

CONSIDERATII ASUPRA VALORII SEMNELOR NEUROLOGICE IN DIAGNOSTICUL NEOPLASMULUI URECHII MEDII

Prof. V. Racoveanu, conf. H. Neumann, R. Anghelide, M. Tanaseanu (Oto-Rino-Laringologie, Nr. 3 iulie-sept. 1958, pag. 199—202)

Au orii relateza două cazuri de neoplasm al urechii medii, cu o deosebită privire asupra posibilității stabilirii diagnosticului precoce.

Diagnosticul precoce întâmpină greutate deoarece simptomatologia bolii este dominată de semnele supurației auriculare aproape întotdeauna prezente.

În caz de tumoare, durerile localizate în teritoriul mastoidian debutează insidios, sînt persistente, sînt rezistente atît la anti-neuragice cît și la antibiotice, iar semnele de ordin general lipsesc (lebra, modificări în formula sanguină).

Modificările ce se constată în cantitatea dar mai ales în culoarea secreției otice, accentuarea neobișnuită a hipoacuziei, apariția polipilor auriculari și mai cu seamă refacerea deosebit de rapidă a țesutului după îndepărtare, sînt tot atitea semne care trebuie să ne rețină atenția.

Autorii sînt de părere că în toate cazurile de supurații cronice oto-mastoidiene, deosebi dacă se constată procese proliferative neobișnuite, la care se asociază paralizii faciale, trebuie să ne gîndim la posibilitatea prezenței unei tumori maligne.

ne a urechii medii. O asertivă suspiciune
e înărită și mai mult de constatarea pa-
ralizilor pericelilor de nervi IX, X etc.

Rezultatul biopsiei poate să creeze con-
fuzii deoarece în urma supurației urechii
medii, pe lângă proliferarea tisulară tu-
morală se constată și una polipoasă.

De aceea e indicat ca biopsia să se re-
pete de mai multe ori.

Pe radiografie, tumorile care se dez-
voltă la baza craniului pot fi bine recu-
noscut, astfel încât examenul radiologic
are o mare importanță.

L. MOLFAY