

## CERCETĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL AL ICTERULUI MECANIC

Porgányi Mária, Szécsey György, Tardos László

Orvosi Hetilap 1959. 12. p. 428

Autorii au determinat raportul Fe/Cu și activitatea transaminazică a serului la 50 de bolnavi de hepatită epidemică, și la tot atîția suferind de icter mecanic. Ei au urmărit să lămurească valoarea acestor procedee în diagnosticul diferențial.

Concomitent au determinat atît reacția de turbiditate cu timol, cît și fosfatazemia alcalină. Rezultatele obținute au dovedit faptul cunoscut că din cauza frecvenței valorilor false, aceste metode nu sînt indicate pentru diferențierea sigură a naturii icterului.

La fel ca și alți autori ei au observat în cîteva cazuri rezultate neconcordante față de natura bolii, atît cu ocazia deter-

minării sideremiei cît și în cazul cupremiei, dar valoarea raportului Fe/Cu a fost întotdeauna în concordanță cu natura reală a icterului.

Transaminazemia a fost exagerată în toate cazurile de hepatită epidemică, iar în cele de icter mecanic, cu excepția a doi bolnavi, ea s-a situat sub valoarea considerată ca limită.

Pe baza rezultatelor lor, autorii consideră determinarea raportului Fe/Cu drept metoda cea mai sigură pentru diferențierea hepatitei epidemice de icterul mecanic, dar recomandă efectuarea examenului concomitent al transaminazemiei.

MARGIT MAKAI