

## EFICACITATEA UNUI NOU DIURETIC ANTIHIPERTENSIV — FUROSEMID — ÎN TRATAMENTUL DISGRAVIDIEI TARDIVE

dr. Vl. P. Băltescu, dr. D. Dejica, dr. H. Mosler, Valeria Băltescu

Din lucrări anterioare, am tras concluzia că fiecare drog cu acțiune diuretică și antihipertensivă își găsește justificarea utilizării sale în disgravidia tardivă, dacă întrunește 3 calități importante: eficacitate mare (evitându-se astfel administrarea îndelungată), efecte secundare minime și mecanism de acțiune pe o verigă patogenetică cât mai superioară. La 15 bolnave cu disgravidie tardivă trisimptomatică (hipertensiune, edem, proteinurie) am administrat timp de 5—7 zile, 80 mg furosemid zilnic (2 tablete Lasix-Hoechst). Patru din bolnavele cercetate au efectuat anterior (ambulator sau în clinică) un tratament cu nefrix fără rezultate mulțumitoare. Rezultatele obținute le-am considerat foarte bune: T.A. s-a normalizat la 13, edemele au dispărut la 12, diureza a crescut semnificativ la toate, au scăzut din greutate 2—3 kg, proteinuria a diminuat la 9; nu s-au semnalat modificări semnificative ale potasemiei. Nu posedăm date în legătură cu utilizarea furosemidului în disgravidia tardivă, dar din cercetările efectuate în diferite sindroame edematoase și hipertensive și din observațiile noastre, următoarele calități îl recomandă: este cel mai puternic diuretic nemercurial, activ în multe cazuri în care altele nu sînt deloc, sau sînt foarte puțin active, efectul său este constant; deoarece este tolerat foarte bine, și nu determină tulburări toxice sau alte fenomene secundare (nu are efect diabetogen, scade nesemnificativ filtrarea glomerulară și fluxul sanguin renal), exercitînd o acțiune mai rapidă decît oricare alt diuretic, este un valoros mijloc terapeutic în preeclampsie și eclampsie.