

Opriy Kalmian

1878

403



620

INT. SEC.
COPIED
FOR REFERENCE
Lot no. 52.597

Under John

28 JUN 2004

1.
Szülés és Dévezetés.

A Szülést segítő Tudomány alatt értendő az Orvosi Tudomány azon része, mely meg esmérte bennünket a Terhesseggel, Szüléssel, és Gyermekágygal, mind tenes mind rendetlen állapotjaiban, az Anyára, és Gyermekre néve.

A Szülésre szülési és a Szülő részre esmérete: értendő pedig a Szülő részre neve alatt, a "Főközből" al, so részre foglaltsato a Fogamzásra, terhességre, és Szülésre szolgáló szülési és részre.

Fel osztásnak a Szülő részre = Felvételre, és Alkotásokra —

ay

1^o Felvisekre 2^o felcöl. 1^o külső,
melyek a kívülről hogy a testet felbontsa,
m. szűrséges volna, látszanak. 2^o bel-
ső, melyeknek meglatásolást a testet
bontani szűrség.

2^o Alkotásokra ismét 2^o felcöl.
u. m: kemények és csontosok, az az a Me-
dentre: és 2^o lágyak a szülő rétegek.

Medentzenek nevezetű azon es
mest üreg, mely az törvöl aján, az
also agyék gerintz, és csont csontok
körött felvise, és követhező 9. csontok
képezik, s. i. az utolsó agyék csigolya
2^o csigó csont, 2^o fan csont, 2^o ülső
csont, kereszt és farszid csont. Ezen-
csontok képezik a medence oldalja-
lait, úgy hogy hátul az utolsó agyék
gerintz, kereszt és farszid csont, ol-
dalt a csigó csontok, elöl a szemérem
csontok képezik falait, alapját pedig
az ülső csontok

Fegyver: az utolsó agyék gerintz

a szülészetnél a Medentzenek tartók,
nem úgy mint az Anatomusoknál, mivel
ezen csigolyánál a szülésre nagy befol-
lyása van, a memyiben a kereszt csont-
tal segíti az előfótot hessíteni, ami
a szülésbe nevezet.

A Medentre csontjairól egyen-
ként tudni kel.

1^o Az utolsó agyék csigolya a
Medentre felső része határo falat ké-
pezik, a többi agyék csigolyákhöz ha-
sonló. első: mel. ö. / also része a kereszt
csontal képezik egy ki dülledést: az elő-
fótot, mely a Terkessegre szülésre =
nagy befolyása van.

2^o kereszt csont formájára
csaló nem három szegletű, úgy hogy
felső része szélebb, mint az also,
két felvise s. i. superficies / van egy
külső mely bolos egyenetlen, rajta
3^o van söt ki álasok szemléthető, a
fattyu gerintzre nyújtványainak

4.
maradéka, egy felső felőrin mely ki vőjött,
is 4: vagy 5: pár láthat mutat, a felső
kereszt láthat, a külsőn a hátsó kereszt
láthat látható, melyeknek nyílása a mel-
sőnek felelnek meg. Felső része az
egyik gerincvel egyenlő, is kereszt arató
fóhat, e mellett odale két felől egy ki
vájulás melyre az előfok sregletei né-
nek, also része pedig a farsók csontok egyik

30^o A farsók a kereszt csontok ha-
sonló, két része van, egy külső is, egy belső,
egy felső részle, melyel a kereszt csont-
tal közelebbi része, egy alsó részle, a
mely szabad.

41^o A csipő csontok a medence
felső részének odale falain keresztül,
két része van, egy belső ki vájult, mel-
lyet egy fél emelkedést hoz, a névte-
len csontok része két egyenlő felek-
re oszt, egy külső rész mely egyen-
len, felső részle, felül is elől egyen-
len, is ki dudorodott, kereszt a csipő
csont részét, hátul a kereszt csont-
tal egyesülvén, kereszt csipő részé-

5.
lét keresztül, alól az ültő, alól is ké-
mérem csontokban négyen által.

5^o Az ültő csontoknál két sreg-
gelyt találunk, egy előt, is egy há-
tulot; ezen utalvánál egy ki állás
az ültő csont közele van, a két sreg-
gely also részén vagy is az alján az
ültő csontnak dudorodott, vastag, is-
formája az ülőgumot, van továbbá
két része, egy belső egyenes, is egy -
külső egyenesen.

6^o A kereszt csontoknál két
sreggelye van, egy felső mely az egy-
enlő felé: egy emelkedést a fan-
közéle is fésűt fésű, láthatni, al-
so sreggelye domború, is a két csont
együtt való egyesülése által a
kereszt rész, haggya az ívesítés
alatt maga közt két rész van, egy
belső egyenes, is egy külső egyenesen.

A fentebbi csontok által háj-
tetett medence, két oldalán felső
is nagy - is also is ki medentéren, el-

válakotatnaki pedig ezen két felek egy
 korr által, mely a kereszt csont elő
 hegyétől, a csipő csontok házában, a
 szemérem csontok felső végelyén ke-
 resztül a szemérem csontok íróvöl-
 se felső részének házában végződik,
 ezen korr felett a nagy, alatta a
 kis medentre foglaltatik, a vállakorr
 korr pedig névtelen lincának nevezetik

A nagy medentre hátsó falát
 az utolsó ágyék gerince, oldalsó pa-
 lat a csipő csontok házában, része,
 elő fala részben, ezt csak nagy része
 az az a háspalack részik.

A kis medentre hátsó falát a
 kereszt és farszék csont, oldalsó pa-
 lat a csipő csontok hátsó fele, előfe-
 le pedig az üdő, és szemérem csontok házában

Hegyzés midőn a trülevri beströbe
 egyedül magányos medentre nevezettel
 élünk, akkor mindig a kis medentre
 íróvölse, a felső a nagy medenterit
 mindig ezen horra adással jelelyük

A kis medentrének nagyobb befolyása =
 van a trülevre, mint a nagy medentre-
 nek, mert amaly rendszer alkotása, nagy-
 sága könnyíti igen a trülevest, midőn
 annak első fala nagy részből lévén,
 a gyermek is mi minden mozgásában
 szabad kitágulást enged.

A kis medentre 3^o része opta-
 tik fel. u. m. Dimeritetre, kimeritell-
 re, és ürege.

1^o De menterének pinstroitus felve-
 os: nevezetik a kis medentre felső-
 nyitása, melyet hátul az előfal, ol-
 dalt a névtelen korr, és elől a szemé-
 rem csont felső végelye határol.

2^o Kimeritell p: exitus pelveos: a
 a medentre alfo része az elől a szemé-
 mérem is, oldalt az üdő, hátul a farsz-
 ék csont által könnyültesik.

3^o Üregelek p: cavum pelveos: a
 mondatik a kis résznek hátsó foglaltat-
 tott két, ezt képezik a kereszt csont
 farszék csont hátul, oldalt a csipő
 csontok, névtelen korr alatti része,
 és az üdő csontok, elől a szemérem csontok

A medentre ürege két félre
 osztatik, egy képzelt vonal által,

mely a kereszt csont második algerme-
 serege, a harmadikkal való összerö-
 pítéstől, az irvaja mellett, a me-
 dentre belső oldalán előre igazol-
 van, a szemérem csontok irányára
 alko vesztéshez is, a képről harron
 felül lévő két felső félnek, az al-
 ta lévő pedig, alko félnek hívattatik,
 és így következül a szemérem csont-
 sok csak nem egész felső kéncz
 foglaltja el, a felső fél.

A fentebbi felosztás igen körül-
 a sebészi gyakorlatra, azért még más
 felosztások is körülvevő, mint az
 a Dösege.

A medentre bővege igen körül-
 ges, a körül meg határozására. Hogy
 pedig a bőveget meg tudhatjuk se-
 kerek vonalokat gondolni, a meden-
 tre egyik pontyától a körpön-
 ton egyenes irányban keresztül, az
 ellenkerő oldali medentre palánál
 bíronyos pontyától, mely vonalok
 át mérőknek s. diametri / keresztet.

A nagy medentriéts csak egy
 kereszt át mérője van, mely kör-
 dik az egyik csipő csont társjától
 a köregeen által az ellenkerő oldali
 csipő csont társjánál végződik, ez
 9. ujnyi hosszú a nagy medentriéts
 hátulról ^{előre} nem mérül mert 1^{1/2} fa-
 la csak hágy részből léven, nem ke-
 mény, és így 2^o elegendő hi tágulást
 enged.

A kis medentre át mérőjé sok-
 kal körülvevő, ebbé tudni azért.

1^o a bemenetelnek 4. át me-
 rője vagyunk. + i.

a) Egyenes át mérője, v egy befog-
 lalt s. diametes conjugata, / kör-
 dik a kereszt csont előfoka körpön-
 tonján haladván keresztül a szemé-
 rem csontok egyezülése felő =
 szegélyen végződik, ennek hossza 4. uj-
 nyi.

b) a kereszt át mérő s. diametes =
 transversa / körödik a csipő csont felhöz
 hosszú körpön tonjától, és a medentre kö-
 r pön tonján túl igazhervein végződik, a
 más oldali csipő csont felhöz hosszú

Lörög pontyát, a medentre lörög pontyát is a medentre lörög pontyán tul igy eszervén, végződile a más oldali csipő ~~csipő~~ er 5. ujnji hosszu.

2^o Lörög átmerő ar egyike p: di ameter obliqui / kezdődile a jobb csipő kesert iresülésnél, a medentre lörög pontyán futván kesertül a más oldali csipő szemérem iresülésnél, v is a tojás, libe lett végződile, emek hossza 4 $\frac{2}{3}$ ujnji. a más oldali ferde átmerő a bal csipő kesert iresüléstől, nem hasonló irányba, at végződile, s minte ar ellenkerő oldali rojás, lib felett, hossza meg egyet ar előbbennivel.

Segyres a ferde átmerő allu löny valde melyek orvasol p: nem tábató / skamára isattal felkatalójakról de ventis átmerőjeinek is nevertetnek.

2^o A himenetelbe is 4. átmerő találtatnak nem.

1^o Egy egyenes átmerő p: diametri conjugata / kezdődile a farokul végző hágyában, a medentre lörög pontyán kesertül a szemérem iv also szegelye körében végződile, emek hossza 4. ujn.

2^o Egy kesert átmerő, mely ered ar egyike ülo csont damboroda sa végző részén, v is ar ülgumon, a medentre lörög tájat el hagyván, a más oldali ülo csont hasonló részén, v is gumoján végződile, hossza 4. ujn.

Harmadros a het ferde átmerőket mivel kesert gumo tralagokra terjednek, s igy eren részelt morgok lévén, részint a hitágiságnak engednek, részint hosszúságukat pontosan határozzák nem lehetvén, elmaradhatnak, mind kevésbe pontos átmerő.

Kezdődile a kesert gumo tralag also szegelyeitől is végződile ar ülo csont lehágo ágánál a szemérem le hágo ágánál való egyesülésénél, er 4. ujn.

3^o A medentre lörögbe 3^o átmerő van t. i.

a / ar üreg átmerője egyenes átmerője, er kezdődile a kesert csont hivajulájában, ott hol a 2^o átgerinte a Bikkal for öfve, s lörön vonatván a medentre lörög pontyán kesertül a szemérem csont bel

ső skinire, emel vége felé végrődik,
hossza 4. $\frac{3}{4}$ ujj.

Cy Ar üreg felső hereszt átme-
rője. Kerdődik a tojás hlt felső re-
skin, és az át ellenes tojás hlt felső
részén végrődik a medentre köröz
ponnyán heresztül, hossza 4. uj.

Cy Ar üreg alsó hereszt átme-
rője, kerdődik az egyik ültő csont
közöttől, a köröz ponnyon által
iránta, és végrődik a más oldali-
ültő csont között, és rövidebb, =
mint a felső valamivel.

Fegyver szoktak az irak még több
át mérőket is számlálni, de a gyálok-
latba kevés hasznok lévén, hi marad.

A medentre lajra hosszaf. Di-
agematis felvess. aron holt melyet
a fan iv köröz ponnyától a hereszt =
csont hi vajulaja körözéig vagy az
elő fogig huratik, és 5. ujjnál is hosszabb
de mivel ezt élőben hi mérni nem
lehet, azért ez is el maradhat.

Egy máshoz hasonlítván a hülvöl-
féle át mérőket, hi tesszik.

101 Hogy a felső medentre átme-
rői, nagyobbak az alsóknál.

202 Hogy a hlt medentre nem min-
den irányban egyenlő bő, v keskeny, mert
a hereszt mérőbe leg szélesebb. Mi az
üregbe ellenkerő, hát ezt az egyenes
leg hosszabb, a felső hereszt pedig hlt,
sebb, az alsó hereszt leg kisebb.

303 A hlt menetel át mérői, csak
nem mind egyenlőb.

A fentebbi át mérők a születés
alatt változnak, mert a hlt menetelbe
hátra sodorván a fasztrik, az nagyobb
bodik, a mi igen nagy ponnyáján, =
mert a gyermek születése körben át-
mérést által nagy hájtartó a meden-
trén heresztül, hogy amek nagyobb
át mérői a medentre nagyobb át me-
rőinek, a kisebbek a hlt ebb át me-
rőkhöz felolgyenek meg. Eszméresen
lévén pedig az át mérők különbözö
iránybéli változó nagyságok, vltá,
gaz hogy a gyermek a fentebbi termé-
szet tökéletesen nem selyesítheti meg
gölgöz, keveskedő hely herkesibe, ha
nem tüktség hogy az át mérők válto-

so nagyságát, magát alhatmarta, mi egy dírt csatá a gyermek forgó murgája által helyesítés.

A medence csontok rész részről örvé nővel, rész részről porro, és szilagó által készíthető. A: Csip ülé, és fan csont örvé növe: vannak a fel sérdülésknél, és külső részeken az irváját kérik, az utolsó ágycik gesztrénel a kereszt csontal való egyesülése erős, nem enged murgást, és formája arló fokos. - A Csip és kereszt csont: porral egyesülnek, a Csip kereszt irvülés által, az ott a hol az elő fok kéglerei; némelyek azt állítják, hogy a terhesség alatt ezen örvé hűsés porrai, és szilagói megdagadván, az az durradván, el lágyulnak, és így a gyermek feje ált hájtájában engednek, és sagulnak, Ez ugyan kékeső, de akkor mindig rendszeren beteges

alapot az, egészséges rendszeren alapokban a szülő meg csatá fájdalmat sem érez, az említett Csip kereszt irvülésbe. Ezen irvülés beteges engedé sejt meg tudhatni, minő aron által következendőből. - 1^o Hogy a szülő lönch aron helyen fájdalma van. = 2^o Ha fel emeljük a Csombokat, a fájdalom nagyobbodik, és az által. 3^o Ezenmi hogy az irvülés enged, és 4^o Terhes nem ülhet fájdalom nélkül. Fan irvülés mely által a két szem, nem a fan csont körbe ejtett porra és szilagó által készíthető örvé; ezen irvülésről szinte állítják némelyek, hogy a terhesség alatt durradván, el lágyulván enged, és egymájtól eltávolít, de szinte rendszeren egészséges alapokban nem történhet, beteges alapoknál felédig meg györodünk az által hogy fej, és hogy ha egyide Csomb felemelkedik, akkor az máské fan csont alább marad fel hágván az első; a kereszt porrait irvülés margo, hívált a terhesség alatt el lágyulván a hőtői; Ha a gyermek részrei által réa nyomás képezik, akkor

kátrapele enged, de ezt nem kel kárta,
 longul telinteni, sőt. jófelonyul, mert
 de által a medentre kérsége nevetés,
 vén, ar özet nyoma fénél, vatalakna,
 épipölnelö bősége, ebb utat enged, és
 ha eren morgás, okosan hormány orra
 sítu a stülé, alatt, akkor minden hó,
 veskerheső baj nélkül történhet. Van
 nek stülöh, hol a fartrik bevest
 irésülé, oly erő, hogy a mellese elgye
 kerő gyermeké réskimel a stülé, alatt
 semmi tört nem enged, a mi nem =
 chajtando, mint a fentebből hi teritko

Segyris Szar ugyan hogy a kőke,
 ság alatt a medentre kötoi, és postka
 durrasabbal, és puhábbal, de arét
 morgást nem engedvel, egéjéje, ren,
 de, hanem csak beszege alapóvónál,
 mint Angol bétey ság után, Gont
 bajolnét Schrophulálnál s.t. =
 We is hidjen ar Orvas valaméven a
 medentre Gontyáinál egy mástol =
 valo el fávorhatásában, mert így ne
 kír stülésknél a Gontok stülör,
 hatására skamolván a stülést, a gyet,
 mek is anya veskedelmére adóvel =
 t.

tovább fogja kalasrtani.

Stülésig a stülésknél meg a
 medentre mélyfégét is szemni, mely
 jól seolvan art, mindig a his meden
 trivöl kel érteni. — Et medentre mély
 sige pedig külvömbörö, külvömbb tá,
 fain emel; Így kátsó fala 5 ujny,
 oldalt 4. uj. Ar 12 falán 1 3/4 ujny
 rishán több.

Segyris vagnak medentrél, mel
 lyek a most ivónál magossabbal, és
 alacsonyabbal, de aronkivül hogy,
 ar 12 esetben hogyabb levén a gyet,
 mek által fejendő ut, hogyabb lét
 a stülé, ideje, ar utobbi esetben
 pedig rövid ebb, mondom eren kivül
 semmi beszege, bajt nem okar.

Mikor a medentre a gerinc
 otkoppal és Gombokkal rendezen
 van orve löve, akkor ar Akony,
 nek ato helykeresésbe a meden
 tre felső nyitása nem egipren fel,
 felé egyenesen, hanem egy kevése
 felfelé, és előre, ar also pedig egy
 kevése lefelé, és előre van igazisva,

miből világos, hogy a Medentre Ga
kornája nem lehet egyenes, hanem gör-
be irányu, ezen alája, v. helykerse-
tése a medentrének rendszer általánah
mondatik.

A fentebbi rendszer alája a me-
dentrének vátsorik, a hülmömbfö-
le helykeresésre néve; Mert po. a
virenyon felvibe a felvő nyilája
fel-felé, és keveset csak előre, az al-
so lefelé is előre van igazisva, ha-
pedig Crombjai felkurasnato, akkor
a felvő nyilás fel-felé, az alvő pedig
előre néz, ugy szinte illyen képen
a medentre alája, midőn haszra
be dülbe, fel-ülről is felvő forma
helykeresésbe van. — Az alvő Crombjai
be az elő hegy magosabb, a szemé-
rem csontjánál, ezek pedig magosabb
bale a parvuk gonjánál. — Ezen hü-
lmömbörö alája a medentre nyilájai-
nál függ, réstint a medentre falak
hülmömbörö magoságaitól, réstint a
csontok görbüléseiről

Sagyris a stülérei beépében a
medentre alája alatt, annak hajlását
is irányul, ezek.

A medentre csontok hülmömbföle
nagyvaga, és görbülése azt okozza, hogy
ily alhosáru kétféle: mint a medon-
tra, rendszer, egyenes tengelyes: axi, if fel-
vemi lehetetlen, azért majok több ap-
vobb tengelyes, sőt görbület is ker-
vettél minden karon nélkül, mert va-
loban semmi, v. igen esakely karnu
a tengely, ha a veres lineát esmérjük.

Veres lineánál mondatik aron
hoz, mely a medentre be menepelének
köré pontyan keresztül a hi mene-
tel köré pontyan egy hatadgya el, hogy
a medentre falak minden pontyan
egyenlő távolságra esnek föl. —
Ezt esmeri igen stüléges, mivel
minden stülendő kétféle ezen hoz
stereint morognat, és hajlatnathi
a medentréből, mivel a stereint bel-vir-
gátni, a gyermek morgasat elő mordisani,
v. hi is horni. — A veres linea pedig, =

mint a medentre alhozájából, emel jár-
sából nyitván, nem egyenes, hanem =
görbült, oly formán, hogy felül a tördöl-
felé, alul a Crombol hórre ferjednek
előfelé gondolt főtásajai.

Et medentre alájának meg emere,
se igen neveses, ugyan arit. miho az
Asthony alája medentrejével együtt ol-
lyan, hogy felső nyitása felfelé, és előre,
az aló befelé és előre néz, akkor a kereszt
Cront mértékeseen domboru. Et hülső
nemző rések sem hátra, sem előre nem
hanem a hórre tájra foglalják, a Crom-
bol hórre, a vékonyak hi tesszék. - Ha
a medentre felső nyitása igen előre =
néz, az aló pedig hátfelé, akkor a kereszt
igen domboru, a vékonyak nagyon hi
tesszenek, a hülső hülső rések egész-
tlen a Crombol hórre hátfelé szinte
seválnak. - Ha pedig a medentre fel-
ső nyitása felfelé nagyon, aló nyitá-
sa pedig befelé áll, akkor a kereszt la-
poz, a vékonyak csals kereszt tesszenek
hi, a hülső hülső rések pedig előfelé
néznek.

Et medentrenek csak a hátra, ö-
vesei fel a fogamrott petét, azt nevelés
et

és védi a nyomástól, és minden egyből hül-
ső befolyástól, a tülei alatt mind a =
gyermek, mind az anyára néve bírtos, sa,
kornas enged, a hülső a tördök feljő re-
se rajta nyugfok, hátra írma ragas,
kardnak, és érdekel tölle, védi és támasz,
szul szolgát a méhnek, viruló holjag,
nak, és beleknek.

Midőn a medentrenek oly alája és
bőjége van, melyen egy rend azan li-
fejlvőst, és est, és rendez nagy ságu gyer-
mek szereztesen meg pütelik, azon
medentre jó, ezt pedig meg emerehemi
2. et felé jelleküll, t. i. hülső és belsőből

Et hülső jelai a jó medentrenek,
mely csak hülső látni lehet a hülső
rendől.

a. a. Et kemény jó termese, hórre
nagy ságu, könnyű járása, egyenes alája.

b. Ha a vilat rendezel jó szelése.

c. Ha a csipő jó szelése, ha a
vékonyakba mértékeseen vékony a
kemény, ha a kereszt cront mérték-
lelesen hi domborodott.

d. Ha a Crombol steged endő lép
reit állanak.

22. 1^o Ez a felvő is albe végtagok = rendszeren állottak.

2^o Minthogy a külső jelek, = csak a medentse külsőjén mutatják, midőn a medentse belsőjébe rendet, tansígelhetetnek jelen. - Ebből világos, hogy a külső jelek elégke, lennek, jó medentset bironyítani, is hogy ere meg belső jelek is kívánatos, nak, milynek.

3^o Az előfok oly magos, alája, hogy egy virgáto ujjal el csúri ne = lehetessen.

4^o hogy a Csipő Csontok fel = ható képi hossa, v a névtelen linea mértékletesen nagy.

5^o A kereszt Csont hi vajuláját neheren, vagy éppen el nem ismereni.

6^o hogy a gyermek alól aló ré = sre értesedik, is a könnyen ere, tudik lá.

7^o hogy a Csipő Csontok hi met, = rére mértékletes, is az ülő Csont tö, = vize, hi is hátfelü al.

8^o hogy a Skemérem Csontok in = kább hi, mint befelü ajakhoz odnak, is a Skemérem iv hi felü van ajakhoz odva

9^o ha az ir vápa helye, v máj, = valamely oldal fal, a med entrébe = igen be nem dülled.

10^o belvő jelekhez tartoznak: = még a hi meneset jeleis, omillyenek.

11^o ha a fasztrik nem igen ko, = stu, is a nyomara enged.

12^o ha az ül gumok nem igen = nagyok, is inkább hi felü alnak.

13^o ha a Skemérem iv, két vir, = gáto ujjat verken fel.

Azon skemélyeknél, kiknél ezen = jelék nyilvánosan találhatnak, azok = vol mondhatni, hogy jó medentrajuk = van. - Minthogy pedig gyakorta = nem leheteknél is, sepetik sgo a me = dentre voltárel, azt az Orvas igen = vigyázva, nem vakmerően mondja hi.

14^o hogy külső répre felere, = ben külső, is belvő.

Külsőh erék, a Skemérem = = Domb, a nagy is kis Skemérem aja, = kol, a Skemérem ajtó, v kőre, kőre = hest, is Csillo.

A' Stremérem dombnat a' stüli
vri gyakorta, ba csak annak helyker
sejésit stüliig tudni, ha a' medon
tre jó alája, csak kevesje fávörít
a' kápfalatol egy kevesje befelé,
er kondos stüliet van be'üléseve,
is tömött kövességel töltve, a'
stremérem dombb helykersejésébül
lehetgeszini a' medonra alájat.

A' nagy is his Stremérem ajkalt,
melyek a' Stremérem dombb alatt her
Töndrel, alá felé memet is egy örve
körébe memet ve'gröndel. - Erch
röt tudni kel hogy a' his gyermekek
nél a' nagy ajkalt a' hisingeket nem
fedik, soványok, de a' felverdültel
nél kövérébbek, is tömötebbek lesz
nek, egy most erit, is fedik, a' his ajka
kat, is így maradnak, még csak igen
gyakori körösülés, is stüliet által =
igen elnem gyengülnek, kárnok =
hogy az egyebb stüli' rejelet fed,
gyál. A' stüliet alatt a' méh hüvely

hi légitájára strogálnak az olyanok
kik gyakori körösülés, stüliet is más
beteges állapotba stremvedtel, erch
a' nagy ajkalt soványak, lefüggök,
a' his ajkalt, ~~stüliet~~ pedig másho,
sok, ezt tudni kell a' körösülés hűdés
veget, hogy körösülés a' más körösülés
is stüliet.

A' Stremérem ajkalt hűsöje, is
fide kerektbe van panyvarva, a'
nagy Stremérem ajkalt kört, a' körök
kiz elött, az olyanoknál hol körösü
lest is stüliet stremvedtel lankadt,
ránpros, több helyeken be' repederett,
olyanoknál pedig kik stüliet, is gya
kori körösülest nem stremvedtel =
egyre sepra, is tömött.

A' his Stremérem ajkalt bös rán
tról, melyek a' nagy Stremérem ajkalt
ba kerdően kik otals kátra, is
előre terjedven, is mit a' nagy st
mirem ajkaltba ve'gröndel, erch
egyenlő vagy tag-ság uah, jivonak, a'
nagy ajkalt által fedetnek, olya

noknál hűlő gyakori körösülés, és
 látszik meg nem szenvedte, hűlő pe-
 dig már erebbe ki csapongottak,
 aronál nem egyenlő nagyságu-
 at, vas, tejságuat, mos, kő, és
 nem fedetnek, a gy. ajakok az.

A Cvillos csak azért említettük a
 szülésre gyakorlása, hogy ezt felesse
 nagy irihenyisége miatt a virgálya-
 alatt, a memyibe lehet lecsúszni, néha
 ez rendkívül nagy, és emelkeznek este,
 het a régi orvok hol a Cvillos nagy,
 sága végez a szülés nem történtek,
 de ez alig hihető, és csak a régi orv-
 soknál a szülésre való járaklan-
 ga mérsékli erem hibás vélemények.

Köröz huz aron vére, mely a vég-
 bel nyílása, és a stemiorem hasadék, és
 is stemiorem külső körött vagy on, és
 a fel védültséget többé, kevésbé van
 szörültek be véleése, nagysága 1/2 ujnyi,
 néha nagyobb, ekkor hűlőbb a stemi-
 nem hasadékot, és ilyenkor a szülés alatt
 be repednek nagyon, és általában szolgát a
 méh hüvelynek, nem engedni egeszren

által csupán a főt, a stemiorem külső
 nyílásán; és olyanoknál hűlő más szül-
 tek ránkros, több helyeken be repednek,
 és erem repedések hegy jélei látszanak.

A Belső szülésre repednek tartanak
 a méh hüvely aron csapás na mely
 a nagy stemiorem ajakoknál kezdődik,
 hat félé meggyen a méh nyílás körül
 veszi, és ott végződik, ekkor tudni kell
 a méh hüvely nyílás, mely a nagy aj-
 kónál kezdődik, és szűr alapotba egy
 hányával vétesik körül, a szűr hányá-
 val, és csak a véreketnek enged feljött,
 erül tudni kell hogy, a szűr hányának
 jelen létezőt a szűrre, és nem léte-
 ből, a baránavágra ismét, de er igaz-
 ságtalan, mert er oly gyenge hogy hű-
 sebb morgajokra is elreped, sőt a gyet-
 meket nemrő nézet kirtogajaja alatt
 is elreped, vagynak ismét oly szűr hat,
 tyúk melyek körösülés alatt sem min-
 denkor repednek, azért az erül a szűr-
 repedése való hasárvia, bizonytalan,
 az is igaz hogy ha a szűrre nagy mor-
 gajokat nem vesz, kirtogajajok általában
 val kinyelmenen bán vele, és mérsékli

les, vagyis, akkor meg marad egész az =
első körözüléig.

A Hádra hüvelynek 4. fala van.
1^o mely a szemérem csontok hátsó fa-
lák bázisa. Hátsó mely a kereszt
csonton fekszik, és oldal falai, mely
a csig csontok felé néznek. - Ezen
falak oly kemények, hogy kik körösü-
sét alatt születést nem szenvednek,
egy máshoz körrel állanak, és elég en-
gednek nagyobb tért mint egy új fel-
vételre; falai igen rándrosok, és
méréggel teljes, mellyen a termé-
sret a születés alatti hi táguláson ren-
delni láttat, hogy ezen nagy hi
tágulás, has nélkül történhesen.

A Hádra hüvely belső hátya-
jába, számos apró lakony mirigyek
vagyunk, melyek körül árapotbaktéri-
mennyiségbe; de a terhesség alatt, és
vége felé oly bővege, nyálas váladé-
sanak el, hogy nem csak a falak közé
lomb, de hi is csorog; ept a terméssel
a könnyebb által csuáskanájra kerü-
sével rendel.

Aron helye a méh hüvelynek
melyet ragasztódik és végrődik a méh
nyakán, méh hüvely, baltorattyának,
vagy fenekének nevezetik.

A méh aron hátya, húsz sű-
lő rést, mely a medence üreg felé
felébe fekszik, a végül és vérellő
kötélg körött, és hasonló egy koru
nyakú körvétel, melynek első és
hátsó fala ívrű van nyomva, hogy
na hogy a fel elcsúszott kőjű fel-
vétel, nevelje, és védje, sőt an-
nak idejében hi is kőtsa.

A méh formája változó, hü-
lombfélé idejére nére átremé-
nek; a hi lánynál csak nem mon-
dola formájú, elöbbeni formája =
csak addig van míg a fogamrás,
na alkalmatos, arutin ismét vál-
torik. A méh fentebbi felvétel =
több okolatol változik, mely havi
kiszűlés alatt változik durrasabb
és fejtebb áll, a tele vérellő köjű,

kárpás lefélé, a tele vég fel előre, és
lefelé, a belső lefélé nyomjatu, de
átlat is helykereséséi leginkább
is leg frembe tűnőben a terhes, ig
alatt váltórassza.

+ Fel osztatik a méh, fenékre,
mely ar ö felső omboru rére; testre,
mely ar ö köré rére; és lyakra, =
mely aron huz oplopu rére, mely el
vegrödül, és a méh hüvelyre rére kö-
vül, ar a nyaka.

Fel végvén egy Bom szegletű
his úreges, találatok oly méhbe,
hol még terhes, ig nem volt, Bom
nyílajai vagnak, egy ill a méh
hüvelybe vité, és a nádora belsőpa-
ja, és két oldal keszö, mely el a
külsőbe veretnek

A méh formája a terhes, ig
után gömbölyű.

A méh aron rére mely a
méh hüvelytől vitétili kövül, méh

hüvelyre réreinek nevertetik. Ennek
két nyílajai van, egy belső, v egy nád
ra belső szája, és egy külső, mely a
nádora külső szájának nevertetik. —
Ennek két nyílajai vagnak, vagy
hogy egy keszűt kapadhat foglal
nak magok köré; a méh hüvel-
lyre rére belül, a körépen szélesebb,
eron rére frembe tűnő váltórassza ten-
vén a külső alatt.

A méh széles skálájának ne-
vertetnek, melyek a kapadkájának
fajtajai lévén, be borítván a méh
elő réreit, és a külsőket, és pete-
fejeket, a méhét helykeresésébe =
tassza.

A méh külsőkre erei gömbölyű, neve
deter, váltórassza nem fremve a terhes, ig alatt

Mojas fajrahk alatt irtjuk aron babb
frem formája: hol nagyobb hol kisebb faj-
teket, melyek a méh külsőkhöz a méhvel
és magok körött is széles, hőtök által faj-
csalattanak örvés.

A Terhességrol.

+ Terhességnek mondatik azon állapot midön az asszony hátrajában fel elvett tojást hordoz, és a fogantatástól egészen a születésig hordozza.

A Terhesség fel osztatik

1^o A Terhes állapot valójára nézve, 4. féle az az Valóságos terhesség = midön az asszony altestében fel elvett tojás van, az ő minden részével együtt. - Fattya terhesség midön a méhben egy elfajult tojás találatatik; történetek hogy a fogantatás által fel elvett és elvált tojásba nincsen magzat, hanem az már elején meg halt, és csak a tojás egyébb részei meg maradnak, mivel pedig az illy születéssel valóban nem érkezik, innen a Terhesség mola Terhességnek is neve

szik, ez néha csupa hólyagból áll, s mola hydarcivica; máshor húgy mola, nemelykor az elfajult tojás levegőt fogtat magába s mola ventosa; és máshor csupa véredényekből, v. atv. verből áll. - Primitív Terhesség, az tubajdon kétféle nem terhesség, hanem beszeg, alapossya az altestben, az organumoknál, és a méhnek, mely alatt a has fel támad, és egyébb való részai is vannak, hasonlat a terhessighet. - Illyenek a tojás fejtés meg keményedése, virhos, sülkös a has organumokba, a méh keményedése és durradása, a méhnek = levegővel való kitöltése. - Legyen Terhesség az, midön valóságos terhesség mellett még vagy Fattya, vagy Primitív Terhesség, vagy méhben hivüli terhesség van jelen.

+ 2^o A fel elvett tojásból léte.

Hádrabéli a Terhes, ig midőn
 a fel elestett Gójas a méhbe esen
 kővén ottan foglaltatik, is fejlő
 dik ki a műle, ig. - Hádrán kivül
 ki mikor a méhen kivül, igy vagy
 a Gójas felekehbe meg ragad, vagy
 a kúrtólbe fel vészevén, tovább
 nem helad, vagy a hasba esvén, a
 has kővénkor ragad, is erekhez ké
 pest a Hádrán kivülli Terhes, ig is
 30m féle. - Gójas felekehbe. - Kúrtólbe
 is Hasürelé Terhes, ig. Ezen 30m
 alapozott máshép rendeltetésig,
 mel is neverik, is igy a Terhes, ig
 get rendeltetnek. - Nemelyek
 mag méh kively, is virellő ho
 jagbéli Terhes, iges is alisanak,
 de ert ha, de ert ha a részek =
 munkálkodását, is hely is felmityűlt
 erék igen volna kétségbe dől.
30m A fel elestett Gójasok
 számará.

Van egyes, v többes, kővén =

Hásmas, v. t. - Többes, löbnyire kes
 kő, a hásmas ritha. - Nemelyek
 meg Strentés, is Strentés stentis al
 lisanak, de er nem stülsége, a =
 praxira, elég levén a fentebbi fel
 aprás.

Terhes, ig neve alatt, mint va
 loságos rendez eggyes Terhes, ig is
 tesődik, er pedig aron alapozva
 az Alkrony nak, midőn méhben
 egy magkat, minden részével ren
 dezen foglaltatik. - Ezen alapoz
 különböféle váltórájokat hoz
 elő a Terhesnek, mind belhében,
 mind kishében, melyek Terhes, ig
 alatti váltórájoknak nevezesnek.

A váltórájok melyeket a
 valóságos Terhes, ig hoz elő féle.
 - Körönjegesek, v Történésbéliek
 melyek általában a Terhesnek =
 mind Testi, mind lelki alapozás

erik, is a mih, is hül sö strütö népa,
 ken hiviül. Így az emböken hiviül
 egy edül csak a has falain véresnek
 érre eren változások a testnek
 minden systemaiba hülölik mago,
 kat, de innen a terhességnek csak
 erövel szöklünk, melyek gyakran
 ban ennél mint azon hiviüljön
 nek elö, is fele változások.

1^o del kére váltörök, ugy:
 hogy hi elöbb víz, most nyomor
 lerk, is harago, is elenkerö, isre,
 kenyek, vagy legkisebb békákai
 sok erant, is strernek gyakori, =
 mint elöbb utálkah, is lihet strer,
 sek, most utálni kezdik.

2^o ok ideg rend strerbe is töi
 sennek változások. Így gyakran
 el ajul, hülömbbféle népreiben
 fájdalomokat, sött görtzökész iser.

3^o ok töi hül söje váltörök,
 így némelyek halaványok most piros,
 s.

3^o mal, is elenkerö légy ábriratosok
 ban hülömbbféle nagy sárga sárga,
 foltsok mutatshornak, némelyeknél
 hülömbbféle Jaganatok strömarosok,
 némelyeknél Tremor bádgyadok
 lévén, azok hideresöröpp harikával
 könyelözetnek.

4^o meg váltörök ar itüagy, némel
 lyek most sokat esznek, mások he
 ves ebet mint elöbb, némelyek
 egészen ellenkerö dolgokat hivan
 nak emi, is erök is mint p. k. k.
 kat, homokot, némelyek undorodó,
 leginkább pedig a kistok, némel
 lyek gyakran hármak is.

5^o ok lélegzés kapora, a szív
 dobogás erös, ar erös, isre huror,
 erös, vagy strinte görtzökész.

6^o ok Kizelösek hol neker, hol
 art nem saothattyák, némelyek he
 veses virel, máskor sokat; A virel
 let hol sárga, hol veseset, sött né
 melyek isertö is.

74^{es} Hol rekedt, hol neker a
 skibe, homan külföldi félé bajat
 skarmának, sőt sketében is más
 betegségekben a has organumainak
 szenved, nemelykor hasmenés is van.

80^{es} Hämelyeknek víz is csomó
 támadnak, hol a has, hol a méh
 víz ereiben, hol pedig a lábakon,
 hol csak egyiken, hol mind a
 kétfőn is.

90^{es} Ragynak hirt a betegségek
 alatt más betegségek is kapnak,
 p. o. félbe hagyó lártt, majok némely
 a Gerkeség által, mint a Chy-
 siensok, de csak Gerkeség lefolyá-
 sáig, nemelyek meg is kírnak.

100^{es} A körönseges váltórájában
 kívül vagyto még a külföldi,
 melyek az emlőben a hasfalakon,
 belső is külső skülső répreken horra-
 nak elő, ereh mint hogy minden tet-
 keségek követnek, skülségek váltó-

rájoknak is never késsnek ereh.

101^{es} Az emlőh körönsegesen na-
 gyobbadnak, teltyesebbek, fesszebbek,
 és tömösebbek, a rajtok livő
 bős fessül, igen eireranyek lévén,
 gyakran nyilatko fájdalmas erer-
 nek, a bős fessül, kitágulása mi-
 att az víz edények, mint hirt fona-
 lak herdenek által késseni, a bim-
 bok, hol önként, hol nyomásra né-
 ha víz, néha sávo, néha tej folyik,
 a csesz bimbok nagyobbak, és udva-
 rokkal együtt sejtésebbek lépnek.

102^{es} A has falak fel domborod-
 nak körönsegesen, és pedig 103^{es} a kö-
 rönseges, arusan otvats, és végre has-
 felé is hirt késseni. - A kördőhög-
 re hirt, ebbadik, sőt egész rem 104^{es} =
 eny isrik, a kördőhög rászorival egy-
 gyüest, egy időben pedig kifelti dombor-
 odik.

105^{es} A külső skülső réprek fel-
 dagadnak, tömösebbek, eireranyek,

melegébbel, néha szárazabb, néha nedvesebb.

4^o A' méh küvelé rászai kerdeneh el enyészni, "vaga sira" sebb lesz, érleheny, néha szárazabb néha nedvesebb, és melegébb.

5^o A' kösöh csak nagyobb hitegyedést szenvednek, és a kösöh tel, és pese fészkellettel együtt igen érleheny, és nagyon hajlandó a legkisebb okokra, és a gyuladástól sokszor úgy szenvednek ezen népek hogy azt szenvedniük kell a "des" hez érne sem veszi, vagy csak a terhesség jeleinek tartója, vagy elég könnyűen, gyakran csak a küvelé után mutatja magát az orvosnak. Hogy a terhesség alatt minő változások mentek végbe az említett népekben.

6^o A' méhen tökélet váltakozás, mely nagyjában, idomában

felvételében helykeresésében, mi voltában változik. - Mithelyt a felélesztés hozzá a méhhez jut, aron nál a durradni kezd formáját váltsattya, terjedni kezd, legelőször a fenékében, arután testében, és legutoljára pedig a nyakán, és is küvelélyes népe kezd terjedni, ezen népek gyobborása a terhesség kezdését mindig halad előre egész a 9^{ik} hetet nap közeig, vagy hogy közre mértékük ii. 12. u. kereszt mérték 9. u. a méh nyakán csak a terhesség 5. heté hetnapjába kezd terjedni. - A' hitegyedésnek még aron tulajdona van, hogy aron mértékbe mint terjed, úgy vastagodnak a falak, és kíváls a méh fenékében, hol előbb kezdődik a hi terjedés, a méh nyakán pedig a hitegyedés alatt vékonyabb lesz. - A' méhnek az ő "vaga" bé van káros, mind a belső méh száj

mind a hűrszék. — Munkielhódija is
 meg kívüli, mert a havi kizárás
 törvényes, en azéig, keményül
 el marad, meg váltórik meg a for-
 mája is, legrossz formája hozzá ké-
 re való, szélesebb része fel fel,
 legkényesebb leféléi al. — Székeje
 re is helykeresésére váltórik a mély,
 er ar elvö holnapba keveset de,
 vehedvén, is neheredvén, meg na,
 gyobb adott kéjja által a megmof-
 elig széles, medentre üregbe alá
 stál, ugy hogy a hüvelyes része a hi-
 manesetker hűrszék találatik, a
 4^{te} holnapba a medentre a más
 jobban terjedni kezdő mély^{re} a hi-
 s^{medentre} hűrszék lemi. Akert a hi, me-
 dentrából, a nagy medentrebe
 tudul fel, ugy hogy fenéke is
 széke elöfelé a 8^{te} holnapba:
 leg inkább jobb, ritkán a bal

oldalán van, a mélyet egyúttal,
 omek nyakra is fejesebb stál, is
 a bal oldal felé hátra van hely
 heresve, így tart er egész a 9^{te}
 holnapig, midön a mély gömbö,
 tödni kezd, leg nagyobb hiteje
 része, is fel hágy az elöven,
 kövesetlen a hasfalakat is kö-
 döröt elötte nyomja, midön aru-
 san kezd stálani.

+ 7^{te} Különös figyelmet érdé-
 mel a hüvelyes rész váltórája,
 mert er próbátja a Terhességnek,
 vagy hogy stült e más er ~~elöven~~
 1. 4. ~~er~~ hűrszékü váltórákat
 stenev. — 10^{te} mind en valamely
 Terhességnek rövidül. — 11^{te} Vast-
 gabb, is kényesebb, is edényesebb
 lesz. — 13^{te} Elnább lesz. — 14^{te} Szé-
 kes, is helykeresés is megval-
 tartassya, a Terhesség a mind a
 mély lensebb van, is fejesebb stál,

vagy etöre vagy hátra dül.

8^o A' méh szája is változik
 az ajakok egyenlő nagy ságnak =
 lépnek, vastagodnak, puhulnak,
 a keveset kasádnak el emérik, és
 a száj gömbölyű lesz, az ajkak
 öfve kúrnak, az 1^o Terhesség
 nál ugyan jobban, mint a 2^o
 3^o terhességnél.

Külmönboról pedig a méhen
 történő változások, araknak,
 kék 1^o, és kék mártósvör voltak
 terhesség.

+ A' az előző terhességnél
 a hüvelyes rész az egész terhess.
 ség alatt sima, és puhább, de nem
 igen vastag. - A' Terhesség 2^o hol
 napjánál kezdven, egész a terhess.
 ség végéig, lassan lassan mindig
 rövidül, úgy hogy a Terhesség
 utolsó holnapjára, az az a 9^o

1^o felébe már elég van 1^o linea:
 kopru, az utolsó felében pedig töké-
 letesen el tűnik, a méhnek mind
 belső, mind külső szája be csúsz,
 dik, csak a 8. utolsó felében kezd a
 külső méh szája keveset nyitni,
 úgy hogy az új hegyet belé lehet
 egyezni, a belső száj csak a terhess.
 ség utolsó napjaiban nyitlik, mindon
 a hüvelyes rész mely a Terhesség
 alatt mindig jobban, és jobban rö-
 vidül, a még egészen eltűnt.

+ 2^o A' köbörős Terhességnél, a
 hüvelyes rész, vastagabb, darabosabb
 és csak a terhesség 1^o felébe kezd rö-
 vidülni, a 4^o holnapig: a 2^o felé-
 ben a terhességnek még marad a kop-
 ru csak nem alámondan 4. 5. linea
 nyi. - A' 2^o fel utolsó felében kezd
 ismét keveset rövidülni, de egészen
 soha sem tűnik el. - A' méh szája
 vastagabb, darabosabb, ajakai mel-

lyek a repedés maradványai. - Et' nek
 skáj nem kurodik oly erősen össze,
 mint hih 1^o Gerhesen. - Et' Gerhesen
 4. 5. holnapjában a külső skáj =
 nyitni kezd, a belső skáj pedig a
 9^o elején. - De a 8^o hónapján, vagy
 végén is meg nyitlik, úgy hogy a
 virgáló úrnak kevés utas enged;
 Et' külső nek skájja a 9^o holnap
 ba, már 3^o újnyi skellességű. -
 Et' belső pedig 2^o újnyi, úgy hogy
 a 4^o újnyi követésnél sapintani lehet.

+ Et' Régi orvoslak a Gerhesjéget
 3^o skakapokra osztják, egy ská,
 kárba 3^o holnapot skamizván. -
 Kisebb 9. holnapokra, is leg újabb
 10. holnapokra osztják, aron obbol
 mint hogy 10. havi kiskapulás maradv.
 el. - De mint hogy a népnél esmé,
 reser a 9. holnapi fel osztás ske,
 rina. - Ha ar orvas ar újabb fel
 osztás skerens követésen. 10^o holnap.

ba mondgya lemni a Gerhesjéget. -
 a 2^o holnap fel osztás skerens hie,
 ső sküles, el ijésti a skülot, ugyan
 eren obbol, is mint hogy a hiebb
 fel osztás, mindég inkább el fo,
 gadhatobb, mint a hiebb, is
 többes. Et' nek tudáskor, ágat igyfe,
 smind skelintven 9. holnapra oszt,
 kyal fel, mint hogy pedig leg több
 apronyok hald holnapok skerens
 kiskülnak, aritt 9. kalendariomi
 holnapra osztjuk fel a Gerhesje,
 get, mely idő alatt minden holnap
 ba egészen skerensnél valódi =
 terhes, ignél követésnél váltórásol
 sapintalsasnak, ar.

1^o Holnapba ar emölbejem,
 mi váltórásol nintsenek, a has =
 erélenyebb is puffadt, úgy skerens
 mint lemni skolott a havi kiskapú
 lán elött, vagy utánna, a külső
 skülot népnél nem váltórásol a bel,

sök erősebben, meleg, inkább
 száraz, ritkán lágyabb, amik
 hüvelyes, réze heves és durvább,
 a mék skaja nyílás gömböjü =
 kerd lenni, a hársó ajtó ar első,
 hár kerd hasonlo nagy ságu len
 ni a havi skám ki marad, a ~~széles~~

21 hónapba ar emlök he
 veset durvábbati, s fesküet
 bel, a has erősen, így hízott =
 mint ar 10^o hónapba, és mint hogy
 a mék durvábbaga véget nehezebb
 lap, heves és aris le kálván a
 medence üregibe; a has puffad
 sa el mulit, a hülső kúrtó réze
 ken semmi változást, a belső és
 kékenyeh, meleg, száraz, a
 hüvelyes réze, és nádra skaj, a
 mék le szállja miass alatt át,
 ert újat el érhenni lehet, a hü
 velyes réze vastagabb, és hevesen
 rövidebb, a nádra hülső skaj at

so ajka hasonlo nagy ságu a fello
 ker, a keveset nyílás gömböjüdi,
 mind a kis skaj csukva, a ho,
 skám el marad, vagy pedig ren
 detlen. — Ereken kívül a gyomor
 még most is igen erősen, s riv
 dobogásra hajlandóság van jelen,
 kühögésre öprionörseik, fel he
 vülése nagyobb, úgy skonja is
 gyakorra, hénkesitsekik a virel,
 lére, és nehezebb a virellő hojag
 nyakánah nyomása véget, forobb
 is; de eren utolsó jélek csak tör
 ténésbélik.

22 ar 10^o hónapba ar a,
 skony igen erősen, és vággya
 változik, undorodik, némely
 elvedelhetöl, gyakorra hány is; de
 eren jélek ar 10^o hónapnah csak
 tör ténésbélik jélek.

Ar 21 hónapba ar emlök
 fesküet, s durvábbaga véget

gyakran nyitlatto fajdalmak:
 ever az aszrony arokban, a has, a
 szemérem csontok felett a höre,
 pen duvad egy heveset, a hülső
 stülő réprébe még most is se,
 hely a vaksorás, a méh hüvely
 éprakenyebb és puhább, a hüvel,
 lyes répré még alant van, a hülső
 nádra straj nyitása köhélerezen göm,
 bölyü, aghai egyendőh, és vastagok,
 mind a has straj csuhva van. — Jan
 hónapba még a lehelésbe, a ves:
 edény és ideg rendszerbe hülsőmbb,
 féle künemények mustathornak,
 de erék csak körsinesbéliek. ar

Hil hónapba az emlőbe sem
 mi hülsőmös, a Bil hónapiahon hi,
 vül, a has már nem csak körepen,
 de oldalvast is herd domboradni, a
 méh már amygiva sejedest, hogy
 azt a szemérem csontok felett mint
 egy gömböt éverni lehet, hívats
 sz.

aroknál, hih más töbörök stülkel,
 is soványak, a hüvelyes répr sövi,
 dült, vastagabb, puhabb, a nádra
 strajjai csuhva nagyok, a hülső
 straj aroknál hih más stülkel, még
 is herd már hevesse nyitni, az ajköt
 egyendőh, a méh nyaka és hüvely =
 herd most fel memmi, ar

Bil hónapba, a durrats emlő
 kön a bimbok nagyobbodnak, épréke
 nyebbek, a bimbok, és udvarok straj
 ne sebesebb, a has domborodás:
 már minden felől lehet épreven,
 ni, a méh fenekével a szemérem
 csontok, is hőtőlök kört, köre:
 helyes foglal el elötök, a hüvel,
 lyes répre hárfeli, a heveset csont
 fele át, és rövidül ar il Terkesek
 nél, a nádra strajak csuhva nagy
 nak, másoknál a hülső straj nyit
 va; erék jófent allanak, a méh
 hüvely hevesse rándros, heveses
 sz.

tágnak, nem oly meleg mint az előbb
 bi hónapokban, hanem inkább ned-
 ves, mert a Táborgy midőnyen solár
 választanak st. — Severeser eren
 hónapban, hogy az anya a gyermek
 morgásait észre veszi, az

Ötödik hónapban az emlőket dur-
 zassak, és dagasztak, a víz edények
 láttánál, a ház domborúsága =
 nagy, mely mindenféle sejt, a
 méh feneké egész a hőtőlök táján
 is sejt; A hőtőlök alóló szintén
 tűnnek a hüvelyes sejt a méh-
 tájjal iggyűtt fejtébb van, hit-
 rább a kereszt csont hirtőlök-
 sa felé, a hüvelyes sejt az elő-
 török keresztel névű, a gyer-
 mek fején most lehet ujjal érez-
 ni, az orvónál kék mint skülsék,
 mert a hőtőlök nádra sejt, ezáltal
 nyílt eren hónapban, mint hogy

a magrat elvont nagy sárga véget a
 méhben szabadon nem uszátkoz,
 az ert feje a méh fenekében éver-
 kező, mint egy kis golyó, de még
 a táppintásra helyes el haggya, az

Hét hónapban: az emlők már
 jó nagyok, és még jobban látja,
 csak a víz edények, a bimbók hi-
 formálatabbak és is udvara még
 keszebb, a ház már kékül az ed-
 gyik táján is sejt, a méh fe-
 neké 3-on sőt 4-ujjal is magyabb
 a hőtőlököt, azert ennek gödre,
 és ránsrai kissébbek, a gyermek
 morgásait nem csak az anya,
 de a uirgató is észre veszi, sőt
 ha vehonyon van öltörve az
 anya, akkor láthatni is, a méh
 hüvelyes sejt jó magyaráz al,
 többle, kevésbé hátra felé a ke-

várat Gorn hi vajulájába, a hüvel
lyes réz rövid, ar 1^o Terheséknél,
és a hülső méh skaja még kárva =
van nálak. - Et kih más skültek
rechnél a hüvelyes réz, oly korn,
mint ar 5. hónapba, ti. i. nyúzi, =
rechnél a méh hülső skaja nyíva,
a belső kárva, a gyermek lefele
éto fején nyilván lehet tapintá
ni, sőt a fappintás alatt fejébb
is mórul, ar.

5^o hónapba ar emlök még
jobbá fejlesse, a vékony bő
rúknél ar edények csak nem =
mint iso tol vastag, ág uak, látká
tok, a bimbók nagyobbak; arak,
bél vagy önhint, vagy nyomásoa
vies, savas, neves, ig folyik, a
hú, nagyobb, és mint hogy a méh
igaz fal mans, a hőtől gődröt =
intéssel 1^o dűntese, de a gya.

karlóst virgálo új, ar még találni
fogja, fenekivel a méh jobbra haj,
lik, úgy hogy éren eto alon nagyobb
hi terjedésű, a has is er hülső, éren
honapban, kih más skültek, a has =
falai puhák, valamint a sovány, =
1^o Terheséknél a has falain átkal
lehet a magras rézre hi puhakot
ni, a hüvelyes réz terjed, magojan
át, a bal oldali csip kéreget ízejú
tis fele, ar 1^o Terheséknél rövidül,
úgy hogy éren hónapba 3^o linea,
nyí, sime vastag, a méh hülső ská
ja dagadt, s nyilván hülsőbőrre
ni lehet, nyilni kezd, úgy hogy,
tis gődröt, his lehet rajta isre von
ni; a belső méh skaj még most is
csukva vanrechnél.

Kih köbör skültek más, a hü
velyes réz 5. 6. lineányi, a hülső
méh skaj nyíva, 2^o virgálo újat
vesz más fel, a belső még kárva,
bár nemelyeknél nyíva van, a gya.

mek előtő ało népzet lömgyen tappint,
 szubs hatagut, a fejét mint gojo,
 birt, a mad ontra felső nyilatásaba,
 mely a tappintásra ugyan morog,
 de helyes nem igen taggya.

9^{te} hónap két felekre osztatik
 az első feleben: az emlőle of
 lyanoz, mint a 8^{te} hónapba, akes
 lag nagyobb hi terjedésen esze el,
 arész fel has egjeren a striv gö,
 döriq, a höldöknél 3. 4. ujjal is
 fejjebb, melyet egjeren el tünset,
 ugy hogy az új igen neheren talat
 réa, inkább a jobb oldalon van
 a méh fenekivel, hol is aróknál
 hih más strütkel, is has palatit
 vikonyok, soványok, tappintani
 lehet, is ereknél a has palatit el
 gyengülise véget, a méh feneké
 vel előre, a has palatit dül, ugy
 hogy ert hízveset lenül evinti, ar az
 sütyed a has, mint az előpörök.

heseknél tapaszaloni nem lehet,
 a hüvelyes, rejr leg magosabban al,
 bal fele, melyet a virgáló új alig
 érhet, az 11^{te} terheseknél igen rövi
 dül, 2^{te} lineányi, a hülső méh
 skaj nyitva, a belső csuhva hih
 más strütkel a hüvelyes, rejr 5. 6. li
 niányi, a hülső méh skaj nyitva,
 de más a belső is nyitlik, ugy hogy
 a tappintó új kegyet fel veszi.
 az gyermek előtő ało feje nyilván
 érhet, is helyben al.

13. a magodih feleben a ter
 hez fajdatmakat iver, melyek a
 levest csontul, a fan csontalig
 terjednek, melyek csak perivide
 jelennel meg, is strütkel előre mon
 do jelének mondatnak, ezek aró
 nál hih nappal sokat álnak, is
 járnak, eszve strütkel meg jellemi,
 is gyakoribbak, de ejel ismét el
 künnel, ezen fajás, aróknál hih

más körültekintőbben át lá, és gya,
 kotta a tekerést járva, ában, és beszédje
 ben akadályoztatása, a has, más nem
 szerjed, sőt a méh a fájdalomak =
 alatt hevesen ügve hurvován, ha
 keményebb a méh, fenekével; a has
 falakra hőrvesetlenül dül, a hűdö,
 köt rándulást egyúttal el tünteti,
 a méh eren előre való ejése has
 süllyedése nek nevérik. - A méh =
 most nem áll oly magasságon, hanem
 a hűdökh, és keményen csontok kö,
 rai körében van, a gyermekel morga
 sai keményen tűnőbelen, könnyen tap
 pintkato a magras réze, a has
 falakon átsal. Atr 110 Testesek
 nél a hüvelyes réze, egészen el
 tűnik, és a nádorinak hűsö strija
 a belsővel egyje leze, nyísva van
 annyira, hogy a kappintó újat le
 veset fel veszi, hih más körültek
 arónál a hüvelyes réze rövidül,

30m lineáingyi kóppu. - A nádor =
 belső strija nem csak egy újat, de kes
 köt is veset fel, melyen átsal a mag,
 ras előtő fejet kappintani lehet.
 A hüvelyes réze, mind a két nemű
 Testeseknél le ereszkedik, úgy
 hogy kappintásra eléri lehet, a
 magras feje mérsen át, a meden
 sre felső nyílásába, a magras fe
 je ereszkedik, és a hőrben a strülo
 oly erőst kappintat, mint ha strü
 lö rézei hőrre valamit le eresz,
 ladne és bujni ahaona, mint =
 hogy a le ereszkedett fö, a virel
 lö halyag nyakát irtassya, ar,
 ezt gyakran kempvisszesít a virel
 lére, de csak hevesen üvit hi egy,
 sere. - A méh hüvely bővebben
 válságván el a nyálkás nedves,
 séges, or a strülo rézeből fol
 lyik. - Eren válsorajok neka =
 egy két két, neka egy két napra

általában a születés előtt, később =
aroknál hihet más születés. Mely
válsorás, ok örvösege: születést elő-
remondó jeleimnek mondhatnák, s
jelenszik hogy a Terhes, ig végefe-
lé van, ezen jeleket némelyek
más a születéshez, mások a Terhes,
seghez kánalyak.

Yőrsimék meg válsorások.
u m. ábráskanya válsorik, erke,
kenyebb lesz, stomoru a Terhes,
magányt keres, és vágya kissébb,
és verése, és alaxi melege ren-
detlen; de ezek nem állandók
a Terhesnél, s nem Terhesnél
nél is előjöhetnek, ariszt arok
kor nem tartórnak, s csak töt-
sének belől.

+ Tojásnak neveretnek, mind
aron réprek, melyek a Rádabé-
li Terhes, ig alaxi a méhben =
találhatnák, emek réprei. 100 a
6.

Burkol. - 200 a Kötéshez 25 inot.
- 300 a Mithlexény - 400 a Magras,
vir - 500 a Magras.

Az egész tojás a Terhes, ig
100 kérésben elég épre vehető, =
wah mint egy csepp tojás gyantá-
festés, és semmit hülömbörök,
ni rajta nem lehet, de hamar
nyúl, hogy hogy az 100 hónap vé-
gével, már galambb nagy, igu,
és így nyö mindig jobban, a 900
holnap 100 feléig, úgy hogy sul-
lya 9. font. hozzá 12. 13. új, se-
les, ige pedig 8. 9. új.

Az egész tojás, vol tudni kel,
hogy az a Terhes, ig hülömbö-
féle idő szakaszaiba, hülömbö-
tő kérésű; a Terhes, ig 100 ho-
napjaiba gyenge apró edények,
böl álnak, melyek utóbb a méh-
lepényt képzik, valgye lodit
a.

a Misk belső falakor, is elhos fal-
mája a mehet egyet. De a Bih-
holnapba, más a mek lepény hi-
fejődése után tojás lépü.

A Tojás Burokjai, vagy há-
tyái erék, erék. A Hülékony há-
tya, víz edényes hátya, is víri hátya.

A Hülékony Hátya, a
leg hülvőbb, s nem tulajdon a
tojásnak, hanem inkább a mek-
nek, mely a fel elejett, és a mek-
be sálott pere alatt izgatásván
stínse gyulad, az alapokban ho-
zátik, mely által Lymphát irad-
hi, mely hátyát képez, is er ka-
paxya bi a mek belső falat, er-
nek Bom nyilápis hi vívén, ma-
mos apró edények által kapta-
tatik a mek belső stínével, az-
ert tojás eren hátya hülvö te-
kinvise. - Eren edények a Bih-
honapba jobban örvé gyülnek,

is formályát a mek lepény any-
rejret. - A tojás, al eren hátya nem
vívül, hanem a gyermek agyi kistka-
lás alatt Darabonként men el, az-
ert némelyek eren hátyát nem
szamolván a hátyáktör, csak ket-
tőt alixanak. Most újabb időbe
3mat vívén fel, ert is oda ma-
molyát. - A Hülékony hátya,
nek het lemerrei vagynak, és az
csábitok ismét némelyeket negy
hátyákat alixani vólak.

B. a víz edényes hátya, er
a tojás tulajdon hátyája fajga
veresse, erös hátya, hülvö stín-
stámos apró skálkák láttanál,
melyek stívö edények, is erék által
némely helyeken a hülékony há-
tyával kaptaolatik általok,
De hülvöbb a Bih honapba sugató-
ni kezd, is formályát a mek lepény
magát rejret. A Kerkesség ¹¹⁰ ma-
ly.

kapraiban nem éri körvesetlen,
 a víri hátyát, de kezőbb mindig
 jobban felelnek a víri hátyára,
 úgy hogy a Terhesseg népen, sem,
 mi hór mint, a 2. hátya köröt,
 csak némely helyeken van hór
 se vir. - Ezen hátya a Tojást a
 hülékonyat közi, a magkat mék
 lepényt képriti, és a virez nedvet
 foglalja magába.

+ C., a víri hátya, vékony si
 ma, fehér, külső sűrűvel néri,
 a víz edényes hátyát, belsővel
 pedig a magkatot néri, ez tart
 tya a magkatot, el valópnya
 a virez nedvet, és az edényes =
 hátyával kéjeli a víz kölygöt.

+ A Tojás hátyájának hátszal
 a sűrűsre nére ereh. - A Tojást
 fedik, a mék lepény anyja, és
 magkat néreit képriti, a gyet,
 mék viret magokba foglalva.

a kölygöt, az úgy mondok vir kol,
 kölygöt képriti, melynek a mék
 nyaka hi tagulaj ára igen nagy be
 folyása van.

+ A mék lepény aron spongiás
 két verez réte, mely kélesebb né,
 kérel a mék feneketek ragad, és
 a sűrűs után a hódok vínnel
 együtt üreik, ragadok pedig
 leg mékább a mék fenekének jobb
 oldalra felé. - Ott hol az odali kőr
 a mékbe nyitlik, áll: sejt kövek
 ből, és edényéből, leg vastagabb
 ott, hol a hódok vínnel ered belől
 te, kélei felé mindig nékonyabb,
 felé kének leg nagyobb az mék
 b. 7. 1/2, vastag, ága 1/2, nekerige
 pedig 3/4 font. - Még hülámbar,
 kéni rajta kélet, és két felé ké
 néit. - Egy hüljöt, mely egyenlet,
 len darabos, kusor spongiás, mely
 a mék felé né, az dombon,

eren felvinn löki a kajást a méh
vel. - Egy belső, er sima, a to-
jás hátyái által hordyítanak,
látszanak rajta az edények,
melyek innen a hőrepe kaján
jobbán jönnék össze, és képe-
zik a ködök kőinosz, felerik
a méh lepenyék a méh feneké,
nél a hüvely méhbe való nyitá-
sánál van, de eren kívül minden
helyére ragadhat, ar meg a méh,
neh, de ilyenkor mindig rendszer-
ten lefolyása a terhesség, és szü-
lés. - A méh lepeny kaptára ar,
hogy a tojást a méhvel össze
kaptolja, hivalt a Bile honaf,
sol fogva, egész a terhesség végé-
ig, és a gyermeket kap lalás, ada is
szolgát.

A ködök kőinosz: aron
bél forma réte, mely a méh le-
peny belső réteiből a gyermek
fel

ködök kőinosz men, és er a méh le-
peny és tojás egyébb réteivel össze
kaptolja. - A réte útszóból, és
egy réte szóból, sejt kövekből, és
kősonya, nemü nedves, ég ből,
erek pedig egy hátyával vagy
nah hüvely vére, mely a víri
hátya ad. - A rendszer ködök kő-
inosz újnyi vastagságra, da ka-
sol a kősonya benne, akkor a
ködök kőinosz vastag, és kövör-
nek nevértetik. - Elenkerőbe ve-
res, vagy vére, vagy savany ar,
ha a kősonya nedves, ég nagy
egy helyen, vagy a víz ar edé,
nyelben fel akad, akkor eso-
mos formál, de er fagyva, né-
ha valóságos csomók is vagy,
nah a ködök kőinoszba, melyek
sokszor halálaf okarrak a gyer-
meknek. Ha vraságra rendszer ala-

potban, a gyermek koponyáján,
 nah felet meg, és így 16.-18. uj,
 de van hosszab és rövidebb is, és
 ezek mind kesken veszedelmé-
 seli lehetnek a szülésre, mint
 alább látni fogjuk. — A höl-
 dök kívánatosnak tartja hogy a mag-
 zatot a tojással és méh lepeny-
 nyel apró köpve, hogy a gyermek
 táplálására szükségese, nevelés
 horra vigye, a romlósakat pe-
 dig, melyek már elgyógyultak
 a táplálásra, oman vispra-
 tesse, és hogy a víz forrjait ár-
 anya és gyermek kört felkötve.
 A méh lepeny, a tojás tu-
 lajdon hártyái, a höl dök kívánatos
 a szülésre praktisba szülésre
 nevetésik, mivel a szülés -
 után mint egy ujoman szülés

nek, nemelyek meg a gyermek vi-
 tet is ide alájah kamoltni.

A magzat víz neve =
 alatt érteődnek mind aron
 nedves, melyek a terhesség =
 alatt a méhbe tartva vagynak,
 ez helyére, hártyára, és fontójá-
 ra néve kétféle.

D. Passyus gyermek víz:
 mely aron nedves, mely a víz
 hártyán kívül van, vagy a víz
 és edényes, vagy az edényes és
 hülékony hártya körött. Mint
 hogy ezen nedves, nem igen bő-
 mennyiségbe van jelen, azért az
 gyakorta a szülésig fel is rövidít,
 s ilyenkor arután a szülés előtt
 nem üvöl semmi víz, de elenke
 röbe igen, és ez arólnak hülék-
 szülés, előbb megyen el, mint
 arólnak melyek meg nem szültek,

a becső mik sárj igen hejősi meg
nyitása véget, mennyisége hol több,
hol kevesebb, hasznát meg nem tud
juk, mint is minden Terhesség,
nél jelen, ha pedig jelen van,
mint a fentebbitől utoljára, né
melyelmit már az 5. hónapban
szóval a Terhesség utolsó hónap
jába megyen el. - Vigyárral kell
hogy ezen faszú magzat vir
a valóságokat örve ne zavasson.

+ C.) Valóságos Magzat vir az,
mely a víri hátyán belől, és a kö
dök kinnort a magzattal körü
veszi, ez tiszta, fehér, a Terhes
ség 12. hónapjaiban, hanem az 5. és
6. hónapban tavasz heró lenni, a bele
márton pappirost, és vassony dár
bot mint a heményítő vagy változ
tatja, mennyisége hülömbörő a
gyermek nagyságához képest, így

ele

elenke több a gyermek nagysága
kor hejőst, hejőbb kevesebb: nem
de, alapostan 3. - 4. - font de né
ha 10. - font, néha kevesebb. - Hájs
nai a hőves heróndák, egyenlően
terjesszi ki a méhet, a gyermek,
néha meleg földöz hejőst, alkat
márta a magzattal a nyomás ol
ellen, és más hülő bekatároz
ellen, az anyát pedig l'edi hogy a
gyermek morgásvai ne okorranak
katt, az egy más mellett fehére
itesevel örve növekedet gátolva,
sarkya is v'edi a köldök kinnort,
az az a tojás hátyáival hozagot
hejőst, mely a nádra hüvely, mely
a nádra hüvely ki tagulós az elő
mordissya, a sküles alatt fel ne
pedven, a sküles alatt a víri ho
lyag a magzat vir elfolyása a
sküles néssakat névessé sejt, és
igy könnyíti a skülest, hogy a
gyermek fehévesen, és a víri ho

ja

72.
jagor adja tudunkra, értüké
ges felesse tud, mert ha er meg
repedsein, el foly a gyermek vire
stüh séges képpen törtenik a stü-
tés, el foly pedig 2^o irbe, ar 1^o a
stütes kezdése alatt, a másik a
stütes nagyobb munkaja alatt.

+ 1^o Magkat a tojásnak leg
nevezesebb része, melyre néve
stüh séges hogy külső tulajdonais
megmígük, melyekkel az minden ho-
napba a Verhegyignek mutatko-
zik. - 2^o a gyermek állását, fel-
vését, is helykeresésis esmérésis,
a Verhegyig alatt. - 3^o a gyermek
feje hány tájlatokra osztatik, az
ist emek csontjaival, mértékü-
vel, varimyaival, is, kutasszaival,
kel meg es mértékü munk

+ A válsorajok melyek a Ver-
hegyig alatt holnaponként kösön-
nek a gyermekkel, a követkoren
20

73.
206.
1^o hónapba egy hangyához
has onto idmu, het helyagolat for-
mal, melyek agyike a főt, a má-
sik a Törzsökhöz kérsi: usobb, De =
meg semmi részt nem lehet megkü-
lön börtetni.

2^o hónapba: mek nagysá-
gu a gyermek, is elkor a fön aró
helyét mint barna pontok, a má-
ját, mint keserep háradikat, a
fülléket mint varakat, a steme-
ket mint pontok: látni lehet, a
másik részen mely a Törzsökhöz ké-
feli, a vég Tagokhoz mint apró csont
somok látszanak. - Ezen túl se-
besen hatad elöre a gyermek
nevelésje, úgy hogy a

3^o harmadik holnapba 2^o
3^o új kopru, neher sége 1/2 lat
alig van. A fön a stem, staj,
4.

füll, orr, jobban látkit, a törő
lün a vég tagok formátudnak,
sőt a kereszt is, a nemis nézetek
együtt, de a nemis meg külön
börseini nem lehet, a

4^{ik} hónapba: 5. - 6. új hónap
2^{ik} lat nekiségü, az ábrázat né-
srei meg lehet üzen ki formátud,
nah, a vég tagokban ar ujja is
kerdenek, s láthatok, a nemis né-
srei annyira fejlődtek, hogy mára
nemis is lehet külön börseni, az

5^{ik} hónapba: 5. - új hónap,
nekisége körül belül 34 font,
a gyermek fején a hajak mutat
karnak, az alsó is felvő vég tago-
kon a körmök kerdenek fejlőd-
ni, a fő, is a többi test köröt
arany nink, az eker képest nagy,
a bói minis hogy alatta követéig

ninken, ariszt rántos, piroz, a gyök-
mek morgásait más az anya is is-
si. - Ha ezen hónapba születes
magrat egészéges lévén, hivált
ha burorjával születik meg, is
hogy meley virbe tiszit: megél,
egy kevés is is, de nem sokára meg hal

6^{ik} hónapba 14. hüvelyk kor,
nekisége 1 $\frac{1}{2}$ - vagy 2 $\frac{1}{2}$ font,
a bói meg most is rántos, piroz,
sovány, a hajak koprabak, a
körök hi fejlődtebbek, a fő meg
nagy arányban, csontjai lágyak,
savult alnak stéitivel egy meg-
sol. - Különös ezen hónapba, =
hogy az egész test rövid süvüfe-
jér tövökkel van beülteve. az

7^{ik} hónapba: 16. - 17 hü-
velyk hónap, 3 $\frac{1}{2}$ font nekis-
néha nekerebb is, sovány meg a
test, meg is jobb arányban van

más a testhez a fő, a hajak
 sűrűk, kopprabbak, a hörmök
 erősödtek, a bőr kemese meg pi-
 ros, a csontok meg lágyak, egy
 mást meg sem értek skelékkel,
 arcot könnyen öjve nyomatik a
 fő, a fehéres, sröröl meg látra-
 nak a testen. - Ezen hónapban
 srülésest gyermek gyenge, se-
 mit rishány nyissya, jobbara
 alszik, nem srópik, de ha srá-
 jába adatik valami nedvesis-
 nyet, keveses víz, sreke üvi-
 zellese hevis, is rishán ürit,
 ha nagy gondgyás viselik, is =
 egyitkint épp, egész éges, a meg-
 ras élekes meg tartani lehet, ar-
 c^{it} hónapba: nagy az váltó-
 rik a magras, a test részei jobba

arányban vagy nek egymáshoz, =
 srebb, is gém bölübb a formájok,
 a bőr meg piros, de más nem
 oly rantsos, mivel a hövörtig =
 más gyül alatta, a fekete fehér
 gyapjas srör meg borissya ar =
 egész testet, koppradaga 17. hü-
 velyt, sija 5. font, a hajak
 kopprak, sűrűk barnások, a kö-
 ponya csontok jobban erik egy
 mást, a nagy kutak meg nagy,
 de ar oldat kutakok licsingek,
 Ezen hónapban srülésest gyet,
 mek sraver is gyenge, er is so-
 kas alszik, neheren srópik, de
 meg is könnyebben mint a két
 hónapos, sreke, is irzellese =
 srinse hevis, jó gond viselés =
 mellast könnyebben lehet meg

tartani, mint a 7^{ik} hónapost, ha
 nem elyeh inkább a máshatá,
 listyák, híkeső eren olvigez:
 hogy a méh nyala a 7^{ik} hónap
 ba nem lévén meg eléggi hísi
 gulva, ez igen érvény, vagy hogy
 a hűlő bé határozat, anélkül
 hogy a gyermeknek ártalmasan,
 nem lévén oly nagy károsat
 egészen oda el kaphassanak, más
 is a méhet az örvé kurodásra,
 és szülésre károsít. — Eki a
 gyermeknek minden ártalmas
 bé károsnak, réa való károsan
 hívül meg is történt, és így károsat
 lan lép a gyermek a világba,
 de a 8^{ik} hónapba jobban hísi
 lévén fogva a méh nyala, és
 réa nyelenebb lévén, hogy a
 méhet az örvé kurodásra, és

lére bírná lehet, an, oly bé határozat
 nath kell történni, melyek nagyja,
 gosh véget más a magzatost is =
 bántva, és így más bántva jön a
 világba, ariszt neherebben is történt
 9^{ik} hónapba: a magzat oly hí
 fej lódást is el, hogy meg születien
 minden baj nélkül el el, és eren
 hónapja gyermeknek éretnek mondatt,
 melynek hozzá 18.-19. hüvelyd, és
 ja pedig 6.-7. font, bőre sima, lörv,
 a test idma gimbolyú, sime helome,
 tes is piro, a fehér hőröt hőrök sime,
 az egész testen jelen volt szőrök
 vagy hűlőbbak, vagy el is enyész
 tel, a koponya csontok heményel,
 szélső egymást írt, a hátsó hu
 tar, bé nőtt, a nagy hűlőtt is
 szak alhova, hogy a mutató uj
 kegye bé fedt, a haj sűrű, kop
 sru, bírony és sűrű, a hűlőtt

ar ujjak hegyéit hosszabbak,
 a születés után elevenen, marog,
 kiált, a kopásra kezd, nem al,
 srik oly sokat, meg születés
 a virelletet a srikkel nem so,
 kára hi üvít.

A kilenczedik hónap ve-
 ge felé szület magratok éresek-
 nek mandarnak, ar után pedig
 a 10 és 11 hónapba születek el
 érett magratnak, a születése-
 dik héjő születésnek mandarnak,
 ar el érett magrat jeléi e hé-
 vet kerendöli: némelyek svenit;
 a koska 22-23 hüvely, suttja 10-
 font, a sröök a testről majd egy,
 sren el multak, bőve csak nem
 egészren fehér, sok liven a bőr
 alatt a lörvívég, a test gömbö-
 lü, erősen vi a gyasmak, sropit,
 a

a csontok hemények, a kaponyá
 egy mász érik, a kutasok mul,
 nak, haja hosszú, a születés után,
 aron val bö virelletet, és sriket
 üvít, söt fogat is mondának, de
 ereh oly jelék, melyek a való-
 héjő születésre nem illeszköd,
 mint hogy ar el érett magratot
 felesse hi fejlődésnek alizyah,
 holott éppen a héjő lappu esve,
 hely kifejlődés oka, leg gyak-
 rabban a héjő születésnek, és ar
 el érett magrat mint kifog ket,
 treni, gyakran kisebb mint aris.

Az Érett Magratok adott
 felebbi hónapokénti hi fejlődés
 beti strabájok. - Nem éppen csak
 kataslanok, mert gyakran a =
 bik hónap, született a 7ik hona-

szeméi között, aránt a Terhesség
melyik hónapjában meg határo-
kaszára, és a születés melyik hónap-
ban történt a Terhességnek, ara
születésig hogy ne hibázzunk a Ter-
hesség lefolyását a születés lefo-
lyásával, a gyermek, és anyja ala-
pójánál ismerete születésig.

+ Gyermek felvétele: vagy a
lása: Symus factus, alatt érte-
dik azon irány, melyet tartani
szokott a gyermek, ar mély, és ar
anya réstete nére.

+ Gyermek helykeresése
pedig a gyermek egyes test rése-
inek egymáshoz való viszonya.

+ A gyermek alása, a Terhes-
ség alatt. 1-6 hónapjaiban válto-
zó, s bizonytalan, mint hogy a
kicsiny gyermek, a sok gyermek
virtól szabadon upkálhat, s így

váltakoztatta unalmas felvétel,
De a Terhesség 3 utolsó hónapjái-
ban: mivel most a gyermek nagyobb
aranyként, a gyermek vir memje-
ségét, s így nem upkálhat, ar
ist állandó ar ő felvétele, a fejé-
s is lefelé, a mély srajfélé aluggy
hogy a nyakfőre, és gerincre
ar anya egyik oldalafélé, több,
nyire bal oldalra: előfelé, a has
és mel ar ábrával hátrafe-
lé, de egy keveset oldalra, para
és lábafélé a mély feneké
felé felvétel, és ar a rendszer fel-
vétel. - De ezen kívül lehet még
kereszt felvétel is, vagy hogy a
para ar egyik Gijő csont hi-
vájulása felé, midán a másik hi-
vájulása felé: a fe-
je nére, vagy lehet hoptas a fel-

vége, úgy hogy feje, úgy hogy a
mék trájába lefelé, a lábak
a mék fenekibe felfelé áll.

† A Göz Terkezés alatt né-
ha az elcsék egy buraiba, néha
mindenik hülön, a maga bura-
jába vagyon, s így sokszor együtt
gyermeknek koronsíges rendszer
a felvése, midőn a májité, elen-
kerő, úgy hogy vagy hozzá nagy
kereszt, vagy mind a két gyet,
mék rendszeren felvétel.

† A Germészes úgy helyker-
teszi a gyermeket, helykeresési
sere néve, hogy az mentől ke-
vesebb kint foglalaton. - Melyet
így esklöröl, a Gözölh elöre
görbülve, a fő a két vállak köz-
zé, elöre hurva, az áll: a mel-
re hajtua, a fölkarok a mellől
dalához kóvítva, az áll karok
pedig 3 irány terent, vagy a Göz
k.

Göz terent alá felé csügnék,
vagy a mellon így más felett ke-
resztbe kevernek, vagy a mellkés
oldalán öblös képtelm, helyker-
tesnek, a Crombol felfelé hu-
radva, a hasra kóvítva, kevés-
se oldalt, az al trát ismét 3-
féle képp van helykeresve, s
egy máson keresztbe csügnék a
hasra, alho répen, vagy a =
Crombolon, felörül alá felé =
elörül, vagy a Crombolon al-
ról felfelé hátulról kever-
nek, a helykeresés esmérése
igen trüviséges a trüvisre, de
ezen fenebbi helykeresésétől
trünse el kávorhat néha, bá-
a helykeresés váltakozása sok-
kal inkább, mint a felvése,
még is meg ejik, hogy a Gözölh
kászra görbül, és a fő kászra fe-
k.

lé hajót a vállak hátra.

A gyermek fejére néve a krülezi praxisba követke, röhes krülsége, tudni. 1^o Hogy er két végre aprtatik. t. i. kő ponyvára, és Abrárasra. 2^o A wonsolat melyek a kaponyát képit, vin, kívül látrának, erer két darabból aó homlok csont, két fal csontok, és egy nyak, sirt csont.

A homlok csont a kapony, nya melyö vértet képeri, emek kőrepi nem lévén még örvé növe a gyermeknél, csak kő, nya által potoltsatik hi a kőre, A fal csontok a kapony, aó dalvo vértet képitik, a Nyak, sirt csont a hátsó, eren Gon, tok ninyenek örvé növe ar új pülöknel két kélei egymást

isjék is, de kőnya által kap, waltatnak, mely kélyek varrá, nyolnak nevertarnak, hol pedig a draglesek kőnya által kőse, nek örvé, ott a kőnyak képitő

A Varrány ok a követke, rendök. 1^o Homlok Varrány, a Homlok csont örvé nem, nőt, két elvö, és kőrepi ké, lei kőrepi. 2^o A Kőrepi Varrány, melyek a homlok csont felvö dragélye, és a két fal: csontok melyö dragélye képit. 3^o Nyak Varrány, melyek a két fal csont felvö dragélyei képitik. 4^o Nyak sirt Varrány, melyek a fal csontok két dragélye, és a Nyak sirt csont felvö dragélye képit, a többi varrányokra a krülezi praxisba nint, különö, kőrepi

Kutacsok é' hővestörandők,
 jö' ar első vagy nagy kusacs, ar aron
 hányas kör, melyet ar homlok csontok
 felső felvő sreglése, is a fal gon-
 sok felső felső metső sreglése képez,
 mely is előt a homlok varrányba két
 oldalra kifele a hátraon varrányba =
 végződés is felső felé a nyíl varrányba
 végződik, ar oly nagy hogy ar ivés
 gyermekbe új hegyet alig lehet =
 be tölteni. - 2^o a Hátzo vagy kis
 kusacs, mely a falkontok hátsó
 felső sreglése, is a nyakcsiriz felső
 sreglése által képezedik, ar =
 előt a nyíl, oldal a nyakcsiriz
 varrányba végződik, formája =
 3^o sreglész, kissébb ar előbbeni-
 né. A többi kusacsoknak ve-
 tely a hátra a sreglészben.

Az említett varrányok, is
 kusacsok hátra ar, hogy minden
 a magras sreglész helyre jön akkor
 a csontok, mint egy egymashoz

is egy más alá tolatattnak, ar
 által kissébb vön a fő. - A sreg-
 lész első segítésük. - Továbbá hogy
 a varrányokból is kusacsokból, =
 virgálódás alatt mag tudjuk a mag-
 ras alá az.

A kanyon a csontok egy =
 csont bolyorakof úraget képezte,
 nek, melyet hőveskerő kajaon
 arunk t. i. Első főre. melyet a
 fal csontok első sreglése, is a hom-
 lok csont képez. - Első főtörő
 melyet a fal csontok első sreg-
 lése, is a homlok csontok felső
 sreglése képez. - Hátzo főtörő,
 nek, melyet a fal csontok hát-
 so sreglése, is a nyakcsiriz felső
 sreglése képez, egyen főtörő,
 nek pedig mondatik aron vére,
 melyet a falcsontok felső sreg-
 lése képez, is előt ar 1^o sreg-
 lése hátra a hátsó főtörő,
 be vére al.

Hogy pedig a főnek melletti
 vaságit tudhasuk, vonalakat
 húrnak, vagy is átmerőket rajta,
 melyek a hivatkerendők. - 1^o is vol-
 na a fő függőleges átmerője, mely
 a fő körből, a nyakvívótálig:
 megy, de ezt nekirhímném. 2^o a
 fő víz mérése, mely a nagy kü-
 szaktól kezdődik, a nyakvívótáig az
 felső belső első szegélyénél, és
 végződik a víz kúszáiban, a nyak-
 vívtól felső szegélyében, és 3^o
 legfejebb 4. hűvelék között.
 A kúszák kaponyá esontok egyenes,
 vagy körívű mézője, mely az
 az felett a homlok varrány alko-
 rásában kezdődik, és végződik
 a kúszák kúszáiban a nyakvívótáig
 az felső szegélyében, és 4. hű-
 velék között. 4^o a főkereszt
 mérése, mely kezdődik, az egy

gyik oldalán fenn azonos legnagyobb
 ki domborodásában, és végződik
 az az alján es be, és 3^o hűvelék
 között. 5^o a ferdén átmerő a főnek

A Terkesség Jeléről

A Terkesség alapot, a Ter-
 kesség nemely váltórajzából es,
 mérések, és ugyan azon váltórajzok,
 melyekből a Terkesség meg-
 mérések. Terkesség Jelének mondható

Az egyenlőség: hitességek a fenteb-
 bi definícióból, hogy a Terkesség
 nem minden váltórajzi ská-
 molhatnak a Terkesség jelének,
 ugyan ebben körülömbörnek is egy-
 mástól.

A Terkesség Jelének példák
 Bizonyosak. melyek mind azon
 váltórajzok, melyek nem csak
 minden Terkesség ábrányát első
 fordultak, de magukat nyilván

Mutakgyán b. - Bíróntalanok,
 melyek, ugyan sok Terhezzignél
 jelen vagynek, de sokanál hi,
 barnak is, mint hogy a Terhezzig
 nélkülük el lehet.

A Terhezzig bírónyos jelen
 körré tartanak 1st a has pokon
 kénki lassu fel dagadása, vagy is
 hi terjedése, a kötdöl váltórási
 val együtt. 2st a miék lépésön
 kénki fájdalom fel dagadá
 sa. 3st a hüvelyes nére, is nádra
 száj váltórási. 4st a gyermek
 morogása. 5st a gyermek iserke,
 közzé nére, a valóságos Terhezzig
 meg emévesére közzé nére:
 hogy a fentebbi váltórási ok:
 bírónyos rendel közzé nére,
 így a has hi terjedése, a kötdöl
 váltórásiival, lassankint közzé
 nére, minden fájdalom nélkül,
 hogy a has leg elörről a kénki
 nem csontok felé, később felé.
 4

felé, is otóalt, minden irányba
 terjedgen, sőt meg az ágyékot
 ba is, srom be tűnő legyen átes,
 jédés, ezen jele a Terhezzignél
 nem csálhatatlan, bírónyosnak
 is csak ariót mondatik, mert:
 minden Terhezzignél jelen van,
 de betegség okok által is eli ko
 rúttá hatik, a has terjedése, így
 virkossá, sőt korog által,
 nem egy kemény edés, sőt a
 belétnél epével, takomnyal, =
 emékessest való meg keléte:
 által.

A miék dagadása hogy nem
 degen, lassankint közzé nére, is
 laqy merő, s kójás kipi legyen,
 hogy fájdalom nélkül közzé
 nére, emek fel dagadása, is meg
 hasárvoross legyen, ar ar közzé
 nére, minden otóaltul, világozan
 külöm bört es keő. - De er sem
 cs.

csalhatatlan jelle a Terhessegnél,
 a bironyos csak arisz, mint hogy
 minden Terhessegnél jelen van,
 de srintse beteges, okis elő hor,
 kassya a méh dagadás, így
 sok meg gyűlt kosztami vés,
 mely hi nem folykassván, teres,
 hi a méhet, így srintse a vir,
 o levegő is, a méhnek Croni-
 cus gyuladása, meg keményedés,
 külambbféle hi növelet által,
 de eren hi terjedés hülmőbörök
 a Terhessegi li terjedésük, a
 méhnek. - A méh hüvelyes rejt
 is nádra skaj váltakozás is sűrű
 sége, hogy bironyos rendel körtin
 nyelnek, hogy a méh hüvelyes
 rejt, hi terjedése a hasfalak,
 is méh hi terjedésével arányba
 legyen, fájdalom nélkül köt-
 temyen, a hi tagulás srintse
 bironyos rendel váltakozon a.

méh skaja, honapok srintent, de ar is
 srintse elő horatatt hatik beteges ok
 által. p. o. a kosztam hátra mara,
 van a méhbe, ért terjedés, i,
 evet a hüvelyes rejt is, mely
 srintse puhul, is rövidül, havir
 által terjed a méh, ahhoz srint-
 se terjed, is rövidül a hüvelyes rejt
 A gyermek mozgására néz-
 ve, sűrűségek hogy a köréptől
 általfele körtimyen, hogy ar
 első mozgás meg jelenése a Ter-
 hesseg felével meg egyetren, =
 ott érteszen a leg első hola
 próbott koronsegesen érteseni,
 hogy srintse hi, ebbel, utobb
 erősebbel legyenek, ugy hogy
 ar első ment jellelhet legyen
 nek arányba, er sem csalhatat-
 lan jel, mint hogy beteges ok
 által is elő horatatt hatik, =

96.
mint görögöl, gilyiszák által,
szelék a belében hasonlita,
nak a gyermek morgásakor.

A gyermek testének iserte,
is része névze, körülseges, hogy
az a többi jelkkel jó arányban
legyenek, hogy hívül ugy érve,
kessük mint a gyermek névzet
isérni szoktuk, s hogy belőlük
is lehetnek isérni, ez sem csat,
hasatlan jele a Terhessejnek,
mint hogy szinte becéges, az al
fel élő jöhet. p. o. a Gese fajt,
ket de ganaxya, gyermek névzet
mutanya. - Halálos tehát az
emblixessék hőveskerisébe, hogy
egy jelből Terhessej az isérni
nem lehet. hanem az az leg alább
3^{om} jel körülseges, és hogy a je
lek egymással, és az üdövel meg
egy isérnek. - A Terhessej első

97.
4. hónapjaiba, hásszages annak
meg esmérise.

⁺ Bironyalan jeltek azok,
melyek ugyan sok Terhessejnek
elő fordulnak, de némelyek
nel hibáznak, és el is lehet a
Terhessej: nélkülük, ide skánol
tatnak is a Terhessejnek hő
vönseges változásai, az az mel
lyek a Terhessej testén, és laktin
körtémek, a hasfalakon hívül,
2^{or} A tisztulás elmaradás,
mint hogy ez némelyeknek, az 1^o
honapokban, de néha az egész Ter
hessej lefolyása alatt sem marad
ki. - 3^{or} az emlökön körtémek
szokott változások, mert némely
személyeknél erebben szembe tű
nö változások nem körtémek.

Némely isok a Bironyka
lan jeltek: a Terhessej első

honajaira korotthyak: igazságja
 tanul ugyan, mert a csecse-
 váltorása, a testi, s lelki vál-
 torásokkal kezdődik is mutatgat,
 s így magokas.

A Terhesség jel tudomá-
 nyához tartozna még azon
 jelék ismerése is, mellyelből
 meg lehetne tudni. - 1^o hogy a
 Terhes elő magratohas kérdő?
 2^o hány magratohas? De az a
 Terhesség társas. - 3^o ugy semle
 első, vagy többször: a Terhesség.

A Terhességnek is Terhes
 ságnak mondjuk, e következőn
 dőlőből, az úgy semely a Terhes
 ság elején rendszerent: Teste
 ben is Lelkiben nagyobb vál-
 torásoknak szenved. - 2^o az a cse-
 csek, kisebbek, a bimbóval szem-
 te, is fesszebbek. - 3^o az a hu-
 seményebb, kisebb, semmi van.
 42

valat nem mutat. - 4^o az a has szi-
 jedése nem történik, oly jótól.
 5^o az a hűvös sűrűségnek követ-
 tebbel, egymást érke, a nagy =
 ajkák, eretnek ajkák egész a nagy
 ajkák fedéséig kizárólag. - 6^o az
 még hűvös sűrűség, rántozható.
 7^o az a hűvös sűrűség, puhább, vi-
 mább, is a Terhesség, sőt felé-
 ben, is rövidül, a sűrűség előtt
 pedig egészen el tűnik. - 8^o az a hű-
 ső még sűrűség jobban sűrűség kuro-
 dik, csak a sőt honap felétől
 nyitni, a belső pedig csak le-
 vel a sűrűség előtt, ezen jelek-
 ből ítéljük az is Terhességét,
 vagy leg alább hogy a Terhes
 éress gyermekek meg nem sűrű-
 ség.

A többször Terhességre
 itélünk eretből. 1^o az emlök
 puhábbak, lefüggők, a csec-
 bimbóval nagyobbak, sűrűség is =
 2

údvárolhetettség. 2^o a hasfalai nem fejtülnek annyira mint az 1^o Terhezhnet, és még a Terhezig 6^o hónapjába is rántzok látrzanati rajta, a falak nem oly vastagok. - 3^o a Has elöbttüjéd. - 4^o a külső sűrű réteget nem oly könnyű eltávolítani, nem is egy mást a nagy szemérem ájlok, nem oly jóval a köcsögök, vagy mint jelen, vagy el gyengült a gát, vagy be van repedve, vagy el gyengülve, a his ajkai nem fedesnek gyakorta az egyik nágyobb, a méh küveltyű sárgosabb levezebb raktári vagy nál. 5^o a küveltyű réteget, nem oly sima, darabos, vastag, és csak a Terhezig első felibe rövidül, azután úgy marad, és csak a Terhezig végen kezd ismét leve-

set rövidülni, de el nem mulik. 6^o a méh sárja darabos, vastag, a külső méh sárj nem hirtőlök oly erős, en ájruve, az már a 7^o hónapba, a belső pedig a 8^o hónapba végezet is nyitlik már. De ezen jelöleket nem kell hisztelenkedve itélni, mert vagy nálkiss nyolc, híz már sűrűlvein sűrűlvein, sűrűlve, könnyű sűrűlvein kevés, a véretek ismét ájruve hirtőlök, s így már alhatommal csak 1^o Terhezig, get tartunk. - De az 1^o Terhezig, nél is mutatkozhat gyakraan oly jelöle, melyek a töbsörő Terhezig jelle, így ha kavi tisztulás rendelkezési be, vagy hóvras fehérpötyösba srenvedett, esetet telimve igen nagy, va mondja hi az orvos, mindenkot itélesít, az előírót, vagy töbsörösrülökre, és hátszegkedésibe minkább valya meg az orvos teke-



szelenséget; ar is lehet.

Ar Eggyes Terhessegtől, a =
 köböst, a hőveskerületből hülombör
 tessyül. — 1^o Nagyobb válsorájót
 szenved egységeben, mint ar egy
 gyermeknél. — 2^o Ar altestet fetdom,
 boradása, sokkal nagyobb, úgy:
 hogy más a 7^o hónapba oly nagy
 mint ar eggyesnél, a hülombörök
 be szorult lemi. — 3^o A has for-
 mája, elől stiles, a hővesbe la-
 poságot mutat, a hülombörökben
 fel domborodott. — 4^o A hülombörök
 kezdébe febrül. — 5^o A gyermek
 mozgásait több helyeken, a köb-
 örök is. — 6^o Több helyen a has-
 nak lehet gyermek népt ávran,
 mely a has nagy vága kor hülombörök,
 a has nem igen süjed, a
 köbörök stülöknel is csak kezdébe
 — 8^o A méh fejébe van, mert:
 nincs süjedés, ar elől a nő népt ma-
 gobb: stinte. — 9^o A nő hójjaja

ar

ar első gyermeknél stilesabb. — 10^o
 elől al be, minden al nélkül a
 stiles, a kétsős Terhessegtől eggyes
 igen stiles, hogy a stilesre
 kívánsato kérsülkehet mag te,
 kezdébe, de itt is vigyazva kell ve-
 loményünket mondani, mert ar:
 eggyes Terhessegtől is nagy nali =
 nemelyek éren jelleből, így ha
 kezdébe febrül van a gyermek-
 nél eggyesnél, akkor a has stin-
 te lapos, hülombörökben dombo-
 ru, a méh a hülombörökkel
 magosan al, mert nem süjed,
 het ilyenkor a has, úgy stinte
 ha igen sok a gyermek úr, ah-
 kor stinte igen nagyon, a hamar
 domborodik a has, hanem ity
 esetbe stinte febrül kérsen a Terhest
 a stilesre, egy hülombörök hülombörök
 re, elől stilesre.

m.

Meg esmérni a többes Terkes, igaz, a trüls alatt bíronyos, san, e kövesherendökből. 1^o ar első gyermek meg születéin, en nek nagy sága nems arányba, a kassal. 2^o Szapintvan a méket es meg kemény, nagy. 3^o virsgát vata belvöteff, a trülsöt újonnan vir halyagos papa, ezalunk, eh kor bíronyos a többes Terkes, ig.

+ A magrat élelésről, min den esetbe nem lehet igar ezal, hatatlan islelensek adni, igen gyakran csalodunk. élönök sark hassyuh meg is. - 1^o ha a Terkes egész igaz volt, a Terkes, ig alatt, ha oly be határoltas nem sromvedett Testüre, is keltüre, melyek vagy né ki, vagy a gyermek élelésnek vepe, delmet lehetne. 2^o ha a váltóra

sok rendezen történnel. 3^o ha ar emlök föjvást váltornak. 4^o ha a gyermek morgásait: hivált: magunk is éperkassyüh. 5^o ha a has dom borodaja folyton ha lad elöre, is erkönyü nem neker.

+ Holnak tartynak. 1^o Ha a Terkes vepe delmet beseg, igbe srom vedven, ar idegshre, is edényshre: ugy határoltas, hogy a gyermek ha látat atorrak. 2^o Ha a Testüre, is keltüre oly be határolt történnel, melyek a gyermek élelés vepe delmet. 3^o Ha a has, nem váltó, rül tovább, hanem oly könyü, ha éri: hogy aron át abra kajol er, mere fektürik, ha éri hogy valamü srinte ki ahas orni, trülsö rejei. körrül. 4^o Ha a eseksek nem vált, tartnak, sött ponyadni kerdene, 5^o Ha a gyermek morgási nem vepe, más épre.

A magrat életéről kimise igen
vagy arra adgy ul véleményünket,
mert sokszor a halátra mutat jelek
körött kélvön a trüles, ilö magg,
tat trülesik meg.

A Terhesség idejének meg hatá-
rása

A Terhesség idejének meg hatá-
rása idő trimitárnak hívják a trü-
lési praksisban. Etz idöt orára, na,
pohra határonni nem lehet, hanem
csak körül belöt a terhesség ideje
nek meg határoraja, nem annyira
a trülesnek, mint mikélt a trü-
vényréhi orvsnak trülesége. —
Hogy a terhesség idejét meg or-
gésük tudják határorni, követ-
kerendö hönyüláláshat kell ke-
lmseni. — Ez a terhesség stremély vé-
leményét kell körderni a fogam-
rás felöt, mert sokan a fogam-
rás idejét meg tudják, a hiteleségig

határonni, hogy ha pedig csak egy
körösülés körtent, is terhesség
a stremély, olyankor bizonyos a fo-
gamrás ideje. — De mint hogy a
fogamrás köveső váltora, du bi-
ron talanok, arirt erre egészen
birni nem lehet, amnyival in-
kább, mint hogy: Terhesség fel-
protisajnat, a Terhesség körösége,
sen harugul, vagy jobbra, v
kéjököré állitga ert, hol pedig
birni lehet a Terhesség stremély val-
lására, att nem kívántatik a ter-
hesség idejének, meg határoraja. —
2^o A gyermek mörgeja, ert a
Terhesség az 5^{ik} hónap körepe tá-
ján szokta iverni, arest ha
a Terhesség leg előrvör erti, a Terhesség
ség felöt, vagy is az 5^{ik} hónap
körepe terhesni fel, De eris bi-
ron talan, mivel némely Terhesség

lejjöb, némely elöb erri ar-
 gik hónap felénél. De van es
 hogy a 3^{ik} hónapba is érkezék
 a gyermek morgásat, arrix a
 Terkes, is idéjére ebböl egejt hi
 rony Jaggal nem hatávor hatunk.
 3^{or} 4^{or} Ha, falainak fel Dom,
 borodásat, a köldök váltórájái
 val, telintven a méh hol lére
 vel, ere néve tudjuk, hogy a
 3^{om} hónapba, a has a stremérem
 csomók felett domborodik. a 4^{ik}
 hónapba, a méh a stremérem, is
 köldök köröss, körézet foglat,
 a 6^{ik} hónapba, a has oldalán is
 terjed, a méh fenekével, a köldök
 lész erri. a 7^{ik} hónap végével,
 elöre düled, a köldökre, a has
 falaira, körvesetlen a méh. 8^{ik}
 hónapba süllyed a has, de errek
 sem csalhatatlan váltórájok, =

mert ha a medentre sűrű, a gyer-
 mek vir sok, akkor a fentebbi
 váltórájok mind elöb fognak
 jelen lenni, ha pedig a meden-
 tre tö, a gyermek vir nem sok,
 akkor az elöb váltórájok, hi-
 söbb fognak be állani. 4^{or} a
 hüvelyes répen, is méh krájan
 való váltórájok telintven,
 a leg drógyabbán, ere tudjuk
 hogy ha a hüvelyes rére, alant
 van, akkor a Terkes, is a 6^{ik}
 hónapba van. Ha a medentre
 körépen, akkor a Terkes, is 6^{ik}
 hónapjába: a 7^{ik} hónap végi-
 vel, leg fejebb a 7^{ik}be ismét
 szál. Hogy a méh külső krája
 az elsőkrör Terkeselnet, más
 az 5^{ik} vagy 6^{ik} hónapba nyit
 va van, a belső pedig a 8^{ik}

második felében. Az első részben
 kezdődik, a 8. hónap utolsó
 felében. vagy a 9. első felében.
 Az első pedig csak a születés =
 előtt kezdődik. - 5. az a magras
 évekhez képest, a haszalatban =
 által, hivatalból pedig, a mit
 küvettyen által, más a 7. hónap
 ba, mint golyó évekhez, a 6. hónap
 hónapba más fejezetben, és ma
 gossabbon évekhez, a 9. hónapba
 a medentre felső nyitójába meg
 röven áll, és hol jobbra, hol há-
 söbb be átlal a születő fájdalma
 6. az a tisztulás utolsó jelen le-
 tet vagy valamelyik, hogy aron ra-
 pok, melyekbe a tisztulás elmarad
 a Terhes, és 10. napjától, de er is nem
 bizonyos mindent, mint hogy a
 tisztulás szinte utána 10. 15. 20. =
 napján történhet, és hogy a Terhes,
 vég

vég 10. hónapjaiba, nemelyeknél még
 még jelen a tisztulás, nemelyeknél
 kétség albul is elmaradhat, aron,
 ba ez is igaz, nemelyeknél kiknél
 rendszeres jelent volt előbb is a tisztu-
 lás. Ezen jel talán a legbizonyo-
 sabb, a megkészerésben, még is
 minis hogy gyakran hiba történik,
 azért se napokra, se hetekre, csak
 hónap felére készerül.

Születésnek mondhatjuk aron
 munkálkodás, mely keresztüli-
 jáshat, a méhétől való elválás,
 szexuális, és hiányos, történik.

Az születést külsőleg felismer-
 hetjük fel a praxis véget, a tö-
 vetkerendő fel az ajak, csak szűk
 ségese. - 10. az a üdöre, melyben
 a szexuális elválás, és hiányos
 történhet, és er ismét. Az a Ter-
 les, midőn a magras a 6. ho-
 napba, az első felében. vagy az 6. ho-
 nap

112.
honapba születik, ez azért mon-
datik értelembe, mert amlyi-
terhesseggel nem bír, hogy a leg-
jobb állapot mellett is életét fen-
tarthatná. B. 9. Korán való szü-
letés, midőn a 7. honap köz-
vetlenül, egész a 9. honap harm-
dik hetéig történik a születés, í-
elköt a gyermek meg gyenge ugyan
a külső károsodásoktól nem
sőt meg hártyás, egészen ellentétben
azért erőt is gyarabban meg hat-
nak, de ha egy idő után egészen
a gyermek, jó gondját vizsgálva, akkor
életbe meg marad. C. 9. Érett szü-
letés az, mikor, a 9. honap vége köz-
vetlenül, azaz a 40, vagy 41. hét körül
történik, az ilyen gyermek már
jóban tűri a külső beavatko-
kat, és elöl gondviselés mellett.
D. 9. Késő a születés, mikor az a
9. honapon túl 3. 4. sőt több

113.
később is, ha öbörtörténi a szü-
letés; Erre utoljára születés meg ha
fárasztóan, igen ügyetlen kell
a Gyógyászati orvosnak illeten
hi mondanom, tamen sokott pe-
dig ily hirdés, hol. 12. többet
jártak az asszonykor. 20. ha az
vegyen maradt volna, és felle-
hatala után születés. 30. ha fe-
je távol volt e.

+ 20. Él születik a születés
a gyermeknek számára nére.
van Egyes, mikor a születés át-
tal egy gyermek jön a világra.
Többet midőn kétfős vagy hár-
mas jön a világra születik, és
igy a többet ismét kétfős hárm-
s. 1. 30. az alsó nére, mely át-
tal a születés végbe vitte, ere
nére van. a. 9. Természetes, mely
egyetlen a természet által, és erőt
a

114.
alcal történet. 6. Mestertéjes
midőn vagy a gyermeknek, vagy
a méh lépényt hi horájára
a terméket erején kívül, egy
szer mind mestertéjes hár fogás
is készüléges.

4^{es} A Felüvire név.
Rendes a születés, midőn az egy
felvire, hogy annak meg születése,
a többi születéshez képest
leg könnyebben történhet, ez
legrövidebb a méh fenekére,
a gyermek feje a méh szájára,
vagy hogy a nyakdrót csont a
gerintrel együtt oldalfele, aranyá-
nak; az ábrítás, a hasat, a má-
sik oldala fele névren, rendes
születést névvel a Terméketes
szel ravarját öre. Rendeslen
a születés mind aranyíró, vala-
hányról névren azon felüvire,

115.
mint a rendesnél, és hi hajlás a
nehéren történet. Ezen rendes-
len ismét kétféle, t. i. Rendeslen
Terméketes mikor t. i. koprába
felüvőien a gyermek, a születés
ugyan a Terméketes által történik,
de nem veszedelem nélkül, nem
könyv. Rendeslen Mestertéjes,
mikor kereszt felüvire vagy a
gyermeknek, annak meg születése
képe csupán csak mestertéjes két
fogás által történhet.

Vagy csak meg többféle off
kiszár a születésnek, mint Dreren
és Dreren és len, Vökiles
és Vökileslen, Könyv, nehé,
veszedelm, de érkelnek semmi
practicus hasznol mindzen.

A' éret Rendes Ter
méretes Születésről

+ A Természetes Szülés, a
 Természet erője, vagy munkája
 által történik. Erőük pedig
 a Természet munkája alatt, a
 has falaknál, Rekesznel, és méh
 nel örvén hurodásat, mely alatt
 a méh örvén hurodván, hüvely,
 résre, és a méh szája szűkülve,
 a gyermek hi kajtódik, ezen hi
 kajtás leginkább a méh örvén
 hurodása által történik, midőn
 a gyermek már tökéletesen ivott,
 és fejlődött, örvén hurodik a méh
 és hi kajtja a magzatot, de még
 is őert egyedül nem teheti, ha
 nem őert ápolják a has falak, és
 levegőt tartja a örvén hurodása,
 vagy neki szék, hol csak a méh
 örvén hurodásán eleget a szülés
 re, de ez csak ivetlen hirt, mag
 magzatnál történhet, a méhnek
 k.

has falaknál, és Rekesznel, öv-
 ve hurodása, mint hogy mindig
 fajdalmomat történik, azért
 szül fajdalmának nevével.

Történi gyakran hogy a méhnek
 örvén szülés előtt de alatta is bete-
 ges, fajdalmak mutatkoznak ar al-
 tésben, melyek hasontalanok a va-
 loságos okhoz. azért 2-et felik. Na-
 loságos szül fajdalmak alatt este-
 tőlnek aron fajdalmak erősek,
 melyek alatt a has, és méh örvén
 hurodik, ez szűkebb lesz, a méh
 szája szűkebb, és a szülés végbe-
 men. - haty u vagy hamis szül faj-
 dalmak a hasnak örvén hurodása,
 de nem aron valóságos, hanem bete-
 ges ok véget történnek. p. o. szék
 által, ezek gyakran igen hasontok
 a valóságos fajdalmakhoz, néha
 szinse aron veszeles foglalat
 melyeket a valóságos szül fajdalmak
 m.

mak, eráhet a fájdalomhat egymás,
tol kútlombörtesen kel, a szülési gya
körtába.

Paloságos szül fájdalom
alatt. 1^o a fájdalom erős, arágó
is keresztet kezdődnek, hisz felül
előre a has oldalán, és nemrö rére
ben keresztül, a Crombolwa, egész
a ferdélig terjed.

2^o Elsőben gyöngel, és soráig fel
ben hagyok, hisz ott mentől tovább
lőreted előre a szülés, amial erősebb,
bel, és tovább tartanak.

3^o A hasfalakon hívül meg
a méh is előre hurodik, és annak
ürege kisebbül.

4^o A bőrkészég vége felé hön
selen ar affrony állapotán hívül =
nyomást termi, vagy is erőlködést, az
ermisest réprebe.

5^o A fájdalom alatt a
méh szája kigul, és a hátyát a víz
holtyagok formáján.

6^o Hogy a fájdalomtól ment
időbe, jól érzi magát a szülő. 4

7^o Hogy eráhet sem hely ker
setis, sem gyógy szes által nem lehet
el savorsatnia.

8^o Hogy ^{szes} Has fájdalom jelei erá
1^o Visszafelvon a szülőt, minden
beteg, sőt talánunk, mely eráhet erőre

2^o Erá nem szoktak rendszeres
tani, hogy előbb gyöngel, utóbb erő,
sebbel, hanem gyákos elenkerés, sőt

szoragó is kútlombörö.

3^o Nem szoktak arágóktól a
kereszt erőre a hasfalán alatt a
nemrö réprebe, innen a Crombolwa
is ferdébe terjednek, hanem akas
mely táján kezdődnek ar alkeztől,
sőt inkább a hálóaktól, és bíronyta
lén időbe kezdődnek.

4^o A hasfalai a fájdalom
alatt nem ferülnek a méhvel, vagy ha
ferülnek ^{alatt} igen fájdalom, és olyan nemi
a hő vagy üreg a heményrege.

5^o A fájdalom alatt a méh szá
ja a fájdalom alatt nem kigul, sem
víri holtyag nem formálódik, a szülés

nam nagy előre, sőt gátoltatik.
2^{or} Hogy ezen fajdalmak az
 olajkor hájazt illő kezevel elvárossamilton

Ezen két fele fajdalmak
 egymástól meg különbözteteni igen
 nehéz, midőn pedig a tüneti prok
 kibán, egyedül csak ezen hi fejérei,
 sel fajdalmak: élünk, mindég a va,
 losig, sül fajdalmak ismünk.

+ A valóság sül fajdalmak
 a tüneti idejére, erősségek, tartásukra,
 is az általok okozott változásokra:
 része ismét 4. részre osztatnak.

1^{or} keskeny fajdalmak melynek je
 lenségei ezek.

A^o minden fajdalmak rövidide,
 de hossza az emyk üdö

B^o a fajdalmak erőre, még gyonger
 er a kezértél egyedül a Cromboli kezűd.

C^o a hasfalai is a méh fejűd, de
 emek ürege még nem kifejűd.

D^o a terhést a menisbe is beűd,
 be még akadályoztatnya is kénterxi te,
 nyeret a kezert hájra tenni.

E^o hogy még a terhés, nem kénterxi
 tenik ahasatya ellen nyomást tenni. 2^{or}

2^{or} Tolo fajdalmak ereh ajélei.

At örsve hurodásod erősségek, az
 üregei kisébbednek, a fajdalmak ho,
 stabbak, az emyk pillant rövid, ezen
 idő szakasza nem csak létegris, is be
 vridoben gátoltatik a terhés, de létegr
 rejis vira tartani ahasatya ellen is
 nyomást kéntelen tenni, vagy is nyögni
 a fajdalmak erőre nem csak a Cromboli
 is, de a terhésen sül a láb sarakon is terjed.

3^{or} A Revchető fajdalmak
 különböztetili magolat.

A^o fajdalmak, erőre, erősségek leg,
 nagyobb, V ritka tüneti kisérek alatt nem
 sítva, ereh nem csak a terhésig, de az
 egise terhés is elkerjednek a fajdalmak
 alatt, ha nem egyibb is, leg de legalább
 a Cromboli representationel; a fajdal,
 mak hopyu ideig tartanak, az emyk-
 pilantat igen rövid, sőt néha örsve
 is foly a hasfalai is a méh örsve hu
 rodván, emek ürege nagyon kifejűd.

4^{or} A tüneti fajdalmak, a gyer
 meli hi hájtája után kezdődnek, is a
 tüneti üdök hi, ereh különböztetili magolat.
 h.

Hogy a gyermek hi kapta a
 usán heródnak, hogy a fájdalom ki
 ring, rövid ideig tart, ar enyhül
 tanst l pedig kopru, a mek aprvaku
 rodik ugyan, de a hasfalai csak né
 ha, a fájdalom alig tejednek a Oron,
 bolon kul.

Eren 4. fájdalomhat a sru
 ler, et apru hasonlivan, ar embliet
 fájdalomhoz képest. Er is 4. névre
 apratik, melyek időszakoknak ne
 versemek, melyek bíronyos időben bi
 ronyos jelenjégekkel jellemek meg,
 is bíronyos váltórajokat hord elő, a
 hasfalakon, méhen, is kiülő sru lö népe
 se.

A sru lö 1^o idő szakapra
 víz holtyag idő szakapra, - 2^o
 4^o idő szakapra. - 3^o a sru lö
 idő szakapra. - 4^o a sru lö idő sa
 kapra nak mondakik.

Ar 1^o idő szakapra be men
 kálhodnak, a képrito fájdalom al, nel
 lyek hőves kerö váltórajokat arornak.
 101

1^o a nádra rája kapul, ugy hogy
 emek apakai el enyevin, a tojás
 nérei a mek rájába évertessnek. -
 2^o a sru lö clove mondo jelen kört,
 más jelen volt nyala, nedvesig, tölle
 is a mek rájának kagulájából erdet
 repedések büll folyk vérel van keverve
 3^o a víz holtyag formálódik, ar ar
 a fájdalom alatt a mek ráján a
 gyermek víz, is tojás körtjái hi tolod
 nak, is hojagok képrisenek, 4^o a víz
 holtyag a meg repedése képrül, ar ar a
 fájdalom sru lövel is meg marad fe,
 sru lö. 5^o a magret feje a madon,
 tre feltö nérebe jön, is a tapintáson
 helyben al, ereken kiült váltórit ab
 rárattyában, átasi melegiben, is rékony
 ségiben, nemelyek hangnak, de eret
 nem alando jelen.

A sru lö 2^o idő szakapra heródik
 1^o a tolo fájdalom által, is
 hogy most néhi alaranya ellon kell
 nyogni, eret alax követ kerö váltórajok
 közzemek.

A., a viri kolyag meg reped, e
ar 10^o gyermek vir hi foly.

B., a gyermek eto alt reje, a
hi folya eto gyermek vir utan amek
rajaba jon, aprt itgattya, e nagyobb
ajve hurodajra kenderesi amekas,
eren alaposor nemelyek a fo elvo
koronartasajaneli, neveriek.

C., a fo a medentre felső nyi
tajabol, ar üvegbe eger a hi menet,
hi kolodil, meg pedig fogyomargajba

D., Eren hi hajta, horkon a lo
ponya csongyai egy mára vörisek,
van, a bor hi vate a nyil várnynit,
vántrot képit, mely ha igy solaj
marad, meg daga, ar ar a fo daga,
nat kerdodih

* a srüle, 4^{ik} fo szakasza
a Reorkesszi fajdalmak munkat,
kodnak erel alatt valornak.

10^o a fo a be mettreibe vörít
tatik, ar ar eto fajdalom alhat a
fo elore morderatik, a hulo srüle
rejel horko, sagitvan ar utan, de
a fajdalom srüntivel imet vörre

megyen, a fo ar etobbi helyare, ity
athalommal igen fepül a korep hu,
e repeder is, ha a veg belbe emeret
van, ar hi vörül, a hulo srüle
rejel tagulnak a veg bel kevertbe
fepül.

B., a fo ar at mettreibe to,
dul, ar ar a mek amgyisa hi ebbit
hogy a gyermek fejat nem csak a
hulo srüle rejelbe kenderesi, e
imet a fajdalom srüntivel vörre
engeds, de ide vörítatvan ott meg
is marad a fajdalom srüntivel, el
kor leg arö, ebben fepül a korep
hu, a nagy vörerem ajkal be felé
hurodian ar et sagul, eren fajda
lom srünti kevert, e ar ujon
nan srüntönel, hamarobb, a tob,
vör srüntönel kejobb, megint faj
dalom al be, e a fo utan a valakar
hajtya hi, e igy valogatva ar eger kevert,
ot srüle, 4^{ik} fo szakasza
a srüle fajdalmak munkatkodnak
melyek ar elöroni terkepe nel kama

rabb, a hit köbörös stültek lejött,
álnak be a stültek után eren fájdat,
mak alatt.

A. a mick lepeny a fájdatnak
alatt el valóan, a hitjö stülte re,
strelböl vis folyik.

B. Nyabb fájdalomra a mick
lepeny a hársyákkal, is hódöl röinor
rat együtt hi hájtani.

Gagyris Kemelyek ö gödör
kapt vejnesh fel a stültek be, eret
t is hibájan a stültek elő képtö gö,
stakaszrat ide stamotják.

Stelmávan ar gödör, melyben
ar em limer gödör stakaszrat tartanak
is egymásra löveskornek, hütömbfö,
le ar egy es idö stakaszratnak tartásany,
ar 10 gödör stakasz, ar előpröt
stülölnel 5. 6. óráig tart, De vagy nel
apronyol melyeknel 20-30 óráig is
el tart ar 10 gödör stakasz, minden
vepredelen nélkül, eren idö stakasz
rendstevens, hopyabb ideig tart, ar
előpröt stülölnel, mint a hit mást

Köbörös stültek, ugy hogy araknel 10-20
3. néha köb. óráig is.
A 2. hit gödör stakasz rövidelt, ar =
előpröt stülölnel 1-2. óráig, De néha
rebb esetekbe 8.-10. óráig is tart, vagy nak
lithnel hevis stampillantás alatt is el
mut, eren idö stakasz nál tudni kell, hogy
er vepredelen nélkül nem tarthat oly
hopyu ideig, mint ar 10 idö stakasz rat
nélkül, mert a föálkat a hódöltek re,
nor nyomtatván a egyesek halátán, ugy
stince a föálkat ar anya Nagy stülte re,
stai nyomtatván rontrolókat stör.

A 3. hit gödör stakasz rövidebb, a
stültek. Ar előpröt stülölnel 10-15
óráig tart, a köbörös stülölnel rövidebb
nemelyeknel pilantatnyi, emek hopy,
stn ideig valo tartása, meg vepredel,
mesebb mint a masodik.

A 4. hit gödör stakasz is vagy 15
óráig tart, eröl meg kel jegyermi, hogy
ha 1/2 vagy 3/4 ola alatt vögbe nem magy,
akkor mindég vepredelme, mert a mick
a mick lepenyt el válatatani, vagy
hi hájtani nom bírván, a mick öjve
nem huródhat, v egy várszítöl lehet tar

tani. - A fiatal, erősebb Asszonyok
nál a rephető fajdatmal alatt oly
nagy arányú hurodás, hogy a gyermek
ki hájtása után, aromal lövesi agya
mehet a méh lépény, és az a születés
végével, más a méh rajába van, ily
alkalomkor, nimyon maga a 4. fejezet.

Hogy a terhesség alatt terén
észen könnyen történessen a születés
kívántatnak.

A születő Asszony rephető.

1^o hogy egészéges, arat oly beteg
ségektől ment legyen, melyek a faj
Dalom hi dolgorajás, és a méh arány
hurodását gátolják, midőn mondják
hogy a születő egészéges legyen, minden
kor a fentebbi betegségek gondolat
nyit lával lesmi, nem tekintvén
általános egészéget.

2^o Hogy egészbe különöz jó
alkosaján medentéje legyen.

3^o Hogy a nagy születő rephető
be se legyen valami alkalos, béli hiba,
és egészégesek legyenek.

4^o Hogy jó szül fajdatmal
legyenek rendesen elegendő erővel.

5^o Hogy a születő a születés mun-
kaja alatt jól tartja magát.

6^o Hogy a születő alatt valami
terent, és len könnyülmény mondja magát elő.
A Gyermek rephető kívántatik.

1^o Hogy rendkívül nagy ne legyen

2^o Hogy könnyen felvegye legyen,
és jó helykeretése.

3^o Hogy az orvosi, hih a gyermek
rephető meg több feltételhez kíván-
nak, mint p. o. a gyermek életét, egész
sége, de az nem kel, mert hány beteg
jött holt magat születik természetesen.

A születés rephető kívántatnak.

1^o hogy a gyermek víz ne legyen
felesse sok, se kevés.

2^o Hogy az orvosi gyermek víz, mely
a születés után hi foly, a születés korok

3^o Hogy a szülés korában se legyen
gib, se felesse erővel ne legyenek, mert
az elsőbe korán, az utóbbiba kéjőn rephető
nek aról.

4^o A kővőh vízre rephető hih
vannak, hogy a kővőh vízre rephető hih

*
 nu nagy ságu, s hozzájárulni legyen.
 Hozzát még leány rejéről hívni
 satik.

A. Hozzát még anyánál rendszeren,
 az ar egy leány örvé köré a méhvel,
 hogy a szüléskor alatt könnyen el
 valkajjon, tehát se igen gyengén, se igen
 erősen ne ragadjon.

B. Kívánatik hogy a méh leány,
 neki rendszer felvise legyen, az ar a méh
 fenekébe.

C. Hogy köré sejtü nagy ságu
 gyen, s minse jo.

D. Hogy egész egész állatján legyen,
 de ezen két utolsó felvise, nem elker,
 rülhetetlen szülésezet.

1^o Az említett felvisek alatt
 mérsékel, leze a szülés, de még nem ren-
 des, azért a feleslebbiekön kívül szülé-
 sége, még a gyermek rendszer felvise, ha
 a gyermek nagyobb mérté, a medence
 nagyobb mérté felvise meg.

2^o Hogy a gyermek kegyelmebb rejéi
 mindig a medence rejében, a nagyobbak
 kitero rejében forogjanak. - Ezen körvont
 fogja pedig helyesíteni a természet, ha a gyer-
 mek egy felvise, hogy a gyermek ábrát
 tyávat az anya bal oldalán a vája felé.

a gerincz pedig a jobb oldali csigó kereszt
 részülé felé, a felesle: a fő lent a nádra
 szája, a fas a méh fenekébe. - Szülé-
 ves be így kaptatik át az 1^o Dövrakar-
 ba a gyermek vir a hányálkal hí felé
 törsénd, mint hogy a méh feneké kurodvan
 leg előbb is örvé, a viret hi szorítva
 oman a nyomása a méh fenekébe, a
 fasa örvé a törzshöz, meg görbiti,
 mert a fő a szája elont át, ugyanarost
 eren obbol ar át, a melve szorult, hogy
 most nyakviret ar át a méh szája, -
 homloka, s faj kéze, a kereszt csigó
 részülé felé át, a nyakviret pedig ar
 ir vájánál van, s így marad az 1^o Dö-
 vrakarba. - Az 2^o Dövrakarba pedig
 a jobb oldalán által egy forog a fő,
 hogy a nyakviret ar ir vájánál a szemé-
 nem ir alá, a homlok hátrafelé, a nyak
 pedig a szemérem ir meletke, eren for,
 gát egy szorval mondjuk, hogy a gyer-
 mek a ferde mértékébe forog. - Az 3^o
 Dövrakarba a kereszt felvise alatt,
 az ar morog, hogy hiuntrol fel-
 felé emelkedvén, az homlok előre,
 l.

leg előbb is ar ábrárat srületesik meg,
 el valóán ar áll a mellől, er után
 srületesik, el valóán a nyakvör a
 szemérem iv alól srületesik meg ar egyrészt

A fő srületesik után, a valóán
 srütesik úgy srületesnek, hogy ar egyrészt
 előre, a valóán a szemérem iv felé
 forog, a májili a kereszt csip ízejü,
 lés felé, ar hátra ar után, minelusion
 na ar is val, a szemérem iv alá, a
 hátrao pedig hátra felé állott volna
 a hi meneselnék egyenes vagy egybe
 foglalójában lévén, hi legelőjris is
 a hátraló vál emelkedik a gáson elő
 re, is hi felé, s er után ar is val is hi
 jön a szemérem iv alól, a valóán meg
 srületesve lévén, újabb fajdalmat
 által a terméjret ismét úgy forog,
 tya a kereszt, hogy a nagyobb mértékü
 a testnek, a medenare nagyobb ar mé
 rőinek felétjenek meg, ar ar semle
 úgy hogy, ar egyrészt Gijó, ar anya ad
 gyili oldali ir vápájához, a máj illepe,
 tzig, a csipő kereszt ízejü her forog,

er után a fajdalmat által, ar irvápa
 jától, a szemérem iv alá, a kereszt Gijó
 ízejü srületesikől pedig, a hátra a ke
 rüst Gonthor jön, ar egyenes at mé
 rőbe, er után a hátrao Gijó előbb,
 ar után ar elő is meg srületesik.

Hogy terméjret, lehaszná srü
 tes, ara rendszer felvése a gyermeknek
 is srületes, ar pedig lepen.

10^o Ha a srütesik hátra egyrészt
 görnőbolyü, is hi álo.

2^o Hogy a há, szembe srütesik
 le srütesik egyen.

3^o Hogy a gyermek morgaja, ar
 5^o hónapba értesen, leg inkább
 pedig a méh fenekében, s rendszerent
 jobbra.

4^o Hogy a hüvelyes rejt a vere,
 kö rejt lineába al alant is rendszerent
 rént jobbra.

5^o A nádva srája tökélete,
 sen kesek formába tagul.

6^o Hogy a formálodo virkio,
 hgy tojás képi legyen.

7^o A gyermek elő álo vesre
 mint golyó ízejü, újjal, is előre job,

ban tölti a medence körét mint kábulat.
 8^{or} A magrat virli folyó a tón
 a his kutas ar iruaja fele, a nyit va
 rany pedig, a csipő kereszt irajulis =
 fele. hátra.

9^{or} Hogy a fő legkönyebb en
 keresztidit le, a lábakat pedig a vi-
 lony hasfalaknál, is töltkör stülökait
 a mik fenekiben overhetö.

Bár a Parmespretes stülökönem
 stülökig, arilet a magratnak, mig is
 jo amali elesis esmerü, a jövendölire
 nerve, hivalt ha operatio alatt keltene
 a stülökst végbe vinni, melyre stülökig
 tudni, el a mig a magrat, vagy pedig,
 vagy pedig ar operatio alatt kelt meg.

Ar elesis jelti a magratnak arde

1^{or} Ha ar anya a terhesség alatt
 nem volt oly istalmaknak hi leve, melyek
 a gyermek elesis veszedelmoraesnetü.

2^{or} Ha a terhesség végén is ist,
 kesöh, a gyermek actiuus morgisai.

3^{or} Ha a stülök alatt sem volt a
 teste istalmas hi folyó, stálna hi leve, is
 mig most is overhetö a gyermek morgisai.

4^{or} Ha rendszer leven a gyermek fel-
 vére, a stülök elegendö hőmjüjéggel
 meggy végbe, is mig stülökig nem tartott.

5^{or} A gyermek vir, üdö elött al
 nem meggy, is nem büdös.

6^{or} Ha a magrat stülök alfo fején
 a kör dagadni kezd, is formalya a fő da,
 ganatott, v ar ujra nem kezd puhulni.

7^{or} Ha a stülököl kinnor ninnsen
 störe erve, is ebben ar is vesi, overhetö.

8^{or} Ha ar stülök alfo végébe mor,
 gas overhetö.

9^{or} Ha a mik küveljen által taf,
 pinskatni, a gyermek végén.

10^{or} Ha a stülök rípekböl semmi
 büdös, feheté, barnás, nedv nem folyik.
Ar kold magrat jelti: ar elö jelt,
 vtel éppen elenkeröh.

A Gyermek Agy Alapötöl.

A gyermek agy: ar arromy aron
 alapötölja, melyben a stülök végötöl va
 24^{or}, egész aron idöig, mig a stülök rípele,

alhos solo a turo, ha igen lehet: akkor solo
a sava a tejben, a mi mind a kesső baj.

4^{es} Cörögvein süri sügi leggen. -
Er lesz ha egy csappet, a vesust illo hon
mion lefutassuan, borradat higy horylag
su lefutaja horyben, ha igen hamar le
fut, akkor hig, ha lassan futle akkor sü
ri, vagy ha egy csapp egy poharba virbe cu
pentatvén, lassan ülepedit le: a csapp a
pohar fenekine, akkor jo süri sügi, ha
hamar le ülepedit, akkor igen süri, ha
fent uskát: akkor igen süri. - Legti
konnyabb jele, a tej jo voltanat arha
jol neri ki a gyesek. - A tej minemise
ge függ: meg; a gyesek agyaz aprony ko
vától, ilet mod gyától, csacsveinet vol
tától, belli alapossyától, is a tej el
választas idijet.

4^{es} A' méh anyján előfordu
to válpörások eret.

1^{es} Ösrve huródik lassan, csend
sen, egy hogy néhány hónap alatt, vgy
dra ter a süri, vagy meddő horra nag
sagva, eren ösrve huródas ar süri sügi
keschnel, hilt a süri sügi alatt jol tartot
vák megolat, a valami hilt csapongyt
nem kesseli, a mindan fajdalom nélkül

jökent, elenben hilt köbriöt süri sügi, is
kikenyelo, a méh gyökzge hajlandos
hiltelen süri sügi, aronál a méh ösrve
huródaja fajdalmas. - Mély fajdalom
uto fajdalomnak mondatik, a er ha,
sontis ar fául fajdalmas.

2^{es} A' gyesek meggyi süri sügi, mely
alatt is kessönek, aron hig sügi, mely sügi
a süri sügi után, egy néhány napig pro
kolt hi folyani, er által a méh meg ka
gas ver edemysiböl, vör, is a hiltelen
hartya, vörít hilt, er 3. 4. napig tartvan,
véresen foly, is veres, a gyesek meggyi süri
süri sügi mondatik, a 4. - 8 napig hig,
leher hasonlo a folyas. A' 8^{es} napon
tul nyálas, srintse ganyszer hasonlo
feherez, hol sárgas, is fehér folyasnak
f. lochia albais mondatik, er aronál
hilt proptatnals, is vrendetlen sügi nem
hövesnek el, is egej ig es el, 3. - 4. hiltig
tart. Er elenkeröknel, hilt arany eben,
süri is véreles nehediben, at kest os,
gammaitk heminyedijeben srenved
nel, nem proptatnals, de hörsüti nel,
a fehér folyas köbb hónapig el tart,
is igen

és igen nyahas a gyógyításba.

5. öt A Gyermek ágyasoknak
a nem Testheségtől való külömbörkedési
B. ar Embőlbe tej van, a csész
bimból, hi fejletőbbé.

B. a hasfalai puhák, moszho
sok, rümpösök, a hűtődök, és kemérem
körs lévő saját hím lőhöz hasonló
falrol látszanak.

C. a puha hasfalakon által
tapintván a méhet, ez olyan mint
egy golyó, értelem, és fajdalmas.

D. a hűtő nemző rézektől
fak, valamint a nagy kemérem ajkól
egy mástul el valóa vagyunk, és mozt
hozok, a his kemérem ajkókat nem
fedik, ereketek hősöje tagulva, vagy
repedve is van, a his kemérem ajkól
körüül, egyik, vagy a másik hosszabb,
a hősök huz bű repedve, a méh hü
vely hi tagulva, a hüvelyes réz -
átant falaktapik, a hűtő méh hősök
repederett, darabos, dagadt, értelem,
és ar újat fel vezri híregeben.

meg.

Meg kell jegyezni, hogy a gyermek
ágyi állapot meg határozásában el ne
felejtjük ki tudni, hogy nemely jelék idő
vel el tűnnek.

A Sküléség gyakor lo. Riske.

A Skülési Virsgálásról.

Erősebb er alatt aron munka társat,
melynek ar orvos tapintás által meg emé
ni, ar Emből, ar al test, hűtő, és belső
Skülő rézekt, és a méh anyában lévő hősök
álaposyát. - Ez igen fontos réz a skülési
praxisnak.

A Virsgálás kétféle: hűtő, és =
belső. Hűtő ar, mely által ar Embőlnek
a hasnak, a hűtő Skülő rézekt, és a me,
densre hűtő álaposyával emésterünk meg

Belső ar, mely által a méh hüvely
hüvelyes réz méh, és hősök álaposyá =
val emésterünk meg

Erősebb protgál ar új, néha ar
egise kör, vagyunk hűtő körök is =
használunk, de ereketek a belső rézekt =
virsgálásat fokiletezen nem tekinthetük,
a hűtőket pedig, a kör leg alkalmato,

lak.

Sabbán végén, úgy az élet, csak kérel
is újjal újságunk. — A hűtő újság
lár, nál köröszegeten het újjal élünk, né
ha egyike új hegyivel, néha az egész
kérel, néha mind a két kérel. — A
belső újságunknál, köröszegeten csak
a tappintó új nál hegyivel élünk, van
nah néha az élet, hol két újjal, is egy
fel hol egész kérel, midőn mestersé
geten új, rüti végre a drülest.

Ak újjalra nére figyelmérni
kel, is a keretere.

1^o hogy arókat kíméltül, is oly
munkákhodást ne ségyintül, mely aróba
az iré, s kompittsa.

2^o meg melegítse, s oly fohra
hogy az itó két melegéket legyen
egyentörögebe.

3^o hivalt belső újságunknál
kerülnket, vagy újjunkat mindenkör
kémnyül meg.

4^o hogy a drüli vércsübe,
be veretett újjunkat, vagy kerülnket
a verető linea drüli vércsübe.

5^o hogy a hűtő marad újjunk
kat, úgy helykeretere, üh, hogy fajjal
ne

ne chorrának, ere több javaslás, s vágy nál,
leg jobb a hűtő újjal a kemérem iwe al
kalmartatni, a mutató mellett lévöket pedig
békajfani.

6^o ha egész kérel újságunknál,
akkor kerülnket újjal sötét formába alkál
mártassuk, is forgo morgia, ba vigyül be,
bent lévő a két hatat a keréret csont fe
le fordítsuk.

7^o hogy mind a két kérel keményül
újságunknál, mert gy akorta a környülmények
nem engedül a drüli helykeretere, val
körtatni, mint két fulyás.

8^o drüli vércsübe, meg a helykeretere,
is meg valortatni.

9^o hogy köröszegeten be vágyul,
is sötét újjunkat ne újságunknál.

A helykeretere a drüli vércsübe, a újságunk
gátal, alatt, több fél, de leg köröszegeten ér
a négy.

10^o Alo helykeretere. Ebben az =
arony alva támaszhatul, a két gerintet
a fathor, vagy más valami erő, arótkör
is köröszegeten lévő gördül, arótkör vé
geter meg hajtya a keréret, is egymás,
hol lévő, s távortatya. — Itt az orvos fél,
del

Del a lörre, is pedig ha bal kézzel akar virgálni, akkor leereszkedik bal kézzel, a virgáláshoz bal kézzel húzza szinire, ha pedig jobb kézzel akar, akkor jobb kézzel ereszkedik, a virgáláshoz jobb kézzel húzza szinire. — Kémelyek ezen virgáláshoz ülnek, úgy hogy egyik kezétől kezdve átöleli, hátul a kezét táján, a másik az ilve virgál, de eriletlen, is tökéletlen is, azert jobb a kézen való virgálás, ezen módot használják. — Ha egész egész testet, ha egész egész testet virgálunk, a testet, de testben. — Ha oly betegség, avval virgálunk, mely által. Ezen által a hátsókat jobban virgálhatjuk, a méh: a húvelyes részre, is méh szájánál keresztbe, ott az orvos virgáló ujját jobban teszi.

+ 2^o A fehérvö helykeresés: erletfele. Hanyott, is otal fehérvö, nálunk a hanyott dívatlité, hanyott fehérvö keveset fel jöttököt valaként, az also egy fagyos tünde meg hajtatnak, fel huratatnak is távolitatnak. — Ekkor az orvos ha jobb kézzel akar, akkor az egy jobb oldalánál,

a fél has mellett, bal kézzel virgálunk = akasvan, bal oldalra át, deh segy pedig a kereszt a virgálás alatt mindig az ing alatt be veretni a testet réprebe. — Ekkor het oldal is, is ekkor a leve meg görbül át a szinire, a testet, a labákat távolítva, is ekkor a virgáló orvos azon oldalra át hol a virgáláshoz melle, is ábrarattya van. — Ezen helykeresés használják a szinire 3^o 4. időszakára; Gyermek egyben, is oly apronyoknál lehet, almi nem tudnak, akat testet, akat nem.

+ 3^o Orvos: masra helykeresés,

az ar, midőn a könyere is kézzel támasztodvan, kaza felfele, ha a lefelé nem, ezen helykeresés ugyan parancsoltuk, keresztbe, vagy a fejét egy apróra hajtatjuk, hogy lábam alhason, a testet ekkor is hátrahajtatjuk; az orvos ekkor bal kézzel = jobb oldalra, jobb kézzel bal oldalra át. Ez nem igen alkalmas, de használják, a midőn a kereszt csont hiányzik a lén, von ebben fehérvö. — Méh feneké, midőn a medenceben nagy hajlása van, is a méh fenekével hátra hajol.

4^{es} üllő helyhertetés: ez mint
 egy körít helyhertetés ar üllő, is felvétel
 közt, úgy hogy a virsgálandó parával, egy
 kas srel sréllin üllve, hátával a hasvél
 hátakor támaszkodik, a kerdék meg haj,
 tartnak, is egymástól távolitattnak, itt
 ar orvos, néha a kerdék körre bot, ajkko,
 zik, néha odalvaít, ezen virsgálás igen
 ritkán srülvéges, is csak att hol a me
 dentre alásit akarjuk, is a betegség, lágy
 srülő résreket akarjuk virsgálni

Minden virsgálásnál srülvéges

1^{es} Hogy egész méltósággal segyünk,
 ne hogy ar ilendőségét sértjük, vagy a sreménst

2^{es} Hogy a nem srülvéges könnyűt
 állók el távolítsanak.

3^{es} Hogy a virsgálás által felka
 láltassanak ar orvos tartja magának,
 is csak Consiliumba nyilváníttak.

4^{es} Hogy a virsgálás annál vro
 nosabbán, is nyilvánítosabbán törtéinke,
 sen, srülvéges hogy a virsgálandó résreket
 mag mosdassat, gyakran a srél, is vi
 dellet hi üvassítással, a virsgálásra =

srülvéges, dolgok jelen legyenek.

5^{es} A testet kime takarjuk, ki
 vaks srülő résreit.

6^{es} A virsgálást a résreket rende
 present segyünk, ne hogy egyik résre
 tul haladván, a másikon ált mennyünk

7^{es} Hogy a virsgáló résre addig
 el ne hagyjuk még bizonyosak nem vagyunk

8^{es} Hogy csak a leg nagyobb srül
 ségbe társ, en virsgálás.

9^{es} Hogy oly helyhertetésbe ké
 gyen, mely a virsgálásra, a leg alka
 matosabb, ha csak valami betegség kii
 lönös helyhertetés is nem kívánja.

A srülvégi virsgálást, a srülő
 virsgálásal kezdjük, míg pedig, ar Em
 lötön, akkor mikor ar Em lötöt betegség
 sek, ha kerdés: Terhes e a sremély? ha
 srülő e? ha sroptatásra alkalmas e?
 Fly esetekbe ar Em lötön kezdjük a
 virsgálást, máshor pedig mindig a has
 falain kezdjük, art k. is egyikke,
 srülket mag melegissük, a ruha alatt
 alá viszük, leg elöször is a Gombol

va, a szerkesztésigények, hogy minden ekkor
 lami ha üres, hirtelen s. t. innen a szemé-
 rem Dombra haladunk, hol hasznolt
 schimüink, fel megyünk arutan a köl-
 dőlőhöz, a schimüink hogy ki álló e er-
 vagy al onyészett, rántai hódvára, =
 vagy hódvára be veszték, immak után
 na a hasfalakat schimüink, erehnetili
 kúrdó nagy szagolat, kemény sárga vagy
 puhajágókat, fájdalmas, vagy fájdal-
 matlan voltak, felpes a a löt, a has-
 falain, vagy rántos, puha, vagy ke-
 mény e, s. t. a hasfalain által a
 méket is vizsgáljuk ki. omak hite-
 jedéit, formájait, alakját, fájdalmas
 vagy fájdalmatlan voltak, puhajágókat
 vagy kemény sárgát, lehet e gyermek
 részt épve venni, gömbölyűk az, ha-
 mény e vagy puha, is a gyermek murgá-
 sara lehet e, is hol érvény, mely fájában
 a méhnek, erupán a helyet hájra me-
 gyünk, a helyet aont Dombordás a nagy
 e, vagy méhnek valamennyire lapos, inment
 két oldalát alvire felé, a Gijó aontokra
 jövünk, is vizsgáljuk ha erősebb lapja

sligge srálok e, s így elgedendő távult vagy
 nál e egy mástul, lefele jövünk arutan
 a szemérem írására, ha er hifelé van
 e ajkadorva, vagy nem, lejjebb vizsgál-
 lyuk a nagy ajkakat körözéjelen e, be-
 hajadorott, vagy talán jelan bint, a
 körözés hus tag, is be repederett, vagy a
 repedés heg jeli rajnt hatol e? mel-
 lyek után vége vagy a löt, a vizsgálódás

+ A Balsó vizsgálódás előtt min-
 denek előtt: mindenkor hátsószeg a viz-
 gáló újat, valamit érvényekkel meg-
 kemény, vizsgáló mutatás újat, en-
 nek utánna a nagy ajkák két távo-
 lisz avat, a szemérem hajadikba viz-
 sítük, hirtelen a szemérem írására
 leire, ötölve hájtot B újat pe-
 dig a gas felé kéven, vagy veresgüle
 a mutatás újat, hogy az a vaxer line
 a szemérem ményen, be veresgüle pe-
 dig mindig a szemérem hajadik háso
 felé hirtelen vinni az újat, hogy a Crit-
 lot ki hirtelen, mely vizsgáljuk a
 méh hirtelen fájdalmas e, vagy fájdal-
 matlan, rántos e vagy sima, tag e

vagy srüli? nincsenek e ki kivétel bema,
 a' nich hüvelyes, réreix vastag e er ju
 ke vagy darabos, vagy fima, ar ajkól
 keresztbe, vagy keresztiden vagy nálka
 sádra, nyitva vagy nál e vagy guleva,
 fent vagy alatt van e? ha nyitva van
 mit överünk a' szájánál által, s így a
 tojás réreix meg virgályul, meg lé,
 ven csak a' medentre kövix is meg vir
 gályul, s így járva virgályo újulha
 hát fele görbítve, ismét hi kurrul,
 az így kövix virgályo koronája. De
 vagy nál oly réreix is melyek hüvelyes
virgályodást hívamnak

Tegyér: a' virgályodás srüli
 séges, mert néha a' srüli oly beteg,
 s így szenved, melyet a' srüli elöt
 el távartatni srüli séges, is hogy a'
 fel találhatott ok után, a' baj her,
 desiben, könnyen el távartatható,
 utobb pedig nem. — A' Baba virs,
 gályodásban pedig tökéletesen bírní ar
 orvosnak nem lehet.

Hüvelyes virgályodást li
vannak

Aj. a' medentre, ezt pedig alá
 + sára, b'öjögire néve srüli ség virgályul,
 mert er igen nagy b'é folyam a' srüli
 re, a' medentre talajdonával pedig
 b'ez mód dal az merkadunk meg, s i. látá
 hi kiderés, is tapintás által. — A' srüli
 ség ar apronyhat nagy ágát, kerna
 ter, általát, járását, a' mell hóronat
 a' gerinc orlopot, ar also, is feltö víg
 tagolat, nincsen erebbe valami rendet
 lenyag, mely a' Cronst bajára mutatna.
 — Kihárdottul arutan nem kéne,
 Dett a' gyermek horában oly betegsé
 be, mely a' Cronstokat is kama dya. —
 mint Rachitis, Schrophula, Schor,
 bulus, Atrophia, vagy kalám srene,
 Dett Syphilitisbe, vagy Cronst körs, be e?
 srüli e más könnyen, kermis retyen
 vagy merket ségesen, nagy volt e a':
 magrathya, vagy hisziny, ilve vagy
 halva jött e a' vilagra. s vég re, fap
 pintással virgályul, melyre minden
 kor srüli séges, hogy elöb a' víg bel ki
 üríti lé, simeit, vagy gyenge ha, ha jto
 a

154.
alsal, ha üresen, és, a virelisse in
küle, vagy mesterségesen borsajt, ut hi,
ha gyuladás, vagy daganat volna jelen,
ert elöböl el távortas, ulla erek meg le
vén, fel ülö, fel felvö hely hertekéjt
adunk a vörsgálandó személynél, úgy
hogy farrélya, a srik seilire arjan,
háza pedig a srik hátsin kamarré-
jék; Török is meg görbire egy májfol
távortas, a arókat, leg elöf rös is a gi
pö gonstova borsútk vörsgálo herin
ket, s meg itelyük erek távortagából,
vagy hóret, igekből, a fel, ö medon
ke herint at miröjjet, arusan a Crom
bol fel, ö vörreire borsútk herin
ket, s abból a távortagból meg iül
tyük a his medonke at miröjjet, er
meg levén, egyik heret, háza vörük
a borsútk gonstora, a másikat a fan
vörülisse borsútk, és aron távortag
ból a his medonke egyenes at mirö
jjet fogjuk meg tudni, erek meg levén
a külsö vörük vörre felvisejt vör
gályuk, ereknél köröp felvisejt le
ind, és vörök, ha a fan a köröp sirt

155.
foglalja el, ha a premieren kapadok
a crombol körre melyen hat felé ro
sul, akkor nagy a medonke hajlása,
ha pedig elöf felé néz inkább, akkor
kötiny a hajlása, ere vörük a me
donsre bel, ö mivolta vörsgályuk,
meg pedig leg elöf rös is a be meneselt,
meg pedig iszen aron odalra állunk,
meg pedig iszen aron odalra állunk,
mely körrel vörsgályuk alarunk. be
vörük + i. vörsgályuk újunkat ama
donsre elö fokához, és er mentöl tá
volabb van arókat, amial nagyobb
a be meneselt egy be foglalója, elen
köröbe hissejt, ha pedig egyjzen el
irjuk ar elö fokot, ahár mely rost, és
nörük lett mely odalra at, meg nörük
arusan a be vörjny okot, ar elö fok
mellott lett odalt erek elögge ta
gajak e, úgy vörük a Cipö gonstok
lappai elögge tagajak, és körök el
innen a körökelen lineára vörük új
jünk, s meg vörsgályuk nörük en e
itt hi vörök, gonstora odas s. t. Innen
a jobb premieren gonstok, amial fel

ső megéltje hi fele van e' a'fha, adva,
 a' kofa's libakkaját, mintan e' itt vendes,
 lonsiq, mint hi növis, vagy mas, vala
 mi illyez baj jelen, további ha a' mag.
 zat feje fens van, akkor srüti a' hi
 menes, elenben pedig tag, eret usin
 ismit hátra veresszüli újunkat, a' he
 vezt Gonthor, e' memiel lönyebb
 iszüli el emel hi vajulaját, amiel
 roprabb, mert a' seerint hi ebriti a'
 medenre üreg egyenes at meroje, elen
 Eeröbe nagyobb, amiel vegerivel a'
 seerinem irjüli, ve meggyünt, mely
 hogy ha elöre levezet hi vajult, akkor
 vendes, az üreg virgálat, amiel veger
 sivel a' hi meneselt virgályut, így
 a' seerint, a' mint a' farsrik távol,
 vagy házzel van, a' seerint a' hi me
 netel egyenes at meroje nagyobb, vagy
 hi, ebb, immen a' lötöhöz virgályut,
 eret nem igen csöppeli e' vagy gyün
 geli, továbbá nézzüli ar ül gumókat,
 eret elgedendö' hie' kivagnak agymis,
 tal, mert a' távros, oh seerint nö a' hi
 na

menes havint at meroje, ar ül ^{154.} gumó,
 hi fele atnah e', a' seerinem inet se,
 kinyüli, arutan ar ha hie' újat vezt
 fet, akkor vendes, - et' tal atdalon is
 kel virgályut, ha elög vitag, újat
 nyerüli együli atdalon, ha egy újat nem
 nyerüli elög vitag, újat, hie' újat se,
 srüti art.

U'ind aron seerim virgályut mel
 lett is igen bajos meg határosni, hogy a'
 kordis, be lévő seerim, fog e' eger, ág, elö
 gyermek a' seerimet ezeje által srüli,
 aret figyelmes, chnek lett kermi nagyon e'
 meg határosni, ha.

De a' hüvely, ve virgályut
 igen fontos a' seerim, e' idejének, ar
 elöre ment srüli, meg határosni, ar,
 beteg, eger, nérve, itt mindig srüli
 kett: meddö' e', körral e' a' havi lör,
 tulashor, vagy utama van, vagy éppen
 rajta seerim e' körral e' a' srüli, her,
 vagy gyermek ág, e' - Ha meddö: e' tá
 vül a' kórulashor, akkor a' hüvely, ve
 a' medenre körepeben van, levezet hat
 na

ra, a medentse egyenes át mérője köröpn.
 - A köröpnél, kor körrel milyebben áll.
 - Ha keskeny a kört hónapba, melyen van, a
 4th és 6th hónapba a medentse köröpnébe
 a 7th és 8th hónapba leg fejjebb áll, a kes-
 kesseg vége felé, leg alantabb van. - A 9th =
 gyermek agyi köröpnél alatt; a köröpnél.
 - Virsgályuk pedig a hüvelyes réjt kemény-
 ságit, daraboságit, nagyágát s. t. - A =
 nagyágra nére tudni kell, hogy a hü-
 velyes réjt, néha igen kicsiny, a hüvel-
 yes réjt néha félre dől, egyik oldalra,
 mint a méh fenekénél áll, sőt tudunk
 meg, mivel or mindig ellenkerő, a méh
 fenéke alávet; sly alapotbe süllye-
 ges, hogy a virsgálandó sremélynek, min-
 dig: többle helykeréses adag, on, ar ar ol-
 ban, mely a méh fenéke állásával el-
 lenkerő legyen. - 2^{or} Ha a hüvelyes
 réjt bal oldalra áll, akkor bal kértel
 virsgálandó, és ellenkerő. - Ha a méh
 igen előre hajlik, akkor a hüvelyes
 réjt hátra állván, vir arányos helyker-
 keség adag süllyeig adunk. - Leg,
 nehezebb a virsgálás, ha a méh hátra

felé

felekké, ilyenkor a hüvelyes réjt a pra-
 mirem esontak felett van, és így nehe-
 zebb találni, a réjt süllyeig, Caspro, ma-
 sro helykeréses.

+ C. 9. A' gyermekre nére virsgál-
 lyuk. 1^{or} Elő e nagy Holt a magrat. - 2^{or}
 Amak nagyágát, felvies, és elő als
 réjt a gyermeknél, itt is alyan, ha il-
 kes a virsgálandó.

+ A' gyermek nagyágát köröpné,
 gesen hűtő sapinsákkal itelyük meg.
 - 1^{or} A' ha nagyágától, és formájá-
 ból. - 2^{or} A' süllye, edjéből. - 3^{or} A' ha
 falon keresztül érekhető magrat réjt,
 nagyágától. - 4^{or} A' morgása hűtőjéből

+ A' felvies hűtő sapinsákkal -
 virsgályuk. 1^{or} A' ha, formájából, így
 ha venter, akkor gömbölyű, elenterőbe
 lapos, és két oldalt domborn. 2^{or} A' mag-
 rat érekhető réjtnek felvieséből. 3^{or}
 aron helyből, hol ar anya a magrat =
 morgását leg jobban éri.

+ A' gyermek elő als réjt, süllye-
 ges, előrör, álva, arutan felve vir-
 gálni, ere süllyeig, figyelmerni. 1^{or}
 h

Hogy a magrat előlő nézet, egész hite-
 jüdjébe, egy vírgáto hérrel, nem lehet
 hi vírgátni, ariest egyjiti odalon, egy
 kérrel, a majikon, a másikkal vírgátunk
 ariest nem lehet pedig. egész hi terjedésibe
 vírgátni, az előlő nézet, egy kérrel, z
 mint hogy az előlő nézet, elől jobban töl-
 ti a medensere hőt, mint hátul. 2^o
 Ha morgo az előlő nézet, azt erősen ne
 nyomjuk, hogy nemely nézetet megneve-
 tül. p. o. a fontanellet.

De a méh leány: mindig meg a
 méhben vagy on is, rendez is, a feteveze,
 az az a méh fenekebe nagy is, vagy hirtiny,
 mint a méh fenekebe érhető domboro-
 dából, is lágyágból isre vehető, de
 erőtelvő vírgátás által nem lehet
 bizonyost, is csálkhatatlan hazárást
 tudni. leg bizonyosabb emel vírgátása
 a 4^{te} Dödrataszba, így ha a méh meg
 domboro lapos, is fájdalmas, akkor meg
 nem vált az a méhtől, elenkerőbeigen
 — Ha a méh leány a méh szájja
 előtt van, akkor a terhesség vége
 felé víz folyás mármár, mely ma

gától kúrnik, de gyakran ismét ujul, a 161
 pinto ujj a hüvelyre nézve, spongiás deket
 érve, is ért hi kágitva, is vagy semmi, z
 vagy csak heves nézet érve a mag-
 zátul. — Ha ujjunkat a méh szájja-
 ba viszük, akkor nagy ottadik a véres
 erőrekonon pedig ezt nyomni nem lehet
 ne, hogy idő előtt el válasszon, vagy
 a hirtiny, az be nyomtatással.

Az Egészes Terhesség és Szülövel való bánás módrol.

Ezt nemelyek el mulasztják, de hogy
 annál jobban emelkedik meg a terhességet
 is szülést, is mivel gyakran nagyon kily be-
 teges, ariest szüléssel ezt tudni.

A Terhesség Physiologicus alapot,
 is ha más ok: által meg nem beleszít,
 egészes a terhesség alatt is, de mivel
 rendez, illesz nem minden szülő, is ter-
 kes tart, is bár a Terhesség Physiologicus,
 meg is a rea hato szül, szülal hony-
 nyebben harnak elő bene beleszít,
 ariest most nemelyek kúrnik hall,

mint elöb nem, mivel értelem, és irdgát
 hatóbb. — A rendszabás, melyeket elő-
 ismunk, töbnyire csak Diabeticus, és ritkán
 orvosiak. Egy 1^o a memyire lehet, ar m
 dulatokat kerülye, mint felette karagot,
 but. 1^o mert egy gyakorn ivetlen, vagy ho-
 rán srülés, verés, a nek leány elvála-
 sa által götteri, ríngatodrást, és a gyot,
 meli halatit otorra, arit a heves, indu-
 latot kerülye. 2^o A Testi morgajokra
 néve, a merékletes, Testi morgajokat
 írre a Testhez, és alatt is, de a felatibbet
 hol a Test igen erőcsit, vagy oly hely
 kertekist adnak, hogy a méhet, és allett
 organumait nyomját, mint Lovaglás, görö-
 roz uton, rozr hossza valo utaris, elke-
 rültas, enek, ugy drinse a kungazag, mert
 er által igen nagyon elő segisetven, a
 káplás, a gyermek gyakort oly nagy lejt,
 hogy a Testhez, és által meg nem srületket.

Ezen fentebbi két rendszerre né-
 ve, srültés figyelemzini a höröjülete, és
 ezt ar által is kerülit a Testhez, és alatt,
 és hogy oly apronyokitit a höröjület
 kerülit, arit, és egységesebb gyerme-
 ket

ket srültnek, és a Testhez, és rendszerben fol-
 lyit, arit ezt kerülye a Testhez.

Ezül köb velomények vagynek, de
 lag jobb, és tanás, arit arit kerülit. — 1^o
 hol a véget tanít, kerület, arit a gyong-
 isrekeny apronyokit: liit a srültö vére-
 be Congestiotra hajlandó, el veséket =
 srenvedt, más erék egységren kerület,
 elenkeröbe pedig igen ritkán engedgyül,
 és kerület fogját a nagy fel kerület,
 mivel ar a fel kerület, könnyen hova srü-
 lés otornak, vagy ivetlen srült, a Test-
 hez, és utolsó hónapjaiba. u. m. 8. — 2. ho-
 napba, eren utolsó is jo hogy egységren
 kerület, mert más a nek mostani forma-
 ja, és alapotya is tilaya arit törtentet
 nyomás, véget vomlás véget.

+ 2^o A Testi Alomra néve: nem srültés, és
 hogy most hevesebbet, vagy köböt alud-
 gyon, mint nem Testhez, alapotyaiban, és
 Alom srinse ugy gy engit mint a heves.

+ 3^o A Testi vére néve, ha egységren munkás
 aprony, nem srültés, és véreket kerület, =
 csak a Testhez, és véreket a puffarso nekron
 emigratokat kerület, és hogy a Testhez, és
 utolsó hónapjaiba heveset egység, egy srült,
 re

164.
 na hogy a gyomor fellette hi terjedésén,
 a vért a lobbi al test organumaita, is méh
 be szorítja. — Az 1^o hónapba a vért
 szobias ellenére sültéges, hogy keveset
 egyen, mert gyengább, is értekenyebb a gyom
 ra, arírt nem eméjti, vagy kényist, 9 =
 emelygést okoz, a sok étel, is a hörön
 séges vérsorásot jobbára, a sok evéstől
 jomnak elő, most még a hóskam is hi
 marad, a tojás hitiny, arírt eschily ség
 látejj sültéges. — A városi finum
 test alhozajuat, atalyaban kevesebbet
 egyenek, kavilyék a fűszereket he
 viső, neheren eméjti, puffasztó ele
 deleket. — A Terhes, is vége felé pedig
 csak egy kis fele étellel ityen, is csak
 keveset most is, a fűszerev erős edelek
 igen veszedelmesek: a gyengéknek, most
 gyomrak nem bírja. 10. a fűszereket
 kövör: tyúk húsvest, solfétet ne egyen
 ar ityen városi Terhes, a hávet is hotá
 tot hörri vegye.

4^o ar Stalakra nerve, leg egy
 ségesebb itala a vir, melyből: stonja
 hor merve igyonak, hit bot hor, seker.

165.
 vagy más kevitölker vagy nek szokva,
 arak most a pentabból nem íhat,
 nek, mint előtör, többet, arírt keve
 set igyon a Terhes ha egy, ren el nem ke
 nülheti. — Kemely bonyol által a
 gyengéknek javasolt hat nem jó, mert
 ha sehinyül a bot Terméket, at lat
 ni fogjuk hogy a gyomrat ronyja, igen
 fel heviti, is erőitenni sem erőiti, mert
 rérag erős minten, is ha Orvosi Crébul
 adjut, alkos csak keveset; hanalankint
 adjut. — A Káve, Csokolade, Cuncs,
 Bizoff. S. t. e. f. atalyaba nem Terhesnek
 valob. — A Téve nerve igen vigyarni
 kel, hogy ha amak jó tulajdonait meg
 tartjuk, hogy art opus ne javajut =
 különbbféle kóros, neher eméjti =
 edelekkel, borral, hamas tej her vir
 ital, is higiso hőmyü eméjti, is dol
 séges edelek hivantarnak.

5^o A Ruhakra nerve, a Terhes
 arony sült ruhát ne hordarron, mert
 er a méh hi terjedésit, a leheltit ga
 solya, ugy sime a gyomrot hi terjedésit,
 ar

ar éves után gátóját, kiválsz fire
 hat kemmi a füvő mellényeket, igen
 erősen se hők, se derékba a ruhát, és
 ez nem annyira a Derékban, mint valón
 Cüggjön, mert a derékban való nyomás,
 proxiás irgatyja a méhet, hova stülést
 okor, igen neheze ne legyen, mert erpél
 kavulás, hova stülést okor, és az igen
 könnyű meg hűsít, mely szinte a méh
 irgatyját hova stülést, se víz folyás, va
 derék, a lábbeliskre nézve igen nagy
 sarku cipőmát, és papucsos heritjón,
 mert könnyen el eshet, miközl három
 baj eredhet.

+ Ör A kiürítéskre nézve; aboi
 ki görölgej rendez alapotya a berke-
 nek, mindig hűs, ebb, szinte egész, igen
 nem berke alapotya, arit ha rendezen
 van ruhárva, nem hat semmi különöz
 vendelés; — A Hystericusok, melyek a
 meg hűsít által igen hajlandók a gör-
 kökre, és melegjégek hűs, ebb mint az
 egész, egész berkeknél, arit erének =
 melegítés, ebb adathatunk napjába két

szet gyenge stülkü förtés. — A virelet
 re nézve, mint hogy ez rendez alapot-
 ya, nem berke, és herdatibe, túrg, és
 kavasz, arit viret csatolat, és a vi-
 rettel gyakoribb hűsítés, és javatult,
 hogy meg ne gyülethet hűsven, meg túrged
 gyen, ha pedig a berke, és vége felé nem
 bírva a méhnek, a viret hőkag nyaki-
 ra való nyomás véget, akkor viret és
 felvén, adath, és ugy viret, en hűs a Ca-
 liser által. — Kéneke, ebb, sőt na-
 gyobb figyelmet is érdemel, a stülkü
 rejtése, a berke, és alatt, erék ritkán
 törtémmel gyakoribban, mint nem ber-
 ke alapotya, és csak ritkán törtémmel
 keporabban nemely berkeknél, és a
 berke, és miatt, de hőkobb hőkön, ebb,
 ten rendezelle válnak. Gyakoribb a
 stülküadás, ar ellen viret isatolat,
 magát a viret, gyakoribb morgást ja
 vasolunk, ha ez nem elegendő, gyogy
 stülküher folyamodunk. Így mindan
 21^{ik} részbe, egy rész, kéneke lágyító hű-
 sítés hőkön rendezünk, minden ir-
 gatok nélkül, mert erék irgatvan a

168.^a
mehes, kora szülést okoznak, mivel
pedig a székrekedés, rendszeren emész-
tést, felpuffadást, gövörést, esetlen szü-
lést, és a méh lepeny hova elválását
okoztat, és ha a klijestare sem követ
kerül szék, akkor gyenge hasfájások
rendelnek. mint Arcanum Duplicatum
not Cremora Tartari Magnesia. De leg
jobb ha a terhes terhét, és a kölsége
engedi, a Picinus olajja, melyből néha
egy kávékanállal is elég. — külvönös
figyelemmel kell lenni a székre, a
Terhes, és utolsó hónapjaiban, mivel
a hi terjedése méh nyomása alatt a
belek, sőt még megjárás gátolva, a
szék lomha, mely ha bír a Terhes, és
alatt ártatlanul marad is, de a szülés
alatt gátolja a Vermisere, szülést, =
mert a nyomás alatt gátolja a hi haj-
tást, máshoz irgalmatlan a méhes, gövör-
rés rágcsatodásolat okoznak, és így káros
lyék a szülést, a szorult, esetlen szülések
nagyobb seamanak, a székrekedés az oka.
A Lavego: mely könnyűen a Terhes,
és tisztá: helemes, de nem nagy meleg

169.
gü legyen, és szivar, ariszt ar orvos a Lavego
ferővőreket igy szerren jó tanácsával
ar el távortassa, va bívni, és a szék alatt
meg szelörtésze által. — Ha a magga
a Terhesnek meg engedni, a székben
tegyen minden nap megjárás, de csak
mértéktelen.

Külvönösön kell tekinteni a Terhes,
sag vége felé.

170.
Hogy ar orvos a Terhes, és utol-
so 4. 5. hatábe, ha a terhes engedi, vírt,
gátsza, meg magát Dába által, vagy
maga vírvégelye meg, ariszt hogy máis a
szülés előtt meg tudja ar embert a szü-
lé veszek allottásat, miyen a magrat
felvére, hogy a rendszereségét, mel-
lyek a Terhes, és alatt szolpro jó tanács
által is, el távortatob, el távortassa,
nek, melyek a szülés alatt bajt okoz-
tak volna, kévdarra a szülést: alapozza
felöl; hogy salám aron baseges ala-
porokat, melyeket a Terhes terhét, és
válsorizának tart, fel federkeszen, és el
távortathassa, ne hogy a szülés alatt
veszedelmek okozzon, a fel federess baja.

202.
Ha javizába nekerése nagyon
a méh igen elvére szülese miatt, és lefi

170.
Küegö haszok vejei, a mi kívánt ar igen nagy
hajlam mediterránul történik, ezek nagy
jába leg alább két irben vir eranyo fel
vesbe nyugodjék keveset, ha foglalato,
sagai engedül, ha pedig nem alkalmas,
kösör java, alunk, a ha, fel kösörve; te
kintven foglalatojára, ne hogy a kösö
tulajdon foglalatojára miatt nyomást
akkoron.

3^o Hogy most a nagyobb morga
sokat havije, ugy szinte onychide a
has nyomattatik, vagy egyes részek erősen
fejűlnék.

4^o Hogy most igen keveset egyen,
mert ar belati, gyomas, is máj nyomatta
tára miatt, ar emésztis igen gyenge, a
mit egyik, is csak a könnyebb emésztésből
böl legyen.

5^o A' Verkes, ig utolsó 4. 5. részbe
ara figyelmeztetésül a Verkest, ha Proptat
mi kíván, ar emlőnt a Proptatára Prok
tappa, arert ar emlőktől minden nyomást
fávoztapon, karta mertik leses meleg,
sége, a ese es bimbót ara hat Proktat
mi, hogy a gyermek sropja alatt eredő
örönt hi alhasa, hogy ezek hi állak

171.
legyenek, is hogy más a körülis állott a fel
bör rallok le hamolvan, ar ny bói szinte meg
erősödvé isje most a gyermeki ajakait,
kattar, vagy háromszor nagyjában skappa,
nyoz virret mossa, ha igen kemény, akkor
a mosás után kezesül meg hogy le vál,
hason a felbör, ha levált; csak sörre
virret mosatas, ut, vagy ha igen erős,
keny borral, vagy pálmával mosas
sul; agere a Proptatásig, hih a pálm
lár sraga végt nem akaják allani
aroknál hasonlot Gyagyókat tarbolko
zatunk. — Ha alkalmas a Verkes a Prok
tatarra, szükség mindenköt a Propta
tára réa bitoni, resint maga, resint
a gyermek java véget. — Ha ar anya
nem alkalmas a Proptatásra, vagy =
átalyában nem alasia, akkor meg a
Verkes, ig alatt intyül: Dajkát vá,
lajrtani, a mi nem könnyü munka.

A' Dajka vélasztásába, kel te
kinteni ereket.

6^o A' Dajka korát tekintven,
a 30 Ertendőn sul jóval kaladkatat

172.
 ne válasszunk, mivel erék meg rögrött,
 és elcséikhet nem hagyják, és meg arútt
 hogy most erék gyengébbek is. 20 alól
 se válasszunk, mert ha fiatal gyen-
 ge, és meg betegsül, arútt leg jobb
 20 alól 30 évesek között választani.

20. Nem szabad e valami sa-
 tos betegségbe. Ha pedig forró beteg-
 ségbe van, és art el távortatni lehet,
 nem tesz hibát, figyelmeztetni kell mint
 e oly betegségbe, vagy hajlandóság-
 ba, mely mára hereditária gyantant
 által mehet, mint Schrop. Rachitis. =
 Antrix. Syphilis. s. t.

30. Közep test alkotásu. elege
 dandó erő, legyen, se igen hűvös, =
 mert er maga hurra a jó táplálást a
 gy somektől, sovány legyen, mert
 er el gyengülvén, gyenge sejt ad, =
 arután hűvös a fejét, szíve is, és
 nincs e hi ütés rajta, fülei szívesek,
 nem fogok is, arután homlokát, nincs
 és itt hi ütese, szemek nem verejték,
 csö.

173.
 csip az ok, ar ábrarattya ába nincs, e bór
 ki ütés, ar orra egész is, nem felületje
 belől, szája szíve is: a felületétől,
 foga nem fáj, lehelése nem bűdös,
 kivált a fókát jól visgályuk, min-
 tenek is itt hiányuk, vagy felületje,
 nyakán nincs, nek is kemény mirigyek,
 elöre ment felületek helyei, nincs is
 gojva, vagy ara hajlandóság, léleg-
 zés e szabad is: vagy nem, emlői ragyok
 is, erék hűvösök is, soványok is, és erék
 levegek is, vagy hűvösök, a csöcs
 bimbók nem sebesek is, fuka is, hi al-
 to is, a hátsán nincs, nek is, Gont göt,
 bűlésök, arután ar egész haját, nincs
 is itt bór hi ütés, nincs, nek is a hajba
 keményedések, a vég belet hűlönö-
 sen visgályuk meg, nincs is itt arany
 is, és Como sántes, füge, a szemek
 réprebbe hűlő hegy, nincs, nek is hi
 ütése, felületje, hi növekedés, erék
 után a méh hűvelty, hűveltyes =
 rézet, hol gyabraan talályuk ar egész
 12.

174.
"Szülő" részre be egyedül a felhatalmazás,
szekusán az első vég tagokat kért
szülő, mint, onk és itten felhatalmaz.

4^{es} Moralis Characteres de
Eminenciis, sem hi csapongó is, nem in
dulatos, Istent félő is, jámbor jó erköl
tű, és csak aron dajkát liban mind
eren tulajdonok találatnats, lehet
ajánlani droptatárai.

A Szülővel való Baniás
Módról, a rendes és Per
mértes Szülőknél

Regentén többet tették a
Szülővel, mint Szülőseges lett volna
most nem oly gondatlanok, azt leg több
része a Termésketre bérni, mint hogy
is Physiologia, tünemény, ne hogy
mind aron által a rendetlenjégnel, is
első adható veszedelemnél egyedül legyen a
szülő, aron meg is Szülőseges hogy valaki le
gyen a Szülő segítése, mint a Baba,
miveltsébb is, tüköt, obbelnél az orvos is
a Baba mellett tesz, hogy a rendetlen
12

175.
születet el távoztatván, jó rendes, ekkor
ereket semmisítkezze, és hogy a rendetlen
születet elene is, melyek törtés kénelek
meg ismerkedni.

+ 1^{es} Mikor oly apronykor hívattatik mely
a Terhesség végen van, és Szülőseges vágya,
külö hágy kell virágálni, virágármé kell
pedig vályon a fájdalomak: nem beleszerek
is, és így faszyn fájdalomak. — 2^{es} melyik =
Dő Szalaxrában van a Szülés, hogy ha az
már herdedőtt volna. — 3^{es} a Szülés, mi
neműségét, rendes, vagy rendetlen leve
is, termésketes, vagy mestertéges: adja is
magát valami kúlonos, iparkodjunk =
meg tudni. — Ezen 3^{es} pontokat mind
gyárt az iső be lépése után a Szülőhöz,
iparkodják meg ismereni.

+ Kihérdérés által meg tudjuk.
1^{es} a vályon a Szülő Számitása ke,
rent a Szülés, is herdedőtt is. — 2^{es} mel
lyek a fájdalomak, hogy, rak is, vagy rávi
del, hol herdedőtt, hogy tartya ma
gát, kényszerít is a nyögésre, vagy
nem, a méh, is has falai fejtűnt is.

3^o Nem érve é oly érte, minn ha va-
 lamú sküto répreiböl hi alarna emi,
 nem foly é nyálas nedves, ég erekböl,
 nem hengrevitesik é a fajdalom alatt
 nyomást semmi. — Erék a fajdalom:
 meg trünvén, hogy éri magát, a gyet,
 meli morgásat, hol, éri é, nem foly
 é nagyobb mennyiségű víz, a sküto ré-
 preiböl, sküls é más, ha igen könnyen
 termékesen, vagy mesterségesen, vi-
 gyárrunk hogy éren utolsó kérést
 ott ne tegyül, hol helye nincsen. =
 Erék hi kérést é alnal meg tudjuk
 kerdödni é a sküls, melyik fösta-
 karba van a sküls, é minémü a
 sküls, ha t. i. helyül hogy a kérés,
 ség vége felé van, ha rendszeré a
 fajdalom, ha nyálas nedves, é foly
 hi, é a tölti.

+

Külsö képp vírgályul, a hi-
 kérést után, meg pedig ha alhat,
 ha pedig nem, felve, a külsö vírgály.
 lat

lással is ha tapintjuk, vessük kiülül a
 kérést milyen az formájára, hi kérést ére,
 fessül é a fajdalom alatt, a méh anyaval
 együtt, sütyed é, vagy nem, jelen van é
 a töltöl, vagy nem. — Hogy a sküls fö-
 stakarát meg tudhas, utó, is érül a kéré-
 hi kérést é, é ehöz meg el nem ment
 a gyermek vír, arést az 1^o fösta-
 karba van, ugy trünse ha a méh nem igen hu-
 kódot é örvé, bár fessés; a sküls mi-
 nemüségét sütyed, é a kérést, é a
 gyermek felvése, az anyk pilantatol
 alatt egészen elmulik é a fajdalom,
 nagy é az értehető répr, vagy kérést, =
 hol értehető a gyermek morgásai,
 mily erővel érte.

A kérést é, külsö vírgály-
 lással elég kérést képp esmértünk
 a skülsvel, de arést soha sem mutat
 trül é a Belö vírgályat, ére nér-
 ve kérést be vessük, a méh külsö
 é trájat, a kérést kérést, a gyermek
 elö als répr, a medentre kérést,
 ha a sküls munkája jelen van, a méh
 lk

Kaja tágult, a tojás hátyát ebbe fe,
 krülve: hozzá képpen tudomnak.

Segyres: a nádra skaj a keszes
 ság alatt nyúl, a krül fajdalomak
 pedig tágulnak.

Ha Dö skakara a krülnek, ha
 a nádra skaj csak most tágul, a vir
 halyag csak most formálódik, a gyermek
 etö alore, jo fent van, akkor ar¹⁰
 Dö skakara van. Ha pedig a nádra
 skaj, már jól tágult, a vir halyagre
 yed, a gyermek etö alore, jo lent
 van, akkor a ¹⁰ Dö skakara vagyon.

iggy továbbá.

A krül, mineműségénél, ha göm
 bölésen tágul a méh skaj, és alatt a
 verető lineába vagyon, és el arkerő,
 ha a tojás hátyái gömbölyű hoja
 got formálnak, ha a fö lent van a
 medentrébe, ezt etöl jobban, mint ha
 tul föl, akkor rendszer a krül, hogy
 pedig ar keszesre, is legyen, kelm,
 teni kell ar etöl alore, nagy ság at,
 és felvisés. ere

Ereket minnyajokat örvet hazonlít,
 van. + i. a hi keszesre; küző; és Delvö
 virgala, meg esmerüle, kezdődöt e
 más a krül, melyik Dö skakara van,
 és minö a hověshvö krül, mineműsé
 gere, de hogy keszesre, la end e, vagy
 keszesre, ere meg legendö ok minten
 találva ilyenkor. — A virgala, ar ot
 vo, mindankor maga segye.

Ha mindon környülmény el objandó
 a krül, alatt, melyek keszesre, krü
 line mutatnak, ehkor ereket a rendszer
 seket segyüli.

A krül, ¹⁰ Dö skakara, min
 denek etöl alhatman, agyas keszesre
 iggy egy nyozrojába egy skakara káhot,
 ere matrátrost: ha felit: / vagy pokro
 rost, e felibe lepedöt, és keszesre agy
 4. res hájtott lepedöt, a dercha, vagy
 inkább fara alá ez a keszes lepedö,
 ezt ha virez kilehet kurni, aragy vire
 arangon, hemény legyen, a pelyhet
 kerülni kell, mert belé sütyed, és iggy
 nehér segiteni, s igen fel melegre,
 karkatason paplammal, feje alá egy
7 van

180.
vannak elég, ha lehet vagy átlisan, eh ar
agy, mindenféle horria lehet, en ferri,
melegítés, üh hi ha hidegebb volna a
proba, vagy erősebb a személy. Ez
meg léven, vesteres, üh hi minden
ruhából, ar egy végig, raj a mellén
nyeg, nyakába egy kendőt, és könnyű
pelyhőt a fejére, a hasnyál alá,
bákon veszedelmes, mert irgatván
ar also végeket, oda tolodván a nedv
vér folyást okornal, és a méh rendet
len örvé hurokjait okornal, ar meg
hátsú a kereszt alá, elöl a hasra =
hajtatván, le feltegyük oldal, hol
jobbán éri magát: aron oldalra fe
küdje, törsötlet előre meg görbül,
sérdeibe meg hajva, könnyen ta,
kartyal, stül, séges ott basorítani,
arol: hogy minden könnyűtmenyét
olyanok, hogy ha jól fogja magát
kartyal, stersésen fog végbe men
ni a stülis, de figyelmerrünk hogy
löt

181.
többet mint lehet, ne igérjünk, és a
stülis idejét soha sem határozzuk:
meg, mert ar bizonyosan fog lenni,
mindig, ha meg határozzuk, és ar,
nem törsent; ahhoz a stülöt nagy ag
godalomba ejtjük, mely görbül vé
folyást. st. okor, a proba melege
mértékletes, levegője tiszta, melyek
ert tiszta szalanyjál, el távortay
samal, úgy stinte a sol hövül alól,
hogy bizonyosan cseregejek által =
mit a stülö nem áthat, meg ne boz
stansál, elég ha a Bába, stalan
meg egy apronyi személy, hivat tud
va van, hogy a stülö stersit, jelen
vagyval, legnagyobb esendesség
legyen hővülötte, st beredünk is csak faj
Dalmaiba nérvételünket hangortay, a
mit a stülö stivesen vesz, és halgat.

+
Esetre nérvé, mint hogy a stülis
alatt nem híván emmi, csak faj Dalmai
val foglalatoskodik, és emétkö tekerge

182.
ge huziny, aris nem hel hivőven, hich elöb
reg nem ottal, a fájdalom hozsan mara
nak el, erelenek lehet i finisziányi masha
hus levest adni, nehér emögtesü, sok el
del ne adasson, mert er meg nem emöve
tetven a srülös alatt hangyást olov, a
mi a srülös kátrólja.

+ Statul viret adunk, csak hogy
fel hevült alapanyagába hideg víz által
meg ne hűtse magát, inkább legyen is
la alatt víz; ar isatra ar orvosok hii
lombörö véleményűek, némelyek a gyen
ge ingerettségnek vire, bort javallá
nak, a mi éppen inkább veszedelmes =
erelenek, mint ar er, elöck, ha gyen
geség nagy, akkor adhatunk bort, de
nem itatul, hanem gyógy vret gya,
nánt, sőt éppen nem lehet javajol
ni. - Srülös a srülönök a srülös
alatt Herbathéat adni? Ha egy,
sége nem kell velle Herbathéat, arar
orvosigot adni, de ha éppen istornök
a viret, emek adassunk gyenge
Herbathéat, így: igen gyenge Alshia
fö

företet, vagy rihány stem Chamamilla 183.
bol förve, csak hogy melege, is trine mäs
legyen, mint a viret.

+ A Vermisre, hi viretis, olov ne
ve. A Böchi görölge, semmi hülönös
vagy arast nem hivőven, csak hogy meg ne
hűtessen, mert hi dolgorik: ar irrad, ol
byanolhat meg is hül altest béli gör,
tröhre hajlandok, mint hogy ilyenek
nél a bör munkajaga gugged, ilyenek
neh gyenge Herbathéat adhatunk. -

+ A viretisre némelykor gyak,
nem ingereltek, is ha viret het sem
mi hülös, orvoslast nem hivőven, de ha a
mék nyomaja miatt er hi nem folyhat,
na, meg csipő, ödven a hozagba er, es hi,
terjedés alatt gátolja a srülöst, ha a
medentörbe igen leereszhető fö: olov,
sa a viretsem rehedest, akkor viretis
san fektetenyűk, ha ere nem enged, ny,
junkt a fök fejebb emelven, hi foly,
ha így sem enged, Casetert hel általmar
ni, más belege, olov semis, eseteket hi
pest orvosoktatnak, inteni kell pedig a
srülöst, hogy ha ingereltek, csak viret
lyen

184.
lyen, ha lehet, mert máshoz öpve gyűl,
gősről olaj.

+ A Szék hi üres, és átkal, a csator
na üres, lévén, rendez, ebből legrövide
a méh öpve kurodászai, nagyobb test
enged a méhnek; Ere néve ha széke
volt is, de has menése mintzen, gyenge:
nyálkás, hűtést adatumk, minden
2. - vagy 3. orában, a Szék herdeie
ke, ha pedig azt kaparszatyuk, hogy:
puffadt a hasa a Széknek, a mire
lehető vagy kúrtatalanágokul vár
marit, akkor a Szék herdeiebe gyen
ge has hájtót rendelünk u. m. Acca
num Dupli: vagy magába, vagy Mag
nesiaval, vagy Pitinus olajt, ha pe
dig azt vehetni érve, hogy a Szék re
nek nem elégé irgatol, olyankor
adunk, melyek egykecsmind a Szék re
reket is, gyengen irgatnyák, mint az
Rheum, mely az epet hi üresi, a tüsti
talanságoktal, és a méhet is gyengen ir
gatnyá, az öpve kurodászai. - Errenek
el rendelése után kúrtatag hogy, leg al

185.
alább a Bába a Szék el ne hagyja többé.
+ Ha már most kaparszatyuk hogy az
emh pilanszatyuk rövid ebből, a faj Salomak
nagyobbak, akkor mindent a Szék re el
rendelünk, de hogy az Aprony ne vegye
érve, ne hogy meg ijedgyen, eret rejrint
olyankor, melyek a hárnál talátszatyuk,
rejrint a Bába korra magával. Hya,
nek 1.º legyen tüst a hárnál, parára,
és serpenyő, az ág: melagitizere, vagy
máskor is, és Chamomilla Theinaki -
2.º az ajutaló, és innen a vesefolyások
el kerülésére néve, az elvőre néve:
valami szaglo legyen jelen, ere leg
jobb a jó Boracet, kivált a Bába:
kerébe, de az orvos Altheret is kap
nálhat, az utobbira néve Fakij =
festvény; sok orvos, ágot csak sürgető
esetbe kaparszatyuk, a rendelésük. - A
Bába korra magával ködök kúrtat
el vágás, az valo ollat, a ködök kúrtat
nor ha kötésére valo kúrtat, a ködök
egy t. egy kurog galandot, ha fordí
tis lenne kúrtat. De ezt inkább az
ot.

Orvos kotta. Klizsiert fészkendőt, hész Wö
 vel, a nagyobb ar Anyara, a hissebb a
 gyermeknél egy fészkendőre, ere is hész =
 Wöves, egyet a mész fészkendőre, =
 egy másikat a gyermek kezeztelése
 re, midőn még nem kült, is vestrécl,
 mes ar élettje. Orvos, agat a Bata. ar Or
 vosra bírra. — Erkelnek el rendelése után
 ha a fájdalom tartósabbal lesznek,
 késser vizsgáltsan a srülö, mennyire
 tágnut a mész sráj, a víz hójag képződött
 é már, vagy már a repedésre is leír. — Ha
 fő a medentre üregibe, emelk ferde át
 mérőjében van, melyekből ar Nö Dö,
 srakasz végig iséhyük, ekkor emártes,
 süh meg velle előre, hogy a víz hójag
 meg fog repedni, ne hogy meg iségyens.
 + A víz hójag: repedés után, a
Zit Dö srakasz kérdődik, ekkor ismét
 vizsgálmi kel, hogy biromyozak le,
 gyünte hogy meg reped a hójag, es
 hogy milyen most a gyermek felve,
 se, is átaja, nem esett é előre, here,
 vagy kötsöke, a fő rendszeren áll é a
 mész

mész srájába. — Erkelutan most ottat
 tyuké, hogy a fájdalom biállajával =
 vegyon lélegzetet, is katta ujjra,
 kéreit fészkes, é valamiket, fészit é
 nyakhat keveset előre görbítve, =
 nyogjen mint ha sör, kéket kétkere
 ki ürítene, de ez ar erőltetés, csak
 a fájdalom alatt is, csak a való
 ságozok alatt kel semie, máz kéff
 el gyengül.

+ Dö Oly felkészt adni; hogy a
 gyermek feje előre, is hátulról ki
 fele jöhessen: elő segítessen. — Ha
 ar Nö Dö srakaszba oldalt felkészt,
 is most is jól érri magát, maradhat
 most is csak hogy térdit fel hurva,
 eren bajait távortassa, ha pedig ol
 dalt nem felkészt, hanyatt felkészt,
 fél ülő, fél fekvő helykérésbe,
 a többi rendelkezés ajánok mint ar
 + Nö Dö srakaszba.

A Zit Dö srakaszba erkelne
 kel figyelmerni.

1^o Hozzát fehéresre, helykeresésire, és így, ha ottal felváltva sem így, sem helykeresésibe nem hal valóságot termi, csak ugy ma, rad gyanal, mint a 2^o Hozzát fehéresre, csak hogy most görbített terde is egy havis, és hi nyujtsa, hogy a köre hús ne igen fesküjön, ha pedig csak hanyott felvált, akkor víz erányozan felvált, mivel a víz erányoz felvált a fő, könnyebben emelkedik ki.

+ 2^o Hogy a szül fájdalmat mentől kevesebbé dolgozza ki, az az tartja vissza a nyögést, hivált a szánt szándékos nem jó, mert ha nem nyög erőszakosan lassan kap, kálit által a gyermek, és így a ré szelnek idején lévén a tagulása ereik nem nyomatnak, sem rontjot tartnak, sem szagatattak.

+ 3^o Hogy a köre húst tart, kálit minőn a fő a hűlő szülő re

széken át magyan, mivel ez könnyen meg kárad, a fő által a köre hús; Haom fe, le kegy apolyuk mihoz a szülő hanyat felvált, akkor víz erányoz lévén a víz, és öl, a Crombole távolítsa, a terdek meg kájtva; Ha az orvos jobb hittel akar segíteni, akkor jobb ottalra al, és úgy te, tri tenyeres hogy emeli gy öhere a szék, mérem kárad al fele, az új hegyel a; vég bel nyitása fele néren, alkalmas, tartnak a köre húsra, és ezt elöre ká, kálit fel fele nyomjuk. — Ha ottal felvált, hús fele kegy történet, vagy az aprony málkának al, és ha jobb ottalra al, jobb hittel tartja, és sem te úgy seven réa kerünet a köre húsra, az elöre felfele emelkedik, de alhat éppen ellenkerő kegy is kálit nál, még pedig a bal ottalra: bal kerrel, de akkor az új hegyel a szemérem kárad akkor, a tenyeres gy ökeret a vég bel nyitáshoz kegy, és kálit úgy nyomjuk a köre húst, szék vég

hogy

hogy akkor tartzuk csak a hörsz húst,
 a midőn a fájdalom künne után sem
 megy vissza a fő, mert akkor alandoan
 fekszik a hörsz húst, előbb veszedel,
 mes, mert a nyomás irgalmán a hörsz
 húst, ez fel dagad, és később amál
 inkább meg reped, utobb kisé.

A fő meg lévén sültelve, afe-
 jet úgy egyeztetjük tenyerünkre, hogy
 újámba hőst létegettes vehessünk.



+

A 4th Dö. Szakaszba ért bel semmi... - 1^{or}
 a gyermek meg születése után aronnal hall
 felinteni, minő érett állapotja van + i.
 élő i? halva van i? vagy tette halálba,
 ha élő, meg tud gyul leg hamarabb a mos
 gisbul, és rivásábul, tette halálba tart.
 tjuh lenni mikor nem moródul, nem ri,
 nem lehel, valószínű holt oal tartjuk.
 mikor nem morog, nem ri, nem leléged,
 a róshadár jelen jelen vagy nalk, ezen
 jelek csak a külsőnk észre való, mi-
 dön idő nem engeddeik, seorog, abb vial
 gátára. Ha élő a gyermek leg előbb is
 a hődölöt mesterül el, egy olloval, a
 gyermekher ep: hőtesen bul, az anya
 felé lévő részbe pedig hátrévi Gava,
 ras, vagy hátrévi alsal, a hossa,
 nyat vissza tapasztjuk hogy verres ne
 történnem, a hődöt vagy két hüvely
 nyire tapasztjuk a gyermekher. Más ok
 egy aranyira hőtik, és innen is jó sa-
 vul, a mi nem sültéges, de a hőzre
 hődölő darabb arsalmas is, mivel a hőz
 kor kell hőteni, ez már oldalt, mert más
 felé fekszik, és alkalmas ad a részre, a
 mi

192.
mi a rövidnél nem történt, a tödő ö
le hősre, és el merréje után, a gyer
meket meleg ruhába tevé, lefeltek
szük keves, és óvalt, és virárványon.

Innen vissza tévén ismét az
anyához, a méh leány elválasztás
jűk, mikor ti. a szülő vérekből ka
vőz víz jön, mikor azt mint gömböly
testet érünk, a méhbe, ha újont
fajdalmai jönnek, akkor jelle hogy a
medence úregibe van a szűlet, ezt
tehat hi harruk, mert csak ritka
ba helyre hi a Termézet, felvett
adván, meg fogjuk a tödő ö
egyik kerülettel, mással ott az
méh leány her eső, véget, és alafelt
hurruk, meg elent állást nem kapar
talunk, a mi azt jelenti hogy a kü
sö szülő vérebe van már a szűlet, el
kor egyik kerület, a gátra tévük,
máskor pedig forogva a tödő ö
fogva: a méh leányt, forog morgás
hurruk hi, mivel vége van a szűletnek.

193.
A Hóbbas szűlet az abba hű,
Lombórnak hogy, a Hű szűletre =
ha meg győződünk: meg egy gyermeket
termi a méhbe, akkor a tödő ö hű,
nort hűsret hűsük le, és a hű hű,
köröss vágjuk el, mert hű gyermek,
nek gyakran csak egy méh leány van
gyon, vagy egyik edényei a méhbe
hatnak által, és így a víz egyikből a
másikba folyván. - Azt is szűletet gyer
mek méh leányja által, el vére, hű
halhat meg: a másik gyermek

A tödő ö hűsret le hűsre után
a szűlet sevon, an hal virágán, hogy
az utobbinak felvétel meg esmet,
fajunk, és he er hűsret, akkor a tödő
szűlet alatt itandó felvett adván,
a szűlet a Termézetre bírván. Mind
a 2^o gyermek meg szűlete után, a szű
letet hűsret ideig bent hagyjuk,
hogy most a gyengébb öve hűsret,
és nagyobb hi leányja méh: mint
egy az öve hűsret, a öve, ha
pedig hi hurruk, úgy hal egyiket

194.
hogy, mind a hat még leány egyse-
re hi koratagon, emek nagyvágit,
minemüjiget meg tekintyüh.

A' Gyermek Agyassal való bánás módrol.

A' szülés végével a' névvel agyi
ruhákat, vagy is a' keszvet lepedőt, hi
horruk, is mást seávarat adunk alá,
er szülésig hogy seávaron fektüdjön, is
hogy meg isét hessyüh a' hi folyó gyermek
agyit tisztulás memjiziget, rendszerző
Bábiával birhaty a' ert ar ovos, erusan
a' melag ruhát adunk a' hasra, ert
tappintyuh, ha a' még öjve van a' hu
rodva, fektessyüh orsan otalt elöre
görbitve, ferdint hajtvá, mi által a'
verést kerülsyüh, a' hanyatt fekt-
vest ha csak lehet, igaz hervitni kell,
mert er enged a' még hiterjedésinek, is
igy hőnyen ver folyást oror, ha a' hi
allott szülés után, a' gyermek agyas
fármé hordene, a' nem szokott kortos
len

195.
lenni, akkor adassunk otliká vagy Cha-
momilla főceset néhis inni, vagy lajy
melegén mátha hus levest, is melegel-
ben takarassyuh. Mind testre, mind =
lalkere pedig: nyugodalmas ajándyuh,
erék el rendelve lévén, ne bároskod,
junkt a' szülöt aromal oda hagyni,
mert ilyenkor még mindig igen hőnyen
esedhet, is csak akkor mehet el ar or,
vor, midön a' szülő magát már hipe-
hente. mi 3 vagy 4. ora alatt kortá-
nik, is a' még öjve hurodást nyest,
hogy ver folyástal: más felni nem
lehet. — Ot' pihenés alatt pedig szorgal-
matosan kell a' gyermek agyas abra-
zattyára tekinteni, hogy valsevrik e' ar,
kordis seabad e' a' gyermek agyasnak a'
szülés után almos engedni? ha igen
gyenge a' szülő, ha sokáig tartott ar,
is igen el fáradt, akkor ha ar ovos
jelen van, almos is engedhet, de sem-
mi más hőnyülmény ek hervott: mert
ar

196.
ár alvász alatt hőmyen veszfolyás, vris,
marhat, ha pedig ébren van a szülő,
maga is ipre veszi, hogy valami foly
nemző veszeiből.

+ Hogy pedig meg tudhas, ut a
veszfolyást, szüléséges tekinteni az
ábrarásra, léteget veselte, alati
melegre, és a méh vélsoráspira, így
ha ábrarása hatalányodik, ha jut
susa gyengül, ha léteget veselte
hizabb, és rövidebb, az alati meleg
sége hizabb, ha a méh hi terjes, ah
kor veszfolyásra okosodhatunk, ily
lyenkor: hogy ha telán hanyort =
feküdtöt volna a gyermek ágyas,
és az alatta volna a veszfolyást, ha
hát oldalt feküdtessen, ha az nem elég
orvosi szer vend állatik.

+ Kipihenven magát a gyermek
ágyas: szülő rekris langyos vízrel
mosatassék, spongiával vízes rekris
is elmondittul, és trávaz inget ad.
24

197.
gyunth réa. A székítés alatt pedig, ha
hüsteni hett a szülő rekris, egész
geseké, és igen vigyárni hett hogy
a gyermek ágyas meg ne hüttse magát,
a mi veszfolyást, és görtörök okor, inquel
több a gyermek ágyas, nek több nem
szüléséges. — Erkekusan a gyermek ágyas
keprissé, ily, melyre minden ágyas, csak
folyhas ne legyen, mert ebbe igen =
meg melegedvén, a gyermek ágyas,
felhevül, és így a veszfolyást ábrara,
nygy szinse igen melege levén, hi sa,
karja magát, és hőmyen meg hül, a
mi görtörök okor, legyen az ágyas
lább heményes, és véreányos, mert
ha igen magozzan felstik, akkor a
has organumok le süljedése véget
nyomatik a méh, a mi fájdalomat, ves
folyást, és méh elő szest okor. — Meleg
levén az ágyas, az mindenkor elebb fel
melegitessen, leg jobb pedig ha
a

a mod engedni a gyermek agyát a „
 sült agy ellenébe tenni, s' azt emel-
 ni, de ha csak egy agy van jelen, és
 ből hi emeltem a gyermek agyát.

+ A gyermek agyi állapotba sült-
 ság figyelmeztet. — 1^o Testi, és lelki
 nyugalmára vagy on sültiség, ariszt
 a leg csendes, és probát valószínű,
 sok hörrül, ellenkerülte pedig a
 kárikák alhatatlan, ágát tüdőre
 sültiség, a gyermek agyát pedig mit
 tüntet hogy most hári foglalatok, és
 gáivol egészren meg felajtkerve fe-
 lüdjön.

2^o Hogy a proba levegője =
 minden gyermek agyán, individuális
 sajátos képest, kellemes melegre
 qu legyen, és kiserés, ariszt oly dolgo-
 kat melyek a levegőt fertőtleníti, és
 távoztat, anélkül, mint sok ember,

éjeli edények. s. s.

3^o Probája kellemes, világos
 sárga is lehet, nemelyek a probát
 egészren sebetse kivány nyak a gyat-
 melk srom fajása elkerülésére, de er-
 nem éppen sültiség, csak a levegő ne-
 kanyon egyenesen, a gyermek vagy anya
 kemere lehet világos a proba.

4^o Etete a gyermek agy elö 5. b.
 napokban, melyekbe a tej elválasztása
 is, mik irgatója van jelen. Ely állapot
 ba egészren Anstiphlogistica üljen, ha
 vasat agyen, kerülte az irgatókat, és igen
 sültiséget, a gyermek vagy is gyenge, ne-
 hogy azt meg terhelje, és meg hogy egy-
 kértre igen sok tej el ne válasszon
 mivel az meg gyútlakereen, a csessek-
 be, erebbe fájdalomat okoznak, és lá-
 ras morgásokat, és hogy a ki fejtdő
 gyútlakereen gátolgunk, csak levegő egyen-
 tesen; így veggel máskor hűve, és
 be is eszve, is e legyen itele. Mikor má-
 a 5. 9. napba van, és a gyermek már erő-
 sabb, a tej elválasztás helyre al, az ige-
 tes melle, és kalam már erősebb is a

gyermek ágyas, ehhez már közbet enge-
 sünk emi; Fog igen fiatal borjú húst;
 vagy csirkét de csinaltos, hol az nem tör-
 tenkes, a gyümölcs edeselt adunk, és így
 lassan átál meggyünk a rend, elöbb volt
 Diétára. De az csak arstinal hih magok
 fogmak droptarni, De hih nem droptar-
 nak meg, a 5^{ik} 9^{ik} napontul is, Gal
 keveset engedünk, ne hogy a tej elvá,
 lassan a cseseibe fajdalmas okarron,
 is Gal ha a tej elvártas meg sünt,
 vagy Gal Csély, akkor engedünk lassan
 van köbber, is táplálabb edeseket.

A 10. edeselt: a mi a körnépül
 Diétalike, igen veszedelmes a gyermek
 ágyasra, arst is crehet fel holt világs,
 sítmi, ezen hiba felát.

5^{ik} Itala víz lehet a gyermek
 ágyasnak, Gal hogy a hídag ne legyen,
 hanem alott, így el pedig somjusághor
 mérvé. Nemely orvosok azt tanácsol,
 lyák, hih magok fogmak droptarni, arst
 nak engedgyünk, tart, ris háza förestet,
 De azt az ágyas vagy ris házat inkább is,
 sünt meg vele, akkor midön már táplá-
 lobb edeselt engedhetünk. - De arst hih
 sarrel elnek: más hoz is, most mindenben
 ne

nélkül merteklesesen itassuk, a gyer-
 mek ágyi állapotba is, más orvosok
 gyengélnék bort ajánlanak, De ez
 sem jó, mert ezen gyengélt leg keves
 sebbe bírják a bort, ha pedig mint
 gyógykor jelentessük, akkor elhet bor-
 ral a gyermek ágyas, De nem mint
 italul.

Bor a virellet, többé, kevesé,
 bá fajdalmas szokott a krüls usán
 termi, arst engedjünk elegendő vi-
 kes italokat, vagy Atkha förestet,
 is többör virelten, ne hogy meg
 gyülekevein, meg Cipőjódjon, es
 egésze a krüls vesreket. Hogy pe-
 dig rövidelt uton hi jöhessen a
 virellet, tehát kerdive is könnyö-
 kere esephadve, eserre hi virel-
 letet, vagy pedig hogy ne fajjon =
 oly nagyon a virellet, akkor boron
 gatasunk, vagy Atkha förestet, vagy
 langyos virellet a krüls vesreket.
 Ha pedig éppen nem virel hi virel-
 let, midön vagy a mek, vagy a vi-
 cel

rellő hójag nyaka nyomatik, vagy
 az a trücs alatti nyomtatás van,
 most gyuladt vagy görtt van jelen,
 vagy a balcsbe van az oka, ezen
 okokhoz képest kel mivelni, de
 minden esetben gyenge has kaptot =
 bossas, untk elöre. p. o. Picinus, Mag.
neziat, Cremort, és leg gyabrabban
 egy hét trücs hi üresítés után megm.
 Dul a virellet, vagy leg alább töny,
 nyebben lezened el káris hatót az
 akok, vagy görtt volna az oka is,
 suntk Chamomillát; adjunk ha
 sonto blizskert, és kárisaron borot
 gassuk hasat, ha a mék nyomja
 a virellő hójag nyakát, tehát az
 dalt fektessük, ha mind erekre nem
 enged, tehát allos Charaxer által
 bossas, untk hi a virelletest.

Fes az trücs hi üresítés, hülső
 nö figyelmet érdemel, mert az aha
 nyost vireványos felvés miatt egyb.
com.

lam hább. — Hémely orvosok azt a
 gyermek ágy 1^o három négy nap,
 járba nem tartják vesztelmenek,
 mert a tej elválasztása, és bős hi
 görölgés, a bélnek tövint hi üres,
 teze által irgatatvan, a fentebbi
 elválasztást meg gárolja, de ez csak
 allos alkassza, hol az asszony a tej,
 megret trücsit elne, de mint hogy a
 gyermek ágya, asszony már többet epít,
 mint trücsit, jobbadán, arést meg tel
 neti balai, a méket és arokat is irgat,
 jat, arést ha 24. óra alatt trücs nem
 vola meg, has puffadást, és más veske
 delom, sött meg fajdalom trücs jelen,
 erakes az vörösk, ha nem indított, untk a =
 trücsit, gyenge hi vörö blizskert által,
 korpa föret, és olajból, ha azjó blizskert
 re nem ereds a trücs, a más adikat adjuk,
 ha ere sem ereds, allos gyenge has kaptot
 adunk, így p. o. Magnisiabol; Drachmat.
Satamarus bol Untiat, és ebből minden
 orában egy hávis hatáimat adunk, ha
in

204.
irgélonyok a baleset, Ricinust adunk,
más utónale Cremort is, így más haskáj
sokat a hőnyúl állás okhoz képest.

+ 30 Az alomra nére a tudják,
ammit a memmit alhat, csak hogy az
első napon alomába, ne legyen egy e
diül, ne hogy víz folyás, vagy más baj
adja magát elő, de utóbb bátrabban
alhat, sőt ammit memmit alhat,
ammitival is inkább, mint hogy a bőszi
görölges, tej elválasztás, és gyermekágyi
sírulás alom alatt még jobban történik

A gyermek ágyasnak süksége
hogy felvő helykeresés, be legyen, mi
fontos hogy memmi ideig felügyön,
nálunk a jobb módok a 7 ite kora
ba felhelni, és hári foglalatok, a
gátlakor látnak, a stragányok fel
kelni, mihez megokat jól értek,
sokszor a 3 ite vagy 4 ite nap. — A fel
vő soha sem kell egyedül ar üdö
re, és erejere határozni, hanem kell
tekinteni ar emlök, a has, a mit
kü

205.
kültö nemző résekre, és a gyermek
ágyi sírulás alaposságára. Elegen
sö erő fog lenni, midőn az ágy a
ba hőnyen moroghat, sőt fel
kelven is minden baj nélkül, nem.
szédelés nélkül járhat, ar emlök
legyenek puhák, arónak hite nap,
látanak, a tej hőnyen jöjjen, min
den fájdalom nélkül, hite pedig
nem droptatnak, arónak ha a
tej elválasztás meg történ, vagy a
leg alább ammi. hogy több meg
nem gyülekerhet, hogy keményvéget
okorna, a has puha, fel nem puff
tad, és fájdalomatlan legyen. —
A mih ammiara legyen öpre hűvös,
hogy a vörögato új art a kemérem
Gonstok felesse vagy ne találjanak,
vagy leg alább hissing, és fájdalom
mattan legyen. — A kültö sültö
rések öpre hűvös, fájdalomat
la

206.
lanolli legyenek. — A gyermekégyi
születés is legyen mértékletes, és a
fejér gyermekégyi is kellék legyen
Erek stültsége: hogy az agyat
el hadgya, mire hol 9. 10 nap tött
30^{om} vagy negy hét is stültsége. Hol
lyában a hasfalaknak, és a méhnek
a méh hüvely is hülső stülő rejtek
nek oly átáporra való örvös huró
Dá, ole mint a terhesség előtt voltak,
ara üdö kell, és csak nem mindig
két hét hal reá. a fel kelet ne
birra ar oros a Barbara. Rossza
korin templomba menni való menés,
mest a stülő 7. 8. napig sokkalkó
tött melogen felvén, most a gyer,
mek agyat talán váoni hintelenit
tesik, hideg bőveken, vagy hideg
a levegő, és meg hűti magát, ami
sokmal betegséges okor.

A gyermekégy előtt kell hű
lönöjen figyelmeztetni a gyermekégy
fűtőjira.

207.
A. a Bőr hi görölgesre, ara
kon hívül, melyeket fejébe inte
nek, nem stültsége, hülső, vande
lő, legyen mértékletesen takarva,
és kerültesen a meg hűtis.

B. a tej el választás hogy ar
elegendő mennyiségbe, és elegendő
üdöve törteményen, stültsége a gyer,
mek agyat ha egészige meg enge
di, reá hűteni hogy maga stoptas
son, errel nem csak a tej el válasz
tás, de a bőr hi görölges is elő mor
ditatik, és a méh fel magasztalt il
let a bőre, és emlőkre Galyuk
midőn tehát hi jöhent, adjuh re
hi a gyermekét, a stoptakajra,
és stoptajra addig meg a termé
stet a tej el választást üri, mi
a 9. hónap végéig törtetik, =
arolnál hűti a hűrésülést kerülük,
a hűrésülis igen ártalmas a stopt

talonát, mivel a tejek igen változatosak, mi felette hasznosak görögöknek, és hazmerőst, vagy más bajok, hirtelen a gyermek halála, más meg hogy a hőzőlés által a vér a méhbe sodul, és ez a miatt örökve nem hurodhatván, a honnan származik még dagadások, hemeriedések s. t. — Hogy tehát jól menjen, be a tej elválasztás, droptas, unko mindig a hüjékhez után, a strüctüs után, midőn még puhák, nem feressek ar emlök, s így bimbók nem fájdalmasok, mert ha később mulla adgyulak csak a droptasra, akkor meg telik a tej ar emlökbe, ez leggyakrabban ar azt kövönit, hogy ar anya Bogány emlőire venni nem akat, mi bal itéltet, hol méhbe ugyan erenfo ganyt tájáltsa. Mások adgyul nem droptasnak, míg a tej öpve nem gyűl ar emlökbe.

ba, csak droptasul illyenkor is, mert táplálásához képest elegendő tejet fog találni a gyermek, és droptas elö fogja mondítani ar új elválasztást.

Illyen gyermek ágya, vagy a li nem droptasok, testi alapottya veget, vagy hűt, ső hőzőlmények veget, vagy nem akat, orok ágyba maradvat, oldals felidgyanak, hogy a tej hi foghasson, könnyű eledelt egyen, és széke hűlönözön nyitva legyen.

A gyermek ágyi tisztulás legjobban elö mardittatuk ha testi, és lelki képpen nyugodt, ha nem indulato, ha ammyit alvrik a memyit a természet kíván, ha mertelletes melegen tartyanagat, ha széke nyitva tartatuk, ha könnyű emésztésűek eledelai, és ha droptas.

Mikor a gyermek meg születvén, a hűl-
 től kímélve elvágya után az anyától
 elvált, ne öltöztessék mindig a ruhába,
 hanem talartsa, uti egy ruhába, és tétő-
 sült ágba, egy kevesse átalt, és csab-
 kevesse magoz abban fővel, és talat-
 tazzuk mértékletesen; Erre pedig
 azért tesszük hogy az új vérforgás-
 kéjre átkasson, a mi ruhabeteli nyo-
 má, által gátoltsátné, a sőt Troi-
 tán által a lehető, meg örüvén, a
 vér ismét a hűdől felé sodul, hol
 aruban a vér folyás, dul hal meg a hű-
 ded; Ere gondgya legyen az orvosnak,
 mint hogy a bába rendelkezé ellen az
 orvosnak, aromat pajarra, és fűrren
 lis dedet. — Így felüdügyen a hű ded
 egy ideig, és a gyermek létegréve jól
 kéjre állott, ekkor hogy véstől, saját
 mártól, és egyéb tisztátalanságoktól
 meg tisztítsassuk, oly melegséggel <sup>hű-
 tá</sup>

ta végből készült fordóba tesszük
 mint a gyermek viz meleg sége oly jól
 ra melegítve, készülni kell a tejét a
 fordóba mint szokás, vagy burre hall
 kemmi, vagy tejbe főrtéseni, és fővel
 be, ese drinta inteni kell a babát
 hogy ilyet ne kövessen el, a fordóba
 pedig, ugy tesszük hogy kaja is a víz-
 be legyen, azért nem jól a beko-
 nyótt, mert erebe mindig meg hűl
 a gyermek kaja, és hámenest, és rá-
 gást kap, azért jó kis lead, vagy ma-
 méj edény, aseréből, és de tva, a mo-
 sár alatt pedig készülni kell a
 hűdől nyomásait, a kímét is, mossuk
 nagy vígyáron, a fordóba lehet egy
 fél óráig, ha valamikéjén a saját márt
 a fordó alatt lenem meggyen dörkő-
 lesre, ott be hemyüle víz vajjal,
 a fordó után természet he ággya felt
 ti.

212.
settyűl, és meg strástitűl; hivált
aron répretek, hol hajlás, ol vagy
nab, ne hogy hi jállyon. Vigyár
ni kell imét ne hogy a baba a
test hajlásait minden ok nélkül
csak egy strólván rejtőzöl ből be
híntane. Toplam porát mely el
quisitívával, és olom kértiméjel
van hevesre, mert er is sok bajó
lat okor. — Meg lévén stráda
va a test, mint hogy a stróla, ort
egy kívámya, bár hibájan igyek
tűnl, ort vótaklamá semmi, ad
gyunk réa tehat egy inget, mely
hátsul hájítva legyen, ese egy mel
lyint, melyet hátsul hösni leha
sen, fejére egy hütös: fej hütös.
Ovak also végeit poljártasűl,
hogy a hi ürejejelet fel vehe
Tél, egy eb semmi nem strúsig,

213.
sok gyermek a meg strólt balga
öltőreje alatt stróved, sőt meg is
hat. Attalyába semmi ruhát ne
engedgyűnt, mely a gyermek strá
bad teste morgáját gátolja, kerül
teppűl nagyon a poljárt, mert er
a lélegrejt gátolja, és mivel a ha
imant nyomját, a ha, elesművel,
a hűlő tal arde alá kentséül, és
igy sérejt obornab, ara is figyel
mátran ar orvó, hogy ar új strólt
nek orvójáig ne adgyon, mi ha on
to kéj stróla, hogy a baba a fős
és után arommal gyenge haska
tot adnab, ne hogy a gyermek stró
rol egy hórrabó ideig bent mara
gyon, és bajt okorron. — Stróla
pedig Syrup: Mannas Chicorei
cum Rheo, et Niولاتum Anatico
admi

Ezt a Dába így héri a gyogyókat Dába
 Drái Chindes Skapteln, a mi igen
 veszedelmes, mert sokszor Diarea ma-
 rad ujjra, és ebbe még hab a liz Ded,
 vagy ha ragaszkosa nyujtanak alkal-
 matosságot, de nem is trükköz, mert
 a gyeselek trükköt a tesmeret maga
 úri ki. Akalyában vigyázzni kell, hogy
 a Dába a gyogyókkal vigyázzon.
 - A liz Ded tisztán, és trükköz katta-
 von, azért förtöessen, de a förtöz-
 után mindig jól lefráztasson, hogy
 a bőr meg ne gyuladjon, de ha meg
 gyuladna, még is alkosz alott vízbe
 mártott, és ki nyomott spongiával kell
 járolni, a még el nem mulik a gyula-
 das, a hol a förtözésre nintzen alka-
 lom, azt javasolyul hogy napjában 2-
 3-szor mossa meg, alott vízzel, ha trü-
 nyított a gyeselek tisztítás, or mind
 anyiszor. Ere néve nemelyek azt
 jár

ja valyál, hogy mind amyszor nyon-
 nan öltöztessen, de er nem éppen jó,
 mert a gyeselek mind untalan cu-
 nyit, és vízzel a váltortatás, al art
 eszkörölyül, hogy a leg liz, ebbe né-
 vességet sem túri, és így nint hogy
 almába is vízzel, tehát mind anyi-
 szor háborgatani fog almába.
 Aklyt elég nappal, minden 5-6-
 órában tisztá trükköz ruhát alá
 adni. Ezzel elég egy szor, a nu-
 ka pedig tisztá legyen, és aröltö-
 zettye ha lehet minden nap vil-
 tórtasson, vagy leg alább 2-3-
 ben 2-3, így trükköz ágyneműje is,
 trükköz váltortasson, a trükköz leve-
 gő legyen tisztá, kelemetes meleg,
 mert még liwált elején nemli-
 szit a liz Ded teste néli elég me-
 leges, a tisztasága véget a leve-
 gő újítás, és de nagy vigyárral,

216.
hogy azt a gyermeket jérre se vegye,
a be fertőző tárgyat távol tartsa,
neki, mihoz legyen a his Dedet li ün-
ni a hűlő levegőre? Ha kelme-
tes meleg van, hivül lehet a mű-
lés után néhány naphoz, ha pe-
dig hűves, ebből való vágyak, és len-
telemek vágyunk a gyermeket li-
vinni, és csak lassan, fokanbent
proktasson, a hűlő levegő hideg-
ker, nem nagy ugrással.

+ Szüksége egy kesz mind a fel-
tetésre is proktálni a gyermeket,
nem pedig mindig karon kordarni,
a mit meg proktván, és utobb nem
is alhat, ha csak karon nem. Az
jó napokba a his Ded leg jobban
felcsirit ar anya mellett, mert
emelt most ugy is szüksége van
ar anya melegére, ha pedig ar

217.
anya attol fél hogy el nyomja,
már okbol nem meri, és nem akarja
ott a his Dedet, akkor egy lejt-
tesen, egy a néli egy matrakra,
ere egy flana és a felett pelon,
kál, feje alá igen alacsony lo-
trór párna, takarni jó flana,
vagy paplany, felteszen pedig min-
dig ott áll, ar agya ne álljon min-
dig a lementre mellett, mert ar
nem jó, a Congestiole végett, se
ugy ne álljon, hogy a világossá
egy enez is szemibe tüsszön, ar agya
leg jobb ha nem morog. po. egy
kórásba, a ringatás nem oly jó.

+ Eledete leg jobb ar anya
táj, és er az 12 naphozba egy edül
étele, szükség pedig ar emeltre
temni, midon évsze jeleit adja,
u

218.
u. m. rivás, újá propáza, amale a
mit krájelba adnala erös meg fo
gáza által, amjizros tészül a
propázra; De hogy hányros he
lyen proptatni, asa nem jó ba
baj ar, hogy midön sis, mest n
esah ijvögöt, de más bajait is
sírás, as nyilvánozza, esah ah
kor hett proptatni midön va
lojagozan éhez.

+ At 1^o hetelbe 3^o 4^o
óra alatt stüb ség proptatni, de
elöbb nem, ne hogy meg terhel
tessen a gyomra, éhez akkor mi
dön puha a hasa, sis, újavalle
res, újait propogattya, es ha va
lami krájába adatvan, art erös
sen fogja ajakával, de nem
jövén belölle tej, art el osepri,
e

219.
es izmet sis, es más valami 3^o 4^o
olta semmit sem esett, krávaron
van, es semmi más ok nem talál
tatvan, a gyermek sis, mentül
távolabb a stüléstöl amial le
ves ebbet proppon. — Midön ar
amya nem proptathat, válagrunt
Dajkát, figyelmervén hogy a
Dajka gyermekének ideje fe
löl ne haladgya a proptatando,
mert így a tej terméjete, mely
a gyermek idejékor van minden
kor arányba, meg kravastatik.

+ Hogy pedig egjéjige, propta
to Dajkára sem kramolhatni,
akkor ar egy neverett vizi kold
sal nevetjütk, or esah ott alhat,
hol éppen jó Dajkát nem talál
h

220.
hatni, mert csak mindig jobb a-
dajka teje, mint a viri lopt, illyenkor
kell figyelmesezni ar anyat, hogy ügy
kísar adajkat tartson mellette, hi má
má, hoi is nevelt, a hi keresi a gyerme-
ket, a hi nem sajnily a almas áldorini.

221. Hogy etedele a gyermeknek
meg egyetren mindenkor aron idöbeli
tejjel, melybe van a gyermek, arist
elintse itt is savos tejet adunk hi
strive, má, fél mekely tejjel, tej is
sárgájával fel kevesse képezen tük-
re, hogy hamar fel fojjon, is el fog
válni a savo, ha pedig nem abas, te
has csak egy leveg cseppre is el vá-
lik, is eren savobol midön a gyermek
éhes, havis Cruhorral vegyitve 3.4.
kavis katinet adunk neki, ha pe-
dig így nem tehetné ar anya, akkor
próbálh tejet virrel, de leg inkább
theaval vegyitve adni, leg gyakrab-
ban adgyák pedig a Verba, tumat, bas

221.
jeg jobb egy kis Chamomilla Viraggal
keverültheaval vegyitni, a te-
jet utobb arutan a savoval nem
éri meg, is má, most több tejet kell
nili adni, utobb fele tejet, is fele
savot, is valami Bom kolnap mulva
lehet má, tejjel keverülthe gires
adni, vagy valamely fiatal hüd levet.

A Rendetlen Krüleskröl

Rendes a krüles a gyermek fele,
vése telintesiböl, midön ar egy áll
a méhbe, hogy a feje a méh szája-
ba, lába is fara a méh fenekébe,
nyakstrütya a nyaka egyik, ar ab-
rarat a másik oldalra fele néz, eren
felvise néz rendes a krüles, minden
egyik krüles rendetlen.

A Rendetlen krüles ismét-
222. fele. + is rendetlen természet-
tes, midön a gyermek felvise hoj,
me

A szájára, az egyenes mértékbe,
 van, és a gyermek átmerő, a medon
 ere átmerővel meg egy er, de nem
 fordulnak hátra felé, a nagyobb re
 serek; Így ha nyakstízzal áll a méh
 strájához, gesimtrével hát felé,
 hájjával ellenkerő oldalán, előre
 fel, és be, így szinte ábrárat fel
 vésnél, fötető felvénél, úgy sim
 te a strúlis a felvésre nérvén,
 datlen, a láb terd felvénél, mert
 ist ugyan hozzá, a felvén, de meg
 sem a leg alhatmasabb a strúlisre,
 és a természet által csak mehe
 ren történet. — Rendetlen,
 Mesterséges a strúlis, a gyermek
 felvénél, midőn emek hozzá, a
 medentre hatást mértékbe fel
 sítik, az ar keserűbe, hol a strúlis
 re a természet nem elég, meg
 Mesterséges fogások is strúliságok.

A Rendetlen Természetes Strúlisokról.

A. Rendetlen nyakstízzal strúlis
 az, midőn a gyermek hozzával úgy fel
 sítik, hogy lába és fara a méh feneké
 be, de feje úgy van a méh strájába, hogy
 a homlok az anya egyjűh oldalafelé
 az anyának, de előre áll, a nyakstízzal
 pedig, a méh strájába áll. — Ezt er
 mesjűk: hogy a has strúlisága nem
 oly nagy, a gyermek magga, inkább
 hátul érkezik, a lábát érkezők,
 az előt ülő rejt magoz, az ál, is lenem
 eszkekedhetvén, a medentre kövén
 láb hátul, mint előt költi, a hüvel
 lyes rejt magoz, a méh strája hátsón,
 is fájalmason tágul, a vir hólyag se
 lezebb, emek meg repedése után fe
 dig a nyilvasrangot találjuk, a nagy
 kutató, a kőjés hejű stb felé, a hi
 s így pedig a természet rejt felé név.

224. Ezen felvétel a természet maga
bizja ki hájtani a gyermeknek, ha ar-
egyéb a skülszere való skülszere, fel ké-
telsh vagy nah jelen, a skülszere, Mecha,
nismussa. A skülszere 120 Dö skülszere,
a fő, a Medentra felvétel nyilatában áll,
csak hogy maggy, abban, és hogy itt a hom-
lok, a tojás, lük, és a természetem ízejü-
l, felé kért, a nyakstírt pedig hátra
felé, csak hogy ar fajdalmas, abb, és
hogyabb ezen idő skülszere, mert gyak-
ran, a korin rezed, a vir hólyag, és gyak-
lagan lágul, és a méh skülszere.

A Zil Dö skülszere a főle
eserkedik, mint más skülszere, csak
hogy itt a fő le eserkedése ellenkerő,
a rendszer felvétel, mert itt is alá,
és lefelé, de a homlok a természetem
skülszere, ar ábrarattot is szinte a
micheffala nyomja, a mell elöre, a nyak
hátra áll.

A Zil Dö skülszere: itten a
kaponya ar ábrarattal, a természetem

225.
hársly alá tartatik, ar átmetti, be je,
dig ar ábraratt a mellől el valóan, leg-
először is a homlok skülszere, a fanav
alot, és emel meg skülszere után, a nyak,
stírt elöre, és felfelé emelkedvén, így
jön ki ar egyéb skülszere a rezednek.
Rezedon körtinik ar után, a fő skülszere
után. — Ezen skülszere fajdalmas, mert
a homlok ki skülszere hátra igen
nyomatik a köre kuy, és könnyen a
végbelig rezed, ha kivált jó tartás,
és helybertetis hibarik.

A Bán mod követkerendő
felvétel, mint természet skülszere
és nehérsége, ar 120 Zil Dö skülszere,
a méh skülszere, és fajdalmas
lágulása. Ar 120 Dö skülszere a
nagy skülszere rezed igen nyomatnak,
de ezt gátolni nem lehet, arist hál
ereket seprül, hogy a fő le eser-
kedése alatt, hogy a fő a csipő
csontkor ne nyomja oly nagyon, a

hüvelyes részt, tehát alólal felülről
adunk, aron oldalra melyen a homlok
van, és hogy a sréket hi üsítettük.

— Az 21. és 22. fejeletben a fájdalom
lecsökkentése ellen a főnök nem te-
hetünk semmit, csak az apronyt
felgubor ar erőlködésűl. Az 23. és 24. fejeletben
a sréket alólal felülről, a
hörszűk vizsgálván, hogy a hom-
lok hi hájtása alatt, midőn ar áll
a mellköl el vól, annak erőszak-
san ellent ne adjunk, hanem igye-
kezzünk a nyomást inkább lecsök-
kenteni, mint a hörszűk vizsgál-
tani. Az 25. fejeletben sréket és el fo-
gadása, úgy a gyermek így assal
való bánás, és a rendszeres tesztelés-
tes sréketével meg egyet.

Nemely orvosok: ezen sré-
ket nem bírák a tesztelésre,
hanem elég korán meg esmérven

ezen felülről lábra fordították, de
er a gyermekre néve vesztelmez,
ar anyára néve pedig a bajokat le-
het okos bánással kezelni. Majd
a főnök rendszeres fordították, de er nem
jó, mert a sréket és hellene-
fordítani, ha fel érre oda kerülve,
majd fogakat használunk, de er
nem sréket, mint hogy a főnök,
sréket úgy jön hi mint nélkül,
mert er a sréket és be mész, és a sré-
ket munkáját is gátolja. — Ezen
egy sréket, ar hol ar sréket-
előbb, és utánok a hátulról jönnek.

B., 26. fejeletben sréket ar, mely
nél a gyermek a nádor sréket,
a feje teste hörszűkkel áll, és a
főnök hájtva, csak a vállak
hörszűk hurva, de er a sréket mun-
kaja alatt legyen, mert a sréket
alatt hörszűk egyen úgy áll
és a sréket alatt a mész öfve k

228.
Zodaja alatt meg görbülven a tör-
kölv valamely oldalra, stülveig hogy
a fö tető is rendszeresét fogtallya el,
ereleből hi tettrül, hogy eren fel-
vés csak a könnyvelbe van. hypote-
ticken, vagy lehetéig is, csakak
has a midön a stüentre bö, a-
gyermek lityim, ugy hogy minden
forgas is nyomoz nélkül leereke,
dül, de midön a stülö résteken áll
akar menni, akkor a leg kisebb
fö is meg váltortatya állását, es
vagy nyakstik, vagy más állás lesz,
f. o. ábrárat állásba, eren felvén
lekereslen, igis leg inkább a Grax
is mutatya.

+ C) Ábrárat stülö midön a
gyermek a kopraz felvise mel-
lett, a stülö 2 vagy 3 Stü
stakayrába ar ábráratyával
ál a Mch stájába, hi tettrül
ebből, hogy eren felvén a Gerkez
1.

229.
sig alatt, stöt a stülö leerdeten
simben jelen, is csak a stülö munká-
ja alatt leprül, midön a Mch mo-
mást kéven a farára a gyermek,
nel. A stülööl nem etöre, hanem
hátrafelé, homoran görbül, is igy
lepr ar ábrárat stülö

Esmerteö felé erel. A has-
nem stülö töhéletesen, a has nem
göm bölyü töhéletesen, a gyermek
morgas hát felé erer felül, a hü-
velyes rést magoz, a vir kolyag-
nem gömbölyü. emel revedeje,
után pedig a Mch stájába ar
ábráratyát talatylub a gyermek,
nel, eren felvén rendszer, mest-
kopraz, de a stülö rendszeren, mest
nehéren megy végbe, de meg is a
Dermáret alkat eren állásba, ugy
áll ar ábrárat a Mch stájába, hogy
2

a homlok hátfele, leg inkább a jobb
oldal, az áll pedig a bal oldalon,
a fej az láb fele, de ellenkerő leír-
pen is állhat.

A 22 20 szakaszba a föle,
és hátra fele forgaták, úgy hogy
a szelley homlok a kereszt csomak-
le, a kereszt áll pedig a szemközti
vont eggyezüléseket.

A 23 20 szakaszba az ábrá-
kat úgy rajtaták, hogy az áll egy-
szen a fan is alá szorították, mi-
dön hátul az homlok, és fötető
hátsul emelkedik ki a horeg kúpon,
úgy hogy legelőjör is az or, szem,
homlok, és arutan a fötető jön ki,
és pedig ariszt, mint hogy az áll a
vállához oly hátrélt van, hogy az
szak nélkül le nem jöhet, ariszt a
szemközti legelőjör is az or, szem,
homlokát hátrá a ki, a fötetője

után a törvök rendszeren szelley,
a másik oldalon szinte így törté-
nik a szelley.

A Könyv 24 25 fele
ábrákat szelley, tatáztaták. ki a
Homlok az anyanál jobbra fele,
de előre a fej az lábhoz, az áll,
a bal oldalfele, hátra a kereszt
irésülést néri, és ellenkerő leír,
hogy a ki hátrá alatt, az áll jön
ki leg előbb, de az a szemközti
még nem jött elő, nem is jöhet,
mert a gyermek feje leg hosszabb
mértékbe eszélkedvén le, a me-
dentrébe; hol a madarra ürege
át mérvi ki, ebből a fötető, és ha
a Homlok előre fordulna, akkor
a törvöknek is lehetne forgani,
de az az elő hogy lehetetlen-
törvi, és így mind az csak a fordá-
át mérve maradna a gyermek,

és a feje se nem eregethetne, hi-
 tessébe tehát, hogy ezen rész-
 so a Termézetbe nem fordul elő,
 és csak holt magzatnál eshetne,
 a hol a szülés, hirtelen örvény-
 matathatna, de itt nem formál-
 dik ábrázat szülés, azért is, lehesen

Att ábrázat szülésbe nem
 egyéppen egyérmel meg a gyermek
 átmerői, a Medence átmerővel,
 azért nehezebb, és így rendetlen,
 de ha a szülésre való felkész-
 leli vagy nem jelen, meg is a sz-
 mézet végben vívri, és hogy a
 gyermek az ábrázat szülés alatt,
 az általán a Premierem csontok,
 hoz való Provisája véget hat,
 váltakozan, a vízhermolyt, kö-
 rön ség és gutta ütésben hal meg.

Emeli a tapasztalat, ettől
 mond, bár igaz hogy az ábrázat úgy

meg dagad, hogy nem is lehet egyszeri,
 de az 24. óra alatt el mulik megint,
 mint hogy pedig hozzá, az ábrázat fel-
 ves, azért rendszer, és ez is az előbi-
 el lövéshez, ebbe a Termézet,
 se bírvani a szülést, csak hogy az
 nehezebb, fájdalmasabb, és hosszab,
 de hást egészjébe nem val.

Att 10 Dö Szakajba úgy bá-
 nunk velle, mint más szülésnél,
 csak hogy itt még inkább vigyár-
 kunk a szél, és virellet hi üve,
 sítévre, mert ez ártthat, és hogy
 mentől előbb igyekerrünk az így-
 ba horni, és felkész, ült oldalt, aron-
 atalra, melyre a fő igyekedik,
 a 2 Dö Szakajba szünet úgy te-
 szünk. — a 3 Dö Szakajba a
 körép húst hűtönösen apolyul,
 mert ez az szélle, ábrázattal ny-
 matik, meg sem úgy mint a nyak
 szíri szülésnél, mert ott előbb a

234.
gátot törtenit a li jövés a főnek, a nyak
színtől pedig a szemem iv alól szabadul
ki a fő, és arutan nyoma a gátot.

Nem ely orvosok halotán meg emé-
nek eren szűlést, tehát lábon fordítván,
a mi veszedelm, a gyermekre, ma, oh vagy
ha lejön emélték meg, vagy a 2. Dö. 2.
hasra szűl fogot használták, mivel kin-
te nem nyerték, ma, oh ar újabb emé-
tő vassal ugy emélték, hogy a Uj. 1. Uj. 1.
szőlől le eméltetvén, színt a fő, aráb-
rát alásbol fő tető, és utobb nyakig
alást ohozták, de ert hol hely van, a
szűlés, hol ninyen, ott ugy is hasz-
lan, és minch ott a Master Uj. 1., hol a
terméret is elegséges.

D., Lab szűlés, Felső szűlés, Felső
szűlés ar, midőn ar eméltett réjrelát-
lanak a méh szűlés, eren szűlés, a
mindig veszedelmesebbel, mint a fő Uj. 1.
lével, ahas Uj. 1. Uj. 1., ahas Uj. 1.
tervisegek legyenek a szűlés, mest

235.
ilyenkor a ködül kösinos hőmnyen elő-
esik, nyomást szenvedhet a szűlés alatt.
— 2^o Ha a vég tagok meg vagy nak szű-
lesse, a Dö. 1. aló végével irgatatván
eren réjrel, a levegőtől, a gyermek a ké-
ső szűlésre körral levegőt sziv be, mel-
tyel vést, vést 1. sziv be, de hi le,
kellani nem tud, és így meg fulhat. —

3^o A morgás, oh körtött hőmnyen ge-
rintrébe hibát tehet, és így a gerint-
velőt nyom hatlya. — 4^o Mivel a
vizza marado fő, a méh ajrve hu-
zódása alatt, éppen a méh leginyt
nyom hatlya, és így ebbe a Uj. 1. Uj. 1.
tolya. — A veszedelem amél na-
gyobb, memel li, ebb réj meggyen
előre, mest er hőmnyen át menve,
es chely utat sagit, arert leg na-
gyobb a veszedelem a lab szűlés-
nél, li, ebb a Felső szűlésnél, és
leg li, ebb a Felső szűlésnél, mely
utolsó elegge sagit a ar utat,

a jövő vállak, és a főre nérvé, de az anyára nérvé is nagyobb a véredelen, az úgy skülséknél, mert köhülés, len vör hólyagok formálódna, mely hely a hü tagulá, az igen sokat hozna. — 2^o hogy aron véredbe sokkal hisz, ebb az ismeret, és tudva vagyon pedig hogy a leve, bi ismét, hogy testek nehezebben hatadnak előre: a gátakon. — 3^o mivel a fő skülséknél a fő levén, úgy is leg nagyobb véren, és úgy jön aron véren előre, melyet örvé nyomni lehet, a mi a láb skülséknél el lenherő, de az anyára nérvé is nagyobb, a láb; hisz, ebb a térd, és leg, hisz, ebb a véredelen a láb skülséknél.

1^o A láb skülsé az, midőn a magrat úgy fele skülsé, hogy a fő, és vállak a mék fenekébe, és a lábak a mék strájába fele skülsé; deket nek a lábak a mék strájába a nélkül.

lént, hogy a láb fele skülsé, vagy skülsé - lenne. 1^o a leve, bi fele skülsé, hövön ségezen mind a láb a mék strájában van. és az töltetkez láb skülsé; — Ha csak egy láb van a mék strájában, akkor töltetkez a láb skülsé.

A láb skülsé, olt 4. fele lépőn ilhat a magrat. — 1^o jobbra úgy ill, hogy a gesimre az anya egy ill otdalafel, de előre, a háza pedig a magrat otdalafel: de hátra felé, és így ilhat a gesimre job otdalra, midőn a háza balra, vagy a gesimre balra, midőn a háza jobbra. — 2^o ilhat még így: a mi ritkább, hogy a háza előre, a gesimre hátra felé, és így ismét a háza bal otdalra, a gesimre jobbra, vagy a háza jobbra, a gesimre balra. — De ezen alást csak a skülsé, min kaja alatt veszi fel a magrat, a ter, hez, így alatt, a gesimre más előre, más hátra ilhat. — A skülsé, melha, nis, mus, a: az legyen egy, vagy 2^o láb a mék strájába, az hü lombó,
7.

get nem teyr, erde tehát könnyen le-
 esz kedve, sőt a hűltö sűrű répe-
 lig is eljőme, de ugy hogy a csipőh
 a ferde átmerőbe jőme, is mikosa
 gesimre előre, a has hátra felé né, ah-
 kor a bal csipő: a jobb átvali tojás lib-
 nál, a job pedig a bal átvali csipő-
 keszept irányul felé.

A' 2^{ik} Dö' skakayba, a tojás-
 libnál levő: csipő előre, is aláfelé
 forog, a szemem csontahizgütölésé
 alá, a májig egészen a keszept csontú
 vajulása, a has pedig ar egyjű: a ge-
 rintse pedig egészen simta a májig, a
 dalra né.

A' 3^{ik} Dö' skakayba a hátuljo
 csipő jön li, leg előbb a gáton, is-
 gah arusan jön li ar 1^o csipő li, er-
 után a fájdalom átkal: a has hátra
 felé forog, is ar a ferde átmerőbe jön.
 — A' 2^{ik} Dö' skakayba a vállak ar
 egyenes átmerőbe jőme, ar ar a 1^o
 merem iv alá, ar 1^o, ar hátuljo fo-
 g.

pedig a keszept Gontli vajulása felé.
 — A' 3^{ik} Dö' skakayba simta a há-
 tuljo váll jön li előbb, arusan ar
 1^o. A' vállak után a főjón, ugy hogy
 a nyak simta. Mely ar 1^o Dö' ska-
 kayba: ar egyjű átvali tojás lib-
 nál, ar ábrarat pedig, a má-
 jik átvali keszept Gij irányul, fe-
 lé né. Elkor a 2^{ik} Dö' skakayba
 ar egyenes átmerőbe jőme, eren-
 rével. A' 3^{ik} Dö' skakayba ar
 ábrarat jön li leg előbb a gá-
 ton, is emek li emelkedés után
 a nyak sirt skabadul li a 1^o
 merem iv alól.

A' 2^{ik} állásba: a jobb csipő,
 a bal átvali tojás libnál, a bal-
 csipő pedig, a keszept csipő irány-
 lésnél. — A' 2^{ik} Dö' skakayba, ar
 egyenes átmerőbe jőme. — A' 3^{ik}
 Dö' skakayba a hátuljo válljón
 li előbb, arusan a csipőh után a

240.
vállal, srinte így mint a Gijőle, a
fő pedig srinte úgy mint az előbbinél
szóval.

Vagy nahál állásod, a hal a ház
egyik oldalán, de előre ill, a háza
hátra felé, de a másik oldalán,
is er srinte így a 2^{ik} & oldalán, de
ez meg veszedelmesebb mint az
múlt 2^{ik} állás, mert itt a köb
bi veszedelmesebb liúul: a srintés
háza, is ábrát rajzol: a srintés
terékbe forognak.

Mechanizmus. Ha a ház előre
az anya bal oldalán, a hat a
másik oldalán hátfelé ill, itt is a
lábak hi jömmek könnyen, de a
Gijő: mely elöl a ház alsó
vált, ott a ferde átmérőből az egy
más átmérőbe jömmek. — A 2^{ik} Gijő
stakapba. — A 3^{ik} Gijő stakapba
dig a hátsó Gijő jön elöl hi, a Gijő
jól srintés után, a ház hátfelé
#

241.
fordulni, hogy a vállak a ferde att
mérobe. az 1^{ik} idő stakapba. a 2^{ik}
idő stakapba pedig az egyenlő
mérebe. a 3^{ik} idő stakapba a hátsó
so váll jön hi elöl, a vállak
srintés után: a fő igen nehezen
léti meg, mivel a srintés rajza
az ábrát jön a srintés rajza,
lé, alá; de ezen srintés után ill,
lást: gyakran a Gijő meg srintés
se után a ferde az egy ferde
hogy a fő srintés alkalmával, a ház
hátra, a gerinté előre néz, is így
az ábrát hátra, a nyak srintés
előre néz. is így a srintés a 2^{ik} idő
oldalán is történik.

Elmértető jelai a láb srintés
nah, is felvisszák. — A ház a ház,
hez, srintés vége felé nem srintés
amjóra lefelé, mert a fő a minden
tre srintésbe marad, a ház nem oly
gömbölyű, a gyermek morgás nem
#

fent a méh fenelibe, hanem alatt ismerke-
 lö, a méh fenelibe némelyetnél a fő
 ismerhető, a hüvely, rége fent van, nehe-
 zen tájul, a Vir hólyag nem tökéletes, az
 elöl allo rége tapintható. De ezen jelszól-
 ból csak gyanakodunk, de a vir hólyag
 repedése után, nyitván tapintható, az
 elöl allo rége, hogy pedig a lábat:
 kérsz ne vesélttyük, keresztük az uja-
 kat, ezek a lábon egymás mellett állat,
 a hüvely nem szabad, a mi a lábánál
 elentierő a kérsz, a lábánál hozzá a
 talp, a kérszél kérsz a kereszt, ha ezek
 bül nem esmérhettyük, keresztük a sar-
 kát, a mi a kérszél niny, ha ezek bül
 sem esmérhettyük meg a lábat, emel-
 dagadása miatt, akkor mennyünk fel
 is keresztük fel a kérszél rége a mag,
 kát nál. — Ha a kérszél a kérszél
 való fel kérszél vagynak jelen, ak-
 kor az anya veszedelmét nem kérszél,
 de a gyermeké akkor is, ha pedig elenke-
 ré az alapot, akkor az anya rége a rége.

véd, de elote nem veszékes, a gyermek
 elote pedig meg nagyobb veszedelmbe
 fog, is az erre végyárni kell, a gyermek
 mák elotól való itallatás hi mondani,
 mert az gyakran más kolt, is gyakran
 a kérszél alatt hal meg.

Dának módgya: Ha a kérszélre hi,
 vántato fel kérszél jelen vagynak,
 akkor az 1^o kérszélre hozzá, a nem
 kérszélre egyid, mint a végbelet, is a
 vérethő hólyagot hi vérethő. — A 2^o
 kérszélre hozzá a kérszélre adunk,
 oktatnyuk hogy fájdalmit erőskato-
 san hi ne dolgozra. Végyárni a
 válsoráshoz, is tudni kell hogy ezen
 idő kérszélre is hozzá. A 3^o kérszélre
 kérszélre némelyek: 2^o fogadhat
 kérszélre, de mi itt is ott a kérszélre
 be kérszélre, a kérszélre kérszélre kérszélre
 ruhával fedjük, a kérszélre kérszélre kérszélre
 rége elöre nyomjuk, a kérszélre kérszélre kérszélre
 2^o ujjal elöre vomni. Hogy ha pedig
 a kérszélre: a 2^o láb kérszélre jön kát.

244.
fele, a gesimre fele, alicor a lét öh
Kisnort amira hurrul hi, hogy eggik
labat hi skabaditattvan, a lét öh
gesimre nyomasatul meg skabadul,
van, a has utalara forgatas, on, a
többi rejteli simte egy: mint sru,
letonek, mindegy rászár meleg ruhával ta,
karkassnati.

201. Térd sküla, ar, a midön
a gyermek a méh anyában fejével,
is vállával a méh fenekebe, terde
vel pedig a méh skájába, is körön,
segeren mind a két terdel: midön
tölelesen, vagy pedig egyet: midön
tölelesen a terd sküles. Er ritlab
mind a láb sküles.

Elmértetői mind arak, mel,
lyek a láb sküles, net hiutul kapaz,
talsatnati. Belvö virszalaznati
a méh hüvelyes rejtet, is nyakat
kovegabbé lakkylu hi tagulva, a
vir hohyag nem gömbölyü, hanem

245.
inkább hopyras, is nem annyira feprült,
a gyermek rejt hopyrasagot kapaz,
talylu a vir hohyag repedeje után.
A vir néha tyritatalan gyermek
szurokkal vegyitve, de csak néha,
kapaztalylu tajmskattyulu a ter,
dehet, melyek hasonlot a honyöle,
kor, is vállakör, de ar elvötöl
külömbörneti, hogy nem: oly va,
teget, a májoditól pedig hü,
lombörnek, hogy mint en mellet,
teh oly skülles rejt. De ha nem
elégge emarjult, mennyünl fej,
jebb újarmkkal. is g fogjuk emenni.

Ha a skülesre hivantato fel
téselek jelen vagnati, a sküles
simte a termozret által mehet
vegker, csak hogy hopyrabban is
fajdalmasabban.

Mechanismus itt is 4. fele
lehet ar állás: 1^o vagy a gesimre
előre, a has hátra, is er a bal, vagy

246.
jobb oldalon. — 22 a has elöre, a
gesimre hátrafelé, és ér is egyike
vagy másik oldalon. — Midőn a ge-
simre elöre áll, az elöre is arthoid,
a has pedig hátrafelé, a térdel
a lábakkal homyan strimse mind
az elöb a láb stülésnél emlité,
sett, meg stülésit, és semmibe
sem hülöm börtit itt a Mechanismus,
a láb stülés Mechanismusátol.

A Prognosis a térd stülés-
nél ugy kell határozni, mint a
láb stülésnél, erre alias mi hódve,
tö kösnjülmányok legyenek jelen,
meg is a gyermek életkorára ve-
kedelmes, de az anyára hatas,
verő a fel tetelék, akkor hony,
nyebb a stülés, bár ekkor is faj,
dalmas, és hopyra a stülés.

30 Fat stülés: Midőn a fat
a méh stráját néri, a fö a méh
f.

fenekibe ragyon.

247.
Meg emérei: a hülvő jeli,
a has nem fökületesezen gömbölyü,
jobb an stülés, mind a térd, és a
láb stülésnél a gyermek fejét a
méh fenekibe tappintatni, a
gyermek morgást fog alant, a méh
hüvelyet rézre alant áll, és az a méh
stráját jobb an ragyon sagulva,
mint az elöbbeni 22 stülésnél,
a vir hopyag nem hopyra, hanem
gömbölyü, a méh stráján által
évephetünk stülés rézre, de nem
oly keményet mint a fö. It vir
hopyag repedése után évephetünk
a fat, és gyerjü a fököl: hogy
é stülés ebb, és nem oly kemény,
egy kezével által van hese válaprt,
va. Hogy a végbel nyitását tap-
pintatjuk, és ha ebbe arrijunk,
kat vörjü, és hi hopyra, és mit
27

gyermek skurokhal mor, halva talat,
 lyul, a gyermek vir tigtatalan, de
 ha a far igen meg sagad, akkor hon-
 nyen hibaten lehet, es abaratorak
 nirkessyul. Hogy tehát meg hü-
 lombortess keppül, ujunkat a vég bel-
 be vizzrül, ar uj: gyermek skurok-
 hal lesz pizrolva, de néha immen-
 is oly tigtan jön ar uj, mint a piz-
 bol, de itt farrikos talalunk,
 itt nyelvet mint ott nem, ha pedig
 meg erül mellett is kettőseges volna
 ar állás, de a sküleire valo fel-
 tételük jelen vagnak, akkor,
 sokat ne aggodjunk, mert a far
 ar abarot sküleivel meg egy-
 gyor. De ha mesterseges sküleis
 jelenvesik, akkor vitzgalyuk
 jól ar állás, ha sküleis ^{zitt kizalig}

Prognosis a gyermekek
 nére nem oly veszedelmes, mint
 ar

ar elöbbeni zitt sküleis, sőt ar anya-
 ra nére is kevesbé, annyira hogy
 a veszedelem kisebb. — Itt is ar
 állás 4. féle. t. i. hogy a hát ge-
 rintz: ar anya egyik oldalán elö-
 re, a has hátra, es a hát leg inkább
 bal, de jobb oldalra is átkat, vagy
 a hát gerintz ar anya jobbra né-
 ri, es hátra igy elvick, a has a bal
 oldalon is előre, vagy ellenkeris kiz.
 a Mechanismus hasonlo a lab, es
 kiz sküleis her.

Et Lab kiz, es far sküleis
 mel. Ha erület jól meg ömerte,
 is a Mechanismusait tudja, ar
 anya erület emeri, jól gyermek-
 nek eleris meg szab aditva a kiz
 egyik arant legis, ig nélkül g
 halnak, a tudatlanok, a kiz a
 meg sküleis labok utan a kiz

250.
Zöl fülelő türehetlenek várm, sőt,
sőt hurrah a lábokat, és az által a
fő a törvölől állával el valóan,
a fő leg nagyobb mestérelével hurrah
a medentébe, és a sötétorahadajára
a skülest, a veszedelem csak a lábok
szülsze, és a sötét skülsze után követ,
kerül, a hódóló Évinor nyomára ve
gett, ezen skülest mindig a természet
re bírruk. Ha az ily skülsze hi,
vansato fel kétsésh vagy nat jelen,
csak ha veszedelmek valónának je
len, hogy leg alább hessi hőrüül ar
egyiket t. i. ar amjant meg szabadis
ni. ily alapotba skülsze a skülest,
sietessni, az ily veszedelmek alapotok,
a hódóló Évinor élő eszre, hőrönjegy
vagy helybeli gyengeség, ves folyos,
götre, ránkötökés. Vagy ha oly beteg
sége kéne, mely a fájdalom hi,
dolgorájat lebeszélenni képi, vagy
nem szabad. p. o. Südő gyulad is, mell

251.
Vörös, Anevirma, mell görer. A se
re, kivált ha hirtart, vagy ha éleket
veszedelmertető betegségek kéne.
Mint hogy ilyenkor a természet
leire skülsze, fel kétsésh mindig je
len vagy nat mint, enek, t. i. ar anya
egysége, ilyenkor bár a természet
a skülest meg bírná, és felvére se
kintatéből a skülest, meg is ilyenkor
hogy hamarabb el hártassuk a ve
szedelmet, mesterséges skülest te
stülni, de nem mindig art, hanem
hülső, és belső kérek által a beteg
séget, ha lehet el hártassuk, és
ezen lehetőség mellett el levinhá
riva, az okot ismét a természetre
bírruk, így a hódóló Évinorot vörre
senni így kérrülni a Südő gyulad is
nál, ezt meg főnni kösélülni, és
csak akkor szabad, ha hülső, és bel
ső kérek semmit sem hágnálpak meg
terséges skülest semmi.

A Mesterséges Szülés

Midőn a láb szülésnél oly veszedelmes jelenség lehetne, melyek mellett ugyan bár a természetre lehetne bízni a szülést, de a veszedelmes jelenség miatt veszedelmesebbé válván a szülés, ezt előfordítani kell, eféle rendetlen, égelt skamozal, melyek alatt veszedelem nélkül nem történhet a szülés. Így esetekben, ha a láb szülést, a természetre nem lehet bízni, hanem mesterséges szülésre alhatnartatni.

Az első Dö skabarba, mint hogy még itt nem szülésre érte, mi, a természetre lehet bízni, hi vévén ha nagy víz folyás, gövör, ringatódás volna jelen.

Az első Dö skabarba. Mással mesterséges, de néha nem, hanem az

nyival inkább a Bih idő skabarba.

Ha mesterséges láb szülés szülés, akkor kereszt ágyba fektetjük. Az ágy áll: skalmak, bot, erre meg duplázva rövid matrást, keresztben lepedővel erősítjük meg, sőt meg erre is egy lepedőt keresztbe, a fej alá egy vándort, még pedig fura egyik szél az ágyra skabarba alján hi felé, a másik szélentő fö, és vállak, a lábak is székre támaszthatók.

hogy a szülésre hörre észrevehessen, a szülésre alá edény készíts, a vízrel melyek hi folyás fel fogására, könnyen szabottak a szülést, erre után le terdetvén, a szülésre a lábak hörre, hupp formájára idő, mitott kereszt / akát melyik hör,

254
zel lehet ert kemni, a horep hus
felé be vigri a méh hüvelyen, és
midőn már vastagabb része a méh
hüvely krájját el hatadta volna,
akkor a hór kátot, a keresztön
ki vajúlój a felé fordítja, most
ha a hüvelyes részt érvén, er meg
a méh krájával nem lenne túrá
gulva, ilyenkor 1^{te} egyet, arutan
több újambat vigriük a méh krá
jába, és ereket lajan távol ne
egymástól, tágittyuk a méh krá
ját, de lajan törtémenyén a tá
gítás, ne hogy sérült a méh krá
ját, erutan a vör hány az reperi
tyük meg, de csak a méh krájá
ba, nem megyünk fejjébe, a vör
holyagot pedig a hüvelybe, és 2^{te}
újálkal meg fogvan a mutató
ujjal, meg furjuk, er meg livén,
ár elől álló lábakat, akas egy,

255
akas mind a 2^{te} legyen. Ha mind
a 2^{te} felső van a méh krájába,
akkor a mutató: 3^{te} és 4^{te} ujjal
fogjuk a 2^{te} lábát, és könnyen ki
hurruk a lábát a körülö részekből,
de vigyárrunk: ne hogy a 4^{te} ujj
hetyek a hüvelybe fogjuk, a
lábakon midőn igen nagy tért
teven öklünk, már er is nehe
zen mehet ki, de ha csak egy
lább van a méh krájába, ak
kor lehet a hüvelybe, a láb
talpára, vagy fejére kemni, a
2^{te} és 3^{te} ujjat pedig a bokák
ra teprük, a vüpra maradt a lá
bat, a meg körülökre

a mere eren utolsó
ujjai állanak, aron oldali hór
zel be megyünk, a vüpra mara
dott lábát fel keresvén, kerdit

^{256.}
fel a has, hor nyomjult, hogy Cromb
ja a has falam heverjen, arutan a
labat kérdbe meg hájtván, minse
vagy horruli hi, mint az ivő labat,
de ha már a Csipőh is be hájtat,
sak a medonre nyitás ába, akkor
nem szabad, és nem is lehet ugrá,
delem nélkül, a vízka maradott
labot hi horni, a mely a Csipőh
stülése alatt, magától is hi fog
yni. Ha a gyermek ujjai art
mutatnyák hogy a has, és ábrát
előre, a kemérem iv alá jöme,
a stülés alatt, ilyenkor aron ol,
dalra forgatva hutorom a labalat,
a melyre a has áll, ha pedig a
stülés art mutatnyá, hogy hasjal
jöme a kemérem iv alá, akkor
igy cherrünk a hasat vagy forgat
ni, hogy a has hátfele igyker.

^{257.}
zen, a labat stülés után 2^{et} ke
kúnhat a medonre jöme a gyermek
neli kéven, vagy forgatni, hogy a
has hátra fele jöjön. A Csipőh
meg stülés után, a hasat hát
ra fele forgatván, vagy hogy 2^{et}
kérdel fogván a gyermeket, hogy
hüvelykénél hátul a horejt
előntre, a többi 4 ujjakat
pedig a Cromb első stüvere,
és nemző véreket alhalmar
tattyul, és vagy forgatni hát
ra a hasat, most ha: a köldök
kvinor, vagy a labai körött vol
na a gyermeknek, akkor aron lá
bat kell hi fejteni, mely hátrafe
lenéri a köldök kvinor. S i. 2^{et}
ujjal fogván, hurrek a meg ve,
delem nélkül törtentet, ez ar
után a labat hi em elven belöle,

258.
a költés és most hátfelől vizsgálom,
Díj igen könnyű a sküles, sőt min-
den sküles fájdalom nélkül is meg-
történhet, de hamar nem lehet sen-
ni a kihúrást, mert ha nem si-
etünk, akkor azt nyerjük, hogy
a mellkasi nyomással az áll,
azért csak a fájdalom alatt ke-
gyünk morgáskor, ha pedig ep-
pen nem akar ökrök húzódnia a
mél, akkor ezt döngöljük, és azt
tegyi meg a mester, hogy a ge-
rimret előre fordíthatja, akkor
mikor forgatás alatt; de most
kerdődik a veszedelem, a karok,
és főli fejükénél, mert ilyenkor
ha az olyan történi, a fő áll-
tal nyomással van a töltés kö-
nos, meg öli a gyermeket, azért
ezt tisztelem hely, hogy a 258

259.
sokat elb. li fejükénél. Sküleség 12.
a bal kar, bal karrel fogni. 2.
mind a hátul lévő kar elb. li hor-
ni. Így ha a bal a hátul, akkor a
hüvely, mutató, és 259 bal kércel
újra fel vivem a főt hasi rész-
lés költ, a könnyűség menven, a kar
előre felé nyomom, a könnyűség ar-
vian le, és hátfelől fordítom, a
test pedig ezen munka alatt, a job-
b karom heves, sküles ar. 259 kar meg
skülesénél is így. — Ertek után skü-
les a fő skülesét nézni, hogy me-
re áll az ábrát. Így ha az ábra-
kat balra néz, a 259 jobbat jobb
kércel vivem, úgy hogy a gyermek
ora, a mutató, és 259 új karra es-
sen, úgy fogjuk meg bal karrel
pedig úgy fogom ismét, hogy a mu-
tató, és 259 új a nyakvéntra es-
sen, most így forgatom a főt, hogy
a

260.
a ferdá az mivőbe jőjön, innen az egye-
nesbe, a mint a természet, trülsénel.

Az Lab trülsénel gyakran megéri,
hogy vagy a természetből, vagy egy ügyet-
len hár fogás által a háj előre, nem je-
dig hátrafelé forog, és ha a trülsérol
trülsőhöz hívattatik linél a hája a
gyermeknél a természet is alattvan,
már ott bizonyosok lehetünk a gyer-
mek határolól, a köldök kintorogy,
mára véget, ilyenkor ha természetesen
fogást tesz, trülsérol a nagyobb
erőt: a gyermekre fordított, az. — 2^{or} —
Hogy a gyermeket tovább li ne hár-
zuli, a még jobb állást nem adunk,
er pedig a pihenés pillantattya alatt
a gyermek fel felé való emelésé által
a törőhöz, az anya aron oldalaféle
fordított az anyának, a mely oldalra
a gyermek többé, levejbe nér, úgy
hogy a gyermek egyik oldal, a meny-
re lehető, a kereszt Cip irásulást

261.
telimnye, a forgatás alatt pedig, az egy-
gyik hárunkat a kereszt hájra, majlat
a medentre 1^o részre tessük. Megle-
vén a gyermek az említett módon for-
gatva, úgy fogom a medentret, hogy
a ~~sz~~ hár hüvelybe a kereszt hájra
legyen, a többi nyjál pedig a meden-
tre 1^o részre, és a Crombohon, így
fogvam a pete línél lévő vált
előre, a májilon hátra, az egyik
oldalról a májilon lassu huroga,
hájokhal valógatva lefelé hurog,
és a vállakat úgy fejtém li mint
máshoz, a fő kintse úgy trülsérol
mint fejjebb már említették.

Ha az ábrákat már előre, al-
hos a vállak li fejkeje feléste
reker, ekkor bár munkával az
egyik háját: még is li kell fej-
teni, és most a főt aron oldalra
fordítani, a mely oldalról a váll

h

262.
li szabadítatott, egyike kerülnék
tato, és köröz újat, a hágya hágo
rére, aron adalon vivin eren be
zet: melyen li szabadult a hat, a
máshat pedig ar ábrátra kérem,
és egy forgatón a főt aron odátra,
a melyen li szabadult a hat, hogy
ar ábrátra hát felé forduljon, és
így arutan meg sületet het a fő.

Mikor a harok ar ábrátra
előtt: előre álván, és keresztbe-
vagyval, akkor fordítani nem le-
het a fejt, sületéges pedig leg-
előbb a harokat li szabadítani,
még pedig art, a mely a májikon
fekszik, arutan a vízre mara-
dottat, és eren után forgatván hát-
ra ar ábrátra, meg sületet het a fő.

Az Vállak meg sületés után,
ha vagy a medence sület volna, vagy
a fő nagysága miatt, a fő meg nem

263.
sületet, és kiérrel sem lehet li venni,
ilyenkor javasolják, legfőbb a sület
fogot, de a forrás; és úgy, lier sület
sületemé teszi a sület fogot. Mert
1st neher itt ilyen állásba li vinni
a sület fogot. 2st nem lehet a főre
alkalmaztatni a fogot, mint hogy
a fő alajja nére: a sület felé. 3st
Ha a sület fogot réa is alkalmaztat-
tyuk, nem lehetünk egyebet a hu-
dánál, a mi elég telen. 4st A sület
fogo szeri gyakran ar anyag is. De
eröl a fő rendszeren nagyságánál li-
ren dro.

Ha a fő: a medencebe mara-
na, a sület abatt, a törvölől el-
választatott: volna, emek mindig
a sület ar oka, arert art kerülni
is lehet, ha esmeri a sület mecha-
nizmusát, és így illendő: nem felotte-
eröl alkalmaztatni, de ha éppen a
fő meg is hátra maradt volna, és

264.
hivatunk, silyenkor virsgalmi lell a
nadrát, a mely vagy görögön van öp-
ve hurva, vagy a fő a leg nagyobb
mesterekkel áll a ferdé mestekbe,
midőn a mők strája van görögön
örve hurva, keresztül a görögök
igy ha meg kütes, art távortassuk,
ha irgatos, akkor Antiphlogistica van
nyunk vele. Ha Histericus a dremely, ak-
kor görög ellenest adjunk, ha a belek kí-
tatalan, aga ar ok, ert távortassuk, mi-
dön a görög engedven a fő kömnyen g rütelük.

A 2^{ik} esetbe segyünk vends, állásba
a főt, is arusan ar egyik herünkujjät
a strájába, a masikat ar öreg hiba ka-
gyüli; ha kerrrel nem bírjuk, stül fö-
göt ajánlanak, de er helyett jobb a be-
gyes ephör, vagy is furo.

A láb stüléjalmel ar 1^{ik} idörra
kaszban gyakrabban; a 2^{ik} idörra
is a termézet visri véghez, arert ha aka-
dajst talatunk, keresztül fel a vepradelem
oktat, is ert kühö is belseö Mesekkel igye-
k.

265.
kezünk el távortatni, vagy leg alabb a
köröthekert, midőn gyakran ar ok el tá-
vortatásival meg stüen, vagy leg alab
gyengülven a vepradelem, a stülest a
termézet visri véghez, p o. a köd öh kö-
nos elö ezejitel, vagy nak ugyan ajatel,
a hol minden faradt, igunk a vepradelem
el távortatásira kasztalan. p o. ha a
mők lejény nagy reje el vált volna,
illyenkor stüléig mentöl elabb a segit-
kig, tehát gyakran ar 1^{ik} is, 2^{ik} idörra
kaszba vepradelem nélkül körténük,
sőt a 3^{ik} idö strahap is eger a váltak
stüléig, magya stüléig vepradelem nél-
kül, de most ajánl is be, vagy a köd,
dök kvinor nyomása, vagy a stül faj,
dalmati csak igen kis, my ak, vagy is
fen rinyonak. Stüléig tehát a láb
stüléig 3^{ik} is 4^{ik} rejeit a mesterség
alsal véghez vinni, arert a láb stü-
lönél toha sem lehet bironyon
mondani, hogy a stülest a termézet
visri véghez, de mesterséget csak alol
alhalmartassunk, midőn a termézet

266.
mag kívülről munkálkodni. Ellenkezőleg
pedig, ha a mestersegés kívülről alatt mu-
tatta volna magát a terméket, min-
gyárt ere kívülről binni a kívülről.

Ha a tőrd kívülről a mestersegés al-
tal jelentetik, akkor vigyázzni kell,
morgok e meg a tőrdet, le jöjjék e
már a medentre üregébe, magojan
van e, vagy már méven állanak, ha
a tőrdet meg morgok, és magojan
állanak, akkor a tőrd kívülről láb
-kívülről kell csinálni, azt a keret
veresven be az orvos a kívülről részé-
be, a mely kéretek tenyere a gyet,
melnek háza felé néz, a mag két-
tel a tőrdit a háza felfelé nyomon,
és így kerülnébe jöven a láb, erőtli
kurrul, és erután a mázihat. — Ha
pedig az 1^o tőrd le kurrasa alatt a
Cromboli igen le ereptheadmenek, a
medentre nyílásába, akkor a vész-
ta maradott lábat, már nem le-
het le kerülni, és így fél láb, fél tőrd

267.
kívülről tartani. — Ha pedig a tőrd al-
már a medentre üregébe lent, és me-
róen állanak, többé láb állást kerülni
nem lehet, és kurrul a kívülről, ak-
kor a tőrdet kívülről ki kerülni, úgy
hogy jobb kerülni mutatott újat aron
tőrd hajlasba tőrdet, mely hátra fe-
lé néz, a bal kerülni mutatott újat pedig
abba a tőrd hajlasba, mely legintább
előre néz, és most fogatvan erchet
leg elébe is a hátsó tőrdet emeljék
ki a gáton, és erután az 1^o tőrd. Működ-
a tőrd kívülről után a többi részt
szinte úgy kívülről, mint a láb kívülről.

Ha a far kívülről van kívülről
seg a mestersegre, szinte meg kell
tekinteni, hogy magojan van e meg
a far, és morgok e, ilyenkor a far áll-
ból láb állást csinálni, aron kerülni
ket tőrdet be, melnek tenyere a
gyermek háza felé néz, és a farat a há-
za felé lévő oldalára a gyermeknek
fel emelni, ererután a lábhat ki kerülni

268.
ni, és úgy születik arusan mint a láb
születésénél, ha pedig a far már le eszt
kedett volna, és merőn állana, akkor
veszedelem, lenne a farat fel emelni,
és a lábakat le horni, hanem akkor
far születés lezr, úgy hogy egyik kezünk
mutató ujját, a gyermek egyik oldalán,
lán, a Cromb hajlásba, a másik ke-
zünkkel a mutató ujjakat a másik olda-
li Cromb hajlásba visszük, és így aron
fart, mely előbre néz, ért előre, és le-
felé forgatjuk, midőn a születés imit
ar előbbi tételt lezest meggyon arusan.

A gyermek néha úgy áll a méh
anyában, hogy feje, hogy a méhke-
jába, fava a méh fenekébe, de a fő
nem áll a vereső lincába, hanem egy-
gyik vagy másik oldalán a Gipsz Con-
talon fekszik; ez a fő ferde állá-
sánál nevertetik, úgy szinte tör-
sénket: az hogy a fő a méh fenekében
van, a far a méh szájába, de szinte
nem a vereső lincába, hanem a Gipsz
Cv.

269.
Contalon fel felé fekszik. Ez Far ferde
állásánál nevertetik, ezen születés ter-
mészetes, bár nem a legkedvezőbb is al-
lása, de ha a természetes születésre va-
la fel kézelde jelen vagyunk, a születés
a természetes állat vitetik végbe, csak
egyedül ahalmas oldal felvételével,
a fordult réz le ereztetik a méh
szájába, a midőn meg történhet a születés.

Vagyunk hirt a fordult, mint sim-
denkor, szükség, természet, születés
talintik, és azt mondjuk hogy a
méh nyakánál nyomása végzett, aron
ve hurodvan, mindig tovább meggyon fer-
de oldalán, és felfelé, és így a ferde
állásból keszt felvétel lezr, erugyan
igaz, de csak akkor, midőn a születés
hanyatt fekszik, de ar oldal felvétel-
nél, emeli példái nimmenele.

A fő ferde állásánál monda-
tik, ha a far a méh fenekébe, a fő
a méh szájába, de nem a vereső li-
ncába, hanem ar anya egyik, vagy
m

240.
magis oldalaba áll. Itt az 12^o idő szakasza
mindig hosszabb, és fájdalmasabb a szü-
lés, de erős oldal felvétel mellett lecsúsz-
kedvén a fő a többi négyre szülés, a
terméskor által visszatér véghez.

Elmesterei: ha a has nem töltel-
letesen gömbölyű, szélesebb ott hol
a far van, a has nem sütyed oly kö-
kélletesen, a hüvelyes rész magosyan,
és fere áll, a víz halyag nem gömbö-
jű, hamar reped, emek repedése előtt
a főt a bursakába oldalra esik herni,
a meg repedése után pedig a bursaká-
mat, a főt körvesztetlen tapintani
lehet, vagy követésére hogy fájdal-
maz a szülés. A víz halyag hamar re-
pedvén, a szülés hamar, és a haldól
kínos elő eshet. Itt is csak erős oldal
felvétel kell a szüléssel adni, aron
oldalra melyre felvétel, maga a fő
áll a felvétel alatt lecsúszkedni, a
fő midőn arutan a szülés rendezésén
megy tovább a terméskor által.

241.
Itt a szülésnek fordulásánál is
a has egyike oldalaba teresebb, a has
nem oly gömbölyű, nem sütyed oly kö-
kélletesen, a hüvelyes rész magosyan
áll, a víz halyag nem gömbölyű, ha-
rón reped. - Veszélyes szünet mindkét
a fő fordulásánál, és a far meg oldal-
lag terjedvén kereszt felvételkor,
vagy hamar lesz a szülés, a víz halyag
repedése végzett, a haldól kínos
elő eshet. - Itt is csak erős oldal
dalt felvétel kell a szüléssel, megpe-
dig szünet aron oldalra, melyre a far
fordul, és így szünet meg szünetket,
a far lecsúszkedvén. - Ha pedig az
12^o idő szakasza a terhesség éppen a
far fordulás mellett járt volna,
vagy hanyatt fekvést volna, akkor
kereszt felvétel képez a fordulást.

Rendetlen Mesterséges Szüléskor.

A szülés rendetlen mesterséges a
gyermek felvétele felvételéből, midőn a

gyermek úgy felelték leírta be, hogy a
feje a méh egyik oldalába, a far, és
lába a másik oldalába, és vagy háta,
vagy háta a méh hájába, az az a
törzshöz valamely része.

Alhat pedig leírta felelt be,
úgy hogy a gyermek vállá, és feje hát
ra fele, a far és lábak előre fele, a
ferde áll mérebe, és így a másik
oldalán, vagy a fő, és vállak előre,
a far és lábak hátra fele, a ferde
mértékbe, és így a másik oldalán,
vagy éppen, a leírta mértékbe fele,
írta, és feleket pedig meg állt mely
részre is a törzshöz a méh hájába.
- Ezen írásról gondolok, mert nem
hoppas. Mesteryes: mert a forma,
írta nem bír vele.

Elmértetői: a írás aron la,
for, és oldalán dombon, a melyek egy
gyilk a fő, a másik a lábakat fe,
írta, a domborodás ok néha éppen egy
más ellenében, vagy nah, más kor egy
7

gyilk fejjel a töltőhöz hozzába ímet,
a gyermek morgás alatt írta fele, a
háza soka nem írted, a méh a ha,
sok nem nyomja a köröpen körve,
feleltél, hanem oldalán a hüvely,
írta a méh hájával magosan áll,
a méh hájára lappan írted, és ha,
írta hoppas nyilat formál, a
vir hollyag más hoppas, más lappas,
nem göm bolyú, a vir hátya a korán
írta, gyilkon, sok vir foly el,
melynek folyását a gyermek fele,
vase nem gátolja, a gyermekre
magosan áll, nem olyan mint a
fő, és sem olyan mint a far, a méh
hüvely fele leírta van írted. Ha je,
írta meg írted volna a vir hollyag, akkor
lehet, az tudni, mely írted áll a méh háj
jába, és a far, vagy fő a méh oldalán vagy
nah, ilyenkor ha egy újal nem világosi,
tatunk fele, 2.3.4. újat is háznalunk,
a írta meg esmérésére, az anatomiat háje,
nalyuk, ha pedig a írta ön magabol nem
2

emésjűk, a szomszéd répreltál igyekertűnk
meg emérni, ar egges réprek emérteső je
leis le irni, hártalan mert a srűlő alatt
meg dagad van ereli, srinse nem fogjuk emérni.

Atk oha hogy mi lehet a heréret felvűs,
neh meg eddig bíronytalan, mint hogy má
felvűsűk aliat sem tudjuk meg, de ha su
nánk is, mit tehatunk a teskes, eg alatt
a gyermek felvűsűre nérvű, meg elű.
srűnk avat ha a heréret felvűsűre havi
rűk emértesűnk.

Atk ily felvűsű veszedelone igen nagy,
a teskes, eg utolsó 3^{um} hotnappárba, ha
vagy Meskorvűsű, befolgás, vagy a tes
műret a heréret felvűsűt hozza, ra nem
fordittya, mind ar asrony, mind a gyűs
meh meg hal, is csak ott vagy valvűsű,
ha eszűk, hol igen bű medentreműl
lett igen hitűsűy lenne a gyermek, eh
kor a gyermek halálával, ar amya
nagy kárával meg srűlűkhet ugyan, rű
ha a gyermek. — De eron srűsűntűsűt
len felvűsűt sűbnyűre a teskes, eg igűsű
srűk, a teskes, eg vűge felű meg fordű.

tani, ar pedig máshor a hűr fogas al
tal is tűrtűnk, a midűn a műk srűjű
ba lűvű répr helyett, ide vagy a fű, vagy
a láb fordittatik, is igű kűsfűle a tes
rűret felvűsű fordittya. — Ha ar orvű
katalmában van, mindűg a fűt fordűt
tűa a műk srűjűba, mert ar bűt rendűt
tan is, mindűg műs is hűmgyűbb ar amya
ra, is nem ott veszedelme, a gyermekre né
rű is, arűt a rűgűk gűt fűre fordűtűt
tűk. — Nem emérvűn a lábba fordűtűt
de művel a fűre fordűtűsűra mindűg hű
rony, fel kűtelűk hűvűntatnűk, mel
tűk nűtűkűk lekűsűtűlen a fűre valű
fordűtűsű, arűt utűbb a láb fordűtűt
kűrdűtűk, is eggedűk ertűt őrűkű, tűb
ertűndűkű, most műs igűműt hűrdűk
a fűre valű fordűtűsű, ott hol ar ara
hűvűntatű fel kűtelűk jűten vagy nat,
műshor lábba fordűtűsűjűk.

Lábba valű fordűtűsű, alatt ertűsű
dűk, aron műnha kűtel, műhűrűt a gyűs
meh heréret, vagy má hűrű, rű felvűsűbűl
is, mint far, vagy fű felvűsűbűl láb fel

276.
vost. Cvinatunli. — Ezen operatio salim
mindenek hőrött a leg nagyobb figyel
met híván.

Telentetili a labra valo fordítás,
a kereszt felvénit a gyermeknek,
a gyermek természet, vagy kopras
felvénit is, mitov a kereszt, vagy
krüles alatt oly vejedelmey jelenés,
geh jömelé elö, a melyek a gyerme
ket meg öli, ha a krüles a természet
re bíratik. így po. a kötölközés
elö esze, vagy midön a betegség,
gyengeség miatt ar anya nem bírja
hí hajtani a gyermeket. Ilyen a
mék gyuladás, mék görse. mék vir
korvág, köhögés, golyva, has virkor
vág, has krükorvág, ar altest bigam
mai hemenyedése, is más altest béli
bajok, melyek veget a kereszt örvenem
hurodhat, gyengeség sérés, a mék leger
hova el vátajánat, ha a mék krüjator
hőrrel ragad.

277.
30 Telentetili a kettős keresztjénél,
nel, akkor midön egyikenek a labra,
májonak a feje jön a skülo repret
be, is egykerek ket vir halyag, is ket
egykeri ropediz körténik, is így egy,
kerek a medentrebe eseptheden,
is be eseptheden, skimta egyike a
májk krülesét nem enged, ilyen
kor a vir halyagok ropedize után,
krüleses aron gyermeket a mely fö
vel alk a mék krüjába, labra for
ditani, minel elötte a májk.
egyikre le eseptheden a mék krü
jába, hogy így legelőjör is az i
mely labra áll más meg krülesesem.

Hogy a gyermeket labra lej
jen, is kereszt fordítani, hívánta
tili 100 hogy a medentre, ha nem is
igen bö, de még is oly nagy legyen,
hogy rajta a fö keresztül mekessen,
ar ar hogy a medentre ürege legyen

278.
leg alább, 4. hüvelyknyi átmérőjében.
- Ha szélesebb a medentre, más hár-
fogás szélessége lesz. - 2^o Hogy a
gyermek érettségén, vagy legalább
készen ar érettségén, mert a terhés-
ség 1^o 6. hónapjában oly hirtelen meg a
gyermek, hogy kereszt felvételében is hi-
het, úgy szinte ha vérszáraz agya-
magat elő fővel, vagy farral is ki lehet
hözni, amélkül hogy fordítás, leme-
szélessége, ar azt csak a 7^o hónapot
kerülve szélessége a fordítás. - 3^o Hogy
a fő, vagy far meg ne ályon a medentre
üregében, is meg morgo legyen, mert ha
más nem morgo ar említeni réz, ah-
kor a fordítás háson ar anyára, a gyer-
mekre vérszáraz: elate tekintet-
ben, ar tehát kopras fő, 6 far felvétel-
ben.
4^o Hogy a gyermek fordítása hivi-
tatik: vérszáraz tünemény végett, ah-
kor használnak. 1^o a jó tanácsot, gyogy-
szert, is más hár fogászat, is ha eset-
ben használnak, akkor felszólal, a fordí-
tás, is csak ellenkerőbe szabad a fordí-
tás.

279.
tást semmi. így p. o. ha a hőtől a szőre arat,
ar azt vizira semmi így elszűnik, is ha díz-
lik, nem lesz szélessége a fordítás.
6^o Hogy a kereszt felvétel meg-
györöggyint, mert ha csak ferdén áll
a gyermek, akkor más hár fogás lesz
szélessége. - 7^o Lábra való fordításnál,
mint hogy ar néha lömgyü, néha ne-
hár, néha a gyermekre, is anyára a ve-
rszáraz lehet.

1^o Lábra való fordítás ar anyá-
ra nére lömgyü, a szélessége nére nem
nehár, a gyermekre nem vérszáraz,
mikor minden beteg, ah jelen léte-
nélkül, egyedül csak a kereszt fel-
vételre a jelentést, is ar anyára me-
dentről elgedendő fő, is jó alho-
su. 2^o Ha a szélessége ar 1^o idő szab-
ban van, a vir meg nem folyt el mind,
is a méh szájja más tagul, vagy leg-
fejebb ha a szélessége a 2^o idő szab-
ban van kerdesében vagy on. - 3^o
Ha meg úgy ellen hár fogás, ah nem tö-
kénthet. - 4^o Ha a lábai a gyermek,

280
nelk hárrelébb állanah a méh skájához,
mint a fő, mentál távolabb áll a láb
a méh skájától, amial veředelmébb
a skülés, és fordítás. — 5^o Hogy ha a
melle a gyermeknél: és háza felfelé
vagy hátra áll.

Ezekkel elentheró esetekben
veředelmébb, és kékrebb leyr a for-
ditás, így ha kereszt felvél mellett
betegség is vagy on jelen, ha rosz a
medentre alkotás, ha léjön hiva-
tik a skülés, ha a gyermek igen
nagy, vagy halva van, ha a fő kö-
zelebb áll a méh skájához, vagy
beme, ha a gyermek háza, vagy
melle előre, vagy lefelé áll, ha úgy-
ten léri fogás ok történtek.

Prognosis. Bár kedverök is a
hőnyülmények, a gyermek életéről,
bíronyost ne állítsunk, mert jó sok
szor a skülés alatt veředelmébb
lenség elő advan magát, meg ötheti
a gyermeket; — 2^o Hogy a gyermek

281.
téröl soha sem lehetünk bíronyostok.
— 3^o Hogy a lábra való fordításra:
láb skülés követkevény, a mi mindig
veředelmébb, arert semmi hőnyülmé-
nyek kövött a gyermek életéről bíro-
nyost ne mondgyunk.

At amnyara néve: ha kedverő
hőnyülmények vagy nál jelen, akkor
nem veředelmébb a lábra fordítás,
ha pedig betegség van jelen, akkor
a betegség természetéket leprühájóvondóit

At lábra fordításnál skülés és
követkevény elvondoloi. 1^o
skülés a kére skülés apronyt meg
egy rész meg virsgáln, hogy így a
fő, és far jelen létéről, mely elő ad,
ba vagy nál, a ház, vagy hát áll elő-
re a medentre, és a légy skülés tá-
rsak alaposság is skülés tudni.

— 2^o Hogy meg kell határozni hogy
mely kérel fog vigbe memmi hőny-
nyelben a fordítás, és hol kért

282.
veretni, ha a gyermek lába ar anyja
jobb oldalához körrelit inkább, mint
a bal oldalához, akkor bal körrelit se-
rűlt a fordítást, ellenkező állásba
jobb körrel. — Vagyvala felvétel
melyek ahát melyik kereszt is engé,
dít hátrálni, vagy vagyvala kör-
lapok melyek soha sem nérik a
kerest, bár néha még is sérűlt. —
Mikor a gyermek vagy felvétel, hogy
melle, is háza ar anyja hát gerin-
krét néri, vagy felfelé áll, akkor
kerűntet mindig a kereszt csontja
sűlére felé erejtűlt fel, még pedig
bal kerűntet, ar anyja jobb kereszt
csip icsűlére felé, jobb kerűntet a
bal kereszt csip icsűlére felé.

Ha pedig a mell előre áll, ak-
kor kerűntet a tojás lili felé, is je-
dig jobb kerűntet, a bal tojás lili felé,
bal kerűntet pedig a jobb tojás lili felé,
verestűlt fel. — 30^o sérűlt oly o-
ly

283.
lat melyek a fordítást nekerembe; vagy
fajdalmasabbá seprük, el távoztatni,
mint a sérűlt is, virelletet li üresíteni,
a sérűlt seprük icsűlére segit lecsi,
lajisani, ha igen hátról, higja,
gohat bele fethenderni. 4^o felvét
adni a sérűlőnek, mi a kereszt agy-
gyat elűnt; er már mást le van írva.
5^o ar operátor terdeire erejtűlt
a sérűlt aprony lábai körre, a sérű-
lő maga hőmyen tahastatik. 6^o
ha alkalmas ember van a segittje,
se, egyet fejéke aláunt, hogy
er vállait tartja, a máshat a másh
lábához állissyuk, hogy arhat tar-
tati, is egyet hogy a sérűlt ereket
kerker stalgáltassa. 7^o sérűlt
a leg alkalmasabb időt a fordí-
tásra választani, ere nére min,
denkor vagyűlt felintembe a je-
lentet, ha kereszt felvétel által

f

284.
jelentetile, a labra fordítás, akkor vá-
laszruh ar 1^o idő skakasz végén, mi-
dön a méh strájja már tagul, avir
holvagy a repedésre léje, vagy már
meg is repedt, és az aprony herdmás
az erőtlődésre kényszerített ni, ha
veszedelemes jeleket sejtik strükse-
gezzé a fordítást, akkor strükse-
gromat mihejt láttuk hogy ar
anya, vagy a gyermek veszedelem-
be forognak, és sem hűtő, sem bel-
ső strükse nem karnálnak.

Midön hestő gyermeknél
jelentetile a labra fordítás, akkor
strükse-gezzé memél előbb a fövel ál-
lo gyermekot labra fordítani. —
Az alkalmas idő választás igen
nagy fontosságú a labra fordításnál.

Ha er igy el kéven rendelve, a
strükse ar agyba alkalmasatattya, a
labait távolítva; a strükse néjrehalá-
e

285.
edényt a fel-fogására a nedvvelé, egy
felvétel, vagy ruhát: melyre az ope-
rator terdelhesen, ne hogy uirba len-
tesen terdelni. Ha tudjuk a fel-
vét, akkor már ugy feltettük, és
aron kézzel herdogyüle a fordítást,
mely a Crébra leg alkalmasabb,
a heret meg melegítjük, a hátat
kivádkhat meg keményül, huz for-
mára idomítjuk, és ugy vizsgál-
bá, hogy a huz újunt a hőröz huz
felé, egyeb újant a stremerem
is felé merrenel. — A méh hű-
vel strájja meg hatad van, for-
go mozgásban kerünk hátat a he-
rept gyont huz vajúlaja felé for-
ditjuk. Ha a méh strájja tagit-
va nincs, ezt tagítsuk, arután
a uir holvagyat, ha nincs repedve
eszt repesztjük, de nem mind en-
hor a méh strájába, igy ha van
k

hely: mennyünk a méh üregébe, és helyet
 ünk fel a lábukat, és ereket elöven,
 furjuli által rendszeren a víz holtágos is,
 így mindig a lábuknál fejrünk, deha
 a méh erősen árva hurodosz, a víz
 holtág fejrült, ilyenkor a méh straja
 ba repertyül: ezt megint, úgy repert
 tyül: hogy hüvelyd, és hősztő ujjal
 meg fogván, rántva, a strül fájdal
 mak alatt meg repertyül. Majd egy
 ujjal struját által a strül fájdalmak
 alatt, de ezen új gyakorta tovább hat,
 és a főt érvén, helyhertetéséből hi moz
 ditva, meg lévén a víz holtág repert
 ve, kerünk a méhbe vízre a lá
 bokhoz, úgy hogy kerünk csak oly
 pilantatolba csurtag, uh fel a méh
 be, midőn a strül fájdalmak nintse,
 nek jelen, a strül fájdalmak alatt
 nyugottan: aron helybe hagyjuk hol
 a fájdalmak érték, ne hogy a méhet
 meg repertyül, vagy sértjük. — 2^o Ha

strül ar ut, a hol fel kell érn, ott elebb
 kerünk ujával csinalunk utat, és emel
 helye léven arutan csurtag, uh csak
 utamok tenyerünk, ar elő karval. —
 3^o Hogy kerünk tenyere mindig a
 gyermek, háta pedig a méhet nérsz.
 — 4^o Hogy kerünk mindig a gyet,
 mel oldalán csurtag, uh fel. — 5^o
 Hogy ujjaink mindig a fojás hátul,
 nyába belől legyenek. — 6^o Hogy a
 kerünk fel csurtag, uh a hörben vi
 gyarrunk hogy a ködölöt ne sértjük,
 ne nyomjuk a gyermek háját, mel
 let, ábrarattját, és a méh lapint.
 — 7^o Hogy kerünk legyen, nempe
 dig szelvedve veressük. — 8^o Ha a
 lábukat elértük akarjuk, nérsük
 hogy keskeny, vagy széles nérs van
 és a méh strajába, ha széles, ak
 kor mint a méh strajából el kell tá
 vortatni, hogy a hár bé fej keskeny a
 méhbe, ha keskeny ar előt álló nérs,
 a

288
akkor nem trüviség, némelyek a bré-
les előtt állo réjrt tovább emelni ja,
vajjal, egész hűrrrel, de ha a méh
örve van hurodva, akkor er nem le-
het, ha a vállat vagy nat le nyomat-
va a méh strájába, úgy hogy hűrről
utat nem engednek, trüviség tehát or-
tes el távoztatni, úgy hogy ha ha-
tul veretom be a kereszt, a mutató
és bit ujjal, a gyermek teste hátra
vinnere, mely a kereszt gont feléül,
a hüvelyket pedig előre, és midőn a
hátsó ujakkal hátra és lefelé, a
hüvelyket előre és felfelé igazítom,
nám er által a lábak, a méh fel-
ső nyílásához hűrrelobb esnek, és
a has ar ábráráttal hát felé fogom,
a mi szinte igen nagy nyereség, meg
nyerve lévén a tér, a hűrről a for-
ditás, szinte úgy történik mint már
sott májutt iratott, és így a lábak
fordításával a kereszt felé, ^{de}

289
sra lett, most némelyek a lábak trüvisé-
g után, némelyek erőszakosan hűrről
li a gyermeket, és gyakran a méhet re-
pejtik, a gyermek halálát okozták,
de trüviség a lábak meg trüviség után,
ha a termézetes trüviségre való fel-
fételék jelen vagy nat, akkor a ter-
mézetre bűrrül, és csak ellenherő-
be fejtü üli a gyermeket, a mestor-
ség, láb trüviség szerint.

Vagy nat esetek hol az eren hű-
rönység, rend szabás, akon hűvül meg
némely hűlönözök és trüviség, el, néha
a lábak fordítás, nál történt, hogy ha
a fordítás későbbén történik mi után
a gyermek víz el folyik, és a méh an-
nya már erősen örve hurodott, il-
lyenkor ha mind a 2^{ik} lábat, vagy
el nem erjűk, vagy el erven, és meg
nem fohhatyul, ilyenkor ha lehet-
tyéges a felső lábat fogjuk, vagy ha
er nem lehető, a másikat, és ezt hű-
rül le a méh strájába, és hurok pant
li

290.
Lilát vetünk rá, hogy ujoman vízre ne
csusszon, arután aron herünkét melfelé.
a li horost láb ujai nárnel, a mébbe víz
szűk, és li horruk a másik lábat is, deha
már a gyermek medentrije, az Anya me-
dentréjébe eserkedett, ilyenkor ugré-
delmes a fordítása a vízre maradt
lábnak, és ilyenkor el hagyjuk a vízre
maradt lábat, és a Csipőket szaba-
dítottuk, a melyekkel li jön a vízre-
maradt láb is. — 20^a Ha ar abo vég-
tagok a térdbe meg vagy nál hájtva,
de a Csombok nem felszerek a hára-
egyen, ar al szar pedig a Csombok
ho szinén felszik, ilyenkor a herünkét
a gyermek egyide Csombját a hára-
szittuk, és ugré le horruk a lábat, aru-
tán a másik lábat is így. — Nem lehet
pedig itt a le álló lábat, egyenesen fel-
húzni, mert ilyenkor a nem lehet, vagy
a gyermek végei fiktamodnak. — 21^a He-
ha a gyermek lábai egymáson herépt
be felszerek, akár legyenek a láb-
sz

291.
rak a hason li nyugtva, akár a Csomb hat,
ho szinén heverjenek, ilyenkor szűk
hogy a lábak egymáshoz hárkeltet, enek,
ugy hogy ar ujjak a 2^o lábtól egy má-
mellét heverjenek; De ha eszt nem te-
hetünk, vagy el nem eszünk, vagy a méh-
örve hurodása nem enged, ilyenkor
ha csak lehet, arst horruk li, a mel-
lyik a máshon felszik. — 4^a A herépt
fel szinél néha a víz hólyag repedése
után a gyermek hája, vagy a méh-
szájába, vagy a szűk külső réstől kö-
rött van, ilyenkor soha se igyekezzünk
vízre temni a gyermek háját, mert
ar a gyermek fel véreit aruja el, ugry
hogy a more a hüvelyk áll, ott a főre
okodunk, a melyre a li u van ott a
lábak vagy nál, ilyenkor a meg szűk-
kett hore pántlikát kötünk, és aron
kerünkét, a melynek szegere a gyer-
mek szegerevel meg fel, fel meggyünk
hátul előre emelve a főtörököt, és
fel horruk a lábat, és erakot le-
f

292.
fordítván, a két felfelé fog menni, és mi-
gön a lábale már a születő reptel körüli
ki is jöttel, mint ilyenkor a jantlikán
lévő hasokat ugy hurrul, hogy azok a
törvöl mellett marad gyanak, és aru-
tán ugy születik mint maghoz. — 6^o
Ha a gyermek hasa lefelé, és a háta
fel felé, és mind a két kere, és mind a
két lába a méh szája van, ilyen-
kor a labokat keresztül fel, et va,
laprtván öket a kérésül, és a labá-
kat le hurrul, a midőn a törvöl,
két felfelé emelül, ugy hogy
nyjunhat hurrul a labákat, a ha-
dad hüvelyket pedig a törvölöt fel-
felé emelül. Amelyek a kérés-
késül és kérésül, és egyike kérésül hur-
rul a labákat, a másikkal emelül a
törvölöt, de ezen módon jobb ar 1^o,
mert ezen utolgo vol kért kíván. — 6^o
ha a gyermek előre lévén gördítve,
a has a méh szája van, a labá-
kat pedig a far felé, ilyenkor a születő

293.
két, és veszedelmes a köldök kénos végét,
ilyenkor kerünel be minden a cipőt
fere emelül valamennyire, és a labát
kérésül meg hájyul a hasra, és így le-
hurrul a másik labát is. Et ki kérés-
körül pedig aron labát hurrul in-
kább, a mely a tojás likánál van, hogy
a has hátra fordíjon. — 7^o Ha a
gyermek hasa is, melle előre néz, il-
lyenkor ar irvája fáján kell hiva-
retni a kérésül. — De a gyermek
oldal kérésül: a mely előre áll art há-
ra mordítani, ugy hogy a melle is ol-
dal kérés ar amyanál lefelé men-
nyen, és erután elővén a labákat,
art hurrul jobban, a mely előre áll,
hogy a has lefelé fordíjon, és hogy a
születő aron oldalra fektetül, a mel-
lyre a far áll. — 8^o Kés a köldök
kénos epül előre, ilyenkor a köldök
kénos a medentre kátyo kérsül
iparhadjuntul temi, arután a fordítást

a körönvées, regulálá szerént tegyünk,
 csak hogy a kötőle kősinort kerüjük,
 és a prognoszt a gyermek életé vé-
 gett, vagy árva mondjuk. — 2^o A
 ha veszedelmes jelenjéek miatta
 fő állást is lábra kell fordítani.
 De ez csak akkor történhet, a mi,
 jön meg a fő merően nem áll, ilyen-
 kor a főt levejje aron oldalra -
 nyomjuk a melyre a nyakavan, aratán
 megyünk a méhbe fejjebb a lábakkor, és
 erchéet fel keresvén, lehorruk, de most
 a fő állásból kereset állás lett, úgy hogy
 a medentre be menetelenek egyike két-
 len a vállak, a másikon a cipőle támasz-
 kodnak, ilyenkor némelyek javasolják hogy
 a lábra hurol pántlikát tegyünk, és on-
 nel fogva tartván, és hurván lefelé, ah-
 kor midőn a másik kerüünk a főt felső-
 le emeljük, de ez is sültvées nagy-
 zomnyal meg fogván a szabadon maro-
 dott huvelykel a főt felfelé emeljük.

aron idő körben a melyben a zomnyal a
 lábakat lefelé hurruk.

Meg történvén a fordítás, akas a
 körönvées, akas a hülönös regulálá sze-
 rént, meg virszalyuk jelen vagy naké
 a természetes sültvées hivántato felté-
 telek, ha jelen vagy naké, akkor a termé-
 szetre börtök, ellenkerőbe pedig mestersé-
 ges használatuk.

A főre való fordítás az a midőn
 a kereset felvételből fő felvétel kíván-
 lunk, ha érem fordításra a sültvées
 fel tetelék jelen vagy naké, ekkor ez
 kívánatosabb mint a lábra való fordí-
 tás. — Történhet csak némely esetek-
 be a főre való fordítás, így ha a fő
 körrelebb áll a méh striffákot, mint
 a lábok, így a váll, nyak, hátgerinc
 felső, és a mell felső része felvétel-
 nel. — De ezek mellett is kíván-
 sák, hogy semmi veszedelem ne lé-
 gyen jelen, a mely a gyermek gyor-
 ti fejtesét kívánja. — 2^o Hogy

a Skülesz jöhöz legyen meg hívva, és a Skülest hogy az 1^{ik} Döskatarba, vagy leg alább a 2^{ik} Dö skatara berdesébe üje, hogy a gyermek vir: vagy egészen jelen legyen, vagy leg alább nagyobb része.

— 3^{or} Hogy a gyermek rendliül négy ne legyen. — 4^{or} Hogy a medentse jobő legyen. De ezen fel tetelék ritkán jönnék mind elő, azért ritkább ezen fordítás, és gyakoribb a láb fordítás.

A kézzületék a láb fordításánál meg egy gyermek mindenbe. — 5^{or} Dítaj ugy történi, hogy a Skülot kérezt agyba fektetvén, és azon kerüket veresszük be, a mely a fordításra leg alkalmasabb, így ha a gyermek feje az anya jobb oldalába van, akkor bal kerüket vesszük be, az elöl álló kérezt fere mordítani, a fara felé, erustanfere jobb menven, fektesszük a főt is, ezt leg san aláfele mordítassuk, hogy a nyak,

297.
Skütyával erejthadjon le a medentse üregébe.

A Sküleszi Esközökröl.

Az esközökröl: melyekkel elünk a Skülesz végbe vitelére. 2^{ik} felet, rejtint olyanok melyekkel sem az anyának, sem a gyermeknek nem ártunk, rejtint pedig olyanok melyek mind a kettőnek ártanak, né, melyek olyanok melyekkel mind a kettőnek életet kárthatyunk meg, rejtint olyanok a melyekkel csak az egyik életet kárthatyunk ki.

A Régi időkben midőn még sem a Mechanizmust, sem a Dinamizmust nem esmerték a Skülesznel, és a Skülesz leg inkább a Darátokhoz képe volt, igen sokféle esközökkel éltek, mint furo, emelő, s. t.

Az oly esköz a mely egyiket sem sérti, a Skülfago, a mely a kért a gyermeknek legabbis, az a furo, és vagynak melyekkel új Skülot utatt

Ésmálunk, vagy a jelen létét tagíttjuk.

+ A' Stül fogó alatt értünk egy lét
 vas Karabok átló fogot, melyekkel a
 medentre üregébe lévő gyermeket meg
 fogjuk és a mint egy vas karokkal tu
 karruk; a' Stül fogonak 2^{es} kara van,
 minden karon 3^{on} a répr. 1^{es} a kanál,
 a mely a gyermek fejére jön. 2^{es} az
 aljo répre, vagy marholat a melyet
 a Stülök fog. 3^{es} a keső körött lé
 vő répr, a hol ti. egyezülnek a fo
 go karjai, vagy kapos, vagy lakat.

Hogy a' Stül fogó alkalmas legyen
 a' gyermek li korára stültség, 1^{es}
 Hogy jó arólbul képrűjön. 2^{es} Hogy
 oly korrta legyen hogy általa a me
 dentre bemenetelében lévő főt is
 le lehetjen horni. 3^{es} Elegendő erő
 is legyen, hogy erősen fogni lehet
 sen, ne hogy li csuszanyon a fogot
 répr. 4^{es} Hogy valami li átló éle
 ne legyen, a melyet a' gyermeket vagy
 an

anyát sérti.

+ A' Karalakra nére stültség, k
 üresen legyenek ablak lent, és csak se
 leiken legyen tömöttégel, hogy jól le
 keszen fogni. 2^{es} hogy a' fő stülent lé
 gyonak görbülve. 3^{es} hogy a' medentre
 görbülése is legyen, ar ar a' vasé li
 nére stülent is legyenek. 4^{es} hogy ele
 gendő korrta is legyenek, ar ar a' me
 dentre felső nyílásig lehetjen esni,
 úgy hogy a' marholat a' Stülök répre
 ken kívül maradjon, ar ar 7. Csöl
 legyen, ha korrabb, vagy rövidebb,
 mindig rapr.

+ A' kaposra nére stültség,
 hogy a' kés has egyezítése memél
 könnyebben történheszen. 2^{es} hogy
 még is elegendő bátorságos legyen,
 ugyan arést meg vetendők a' re
 tvert lakatu fogok, vagy a' hol
 ar egyezítésre egyik karrt fel, a'
 másikat le kell horni, ily razzak
 ma

mai időbe a Levret / francia is, Bri-
nighausen / németh fogói, nem job,
leg jobb ar Angol fogó.

A markolat legyen elegendő,
en hopyru, is vartag, hogy meg leho,
sen 2^o herrel is fogni. Vartag lé,
gyen hogy a herbe ne forogjon, ere
nérve guha fával boritattuk a ma,
kolatott; hopyra leg alhatmatorabb
ha 5. 1/2 vagy 6. Crolnyi kosru.

Mi a Boer fogójával ilendő
leg inkább, a mely ar Angol fogó,
csak keveset hopyrabb.

A fogóval hověthető müho
dest seprünk. 1^o Huria által, 2^o
Provia által. 3^o A fö állaza meg
váltortájával. 4^o A "Stülö" répre
irgatasa által, horruk hi a gyot
mellet. — Eren neqy modot min
den Stülejnél ugyan nem hopyrál
lyuk, hanem holegyiket, hol töt
6.

bet, hol mindet a hověnyülmények se
rönt. Így ha Stül fajdalmai ninte,
neh a Stülönél, ilyenkor csak hu
kával mühödünk.

Jelenteteli a Stül fogó által
martatasa. 1^o ha a medentre böse
ge, is a fö nagy sága hovětt oly se
rentetlen arány van, hogy a se,
méret vagy éppen nem, vagy ve
stedelem nélkül hi nem hopyrál,
lya, a Stülö répreből a fö. —
Eren jelentés 2^o répre oprlik, ar
anyara, is gyermeke nére. Az
anyara nére tartozik a Stül
medentre, a nagy hopyra rendet,
ten alhatasa; vagy ha rendes is a
medentre, de üregibe hi növejed,
daganatok által hopyebbíteli,
vagy eggyes Consoli életelenyige mi
att: Stül lepr. Így szinte minden
a medentre: hátulról clore van
oje

302.
örve nyomva, így az ajkai a szék
mirem szontokon bifele ajakosodva,
az az iktelen rozr állásu srülme,
dentre: a gyermek répről, a nagy
fő, viri fő. Ha a varány ok meg
vagy nah szontosodva, vagy a hol
a fő rozr állása van jelen; ezen
esetek mind az 1^o felvisek sas,
tornak, mivel a fő itt: vagy nem
srülteset, vagy vepréd elem nélkül
nem. 2^o ha a medentre bősége,
és a gyermek feje v nagy sága hó
zött jó is az arány, de valami ve
predelmes jelenség adja magát elő,
a mely véget vagy az anya, vagy az
gyermek élete vepréd elembe forog,
az ily jelenség az a hősök Esimor elő
ajja, és így a hősönység, és helybéli
srülési gyengesség, srül faj Dalmah
hármia, ajulások, görvöl, ranga
todrázok, vér folyások, az orbal, vér
kö

303.
köpés, és hányás, mely vér folyás, ok
betegség az a méhbe, a melyet a
faj Dalmah hi dotgorásat feltyáti.
Igy a Tüdő vépr, a Tüdő görör, a Tü
dő gyuladás, mell vörkorság, szív
burok vörkorság, Aneurizma, ok
betegség, melyek srinte a vérept
fel nyomják, ezek 2^o fele lejj gátol
lyák a srülést. 1^o fel fele nyomvan a
vérept, fuladást okoznak, és így a faj
Dalmah hi dotgorásat. 3^o a házfalák
örve hurodását gátolyák, ilyenek a
hásvörkös mirigyek heménye,
Dise, ugy srinte a sésésék is, ezek által
jába veprédalmes tünemények neverted.

13. A régibb hönnyelbe a srül
fogó alkalmazására való jelentésük
jobb an vagnak fel jegyerve, mintha
ujabálba.

Hogy a jelentésükhez képest a
srül fogó jó hárommal lehetjen az
halmarini, nemely fel tételük srülése
g.

304.
gész. 1^o Hogy az 1^o jelentésnél kap-
nos legyen a foga alhatmaraja, hiván
tatiti hogy a szülés a 2^o idő szakasz
kerdetén tud legyen, az az a méhka-
ja tökéletesen ki legyen tagulva, a
vir hólyag vészve, és a gyermek feje
a medentre felső nyílásába: más me-
vően álljon, mert előbb az áll meg-
nem korult a melher, és így belém
illik a fő, többi az által bi-
rodalmat veszi a szülés, de még
sörtesi a szülőt, a gyermek fejét,
szülésig, pedig a kanyar szülésnél
hogy a mell az állon hevesen, és a
nyakvörögya a gyermek kanyarjára
nak nére, a foga marholaty a
hor. — Ezen 1^o felsetel körönsé,
ges, még a 2^o jelentésre is, ha fe-
dig vészveles, jelenig mutatya
magat, az 1^o vagy 2^o idő. Ma-
kasz kerdetibe vagy on, alhoz nem
hadjuk szinte segitseg nélkül,
a

305.
a gyermek, vagy anyát, hanem ilyen,
kor lábra való fordítást seprünk. — 2^o
Hogy a medentre, és fő körött anyi-
tér legyen mind más a fő a meden-
tre nyílásába korult, hogy a szülés-
got sörtes nélkül a főre alhatmarat,
ni, és ki közni is lehet, az anya és
gyermek élete vészveles nélkül, ellen-
keröbe nem szabad alhatmarni a fogot,
hanem más segitseg szülésig, így ha
halva van a gyermek alhoz tüzebe,
titi a fő, ha életben van jobbara a
Csáprár mettes jelentetiti. 3^o Hogy
a szülő aprony leg alább meg hal-
dohlo félben ne legyen, mert nemely
orvos azt mondja, hogy ha hatólik
a szülő, vészveles hatálat, és arutan
szabaditt, uti ki a magratot, ne hogy
a szülő hatálat az operationale ki-
lajdonissáti, és így a szülés birodal-
mát vészveles, de ha az bironyos-
hogy a gyermek még élő, vagy leg
a

306.
alább tessék katalba horkattyuki hi, akkor
szükség a gyermeknek a katalból anyától
is hi horkati, de ha a gyermek katalával
bironyisodunk, akkor ne bántjuk a gyer-
meket a méhbe.

+ Csek tehát a fel tétel a szül-
fogó alkalmasságára, vagy inkább másképp
a contra indicatumai a szül fogónak;
erőből hi tessék.

+ A szül fogó alkalmasságai előtt
szükséges nemelyeket meg el rendelni.
Egyenek 1^o a hőmögés lühö és behö
virsgalást meg tenni, az egészeg te-
kintésébe, és a szülő neme, bajára nör-
ve, a szülő néreket, és evét. — 2^o A fel-
vőjt el lepriseni, eszt keserűt agyon
körténik krinte úgy mint a labra for-
ditásnál. De a keserűt agy nem minden-
kor szükséges, itt néha a hőmögés
agyon felve hagyjuk; keserűt agya
keprük. — 3^o A hol látkyuk hogy a
szülés nehérs lepr. — 4^o Ha bár könny-
nyü lepr is, de a szülés meg a 2^o idő-
re

307.
szakaszban van. Egy más agyát valap-
tunk mihor a gyermek feje más a
2^o idő szakasz végén, vagy a 3^o idő-
szakaszban van, és az operatios könny-
nyü meg tenni. — 3^o Helyhertetés is
szükség. Egy a 2^o idő szakaszba ha-
nyott. fél ültö, fél felvő helyherse-
tést adunk, a 3^o idő szakaszba vir-
erányon: hanyott. — 4^o Az opera-
tor a 2^o idő szakaszba kordel, a 3^o idő-
idő szakaszba alkat is meg, de a 2^o idő-
idő szakaszba a szülő kára nélkül
soha sem. Ha pedig a szülő egyenes
agyon felvőjt, akkor oldalához áll
az operatios. — 5^o Szükség a fő re-
stest katarolni, melyekre a szül-
fogó alkalmasságai fog; Er mindig
a fő keserűt méstébe, vagy teg,
alább ferde méstálbe, úgy hogy
az egyik kanál levegője a nyak-
körté felé, a másik a homlok fe-
lé áll. Úgy jobb ha a 2^o oldal Con-
t

308.
takra lehet a fogot alhalmarni, vagy
szűk pedig a fogokat szűke a meden-
re kereszt, vagy ferde mértékűbe, bár
vagy nah esetek a hol eren szabás, sol
el térünk. — 6^o Egy segéd a főhöz,
és 2^o a lábához, ha egy 4^o is van je-
len, ept a nyugtando szűkegészetre al-
kalmartatni. — 7^o Szűkegész, tekintve
ni hogy nincs e oly betegség jelen a
mely az operatiót neheritene; azért
ha epe, bírtás, vagy virekter, vagy
szűk rekedés volna jelen, ereketlő
úritéjük. Ha a szűk rekedés iré-
kenyebb, gyuladtak, enyhítő boron-
gatásokat teszünk. — 8^o Az opera-
tióra szűkegészeket amah előtte ké-
szítjük el, így a fogot, vagy nah
két egy szűk mind a gyermek fejében,
sebtűsire szolgálati eszközök, mint
furot is képen tartó a szűkegész-
mára, egy ruha, hogy elejébe hűthet-
se

309.
se, és egy pár körölkörö, az anya re-
kre szűke egy 2^o lepedő, és köröl-
körö. — A gyermekre néve szűke ru-
ha polya, éleztő szűke az anyára,
és mind aron képrűletel, melyekkel
a gyermeket a szűk hátaltól vigen-
hívjuk. — 9^o Az operatio idejét
meg határozni, és ha a fő is medentse
körött rajk arány van, mind vepred-
me, jelenig nélkül, ilyenkor ha a
szűkölnek vagy nah ereje, és szűkfaj,
dalmi, és bár a fő lattan, de még is
mördul, és semmi vepredelem nem
mutatja magát: a termékre be-
kül a szűköt, vagy nah két a virekter,
lyag rekedés után a szűk fogot al-
kalmartat 2^o 8. sőt 24. ora elfo-
ta után meg nem szűkhezven a fő,
szűk fogot alhalmarasztunk, de az
időnek órára való határozása elég,
telen, azért ha badgyatt hord semmi
az aprony, a szűk faj dalmi hűthet-
se

310.
neh is gyengébbek, a fő nem mardul,
a nagy trütlő rézre kárárol, és réka
nyel, ilyenkor trütlőleges a trütlő fogot
alkalmartatni, a mi a víz hohyag re,
pedig után egy ora után is törték.
- Ha pedig a fogó alkalmartat vaxe
delmes jelenleg hívamya, így a ködök
és inos élő esze, göstör, ranganodrasok.
st. Ilyenkor trütlőleges arómat fogot alkalmartatni,
mükéjt meg györödiünk a külső
sö is belső részek siteretlen használata
rol, és a trütlő már a 2^{ik} idő szababá
van. - 10^{ik} trütlőleges orog meg gondolni,
hogy mit fogunk jövendőlni a trütlő li me
neteléről; ere hogy jó és igazságos jöven
dölést mondhasunk, ar aprony egészségét,
eséjét, a trütlő rézreit, a trütlő fájdalma,
ar alkalmartott segitséget, a víz hohyag
repedését. - Arézt átkalánosan: a vaxe
delom: mind ar anyara: mind a gyermek
re néve, nem oly vaxedelmes, mint a
láb trütlő, mert itt a fő jön élő felé.
- So lepe a jövendőlés ar anyara, a mi
de

311.
Dön ar orvos jolok hivatik, a trütlő fájdal
mai rendezel, a medentre rendez, is ha
egészes a trütlő, ha a nagy trütlő rézre
de nincs hiba, ha a gyermek víz igen ré,
gen meg el nem ment, ha a gyermek
feje nem igen nagy, nem csontos, is
it, is már a medentre felső nyilat,
ba mint kaptva; Ilyenkor a gyermek
életére néve is kedverőbb a jöven
dölés, ha a trütlő alatt meg áll, de
átalyába a gyermek életére néve igen
vigyárva mondjuk li a jövendőlést,
mert a trütlő alatt is meg halhat,
igen könnyen; Elentörökbe pedig:
is ha vaxedelmes jelenleg is van je
len, olyankor nem lehet, oly jó a jövendőlés.
Mindemel a trütlő fogó alkalmartatni
sára el rendezve lévén, is kezeptágya
felvén a trütlő, a fő meg a meden
tre bi menetelében át, a trütlő pedig
könnyen szakasztatik, a lábai körre
egy edény tetetik, a li folyo nével
fe

fel fogására, lábait a kőalmolyra letetve,
 és tartatva két segédkölt; egy segéd a fejé-
 nél áll, a stülör a felső köntösöt leve-
 li, és eljébe, vagy egy hőtényt, vagy meg-
 hajtott lapátot hőt, és meg melegíti a fo-
 got a test mérsékletéhez meleg vízzel,
 körölyök arutan strávaroa, és a főtörtepi
 a stülör, a stülö lábait körölyt, hogy ar-
 kat maga is elérhesse, le térdel most
 a stülör, és a bal karát vízre leg elb-
 bé, meg fésűven kanalat, úgy simta a
 jobb kar fejét is kőivadékkal, ezen he-
 tet a medentre bal oldalán, arúl vont
 gumója felé oldal, és hátul vagy két-
 vagy 4. ujjal fel veresi, addig a meg-
 éri hogy a herte a nádra strája, és a
 fő körölyt van; Akkor bal karral fog-
 van a foga marsholatott, úgy mint
 arivo tollat, hogy a hüvelyk, és a foga
 belső oldalán, a mekato: és a felső; a
 3. ujj a hüvelyk oldalán heveppen, úgy
 fogja vízre; hogy a marsholat fel-
 felé, a kanál pedig lapelé nére.
 62

bé veresi a kanalat: a jobb kar hirt-
 maradt, hüvelykével igazolva aprt. Ha
 a kanál már a méh strájan belől
 van, bé veresi a marsholatott egészre
 stülö Crombbjára, most a jobb karot
 hi horván, és meg körölyt, és meg fog-
 van ezzel a marsholat végét, úgy hogy
 mind a két herte a foga karján legyen,
 egyt jobban felfelé veresi, és alhat
 marshatya a főre. — Erutan a jobb
 kanalat simta így kell bé vízre,
 de csak akkor kell a kanalatat cruz-
 tatni, a midőn a stülönök simtafá-
 dalma, és hogy a fogot jó magora
 cruztat, ut, hogy a főnek gömbölyü
 répre. a fő leg nagyobb hi vajulaja
 ba éppen, ha ellent állást kanalunk,
 a mi várta: egyt hi egyengetőfűk, és hogy
 a nádra strája a fogaon hüvelyk legyen.
 rajta lévén tehát mind a két karja,
 és már a fogaonál a jobb marsholatott
 a jobbal, a bal pedig a bal karral
 40

314.
fogván, és nérvén a kapcsolatokról jól
vagy nálk e, egymáznál által ellenébe,
ar ar egyike a kereszt, a másik is a ke-
rest, vagy mind a 2^o a ferde mérték-
ben vagy nálk e. Ezenkor a maszkola-
tokat gyengen, és lassan egymáshoz
közelítvén, kapcsolatba kerülnek a fo-
got, végjárva hogy nagy sültö rést
sem hárkibe ne jöjjenek. — Ha a foga-
maszkolatokai miniszerek is aványba egy-
máshoz, akkor nem szabad őket kap-
tolni; így egyike a kereszt, a másik
a ferde mértékbe kapcsolatba lévén, a
maszkolatok szalaggal ált lehet köt-
ni, kívánt oly esetben a hol a sültés is
nagy, a fő hogy a munka kézet alatt
rest ne távorrának. Erután kerülnek
ily rendszabások szerint. — 1^o Hogy
a fő a medentre be menetetelbe van,
akkor lefelé kell hurni. — 2^o Hogy
a be menetetelbe való hurnáshoz, ne csak
egy fogatasson, hogy lefelé forogjon,
de a nyakvált elöre, ar ábrát a hom-
lo.

315.
lökkel pedig hátfelé forogjon. — 3^o Hogy
a hal sült fájdalmak alatt tegyünk a
kurást. — 4^o Ha pedig sült fájdalma
nem lenne, a sültés pedig sürgeső len-
ne, akkor oly idő alatt: a mennyi a sült-
és végbe men: tejjel a hű kereszt.
— 5^o Hogy midőn a medentre hi-
menetetelbe jön a fő, akkor egy-egy-
rezen lefelé kerülnek. — 6^o Az átmet-
tesbe más nem kerülnek, hanem csak
a gáton lévő részt elöre: felfelé emel-
lyük.

Segyres A fogot leg jobbat úgy fog-
ni, hogy a jobb kezünket a maszkolat
végén alól, a másikat pedig a mas-
kolat felső részére, a kapcsolatához
közel fogjuk, hogy ezen kéz által
a fő mozgásait lehet, en ismerni.

Segyres Nagy vagy 5. fél kör
forma mozgás a fogoval. never,
(tekih) racionális.

A hűrés hűs ápolását némelyek
segidre bírták, de jobb ha a sültés
maga jobbat kereszt a maszkolat vé-
g.

316.
geről emeli eljére a kaptolathoz
fogja, bal kezével pedig, a köríp
kust apólya.

Meg születvén a főnek abra-
kati nőre, a fogs levezetik, úgy-
hogy emek marholatnyi a hörrétol-
lyuk a végétől előre a hüvelyki-
junkt, és így válszkyuk el egy má-
sol. De ezt csak akkor fogjuk,
a midőn elegendő erőt találunk,
a skülsbe. A természetes születés
a fő a másik néprének.

Ha nyakskirt állás vagy on je-
len, de a has hátra, a háta előre
áll, akkor szinte az a ki kúrásuk,
vántatik, csak hogy itt a gerinc
a jobb oldalán lévén, és jobbról bal-
ra fordul előre.

A fő be mentelenül az üregbe
a tractional. Vigyél merni kell. 100
Hogy ha lassan, vagy nehezen jöme-
ki a fő, ezt nagyon ügyve ne nyom-
juk, ambar ugyan a nyomás tüze-
bi.

317.
biti a kereszt mértékét a főnek, de
a gyermek vetejét nyomván, meg-
ölheti azt, és hogy a fő a nyomás
által egyenes mértékibe nevetés-
vén, a hol a medentre maga min-
deg srülőbb, és így a kisebb mé-
tékére a medentreivel nagyobbisnyuk
a főt. — 200. Hogy a fő nyomás az
hirtelen soha se legyen, mert így
egy nyomás rájön meg ölheti a gyö-
melet; de ha lassan lassan történik
altior nem veszedelmes. — 300. A hu-
kásra névve: a midőn meg szorult
a fő, ne alhalmarassunk felette
erőt, inkább vigyázzunk jól a fő
állítására; és ha az anya, és gyermek
veszedelmbe nincs: várjunk, és hogy
mindenkor majd a nyakskirtnak a
Premierem Consohon való fel aka-
dása az oka. Elyenkor nem erővel,
hanem, hanem a főnek fel: és
hátfelé való emelése szükséges, és
ar.

318.
arutáni, le hűrésa által fogjuk nyi-
ni a főt. Ha ere sem merre ak-
kor vajjunk, és engedjünk nyugodal-
mat a körülötte, hogy jó fájdalom
hajjon gyabrabban, most egy pilantat
szűk ara mi mesterséggel élőbb rembi-
tánk. — 4^{es} Ha meg atad a fő, és a
szűk foga nem egészen van rajta,
livalt a ferde mértékbe, midőn
a hűrés, hűrés hirtelen le váltak
a főből a foga, és vadabb esetébe.
Szenhor a körülötte hátra ejt, ere
néve tehát mindig figyelmes lé-
gyen az orvos, hogy a foga a főn
jól áll-e. Ezt tudni fogja ha
újait vagy alhalmartattya, hogy a
kapcsolatba gerbeje formába al-
halmarra, és a köré újait a fő
hűrés lüdtgye; ha pedig előre vepri
hogy a fő hátra marad, akkor ve-
gye hi ar egyik hanalat, a bent
ma

319.
marado másikat: alhalmarra jól:
arután vigye be ismét a másikat,
és jól alhalmartassuk újra. — 5^{es}
Hogy ha a körülötte soká tart, al-
kor a fihenis ideje alatt, ne-
hogy a fő alandoan nyomtatson,
a marholaton lévő fonat erepe-
teszen meg. — 6^{es} Ha a körülötte
mint fájdalom, és a körülötte je-
lentesebb, akkor a természetesebb
vetni igyekszünk, egy oratio ^{tractat} tívén,
fihenitessük a körülöt, de úgy hogy
ar oratio rövidebb legyen, a fihen-
nes pedig hosszabb. — 7^{es} Különös
figyelemmel legyünk ityenhör, a
fő természetesebb mozgása, ne te-
már odalra forgassuk a főt a természetet.
Ez üregből a hűmenetelen
által, egy emeljük el is hi veket,
tyük a főt. De ha a körülötte
fájdalmat vagy nál, a természet
mu

munkálkodik, hagyjuk ezt egészen eny-
 és csak rajta tartjuk a főt a fogor, a
 nélkül hogy hurnánk, mert ha kirke
 lenli hurnánk a főt a hi menetekel
 tal, akkor igen gyakran egész a végéig
 lig reped sokszor a gát, sőt meg ha a hi
 menetel igen tö, és a szülőnek erős faj,
 dalmai vagnak, úgy hogy szinte sebz-
 sen jöme ki a fő, ilyenkor a fogor
 a főt: fel is befelé emelve így szerünk,
 ezt aipra tartani, hogy haj abban fej-
 jen ki, mert a hülvő szülő nérel
 laankénti ki kagizás a vepradal nélkül
 engednek.

Ha a fő: a főtetővel áll ugyan a
 méh srajába, de úgy hogy homlokhat
 kábe előre, mint hátra áll, ilyenkor ha
 fogs alhatmarása jelentetiti, tehát itt
 szülésig és még 1^o a marholatokat lej-
 jebb tartani, hogy a fogs még is a fő-
 re eszen; mert ha magyan tartjuk
 a marholatott, akkor csak a fő hátul
 so répre esik egy esetely rére. — 2^o
 et hurnák szinte valamivel lejjebb kö-
 ti

temyen, más lip a fő a szemérem csontokra
 szorul. — 3^o et medentre hi menetekel
 a fogs marholatokat le kell eszerteni,
 mert hülvőben ar áll, a mély előre áll,
 a mellől el nem válhat hülvőben, és
 így meg szorul a szemérem iv felső ré-
 len, és a gyermek nyaka ki törhet.

Néha a medentre bájige mellett
 a fő le száll, úgy a medentre felső
 nyílásába, úgy hogy fő kétő alást
 a keverkedett magrat, és most se a
 nyakvint a méh srajába nint, se ar
 áll a mellre nem szorul, itt ugyan ha
 vagnak szülő fajdalmai a szülőnek,
 akkor meg váltórik a fő kétő állá-
 nyakvint állása, és ar áll a mellre
 szorul; de ha vepradelmes jelenjig
 végett: a fogs jelentetiti. A fogor
 almarása: a rendszerint köstémít, de
 a hurnák kétfelé képrül, hogy a fő ke-
 tö helyett a nyakvint jöjön a méh
 srajába, a hi menetekel előre, és fel-
 felé emeljük, de nem oly nagyon, mint
 a.

a rendez nyakvörst körül, néli.

Ha ábrát felvénél, a körül fogó alhatmarájára nére kell lenni. — 1^o az ábrátot soha sem fog, jelle fogóval, csak a 2^o idő szakasza, míg pedig emelt vége felé, ahol a fő már úgy áll; hogy a fő tető a kereszt csont felé, az áll pedig a re mérem iv felé álljon. — 2^o A fogó mosholattját az alhatmaráj alatt: mindig levéje felpelá tartjuk, ne hogy a fogó a gyermeli ábrátokya also réjére eszen, a nyakát sértse.

— 3^o A hurás is a körül felé előre törtimyen, hogy a homlok jön előre. — 4^o hogy a li menetelnél: midőn a fő már a nagyobb körülrejt áll haladta, vegyül le a fogót, és az ábrátot úgy mordittjuk kézzel, hogy a nyakvörst hátulról: a vártól el vajon, és így meg körülkeresem.

ha

Ha a fő úgy eszkeedik le a rósi alhatmaráj medentriénél, hogy a fő nem a ferde, hanem a kereszt mértékbe eszkeedik le, és meg protul, ilyenkor a fogót úgy alhatmarrul, hogy az egy gyök fogót hátrább, a másik at előbb visszül be a ferde mértékbe, arutan keveset hurva: úgy forgattjuk, hogy a nyakvörst jöjön előre; ez meglé vén: a fogó kanalait egymá után ki veszül, és ujoman alhatmarrat szul; de a li hurásánál a körül fogóval vigyárrunk, hogy egyenesen hurruk li a körül fogóval, ne hogy az áll a mellköl hosán el vajon; de ezen eset igen ritka.

Ha a törtsöh körülre után, egye dül a fő marad uszra, ilyenkor fogóval nem jó elni, mivel 1^o a körül fogót nehér a gyermeli fejére temni, a nélkül hogy az anyának: nagy fájdalom.

6.

324.
lom, ne akortassék, a fogó: és körüljár-
te által. — 2^o Ha a fő magyan áll, a
mellől elválék, akkor a fogót alhatmar-
ni nem lehet. Ha pedig ar állat: más el
isjűk, akkor fogó nem körüljár. — 3^o A
köz is bír medentre görbület: fő görbület,
és egymásra való hule, otodást semmi: im-
te mint a fogó. — Még is ha valaki fogót
hi van alhatmarni: körüljár, 1^o Hogy
fogót ne alhatmarassunk, minelétől,
te a fő a medentre nyilat, aba rimzen.
— 2^o Soha se alhatmarassunk a fogót,
csak akkor midőn ar ábrát előre néi.
Hanem körüljár, kerünkél a fej és úgy
forgatni, hogy ar ábrát előbb oldal felé
nerren, arután alhatmarni a fogót, a
melyel a főt úgy forgassuk, hogy ar
ábrát hát felé forgasson. De ha a
fej ar kérrél forgassuk, azt hi is
hozhatjuk. — 3^o Hogy a fogó kana-
lais szabadon bí uipessük, körüljár,
hogy saged által ~~hagyjuk~~ tartassuk
a gyermeket, és távortassuk a saged al-
ta

325.
tal: aron oldalra, a mely ar alhatmar-
rands fogóval elenkerő. — 4^o Hogy a
fogót a törriök alatt alhatmarassunk,
sul: mindig, úgy hogy ar alhatmaras-
után, a törriök a fogón heverjen. —
5^o Hogy a húr, alatt a gyermeköt,
és öket körüljár, úgy forgatassuk, vagy mor-
gassuk: mint a főt. — 6^o A hűdöl köi-
norra vigyárrunk, ne hogy azt a fogó
közé csipjük.

Ha a hűdöl kősinor előre esett,
eset nyíra hell semmi, és a fogót a köi-
dőkön sul hell alhatmarni.

Ha a gyermek herai volnának
előre, a hit körüljár ercken belől hell al-
hatmaratni a fogót, ne hogy erket is
a fogóval csipjük.

Azon körüljárkról mel-
lyeknél: vagy a gyer-
meket kisebbítettük...
vagy ar anyan új körül-
járta körüljárunk.

Ezen körül, eh ritkán tökéletesek,
ugy hogy mind a gyermek, mind az anya
életét meg tartani tudjuk. Itt leggyak-
rabban meg kell előzünk, egy neki
életével, a hol mind a kettőt is tarthatjuk.

+ Ezen körül, ehhez tartamnak. 1^o
Az át furás. - 2^o A Csáprás mettrés.
- 3^o Ha mettrés. - 4^o Reményem is mettrés.

Ha a fő ugy meg prosul a meden-
trebe, hogy meg fogóval se. De által,
látnom csak meg hisz, ebből is által le-
het hi venni a főt; a hi ebből, pedig
az által történik, hogy egy hi: vagy
másik üreges meg fuszul, a tárgy se
szekes hi venni, sőt Gonatot is
néha, is az által nagy sajót hisz, ebből
tyűk. az az át furás.

Itt furatni szoktuk hörönsege-
sen a kaponyát, néha a mell, vagy has
üreges is.

+ Kaponya átfurása je: ex Cerebratione
a midőn a kaponya meg fuszul, is a
furat nyílásán az agy kivételik. je

+ Talantetik a kaponya furás: a hol
a fő a medentre üreges ugy prosul, t
kerrel, vagy fogóval, vagy éppen nem, v
az anya vepredelme nélkül hi nem
bizjuth venni. - Gonatos kérdés, kamadott
más az orvosok között, hogy valyon
csak a holt: vagy élő magzat fejével,
lyen meg furni; vagy náli holt az élet
jelentik. ti: midőn a gyermek holt, is
a főt fogóval, vagy kerrel éppen nem
vagy az anya vepredelme nélkül nem
történhet. Erre anal fogva átlisját,
is erősítik véleményeket, hogy nem
szabad ölni, azért nem fuszhat ad,
dig: míg csak a gyermek meg nem
hal, is ezen pilantatot várják.
- Szar hogy nagy valami az át fu-
rás, hivatt midőn meg a gyermek ka-
lálatal bíronyoz, oh nem vagyunk. De
ha bíronyoz, oh vagyunk hogy a gyet,
mek az anyától, vagy éppen el nem
válhat, vagy vepredelme nélkül nem,
it.

ilyenkor ha a srülés munkáját vepe-
 delem nélkül halasztani lehet; akkor
 lehet várni a gyermek halálát; és il-
 lyenkor is csak a nagyobb esetekbe fut-
 ják által. — De ha láttuk hogy a
 srülés: a váralorás miatt a srület
 vezredelembe ejti, a midőn gyakran
 az anya életének meg tartásához va-
 la reményt is, el tűnik a gyermek
 halálával; midőn a furás által
 egy holt magratot egy más halál-
 to apronyból hozok ki. Kérdés hogy
 2^{ik} élet fel áldorható e vagy csak
 egyike, azon kévőn parancsokat kövessék.
 Hogy ne öly: itten 2^{ik} életet fog el va-
 bolni, a vissza tartás, is váralorás
 által. Ugy ha kétkönel a halála bi-
 ronyon, vagy hogy egyike általános an
 meg hal, a másik csak fel tetelen
 ti. ha az általánost a fel tetelenek
 fel áldorom, a mint hétése, ige lejend
 a srülésnek, a még meg tartható életet,

a bironyon el vartó életet előbb fel-
 áldorom, mint sem a tartható élet
 tartása is lehetetlenie nem lejend.
 — Vagy nek tehát: kik csak a holt főt
 híványuk furni, vagy nek kik aritő
 magrat fejis is: meg furják. De er-
 kei hülöm börtö vélemény, csak egye-
 dül fel tetelen a törnyül állajok
 hoz alhalomartatva jó, a mint a fen-
 tebbiekből hi tessék.

It fő at furásnál srülésig, el
 — 1^{ik} Hogy a fő nem a medentre úragi-
 be, vagy leg előbb a himenotelbe mel-
 lyen legyen, az az a 2^{ik} idő seker-
 vég in, vagy a 3^{ik} idő orakarba legyen
 mert: előbb még magonyan alvan a
 fő, a furás az anya srítésivel törté-
 ni: gyakran, és még ilyenkor a gyef-
 mel fordítás is lehetesigez inkább, mint
 a furást hüll semmi. — 2^{ik} Hogy a srülés
 elese meg tartatására lehetesigez legyen,
 ere hogy a tudomány bírodalmát az anya

330.
El kesülhetetlen halála által hozzár-
taz, uli; a mit a furásnak fognak tulajdonítani.

El rendelés, eh ar operatio előtt. —

1^o Mindenek előtt tészejen: meg egy szo-
roz: külső, és belső vizsgálás, ha van idő,
és van hivat, ahát hívjunk egyet, a
ki vel ar egyet véget Consiliumot tart
kaszunk. — A vizsgálásnál pedig körül-
ségg, vagy a körül egészéget, és a minden-
re alapoztat, a fő állását, és hely,
hertéjét, és a magrat illeszi: főképpen
tekinteni. — 2^o Alkalmaz, felvev, és le-
írteni, a mely mindenkor keséptény
leind, és a körülönk oly hely hertéjét
adjunk, mint a körül fogó alkalmaz-
tatásánál. Az operátor szinte terdet,
segédük rendelkezésének, ar egyrö-
könyen tartassák, eh ar operatiót ga-
solók: el távortasz, ahát, mint a körül, és
virellet. — 3^o Az ephöröket hírvit,
trüh el, erék előrrör át furás: perfora-
torium: / másodtror oly ephörök, melyek

331.
kel a furásföt hi korruk, így körül fogó né-
ha, mások Csont fogó, mások illy korog.

Scyris itten a gyermekek semmi
esetben keséptelni nem lehet.

4^o Határozzuk ar időt: ar operatióra,
er akkor lesz midön a körül ar anyja
vevredelme nélkül tovább halapra-
ni nem lehet. — 5^o Trüh ség meg
Prognostis, mondani ar operatio előtt.
a gyermekek nérvé nem lehet mert
emmel feje át furatik. — De ar át fu-
rás: a fő körül, nel, ar anyára nérvé,
mint át furás, nem vevredelme, De meg
is ar operatio előtt vevüh tekintet,
be egészéget, és a körül vérvé ala-
pokat, és ha ar anyja vevredelme,
betegség be szenved, akkor határozzuk
hogy ar át furás, ar anyára nérvé n
leze vevredelme, De a vevredelme,
betegség halál, leindé, ar a baj
maga fogja mutatni.

Az operatio maga nem nehéz,
vagy hal emmel keséptelen hoveskeré

sei marad talu vigra, mint a veteje ar
anyanah, s6bnyire a srulo, ugy es lensi,
genek kulajdonithato.

Ha at furas, ugy tortenik: hogy fel
vet ad van, hogy farkilija szabadon le
gyen, is edényt, kendőket, poharokat,
a laba alá, is a felvő hönzőit is le
vetheti, ha éppen akarja, a mi nem
szükséges, ugyan. Ha te veszi ugy ve
se le, hogy a srulo észre ne vehesse,
próbálhatnya a fogóval való li ve
telt, ha a gyermek halálával meg
nem bírnyoz, is a jelentés, sines meg
provoz, am meg határova. De ha
igen; akkor ar at furó otlot: mely
virbe tesszük, is meg törvölven,
aron kerünkhet: melyel nem fogjuk
meg fogni a furót: kemnyűt meg
és iradékkal, is veressűt be a me
dentribe, is keressűt fel a fő
aron réprét, is melyel a mék szá
jába áll. Ere némelyek a varra
ny

nyokat, vagy kutatókat. ^{333.} ^{333.} ^{333.}
oda igarzatni, ha ott nem állan a
nah. Mert ha a nagy kutatókat
nám éppen meg furni: er hátul
lévén, meg térhetünk ar anyát;
is ha a nagy kutatókat furjuk meg,
akkor a Gontok be fogják csuk
ni a furót nyilat, is így majd li
nem foghat ar agy, arert aron répr
furjuk meg a háonyánah, a mely
a medentre verető lincijába áll,
ert fel találván, hie be veretett
ujjaink hörött veressűt be a furót
aron, a verető lincijába lévő répre.
— Er meg lévén, ar erlőrt lej
jebb erepreteni srük ség, is furó mo
gás okat temi, is a midőn a furó
kegye: a nagy répreket, is Gontok,
kat meg haladta, akkor leveget
be tapasztjuk a fogot. A bent
lévő keret: most már li kerem
le

lehet; a bent lévő fogó strárai egy
máztól távolították, és forgat-
ván: az agy velő úgy örvéront, ol-
tatik, hogy az ejtett nyílás on hi
foghaszon, néha önként is. Er meg
lívén, kerünkön: ismét hi kurruk
a fuort, is most a velő, vagy a rüel
fájdalmak alatt önként hi folyik,
vagy pedig újambal hi korrutbe-
lőtte, mely után a fő lézébülven
hi kajtatik, is gyakran a természet
által meg rüelotik; ha nem bírja
a természet hi kajtani a főt,
akkor fogot alkalmartatunk.

Ha a fő hi nem akar jönni,
nemelyek fogot, mások horgot kaj-
nálnak; de ereket csak a hőnyül
által akkor alkalmarva strárad kaj-
nálni. — Ha a fő a furás, is aragy
hi fajása után: formáját nemvál-
tortattya nagyon; úgy hogy a fogó
ba

ba, be illik, ilyenkor azt kaptatunk.
— Ha pedig a fogó által a főt hi
vemi nem lehet, vagy ez formáját
úgy váltortattya, hogy a fogóba nem
illik; akkor éles érhöröket kaptat-
unk. meg pedig 1^o Boer Cronstfo-
got, meg pedig a fogóval strárad
meg lent kerünköt be vizsrué a
med entre úregibe, is fel kerünköt
a fuort nyitáson a fogot eren be
vitt kerünkön kaptatunk, is
úgy alkalmartatunk, hogy a fogó
egyik kanala, a kaponyába-
bent, a másik pedig a gyémekha-
ponyáján hi ül legyen; alkalm-
marva lívén a fogó, a strárad ker-
rel ellenkerő oldalon a fogóval fog-
juk meg a főt, is így hi erővel for-
gasva hi korruk. — De ha eren
mod nem volna elegendő: a fő hi
ho

336.
horájára, akkor magát a kaponyát
kel li, ebbitenünk, még pedig az
is a fentebbi fogóval képrül, de
ugy hogy egyike kánál a kaponya
üregbe, a másik kánál a kaponya
külsőjén; de a bőr alatt fogjuk
meg a gonat, is ezt be felétör
jüth, is hi horruk, is ezt addig is
mítelyül: még trülsége, leend,
arutan szinte ezen csont fogóval
meg fogjuk a főt, a hőronygy
fakarakkal együtt, is hi horruk.
— Ezen csont fogó: leg inkább
csak akkor kell kapniálni, mi
dön a fő még a bemenetelbe van,
másként is jobb ezen ephör, aho
ragnál, mivel nem lehet hi oly
könnyen a trülot, mint amar, egy főt
gatast is lehet vele tenni. — Ha
pedig a medentre hi menetelében
van

337.
van a fő, is trül fogóval nem lehet
hi horruk, vagy a fő beté nem illik,
ilyenkor a hosgot kapniálni, mel
lyet a furott nyílásba horruk, is
ugy hurruk hi a főt. — Ha pedig a
kaponyába nem találhatna erős
festit pont a horogra, akkor ezt a
strájába képrül: a gyermeknek.

Ha a gyermek ab rárattya
val srocul a medentrebe; akkor
át furruk nem lehet, hanem az
éles hosgot kell kapniálni, mel
lyet vagy a strájába, vagy a fület
be, vagy a szemébe alkalmatasmul

Medön a fő nem rend kívül nagy
ságn, vagy a medentre étkelenyige, is
hannem a gyermek fej virhorvája mi
att akad fel. — Ezenjüth hogy a méh
magyan áll, a vir hohyag stréte,
is emel repedése után mint egy le
vegövel teje, késtet érünk, mely
a fájdalom alatt le felé tolvit

Künat alatt ismét vízre megy, és er a mi-
 dentse li monetelet egészen meg tölti.
 - Ilyen főt ha nem igen nagy, sokkal
 a terméret; ha pedig sem a termé-
 ret meg nem trülhesi, le se hajthat-
 tya a medentébe a főt, sem a trülfo-
 got nem lehet így reá alhatmarni,
 sem pedig ha lehet is reá alhatmar-
 ni, mivel reá nem illik; ilyenkor a fu-
 rovat perforativum, lehet a főt meg
 nyitni, és li botrájstani a víret, és
 fen úgy mint a máz furás alatt, csak
 hogy mivel a méh ilyenkor fent van,
 egy sejtő hiet odalt rostitya lefelé
 a méhet, és er által emeli, és a gyet
 meli fejének, erős állást ad. Er meg
 liven: a hörönység, regulah tróient
 furjuth által a haponyát; de ha a
 hörönység, takaral, és gyont meg va-
 gyon furva, vigyárrni kell itten, hogy
 a furó igen te ne hapon, és egy talán
 ar agyat sirtya. Bást ugyan hörönje.

gesen meg halnák ar ily gyet méh,
 fagitt, ut inkább vjunktat a nyitást,
 úgy trinke akkor is ha meg repedne a
 folyás, és li folyván a víz, a fő meg li,
 sebbül, és leginkább a terméret által
 trületik; hievem aron egy gyet,
 midőn a trülönök semmi trül fo-
 dalma nem lenne, a midőn trül fo-
 goval kell li kurni

Ha a törsök meg trülje van
 a fő meg akad, és sem kerünel, sem
 fogovat nem vehetjük li, ilyenkor
 trinke és, eprörret élünk. ti. at fu-
 rással. Bást ugyan er által haveset
 lisekbedik a fő, mert alapjával áll
 a fő a furóhoz, és mivel leve, agye,
 lö foly li, mind aron által, mivel ar
 anyat nem serti, és ar eptett nyitá-
 ba, ha kerünel horra nem terhet,
 nent, epröröt lehet alhatmarni,
 ar at furás úgy körtinik, hogy legi-
 a nyak tritot hiet felé, a gát felé nyom-
 juk, hogy egy előbe jöjjön a nyak.

szív, vagy valamely oldal végre a fő-
 nek; a fűrész meg történvén, a fűrész-
 ágait nem lehet egymáshoz távolít-
 va forgatni, mivel meg sértenék
 az aprony lágy szülő rézeit; hanem
 csak úgy forgassuk. — Meg fűrész-
 vén a fő, és kevés agy is hi polyan,
 horgot alkalmartatunk, és úgy kör-
 tünk hi, a szont fogóval isten tör-
 ni a szontokat, a szülő hára nél-
 küül nem lehet. — Akaly ába az
 oly fő vízre maradás nál, a hol azt
 kézzel hi horni nem lehet, mindig
 rosz prognoszt igazunk

Ha a törésnél szülés után vi-
 di fő marad vízre, és az oly nagy, és
 sem a természet, sem kézi fogás ol-
 tal meg nem szülhet; úgy hogy az
 körök szükségese; ezen győzve né-
 melyek szamos, és más esztört hogy
 nálunk, de a melyek csak leg inkább
 holt testben tehetők. — Mi így tevének
 ve

vésle, kereszt felvétel helyében a
 szülőt, egyike kerülhet a vállá körött
 a nyakhoz fel oldalt veretjük kerün-
 ket egész a gyémek fejéig. Most mint
 hogy fűrész ágok ezen munka, tehát
 hi pihenetjük egy kevés, kerül-
 ket, arután igyekünk a bent lévő
 kézzel a fő táharom egy rántást ké-
 pelünk, és a bent lévő kerünk tenye-
 ren veretjük be, a perforativumot, és
 azt fűrész a rántás alsó rézét, és ke-
 veset kágitva a fűrész szarait kágit-
 tunk, az éjtett nyilat kevés, és or-
 után hi kárituk a fűrész, és az éjtett
 nyilat az újánál kágitunk, hi polyan
 van a víz, a fő a természet által ké-
 telik meg. — De ha ilyenkor sem mi faj-
 dalom nem mutatkozik, a szülő el győ-
 zülése miatt, akkor szül fogot alkalmartatunk
 De ha a fő szülésnél a víri fő
 meg fűrész, és hi ebből után, nem
 mutatkozik szül fájdalom, és a szülő
 veszedelmbe fogyna; akkor labra szül-
 se

342.
Seget fordítani, vagy jg sültfogoz által martatni

Ritkább esetekben: a mellett, ha az is meg fuszult. t. i. akkor a midőn a gyermek herczt felvise mellett, annyira hajtatott más a medentribe, hogy a sültfogoz egyike oldalon sem férhet más fel hogy a lábokat lehorhatná. Er közté nek midőn a gyermek vire más elfojt, a méh erősen örvé hurodott, a sültfogozok dagadtak, és a sültfogoz más régen törtéven, kejön hivatik ar orvos. —
Egy esetben a körsök üregeit sültfogoz meg fusni, hogy a sültfogoz törtéven; amál inkább ha a gyermek hála lábától bizonyosok vagyunk, hogy az anyát kemelhezült.

Történi néha a has meg fuszása, és a láb sültfogoz: midőn a has igen nagy, vagy hogy a hi menetek a medentribe lehetetlen; így alapot lehet a has vire, vagy a holt gyermek hála lábán eredett typhusban, és így törtéte a fő sültfogoz: nek is történihet; ha azonos
ko

343.
könyvül állás, okba, vagy törtéte: ha a has oly nagy hi serjedés, a herczt felvise, nek is lehet sültfogoz, az át fusz. —
A törtéte operatio más könnyebb, más nehezebb; de általában ha ujjakunk, akkor nem nehe; és a könnyebb esetek törtéte tartorik. — A herczt felvise, nek, a has üreg meg fuszása, egyike herünkkel be vereségül a méhbe, és fel heresül a vereség liniaaba lévő rést, melyet meg találván röntem fogunk, a másik bint maradott herünkkel pedig be ujjak a perforatiumot a röntem át fuszult, és egy szeminium távortatván a perforatium törtéte, a nyilat nagyobb, nyul, és meg lévén, a perforatiumot hi hozunk, midőn majd ar törtéte nyilatagon a vire, vagy levegő hi foly; Ha pedig törtéte volna a nyilaga, egy törtéte ha meg törtéte, re a foly, ar törtéte nyilatag újánkel törtéte. Ha pedig a herczt felvise, nek a mell üregét holt fusni, akkor törtéte egyike herünkkel fel heresül a vereség liniaaba
al

344.
állo részt, a perforatoriumot bé vizsűt,
és nagy furjúk ált' részt furáj, al, hogy a két
furáj hörre egy borda epteyen, arax egy
borda egyike szűllén elébb, arutan pe-
dig a másikon. Er meg lévén a perfo-
ratoriumot, hi horruti, és amalk utama
ujankal a bordát, mely a részt furáj
hörre szorult, befeti törjűk, és hi hor-
ruti, és a szűllént tagitván, mossa-
nyitáson a bel részreket hi hornitá-
ket, ha pedig nem volna elég egy bor-
da hi törés, e által nyest két, a bel
részreket hi horzára, akkor meg egy fu-
rást kévén, vagy inkább meg egy bordát
éptvén a furájok hörre, ept és mint az
emblesset hi törjűk, és tagitván egy
ar utat; ha pedig ar ily álagosba a
mell furája után, a haz üreges és furái
szűllésig, volna, akkor csak a más éptett
a részreket sul tovább folytatván a
haz üregbe, melyen most majd levegő és
vír hi szabadulhatnak az mell üregből,
vagy szűnt a bel részreket is. — Ha láb szű-
lén

345.
lével helle a hazat furái, akkor ar van
dezen törjűk, mint a hazony furáj.
Ha pedig fő szűllén helle a hazat
furái, akkor a vállak höröss vizsűt
bé a furót, és a részreket által furjúk
meg a hazat, midőn ar éptett nyitá-
son hi szabadulhat: a vír, vagy levegő,
ha pedig egy részreket bel részreket
helle hi horni, ilyenkor elébb a
mell üreges helle meg furái amalk
rende törjűk, arutan a haz üreges,
a részreket által, és eren éptett, és tá-
gított nyitáson hi horruti a belreket.

It' gyermekek egy részreket fel-
darabolása soka sem szűllésig.

Azon szűllési műtetelekről
melyeknél a gyermek hi ho-
rára ar anya sértése,
vel: vagy tagitni kell a
szűllő utat, vagy egész-
szen új utat készíteni.

+ 346. De tartornak 1^o a Császár met-
tze; 1. Sectio Casarea; 2^o Has Mettze;
1. Lapharotomia; 3^o Premérem úresü-
lésnek át mettzeje; 1. Transactio Symp-
hizis opium quibus; 1.

A. Császár Mettzesről.

+ A Császár mettzés alatt értjük azon
operatiót; midőn a gyermek nem születke-
tül; vagy igen nagy veprédalom nélkül nem,
ahol a has falakon nyitott: a méhbe ha-
tott nyílásan keresztül veprüthet ki a gyer-
melet.

Ezen operatio veszélyes: mert 1^o kö-
nyen görzölő támadhatnak, még maga
az operatio alatt; vagy más veprédalom
álatos adja magát elő, mely miatt a
szülő az operatio alatt, és emelk vége-
előtt meg halhat. — 2^o mint hogy víz-
vepréssel vagy on öjve hőve, a mi min-
te veprédalom. — 3^o mivel a most egyé-
ként is a gymladással hajlando a has
hátsya a sertés által. Ezen sertés
hgy

347.
helyről az egészre terjedhet el, a mi vepré-
delmes a gyermek agyánál a sábas torja-
dise, és fenére való át menése hajlan-
dosaga végett. — 4^o mivel azon premé-
lyek közt a Császár mettzés jelentetik,
majd előre ment Scrophulosus, Venereus,
Artriticus, Rachiticus betegségelbe,
vagy Csont töréselbe szenvedtek, és
amely köpönhetik életlenjéit a me-
dentriájomel; e felett pedig még be-
teges veprületü névvelhet is bírnak,
melyeknél a sertés veprédalommal fog-
lemmi. — 5^o mivel leg többet az Orv-
közön hívatik.

Ezen veprédalom operatio elkerü-
se miatt, hülömbféléket gondoltak ki-
szgy nemelyek a gyermek táplálását ki-
van látni gátolni; a terheselek csak a
köt, kivéj növényi eldeléket engedő,
a sereint a gyermek ki fejlődése kassab-
ban haladhaszon előre, és így ki, ebb le-
ven a gyermek, arutan a terméketes
ut

utón születésén. De ezen mód: nem-
 egészen szület; mert némely terhes anyja
 elgyengül: ez által, hogy félhetni a szü-
 lés vége előtt behővönhető halálától,
 és hogy némely terhesnél, nem is fogana-
 toz, mert emelk ^{gy} szűz is nyúl némij-
 kor a gyermek. — Mások az át fűzést aján-
 lották; de ez nem egészen álhatsz,
 vagy csak ugyan ezeték, a hol a meden-
 tere nem éppen legrendetlenebb, és a
 gyermek még is halva van, hogy a fű-
 zés után a hűvöztetés a gyermeknek fo-
 ganatos. De ha élő a magzat, vagy ha
 holt is, a hűvöztetés által fűzést hű-
 ven jászaja által sem lehet hűvöztetni a
 magzatot, vagy az any a veszedelme-
 nélkül: nem; Mások javallják hogy a
 medentre tágitasson, a gyermekem
 érzületének szűz mértékével: ezöl-
 talább lézen szó. Vagy csak hűvöztetés
 előtt, vagy is mesterséges hova születés
 javallják. a 8^{ik} hetnapba a méh

szája mesterséges tágitása, a szűz hol-
 lyag meg rezeztése; és a gyermekel-
 ra fordítása által, mely működés al-
 tal irgathatván a méh, vagy termé-
 szetesén hajly a hűvöztetés, vagy
 pedig mesterségesen tovább folytatni
 a születés. Kétféleképp abból, hogy ezt
 akkor kell tenni, minden a magzat-
 meg hűvöztetés. Ezen működést is hol
 hopyrunak; hol a nélkül tészták, és
 ha javallják is az ingerékony any-
 nyaknál, vagy a hűvöztetés nagy szűz re-
 zsi vagy tagok, kemények, ott még
 szűz emelk helye. — A méhet ingerel-
 tyűk a hűvöztetés által, mel-
 lyet minden fészék orába egy néhány
 minuscumig tészták; és vajunkat ar-
 után: úgy örvös hűvöztetés a méh, és en-
 nek is fájdalomak. Ha ez nem elég, a
 méh szűz újunkkal irgathatván,
 pedig a méh szűz újunkkal tá-
 gitatván. vagy a méh szűz hova hovatott
 szűz szűz irgathatván, vagy szűz

350.
fe kagityuk ayt. Ha eren áttatlan pe-
rchre szül-fájdalomal erednel, elvár-
juk, ha bár lassan eredő szülest; ha
pedig eren szerehre nem hővesherne
fájdalom, némelyek hegyes, ephörö-
ket: mint hőre söt. szenele általa
mék strájain, is ar által meg fut,
ván a vir hólyagot; a gyermekvir
el folyása után 4. 5. vagy 6. nap,
matva fog hővesherne a szüles, de
er nem jó, mert akkor midőn meg
vir hólyag nem képrödött, a viri kas-
tyát át skurni nem lehet, a gyermek
sértise nélkül; is ha a vir el folyása
után nem hővesherik a szüles, akkor
meg hal a magrat, airt eren utolsó
mod nem jó.

Telentetük 1^o Holt apronyok
nál, a hű a terhes, is utolsó 3^{on} hol-
napjaiba haltak et, hogy a meg kalán
elő magrat meg szabaditassék. — Ami
ar időt a Csáprás mettrise: a halál
után illeti; némelyek 14. májoh 2. 3.

351.
vagy 4. 12. ora után hívományál termi,
itt ar a regula, hogy ha minden hőt
nyülmények: ar anya birony, halá-
lára mutatnak; is a gyermek meg
elő. Mint hogy a Csáprás mettris,
ar anyának nem árt. De a halál
a tette halállal fel ne cserjüld.
— 2^o oky szemelyeknél hű a szüles
alatt meg halnak, is a szüles ar 1^o idő;
szahazba van, vagy a 2^{ik} idő szahaz-
kerdetében; mindenkot eren hőnyü-
mények hűpt. szüles, a Csáprás
mettris, mert némelyek aron rojt
javallatott ajánlyák, hogy ha a
mék strája nyitva van, fordítas,
son lábra; bár er nem veszedelmes,
is hőnyü; De ar elő gyermekel ha
lállal fenyegeti, is így a gyermeket
szabaditani híványo cselunkatnem
isjüld el. — Ha a szüles már a 2^{ik}
idő szahazba: vagy a 3^{ik} ba van
már, akkor Csáprás mettrist termi
ne

nem szabad, hanem fogóval, vagy
 megteresség által kell tölteni; tölteni
 van ha helyet felvétel volna, midőn
 még a helyöbbit, így a 2^{ik} idő szabadba
 is kell császár mettrést tenni. — 3^{or}
 az élő szülőhöz 2^{ik} rendű fel-
 tét a liskatoni fel, a császár mettrés-
 re; egyik általános, a másik fel-
 tétel.

Az, Feltevések minthoz a medon-
 the oly éhtelen v. szűk, hogy a fő be-
 té sem erekedhet: a medonthe fel-
 sö nyilatáiba; még pedig általános
 jelenteték ilyenkor: ahaz élő, ahaz
 holt a magrat, is a császár mettrés,
 midőn is így alapotba ha a termépe,
 hoz uton hi hájtani ahaszjúl, az az
 anyának oly sőtiszibe kerül, a mely
 be hosszabb, vagy rövidebb idő mul-
 va el hal.

B. 3. Feltevések en jelenteték, mi-
 ho

hoz a medonthe éhtelen, így nem open-
 oly nagy, sőt a gyermek a medonthe
 felső nyilatáiba le is hájtatható, is
 furo nélkül hi horni nem lehet,
 ilyenkor ha élő a gyermek, akkor
 császár mettrés, szűk, ha pedig
 halva van, akkor fura, szűk.
 Elhatárolt hogy az anya életet ve-
 tredelomre tezzük, midőn a gyer-
 meket szabadulhat, hol az élő
 volna nagyobb igaz, így az életre,
 de éren igaz, azot mind a 2^{ik} otat,
 nah lehet tulajdonítani, is az
 lelhi eméretesebb egy életet: lé-
 tes alapotba horni: melyből még
 is meg szabadulhat gyáhorta; mint
 egy életet a leg bizonyosabb ha
 talnak ált engedni. Egyéb asant
 a jelentés q hájtóra, aba igen
 figyelemes legyünk, ne hogy ott
 is császár mettrést csináljunk a
 ho

354.
hol már egy szék a természet által tör-
tént a szülés.

Hogy a Csájka metris alkalmat
már fogamattal történe: szülés
gerek 1^o Hogy a szülő meg határo-
lo ne legyen, oly esetbe hol iktelen
medentre véget a szülés általans,
son nem történet, mert ha hal,
Doblon törvénsh: ily alapotba a Csá-
jár metris; meg halhasar-
ánya ar operatio alatt, és a gyermek
és meg halhat ar operatio alatt, mi-
dön ar operatio sokat vezt.

Szülészes, fel képezlek a Csá-
jár metris, ve erék. — 1^o Hogy Con-
siliumot tartassunk, ha lehetséges
felölle. — 2^o A szülőnek hejbeli
és körönszies, egészjéget vizsgáljuk
meg, arutan mind a medentret,
mind a nagy szülő réjreket, és kide-
közödünk hogy történetek e má-
ny

355.
ügyetlen hier. fogás, ok. — 3^o A virsiga,
laj után ujoman jelentettven a Csá-
jár metris, emek vezedalmas vol-
tárol; a hövül levöket tudozissunk,
a szülőnek pedig ohyan mondjuk meg
nélü, hogy ar alapotnya olyan, hogy a
természet uttyán meg nem szülhet,
hanem máz utat szülészes lepr lé-
síteni, és Csáka akkor ha réa áll ar
operatio-ra: akkor kell: máz kor nem
szabad erőltetni: / ötöt ar operatio-
ra elő hejriteni, a mi a fentebbi
oktat is ba áll, virekhatet, és székét
li üvisszük. — 4^o Határozzuk
a helyt: hol a metris történet:
er máz napokba a fejér lineánál
történet, egy ujnyival a hövösh alatt,
és amnyival a szénicem Consoh
felött történe, eren helyet ar
kapart alatt lánsh meg jegyerhetik,
feléte tárgyat p. o. szén, vagy jobol
li

ho olvadik által. Nagynak esetch,
 hol a betegség miatt a méh anyason
 deklon fehérese miatt nem lehet
 a mettrist a fehér lincian termi, il
 tyenhor másutt teyrüle, hol srük,
 ség, és oly nért enged, hogy a mettré,
 hozzá tegy alább 6. hüvelyknyi legyen,
 és ha a hűdökh, és tremorem cont
 körött, ily hozzá nem talál, ah
 kor is odalt kell tenni a mettrist.
 — Ha pedig az orvos meg a testor
 ség alatt meg eméri a Clajras
 mettréire való indicatiot, mint
 hogy ezek mindig Cachecticusok
 straktak lenni, és így gyengék, ar
 ist a hűlömbe fele Cachectiátat
 gy agyítani, a testet erősíteni srük
 ség. — Ezek után mind aróat kell
 készíteni, melyek az operatiom
 srük ségezek; így mettrö eplörök
 más alitok, és köröréire való eplörök

zök. — Mettrö eplörököl kell 2^{es}
 lés, az egyik egy körösége, bir
 torin, mely Dombos élű, és egy lés,
 mos végű: kára forma lés; az 1^{es}
 ara való, hogy a mettré, által egész
 a háj hátyáig körtemyen, lött meg
 ebbe is egy levezet; a más il pedig
 a háj hátya tagitájára, úgy srük
 te a méh tagitájára, a vér áli
 sok körökül, srükség ütör horog, ö
 foga, sejem fonatuk, spongia,
 etret, vagy pálmika, vagy más vér
 álitok. — Ha a srükö nem igen hű
 vés, akkor agygyülnék a több srük
 tek, varrás nélkül is, csak nyom
 poltok, rakapaz srükök, és egy
 ö forma hűdö srüksége. Erőten
 hívül jó ha körnél vagy nah némely
 orvosi srük is, hívált a vér folyójok,
 görököl el körülés ere; így Aether.
Tinctura Cinamomi, Spiritus Amomi
 ac

acus, ugyrinte aron szerek is légnél
 legyenek, melyek a gyermek felélepté,
 vére srühségesek, midőn tetre halálba
 beme. - Felkely is srühség, melyre al
 halmas, egy nem magos így, a mely ugy
 ályon, hogy minden oldaltól horráfét
 ni lehet, en, eszt hi potolya srünte egy
 nem éppen nagy aprtat; vagy emek
 kijármjába zét dörkára fektetik a
 srütső hanyatt, iderányozon, hanem
 fejével, is vállával, levezet magosab
 ban, térdével fel húrva. Segédet
 srühségesek, így egy a vállánál fog
 va tartja; a lábait hor zé, egy se
 ged hett srünte: hi a has, falait, is
 fejrítte; jó ha még egy van, a hiá
 srühségeseket hárter strogáltatja.
 - Az operatioora a leg alhalmatopalt
 idős is hett választani; ha ar orvos jó
 kor hivatik, is jobhor ált láttja: a ter
 méreket, uson a lekerattlen srülszt,
 alhor ar iő idő srakaz vége leg jobb
 li

lezen midőn ti. a vir halyag a meg
 repedire léje. De köbnyire ar orvos,
 hiő hivatik a miatt ha srühs, aronnal
 jelenti a Csájrat mettrist.

Hogy ar operatiot srünte jó srühs
 rel tekerjüb, srühséges egy srümsind a
 Prognoszt is előre Gimatni, hogy erál
 tal ar operatiot srünte hasávorhaj
 suk. Ere nérvet tekinxeni hett ar
 anya egészégét, srülső rejrét, alapot
 tyát, is a gyermek életét; ere nérvet
 ha élete jelét nem mutatja nyit
 van, mindenkör, hiéteges, hasáro
 zást mondjunk a gyermekre; elenke
 röbe jó a jóvendölés, Csak ar anya
 ban ar operatio alatt elő fordult
 vevedelmez künemények: a gyermek
 re is be ne folyanak. - Az anyára
 nérvet: a Csájrat mettrist, a Prog
 nost mindég hiéteges, is majd na
 gyobb, majd hiétebb a vevedelem.
 Ha látjuk hogy a srülső egészége ál
 ta

salanozan most kedverő; ha a srülő² jó
 kor hivatott; a srülő ar² üdö² sea
 hasra van, ha a gyermek vör meg
 el nem folyt, ha a srülő jól tartja
 magát, és egész el frány, al van,
 gyermek meg szabadít, ára, és min,
 den kívántatok találatnak, és meg
 ügyetlen hár fogja, ok nem törtétek,
 ilyenkor nem oly veszedelem, a gyermek
 noz is: aranya étesire néve; elenke
 röbe pedig csak a lehet, és et alit,
 nyuh, ne hogy köbber igi jünk mint ad
 hatunk.

Mind erch meg levénch, a
 srülő a hejrisett helyre feltetik, ha
 a srülő a jobb körrel abas operat
 ni, a srülő jobb oldalán áll, a segéd
 pedig a bal oldalán, úgy tartja a ha
 sas és méhet, hogy hár hegye lefelé,
 a szemérem fele; oldalt a méhen
 kovergének, hüvelyével mind a 2^o kör
 töl, a méh fenekét tartja, most ar
 of

operator a hár jeletet hejjen, a dom,
 boz illü hárjel fel mettri a hár at,
 egész a hár hátyáig, a vére is sivat,
 hat, meg vör alitokba mártatik: alit
 rami fog, vagy le hősének, ere a hár
 hátyát sűrűse a domboz illü hárjel egy
 hüvelyknyire fel nyitynak, és a domoz,
 fűrhen a hár hátya hárjel tagitynak,
 akkor igen vigyarron a segéd, hogy be
 leh elö ne essenek, erután a méhet
 úgy vágja fel, hogy a gyermeket
 ne sértse; a méh vágás a hár, ebb
 legyen, a hár vágásánál, ha a gyer
 mek vör már el folyt, akkor 5. Crol
 elég, de ha még jétlen van 1/2 vagy
 1. Crollal hárabb legyen a méh,
 prés, és meg levén most; a herünket
 úgy vörünk be, hogy egy illü herün
 ket felete, és valamennyire oldalt
 a máshon, eren is valamennyire alant
 vörögyüh, arután a láb fele levő ré
 se

Isten, a vir holly agot at fuzjult, is li vess.
 srüle Crombjainál fogva a gy ermet, ha
 pedig lábait nem ishetnint, akkor fővel
 duk hi, a mi mindig meherobb; De a li ve
 sel hamas törteményen, ne hogy a mich or
 ve huradván, a gyermetk feje is nyaka
 körül: is lehasztemia segye a li vételt, li ve
 ve levén a gyermetk, egyt a Babának adja
 áltat. Ha pedig gyermetk vir maradt volna
 a méhbe, egyt Privatyat horrukt hi, nem
 pedig mint némelyek híványák a vürkt
 lyagnak a méh séjába valo sepeztise
 áltat híványák le csapohi; arak után
 a méh lepenyét simta vigjárva al vályp
 tyuk, is hi horrukt a srülepet, nem bír
 duk pedig a terméjretek uson valo lityk
 kájara, mint hogy ily állapotba a gyahotte
 ejtett nyálaton herapntül a has, üvegbe ön
 södhet vir, melynek el távortatásán,
 most ujonnán fel kellene nyitni a hööréft
 — Ha a méh lepeny éppen ar ajtando met,
 vir, atatt keverne, ilyenkor ha egyt kesz
 tül vágjuk, igen nagy vére folyas fogna

vetheren, ilyenkor hat csak egyik mel
 te egyt a sebbe, egyt al vályp tyuk elobb, is
 arutan folytat, ut tovább. Ha pedig a
 méh lepeny derékával es ne a mettre, be,
 akkor vályp tyuk el a li, ebb vére, ve
 gett iö ar egyt méh lepeny, arutan
 evet együtt a gyermetk hirtelen hikor
 duk, hogy el ne hajjon, aron javaltat hogy
 a méh lepenyre ne nérrünk a mettre,
 atatt, hároz mert amak mettreje igen
 nagy véreft okor. Erck meg levének
 a méh sebe ajakai iö is er, is a has
 vérege hi tisztitattván, Privaty által
 egy mázhor hörelitessnek, hanem löre
 ladsek volna rendezen; ne hogy eren
 aghak hörré bet provolván, be rárt
 sévint okorván; ennek végevel a has
 sebe fogadik öpre, valami 12 Creol
 hopenyagnyi ragasztó frastronnal, a
 mi igen jó hogy legyen, sükhéges, sá
 pi, tessék arutan a sebbe, egyt folyta
 sevént, két oldalt pedig vastag Comp

res, a, erekre ujoman egy, hogy ar epejesebe
 fedje egy tréles nyom folts, is uigre mind
 erek egy vejromy övel tartassanak öve-
 Ha a has falak a kövér ség miatt igen
 tagolt, vagy elerkeröke igen vékonyok,
 akkor vize, vasa, al foglaltassanak öve.
 A seb also vigát pedig nyitva hagyni kell,
 egy vejromy seilahot seiven ar is lehet öve
 hogy majd aron a hig ség ok hi folykaga
 nak. — Meg seiven mind erek, a gyermek
 agyast agyba horruk, a fejét nagyon
 helykeresttyük, is fél hanyatt, fél oldalra
 fektettyük, is nagy bánunk vele mint gy
 mel agyast. Különösen vigy arvan, hogy
 nem támadott e al testbéli gyuladás,
 a melyet amalk rangye seivent gyogy
 ni fogunk, nagy seivse a görököket, ran
 gataraszt, agyulást, tartos ves folyást, b
 erek mindenthor kessséges hi meneselt
 igérnek. Okalyábe pedig igen sok orv
 sággal ne kerhájük a gyermek agyast,
 amalk inkább elöre ne rendelyünk orv
 ságot, hivalt a vés hi üres issej el vejsza
 ne

ne slyünk, mint hogy a most is miseredő
 has organumoknál el válatkás, a ujon
 nan kezd, mint a májnak, belének,
 arutin a tej el válatkásra is, seivse
 ges a vés, is leg nagy obban a gyuladás el
 oplás, ara seivseges, mertek letes meny
 ségü vés; figyelemreünk különösen a
 seivse, ha ar rehedt volna, antiphlo
 gisticus has, hajtok is, liz, seivsel által
 morditassék elő. Ere leg jobb a Ricci
 nus olaj, el edele seively, hig, is non
 nagyon kaplato legyen, el melván a
 gyuladás, aron islet modot tovább is foly
 tar, a a gyermek agyast, is több holna
 fok, seivt el seivend ség is meg hordja övet, a
 has falak apotg asasa seivett.

Bár pedig atalyaban javalyuk a
 gyermek agyast, oknati a seivkatást, erek
 nek mint hogy mindig seivnedett vont
 bajok, is más beteges alapossyák vésget
 jelentetik, a Caspari metris, is egy be
 seges vegyületü nedvelkel bírnak. — 2^o
 mivel seivkatvan ülé, hórött: a seiv
 se

leg mihiabb a trojorol a kaza terjed,
 is er által a seb ajakohat egymástól tá-
 volissya. Ezen okoknál fogva nem jár
 vésztyuk, ereinek a trojkatást, hanem
 előre trojkató dajkáról gondolkodunk.

B., Has Mettrésről.

Er aron műtétel: midőn a has fala
 it felnyitván egyenként sren uton-
 vezzük ki.

Telentetili. — 1^o Midőn a méh
 meg roped, is a gyermek a has üregbe
 esett. — 2^o A méhen kívülli terhességűt

Megnyitvány pedig a hasat. 1^o A
 has fatam által, hőrönig ezen a méh
 ropedizniel, ugy meg a nádán kívülli ter-
 hességűt is, midőn a hűtőbe felvük,
 vagy magosyan felvük a magrat, is csak
 akkor midőn a magrat tojás a has hátyi-
 ra ragaszkodik, is lefelé erórhodik a
 medentre felő nyilazán által a nádán-
 tre üregbe. — 2^o Midőn a méh kü-
 löb hűtő felületécher ragaszkodik, is
 sűrűse le erórhodik a medentre felő

ny

nyilazán által ar üregben. Ekkor a has
 merrist a méh hüvely nyilazán keszűtül
 keszűk.

A' Fövendölés: Ha a has mettrés a
 méh ropedizniel jelentetili, ekkor mindig
 veszedelmes a gyermekre nére, maga
 a ropediz séget, mert meg sűrűven a víz
 fogás, a gyermek leggyakorabban halva
 hórakili ki. — Ha a méhen kívülli ter-
 hesség jelentili, akkor 1^o a császárt met-
 trés veszedelmével jár, de ha a gyerme-
 kes által magon ki vevük is, a méh le-
 fenyűdik mag alkozája lévén, neheren
 válszthatatik el, is ha el válszthatatik,
 nem hurodik orve a helye, így vész-
 támad, is sren hely mindig gennyed.
 erőst veszedelmes. — A' méh hüvel-
 lyen keszűtül történt mettrés nemoly
 veszedelmes.

Történili pedig a has mettrés; éle,
 vagy halt sűrűn is.

A' keszűtül csak nagyobb részeit ha-
 sánolok arakhor, melyek a császárt met-
 trésnél említették, csak ar operatio

he

368.
helye hülömbökik t. i. nem a fejér lincen,
hanem, ott segyrüh. a mettrist: hol a
Dom bordás, ar ar hol a gyermek fehérik.

Az operatio idajere neque, a méh
repedés avól, ha meg györödünk, memél
hamarabb horra kell fogni az operati
hoz. — A nádorán hivülte terhejeg
nél, ha a terhejeg usgét isheti ve
szedelm nélkül, ekkor oly fájóalmi
lazznak, mint a méh terhejegnél,
ilyenkor a terméjret jelentven, hogy
a magrattol meg hiván valamit, il
lyenkor segyrüh a haz mettrist; de
nyire más a 4^{te} 5^{te} holnapba a mag
zat gyuladása, is suppuratioba meg
álta; ilyenkor midőn a suppuratio
jelait észre vesszük: kell kenni az
operatiot.

Az operatio hülömböfele no
don körténik, függ a terhe indivi
dualisától, ar idő járától, is köb
bafolyásuktól. Ha a méh repedés
li

369.
liványja az operatiot; allhat a haz met
trist, ugy körténik, mint a Cságrái met
tristnél, csak hogy nem a fejér vona
ton. — Ha a méh lapiny is li edett vol
na, ept is li horruti; ha a méhba ma
ratt, a mi ritka, allhat a terméjret
hajtya, a terméjretes, nem. Ha a
méhen hivülte terhejeg jelentve
az operatiot, ept ott segyrüh, hol
a Dom bordás; a mettristnél vigyár
ni kell hogy a belek elö ne ept,
arután meg nyisszuk a kővel,
is li horruti a gyermekot, le köt
tyük a ködök kőinost, is el vág
juk, nem elyhor a méh lapiny kel
lyett csak a hátya ilyenkor
ne bátorhadjunk oron testet li hor
ni, hanem lekövén, a ködök kő
nost haggyuk, ott az el vágott réjet
foglalyuk észre a sebet; vagy fleg
tromokkal, vagy varással, is kőnt
ugy kövörük mint a Cságrái met
trist

háznál; csak hogy itt is a seb ajakaké
szellei hörri: egyike végébe vájromy
Gihos tegyünk, hogy or örvé ne for
jon, hanem rajta higvágaok st. a hi
jot fejen. Ha pedig sündes, akkor a
mék leány, akkor el lehet vájartani
is hi horni

Hogy ha pedig a mettrés, a gyet
mehet a ház hátyákor való vagy
lodás, vagy a húst hűtő skincse, is
egy a medence felső nyílásába kö
tenkereszt erepedése véget jelent,
ve a méh hüvelyen áttal; akkor egy
kéj, el onyomni ilet hágya hüvely
vájromyat van beborítva; körténik
a mettrés a virellő kobyag: is
kémélisivel.

B. Stremérem Stremé léis két mettréséről.

Stremérem Csont irtésűlés mettrés
ar, midőn a stülis nem körténket,
vén, ar irtésűlés által vájartik, is
ar

ar áttal a medence höre tagitta
tik.

Ere a gondolatra pedig jössh
igy ok, hogy a stülis alatt, a
portroh Durradván, egy máj, tolta
vöröst engednek veszedelem nél
kül; ha tehát a terméret egyen
teperi: vagy nem elegendő kéj,
akkor át mettrém javalyát, a se
mérém Csont irtésűlést; egy leg
előrről is a Franzráh kezdettik.

De mint hogy ezen operatio
nah igen nagy hővelkerészi vagy
nah, u m. a Stremérem irtésűlés írt
ve nem foráa, ezen helgen virell
lö fixatúrák, a horegt irtésűlés
gy uladása, gonyedése, is Caries.
- 2^{or} Mivel nem nyerünk ezen
operatio által elegendő tért. 3^{or}
Mivel ezen operatio nah főnyire
oly Stremélyesen körténik, hűtél
a Csontok Stremédvén, a portroh
me

meg csontozódta, és a lágy részek által
 tal vágása után fűrésszel kintele,
 nitették által vágni az írezület,
 és mivel gyahorta az írezület, arily
 személyeknél ferdén is áll, a hol
 neheren kalálni is fogjuk a metéz
 nél. Ugyan ezek véget levejebbve
 szedelmével járva a Crampas metéz
 rész, a Premierem Gont metézésinél,
 ezen utoljóról fel hagyta.

Az operatio így történik, a
 lö obly hely kertesébe kérésük, mint
 a fordításnál, hi kell üvesseni a
 vágóbetét, de hülönözön a virellő
 hóagot; feje magyabban alyonja
 fan részre de beretváltan. Ezt segéd
 a labokat, egy a fejét tartja, a Trü
 lejt a sültő lábán körre esepkedik,
 egy Dombor élű hejjet; fel kereszven
 a Premierem írezület: át vágjuk egy
 a portrohig, a virellet el atírtjuk,
 és erután a katesert vágjuk a virellő

lö hollyagba, egyt a kateserrel egyik
 oldalon emeltesyük; egymás, al az
 után a portrot nyomás, al: felülvöl
 le felé, és befete: át vágjuk a port
 rokat, erután a lötöt is; De vigyár
 zunk: ne hogy a méh hüvelyt is meg
 sértyük; eret meg levén, a Crampot
 lassan, nem hirtelen, most ez által a
 lágy részek, és a hexejet egy írezület, ten
 vedne, egymástól távortatjuk; ezen mü
 ködés által irgatattván a méh az öpve
 huradágra mondják sültfajdalmah körött
 hi kájtakodik a magrat, elenherőbe sült
 foga sültéges, a mi itt vezredelme, liive
 ven a gyarmelhet: a Crampok egymás kör tö
 relitettven, az egytett metéz, rak taparok
 hal köttetik, are egy köttő övít seprent
 a labokat a terdabbe öpve köttük, a
 virelletett kateserrel borjítjuk, és a
 gyuladajt antiphlogistica gyógyítottuk.

A Sültés Mesterseges
Sültéséről

A méh leányok a nádortól való méstervégén, elválasztása alatt is, tyűk, aron hirt fogást, mely szerint a méh behő simeve veretett újvétel, a méhtől, hol egészren, hol csak régen kint választjuk el. Ezen működés vérszedelme, mert a méh leány, vagy igen erősen ragad, vagy a terhét semmit sem tejt ar elválasztva, ezért nem válhat el, is elválasztása közben, könnyen a méh sértetődhet, is vör folyások, gyuladások, gennyedések st. stármak.

Selentesik miho a méh leány igen erősen ragad a méhhez, is vérsime huzon stálhat által örve van nyölve. — 2^o Ha a méh igen gyengén vagy éppen nem hurodit örve, is miután a méh leány egy réped valóan, a máshat etnem bírja mást választani, vagy a véget vörös stármak. — 3^o Ha a méh görtös örve huz.

rodija által, a méh leány csak egy része válhat el, midőn a vörre maradot, sal véres körténik; a gört engede se után pedig: gyengéje miatt nem bírja elválasztani: a vörre maradt répt. — 4^o A gyermek születése se clött is, midőn a méh leány a méh aló réptek: a nyakához ragad, is a méh séjtés rárja.

A fővondóls: akkor midőn a méh görtös örve hurodit, is ilyenkor kell elválasztani a méh leányt, csakely lévén a vörre, mag a köbbök hurott leg, ked verőbb hi meneselt enged. Ha igen erősen ragad, akkor sepi vérszedelme ar anyár, de erőszakos elválasztása más gyuladástam adhat a méhhez, a mi ből fene stármak. Ha a méh séjtés ragad, akkor vérszedelme ar anyára, mert a vör folyás végest vérszedelme felnyegesti ar ileret a nagy gyengéje, a gyermek elere stinte a gyengéje végest.

is labra fordítás véget hozhatatik.
Ha csak egy nére vált el a méh leány,
nek, a méh nem, akkor a körtékés
vél folyás véget lehet vevadelmes.

Ha operatio a körül ídő szabad
szaba, ha megtervegen kell hi horni a
méh leányt, akkor hanyatt fektetjük,
kezét egyre fejével magoz, abban, sord
it keveset hajkva, és távolíva, ar ope
rátor ar egyik kezével a höldök kösint
végit, a másikkel a méhnyire lehet a le
pényker leg hörrelebb fogjuk, és kurrek
mind addig meg ellent állást tapasztalunk,
arutan aron kereszt, a melyet hi vámsi
akasztunk, a nébbe a höldök járása ve
rönt veressyüh a méh leányker, a má
sik kezünkkel el botyítván, a höldök kö
nort a hátra vippük, és a méh fenekét
lefelé nyomjuk, hogy a bent lévő kőrök
a méh leány hörrelebb jöjjen, arutan fel
kegyvén ar el vált nért, vjjunkal a méh
leányt a méhtől el választjuk; De így
kerrünk inkább a méh leányre temni a

nyomást: ar újunk hegyével. — Ha va
lamily nére igen erősen oda nyött volna
sínse a méh, akkor azt ne alagjuk
esőkalozan el választani; hanem el választ
ván eren nértől, a méh leány szabad ré
sre azt hagyjuk benne, és a körtékés fej
dalmat ott előfelé hajkuk, és hi korrak.
— Ha a méh leánya méh fenekibe, de job
ra odalt: akkor bal kézzel, ha fenekibe,
de balra áll, akkor jobb kézzel választjuk
el, ha pedig a méh mélső; vagy hátsó falá
kor ragad, akkor mindenképpel tehesyüh.
— Midőn a leány a méh sejtébe ragad,
és el kell választani, mint hogy ar el vá
lással, után a labra fordítás körül vége,
arint ere való kijelölésük körül vége, el,
ilyenkor a méh leány aron kélet, vagy
nért: mely más el vagy on való, vagy
körtékét belölte a véris; akkor azt fel
kegyüh, és ott kerdjük el választani. Ha
pedig sínse köreget keves a méh szá
ján a leány; ilyenkor kegyüh fel
aron nért, a mely leg uehonyabb;
mi

mint hogy are van a seble: leg hore
lebb. Ezt fel találván, et val apra
nyak a méhtől, de nem egészen, ha
nem csak annyit: hogy körülmel fel
mehez, ünk, a vir hólyagot meg vespertha
sülk, a gyermeket lábra fordithassuk. De
melyek ily esetekben az egész leányt
akaszták el vátazsani, de er nem jo,
mert ves folyás marad: a méh el gyengül
vén: öprve nem hurodhat, is mint hogy
a Circulatio ar anya: is gyermek kört
meg srünik, is csak a méh leány hi
horaja után, gy akoran lejöbb srülette
lik; lábra forditással a gyermek vir köp
sran tartaja után emek halálát ölt
kassya. De fervein a méhbe: lábra for
ditással hi horruk a gyermeket, mely után
ha igen et nem gyengül a srülö: a kormé,
sret a meg hátra tövö et nem vált répt
et vátazsya, is hi kajtya.

Ha a srülex et vátván, de hinen
kajtasthatik, ily onkor öprve nem hurod,
ha

hat van, réprint e végett, réprint a gyen
gegy végett, méh ves folyás kénad; ilyen
kor srükséges a mesterseges hi horis, a
méh leány nek, ugy srünte akkor is srüik
sigan, midön a leány fel este nagy, vagy
képfelenül a méh srájához ragad. Et gyen
ran jön elö, aróknál hi srörös srülettek,
hi a srül is alatt et gyengültök; ha a
méh öprve hurodásit gátsó öltök vagy
nah jelen, mint srül a belébe, rekedt
srük, is váteltet.

Az operatio alatt ugy fele srük
mint ar et vátazsánál fogyni srünte
ugy fogjuk a hötdök ksinort, is hurrek
nyg ellen állajt nem tapaztatunk, de
a mely nem vörre rantsis, mint a ra,
gajrtánál; Most aron körülmel: mel
lyet a hötdök ksinor véget fogjuk:
bi meggyünk a méh srájába, is hasánt
újunkal egy réprat hi horruk; de nem
egiszen, a vörre marado répt pedig
csak forgatás által fogjuk hi horni.
— Ha pedig a méh leány egy répre, a
terméret által kajtatik a méh hi
va

selyig, de a máj, a vére elmarad, akkor csak egy korunkat magyunk a méhki velybe, és fogat is, al hi korunk a méhki panyk.

Idő előtt erőszakos srülés.
acuta forse.

Er aron operatio midőn több srüli sri operatiot kapunk egy srüli, vagy vitelore, és a méh srüjait sagistyuk, a viré halyagot repertiyuk, lábra for distyuk: hi korunk, a srülapet el va lapstyk, és egy is hi korunk, ar erőszakosan hi korunk, és erőszakos a srüleit idő előtt. — Ezen srüli midőn hos nagy veredelom meljöt, midőn mind ar anyara: mind a gyet, mekre nörve; most minch előtt, te a terméret el valaptya is a hi hájtayra el hejrukt volna, igu neheren enged, ar erőszakos el valapstyk, és hi hájtayt, vagy ^{hogy} ver folyajok, vagy görtrök, és ^{ma} ve

veredelmes jelen, így el miatt; mind ar anyara, mind a gyermek mag hal; de ha nem hal is, igen könnyen tá madhat gyuladás, a mi a gyermek így arba mindig veredelmet, a gy et, mekre nörve; még arist is veredelmes, most isetlenül hurruk a vitagra, arist csak akkor kell ten ni, midőn el herül hezetlenül srüjegy.

Jelenetül midőn a terhesség ^{30m} utolsó hónapjaiba veredelmes göst, ves folyas, vagy más veredelmes baj ar, ja magát elő, mely a terhességgel obbéli örvé löttetésben vagy on, vagy teg alább a terhesség jelen létében el távortastni nem lehet, és ar ele ket a terhesség veredelmerketek. — Egy ha a méh lapony a méh srüjához ragad, vagy a méh hi terjedése miatt göst ered, vagy ha hült ö erő, csak által a méh lapony a méhtöl: ripsint vagy egészen el vált. — 20^{or} ok

382.
Hűh medonrichnél hol a Csajrák messze
rühögés, arany a pedig vagy nem elég erős
a Csajrák messze, vagy egyt nem alanya,
és ar oros a Csajrák messze rühögés el-
re lánya; ilyenkor ha megvan is díjelt
próbálni lehet lehet a horánsi erő, raly,
mesterjége, rühögés.

Figyelemre kell éven operatio
alatt, hogy egyik mi kézelt vege-
vén; ha a terméjret herd munkálkod-
ni: aronal a terméjre börtök a
rühögés; Egy ha a méh raly kigítas
usán, rühögés dalmai jönnék, a vörhög-
lyag rühögés, és a további rühögés
a terméjre börtök, mert er mindig
jobb an képi apt, mint mi kerünk el termé-
aharjuk.

A Terhes, egész idjéhez képest
egyféle képi apt fel a rühögés.

Bretlen eskorán rühögésről

Az Orak igen gyakran jönnék elő.
okai hülömbbfélek, a dispositioa nére,
örök, idjélt, és a későjélt.

383.
rühögés a terhesség gyengejében, és me-
rühögésében, gyenge horában, a mai
történet hova rühögés, hülömbbféle
nyavalyák, mint görbörés való haj,
landorág, arany is, dugulások. —
A hajlandóság mellett alhatmato,
sag az adhatnak, a hülömbbféle tel-
ti indulatok, bu, bromaruság, féle-
lem, ijeds, a rühögés testi gy-
korlások, mint ralyadás, lovaglás,
taner, korszak, ropr utakba a ter-
hek emelése, a rühögés isalok, fűpre-
ny, ételék, ar igen tápláló eddelék,
a bő vírűjég miatt a gyomor terhe-
léje; ar erős hánytató, és ha hájtó
orvosjagok, és arak melyek a rühögés
rühögés: hülömbbféle munkálkodnak.
mint a fakaj, vagy, antimonialis
képi mennyek, és minden erő oros-
sag, ha nagy dajsisba vétesik, hi-
vált haysabb ideig. Egy gyakran a

Ch

384.
China nagyobb adatjai is, ha a hideg-
lelés nem minden betegséget, sőt inkább
okai is adnak alkalmat a hajlandóság
mellette, különösen a hányás, köpés,
hasmenés, hideg lelés, az idősebb hideg-
lelés mindannyan gőstörök, rágatás,
részlet, bővérűség, tartós ajulás, és
hideg lelés, és: melyek miatt, vagy ha
organumok gyuladásaival járnak.
Ha hajlandóság nincsen jelen. ¹⁸⁴⁴ Az
szerepek, arutan mint indító okok
munkálkodnak, a vér folyás, a vértör-
pés, köhögés, és hányás, aranyis folyás,
egy csomóval. — Az medencei igen
törés, rendetlen állása, hínővesség,
a méh süljedése, elörs, vagy hátra-
adats való fordulás, méh hemingés,
virkor, gyuladás, tojás, fészek betegsé-
gei, melyek gyakorta több évtizedes
lapanganak; meg nem születésük, és
mind hajlandóságot szerepek, és mind
indító okot képeznek. Rendetlenjégük

385.
szélben, mint rekedés: hasmenés, a ló-
kövülés, ezt nemcsak kagadják; de a brachy-
bizonyosra.

B. g. Az gyermek betegségek gőstörök,
rágatásokról, hífejködés, béli bajai, a
gyermek halála is ad alkalmat, és gőst.

C. g. Az örökös vérsínch betegségek, a
potyó. — Így ha a köldök kóros igen
vid, és a gyermek morgása által hurvát
ezt irgattya, a méh is a lapány korak
váltakat olorrah, vagy ha igen koppen
a köldök kóros, és csomók vagy naktör-
ta, és így a vérkeringést gátolják. Ha a
méh lapány igen káros, gyuladást
meny.

D. g. Az gyermek károsíthatja igen
gyengejége, a korán való rekedés.

E. g. Az gyermek vir és törés, és
mind aron okok: melyek a gyermek halá-
lat olorrah, mivel vagy dinamico, vagy
mechanico a testet irgattják.

Az érteslen születésű a gyermekel
vejr; a korán születésű pedig a gyermek
élete: a gyengejége miatt szinte veszedel-
ne

meg; ar anyara nérue gyengejét, ves,
folyást, tappango gyutadást, hemingedist
okor, mind ar isetlen, mind a korán valo
srülis. — És ha ar isetlen; vagy korán
tis, vejedelmes hövethereji ellen: ar is
meg orvos hörben járva által börtöri,
tatott is; ar ara valo hajlandóság megis
meg marad más kora.

Aromba ar okok nem mindig hőköl
elő ar isetlen: vagy korán srülis, mert
csak alig lehet képzelmű a terhet, a
hük a 9. holnapok lefolyása alatt, ar
emlitett okok hörrül, egyjité ö májike
nem munkalkodott volna. — Midőn
pedig ar oki ok erőjén bí hatott vol,
na: hogy annak rojt hövethereji vagy
nak, akkor néha aromal, más kor utóbb
ered, csak ar isetlen vagy korán srülis; mind
aron által néha hogy a békátörés, a tö
vetkeris aron srempilantatba hövethere
zen; hanem a vésorajok hozzább vagy
rövidebb ideig valo tartás ok után, ^{előtt}

vagy hejőbb hövethereji; sőt segetyig
horatván, akkor meg gátolmi is lehet
ar isetlen, vagy kora srülis.

Ar isetlen is korán srülis előre
mondo jelci ereh. — Selli is terti val
sorast srenvedett, bád gyatt, tagjaiba faj,
dalma van, it vággya meg kizebbedik,
srinte a sromja is, is fel böfögési vagy
nali, a sréli rehedt, a virellis, nekis, ar
ábrarapya halaványabb, vagy igen fel
kivül, sraj ira rojt: nyálhis, néha bor,
zadorajt hidaggel fel váltva erer, gyom
rát hőmjén meg terheli, átma nyugha
tatlan, erehnek hozzább: vagy rövi
debb tartás ok után fajdalommal ered.
a keszget táján néha; néha a haj,
ban, ereh alatt gyatorka öjetönörte,
tik a virellisre, mint ha valami hi
akarna eni: apt csi: a 6. holnapfele,
ar emlitették tartás ok után vésfolyis, rást
marit, mint a hus, tiker haj onto, a gyet
mek halála jelci mutat hornali; a gyet

mek morgán, nem érhető, a ha, nem teljes,
 többi; nekik mint ha valami akaszt,
 mi a méltól, a ha aron öb alra dül,
 melyre a srülö felvrit. De ar indiso
 termézetekhez lépest: erelker máj, öb
 is kapt, oltattak, mint máj betegsé-
 s.t. De a melyek laz, abban fejlődnek
 li, minchutanna erel több napok is o-
 lig, is sokszor hetekig el tartottak vol-
 na: onutathornak, magának a srülö,
 nek elötte mondo jelei, a melyek a-
 rönyszer srülö, elöre mondo jelei.

Késdig: meddig lehet várnem-
 séget a választás, chat el távortattak,
 olyannal, a melynek máj ar elöre
 mondo jelei vagy nahi jelen, vagy
 meddig szabad? — Remélhetjük meg
 a gy, esmek ha a srül fáj dalmalmi,
 tenek jelen a vir hollyag nem formáló,
 dott, a vir meg el nem ment; ilyenkor
 remélhetjük meg tarthatni: a kes-
 kes, ég rendez folyamottyára vissza tart-
 ve

ni. De ellenkeröbe nem marad romá,
 nyunk: a meg tarthatásra.

A Bának modgya a betegség
 külfömbb irakapraiba; ha máj el
 kerülhetetlen a srülö; de ha re-
 menyünk van a betegség meg tar-
 tására, akkor egy a bának mod.

Remélt. Nekik ruhából kivétel
 lejár, vízerányos keménybe ágya
 oldatvái felidőnk, a törésötör e-
 löre görböre besakarjuk hogy ne jár
 son, de ne is isradim; a endigyet
 nánunk tefi's lélkeri néve, kéleve,
 jó lipca legyen, a kiirejireje vigyi
 kunk —

A Bőr li görölges, a mértelletes
 tartás mellett, is faharag mellett nem
 kívántatik semmi. — A vírelekre ha
 örtönt iser: javalyuk. — A srülökli,
 terrel, vagy gyenge ha kaptokkal. po.
 oleum Ricini távortattuk el. Erél
 után fel keressük a betegség indiso
 ok

399.
ohát, ha jelen van el távortatásuk,
ha lehet; ha nem lehet a béka-
sát hijs, ebből is, ha bő vérség ar
oh, akkor is vágás, al 6. 7. Unciara
Delső kétféle mandola fejetet ritrummal
vagy más fel olvartó soval, vagy sópelt.
- Ha görté ar oh, akkor görté allenyel
adunk, ha a méh rendetlen felhője ar
oh, akkor ugy felsetty üti hogy fel
jön, ha seki vrontás ar oh, akkor gyenge
kajhajtok, ha pedig dugulás, oh vagnakoh
al testbe. p. o. ar arany ereh igen meg
nah telve, a vért a méh felé hűsít
ilyenkor ar arany is ellen kell munkál
ni, ar előre vagy kora srülis meg gátolá
ra. - Ha ar indító oh más mint jelen
akkor a vízre maradt fogamatok
lapitnyuk, így ar ütegből seásmarott
ladást csilapitnyuk: orvay lass al, vagy
meg ijédett, akkor meg ijédett követe
reje ellen munkál adunk; vagnakoh
a hol a kora srülis semmi olát nem
látjuk, ilyenkor Symptomatica orvay

391.
a jelen lévő beteges, baj hörrül: a leg
vegyedelmesebbet; néha fel talályut ar
ohot; De lehetetlen el távortatni p. o. a ke
rept csont elő hegye: igen előre alvian,
nyomja a méh hátfelel; vés folyás, is
kora srülis ohot. Ilyenkor a mennyire
lehet a Symptomák egy his vérsere testi
is delhi nyugalmat ajánlunk, a hi ürejté
sehet fent tartjuk, is így cherünk a termé
sretet srinte horra vaktatni a béka
táhor. - Erchére így helyesítvén: gyak
ran körtünk hogy a srülis előre mon
do jelei mutat; is a kora srülis
meg ahadajortatuk, is a terhe, is fog
tatty a venter járás at. - Ha a gyér
mek meg nem halt, a srülis fáj al,
mah nem valószínű, ha a méh
sraj nem tájuk, a vir hollyag nem
formálódik; is nem terjed; ha ar ok
el távortatható, akkor lehet a fen
tebbiek által remény lenni a kora
srülis meg gátolását.

De ha mind erek mellett ar dot
 vagy ártalmos, hővethes és távortat,
 ni nem lehet, valószínű, sűrű fájda-
 mak által bű; a méh szája tagul,
 a vir hólyag formálódik: és reped, a
 gyermek holt; ilyenkor a terhést
 mint sűrűt tekintjük; és még
 a terhesség 1^o b. hónapjaiban van,
 akkor a gyermek fűvesség nem ismét,
 sűrű vöröskék tekintetbe, mint
 hogy akár mi fűvesség is hi háj,
 kaphat; tegy nevézetesebb jelen-
 sége lévén ar ilyen sűrűnek, a
 vöröskék. Erőse tekintetbe lévő,
 aránt aron lépés a Dieteticai ren-
 delésüket folytatva. Ha a sűrű
 fájda mak: és méh szája tagul,
 a mellett a vöröskék, hisz, abbédett
 vagy hisz, abbédni kezd, akkor ugyan-
 nent vele: mint a rendszeres terméke
 fe.

tes, sűrűnek sűrűnek; Adak fel,
 sűrűnk, és a fájda mak hi dolgora-
 sít kilyuk. ar 1^o b. hónapjaiban.
 De ha valószínű, sűrű fájda mak mel-
 lett nem tisztosít a vöröskék,
 sőt nagyobbodik, akkor oly belső
 szerket kell használni, melyek
 a méhet ar örvén kurodásnak,
 könnyen, a sűrűt elő mördít,
 ják. Ilyenek a Cinamonum,
 Spicacoana, hisz adagba, a Seca-
 ti Cornutum, a Stantia, Galoly
 vöröskék, ellen jó, a hol nem
 oly sürges, igen: a vöröskék alízsa.
 A fájda tinkturából adunk min-
 den fél órába 10. 15. Cseppet, ha
 esélyesebb a vöröskék, vagy igen
 ingerékony, akkor 5. vagy 8. Csepp
 elegendő, így igen szeretik ren-
 delni leg inkább -

Recept. Melisso ʒij
 Tinctur. Cinam. ʒij

Syrup: Rubidi 3ß

vagy oron Compositisokhoz még egy
Scrupulus Spiritus Sulfuricus adunke,
vagy a fahéjból Theat kérszesnek, és
vagy magába, vagy Chamomillával ve-
gyítve, vagy veltogassa adatele, némel-
lyek a fahéj úrat Prescrib rendelni.

Rpp. ʒ Mellis ʒij

- Cinamo: ʒij

s. minden 2^{ik} óráig egy evő kálmán,
az Speccosomat igen jó rendelni, ahol
a görteve való hajlandóság vagy onje-
len. így -

Rpp. ʒ Ra: Spica: ʒij

sach: albi ʒij

M.D. in Doy 8.

s. minden 2^{ik} óráig egy port. Ha
fontosabb a vesefolyás, akkor a Cinamo,
mummal kössük az Speccosomat össze.

Rpp. ʒ Ra: Spica: ʒij

infund: ad Cola: ʒij

Elixir: acid: Kalle: ʒij

Syrup: Rubid: ʒij

s. minden óráig egy evő kálmánal.
Ha ajúlásokra való hajlandóság vagy onje

jelen, akkor hi haggyuk az Speccosomat.

Ha lúnya az Individuum: neheren
irgathato, akkor a Secale Cornutum igen
jó, a melyet főzet formába, vagy port
formába lehet rendelni, így az legjobbat

Rpp. Secale Cornuti ʒij

fi: ʒ sub. Divide

in Doy: 12.

s. eleinte még 5-6 Doyt
arutan minden fél órába egy
Scrupulus port. Arutan vá-
runk egy ideig, és ha szükség
arutan ismételyük a portot

A gyengébb belső Prescribhoz sa-
tornati a Melisa, a Chamomilla, a
Millefolium,

Külső léppen az észlelt sé-
lésnél, a vesefolyás ellen: ha er más
többlet: nem szabadunk semmit
kapszálalni, De ha a sértől fájdalom,
már meg süntetven, a vesefolyás
vagy nagy obbodite, hogy v. predelen
mel fejeget, és más alkett belifaj.

Dalmah niny, enek a srülönék, akkor a
 hideg borongatás a legalkalmasabb
 eset: jég, kovir alkalmaz. — De a hi
 deg borongatásra figyel merrünki, hogy
 1^o Csak akkor használjuk: mikor
 igen nagy a folyás. — 2^o Mikor más
 fájdalom miatt jelen a hasban. —
 3^o Mivel a hideg borongatás igen
 hamar has a méh vesző edénye
 ire, csak fertály, vagy fél óráig has
 náltassanak, arután hideg ruhá
 val cserelezz, enek fél. Ha sokáig
 használattanak, akkor leggyalrab
 ban méh hemény edézt, sőt elnem
 álitható. és ismét megújuló vesző
 szármarik. — Ha pedig nagy lévén a
 víz folyás, a srülönék görbe van, elkor
 nem hideget, hanem kásar meleg fü,
 költ ruhát használunk, a csövelébb
 esetelbe, vagy aromaticus Gesch,
 kel költött kásarok használunk, a
 hasra, vagy füperes füreselbe má,
 40

sőt, és li faszart ruhálat borongat,
 tyuk. Attaly ába irgatok légyenekitt
 a srülök; ha igen gyenge a srülök, ak
 kor borral készült fororatakkal bo
 rongassuk a méhet.

Ha a víz folyás a hora sár
 lénél: mind a lütyő, mind belső
 srüclenék nem enged, akkor kenye
 rüclék is dörrelük a méhet.
 — De elöbb a sójás kártyákat g
 regegyük. — Ha a gyermek ví
 ti folyás a után: a fentebbielre
 sem srüclen a víz folyás, akkor
 srücléges kenne a méh srüclenél
 vő gyermekét kéréll ki: kér ká
 son újjal li kurni; a méhbe a lü
 rel menni itt nem srücléges. —
 a gyermek el lévén vályartua, ha
 meg ~~szent~~ a vesző, sem srüclen a víz
 lé, a fentebbi lütyő: és belső srüclen
 használjuk ismét. A srüclen srüclen
 sőt a termézetre bírruk, a mely
 67

eren srülésnél mindig hosszabb, mint a
vendes srülésnél, úgy hogy sokszor egy
nap után történik. — Ha a méh lépény
el valóan a méh srájába: hajtatott
valna, azért nagy kell lenni: mint a
des srülésnél, csak hogy itt a köldök kö-
nost erősen meg hurrul, mélt 2^o agra elől.

Mikor a srülés a terhesség 3^o utol-
só hetnapjaiba hora srülés képe
kor nagy kánusok vele, mint a vended srü-
lésnél; ha vesefolyás volna jelen: a mi-
ntha eset, gyírfapittorok ha rendszeren a
fehves, akkor labra fordítás srülés
a képezt fehérsé. Egy ábrán az is
a hora srülés sokkal tovább tart, mint
az érett srülésnél, hivalt az 1^o d^o
szakasza, hogy a srülés idő szakasza
sime hosszabb, is a vörös nagyobb,
mint az érett srülésnél.

A Késő Srülésről.

1. De partu serotica

Késő srülés az, mely a 9^o hetnap
végén tul, a 10. vagy talán a 11^o hetnap

ba történik. — Eren srülésről többek
a vélemények; némely orvosok lehetet-
lennek állítják; némely Turistak el fo-
gadni nem akarják. — A késő srülésről
apriore a lehetőséget engedni lehet, de
a posteriori alizani bizonyos halka-
talannak bizony. Nagy nehézség hol
a srülés morális, aba lélektudni nem
teheress, tekintve az előjött való-
ságokat, a srülés a 10^o hetnap 1^o 2^o
3. 4^o hetbe, sőt a 11^o hetnapba is
történhet. De ily tapasztalások csak hi-
jazok körötte, a hol csakis az ólmis,
az aprony jó morális Characterü, de
más szemelyekről, mint hitnek mint
férjek, vagy attól el valóra vagy nah,
vagy férjektől távol vagy nah, a hol
mindenkor valamely ok vagy on a lés
lára. Midőn az orvosok bírák a
virgálás, az ily srülés seget, igen nagy
vigyárral legyen, sokszor csak az idő
srámitaiban hibárik a terhés, arótté

ti ar orvos, virsgálya ar orvos. De ar a Bina
 de j'ibe nem kerül, De ha a szülés ar
 által valami ... hiván nyumi, akkor
 orvos, ar virsgálya ar orvos. Hogy pedig
 tovább tart a terhesség, több aróltal fog
 számoz orvosok kéretek. Így 1^o Oly beteg
 végbe szenved, mely a gyermek hi fejtő
 de is gátolja; Így vités, hosszabb ha
 menés, sebek által el vesztett sok né
 vel véget. Ha szenvedett 3. 4. hétig
 is arórtelen hova szülés, vaktörés, a
 ha buba, szomoru sárga szenvedett,
 a mi által ar emésztés káplálás, is vit
 léjrités gátolhatik. De kátharmat meg
 más sok gyengítő betegségek. — 2^o Az
 anya körönges, is helybéli betegségek.
 — Így lük droptere nek hosszabb idig. —
 3^o Mivel a máhbe lévő gyermek nevesz,
 kes betegségekbe szenved; így Schrophula,
 Rachitis, Spina bifida, Virhorrag; ha egy
 gyilk vagy a másik tojás fejtelen meg vagy
 nak homonyedve; hárt ar néha idő előtt

Hülést is oroshat. — A terhesség alatt
 is némely jélek jömelek elő, mely más
 terhességnél nintsen. Így a 9^o hónap
 végével a szülés előre mondo jélei mu
 tathornak, a has süllyed, fájdalom
 lettek, a szülés rézrebbél nedvesjégyfolyt
 a vir hólyag formátadott, a virellejre
 való örtön jélei van, a méh szája tá
 gult; De cran jélek ismét el mutnak,
 csak a méh szája marad nyitva, is
 ugy a terhesség arútan, a terhesség
 tovább folytopdik a szülésig.

A 10^o törvény széli orvosok által is a
 hogy a gyermek nagyobb, is nekerabb, nem
 igaz: mert a hi fejtőre végett a gyer
 melnél gátolhatván, a szülés némely
 kor, is köbprő hízabb a gyermek, arórt
 hülönös bány modok nem okajt, hi vé
 ven ha valamely réz betegesen nagyobb
 p o. a vire fő; ilyenkor hülönös bány mod
 mellett nekerabb a szülés. Ha csak
 egy edül a gyermek kéretek ar orvos aleji

402.
be, és itéllést kéretik tölle, a fejlődés
lényegét, akkor várja meg hogy költetés
itéletessé nem adhat, hanem bírjon
ésmértetni a szülövel, Characterével,
háza, életéről, minő válságok között
és a terhesség alatt, a mi a 9^{ik} hónap
ba is ha tapasztalja hogy olyan mentesül
re, melyek fejlődés szülést ajánlanak, a 9^{ik}
hónapba a szülés előre mondó jelei
jelentsék, de ismét el multhak; akkor
mondjuk hogy oly válságok mentesül
melyek a fejlődés szülést mutatják; de
hatatlannak ne állítsuk. — Alapjában a
gyermek süpparól is hozzájáról a fejlődés
létre ne itéljünk. — Ha a fejlődés szülést
okoro betegségnek, és olyan előre nem
is, mégis néha a terhesség 9^{ik} hónapjában
történik a szülés.

A Bányás módja a fejlődés
lényegét, meg agyger: a miat előbb leírt
szülési bányás móddal.

402

403.
Azon Betegségekről és
test belüli hibák: és ren-
detlenségekről, melyek
kárt okozhatnak már
a Terhesség alatt, hol
az anyára, hol a gyer-
mekre nézve, a Terhes-
ség rendtelenségét, a
Szülési nehézséget és
rendtelenségét okozzák

Ezek fel osztattak. 1^o az Anyára.
— 2^o a tojásra. — 3^o a tojás egyes
részeire nézve.

Az anya részéről lévő hibák 2^{ik} fe-
lül. 1^o olyanok melyek a szülő részében
lévőek, az ar hőmérséklet. — 2^o
melyek a szülő részében vannak, ar a
különös, és helybeli. Ebből világos, hogy
a hőmérséklet háré helybeli bajok is
mivel vannak, de a szülő részében lévőek
na

nah. - A' hörön, egész eh körré számlált
lyuk, a' követhereendőket leg inkább: ar elő
jövetet, így a' Bővérűség, a' fiatal kor, gyer-
meség, gött, tartos ajulás, aron betegse-
gek: melyek véget a' lélegzés rendeltetés
tételük, így ar anyán, vagy gyermekre ve-
szed el meglehetnek; ezek vármosot, a'
számláltatnak hülönözön a' Tüdőpula-
dás, a' Tüdő horvág, a' máj, is akár mely
vizek horvág, has vért horvág, ar altest ből
betegség, melyek a' has falak árva hül-
dását gátolják, is a' rechejt felfele-
nyomván, a' lélegzést gátolják, s' mint
ide számlottatnak még a' has organum
keményedése, vagy máj bajai. - A' ar any
körön, igaz bajaihor tartornak még a' gyf-
va, s' is, ar igen alaxony test, vastag
vid nyak, a' gerincz görbülése, kemény-
dés, a' hasban, s' is, is virellet & ekedés,
ar anyát daganat, hányás, hasmenés, fel-
be hagyó hűdégelés, minden nemű gátló-
ca hűdégelés.

A' Okolú melyekből eron betegse-
gek származnak: a' körön, egész eh, melyek
máshor is elő korra a' betegséget; de itt
hivata nem elyehet a' terhesség is sejt.

A' Bana's mód ar: mint a' nem tel,
kezdhet, csak hogy oly orvos, a' trachea,
s' tüdő, enche el, melyek a' nedveknek a'
mék felé való vésztolodását is irgatót
olornak; A' d' d' pedig a' máj a' termé-
s' szes munkáját nem akadályoztatják, ar
bírni ölet, de ha igen: akkor hi kell
fejteni a' magratott mesterségesen, né-
ha ha veszedelmes: még a' terhesség
végén kántricitattuk keményket a'
mesterséges idő előtti születést véghez
vinni. - Kemény hülő orvos, igaz olat
is ne használynak oly helyeken, a' hol
a' mék felé való vésztolodás olortatik
p.o. Ha is vag is jelenségek, aprt a' la-
bon ne segyüh, s' mint a' Crombol bét,
is s' mire jötriket ne rakjunk, a'
la

láb úrcher se rendeljék soha a tal,
kesnel. Kér fordöt, vagy gyenge hörön
ságes fordöt lehet rendelni. Az orv
ságotat pedig a nagy ingerikenyig
att; italyaban hissebb adagba nyujt
nyuh: mint sem keser alapotba.

Erre betegjégek hörül: nem
lyak hülonö, fekvést tartanak sük
ságes, a sükös alatt, így a mellbe
tagyáig, vagy akár mi betegjégek,
a mi a lehellést gátolja, fél ülö fél
félvö helykeretést hívámak, szinte
hük rövid vastag testüch, a hük gojva
sok fél ülö fél félvö helykeretést
hívámak, vir eranyoba: a guta üthetig öse

A medentre hibait tapasztaljuk
vagy a medentre böségiben, vagy alja
ban. — A Böjégek kétféle hepp jelen
ti magát, mind a keserjégek, mind a
sükösre. t. i. rendkívül Bö, vagy sük
medentre. — Allására szinte kétféle
hepp lehet rendelni, vagy igen nagy

vagy igen kicsiny a hajlás. 407.

Rendetlen sük a medentre
minden ar átmerő jóval hissebb,
mint egy rendszeres hörög nagyságn érett
gyermek sükösre slégságes volna. —
Er lehet vagy hörön ságes, ar ar min
den átmerőibe sük, vagy pedig csak
egyik, vagy másik fő tájékába po.
ba menetelbe vagy úragbe, vagy hi
menetelbe, vagy csak egy átmerőibe
sükébb a hörön ságesnél, oman van
a sükösre, hogy a medentre minden
csontján hissebb. így a kicsiny appro
nyoknál, de lehetnek a medentre on
sok rendszeres nagyságnak, de a keserjé
gont maga ar egész hosszaba hepp
nyebb; minden pedig csak egyik tá
jék, vagy átmerő sükébb, emel öta
csak egy csont rendszeresége p. o. ki
növes egyik csontban, vagy rendszeren
hajlása, de ezt sokszor a tárgy végrebb

előforduló li növény, Daganatok.

A Medentre srübe emestetője
 lei, rérint körönség esek, is hülönö, de
 ilyenek ar aprony igen alacsony, vagy ve
 lony kasszi, rendetlen, is neher járása, ar
 aló vagy felső vektagok görbülése, rü
 bége, a hat görönsz görbülési, a Cipőök
 rendetlen alása, a kereszt fajék he,
 kony sége, nagy hajlása, vagy laposja,
 ga, a nagy srüto réreket rendetlen
 alása. — A felső vagy hajbéli vör
 gálánál, a be menetelnél, ar cloke
 gyat vagy el isjűk, vagy nem megre
 van a kereszt Cipő lónt egyesülete
 körrel van ar elő hegyker, a Cipő-
 Gons névtelen hozzá egyenestlen, it
 ten vagy a srüto rérekte li növény
 van; a nádra réjék vagy nem, vagy
 neheren éri, a méh magoz, ar áll, ar
 üregbe, a kereszt lónt li vajúlájat
 lömnyen isjűk: a nagy srüto rérekte,
 21

vagy a Csontokba: li növény, vagy da
 ganat van, ar ir vajúk körrel álak
 be felé, a szem írem felső stalle, is
 egyesülete li felé van ajkoyodva. —
 A li menetelbe is fasztrik hozzá
 nem morog, a szem írem is srü. st.
 ar ártalmak erék a keskes, is alatt,
 a méh magoz, ar álvan, fel srüt,
 tya a kereszt, is igy a létágrist ga,
 tolya, is igy vés köpést: gyuladást,
 sött kolodást, a főfelé, srüülést,
 főfajást okor, srüke is virellése
 raledésit okor. a kereszt fajékaba
 fajdalmat, a méhnek nagy rére kím,
 te nyomtatattvan, is irgekattmak
 ar örve hurodizra, is lora srülisre.
 — A srülisre nerve nagyobb ar á,
 talmak, igy ha Csak kereszt srükel
 a medentre, igy fel Csokkal, alát tö,
 könsége, a kis helybéli hepp; ilyenkor a
 22

Szülésre ar ívett gyermeknek; ha a szü-
 lésre szülésig fel tártalak jelen vagy
 nah, akkor a szülés hozzávaló: fájdalom
 lesz, de mind ar anya mind a gyermekre
 szedelmre nélkül történhet. - De ha
 más által egészbe, által csak hajbéli
 hágy szülés, más fel orolom fut, vagy
 hogy tegy, több mértéke csak szűkít
 el, akkor ar ívett rendszer nagy ságu-
 gyermek a szülésre hívás után felte-
 telék mellett, azt vagy nem bírja
 meg, vagy ar anya, vagy gyermek keli-
 tével, vagy kárával helyesíti. Ilyenkor
 tehát megkeresg szülésig. - Neha oly
 szűk a medentra, hogy tegy, több mé-
 rtéke 2-3 is fel, néha kevesebb is, is, is,
 ilyenkor ar ívett rendszer nagy ságu gyer-
 meket, meg csak veszedelmekkel szem-
 szülheti meg; a természetet ilyenkor ha
 élő a gyermek: akkor a Csájrái mészis,
 ha kelt fel tétel alatt: ar ívett ^{is}

a 2-3 Dö Szakarra ~~szinte~~ a szülésnek,
 a 2-3 Dö Szakarra szinte Csájrái met,
 részt kell tenni; arírt is a fentebbiek
 her alkalmasatt va. A medentra szü-
 lés Bon grádus na szűkítik orotani.

Mi a szűk medentrájú Terhes ar
 könnyel való bánás módot illeti. ¹² is
 ara kell figyelni, hogy semmi más be-
 tagos állapot ne járjon hozzá; így ha bő-
 vüri, ezt meg előzzük, ha szűkítik haj-
 lando könnyü emésztésü alapját ar,
 gédünk, hogy a lágy szűkítő részek amél-
 könnyebben ki kerjedjenek; néha lágy
 metag fordókat rendelünk, a természet-
 tes kiüresítéséről gondalodunk, ar
 ártalmos befolyásoktól kerülszünk,
 ezek által symptomatice bizsabbite-
 tel: valamennyire a baj.

A Bánás mód a szülés alatt
 lülöm börtö, a szűk alapathoz képest.
 Így ha szűkítjük hogy a medentra
 csak néhány linianál szűkít, ha

meg is leereszthet a méh; ha a szék-
lívre kívántató fel tételék jelen vagy-
nak, a terméjre bürök. Az 12^o

Dö Szakart; Csak a szék, is virellet
hi üresítést tegyék, is ar erőlködés
röl. kelték, ne hogy erejéből hi
foggyon. — Az 2^o Dö Szakarra
néve; is hogy alkalmas helyen,
tetszebe tétessen: jó homény ágyon.

— Az 2^o Dö Szakarra a szék-
nek, is meg a memyire lehet int-
gyük ar erőlködés; is kerülni kell,
lag alább akarattal apra ne nevelje,
hogy a 2^o Dö Szakarr végén legyen
ereje a fő hi kajtására. — Az fel-
vejt eren Dö Szakartban nagy figye-
lemmel rendelgyük, ha ar ottal fehéris
lehetőség; hanyatt soha se fekteszük, ha
nem ottal előre: görbét körvállal fel
kurott: is távolított kerdéllel. — Az 3^o

Dö Szakarra virelletgyonon fektessük, is
elkivortassuk Crombjait; külvörösen a
köröp kurt apokult, hogy ar nagy kurt ne,
nem vedgyen. — Az 4^o Dö Szakarra
semmi külvörös bány, mod nem sültig,
aromban a sültig, is eren grádusában is ha
nagyobb a rendszerül a gyermek, ha a
mék örve kurodásai gyengít; st e f. dol-
miatt: megkerjegy, sültis kívántaték,
ilyenkor ar 12^o Dö Szakarra a terméjre,
re bürök. De ha látkyuk hogy gyengül,
is a terméjre, sültisre való fel tételék
kurt mintzen, elkor megkerjegy, sültis tét-
betölle: fogó alkati sültig.

Az medentre sültinek 2^o lépés:
je midön jelen van, ar ar fel erőlon-
tal sültisebbék ar át mörök, is látkyuk
hogy a terméjre, vagy nem, vagy vesre,
dehem nélkül nem bírja a sültis. ilyen-
kor ar 12^o Dö Szakarra ha a terméjre
kivántató fel tételék jelen vagy-
nak, egyt a terméjre bürök; a fáj dalom
hi dolgoraját, felintgyük a szék, is
virelletet, is hi üresítgyük. — Az 2^o

414.
Dö szakasza is a termékre birtok,
addig meg a szülésre hivatalos fel-
tevel jelen vagyunk. De hogy em-
idő után mielőtt helyen szül fogos al-
kalmanni; alba meg nem igyervele,
melyek a víz helyre repedje után ak-
jék. Akalyaban mind addig meg a sz-
mészet: bár lassan is, de meg is munkál-
kodik: ara bírdak, bár hosszabb: több ór-
oraig is tart. De ha látjuk a szülőt,
is a fájdalomak gyengülni, a főt nem
mozdulni, a szülő néreket érintenél
belnek, szaradnak, akkor szülésig
a szül fogos haználni; ha bárhol
2-3 óráig is tartott a szülés, vagy egy
óraig: a víz helyre repedje után. Itt
a szül fogos haználtása, is alhatma-
tatás a mindentor neherelt, mint
ar 12 lépvőjibe, a medentre szü-
lőnek; is a Crognosis is helyigyele;
mert sokszor holt gyermekek hárunk
hi. — Ha fogoval hi marditani
nem lehet a főt, vagy vale meg
fo

415.
fogni; vagy ha a kaponya csontok
engednek előre szorítás, is a gyermek
holt, akkor át furni kell a főt. Itt
Dön eren 2-3 lépvőjibe a szülőknek,
igen jó erje van, a gyermek kis, ette,
a varrányok meg lágyak; ilyenkor vagy-
nak példái: hogy szül fogos nélkül is
meg született a gyermek.

Fogyás Itt lehetne hiedés: a
midőn a fő a medentre szorul, is
a gyermek elate jelen nyilváno, a
szülőt kaptatassni nem szabad itt.
Kördis nem lenne jó a szülésen szor-
kol egyezület szor makkani, is a
nyert levek kirel a szülőt elöre mo-
ditani, hol ott midőn csak eren egyke
egyedül futással lehetne a gyermeket
hi korni: De halva; ilyenkor talán
szabad is volna a szülőt wepedelem,
neh hi korni, melynek a meg is távo-
lithato: hogy a gyermek 7 szabaditasson.

A medentre trühenek zikely
csöjébe, midön oly nagy ar, hogy arad
éle fö bele sem eszkekedhet; akkor akis
éle, akis holt: Csajrás metris trühe-
ges. De ha még is annyi böjög van jelen
hogy ar elöl álto rész bele eszkekedhet,
ilyenkor ha élö a gyermek, srintse
srias metris trüheséges; ha pedig holt
a gyermek, akkor pusztal vesztékü.

- A 4^{ik} Trü szakasz körönvéges.

Ha a medentre rendkívül ha-
ges. s. ar lap midön mind on át mivő-
be tagabb, mint egy gyermek meg
lepesése trüheséges, vagy kivántastua
akkor a terhe, ig alatt lejjebb eszkekedik
a méh, hivelt a 3^{on} utolsó kolanpba,
is könnyen támad a nyomán áttal sri-
is virelket vechedés, méh élö is, élö
hátra való bukás, a mi nem ves folyás,
kora trühe, a körrrel lévő lágy ségek

fel dagadása is viret gomok. — A trühe
alatt a gyermek vir hamar el foly, is a sri-
is trüaron történi; ha pedig igen hamar
tagul ki a méh szája, könnyen vir hol,
lyag repedése nélkül ki hátkatik a gyet,
meh a trühe után; arután ki sri-
a méh, is viret trümarit; ha vir,
folyás nem trümarit, akkor ajánlag,
gyengeig trümarhat, a fant jász alatt
is történi, hogy egy fájalom alatt ki
hátkatván a gyermek a földre, ettül
a haldööh kismor el szakadhat; sőt
vagy nálk példái: hogy ily állapotba a
gyermek a haldööh kismornál fogva
a méh lepenyét hurván, or a méh
penéket srintse be türejteti.

Okai ha mind a Csontjai na-
gyobbak; ha a herczt Csont jóval
sri-esebb, de valamint a meden-
cre trühe: nem egészen, hanem
csak bizonyos tájai, vagy át mivő.

egy a böség is, vagy csak be menettelbe
 tágas; így ha az élő hegy hűsiny, ha
 a keserű csont felső részén sűrű,
 az üreg tágas, ha a keserűt hi vajú
 lása igen nagy, ha az ir vajú hi
 csinyek, a himenetel tágas, ha a
 szemérem csontok hi felső vagnak
 ajkhoz odva, a szemérem iv sűrű,
 a farkik kavul van, vagy igen mozd.

Az öö medentriju teskeje
 nek javasolyuk, hogy sokáig
 ne járjanak, fehérdjenek hangyát,
 több oráig, napjába könnyű eme
 rjú eldelakot egyen, sechivül
 gondolhódnak, és a virellet hi üre
 sítéje intyül. — A sűrű 10 öö
 srakarba hangyát fehérest ajánlunk,
 hogy a sűrűt lassabban törtémjen,
 a fájdalom hi dolgorásat síttyül.
 Ha a vir hollyag képrődik, a méh

srája tágul, a vir hollyagot meg abba
 az öö srakarba meg reperttyül.

- A 2^{ik} öö srakarba már nem vir
 arányozan, hanem keveset focz,
 kolt fővel hangyát fehérestyül; a
 fájdalomat síttyül hi dolgorni.

- A 3^{ik} öö srakarba olyan mint a
 2^{ik}; és a 4^{ik} öö srakarba a sűrűt lass,
 san ves, rüh hi. A gyermek így vna
 vir arányoz fehérest adunk, adalt, a sít
 ket és virelletet hi üresíttyül; de
 vren hi üresít, alatt: és midőn seoptat,
 vagy sít: fehérest maradgyon; jó sít,
 te hogy a méh élő része elherültse,
 sen, hogy kor, rabb idig maradgyon arányba.

Az medentria állása 2^{ik} fála
 képp lehet hibis. Kis vagy igen nagy
 a hajlása; midőn a felső nyitása
 igen elöve, a hátsó pedig nagy on le
 felső át; elenherőbe hűsiny a hajlása.

- Ha vrelaty a hajlása, akkor a teskeje

seg is srül is alatt, könnyen mind aron
 nehersegeket a srülke, mint a bö me,
 dentre; arint a bö medentrirel int
 rend srabjok; mind a terhes, igre,
 mind a srül igre srülke igre. - A nagy
 hajlast emierni; a herest igentli
 van domborodva, a hülsö srülö répl
 melyen vagy on helykerestve; a ke,
 merem hasadik a Crombol köröttön,
 hatna hurott fövel járni, a terhes,
 seg végivel le függö hasok van; ha
 virsgátni akarjuk, egész a Crombol
 körre kell a virsgáto heret bossz,
 tani.

A nehersegék a terhes, ig alatt
 orok; neheren jár, fajdalma van a
 szemrem csont felöl: a nyomás véget
 a herestnél: a fejrülis véget, neher
 a srül: is virgellat hi üresítés. - A srül
 is, idö srakayra fajdalmas, mert
 a méh nyaha a medentre felsö srül
 léker nyomatik; a vir helyag ^{keres}

reped, a méh srája neheren kagol,
 a gyermek feje fel akadhat: a meden
 tra felsö srülke, lött fere csurhat,
 is roya felvirre adhat alkalomat. - Ezen
 nehersegeket ugyan egészren elkerül
 ni nem lehet a terhes, el: is srülö
 vel. De istalmattia lehet temni. Így
 a terhes, elnél figyelemerrünk: hogy
 srülke legyen, könnyü emiertü,
 chat egyen, nem puffasztokas, in
 srül a viralligre; ha neher a te
 her: napjaba 1. vagy 2. orig felü,
 gyön erősen ödalt, meg hajtott kö,
 srülhet: a srülis alatt; aramat a
 srülke hi üresítés, a viralligre
 inssüth; erősen ödalt felkettü,
 kordist csak nem a hajig felkur
 va, a fö a vállakkal elöre hajtsva,
 mely alsal könnyen le eser hadket
 a fö. - A 2. idö srakayra srülke
 abba a helykerestésbe marad. - A

422.
3^{ik} idő straharba a körepp kúst itt
szorgalmatosan kell ápolni. — Ezen
alaposságára a medentriének: több or-
vosok több felület javasolnák; így ha
nyatt oly ágyon fektetik, melynek a
fára alá egy rézre magosabb, minsi-
fő is; De ezen helyhartesébe a ter-
hes nem maradhat: neher, így nélkül,
a szülés alatt is szinte aron fekvést
javasolják, és hogy a hájat hátrafe-
le hurrul: vagy lepedőhöz átkal, vagy
kérrel; De ereknél jobb aróval
fekvés, görbített törvökhöz; mint
hogy pedig a hanyatt fekvés alatt
a fő: le nem eszchedett; mindig te-
hat lábra fordítást tartanak, a mi
aróval fekvésnél nem fog kívántatni.

At' lágy szülő rézrebe is lehet,
neh hibák; így vagy csak a hüvelőknél,
melyek hüvelőnöz bányás módot nem hi-
vannak; De vagy csak hibái a belső
lá

423.
lágy szülő rézrebe, a melyek nevezte,
szébbek: így.

Így miék hüvely szüke: akár
mi okból. — 2^o a miék hüvely elő része
a terhes, így alatt a szüke hüvely nagy
nehérségéket nem szül; De a szülés alatt
fájdatmas lesz, és gyábrán a végett öze-
ve nem hurodhatván edigge, lassu és
fájdatmas lesz a szülés.

Okai gyuladás, hemingadás, da-
ganat, hüvelő, örvös növény, polipus.
— At' szüke hüvely mindig neherisi a szü-
let, aróval puhított, utó, hogy a szü-
let alatt hi kigulást engedhesen, aróval
már a terhes, így usolyo holnapjába kívánt
lágy meleg fürdőt használtatunk vele, és
napjában egyszer lágyító lútrios, a szü-
let alatt ismét lágyító lútrios. At' miék
hüvelyt lágyító keszkekkel borongatunk,
vagy beté. fész, leendőreünk; ezen ren-
delés, eh mellé meg puhul a hüvely,
egy

es a mick skaja tagulása alatt: az is tagul. De ha keményedés, vagy örvös nővér van jelen a hüvelyben; akkor krutis alatt kel segítségem; így a keményedésen hoz, rá egy hurirt kegyűnk, ha pedig hasikiason keményedett, akkor csak egy + mattris krutis; ha pedig a fent írtakra sem engedve a krutis, akkor fagóval hurruk ki a főt.

A mick hüvely első része mindön a fel meg vagy nah gyengülve, is első része: egy hogy a keményen hájádikon ki dül; ha egyéki oldalon van az, akkor köhletlen; de ha ar egyre mick hüvely egy első rész, az kor köhlet. — Réa a mick hüvely: két bol, is tapintisbol; a virellis fajdalmos; a krutis alatt jobban ki jön. — A keshogy alatt gyogyitani nem igen lehet; ha csak a keshogyat nem gyogyitja, a mi gyakorban az egyet, ariszt csak krutis gondoltunk; virellisre indyüh: napontant dül fel keshyüh; ha ara virela nem ment, virel fel kegyűnk virela, a mick ha lehet egyéki

ban maradnia; virela marad után egy két napi felvétel után. Ha az nem elég sége, spongiat ruhával be vasva krutisálhat hozzá, nyom foltok is T. folya alsat a krutisot a hüvelybe hoz, az egy keshyüh virela ar első rész.

— A krutis alatt nem kell egyéki mint virelanyon felkettő: az első, az egyre krutis alatt; a gyermek egyéki keshyüh krutisával örvös hurruk, sisső borongatás, azat keshyüh; fel keshyüh pedig hoz, rá az egy, mint mick gyermek egyéki.

- 1^o A mick rendetlen felvétel.
 — 2^o Rendetlen örvös hurruk. — 3^o A virel folyása; éran 3^o hiba leg gyakorribb. De tartózik meg 4^o Mick be ki keményedés hibás allatása. — 5^o Meg repedés. — 6^o A mick kifordulása. — 7^o Gyuladása.

A mi rendetlen fehéris, mel-
lyek a keskeny és szűk alatt elöj
nek erék. 1^o a méh le tütyedése, vagy
elöjje. 2^o Forde alój a. 3^o hátra fordítva

Le tütyedése vagy elöjje a
mehnek: az midőn annyira lecsor-
kadik, hogy a hüvely, része, és része
vagy egészren a hüvely szűk részéig
jut, vagy arolon túl, vagy az egész
mék is hi jut a hüvely szűk részéig
körre, midőn csak a hüvely szűk ré-
sék körre jut a hüvely, része a méh
májának, akkor tökéletlen az elö-
jje; a máj is egybe tökéletes.

Okai rérint okyanok, melyek
ezen bajra hajlandóságok okornak;
egy hűvel vagy a madentre nagyon tá-
gas: és bő, a hűvel a nagy szűk részéig
hülönözön a méh hüvely: és közölgő
lankadnak; a hűvel a közép rész
ma

meg van repedve; rérint pedig ol-
lyanok: melyek az elöjje: elöjje
rész. Egy midőn okai: seke és virelles
rekes; melyek a méh annyira fehé-
ren, és elöre nyomják, a nehérségek
emelése, és hordása, hivált ha az alkatom-
mal a has falai is nyomtatnak; a hári
foglalatos, agok a melyek a has falait -
nyomják; így a sikoslás, mángorlás, köz-
te az állás, járás, rosz utba, rosz közsiba
vato járás, lovaglás, a szűk ruhák
a derekon vato kötés, közre és szűk
füvő melyéinek.

Előmeletési: láteyuh a bő midőn
trés, esmérjűh a nagy szűk részéig
gezige tudjuk, a közép rész repedése,
a virelles és seke rekes, fajdalmas
a hasa; vagy a hári is dagadnak, já-
rás a fajdalmas a virelles, a méh hű-
velly a hüvely szűk részéig kört talál-
lyuk. — A közép rész a keskeny alatt

a fájdalomak a kereszt tájéka a helyben,
 kivált a szemürem csont felett, a hülyő
 srülső rések meg dagadnak; sűrűsödnek,
 fájdalmasok; a lábok dagadt: is fáj, elő
 állanak fattyu fájdalomak, melyek alatt
 a víz hátraját meg nyelhetnek; ezeken
 isethon srülső; a méh lapiny hova: is, s
 dellen elválása miatt víz folyás, is a
 gyermek halálát okozhatja; a srülső
 ledt, srinta a viretlis eren utolsó meg
 egéssel, is nehézséggel ürítették,
 vagy csippenként; vagy meg van aha,
 dályortattva. — A srülső alatt eren
 baj srinta aron ártalmakat okoz
 mint a bö medentre.

A Bónis módja a srülső
 alatt; felhűdjék ha lehet, napon
 ként egy hét orát, herülye ar alkál
 maffozagos, a melyek a baját nevel
 hatnak; srülső gond olkodjunk,
 ha igen nagy a lecsorhadás; akkor
 ce

Compressát tegyünk ar elő ^{egy} részre
 úgy srinta a hülyő srülső résekbe is,
 ezeket T. folya által tartjuk helyben

Midőn a méh egészren elő van
 ezve, úgy hogy a méh a hülyő srülső
 résekben hívül is van; akkor magira
 hagyni nem lehet, hanem kanyott
 fektetjük, srülső hi üresítettük, a
 virellasest is srinta hi üresítettük.

— Erék után hörönjégesen magától
 megyen vízre a méh; ha pedig vízre
 nem megy; a mi hívült ar ¹² terhesség 12
 hónapjaiba történik; akkor egy olajba mást
 tott gyolc, darab hörbejárója által meg fog
 juki a méhet, is vízre seprük. Ha pedig
 hosszabb ideig mást hint lett volna a méh
 is gyuladástól lehetefelni, vagy ar mást
 antaja, is előbb tartiflogistice kell vele
 banni, is csak ha ere vízre nem mome, ak
 kor kell a méhet vízre tenni. — Vízre
 teve lévén a méh; srülső is hogy a srülső
 li

Cö meg egy néhány óráig felhűdjön; a mi
 hüvelly körül Compres, ah téteteneh, v
 te a hűző sültö rézre hűvös is; 12^o p
 lyával helybe tartjuk, a Compres, ah tét
 het borba mástani, a mi leg jobb, vagy
 China företbe, vagy Cserfa företbe má
 tani. — Vagy nah orvosok hű ar elő ej
 perarriumot használnak; a mi nem je
 más ok egy kis hely agot, vagy kőatstot, ü
 dugyas China företbe, vagy borban má
 va tétetik a méh hüvellybe; de ar is t
 nyen fere Csur, is egy élt otalán aru
 tán sünte van helye ar elő ej, nek
 — A sültös alatt a méh elő ej, nek g
 szettel a bil ki üszítették, a virellet
 sünte ki üszítették; hanyatt fektet
 is midőn a méh vörre ment: akkor ol
 dalt fektetjük; is így marad ar egy
 sültös alatt; de a gyermek igen hűt
 len siet előre, akkor egy bannuk:
 mint eren egybe, a bö medentriénél
 banni roktunk. — Vagy nah orvosok
 ki

hűt azt javalyát; hogy ha ar orvos
 horon hivatik labora fordixist te
 gyen; de ar nem sültös, is nehe
 zebb is veszedelmesebb is, hűvös a
 gyermek életére; de nem is sültös
 ges, mert a terméret igaritya el
 a bajt; mert a mint a méh örv
 hűvös, aron módon vörre is
 megy: a méh. — Vagy nah hűt 4.
 rétebe hűtött vörre a hűrején
 meg hajtanak, is egy alkolmarat
 nyák: hogy a hazadik: a premieren
 hazadikra eszen, a vörre egy ite
 vége a hazon, a másit a hát
 magyen végig; is ereket seged al
 tal tartjuk; a sültös pedig for
 ditást tesz. — Ha ar 12^o Dö sra
 karba éri a sültöst. A 2^o idő
 srahajba pedig fogóval hűvös ki.
 — A gyermek agyas, al egy bannuk,
 mi

mint a bõ medon trejüknél, felü
ve maradgyon horrabb ideig; viren
nyozam felüdjék többet, is ha el
múlt is a gyermek agyi alapot: meg
meg maradgyon virenanyoz helykeres
tisbe; erék után öjve kurok hellenek.

A' mih ferdõs állás aron
rendetlen felvõs, melynek a mih
egy eny at mivõje: a medentre egye
ny at mivõjõtöl amny is a el tãvõ
zik, hogy a mih straja soha simy
a veresõ liniaaba; a mih ferdõs
pedig a mih strajával mindig elen
kerõ köp van.

Okai krintse 2it felãh, mely
lyek hely landozãgot okornak ki
a haszalmat nagy gyengesége, a
medentre csontok rendetlen állása,
vagy a gerincnek hifelã vato göttõ
lãse, ar also rãpãbe.

Indisõ okok a virelles rãhedis,
siek rãhedis, a belãbbe levõ sãr sãk,
a terhes vãr felvõs aron otvalra
hol a csipõ ippam rendetlen, de a
Dispositio mellest sok ok nem kell,
mert maga a Dispositio is elãg: a
mih ferdõlãst elõ horni. — Esmãt
kesõi mãr a kajlandozãgot nyitvã
nos, is talãlyuk viregãtisãlãt a mih
ferdõlãsãt. — A'rtalmai a terhegg
alatt: fajdalmakat okor, hivãlt a ter
heggãt hãjõbbi hotnãjãiban fajdalmã
kat; akkãr hivãlt a sãk is virellesbe;
de aron bajok nem fanyãgãtik vãrãe,
delõmmel, sem a terhest, sem a gyet,
mãhet; nem is rãkãvãges egyãbb: mint
hogy nãjãba 1. vagy 2. orãt felüdjãk
otãlt virenanyozãgon; ha pedig hãt,
ve felã volna ferdõlãve: krintse otãlt
felvõst vagy en felã a terhes. — Ha a
ferdõlãsãt egyãk: vagy mãrãlt otãlt felã
ha

hajlik, akkor szinte fehéredgyön oldalára;
 aron oldalra melyre a méh: szájjával fe-
 dul; Ha pedig egész nap állani hánstelen
 lenne; akkor hájat felhőse. - A sűrű-
 tés atatt lehet hogy a méh igen meg-
 gyesen hurodih örve; a méh szája ke-
 veset tágul; a méh szája ar oldal-
 hor nyomatik, a vir hólyag hovára
 fed, is így a sűrűség kevésbé lesz, vagy
 néha végbe sem megy. - Akkor a
 régi ovvosh aron hi menetetlek el
 távoztatására a méh fenahat: ar
 ellenkerő oldalra nyomatik, a méh
 szájat egy belé vitt ujjal: a vere-
 kö hínca felé hirtelen; De orokor
 csak voltak: mert meg sértesék
 a méh szájat, is meg sem történik el
 távoztatása a ferdülésnek; szája
 labra fordírást tettek, De ar sem
 sűrűség, csak oldalra kell feljött

ni

ni: minden esetbe; De aron oldalra
 inkább: a melyre a méh szája nér,
 a mi a segitzéget illeti. Akemely
 ovvosh meg mai időbe is hálom-
 börtök; ha oldalra feljött a ferdü-
 lés, akkor oldalra feljöttnek engedik,
 De ha előre ferdül, akkor hányat
 feljött, feljött holt farrat, is
 e' mellett a hájat sárga által egy
 lepedővel feljött hurrák; De aron
 feljött egész egésznek is nem csak sűrű-
 lőnek sűrűs. - Ha pedig hátra fe-
 lő ferdül akkor javulják a sűrűs-
 ég is sűrű sűrűsében kérdőre is
 könnyűsége szerkeszték. De aron
 feljött alatt nem hurodhat örve
 rendszeren a méh, is nem is fogja
 hi állani koprazon; így is legfőbb
 esetekben ar ilyenek labra fordí-
 tásra szoktatnak.

Az méh hátra fordulásáról: retro-
versio; alatta istyüle a méh arany-
datlen felvise, mely serkent arany-
nes mértéké oly annyira el távozik
s endes állásból, hogy a méh feneke
egyippen hátra áll a hereszt csont
ki végülébe; a hüvelyes rézre
dig a sermésen csont egyezüléje
felcsat felcsit. De a medentre egy-
nes át mérőjébe egy jön oly andnál
hik más sorros stülé, vagy más gyen-
geség, is betegséj miatt a méh igen
gyengült. — Elő jön leg inkább a Bih
holnapba; a vilba ritkán, a bit hol-
napon tul isha sem; a bö medentre
is elő horhattya.

Indito olai stülé rchedis, is
emeh völtetés, el való hi üresítés, is,
a virellet rchedis, nem ely helyherte,
tízle, melyeknél a crombolé felfele
huratnak, a hasfalak befelé nyomak,
na

nak, s így a méhez hátra nyomják,
s így sűrűlőst, néha a ruhák melyek
a méhet nyomják; így seros ruhák,
füdő mellény, erős nehér tetes eme-
lése, hosszú, roz utba való lovag-
lás. — Esmeretsei; látkyuk hogy a
stüló a terhesség Bih holnapjában van
hajuk hogy stülé is virellet rchedis,
be servend, vagy más valamely stülé
istkünt; a his haz stülé üres, isre,
se mint ha valami a hereszt rche-
lindne, is a vég belen hi ahasna
tudulni; viregálás által pedig talat-
lyuk a méh stülé a sermésen don-
tol felcsat a veretó lincian tul. —
Követhetési a terhesség alatt nagy
fajdalmak iser a hereszt csont
is sermésen csont egyezüléje a há-
ján; a stülé is virellet rchedis,
a hüvely stüló rreth: stülé a hojag
is

438.
is agyaz, a ha kártya is meg gyűlt,
a minch romora hová herései le
hatnak; is csak ha korán koratiki
segittye, vagy ha szül fajdalmai
vén. idő elötki szülés abortatiki.

Orvoslás a méhes szülés

szeg rendszer állásába vizra temni,
ere szülésig mindezek elött a vég
belot hi utitani, a mi hajható
tal szülésig; De nem irgatnak,
sőtöknek ere. 1^o Orvos, is ar Oleum
Ricini, vagy a hóríp soh, a szül,
lö halyagot hi utitani: ha lehet
aromal Chastiter által, arutan
erő, otat fehéret adjunk a be
tegnel, ha egy is vagy más is
otat felé hajlik

lyuk hogy a méh fenche hátrafelé fordult
nagyon, akkor ugy hely hertatnyúl hogy
sardaire, is honyóhairé ereghedjen, is a
mi

439.
mék hüvely kártya, is répen be vizrül
kerümbet, is segittye, a hüvely, is rést
a méh fenchevel rendszer hely hertatny
be; ha are nom mama el halygult egy ide
ig, is lagyito fördöhebe tesszük; vagy a
vig belen által probatnyúl, isy valami 3.4.
vagy 5. proba után kőstöknek arutan hogy
a méh fenche ismét a medentzbe erp
kedett, is ha ar tökönt: erősen otat
fehettégyünk, egy néhány napig, a meg a
vagy adalmen hivül temni gondolyul.

Mindön a méh rendszeren örve
hurodias avot van 1^o, ar mindig a szülést
illeti. — Rendszeren lehet pedig 3^o fe
le halyg: ar örve hurodias. — 1^o hogy
igen nagyok. — 2^o igen gyengék. — 3^o göt,
csöjök. — Ar igen nagy örve hurodias at
tal igen hirtelen hi terjed a méh nya
ka, is emelk traja meg repedhet; a gyet
mék hirtelen meg szülésre viget: a föld
re potyoghat, a hódöhe kősimot el 1^o
kadhat, is vil folyas ereghet. — Előjön
ar

A méh hátra fordulás a retro-
versio; alatta istyüle a méh aron-
datlen felviseit, mely szervet aron-
nes, mertele oly annyira el távozik
sandes állásból, hogy a méh feneke
egyippen hátra áll a hereszt Gont
ki vajuláaba; a hüvelyes rézpe-
dig a premieren csont egyezülte
felset fekszik. De a medentre egye-
nes at merojébe esö jön alyandhat
hik mit sokszor strüls, vagy más gyen-
gesig, is betegig miatt a méh igond
gyengült. — Elö jön leg inkább a Bile
holnapba; a Bilebá nikkán, a Bile hol-
napon tul soha sem; a bö medentre
is elö horhattya.

Inditso olai strék rchedis, is
emeh völtakis, el valo hi üresit is,
a virellet rchedis, nem ely helyherte
tészle, melyshnel a Crambol felset
huraknak, a háj palak lapete nyomati

mal, s így a méhez hátra nyomják,
s így sikkaszt, néha a ruhák melyek
a méhet nyomják; így sokszor ruhák,
füvö mellény, erős nehér tetes omé-
tise, hosszú, rozr itba való lovag,
las. — Esmeretsei; látkyuk hogy a
strüls a terhesség Bile holnapjában van
hajuk hogy strék is virellet rchedis
be srenved, vagy más valamely slot
estünte; a hi, ha slot üres, isre,
se mint ha valami a hereszt fe-
hüdné, is a vög belen hi akarna
fordulni; viregálás által pedig satál-
lyuk a méh strajat a premieren csont
tol felett a veretö linian tul. —
Kövatherezai a terhesség alatt nagy
fajdalmakat eser a hereszt csont
es premieren csont egyezülte a há-
ján; a strék is virellet rchedis,
a hüvely strüls rézpe: sött a hójag

is egész, a has hátya is meg gyntad,
a minak stomona hóvet herései le
hetnek; is csak ha korán koratiki
segittsége, vagy ha szül fajdalmai
vén. üdö elötti szülés abortatiki.

Orvoslása

a méhet szűk
síg rendszer állásába vissza térni;
ere szűk ség mindezek elött a vég
belet hi útizeni, a mi haz hajtsát
tal szűk ség; De nem irgatnak,
körténik ere. 1^o Orvos, is ar Oleum
Ricini, vagy a körép sál, a virul
ló halyagot hi útizeni: ha leket
aromat Chaciter által, arusan
erő, otal fchvíst adjunk a be
segnek, ha egy ik vagy máj ik
otal felé hajlik ishalót.
nyuh hogy a méh feneke hátrafelé fordult
nagyon, akkor ugy helyhertettyük hogy
sádsive, is honyóháive eszrhedjen, is a
ma

miék hüvely háty, is sepien bá vii, rüli
kerümbet, is segittsük a hüvely, sejet
a méh fenekevel rendszer helyherteti,
be; ha ere nem mame al hagyjuk egy ide
ig, is lágyito fördölbe tesszük; vagy a
víg belen által probalyuk, igy valami 3.4.
vagy 5. proba után körténik arutan hogy
a méh feneke ismét a medentzibe esz
kedett, is ha ar körtént: eszjen otal
fektesztyük, egy néhány napig, a meg a
vezed almen hivül termi gonolyuk.

Minden a méh rendszeren örvé
hurodias avol van so, ar mindig a szűk ség
illeti. — Rendszeren lehet pedig 3^o fe
le hiff: ar örvé hurodias. — 1^o hogy
igen nagyok. — 2^o igen gyengék. — 3^o göt
csözök. — Ar igen nagy örvé hurodias al
tal igen hirtelen hi terjed a méh nya
la, is emek traja meg repedhet; a gyet
méh hirtelen meg szülése véget: a fölé
re pogyoghat, a hőtökös ksimos al so
kadhat, is vés folyas eredhet. — Előjön
ar

ar fiatal is igen ingeriheny agyromy de
 nál. — Esméketör; mind en srül faj.
 Datom hopyru, ar anyh pillantat rü
 vid: a fajdalom alatt a hazfatin,
 is mich sokkal erő, ebben huródikör
 ve; a mich hirtelen tágul, igen na,
 gyon kell erőlködnie. a srülis igen
 hirtelen megy végbe. — Itt hanyott
 felvőst áruok, a kérdéset hi nyit
 va, a mely által gyengitettnek a srül
 dalmak; ar erőlködést kilyul. a d
 idö szakarba szinte hanyott felve
 hagyul, uir eranyosani hi nyitva,
 ar erőlködést a lehet, igig kilyul.
 — A 3ik idö szakarba hanyott fel
 ve hagyvan: a teste felvö rést ma
 goss abban helyker tettyül, hogy fel
 ülö: fel felvö helyker tettyübe légyon.
 a hörep hyst tartani, is a Oromba,
 kat egy máshor oly hörel tartani a

mint lehet; is ar erőlködést a le
 het, igig kilyul. — A gyenge
 srül faj dalmak; vagy a mich gyen
 ge erőve huródiasai alatt a srülis
 igen hopyru, a srülö el gyengül, a
 helyö srülö résteli hömyen stron,
 vedneli a fö nyom is átol, a gyen
 mek hömyen el hal, ar anyjának
 görtrei: rang asodrasai lehetnek,
 is gy ahvan a terméset által nem
 lehet, igig a srülis. — Elö jón oly
 srülöknel, hih meg ar 12 idö szakar
 ban is ar elött erőlködtek; italyaban
 hih vagy magohra hagyattak, vagy tu
 datlanagbul, vagy a Baba hibaja véget
 nem tudja mihor kell erőlködni.

A körönsiger gyenge igöl, a
 a mich gyenge igöl is elő jöhet, a hih
 gyenge test allotismak, is igen fiatal
 loh; a terkes, ig alatt gyengitö bafolya
 soknak hi voltak leve; egy betegeg,

promonjag, életem fogyathorájai, a méh
helybéli gyengejége előjön: a gyököri
léjtől. - Ereken hívül még más okai is
lehetnek; így a torpidus: az apronyokból,
a hörönjéges; vagy helybéli; hívált a méh
bővérjége, a virellet rchédés, is a rch
rchédés, a belétnék puffedás, a rch
rchnék fehérs, hívált a hanyott fel
vén, virevény, helyhertetés mellett.

Elmértetői: minden fajdalom rch
vid, az enyh pillantat igen hozzá, a h
is méh falai heveset ferülnek, a méh
szijs, is a hüvely lassan tágul, a vir
holyag nem formálódik; a gyarmek la
san mordul előre; rch mellett arcm
litést okok hővethereit eméjülmeg,
igy a méh gyengejége, a köbröri rch
a rch is virellet rchedést. - A gyen
geség jeleit hogy el távortassuk. Egy bá
nunk: ha egy idő aránt a rchre hi
vántaro feltételék jelen vágnak;
ilyenkor ottalt feltessük: görbütt
körvélhet, a seül fajdalmak hi dolgo
ka

ésát tilgyuk. Felkeressük most a
gyengejég okát; így ha bővérjége: ah
kor gyulad is ellen való belső rchét:
vagy is vágnst rendelünk. Ha látnyuk
hogy gyenge: hörönjégesen ilyenkor
je tápláló gyenge könnyű eméjülmeg
elédésket adunk, bort kavalanként,
füreres theakat, vagy egy két gop
fakéj festvényt, vagy más vala,
mely erőitő rch: így

Rpp. 20 Chamé: 3j

- Melissa 3j

Spiritus vitrio: 3j

Figyelmerrünk pedig minden
kor, hogy a rendelt rch: görbe elle
narch légyenek, is a méh örve hu
rdásion is munbálhodjanak. Így
az 12 idő rchában vágn meg
köbnyire rchénjén. - A 2 idő
rchában a fehérs marad: a rch
folytatódhatnak; a fajdalmak hi
20

Dolgokát javalyuk ere; a Vil idő szakasza
 könnyű. — De ha nagy a gyermek, a fájdalom
 máh lig, ebből nek, a gyermek vérsz előre nem
 mordul; akkor a Vil idő szakasza: sül fogás
 által martatunk. — A Hil idő szakasza a
 méhes sekentőket használjuk, ha erős
 nem elég, igazak, méhességben valaszt,
 tyuk el a méh lefegyvt.

Ha a méh: a ru alá alatt görtő
 sen örvé huroditi, akkor a gyermek vir
 idő előtt el megy, a méh roz örvé hu
 rodia végess. Roz helykeresést kap
 a gyermek, a hödölök kímor nyomtat
 hatik; er a gyermek halálát ororra, a
 vir hólyag kósan reped, is hörönjéges
 görtőt okozhatnak. — Elő jön pedig
 a Hysteria apronyoknál, minden
 gyenge apronyoknál; minden indito
 ok nélkül; egyedül gyakran a Dispo
 sizio által. De az indiso okok megok
 nál is okozhatnak elő görtőt.

Indiso okok a lalhi indula
 tok, a ren vedélyek, a meg hütis, a test
 fe

felhevülése, szék, is nagy sehed is, gaz,
 trica tisztátalanjagok, minden okok,
 melyek, a nem terhesség is görtőt
 okoznak. Nagy szinse a bő vérség, ne
 ha a Hysteria apronyoknál, valamely
 kedvetlen tárgy látása, helemetlen
 szaglás, fel bosszanhodás.

Elmestetői figyelmerrünk ar
 előre ment okokra; eranhivül lát,
 tyuk hogy a nádva örvé hurodia
 görtő, sokkal fájdalom. A fájd
 dalmas nem tartanak rendet, is rem
 kerdődik mindenhol a hesept tájtal
 hanem ahát mely ponton is, a fájd
 lom után szinse bepeg az aprony; a méh
 szája nem tájul, hanem inkább örv
 ve hurodit. — A ru alá alatt kön
 nyen idő előtt meg reped a vir hólyag,
 is szászor lepr a ru alá, vagy meheren
 vagy éppen nem megy végbe; vagy a
 jó fehérsből hesept fehérs lepr. a
 me

meh meg vedhet; hönönjé es ringa
todriá jásul horrá, melyek veddel
mesele minyájan.

Bánás a srül is alatt. ástrü

lö ödalt fektetik, gösbített sörsövel
kel, is előre meg kajtott láballal,
ar evölköd is tilyul; a vég belis
Chamomilla klijrtérrel: is olajalki
üsitettyül, a virelletett sörse, a
kazát melegen jár olkattyuk: sárta
ron; arután fel heressül a götr
okát. — Így ha tö vörücsig ar ok; így
ha tö eset vägatunk; ha virellet: is
srül vedes, srül hotiha, epe, ge
lesrák volnának ar ok, erhet hi
kell üsitenni. Ha letti indulat ar
ok, le vendajiseni igykerünk, is a
jelen baj formája sörint melyben
magát leg inkább mutatya, erhet tel
lyesit ven solstrot el mulik a götr, is
endes leg a srülis.

De

De ha matelijit is ol mint jelen
is a götr tart, ilyenkor götr eleneje
ket adunk; de csak gyengébbeket, is
kijebb doziba. Erék kajnálhat ok.
Chamomilla. Melissa. Milefolium,
is rithán Valisiana. Castoreum.
Specacoanka. Kijebb doziba ar áleg
neveretes, ebb sres. — Ar opiumot rit,
kán kajnáljuk, hiválk belsö háff,
erek mellet srühvágó Dieteticus
randeljeset senni. Sörse job a
külö serek: mint a lágy meleg bo
rongatás ok: sáraron; kompito hevi
csök; de leg jobb ah a götr ellen
klijrtisok. Erék be pedig leg söbbet
kajnál ar opium, lágy meleg vir
böl, vagy kevés Chamomilla infu
sumának horrá öntéséböl képcült
fördö; de csak gyomra tájain legyen
beme, hogy sradon lehetessen.
— Vagynak esetek a hol ar előne
ment indiso ok nagy bi hatása
mi

miatt: a nagy Dispositio, vagy a rossz orvoslás miatt, a mely etöre ment a fentebbi által sem lehet a gör, tröt annyira távortattni; hogy van, de, sőt fájdalmas esedhes, eneli, a mi mindig rosz, mert ilyenkor meg, terjedés, sülés, hivatásai, a melybe az 12. idő szakasz igen veszedelmes. Ezenidő szakaszba a gyöcsmél Libaira való fordítás, sülés, s; de csak azon feltétel alatt, ha a görte néha meg ürül, és a méh szája tagult. De ha minty tagitva senki se bátorodikjon azrt tagítani, mert az mind den lényektől mellettt nagyobbodni fog; ilyenkor, csak Symptomatice orvosoljuk, vagy várjuk a méh szájnál hi tagulását; a sülés 2. idő vagy 3. idő szakaszba más könnyebb. Mert ilyenkor fog, val elünk, a mi könnyebb a fordításnál; és ezt a görte nem is akadályoztatja, a sülés, 4. idő szakaszba; alkor, mint a sülés alatt: a Diäteticai rendelkezés

tételnek. — Az indító okok felkeresés, nek, és el távortattatni, ha erekre nem ürülnék: görte ellenes, és használat; slyanokhat különösen: melyek a méhet az erőt erőve huradása, s; és a vértét csilapítják; azrt a fenteb, bülker Hofman oxycit Tinctura Cinamomi Specacantha adatik; még pedig a méh szája görvösen van ör, ve huradva, arotat használat. De ha félbe hagyat, és a sülés nem ürülék: ekkor van helye a méh le, jeny mesterséges elváltásának.

Rendetlen hi terjedése a méh nek: lehet hővetkerése a mestersé, nek, úgy hogy már a terhesség alatt: egyik vagy a másik fala, hívás a hatzo jobban hi terjed, mint egy más; ilyenkor idoma meg változik, és helykeresése a méhnek; a méh szája sem azik a verető lincába,

hanem egyjüb: vagy másik oldalakra
veszt.

Okát ezen rendetlen li terjedésnek nem ismerjük. Régi könyvekben ezen álapot a méh ferde állása alatt jön elő. Legelő volt Boos, a ki ese ar alapokra lett figyelmes; de ő obliquitas s: Stipheit: uterinum quod figuram neverte.

Még eméltetik a méh egyjüb falánál igen nagy li terjedéséből, a másiknál rövid voltaiból, a méh szája: és fenekének nem egy más állásba való léteiből. — A terhesség alatt semmi rojz hővetherejt nem szok. — De a srülés alatt a méhön vé hurokai neherék, fájdalmas ar elő álló része, a termérem Confolhor soríttatik, a gyermek vírákban el foly, a srülés neher, vagy végbe sem megyen; ha jó

kor hivatik a srülés, oldalsó hely felé tett ni a srülőt; aron oldalra a melyen nagyobb a li terjedés, s melletts a méh szája; átaljába a srül fájdalom ki dolgoraját tiltat, a srék is virelletett kiürítettyül; ezek melletts ha jó srül fájdalomai vagy nek a srülönék. a srülés bír ar 12-15 órában korább, még is a terméret által megyen végbe. Ha igen erősen kényes a srülő részek, lágyító bórongatásokat csinálunk, is káson to hlytist adni ten magból; belső képp srinte lágyító főreselhet.

A méh li fordulása alatt istetődik aron álapot, mely srént a méh feneké a méh üregébe esreledik, sőt a méh szájan is néha keresztül megy, is ar

egész: szinte li fordul. - Ezenáta
 pot csab a srülés némely srempi
 lantásaita jöhet elő. Így a 4^{ik}
 idő szakasza a srülés li hajta
 sa után, ha a méh feneké még
 li terjedve maradt; igen gyön-
 ge srülöknél: hívált ha a mé-
 denye bő, és a gyermek hirtelen
 meg srületett; vagy előre ment
 srülés által igen elgyengült a
 méh; és a méh lapiny még nem
 vált el, ha ügyetlen hirt fogó, a
 köldöknél fogva hurasik a méh
 lapiny, és ezzel a méh feneké; ezen
 bajhoz ha kéjon jön az orvos: gött
 és ríngatódrás járul hozzá, és meg-
 hat a srülés; de ha korán hívá-
 tik a srülés, meg esmerhetni hogy
 a méhet nem mint gömbölyű ter-
 tet talállya, hanem mint homo-
 ru

ru rért; a méhet pedig a nagy
 srülés révvel kört: elő epe ta,
 látjuk. Ilyenkor a méhet leg-
 stebb is a méh szájan keresztül
 vízra tesszük, és arután emel-
 lyük li a méh homocuzágát,
 domboruzágra.

A méh repedése ar oly apró,
 nyolknál: a hirtelen srülés és éltelen
 medentréjek van, hirtelen méh falai
 gyengék, hirtelen a gyermek kereszt-
 be felelik. Ar ily apronyolnál
 mindig jelen van a Dispositio a
 repedésre. - A srülés alatt re-
 pedhet a méh, a göttér végett, arótt
 felvél végett, a nagy karto, hányás,
 ügyetlen hirt fogás végett. - A hül-
 sö erőszakos ide nem tartornak,
 mert a terhesség alatt is, és egész egész
 srülöknél is: gészet, fittás, s.t. által.

Esméltetői Láttynuk hogy egy-
gyik vagy másik Disponato momen-
tum jelen van, hogy erőfájdalma
van: a méh egyike vagy másikké-
lyen; mely fájdalom alatt a méh
aron helyen valami pattanás hatta
éjlik, is a szülő maga fel liált: hogy
miche meg repedt; ilyenkor meg sün-
nek a fájdalmak, a méh erősebb,
is a gyermeket a has üregbe talál-
lyuk. Midőn a méh: vagy a másik
oldalán: vagy igen erőse hurokva
találhatók, a gyermek réjz bome
nem tapintható, ha pedig csak
felig ment li a gyermek a méh-
ből, akkor ar elöl álló réjz: ma,
gyorabbani áll.

Veszedelmes a gyuladás ar anyára
néve, is a gyermek életére a meg akadályoz-
tatott vés folyás véget. a segítségjé ebbe
áll + i. mikor a gyermek köhögéssel en li
4

erett a has üregbe; aronnal ha, mettes
törtémeny; De ha a gyermek életé jeleni
nem mutathornak, is a szülő ható dolo,
akkor el kell hagyni a műtétet. —
ot meg sebezett anyával ugy bámmuk
mint a has mettesj után. — Ezenbaj
a szülés, égbe ritkábban jön elő 2^o d^o
bol + i. — 1^o Mivel most a hanyatt fel,
és jobbra egészen li maradott. — 2^o
a fordítás próbái sokszor adtak ar előtt
most a repedésre, mivel a fordítás alatt
akkor ar elől álló réjzt erősrakkal fel,
felé emelték; De most köhögéssel
a fordítás, arert nem történik.

Méh vés folyás ar midőn a méh
anya belső simén lévő vés edényekből
folyik a vés, is vagy a méhbe marad a
vés, is ar a belső vészes simte: ha a vés,
és a méh repedés után a has üregbe.
gyül; a hütyő pedig a mely a hütyő szü-
lő réjzrechen li foly. — Fel optatnak
még a terhesség szülés is gyermek anyi
4

456y
folyás vérzéire. — A terhesség alatt
3-on rendelti lehet a vér folyás tika,
vi tisztulás, a méh lefegy lora meg
váltása, és a méh lefegy nek a méh
szájához való ragaszkodása. Ezen
folyások töbnyire hűtő.

Havi tisztuláskor tartanak
a terhesség alatt a vér folyást; ha a ter-
he, és 12 heteséig jelenik meg,
minden ok nélkül. Azon idő, mely
be a tisztulás meg jelenik, a vér
mint sűrűre mind mineműségére
meg egy er avar, és idejére nére
is. a méhbe nem törtémel májval
források, úgy a hűtő szűlő rézre
be sem; mint a havi tisztulás alatt
szoktak lenni. — Ezen vér folyást so-
kan egészégre nem telintik, és nem is ter-
nek semmit ellene, a mi hibás: mint
hogy ok nélkül soha sem jelenik er
meg, sőt pedig lehetnek a bővítéség.
to

457.
től, ahát er hűtő, és, ahát helybéli
legyen, lükkel a vér folyás a hasba
meg akadályoztatva van, az arany
is sűrűre dugulva, és a máj, lép fodor
miregyle meg dugulva, m. lora a be-
leli tisztulás alatt, így okkal is szelak,
lak meg vagy nek telve, midőn máj
betegségbe tranved, melynek a vér leg
inkább a has üregbe: nevére tezen a
méhbe jéreség.

Értesítők mindenkor az
említett okok egyide vagy máj,
kát talályuk; és talályuk hogy
ezen vérzés sem a méh lefegy lo-
ra elváltásából, sem a méh szá-
jához való ragaszkodásából nem
származott: segittég. — Ezen-
séget a lélekre és testre; egy so-
val azon rendeltég lehet tezzük
melyeket a rendetlen lora szü-
lőnek ajánlunk: a vérzés ellen,
ar

arután keserűh fel csak ar ololat.
 - Így ar arany is ellen munkálkod,
 junk, máj, lép fodor heményedé,
 ellen; ha azok ar olai a tisztulá,
 nak, mind erekből ki tetszik hogy
 a teshegek havi tisztulásiolat -
 Physiologicus különemények, és te,
 kinteni nem lehet: amnyival inkább
 ha sokáig tart, mert olyenkor a
 méh lépény hora el válnak, és
 a szűlést okar.

Hogy a víz folyás a méh le,
 fény hora el válnak a hóvet,
 kerése: megismerjűk; hogy nincs
 meg jelenésének bizonyos ideje.
 - Hogy indiso okra vrasmarik,
 így ar ütés, nyomás, szorítás, test
 ráródás; egy szoval mind aron
 okok: melyek isetlen hora szű,
 lésit okornak, ide tartornak;
 a víz sebessebben foly, és nem bot,
 na

na, hanem firog, abb: & köbb, néha
 hig, néha darabok ok; eren kívül ta,
 pasztaltattnak lülömbbféle beteg,
 alapottjai a testnek, melyek hóvet,
 kerései a méh lépény hora el válnak,
 sít okorra okolnak, így porojagka
 nem bromjukorik, képzetik a vírel,
 lére, fajdalmakat iser a házá;
 egy szoval mind aron változásokat
 talályuk melyek ar isetlen hora
 szűlésnél találattnak, és jönnek
 elő. - Követkerései hora szűlés,
 a gyermek halála; aranya el -
 gyengülése.

A Bános mód egészreny
 égyer ar isetlen hora szűlésnél
 itt a bános módnál: melyet addig
 tartunk: a meg a víz folyást csila,
 fitani remélhetjük. Ellenkerés:
 vagy a gyermek halálával, és a bé,
 köpröntő szűlfajdalmai mellett
 a

a skülest úgy tesszük: mint a hora
skülesnél íratott.

Elő jön leg inkább a terhes, eg
10 2^{ik} 3^{ik} holnapjaiba, azért mivel
nem tudja gyakran a terhes: a ter
hes alagotlyát, azért magát arát
talmas behatároltol annyira nem
véri. a 4^{ik} 5^{ik} 6^{ik} ritkiabb: mivel
a gyermek morgást észre veszi, és
igy jobban érri magát; és hogy a méh
lepény eren holnapba töhéletesen
lejt, a mi az 10^{on} holnapba
még nincs, és mivel eren holna
pokba a méh lejt, azért erősebben
is ragarkodik, úgy hogy hora elvá
lásnak nagyobb ok kívántatik; a
terhes, eg utolsó holnapjaiba még rit
kábban jön elő.

A méh lepénynek a méh
száján való ragarkodásából szá
maro vér folyást meg esmerjüli, hogy

a terhes, eg 7^{ik} 8^{ik} 9^{ik} holnapjaiba jön
elő, a hol a méh lepény egy régre ra
gádta méh száján: ott lejt, a hol
egyéren ~~lejt~~ ragad: ott előbb. Hogy min
den elnélkülűt származik, gyakorta
észrevaló; úgy szinte elémte meg is
szűnik magátol, de megint: meg in
dul, vagy végre nem is szűnik töb
bé; hogy aron tulajdonsága van,
hogy minden fájdalom észre huro
dása alatt: a méhnek: nagyobb
dik a véres; mivel a méh szájá
ságul, hogy a méh nyála is feneke
a méh hüvelynek hi van sejtve,
és szinte spongiás testet töltve; a
gyermek elöl illo régre nem érkező,
vagy csak régre egyike elő alba, a
májába pedig a spongiás test. Hogy
a méh szájá meg nyitása után egy
spongiás test találhatik a méh szá
ján

jába, mely ha tappintatili: akkor víz
 éri. — Leg hűvösebbi oka a méh
 lepénynek, a méh rájáhor vékony
 gazdodása; hogy pedig a méh le-
 pény a méh rájáhor ragad: ar-
 bírontalan: hogy pedig víz folyás
 csak a Bom utolsó holnapja ere-
 smen vagy on: hogy a méh lepény
 terjedése; a méh nyakának li ter-
 jedésével: mely sebés: igen ritkán
 arányba. A terhesség 12^o holnapjaiban
 nem terjed a méh rája: azért nem víz
 éri a méh lepény. — Ezen víz folyás
 vezredelme: mind ar anyja: mind a gyér-
 meke, mert mind a hestén igen elgyengül-
 nek; a méh hűvös li terjedését, mint
 indító okot távortassani: és gasolin nem
 lehet; ha a méh lepény egy, rem ragad a
 méh rájáhor, akkor ha korán segített
 nem jön: meg hal a gyermek, rézréti
 ragadójánál a méhnek: gy alori víz,

és elgyengülése a gyermeknek, és korai születés

Bianás mod. Itt a víz folyás
 ellen való szersz, hívált ha a méh ör-
 ve hurodjára is munkálkodnát: kap-
 talandó; de ar utolsó telimessből
 még vezredelme is; ha még valami
 okok is vagnak, a melyek a víz fol-
 yást nagyobbit hatnak: távortas-
 suli; kömnyü jó tápláló eldelékes
 adunk, hogy a házat ne puffadják:
 így hűvös, hűvös becsimáltot, ita-
 lal víz, bor, szersz nem, a rék ve-
 kedésit Picinus, at előrűk, a vírel-
 lésre intyűk, fesszi erőlködésüket tilt-
 tyuk, ar erős lalhi mozgásukat vinté.
 — Ha a víz is igen nagy: és hirtelen
 akkor hűvös hűvös hűvös borongat,
 tyuk a hűvös házat, baltó hűvös adunk
 Hállat nedvűt. Plataniat. Specaco,
 anha. itt Cinamomum nem jó. Így

tarttyuk a terhést mind addig: míg
 veszedelem nélkül tartkhatni lehet:
 a terhességig. De ha a vérzés nagy:
 akkor veszedelem járulhat hozzá, és
 sül fájdalmas mutathornak, és a-
 nich egészen ragad a méh szájához;
 akkor a mesterjégek sülést kell vigbe-
 vinni. Ha pedig csak rézként ra-
 gad a méh leány; akkor erősenör,
 a hurok szorokot adunk belső képp,
 hogy így örvé hurokvan a méh, leg-
 alább a medonrébe hajtya a főt,
 a vérzés lijjebbéde, és így sülést
 leg alább sül fogóval kivétel
 a gyermeknek.