

Erklärung der Abkürzungen.

Pharmacopoen und Dispensatorien.

- A. Pharmacopoea Austriaca, Vindobonae 1820 in 8.
Am The Pharmacopoea of the United States of America. Boston 1820 in 8.
Amst. Pharmacopoea Amstelodamensis nova. Amstelod. 1792 in 4.
An. Pharmacopoea manusiae, Anvers 1812 in 8.
B. Pharmacopoea Batava, Amstelqd. 1805 in 4.
B. Süße von Riemann. (Lips. 1811 2 vol. 4.)
Ba. Pharmacopoea Bavarica, Monachii 1822 in 8.
Bel. Pharmacopoea Belgica, Hagae 1823 in 4.
Ber. Pharmacopoea Borussiae, Berolin. 1813 ed. 3.
Berol. Edit. 4., mit der Beib. von Duff. Zripp. 1828. in 4.
Berol. Pharmacopoea castrensis Borussiae, Regiomonti. 1823 in 8. ed. 4.
Br. Dispensatorium pharmaceuticum Brunsvicensis. Brunsv. 1777 in 4.
D. Pharmacopoea Danica, Hafniae 1803 in 4.
DD. Pharmacop. militaris Danica, Hafn. 1818 in 12.
Da. Pharmacopoea Dublinensis 1807 in 8.
Ed. Pharmacopoea Edinburgensia, Edinb. 1813 in 8.
Fenn. Pharmacopoea Fennica, Aboae 1810 in 8.
Fer. Pharmacopoea Ferrarense, Padova 1826 in 18 ed. 10.
Ful. Dispens. Fuldense, Franc. ed. M. 1791 8 ed. 3.
Gal. Codex medicamentarius sive Pharmacopoea Gallica, Paris 1818 in 4.
GalP. Ausgabe von Pécq. Paris 1826 in 8.
GalH. Ausgabe von Hettler und Dentz. Paris 1828 in 8.
GallM. Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires de France. Paris 1811 in 8.
Gen. Pharmacopoea Genevensis, Genov. 1780 in 8.
Ham. Pharmacopoea pauperum in usum instituti clinici Hamburgensis, Hamb. 1804 in 8. ed. 3.
Han. Pharmacopoea hannoverana, Hannov. 1819 in 8.
Hass. Dispensatorium electorale Hassiacum, Marburg. 1806 in 8. und
HassP. Pharmacopoea Hassiae electoralis, Cassellia 1827.
His. Pharmacopoea Hispanica, Madrid 1798 in 8.
Li. Dispensatorium Lippsonianum genio moderato accommodatum, Lemgoe 1799—1794. 2 vol. in 8.
Lon. u. LonN. (nova edit.) Pharmacopoea Londinensis. Lond. 1815 in 8. und 1824 in 8.
Lus. Pharmacopoea Lusitanica, Lipsab. 1711 in fol.
O. Pharmacopoea Oldenburgica, Oldenb. 1801 in 8.
Pal. Dispensatorium medicum pharmaceuticum Palatinatum, Manb. 1764 in fol.
Pol. Pharmacopoea regni Poloniae, Varsov. 1817 in 8.
R. Pharmacopoea Rossica, Petrop. 1803 in 8.
RC. Pharmacopoea castrensis Ruthena anct. J. Pflue. Petropol. 1808. in 8.
Sar. Pharmacopoea Sarda, Turin 1773. in 4.
Sax. Pharmacopoea Saxonica, Dresd. 1820 in 8.
Suec. Pharmacopoea Suecica, Stock. 1817 in 4. ed. 5.
Wit. Pharmacopoea Wirtembergica, Stuttg. 1798 in fol. ed. 6.
Wür. Pharmacopoea Herbitopolitana, Würceb. 1796 in 8. ed. 2.
WW. Pharmacopoea in usum nosocomii militaris Wurzburgensis. Würceb. 1816 in 4.
A. Ainslie Materia indica etc. Lond. 1826 2 voll. in 8.
Au. Augustin Pharmacopoea extemporanea etc. Berol. 1822 in 18. ed. 2.
B. Brera Ricettario clinico. Padov. 1826 in 8. ed. 3.
Be. Bergius Materia medica etc. Stockh. 1782. 2 voll. in 8.
Bo. Borias Formulaire de Montpellier. Montp. 1822 in 12.
Br. Brugnatelli Pharmacopée générale etc. Paris 1811 2 voll. in 8. ed. Planche.
Br. Süße Pécq. u. G. etc.
C. Owen The american dispensary etc. Philadelphia. 1826 in 8.
Ca. Gadet de Gassicourt Formulaire magistral etc. Paris 1823 in 18. ed. 5.
Da. Ellis The medical formulery etc. Philadelphia 1826 in 8.
Fi. Ferrarini Pharmacopoea, Bologna 1826. in 4.
G. Guibours Histoire abrégée des drogues simples. Paris 1826 2 voll. in 8. ed. 2.
Huf. Hufeland Armenpharmacopoea. Berl. 1826 in 8. ed. 4.
M. Murray et Gmelin. Apparatus medicaminum etc. Götting. 1776—1796 8 vol. in 8.
Ma. Magendie Formulaire. Paris 1827 in 12. ed. 6.
Par. Paris Pharmacologie. Lond. 1826 2 voll. in 8. ed. 6.
ParV. Dispensaire des bureaux de Charité de Paris. Paris 1819 in 8.
Pid. Pidarit Pharmacopoea rationalis, Gerlach 1806 in 8.
Pis. Pierquin Mémorial pharmaceutique. Montpell. 1824. in 32.
Ra. Rattier Formulaire pratique des hôpitaux civils de Paris. Paris 1827 in 18 ed. 3.
Sa. Saunders Pharmacopoea in usum studiosorum. Lips. 1799 in 8.
Sm. Sainte-Marie Nouveau formulaire médical et pharmaceutique. Paris et Lyon 1820 in 8.
Sp. Spielmann Pharmacopoea generalis, Argentor. 1783 in 4.
Sw. Swediaw Pharmacopoea medici practici universalis, Russ. 1817. 3 voll. in 12 ed. van Mons.
Sw. Süße von van Mons.
Sy. Pharmacopoea syphilitica (von Swediaw.) Paris 1799 in 12.
T. Tudei Pharmacopoea generale, Firenze 1826.
Vm. Van Mons Pharmacopée usuelle, théorique et pratique. Louvain 1821 2 voll. in 8.
Z. Zarda Pharmaca vegetabilia juxta pharmacopoeam austriaco-provincialem sistens, Praegae 1778 in 8.

Namen von Schriftstellern.

A. St. H. August St. Hilaire.
Ach. Acharius.
Ait. Aiton.
All. Allioni.
Alp. Alpini.
Anth. Aublet.
B. Beudant.
Bart. Barton.
Be. Berzelius.
Reauw. Palbot de Beauvois.
Big. Bigelow.
Bl. Blainville.
Blackw. Blackwell.
Ban. Bonpland.
Br. Brown.
Brongn. Brongniart.
Brug. Bruguière.
Burm. Burmann.
Cand. Decandolle.
Cass. Cassini.
Cat. Catesby.
Cav. Cavanilles.
Clas. l'Écluse.
Col. Colchoucke.
Coll. Colladon.
Comm. Commelin.
Curt. Curtia.
Cuv. Cuvier.
Daud. Daudin.
Del. Delile.
Dela. Delauney.
Dese. Descourtils.
Desf. Desfontaines.
Dill. Dillen.
Dod. Dodoens.
Dryand. Dryander.
Duh. Duhamel.
Dum. Duméril.
Esp. Esper.
Fab. Fabricius.
Fer. Férussac.
Fouill. Fouillee.
Forsk. Forakal.

Forst. Forster.
Gaert. Gaertner.
Garid. Garidel.
Gled. Gleditsch.
Gmel. Gmelin.
Gom. Gomez.
Gualt. Gualtieri.
H. Hally.
Herm. Hermann.
Hern. Hernandez.
Ham. Humboldt.
J. Jussieu.
Jaqu. Jaquin.
K. Kunth.
Kn. Kaorr.
Kniph. Kniphoff.
L. Linné.
Lab. Labillardière.
Lac. Laccépède.
Lat. Latrielle.
Latour. Latourrette.
Est. Linné Élite.
L'Hér. L'Héritier.
Lamb. Lambert.
Lam. Lamarck.
Lob. Lobel.
Lods. Loiseleur-Deslongchamps.
Lyngh. Lyngbye.
Mart. Martyn.
Mart. Marten.
Mér. Mérit.
Mérr. Méron.
Mich. Michaux.
Michel. Michx.
Mill. Miller.
Mos. Moench.
Mor. Morison.
Murp. Murray.
Mut. Mutis.
Oed. Oeder.
Oh. Olivier.
Pall. Pallas.
Pann. Pannier.

Pers. Persoon.
Pluk. Pinknet.
Plym. Plamier.
Poir. Poiret.
Pu. Pursh.
Purm. Purmann.
Rauw. Rauwolf.
Réaumur. Réaumur.
Red. Redouté.
Regn. Regnault.
Re. Retzius.
Rich. Richard.
Rivin. Rivinus.
Roem. et Schall. Roemer et Schell-tes.
Roes. Roese.
Ro. Roth.
Rottb. Rottboell.
Rosb. Roxburgh.
Ru. et Pav. Ruiz et Pavon.
Rumph. Rumphius.
Sal. Salisbury.
Schaeff. Schaeffer.
Scheuch. Scheuchzer.
Schë. Schkuhr.
Schn. Schneider.
Schrad. Schrader.
Schreb. Schreber.
Scop. Scopoli.
Ser. Seringe.
Sl. Sloane.
Sm. Smith.
Sonn. Sonnerat.
Spr. Sprengel.
Sw. Swartz.
Thunb. Thunberg.
Vaill. Vaillant.
Vand. Vandel.
Vauch. Vaucher.
Vent. Ventenat.
Willd. Willdenow.
Wright. Wright.
Zann. Zannichelli.

S ö l f e r n a m e n.

Ang. Englisch.
Ar. Arabisch.
Arm. Armenisch.
Ba. Bali.
Be. oder Beng. Bengalisches.
Bel. Holländisch.
B. Böhmisch.
Br. Brasilisch.
Cal. Kalmanisch.
Ca. Celsus.
C. Chinesisch.
Co. Cochinchinesisch.
Cy. Cypriatisch.
D. Dänisch.
Dut. Dutchonisch.
Eg. Egyptisch.

Gr. Mod. Griechisch.
Ges. Geyrat.
Hab. Hebräisch.
Hin. Hinduisch.
Hin. Syrisch.
Ha. Ungarisch.
Ir. Irotesisch.
I. Italienisch.
J. Japanisch.
Ja. Javanisch.
Lus. Portugiesisch.
Ma. Mandschu.
Mal. Malaisch.
Malab. Malabarisch.
Mar. Maratich.
Me. Mexicainisch.

Mo. Mongolisch.
Mos. Mojanbique.
N. Nepäl.
Pe. Persisch.
Pol. Polnisch.
R. Russisch.
Sa. Sanscrit.
Si. Sicilisch.
Succ. Schwedisch.
Syr. Syrisch.
Tu. Tartarisch.
Th. Tibetansisch.
Te. Tellingu.
Tam. Tamulisch.
Tur. Türckisch.
Turn. Ermat.

I.

I l e x.

Ilex vomitoria, Ait.; Brechhülßen, Apalachine; Apalachina, Thé de la mer du Sud (Gal.),

Br. Gal. Wir. C. Sp.

♀ (Tetrandria Tetragynia, L.; Rhamneae, J.) Eine Pflanze Florida's. (Hort. Kew. I. p. 170.)

Die Blätter, welche man anwendet, sind elliptisch ober lanzettig, stumpf, sägezählig, glatt und glänzend.

Ein sehr kräftiges Brech- und harntreibendes Mittel.

Imperatoria.

Imperatoria Ostruthium, L.; Meisterwurz, Kaiserwurzel, Dstranz; Imperatoire (Gal.); Masterwort (Ang.); Wssedobr (B.); Mesterurt (D.); Imperatoria (His. Lus.); Imperatoria, Erba rena (I.); Mesterwortel (Bel.); Maesterrot (Succ.)

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Borä. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Li. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

♀ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine im gemäßigten Europa wachsende Pflanze. (Blackw. t. 279. Schk. t. 74. Plenck t. 211. Hayne VII. t. 15. Fl. méd. IV. 200.)

Man wendet die Wurzel (radix Imperatoriae s. Ostruthii s. Magistrantiae s. Astrantiae) an; sie ist dick, ästig, fast knollig, wie geringelt, mit langen Fasern besetzt, außen graulichbraun, innen weiß. Sie hat einen starken gewürzhaften Geruch und einen scharfen, bitteren und unangenehmen Geschmack.

Reizend, blähungtreibend, die Ausbuchtung und Speichelfecretion befördernd; Hoffmann nannte sie ein *divinum remedium*, sie hat aber keine besondern Kräfte und wird jetzt nur wenig gebraucht. — Gabe des Pulvers, zwanzig bis dreißig Gran.

Pulvis masticatorius. (Sp.)

℞. Radicis Imperatoriae,
Corticis Sambuci,
singulorum semunciam.

Pharmacopoea universalis. II.

Foliorum Lauri sesquidrachmam.
Seminum Sinapis,

— Staphisagriae,
singulorum drachmam unam.

Caryophyllorum scrupulos quatuor.
Myrrhae drachmas sex.

Gabe, ein Scrupel in einen Knoten geknüpft, zum Rauhen bei Sprachlosigkeit und Zungenlähmung.

Infusum Imperatoriae. (Fi.)

Paratur cum Radicis Imperatoriae drachma dimidia vel drachma una et Aquae bullientis uncis decem.

Indicus Color.

Pigmentum Indicum; Indigo; Indigo (Gal.); Nil (Ar. Cy. Duk. Fe.); Chamhol (Co.); Tarum (Mal.); Anil (Lus.); Nili, Nil'ni (Sa. Tam.); Nilum (Tel.).
Br. Wir. A. Be. G. Sp. T.

Ein Farbestoff in kleinen, dicken, brüchigen, sehr dunkelazurblauen Stücken ohne Geruch und Geschmack, welche durch Reiben einen Kupferglanz annehmen.

Man gewinnt den Indigo von Indigofera Anil (Desc. Fl. méd. d. Ant. t. 17. Bert. Bild. I. 71. f. 1.), argentea und tinctoria, L. (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.), welche in Südamerika gebaut werden. Isatis tinctoria, L., liefert ihn auch, aber in geringerer Menge.

Er enthält mit mehreren andern verschiedenen Stoffen einen eigenthümlichen, den sogenannten Indigostoff, Indigotin (Indigotinum), welcher in gutem Indigo fast die Hälfte beträgt.

Die Pharmaceuten wenden ihn bisweilen, jedoch selten, an, um manchen Präparaten die Farbe zu geben. — Manche Aerzte geben ihn bei Icterus (T.)

Tinctura Resinae Indigo. (Br.)

℞. Resinae Indigo drachmam unam.
Alcoholis quantum sufficit.

Solutionem filtra. — Man erhält das Indigoharz durch Destillation von vier Theilen Schwefelsäure über einen Theil Indigo.

Sulphas Pigmenti Indici liquidus. (Ma.)

℞. Pigmenti Indici Bengalensis pulverati partem unam.

Acidi sulphurici concentrati
partes sex.

Actioni calidae subijce et dilue Aquae destillatae partibus nongentis nonaginta tribus.

Diese Flüssigkeit dient zur Prüfung der Stärke alkalisch salzsaurer Salze, durch welche sie entfärbt wird.

Inula.

In den Pharmacopöen kommen zwei Arten dieser Pflanzengattung vor:

1) *Inula dysenterica*, L.; Dürnwurz; Kubalant; Aunée antidyserterique, Herbe de Saint-Roch (*Gal.*); Niddle seize, Fléabane (*Ang.*); Roo loops alant (*Bel.*).

Br. *Gal. M. Sp.*

2) (*Syngenesia Polygamia Superflua*, L.; *Synanthereae*, *Cass.*) Eine in Europa an feuchten Orten häufig wachsende Pflanze. (*Zorn. Ic. pl. t. 272. Hayne VI. t. 46.*)

Man wendet das Kraut (*herba Conyzae mediae s. Arnicae spuriae s. suedensis*) an; es besteht aus einem runden, sitzigen Stängel mit umfassenden, länglichherzförmigen, sägezahnigen, wellenförmigen, gerunzelten, etwas sitzigen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen scharfen, etwas gewürzhaften, abstringirenden Geschmack.

2) *Inula Helenium*, L.; Alant, Alantwurz, Alantwurzel, Brustalant, Diant, Helenkraut; Aunée commune (*Gal.*); Elecampane (*Ang.*); Usularasun (*Ar.*); Women (*B.*); Oland Sanct Ellensron (*D.*); *Enula campana* (*His. Lus.*); Alantwortel (*Bel.*); *Enula campana*, *Elenio* (*I.*); *Bekhizan jabilischami* (*Pe.*); *Omanowy* (*Pol.*); *Aland* (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gall. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

2) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Blackw. t. 473. Plenck t. 624. Hayne VI. t. 45. Düss. off. Pfl. IV. t. 9. Fl. méd. I. 48. Berr. Bild. VI. 95. f. 1.*)

Die Wurzel (*radix Enulae s. Enulae Campanae s. Helenii s. Inulae*) ist spindelförmig, baumendick, fleischig, ästig, mit wenigen Fäserchen besetzt, außen gelbbraun oder braun, inwendig weiß. Fleisch hat sie einen starken durchdringenden Geruch, welcher beim Erhitzen weichenähnlich wird. Der Geschmack ist eigenthümlich, etwas bitter, gewürzhaft und beißend.

Sie enthält ein stüchtiges Del, eine Art

Stärke, Inulin (*Inulinum*) genannt, einen bitteren und einen harzigen Stoff.

Ionisch, harn- und schweißtreibend, den Auswurf und die Reinigung befördernd, wurmwidrig. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis zwei Drachmen.

§. I. Präparate, welche den Alant in Substanz enthalten.

Conserba Inulae. (*Gal. Sar. Fi. T. Vm.*)

℞. *Radici recentis Enulae mundatae* libram unam.

Aquae communis . . . libras octo.

Macera per aliquot dies, radicem tunc coctione mollem redde et in decocto clarifica

Sacchari albi . . . semilibram.

Digere radicem in syrupo per dies tres, coque tunc, donec spississimus factus sit et illam in eo serva vel balnei vaporis ope sicca. (*Sar.*)

℞. *Radici Enulae* . . . quantum vis.

Coque in Aquae sufficiente quantitate, donec inter digitos conteri possit; contunde in mortario marmoreo, pulpam per cribrum bombycinum trajice et adde Syrupi ad plumam cocti pondus duplum. (*Sar.*)

Gal. Pulpae partem unam et quatuor Sacchari in decocto radici ad electuarii solidi consistentiam cocti; — T. Pulpae libras quatuor et Syrupi Enulae libras sex; — Vm. Pulpae partem unam et tres Sacchari albi; — Fi. Radici libram unam coquere, pulpam per setaceum trajicere, decocti liquidum cum Sacchari albi libris duabus ad syrupo spissi consistentiam coquere, et pulpa addita, totum ad justam spissitudinem redigere jubet.

Pulvis Inulae aromatisatus. (*Sa.*)

℞. *Pulveris Radici Inulae partes sex.*
— *Angelicæ partem unam.*

Misce.

Pulvis antilyssicus Ormskirkianus. (*B.**)

℞. *Pulveris Radici Inulae*

drachmam unam.

— *Cretæ* . . . semunciam.

— *Boli Armenae*

drachmas tres.

— *Aluminis* . grana decem.

Olei essentialis Anisi

guttas quinque.

Esedem sehr berühmt.

Unguentum Inulae s. Enulae s. Helenii s. enulatum. (*B.* Br. His. RC. Wir. Au. Huf. Sp. Sw.*)

℞. *Radici Enulae* . . . semilibram.

Aquae fontanae

uncias centum viginti octo.

Coque et in pulpam redige, cui adde Butyri recentis . unciās quatuor.

Misce. (B^o.)

Su. Coquere Enulae semilibram in Aquae libra una et pulpae addere Butyri unciās tres; — *Au. et Huf.* Radicem coquere in Aquae quantitate sufficiente, ut fiat pulpa, quae cum Axungiae Porci sufficiente quantitate conteratur; — *RC.* Radicis pulveratae semilibram cum Aquae fontanae librā una ad consistentiam pultis coquere et addere Adipis suilli praeparatae unciās tres.

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Axungiae Porci . . . semilibram.
Olei Olivarum . unciās quatuor.

Tere in mortario lapideo; coque blando igne ad humidam consumptionem, exprime et colaturae adde

Cerae flavae,
Terebinthinae purae,
singulorum unciām unam.

Misce bene (Br. Wir. Sp.)

℞. Olei Enulae compositi
libras quatuor.

Cerae flavae . . . libram unam.
Axungiae Porci . unciās quatuor.

Liquatis et semirefrigeratis adde
Styracis liquidae
drachmas undecim.

Mastichis pulverati drachmas sex.
Agita donec refrigerint. (His.)

Gegen scabies empfohlen.

Theriaca officinalis. (Li.)

℞. Pulveris Enulae . . unciās duas.

— Zedoariae,
— Myrrhae,
— Aristolochiae rotundae,
— Angelicae,
singulorum sesquinciām.

Rob Juniperi . . . unciās sex.

Mellis depurati,
Syrupi Capiti Papaveris,
singulorum unciās octo.

Misce bene. — *Gabe*, eine Drachme bis eine halbe Unze.

Trochisci Enulae. (Bo. Ca.)

℞. Pulveris Enulae . . . seminciām.
— Iridis Florentinae
drachmam unam.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Bei Scorbut, Wasserfucht, Bleichfucht,
eine halbe Unze täglich.

§. II. Präparate, welche nur einen
Theil der Bestandtheile des Alantē
enthalten.

A. Auszug durch Destillation.

Aqua Enulae s. Helenii. (Gal. Fi.)

℞. Radicis recentis Enulae
partem unam.

Aquae communis partes quinque.
Destillent partes duae.

Aqua antiasthmatica. (Br. Pal. Wir. Sp.)

℞. Radicis Enulae,
— Liquiritiae,
— Iridis Florentinae,
singulorum unciās duas.

Herbae Hederæ terrestris,
— Farfarae,
— Botryos,
singulorum semilibram.

— Hyssopi,
— Marrubii albi,
— Pulegi,
— Salviae,
singulorum unciās tres.

Anisi,
Foeniculi,
singulorum unciām unam.

Alcoholis . . . libram unam.
Aquae fontanae . libras decem.

Post tres dies digestionis destillent
librae sex vel septem. (Wir.)

℞. Radicis Enulae . . unciās duas.
— Pimpinellae albae,
— Iridis Florentinae,
singulorum sesquinciām.

Herbae Hyssopi,
— Marrubii albi,
— Salviae,
singulorum unciās duas.

Anisi,
Foeniculi,
Baccarum Juniperi,
— Lauri,
singulorum unciām unam.

Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Zingiberis, singulorum seminciām.

Styracis Calamita . drachmas sex.

Alcoholis . . . libras duodecim.

Aquae Acaciae . . . libras octo.

Post tres dies digestionis destillent
librae decem; producto adde

Julep rosati . . . libras duas.
Aquae Foeniculi . . libras octo.

Misce. (Br.)
℞. Radicis Enulae,
— Liquiritiae,
— Iridis Florentinae,
singulorum unciām unam.

— Angelicae,
— Pimpinellae albae,
singulorum drachmas sex.

Herbae Capilli Veneris,
— Hyssopi,
— Pulmonariae,
— Hederæ terrestris,
— Salviae,
— Farfarae,

Seminum Anisi,
— Foeniculi,

- Seminum Urticae,
singulorum semunciam
- Croci scrupulos duos.
- Alcoholis libram unam.
- Aquae Scabiosae,
— Marrubii,
— Veronicae,
singulorum semilibram.
- Post tres dies digestionis destillatio
in balneo aquae instituitur. (Pal.)
- R. Radicis Enulae . . . uncias duas.
— Iridis Florentinae . . . sesquiunciam.
- Herbae Hyssopi,
— Rorismarini,
— Salviae,
singulorum unciam unam.
- Anisi,
Foeniculi,
Cinnamomi,
singulorum semunciam.
- Cardamomim minoris drachmas duas.
- Croci scrupulos duos.
- Alcoholis uncias duodecim.
- Aquae Hyssopi uncias viginti quatuor.
- Digesta per tres dies destillent. (Sp.)
Bei feuchtem Husten alter Leute. —
Gabe, Morgens eine oder zwei Unzen.
- B. Auszug durch mechanische Mit-
tel.
- Syrupus Enulae.* (Gal.)
- R. Succis depurati Radicis Inulae . . . sesquilibram.
- Sacchari albi libras duas cum dimidia.
- Liqua et cola.
Brustmittel.
- C. Auszug durch Wasser.
- Tisana Enulae.* (Gal.)
- R. Radicis Enulae . . . unciam unam.
Aquae bullientis . . . libras duas.
- Infunde, cola et adde
Mellis vel Syrupi Capilli Veneris
unciam unam.
- Extractum Enulae s. Helenii aquosum.*
(A. Ams. An. B. Bor4. Br. Gal. Gen.
HassP. His. Li. Pal. Suec. T. Vm.)
- R. Radicis recentis Enulae . . . quantum vis.
- Bene lotam raspa et exprime suc-
cum; pulpam cum Aquae paxillo tri-
tam iterum exprime; succus tunc per
manicam trajectus blando calore ad
extracti consistentiam evaporet. (Gen.
Vm.)
- R. Radicis Enulae . . . libram unam.
Aquae fontanae . . . libras sex.
- Macera per dies quatuor in loco ca-
lido et coque parumper; cola expri-

mendo et colaturam consume. (Br. Li. Pal.)

- R. Radicis Enulae . . . libram unam.
Aquae frigidae . . . libras quatuor.
- Macera in vase tecto, subinde agi-
tando et cola; residuo novam Aquam
infunde et macera, quo facto leni ex-
pressionem coletur; liquores mixti et co-
lati in balneo aquae evaporent. (Gal.)
- R. Radicis Enulae . . . partem unam.
Aquae bullientis . . . partes octo.
- Digere per horas viginti quatuor,
tunc coque per horae quadrantem et
cola; residuo per horae quadrantem
cocto cum Aquae novae partibus qua-
tuor et colato, liquores commisce, et
post desidentiam decanthatos consume.
(An.)

B. Digestionis horas viginti quatuor
et duas bullitionis cum Aquae partibus
decem, tunc secundum per horas duas
coctionem cum Aquae partibus octo;
— Ams. Coctionem primam cum vi-
ginti, secundam cum quindecim parti-
bus Aquae, ad dimidium quamque con-
tinuatas; — His. Digestionem per ho-
ras viginti quatuor et ebullitionem per
duas cum partibus decem Aquae et se-
cundam coctionem cum Aquae nova
quantitate ad dimidium remanentiam; —
HassP. ut extractum Colombo p. 561;
— T. ut extractum Centaurii minoris
p. 449; — Bor4. ut extractum aconiti
p. 61.

- R. Radicis Inulae . . . quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
- Radice pluribus ebullitionibus se-
quentibus penitus extracta, liquores
misce et decanthatos vaporando consu-
me. (A. Suec.)

Gabe, ein Scrupel bis eine halbe Drachme.

Mixtura pectoralis. (Ca.)

- R. Extracti Enulae . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici . . . drachmas duas.
Aquae Hyssopi . . . semunciam.
Oxymellis scillitici,
Syrupi Hyssopi,
singulorum sesquiunciam.

Eßfelweise.

Mixtura antiasthmatica. (Sp.)

- R. Extracti Enulae,
— Cascarillae,
singulorum scrupulum unum,
Essentiae Pimpinellae albae,
— Liquiritiae,
singulorum drachmam unam.
Elixir pectoralis Wedellii
drachmas duas.
- Oxymellis scillitici . . . semunciam.
Aquae Tusilaginis,
— Pulmonariae,
— Hyssopi,

Aquae Foeniculi,
— Veronicæ,
Syrupi Althæeae,
singulorum unciam unam.

Edßelweise.

Decoctum Helenii s. Enulae. (B.)*

℞. Radicis Enulae . . . semunciam.
Aquae fontanae . . . quantum sufficit
ut coquendo colaturae unciæ sex ob-
tineantur.

Gabe, alle zwei Stunden einen oder zwei
Edßel.

*Decoctum Enulae s. Helenii compositum,
Hydromel compositum. (Ra.)*

℞. Radicis Enulae . . . unciam unam.
Summitatum Hyssopi,
Foliorum Hederæ terrestris,
singulorum drachmas duas.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque et colaturae adde

Syrupi Mellis uncias duas.

Schwach reizend, bei chronischen Catar-
acten, Asthma und Herzerweiterung empfoh-
len.

*Potio Enulae composita s. cordialis diu-
retica. (Ra)*

℞. Decocti Enulae . . . uncias quatuor.
Tincturae Digitalis . . . semunciam.
— Potassae . . .

guttas octodecim.

Syrupi quinque Radicum . . .
unciam unam.

Reizend, harntreibend. — Edßelweise.

Decoctum Carnis s. Jus purificans. (Pic.)

℞. Carnis vervecinae (collet)
uncias quatuor.

Radicis Enulae . . . semidrachmam.

— Hydrolapathi . . .
drachmam unam.

Cancrorum contusorum . . . no. 2.

Foliorum Cichorii,

— Fumariae,

— Nasturii,

singulorum manipulum unum.

Coque in Aquae sufficiente quanti-
tate.

Oxymel pectorale. (Br. Ca. Sp.)

℞. Radicis Enulae . . . unciam unam.

— Iridis Florentinae . . .

semunciam.

Aquae fontanae uncias triginta sex.

Coque ad unciarum viginti quatuor
remanentiam, cola et post desidentiam
colaturae adde

Mellis albi . . . uncias sedecim.

Gummi Ammoniaci unciam unam

in

Aceti albi . . . unciis octo
dissoluti, Coque ad mellis consisten-
tiam.

Bei Husten und feuchtem Asthma empfoh-
len. — Edßelweise, von Zeit zu Zeit.

D. Auszug durch Weinessig.

Acetum theriacale. (Pal.)

℞. Radicis Enulae,
— Angelicae,
— Cyperi,
— Zedoariae,
— Caryophyllatae,
— Contrayervae,
— Imperatoriae,
— Valerianae sylvestris,
— Viperinae,
singularum semunciam.

Corticis recentis Aurantii,

— Citri,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Galangae,

Baccarum Juniperi,

— Lauri,

Summitatum Salviae,

— Rorismarini,

— Rutae,

singulorum drachmas duas.

Aceti libras septem.

Macera per mensem in loco calido,
cola fortiter exprimendo et adde

Theriacae uncias septem.

Macera per mensem et filtra.

Innerlich zu einem halben bis ganzen
Edßel, als schweißtreibend und gegen An-
streckung empfohlen; auch äußerlich in Ein-
reibungen als stärkend.

E. Auszug durch Wein.

*Vinum Enulae s. Helenii s. enulatum.
(B*, GalM. Sar. Vm.)*

℞. Radicis recentis Enulae . . .
partem unam.

Vini albi partes sedecim.

Digere frigide per plures dies, cola
exprimendo et filtra. (Vm.)

Sar. Radicis siccae uncias duas, Vini
albi libras quatuor et viginti quatuor
horas macerationis.

℞. Tincturae Enulae . . . partem unam.

Vini rubri partes decem vel viginti.

Misce bene. (GalM.)

℞. Essentiae Enulae drachmam unam.

Vini albi uncias sex.

Syrupi simplicis . . . drachmas sex.

Misce. (B*) — Crasting's Formel.

F. Auszug durch Alkohol.

*Tinctura Helenii s. Enulae. (A. Ams.
An. B. Pal. Fi. T.)*

℞. Radicis Enulae . . . partem unam.

Alcoholis (15°) partes sex.

Post tres dies digestionis, blando ca-
lore, filtra. (B.)

A. Radicis partem unam, et sex Al-
coholis (0,910); — Ams. Radicis par-

tem unam, et sex Alcoholis (0,917); —
Fi. Alcoholis 24° sex; — *Pal.* et *Wir.*
 Radicis partem unam et quatuor Al-
 coholis; — *T.* ut tincturam Contra-
 yervae p. 567. parat.

R. Radicis Enulae . unciam unam.

Alcoholis (20°) unciis quatuor.

Infunde in balneo aquae tepido per
 dies quatuor, cola et residuo infunde

Alcoholis (20°) . . . unciis duas.

Maceraudo continua per dies duos,
 cola, et colaturas mixtas filtra.

Reizend, Blähungstreibend, Ausdünstung
 befördernd; besonders bei Brustaffectionen
 empfohlen — Gabe, sechs Tropfen bis
 eine Drachme.

Extractum Enulae s. Helenii alcoholicum.

(Ba. Bor. Bor4. Ful. Han. O. Pol.
 Sax. Wir. Wür.)

R. Radicis Enulae,

Alcoholis, singulorum libras duas.

Aquae communis libras novem.

Digere per horas duodecim, cola ex-
 primendo, alcoholem destillatione elice,
 et residuum ad aptam consistentiam
 consume. (Pol.)

Ba. Bor. Han. O. et Sax. Radicis
 partes duas, Alcoholis tres et novem
 Aquae; — Ful. Radicis unam, sex Al-
 coholis et tres Aquae.

Bor4. ut extractum Aconiti p. 61.

R. Radicis Enulae . libram unam.

Alcoholis libras quinquem vel sex.

Post sufficientem extractionem cola
 fortiter exprimendo; residuum digere
 et tunc coque parumper cum Aquae
 libris tribus, decoctum albuminis ope
 clarifica, liquores commisce et, alcohole
 destillando elicit, quod restat ad ex-
 tracti consistentiam consume. (Wir.)

R. Radicis Enulae . . . quantum vis.

Alcoholis . . . quantum sufficit

ut radix quatuor digitorum crassitiem
 tegatur; digere in loco calido et de-
 cantha; coque per horam cum Aqua,
 cola cum expressione, et colaturam ad
 mellis consistentiam consume, tinctu-
 ram sub finem addendo ut massa sit
 homogenea neque grumosa.

Dieselbe Gabe, wie bei'm extr, aquo-
 sum,

Elixir antihystericum. (Ca. Vm.)

R. Radicis Asari . . . partes tres.

— Iridis Florentinae
 partes quinque.

— Enulae,

— Calami,

singulorum partes decem.

— Liquiritiae partes quindecim.

Seminum Anisi partes quinque,

Aquae Vitae . partes octoginta.
 Stent in infusione frigida per plures
 dies; colaturae adde

Camphorae . . . partem unam.

Dissolve. (Vm.)

Ca. Liquiritiae sesquidrachmam, Ga-
 lami, Enulae, singulorum drachmam
 unam, Iridis, Anisi, singulorum semi-
 drachmam, Radicis Asari grana octo-
 decim, Camphorae grana sex et Alco-
 holis semilibram.

Reizend, besonders bei feuchtem Asthma
 empfohlen. — Gabe, zehn bis dreißig
 Tropfen in einer Tasse Thee oder irgend
 einem schwachen Aufguss.

Elixir pectorale Elsneri. (Vm.)

R. Radicis Liquiritiae,

Croci,

Anisi stellati,

singulorum partes quatuor.

Radicis Enulae,

— Iridis Florentinae,

singulorum partes octo.

Spiritus Hyssopi

partes nonaginta sex.

Infunde in balneo aquae, filtra et
 adde colaturae

Balsami Peruviani partem unam.

Mellis Narbonnensis

partes sedecim.

Sepone per aliquot tempus et filtra.

Elixir americanum Courcellesii. (B. Ca.)*

R. Alcoholis (32°),

Aquae Vitae (21°), singulorum oc-
 tarios (litre) octo.

Radicis Enulae . libras quatuor.

— Sacchari,

— Aristolochiae rotundae,

singulorum libras tres.

— Donacis,

Foliorum Lauri Perseae,

singulorum libras duas.

Florum Hyperici libram unam.

— Sambuci . . . semilibram.

Corticis Sideroxyli . unciis sex.

Foliorum Aurantii,

Crotonis balsamiferi,

singulorum unciis quatuor.

Juniperi . . . unciis tres.

Opii puri unciis duas cum dimidia.

Justiciae assurgentis,

Florum Aurantii,

— Tiliae,

Summitatum Rorismarini,

singulorum unciis duas.

Radicis Asari,

— Chamaeropsis humilis,

Cucurbitae, Lagenariae,

singulorum unciam unam.

Macera et cola; residuum combure et
 cinerem in liquore infunde cum

Florum Rhoeados . . . uncias sex.
 Rubiae tinctoriae . . . uncias tribus.
 Filtra. — Ca. hat diese Formel auf

folgende Weise verbessert:

℞. Alcoholis partes centum viginti.
 Radicis Enulae . . . libras sedecim.
 Florum Hyperici . . . libras octo.
 Foliorum Aurantii . . . libras sex.
 Florum Sambuci . . . libras quinque.
 Foliorum Tanaceti . . . libras quatuor.
 Florum Tiliae . . . libras duas cum dimidia.

Radicis Donacis,
 Juniperi,
 Florum Rorismarini,
 Opii, singulorum libras duas.
 Radicis Asari . . . libram unam.
 Aquae . . . quantum sufficit.

ut liquor 24° indicet. Colora cum rhoeado.

Ein Reizmittel, welches in America in einer Menge Beschwerden, welche theils von nerösen Krämpfen, theils von Schwäche hergeleitet werden, sehr geschätzt ist und gleichsam als Universalmittel betrachtet wird. — Gabe, ein starker Eßset, allein oder in einem passenden Getränk, zwei oder drei Mal zu wiederholen.

G. Auszug durch Del.

Oleum Inulae s. Enulae s. Helenii compositum. (E.)

℞. Radicis Inulae,
 — Valerianae,
 — Bardanae,
 Summitatum Hyperici,
 — Abrotani,
 — Absinthii,
 — Basilici,
 — Calaminthae,
 — Balsamitae maris,
 — Majoranae,
 — Menthae rotundifoliae,
 Foliorum Salviae,
 Foliorum Sambuci,
 . . . singulorum uncias tres,
 Summitatum floresentium Chamomillae,
 — Meliloti,
 — Stoechatis,
 . . . singulorum uncias duas,
 Foliorum recentium Lauri,
 — — Ebuli,
 — — Rorismarini,
 — — Rutae,
 . . . singulorum uncias sex.
 Seminum Cumini,
 — Foenugraeci,
 — Urticae,
 . . . singulorum unciam unam.
 Olei Olivarum . . . libras duas.
 Macera per dies quatuor, coque tunc

ad consumptionem humidi et sepone ut depurificetur.

I o d i u m.

Iodium s. Iodina; Jod, Jodine; Iode (Gal.).

℞. Ba. Bor4. Fer. HassP. Fi. Ma. T. Vm.

℞. Lixivii NatriFucorigum quantum vis.
 Affunde Acidum sulphuricum concentratum in excessu et coque lente liquorem in retorta vitrea, recipiente instructa; acus s. squamas splendentes in hoc concretas Aquae frigidae parva quantitate lotas blando calore sicca.

Ba. HassP. T. ope Oxydi Mangani et Acidi sulphurici sublimatione paratum indicant; — Fi. Lixivii uncias quinque, Mangani nigri pulverati unciam dimidiam, Acidi sulphurici uncias sex, Aquae fontanae sesquunciam, post horas viginti quatuor digestionis fiat destillatio; iodium obtentum cum pondere quadruplo Magnesia commisce et purifica.

Ein sehr kräftig reizendes und erregendes Mittel, in hohen Gaben ein Gift, welches unter gewissen Umständen eine sehr bedeutende Wirkung auf die Brustdrüsen und besonders auf die Schilddrüse äußert, in Folge deren diese Organe mehr oder weniger vollkommen schwinden. Man hat es bei der Behandlung der Scrofeln und des Kropfes, bei lymphatischen Geschwülsten jeder Art, beim Krüpper, selbst acuten, bei chronischer Leukorrhöe, Hodengeschwülsten 2c. empfohlen. — Man wendet es innerlich und äußerlich an, jedoch ist Vorsicht nöthig und man muß sogleich, damit aufgehören, sobald Abmagerung eintritt, welche im Allgemeinen das erste Zeichen seiner schädlichen Wirkung ist — Gabe, von einem achtel bis zu einem ganzen Gran, täglich zweimal, in Pillen.

Tinctura s. Alcohol Iodii s. Iodi. (B*. Ba. Bor4. Fer. GalF. HassP. Bo. Fi. Ma, Pie.Ra. T. Vm.)

℞. Iodii . . . partem unam.
 Alcoholis (35°) partes duodecim.
 Dissolve, (Fer. GalF. Bo. Ma. Ra.)

Pie. Iodii partem unam et octo Alcoholis; — Ba. Iodii unam et Alcoholis novemdecim (viginti HassP. Tinctura Iodinae diluta ut reagens); — Vm. Iodii unam et Alcoholis decem cum pauxillo; — B*. Iodii unam et Alcoholis sedecim ad septemdecim; — Bor4. Iodii grana quadraginta octo, Spiritus Vini alcoholisati unciam unam; — HassP. Iodii grana quadraginta, Spiritus Vini rectificatissimi unciam unam;

— T. Iodii scrupulos sex, Alcoholis 33° B. uncias duodecim; — Fi. Iodi scrupulos duos, Alcoholis 35° unciam unam.

Zwanzig Tropfen der ersten Formel enthalten etwa einen Gran Iod und der Tropfen wiegt $\frac{2}{3}$ Gran. — Gabe, für Erwachsene vier bis zehn Tropfen, täglich dreimal, in einem halben Glase Zuckerswasser, allmählig bis auf zwanzig und mehr Tropfen gesteigen. — Nicht ohne Vermeidung wahr- scheinlich eine schwächere Tinctur an, als die Magen die'sche, da dreißig Tropfen nur etwa einen Gran Iod enthalten; auch giebt er sie bis zu dreißig Tropfen Nor- gens und Abends.

Syrupus Iodii. (Fer. T.)

℞. Tincturae Iodii drachmas duas.
Syrupi Sacchari uncias quatuor.
Misce frigide.

Tinctura Iodii aetherea, Aether iodini- curus s. ioduratus. (Fer.)

℞. Iodii grana sex.
Aetheris (66°) drachmam unam.
Dissolve.

T. Alcoholis 36° B. partes vol. duas,
Acidi hydroiodici (1,700) partem unam,
destillant in balneo aquae; productum cum Aqua tracta.

Pilulae Iodii s. iodatae. (Fer. B.)

℞. Iodii granum unum.
Liquiritiae pulveratae scrupulum unum.
Rob Sambuci quantum sufficit.

Fiant pilulae duae.

Unguentum Iodii s. iodatum. (Fer. B. T.)

℞. Iodii semidrachmam.
Axungiae praeparatae sesquiunciam.

Terendo exacte misce.

T. Iodii scrupulos sex, Axungiae praeparatae uncias quatuor, Sebi uncias duas.

Tinctura Alcoholis Sulphuris iodata s. Carbureti Sulphuris iodurati. (Vm.)

℞. Iodii partem unam.
Alcoholis Sulphuris partes tres.
— Vini partes novem.
Misce ut sensim solvatur iodium.

Acidum iodicum. (T. Vm.)

℞. Kali iodioi pulverati quantum vis.
Infunde ei Acidi tartarici in Aquae quantitate qua potest minima soluti sufficientem quantitatem, liquorem post aliquot tempus decantha, et lenta vapo- ratione consume, refrigerare sinendo quoque momento, donec nihil amplius subsideat.

Secundum Davy purum obtinetur, Iodium cum Gase oxydato Chlori sicco commiscendo, quo facto chloro decom- posito acidum iodicum excernitur. (T.)

Kali iodicum s. iodanicum. (Fer. T. Vm.)
℞. Iodii quantum vis.

Liquoris Kali caustici concen- tratae quantum sufficit.

Solutione ad siccum evaporata, resi- duum cum Alcoholo lava et quod non solutum remansit, serva. (Fer. T.)

℞. Natri Fulcorum cribrati et pulverati quantum vis.

Aquae leviter potassatae pondus duplum.

Coque et operationem cum eadem Aquae quantitate repete, liquores com- mixtos filtra, vaporando consume et crystallos, prout formantur collectas et exstillatas pulvera et Aqua calida lava; Aqua lotionum cum illa exstil- lata commixta totum ad siccum eva- poret; residuum serva. (Vm.)

Dieser Rückstand enthält viel salzsaures Natron und Kali. Man könnte ihn statt des Jodwasserstoffkali anwenden.

Calcaria iodica s. iodinica.

In keiner Pharmacopoe ist die Berei- tung angegeben.

Boli resolventes deprimentes. (B.)

℞. Calcariae iodinicae grana sex ad decem.

Extracti Aconi

grana viginti quatuor.

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle vier Stunden. — Bei chronischer Bronchitis und tuberkulöser Schwindsucht.

Boli emmenagogi resolventes. (B.)

℞. Calcariae iodinicae grana decem.
Extracti Sabinae grana duodecim.

Fant boli quatuor. — Gabe, alle vier Stunden ein Stück. Bei Mangel der Rei- nigung mit Scrofe complication.

Acidum hydroiodicum. (Fer. GalH. T.)

℞. Phosphureti Iodii quantum vis.
Retortae intromissum parumper hu- mecta et lente calefac; acidum inde evolutum, tubi longi recurvati ope, in fundum catilli angusti excipe.

Immittere potes quoque Iodio Aqua destillata diluto torrentem Gasis Acidi hydrosulphurici donec liquor colore sit privatus, hunc calefacere et filtratum sub recipiente apparatus pneumatici sedulo (ad dimidia vel tertiae part. s remanentiam T.) concentrare.

Proto. hydroiodas Potassii.

Hydroiodas Protoxydi Potassii, Hydro- iodas Potassii s. kalicus, Iodetum Kali- lii, Kali hydroiodicum. (B*. Bor4. Fer. GalF. GalH. HassP. Ma. T.)

1) Verfahren Turner's.

℞. Solut.onis Kali caustici (1,150) quantum vis.
Adde sensim, blando calore

Iodii quantum sufficit ad neutralisandum kali (donec liquoris color intense ruber in rubicundum nec flavescens vergat Bor4.). Evaporatum ad siccum calcina fortiter et in Aqua dissolutum crystallisationi subjice. (Bor4. GalF. GalH. Ma.)

B*. Kali cum Acido hydroiodico saturatum ad liquoris spissi consistentiam evaporare jubet.

2) Verfahren Gaillet's und Baup's.

R. Iodii partes decem.
Aquae destillatae partes quinquaginta.

Retortae vitreae immixtis adde sensim, dosibus divisim

Limaturae Ferri purae

partes quinque, quaque vice vas agitando. Calefac usque liquor colore sit privatus; filtra hunc et filtrum cum Aqua bulliente ablue donec liquor saporis sit expers; liquorem et lotionum Aquam commisce et totum in arena ad ebullitionem usque calefac; infunde deinde solutionem Kali subcarbonici tantum ut omne ferrum oxydatum praecipitetur; filtra et filtrum sedulo ablue; liquores commisce et si charta exploratoria rubra baseos excessum indicet, Acidi hydroiodici pauxillum adde; evaporent tunc in balneo arenae ad cuticulae apparitionem usque; quo facto igne extincto crystallisationi subjice, Aqua parumper lava et crystallos sicca. (GalH.)

HassP. Iodinae purae uncias duas, Aquae dest. octo, Limaturae unam; liquido limpido filtrato et residuo cum Aqua dest. abluto liquores cum Aquae dest. unciis triginta misceantur et liquoris cinerum clavellat. depurat. tantum addatur ut omne Oxydum ferri praecipitetur; residuo cum Aqua dest. cloto et expresso, liquores clari vaporent lento calore et crystallisationi subjiciantur etc.; — *Fi. Iodii* drachmam unam, Aquae destillatae unciam unam, Limaturae sesquidrachmam, Kali subcarbonici quantum sufficit.

3) Verfahren Zabbet's.

R. Iodii quantum vis.
Dissolve in
Alcoholis (25° B.)

quantitate sufficiente.

Solutioni deinde infunde per vices Kali hydrosulphuricum (liquidum?), donec colorem lacteam induerit; liquor tunc sponta clarificato adhuc infunde guttas aliquot kali, filtra, et ad siccum evaporatum crystallisationi subjice. (GalH. T.)

Brandes Kali sulphuratum liquidum adhibet.

Diese Zusammensetzung erhält nur im flüssigen Zustande den Namen iodwasserstoffsaures Kali; crystallisirt ist es Jodkali. (Ioduretum Potassii).

R. Acidi hydroiodici partem unam.
Aquae partes quatuor.

Infunde sensim Kali subcarbonicum ad perfectam saturationem usque, filtra et evaporata crystallisationi subjice. (Fer.)

Potio resolvens ex Iodio, Solutio Hydroiodatis Potassae. (Fer. GalF. GalH. B. Bo. Ma. Pic. Ra.)

R. Hydroiodatis Potassae

grana triginta sex.

Aquae destillatae unciam unam.
Dissolve.

Ein Tropfen dieser Flüssigkeit ist über einen Gran schwer. — Man hält sie allgemein für vorzüglich, als die Linctur, und verschreibt sie auf dieselbe Weise, in denselben Gaben und unter denselben Umständen, wie diese.

Potio stimulans.

R. Hydroiodatis Potassae grana duo.
Magnesiae sulphuricae semunciam.
Tartari stibiatii granum dimidium.
Aquae uncias sex.
Gabe, ein Kaffeelöffel drei oder vier Mal täglich, bei Scrofeln.

Pilulae Hydroiodatis Potassae. (Pic.)

R. Hydroiodatis Potassae

drachmas quinque.

Aquae destillatae drachmas sex.
Panis biscocci quantum sufficit ut fiat massa in pilulas trecentas dividenda, quarum quaeque salis unum granum continet.

Bei Kropf, Leucorrhoe und weißen Geschwülsten.

Unguentum Kali hydroiodici s. Hydroiodatis Potassae. (B*. Bor4. Fer. GalF. GalH. B. Bo. E. Ma. Pic. Ra. T.)

R. Hydroiodatis Potassae

semidrachmam.

Axungiae Porci sesquunciam.
Misce triturando.

Bor4. Kali drachmam unam, Magnesiae carbonicae grana sex, tere additis aliquot guttis Aquae destillatae cum Unguenti rosati uncia una; — T. Kali drachmas tres, Axungiae uncias sex; i placet, guttas aliquot essentiae Bergamottae addere potes.

In Einreibungen, besonders gegen Kropf. — Gabe, Morgens und Abends, jedesmal haufelnußgroß eingegeben.

Tabellae cum Coffea Moccaënsse. (Pie.)

℞. Sacchari pulverati uncias quatuor.
Coffeae Moccaënsis porphyrisatae
semidrachmam.

Hydriodatis Potassae
grana septuaginta quinque.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae
cum infuso forti Coffeae paratae
quantum sufficit.

Fiant tabellae trecentae. — Bei wei-
ßem Fluß, Stops, Amenorrhoe, Drüsen-
stopfungen, Scrofeln.

*Hydroiodas ioduratus Potassae. (Fer. Fi.
Ma. T.)*

℞. Hydriodatis Potassae partes viginti.
Iodii puri . . . partes sex.

Misce in mortario vitreo et diu trita-
tura ut mixtura sit homogœnea et ob-
scure rubra.

℞. Hydriodatis semidrachmam, Iodii
grana decem; — T. Hydriodatis drach-
mas sex, Iodii scrupulos quinque.

*Solutio Hydriodatis iodurati Potassae,
Solutio Coindetii. (Fer. B. Ca. Ma.)*

℞. Hydriodatis Potassae
grana triginta sex.

Aquae destillatae unciam unam.
Solutioni adde

Iodii . . . grana decem.

Ein Tropfen wiegt anderthalb bis zwei
Gran.

*Syrupus Hydriodatis iodurati Potassae.
(T.)*

℞. Hydriodatis iodurati Potassae
grana octodecim.

Aquae destillatae drachmas duas.
Solutioni adde

Syrupi simplicis . uncias decem.

℞. Hydriodatis drachmam unam,
Aquae destillatae unciam unam, Syrupi
simplicis uncias quadraginta.

Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Un-
ze in 24 Stunden.

*Unguentum Hydriodatis iodurati Pot-
assae. (Fer. B. Bo. Ca. Ma. Pie. T.)*

℞. Hydriodatis iodurati Potassae
semidrachmam.

Iodii grana decem ad quindecim.

Axungiae . . . sesquiunciam.
Contere bene. (Fer. Bo. Ca. Ma.)

℞. Hydriodatis Potassae
drachmam unam.

Iodii . . . grana viginti.

Succi gastrici Vituli
quantum sufficit.

ut fiat, intra horarum viginti quatuor
tempus, solutio, cui adde

Axungiae . . . uncias duas.
Misce bene. (Fer. B. Pie.)

℞. et T. ut unguentum kali hydro-
iodici sed cum Kali iodurato. (T.)

Alle diese Präparate sind wirksam, als
die mit dem einfachen Jodwasserstoffkali.

Mixtura s. Potio resolvens. (B.)

℞. Ononidis . . . unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut decocti unciae sex obtineantur; co-
laturae adde

Solutionis Hydriodatis iodurati Po-
tassae . . . guttas quadraginta.

Syrupi Sacchari . unciam unam.

Allmählig zu nehmen, bei scrofulösen
Krankheiten.

*Natrum hydroiodinicum, Hydroiodas
Sodae, Sodium iodatum. (HassP. T.)*

Ut Kali hydroiodinicum sed cum Sale
Sodae depurato, Aqua soluto, loco li-
quoris cinerum clavell.

*Ioduretum Carbonii s. Carburetum Io-
dii. (T.)*

℞. Solutionis alcoholicae (Alcoholis
33° B.) Iodii saturatae

quantum libet

Instilla guttatim

Solutionem Kali caustici alcoholi-
cam

ita tamen, ut iodii parva quantitas li-
bera restet; sepone liquorem per ali-
quot tempus, tunc Aquae magnam co-
piam ei infunde, squamulae iodureti
citri coloris in Alchole rectificato
solve et hanc solutionem per chartam
filtratam in vase vitreo vel porcellaneo
amplae superficiei evaporationi sponta-
neae subijce ut squamulae iodureti pu-
rae obtineantur.

Röhmte versucht werden bei Krankheiten,
wo die Tinctur den Magen angreift.

Hydroiodas Ferri, Ferrum hydroiodicum.

Die Bereitungsart ist in keiner einzigen
Pharmacopde angegeben.

*Solutio ad strumam s. antistrumosa,
(Pie.)*

℞. Hydriodatis Ferri drachmas qua-
tuor et grana quadraginta,

Aquae destillatae uncias quatuor.

Gabe, zehn Tropfen Morgens und Abends
und allmählig gestiegen.

*Unguentum ad scrofulas s. antiscrofu-
losum. (Pie)*

℞. Hydriodatis Ferri grana sexaginta.
Axungiae . . . unciam unam.

Soll mit Erfolg gegen Kenorrhoe, weiße
Geschwülste und Drüsenverstopfungen ange-
wendet worden seyn.

Trochisci emmenagogi. (Pie.)

℞. Hydriodatis Ferri grana triginta.
Croci pulverati semidrachmam.

Sacchari . . . uncias quatuor.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae,
Infusi Singulorumomii,
singulorum quantum sufficit.

Fiant trochisci ducenti quadraginta.
Bei Amenorrhoe und Leucorrhoe gerührt.
— Gabe, fünfzehn bis zwanzig Stück täg-
lich, allmählig gestiegen.

I p e c a c u a n h a .

Brechwurzel, Ruhrwurzel; Ipecacuan-
ha (Gal.); Ipecacuan (Ang.); Hipeca-
cuana, Bejuguillo (His.); Ipekakuanq
(Pol.); Kraekrot (Suec.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Eenn.
Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han.
Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus.
O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür.
WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid.
Sp. Z.

Die wahre Ipecacuanha ist die Wurzel
von *Cephaelis Ipecacuanha*, Rich., einer
Pflanze (Pentandria Monogynia, L.;
Rubiaceae, J.), welche in den Wäldern
Brasilien's wächst. (Dict. d. Sc. méd. T.
XXVI. pl. 1. Hayne VIII. 20. Rich.
Hist. Ip. t. 1. de Mart. Spec. mat. med.
Bras. t. 1. Plenck. t. 754. Berl. Jahrb.
X. et XXII. t. 1. Linn. Trans. VI. t. 6.
St. Hil. pl. us. Bras. t. VI.)

Von dieser Wurzel (radix Brasiliensis)
kommen im Handel drei Varietäten vor:

1) Die graue, geringelte, schwärz-
lichgraue, braune Ipecacuanha;
sie ist nicht über federpulendick, unregel-
mäßig geringelt, außen schwärzlichgrau und
enthält weniger Holz, als Rinde; der Bruch
ist weißlich und harzig, der Geschmack bit-
ter und etwas scharf.

2) Rötlichgraue, rothgraue
oder graue Ipecacuanha; sie hat
äußerlich eine rötliche Farbe, unregelmä-
ßige Ringe, einen harzigen, rosenspäthlichwei-
ßen Bruch, und ihr Geschmack ist etwas
bitterer als der der vorhergehenden.

3) Grauweiße, weiße oder grü-
fergeringelte Ipecacuanha, mit
wenig hervorstehenden, fast regelmäßigen
Ringeln, von grauweißer Farbe, harzigem,
weißlichem Bruche, bitterem Geschmack und
von größerer Dichte, als die beiden vorher-
gehenden. Im Handel kommen von der
ersten etwa zwei, von der zweiten ein
Drittheil vor, die dritte findet man dage-
gen äußerst selten.

Noch führen eine Menge anderer Wur-
zeln den Namen Ipecacuanha; so in
America, nach Decandolle, alle die,
welche brechenregende Eigenschaften besit-
zen. Unter ihnen unterscheidet man die von

Psychotria emetica, Mut., einem Strau-
che Peru's (Hayne VIII. 19. Berl. Jahrb.
XXII. t. II. Mart. Spec. mat. med.
Bras. t. 8. f. 8—10 radix. Rich. Hist.
Ip. t. 2. Desc. fl. méd. d. Ant. t. 120.
Humb. Pl. aequin. II. t. 126. Fl. méd.
IV. 201. Bert. Bild. VII. 24. f. 1.),
die sogenannte schwarze, gestreifte,
aschgrau, süßholzartige
Ipecacuanha. Sie hat gar keine oder nur
sehr wenige und unregelmäßige Ringe, aber
Längstreifen. Der Bruch ist harzig, aber
weniger dicht, als bei den vorigen, und
beutlich schwarzgrau, besonders wenn man
sie befeuchtet. Sie hat keinen Geschmack.
Sie kommt aus Peru, jedoch nur wenig in
den Handel. Auch ist sie nicht sehr ge-
schätzt.

Noch wird einer weißen oder stä-
kemehlartigen Ipecacuanha ge-
dacht, die Wurzel von *Richardsonia Bra-
siliensis*, Gom. (Lus. M.) (Hayne VII.
21. Aug. St. Hil. pl. us. du Brés. t.
VIII. Mart. l. c. I. t. 9. f. 13. 14. ra-
dix), an welcher man unregelmäßige, kaum
halbkreisrunde Ringe bemerkt. Sie hat die
Stärke einer Taubenseder, ist runzelig, ge-
dreht, weißgrau und ohne Geschmack. Sie
riecht schimmelig. Der Bruch ist weiß,
stärkemehlartig und durchaus nicht harzig.
Man findet sie nie unter der käuflichen
Ipecacuanha.

Die wahre Ipecacuanha enthält, nach
Pelletier, einen fetten Stoff, Gummi,
Sagmehl und besonders ein Alcaloid, das
sogenannte Emetin (Emetina, Emeti-
num), dem sie ihre Eigenschaften verdankt.
Dieses Alkali ist in der Wurzel der *Psy-
chotria* in geringerer Menge vorhanden,
als in der der *Cephaelis*, und *Richard-
sonia* enthält dessen nur sehr wenig.

Reizend, Brechen und Stuhlaussierungen
bewirkend, oder bloß aufregend oder tonisch,
wenn man sie in geringer Gabe reicht. —
Gabe, als Reizmittel, einen bis vier, als
Brechmittel zwölf bis dreißig Gran in vier
Unzen Wasser.

§. I. Präparate, welche die Ipecacuan-
ha in Substanz enthalten.

*Pulvis ad diarrhoeam s. anti diarrhoei-
cus.* (Sm.)

℞. Ipecacuanhae . . . grana duo.

Sacchari . . . drachmas quatuor.

Olei Nucis moschatae guttas duas.

Fiat pulvis in quatuor partes divi-
dendus. — In vier und zwanzig Stun-
den, jedes Pulver in einem halben Glase
Zuckerwasser zu nehmen und 15 oder 20
Tage lang fortzubrauchen. — Von Frank
bei chronischer Diarrhoe empfohlen.

Pulvis emeto-catharticus. (E. Rg.)

℞. Ipecacuanhae grana viginti quatuor.

- Rhei grana duodecim.
 Fiat pulvis. (Ra.)
 E. Ipecacuanhae et Rhei, singulorum scrupulum unum; in Syrup zu nehmen.
- Pulvis motum peristalticum invertens s. nauseam ciens.* (Au. B.)
 R. Ipecacuanhae grani quadrantem.
 Sacchari . . . grana quindecim.
 Alle zwei Stunden zu nehmen. — Bon Richter bei eingeklemmten Brüchen empfohlen. (Au.)
 R. Ipecacuanhae . . . granum unum.
 Gummi Arabici,
 Sacchari,
 singulorum scrupulum unum.
 Alle zwei Stunden zu nehmen, bei chronischen Catarrhen. (B.)
Pulvis emeticus s. vomicus. (RC. Au.)
 R. Ipecacuanhae,
 Sacchari albi,
 singulorum scrupulum unum.
 Divide in partes quatuor. — Gabe, ein Stück alle Viertelstunden, bis Erbrechen eintritt.
 R. Ipecacuanhae,
 Sacchari albi,
 singulorum grana quindecim.
 Sulphuris Antimonii aurati
 grana quinque.
 Divide in partes quatuor.
 R. Ipecacuanhae,
 Sacchari albi,
 singulorum grana quindecim.
 Tartari stibiati . . . granum unum.
 Divide in partes quatuor.
 R. Ipecacuanhae scrupulum unum.
 Tartari stibiati . . . granum unum.
 Miscere ut fiat pulvis subtilissimus, pro dosi sumendus.
Pulvis febrifugus. (Sm.)
 R. Ipecacuanhae scrupulum unum.
 Magnesia subcarbonicae
 unciam unam.
 Divide in partes viginti quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, in einer Lasse Thee. — Bon Wichmann empfohlen.
Pulvis expectorans. (E. Par. Ra.)
 R. Ipecacuanhae
 grana viginti quatuor.
 Scillae grana duodecim.
 Fiat pulvis. (Ra.)
 R. Ipecacuanhae grana sex.
 Myrrhae grana duodecim.
 Nitri semidrachmam.
 Divide in partes quatuor. — Gabe, viertelstündlich ein Stück. (E. Par.)
Pulvis carminativus. (Pie.)
 R. Ipecacuanhae . . . granum unum.

- Succini porphyrisati
 grana duodecim.
 Fiat pulvis.
Boli digestivi. (Ca. Sw.)
 R. Ipecacuanhae
 grana duo ad quatuor.
 Pulveris aromatici grana decem.
 Syrupi Cinnamomi
 quantum sufficit.
Pulvis alexiterius. (Ful.)
 R. Ipecacuanhae,
 Extracti Opii,
 singulorum grana sex.
 Kali sulphurici . . . drachmas tres.
 Gabe, zehn Gran.
Boli antidysenterici. (Ca. Sm.)
 R. Ipecacuanhae . . . grana duo.
 Theriacae . . . scrupulum unum.
 Cretae praeparatae
 quantum sufficit.
Boli adstringentes. (Pie.)
 R. Ipecacuanhae
 granum unum cum dimidio.
 Aluminis grana sex.
 Dioscoridi . . . quantum sufficit.
 Fiat bolus.
 R. Ipecacuanhae
 granum unum cum dimidio.
 Laudani liquidi Sydenhami
 granum unum.
 Conservae Cynorrhodi
 quantum sufficit.
 Fiat bolus.
Boli vomitivi. (Ra.)
 R. Ipecacuanhae grana octodecim ad
 viginti quatuor.
 Mellis quantum sufficit.
 Fiant boli tres. — Galtstündlich zu nehmen.
Pilulae nauseam ciens. (B.)
 R. Ipecacuanhae grana sex.
 Rob Sambuci quantum sufficit
 ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.
Pilulae expectorantes. (E.)
 R. Extracti Cicutae,
 Pulveris Ipecacuanhae,
 singulorum grana decem.
 Fiant pilulae quatuor. — Gabe, zwei Stück auf einmal.
 R. Ipecacuanhae grana quindecim.
 Saponis albi . . . quantum sufficit.
 Fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück täglich vier Mal.
Linctus s. Marmelada pectoralis. (Bo.)
 R. Ipecacuanhae pulveratae
 grana duodecim.

Florum Sulphuris scrupulum unum.
Radici Iridis Florentinae.
drachmam unam.

Mannae in lacrymis,
Syrupi Althaeae,
singulorum uncias duas.

Bei Reuchhusten empfohlen. — Gabe,
ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Opiatum antidysentericum. (Ca.)

℞. Ipecacuanhae . . . semidrachmam.
Radici Tormentillae
drachmam unam.

Opii purificati . . . grana quatuor.
Conserve Rosarum rubrarum,
Syrupi Myrtillorum,
singulorum drachmas sex.

Electuarium Ipecacuanhae moschatum s.
vomitivum. (Au.)

℞. Pulveris Rhei,
— Tartari boraxati,
singulorum drachmam unam.
— Ipecacuanhae
semidrachmam.

— Moschi . . . grana quatuor.
Sulphuris aurati Antimonii
grana decem.
Mellis . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel, bis ein leichtes
Erbrechen erfolgt. — Bärens empfiehlt
es bei Reuchhusten.

Trochisci Ipecacuanhae. (An. B*. Ba.
Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. His. Suec. Br.
Ca. Fi. T. Vm.)

℞. Ipecacuanhae . . . partem unam.
Sacchari albi partes quadraginta.
Mucilaginis Tragacanthae cum Aqua
Rosarum paratae
quantum sufficit.

Fiant trochisci granorum duodecim.
(Fer. Gal. Ca.)

Br. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari duodecim, et Mucilaginem Gummi Arabici ad formandos trochiscos nonaginta quatuor; — Bor4. Ipecacuanhae drachmas duas, Aquae fervidae q. s. stent loco calido per horas aliquot; colaturae expressae adde Gummi Tragacanthae q. s. ut cum Sacchari albisimi pulverati uncias sedecim massa fiat in trochiscos formanda; — His. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari quadraginta quatuor, Gummi Tragacanthae tres et Aquae quantum satis ut fiant trochisci centum quadraginta quatuor; — B*. et Ba. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari sexaginta et Mucilaginis Tragacanthae q. s. ut fiat massa, cujus drachma quaeque in trochiscos decem dividatur; — An. et Bel. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari septuaginta duas et Mucilaginis Gummi

mi Tragacanthae quantum satis ut fiant trochisci granorum decem; — Suec. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari nonaginta sex et Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit ad formandos sexaginta trochiscos; — Fi. Radici drachmas duas, Sacchari pulverati uncias sex, Mucilaginis Tragacanthae q. s. ut fiant trochisci no. 288; — T. Radici drachmas duas, Sacchari pulverati uncias decem, Mucilaginis Tragacanthae cum Aq. Flor. Aur. paratae et aliquot guttis Essentiae Caryophyllorum aromatisatae quantum satis ut fiant trochisci granorum circiter sedecim, quorum quisque Ipecac. gr. $\frac{1}{2}$ continet.

℞. Pulveris Ipecacuanhae
grana triginta sex.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiant trochisci centum quadraginta quatuor. (Han.)

℞. Pulveris Ipecacuanhae
partem unam.
Sacchari . . . partes triginta duas.
Ipecacuanham cum aequali pondere
sacchari tritam cum reliquo saccharo
ad plumam cocto commisce. (Vm.)

Trochisci Ipecacuanhae opiatae. (GalH.)
℞. Ipecacuanhae . . . partes sedecim.
Sacchari albi

partes sexcentas quadraginta.
Extracti Opii . . . partes quinque.
Gummi Tragacanthae partes octo.
Aquae Florum Aurantii
quantum sufficit.

Opium in Aquae pauillo solum
mucilagini addendo, trochisci formen-
tur.

Trochisci Ipecacuanhae compositae. (B*)

℞. Ipecacuanhae scrupulum unum.
Salis Ammoniaci . . . semunciam.
Chocolatae pulveratae

sesquiunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Syrupi Capilli Veneris
quantum sufficit.

Fiant trochisci octoginta.

Potio vomitiva. (GalM. Bg. ParC. Ra.
Sa. Sm. Sw.)

℞. Ipecacuanhae . . . grana duodecim.
Aquae uncias quatuor.
Misce bene. (Ra.)

GalM. et Bo. Ipecacuanhae grana
viginti et Aquae uncias quatuor.

℞. Ipecacuanhae
grana viginti quatuor.
Aquae purae . . . uncias novem.
Syrupi Capilli Veneris
unciam unam.

Misce bene. (Gal.)

ParC. Ipecacuanhae grana decem,
Aquaе unciās quatuor et unam unciām
Syrupi Sacchari.

℞. Ipecacuanhae
grana viginti quinque.

Oxymellis scillitici
drachmam unam.

Aquaе purae . . . unciām unam.

Misce sedulo. (Sw.)

Sa. loco aquae purae Aquam alexi-
teriam simplicem adhibet.

℞. Ipecacuanhae . . . grana decem.
Kermētis mineralis granum unum.

Aquaе Cinnamomi hordeatae
drachmas quatuor.

— communis . . . unciās sex.

Misce. (Sm.)

℞. Ipecacuanhae . . . scrupulum unum.

Tartari emetici . . . granum unum.

Syrupi Mellis . . . semunciām.

Aquaе unciās quatuor.

Misce. (Ra.)

℞. Ipecacuanhae . . . grana viginti.

Aquaе unciās quatuor.

Tartari emetici . . . grana duo.

Misce. (GalM.)

Auf zwei oder auf mehrere Male und
selbst auf einmal zu nehmen.

Potio antispasmodica. (Ham.)

℞. Ipecacuanhae grana tria.

Aquaе Valerianae,

— Menthae piperitae,
singularum unciās tres.

Misce.

Potio antemetica s. antivomitiva. (Sm.)

℞. Ipecacuanhae

grana duo ad quatuor.

Natri subcarbonici . grana decem.

Syrupi Capiti Papaveris

unciām unam.

Aquaе Menthae . . . unciās sex.

Gegen krampfhaftes Erbrechen. — Alle
Stunden oder zwei oder drei Stunden ein-
nen Eßfel.

Mixtura emetica s. vomitiva. (B*.)

℞. Ipecacuanhae . . . grana viginti.

Olei Amygdalarum dulcium

unciām unam.

Misce bene.

§. II. Präparate, welche das wirksame
Princip der Ipecacuanha ohne das
zur Ausziehung benutzte Vehikel
enthalten.

Extractum Ipecacuanhae. (Vm.)

℞. Corticis Radicis Ipecacuanhae pul-
verati quantum vis.

Prelo de Real submitte, Aqua fri-
gida humectans; post horas viginti

quatuor apparatus columnae pedum vi-
ginti duarum ad quinque Aquaе bul-
lientis pressurā adhibita, liquidum,
quamdiu colore praeditum prodeat,
susceptum per pannum laneum (Stan-
nell) colatum, ad extracti consistentiam
consume.

§. III. Präparate, welche das wirksame
Princip der Ipecacuanha zu-
gleich mit dem zur Ausziehung be-
nutzten Vehikel enthalten.

A. Auszug durch Wasser.

Infusum Ipecacuanhae. (Ams. B*. Ful.
Ham. Li. Vm.)

℞. Ipecacuanhae . . drachmas duas.
Aquaе bullientis . . . unciās sex.

Post horae quadrantem infusionis co-
la. (Ful. Li.)

℞. Ipecacuanhae contusae
sesquidrachmam.

Corticis Aurantii . drachmas duas.

Aquaе unciās quinque.

Infunde in vase tecto per semihoram
et adde

Cremoris Tartari drachmas duas.

Vas tege et post refrigerationem

cola absque expressione. Colaturae
unciis quatuor adde

Oxymellis . scillitici semunciām.

Misce bene. (Ams. B*. Han. Vm.)

Gabe, alle Viertelstunden einen bis zwei
Eßfel.

Infusum tonicum. (Bo.)

℞. Ipecacuanhae contusae
grana viginti quinque.

Corticis Aurantiorum amarorum

drachmam unam.

Aquaе quantum sufficit

ut colaturae unciae sex obtineantur,
quibus adde

Syrupi Florum Aurantii
unciām unam.

Gabe, ein Eßlöffel eine halbe Stunde
vor jeder Mahlzeit.

Decoctum Ipecacuanhae. (Sp.)

℞. Ipecacuanhae grossiuscule pulve-
ratae drachmas duas.

Aquaе fontanae . . . unciās quatuor.

Decoque blando igne ad dimidium et
cola; residuo bis eodem modo cocto,
colaturae tunc commisceantur.

Bei Ruhr empfohlen. — Auf dreimal
zu nehmen, drei Tage hintereinander.

Syrupus Ipecacuanhae aquosus. (Bor4.
Gal. Li. Fi. T. Vm.)

℞. Radicis Ipecacuanhae contusae
scrupulos octo.

Infunde

Aquae communis fervidae
quantitatem sufficientem
ad colaturam unciarum novem, cui
adde

Sacchari albillissimi uncias sedecim.
Fiat ebullitione unica syrupus. (Bo. 4.)
℞. Radicis Ipecacuanhae griseae contusae semilibram.
Aquae libras septem.

Coque in vase clauso ad liquidi librarum sex remanentiam; subsideant; tunc clarificatis filtratisque addantur

Sacchari albi librae duodecim.
Coque ad consistentiam syrupi. (Gal.)

T. Ipecacuanhae uncias duas, Aquae communis libras duas et uncias quatuor ad librarum duarum remanentiam coquere et liquori post refrigerationem et subsidentiam decanthato filtratoque addere Sacchari libras quatuor, ut fiat syrupus; — *Fi.* Ipecacuanhae cinereae unciae uui Aquae bullientis uncias quatuordecim infundere et leviter ad unius librae remanentiam coquere, filtrare per chartam et additis Sacchari albillissimi libris duabus balnei aquae ope in vase clauso syrupum parare.

℞. Ipecacuanhae grossiuscule contusae partem unam.

Aquae frigidae quantum satis ad humectandum. Post horas duodecim adde

Aquae bullientis partes viginti.
Refrigeratis et colatis adde

Sacchari albi partes viginti quatuor.

Clarifica et vaporando ad syrupi consistentiam inspisa. (*Vm.*)

℞. Ipecacuanhae libram unam.
Aquae libras sex.

Macera per horas duodecim, residuo infunde Aquae aequalem quantitatem; infusus tum commixtis et filtratis fiat coctione sufficiente, cum Sacchari libris viginti quatuor syrupus.

℞. Ipecacuanhae semunciam.
Aquae libras quinque.

Coctis per octo vel decem sexagesimas et colatis adde

Sacchari albi libras duas cum dimidia.

Coquendo ad syrupi consistentiam redactis adde denique

Aquae Florum Aurantiorum unciam unam.

Misce. (Li.)

Syrupus incisivus s. expectorans. (Fer. Bo. Pie. Sw*.)

℞. Radicis Ipecacuanhae drachmas duas.

— Iridis Florentinae,

Lichenis pyxidati,
singulorum unciam unam.

Sacchari libras duas.
Fiat syrupus. (Sw*.)

B. et *Pie.* Radicis Iridis unciam unam,
Lichenis semunciam et Polygalae Virginicae tantidem.

Syrupus Ipecacuanhae compositus s. pectoralis de Courti. (B. Fer. Pie. T.)

℞. Polygalae Virginicae,
Lichenis Islandici,
singulorum-uncias duas.

Chinae rubrae contusae semunciam.
Iridis Florentinae drachmas duas.

Ipecacuanhae drachmam unam.
Sacchari libras duas.

Fiat syrupus. (B. Pie.)

℞. Ipecacuanhae uncias duas.
Chinae uncias quatuor.

Opii scrupulos duos.
Aquae libras septem.

Macera per dies duos vel tres et decantha, et hoc cum Aqua nova tam diu repete quam haec colorem extrahat; liquoribus filtratis adde

Sacchari albi libras novem.

Evaporent in balneo aquae ad syrupi consistentiam. (Fer.)

T. Aquae libras sex, evaporationem ad librarum quatuor cum dimidia remanentiam, caeterum ut Fer.

Potio emetica s. vomitiva. (Ful.)

℞. Cremoris Tartari semidrachmam.
Aquae bullientis uncias quatuor.

Colaturae adhuc ferventi adde
Pulveris Ipecacuanhae drachmas duas.

— Corticum Aurantiorum drachmam unam.

Post aliquot tempus filtra, — *Effelweise.*

Potio febrifuga. (Ca. Sm.)

℞. Ipecacuanhae sesquidrachmam.
Corticis Aurantii drachmas duas.

Cremoris Tartari semunciam.
Aquae uncias quatuor.

Coctis et colatis adde
Oxymellis scillitici semunciam.

Misce bene. (Ca.)

Sm. Ipecacuanhae semidrachmam ad drachmam, Corticis Aurantiorum drachmas duas, Cremoris Tartari tantidem,

Aquae uncias duodecim coquendo ad octo redactas et Oxymellis scillitici uncias duas.

Effelweise zu nehmen.

Potio expectorans et incisiva. (Gal. Bo. Ca.)

℞. Ipecacuanhae drachmam unam,

Folliculorum Sennae

drachmas duas.

Aquae bullientis . . . uncias sex.

Post horas duodecim infusionis colaturae adde

Oxymellis scillitici,

Syrupi Hyssopi,

singulorum unciam unam.

Bei'm Reuchhusten. — Gabe, Sondern des Morgens sechs Kaffeelöffel.

Mixtura expectorans et tonica. (Pie.)

℞. Ipecacuanhae . . . grana decem.

Corticis Aurantiorum immaturorum,

Lichenis Islandici,

singulorum drachmas duas.

Aquae uncias sex.

Coque per semihoram, tunc liquorem infunde

Herbae Hyssopi,

Radici Polygalae Virginicae,

singularum manipulo uno.

Cola et adde

Syrupi Boraginis . unciam unam.

Eßweise, bei Catarrhalbeschwerden.

B. Kusjug durch Wein.

Vinum s. Tinctura Ipecacuanhae s. Ipecacuannae, Infusum Ipecacuanhae vinosum, Vinum Psychotriacae s. Psychotriac emeticae. (Am. Ams. An. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Suec. Br. C. Sw. Vm.)

℞. Ipecacuanhae contusae

partem unam.

Vini albi boni partes quindecim.

Macerata per tres dies et filtra. (Ams. B. Bel. Ed. Lus. Br. Sw.)

RC. Vinum Hispanicum album et dierum septem macerationem; — Am. Du. Lon. et C. Ipecacuanhae uncias duas, Vini albi Hispanici octarios duos et macerationem per dies quatuordecim; — Fenn. et Suec. Ipecacuanhae drachmas sex et Vini albi Hispanici semilibram; — Vm. Ipecacuanhae partem unam, Vini Maderani tringinta duas; — Li. Ipecacuanhae drachmas sex et Vini Hispanici uncias sex.

℞. Ipecacuanhae contusae

uncias duas,

Spiritus tenuioris

fluiduncias duodecim.

Aquae destillatae

fluiduncias viginti.

Macerata per dies quatuordecim et cola. (LonN.)

℞. Ipecacuanhae grossiusecule contusae unciam unam.

Vini albi uncias octo.

Alcoholis (20°) uncias duas.

Digere in arenae balneo per tres dies, cola et residuo infunde

Vini albi uncias quatuor.

Alcoholis (20°) unciam unam.

Post duos dies digestionis cola et colaturas commixtas filtra. (An.)

Vinum emeticum s. Ipecacuanhae compositum. (B. Wür.)*

℞. Ipecacuanhae uncias duas.

Corticis Aurantiorum semunciam.

Vini generosi

libras duas cum dimidia.

Infunde frigide per dies aliquot et cola. (Wür.)

℞. Ipecacuanhae uncias quatuor.

Sacchari albi uncias duas.

Alcoholis (32°) libras duas.

Digere in balneo arenae per hebdomadem et adde

Vini albi libras octo.

Anisi stellati unciam unam.

Sacchari albi uncias quatuor.

Post sex dies filtra. (B*.)

Eine Unze ist gleich 18 Gran Ipecacuanha.

Syrupus Ipecacuanhae compositus. (Pie.)

℞. Ipecacuanhae contusae drachmas quinque et scrupulum unum.

Vini albi libram unam.

Infusis per horae quadrantem adde

Aquae bullientis . libras quatuor.

Salis vegetabilis . uncias quatuor.

Serpilli drachmas sex.

Corticis Aurantii amari drachmas

quinque et scrupulum unum.

Infunde per horas quatuor, cola et adde

Syrupi Althaeae . . . libras duas.

Aquae Florum Aurantiorum

uncias duodecim.

Syrupus de Desessarts. (B. Br. Ca. Pie.)*

℞. Ipecacuanhae contusae

unciam unam.

Sennae mundatae . uncias tres.

Vini albi . uncias viginti quatuor.

Macerata per horas duas, decantha liquorem et filtratum sepone; residuo adde

Magnesiae sulphuricae uncias tres.

Summitatum Serpilli

unciam unam.

Florum Rhoeados uncias quatuor.

Aquae bullientis . . . libras sex.

Stent in infusione per quatuor horas, tunc cola, filtra liquorem et adde

Aquae Florum Aurantiorum

uncias viginti quatuor.

Sacchari albi contusi

libras quindecim

et tincturam vinosam, misce et frigide solve.

C. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Ipecacuanhae. (T. Vm.)

R. Ipecacuanhae . . . unciam unam.

Alcoholis 26° B. . . uncias octo.

Digere per duodecim vel quindecim dies. (T.) Besonders zur Bereitung des syrup. alcoh. Ipec.

R. Ipecacuanhae . . . partem unam.

Aquaе Vitae;
Vini Maderani,

singulorum partes quatuor.

Stent in infusione frigida per plures dies, quo facto expressa filtra. (Vm.)

Jérôme hat folgendes Verfahren vorgeschlagen:

R. Ipecacuanhae griseae grossiuscule pulveratae . . . uncias quatuor.

Alcoholis (37° B.) . . . libram unam.

Digere in balneo vaporis per horas viginti quatuor, caloris 34° ope, subinde agitando; refrigerata filtra; residuo infunde

Alcoholis (22°) . . . libram unam.

Digerentur denuo in vaporis balneo per horas viginti quatuor et filtrentur. Residuo infunde

Aquaе fluviatilis filtratae fervidae libram unam.

Continuetur infusio per horas viginti quatuor; tunc, refrigeractis, quod subsedit, filtri ope separa; commisce tincturas et agitatae se pone e quibus praecipitatum abundans, quod subsedit post horas duodecim separatur. E liquore filtrato distillatione libris duabus Alcoholis abstractis, liquidum quod in balneo aquae remansit, filtra et ei Alcoholis 36° B. unciam unam adde.

Die letztere Tinctur ist sehr stark, indem sie in zwei Unzen Flüssigkeit sechs und fünfzig Gran Stoff aufgelöst enthält.

Syrupus Psychothrae emeticae s. Ipecacuanhae (alcoholicus). (An. Bel. T.)

R. Radicis Ipecacuanhae contusae unciam unam.

Alcoholis 20°

uncias novem cum dimidia.

Macera radicem per septimanam in Alcoholis dimidio; decantha et quod liquidum restat, pulpae infunde. Digere in aquae balneo, filtra et cum tinctura antea parata commisce. Tunc mixturae drachmis quinque Syrupi communis tepidi libram unam addendo fiat syrupus. (An.)

Bel. eandem formulam, sed Alcoholem 10°; — Jérôme syrupum parare proposuit commiscendo Tincturam Ipecacuanhae suae uncias duas cum Syrupi communis libra una et uncias duas et, ut consistenzia requisita obtineatur, per momentum coquendo; — T. Tincturae (T.) unciam unam, Syru-

pi simplicis 32° B. uncias triginta; miscere agitando.

Tinctura Ipecacuanhae anisata. (Bo. Ca. Ra.)

R. Ipecacuanhae pulveratae

unciam unam.

Spiritus Anisi . . . uncias quatuor.

Digere. (Ca.) — Interdum Sacchari vel Syrupi Capilli Veneris paucillum additur.

Ra. Ipecacuanhae unciam unam et duas Spiritus; — Bo. Spiritus Anisi et Sacchari, singulorum uncias quatuor, Tartari emetici grana duodecim, Ipecacuanhae unciam unam, Vini albi libras duodecim et quatuordecim dies infusionis.

Ein Brechmittel, welches Albert besonders bei Kindern empfohlen hat. — Gabe, eine bis zwei Unzen.

Elizir sudorificum Willisii. (Ca.)

R. Ipecacuanhae,

Balsami Tolutani;

singulorum semunciam.

Florum Benzoës,

Opii purificati,

Croci, singulorum drachmas duas.

Olei essentialis Anisi

drachmam unam.

Camphorae . . . scrupulos duas.

Alcoholis libras duas.

Reizend, schweißtreibend. — Gabe, eine bis zwei Drachmen. — Eine halbe Unze enthält zwei Gran Opium.

I r i s.

In den Pharmacopoen werden mehrere Arten dieser Pflanzengattung aufgeführt:

1) Iris Germanica, L.; Deutscher, blauer Schwertel; Flambe vraie (Gal.); Blue flower de Luce (Ang.); Kosatec (B.); Sverdlilie (D.); Lirio de Alemania (His.); Blaawe iris (Hel.); Giglio celeste azzurro (I.); Mieczky ziele (Pol.); Lirio roxo dos montes (Lus.); Swaeras lilja (Succ.).

Ams Br. Fer. Ful. Gal. Gen. His. Pal. Wir. Wür. Be. G. M. Sp. Z.

2) (Triandria Digynia, L.; Irideae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Bull. t. 141. Blackw t. 69. Plenck t. 34. Dict. de Sc. nat. cah. 5. Zorn. Ic. pl. t. 188.)

Man wendet die Wurzel (radix Ireos nostratis s. Gladioli coerulei) an; sie ist lang, walzig, gegliedert dicht, fleischig, runzelig, außen bräunlich und faserig, innen weiß. Frisch ist ihr Geruch unangenehm, getrocknet schwach weichenartig. Der Geschmack der frischen Wurzel ist scharf und reizend, wird aber bitter und widerlich, wenn sie getrocknet ist.

2) Iris Pseudacorus, L.; Ackermann, Wasserschwertelwurzel, gelbe Teichlilie, sal-

ſche Acoruswurzel, unächter Kalmusſchwerdtel; Flambe bâtarde, Faux acore, Acore bâtarde (Gal.); Yellow iris (Ang.); Svaerdlilie (D.); Acore bastardo (His.); Geel lisch (Bel.); Irida gialla (I.); Mieczky zoty (Pol.); Svaerds lilja (Succ.).

Br. Gal. Wir. Re. G. M. Sa. Sp.

4 Eine Europäische Pflanze. (Bull. t. 137. Blackw. t. 261. Plenck t. 36. Zorn Ic. pl. t. 187.)

Man wendet die Wurzel (radix Acori palustris s. vulgaris s. Pseudacori s. Acori adulterini s. Ireos palustris s. Gladioli lutei) an; ſie iſt lang, etwas zuſammengebrüdt, baumenſtark und ſtärker, außen ſchwärzlichbraun und runzlig, innen röthlich und ſchwammig. Sie hat einen ſtarken und unangenehmen Geruch und einen ſcharfen, ſtyptiſchen Geſchmack.

Beide Wurzeln ſind purgirend.

3) Iris foetidissima, L.; Waldbläuſtraut, ſinkende Schwerdtlilie; Iris fétide, Glayeul puant (Gal.); Stinking gladwyn (Ang.).

Gal.

4 (Triandria Monogynia, L.; Irideae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Blackw. Herb. t. 158.)

Man wendet die Wurzel (radix Xyridis s. Spathulae foetidae) an; ſie beſitzt einen unangenehmen Geruch und einen ſcharfen Geſchmack.

4) Iris Florentina, L.; Florentiniſcher Schwerdtel, Biolenwurzel, Weilchenwurzel, Weilchenwurzel; Iris de Florence (Gal.); Florantine orris (Ang.); Ussul, ussounul, Asmon jumie, Irsa (Ar.); Fialowy koren (R.); Fiolrod (D.); Lirio de Florenzia (His.); Irsa (Hin.); Florentynse iris (Bel.); Irios, Giaggiolo, Giglio celeste, Iride di Firenze (I.); Korzen fiolkowy (Pol.); Irio de Florença (Lus.); Fiolrot (Succ.).

A. Am. Ans. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sa. Sp. Z.

4 Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (Blackw. t. 414. Plenck t. 35. Fl. méd. IV. 204.)

Die Wurzel (radix Ireos s. Iridis Florentinae), welche angewendet wird, iſt dick, knotig, herb, außen bräunlich, innen weiß. Sie hat einen ſcharfen, bitteren und anhaltenden Geſchmack. Man verkauft ſie gemeinlich, nachdem man die Oberhaut abgezogen, in walzigen, abgeplatteten, höckerigen Stücken von rosenröthlichweißer Farbe, welche ſaft ohne Geruch ſind, aber einen ſehr angenehmen Weilchengeruch beſitzen.

Sie enthält, nach Vogel, Schleimharz, einen braunen Extractivstoff, Saßmehl, ein fettes und ein flüchtiges Del, Pflanzenſafer zc. Toreri hat Emetin darin entdeckt.

Friſch, purgirend, auch gilt ſie als ein ſchneidendes und als Niesemittel. Man verordnet ſie hiſweilen bei Catarrhen. — Saße des Pulvers, ein Scrupel; des Saßts, eine bis zwei Unzen in vier Unzen Wein.

5) Iris versicolor, L.; bunte Schwerdtlilie; Iris variée (Gal.); Blue flag (Ang.).

Am. C.

4 Eine Pflanze Nordamerica's. (Hort. Elth. t. 155. f. 187.)

Die Wurzel, welche angewendet wird, iſt faſerig.

Species diaereos. (An. B*. Br. Pal. Wir. Sp. Vm.)

R. Radicis Iridis Florentinae, Sacchari crystallisati (Candis) albi, Specierum diatragacanthae frigida-rum, singulorum drachmas sex, Fiat pulvis. (Br. Pal. Wir. Sp.)

B*. Iridis semunciam, Specierum et Sacchari, singulorum drachmas duas; — Vm. Iridis et Specierum, singulorum partem unam et Sacchari unam cum dimidia; — An. Iridis partes duas, Gummi Tragacanthae et Sacchari, singulorum unam; — Han. Iridis semunciam, Gummi Tragacanthae et Sacchari, singulorum drachmas duas.

Pulvis puerorum citrinus. (Br.)

R. Radicis Iridis Florentinae

uncias octo.

— Liquiritiae drachmas sex.

Anisi,

Foeniculi,

singulorum drachmas tres.

Croci drachmas duas cum dimidia.

Sacchari pondus totius aequalis.

Fiat pulvis. Species pro odoramento s. odoriferae, (Sp.)

R. Florum recentium Rosarum rubrum semunciam.

— Lavandulae

drachmas duas cum dimidia.

Ligni Rhodii semunciam.

Radicis Iridis Florentinae

uncias duas.

Herbae recentis Basilici,

— — Calaminthae montanae,

— — Majoranae,

singulorum drachmas duas.

— — Menthae piperitae scrupulos quatuor.

— — Origani,

— — Pulegii,

Herbae recentis Salviae,
 — — Saturejae,
 Corticis Aurantii,
 — Citri,
 singulorum drachmas duas.
 Cinnamomi,
 Summitatum Rorismarini,
 Caryophyllorum,
 Macidis, singulorum drachmas tres.
 Foliorum Lauri . . . semunciam.
 Moschi cum Sacchari pauillo triti:
 grana duo.
 Ambrae griseae itidem tritae
 grana quatuor.

Fiat pulvis grossus.

Species cephalicae pro cucuphis. (Br.
 Pal. Wir. Sp.)

℞. Radicis Cyperi rotundi,
 — Iridis Florentinae,
 singulorum semunciam.

Florum Lavandulae,
 — Rorismarini,
 — Rosarum,
 singulorum drachmas sex.

Ligni Rhodii,
 — Santali citrini,
 — Aloës,
 singulorum semunciam.

Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Nucis moschatae,
 Succini flavi,
 Styracis, singulorum drachmas tres.
 Concisa contusaque misce. (Br. Wir.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
 uncias tres.

Herbae Lavandulae,
 — Majoranae, et
 singularum unciam unam.

Ligni Rhodii,
 — Santali citrini,
 singulorum drachmas sex.

Cinnamomi . . . drachmas duas.
 Corticis Aurantii . . . semunciam.
 — Citri . . . sesquiunciam.

Caryophyllorum
 drachmas duas cum dimidia.

Benzoës,
 Mastichis,
 Styracis Calamita,
 Succini flavi,
 singulorum semunciam.

Concisa contusaque misce. (Sp.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
 sesquiunciam.

Herbae Betonicae,
 — Majoranae,
 — Rorismarini,
 singularum semunciam.
 — Salviae . . . drachmas duas.

Florum Rosarum rubrarum
 unciam unam.

— Lavandulae,
 — Cheiri,
 singulorum drachmas duas.

Storacis in granis,
 Succini rasi,
 singulorum drachmas tres.

Nardi Indicae,
 Santali citrini,
 Ligni Rhodii,
 singulorum drachmas duas.

Caryophyllorum,
 Cyperi rotundi,
 Cinnamomi,
 Benzoës,

singulorum scrupulos quatuor.
 Fiat pulvis. (Pal.)

Extractum Iridis Florentinae. (Sar. Wir.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
 partem unam.

Aquae bullientis . . . partes sex.
 Infusionem post tres dies coque par-
 umper, cola exprimendo et liquorem
 vaporando ad extracti consistentiam
 consume. (Wir.)

Sar. infusum pro tertia parte consu-
 mere et tunc colare et evaporare.

Faecula Ireos. (Gal. Gen. Pal. T.)

℞. Radicis recentis Iridis quantum vis.
 Raspa et pulpam in saccum e tela
 confectum inclusam prelo subjice; suc-
 cum Aquae pauillo addito, sepone,
 quo facto, parte limpida decanthata,
 faecula blando calore siccata pulvere-
 tur.

Confectio Iridis. (Vm.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
 partem unam.
 Sacchari albi . . . partes tres.
 Contere.

*Conditum Iridis saccharatum s. Mar-
 melada Iridis.* (Sw*.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
 libram unam.

Kali subcarbonici . . . unciam unam.
 Scillae contusae drachmam unam.
 Aquae . . . libras quatuor.

Macera blando igne donec molle-
 fiant; trajice per cribrum, residuo no-
 vam Aquam infunde, macera et iterum
 cola; et hoc repetere donec omnia cri-
 brum transierint. Adde deinde

Sacchari,
 Syrupi Sacchari,
 singulorum libras tres.

Evaporatis ad gelatinae spissae con-
 sistentiam denique adde

Extracti Martis pomati uncias duas.
 Zonisch, Brustmittel, bei chronischen Lun-

gencalarrhen. — Gabe, vier; fünf oder sechs Kaffeelöffel täglich.

Rotulae diaereos, Tabellae Iridis Florentinae compositae, Trochisci bechici albi. (An. Br. Wir.)

℞. Specierum diaereos unciam unam.
Sacchari albi in Aqua Violarum
dissoluti et ad plumam cocti
uncias duodecim.

Fiant trochisci. (Br. Wir.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
sesquiunciam.
Amyli . uncias duas cum dimidia.
Sacchari albi . . . uncias viginti.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit

ut fiant trochisci. (An.)

Pasta Iridis Florentinae. (Vm.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
partem unam.
Aquaë frigidæ . partes sedecim.
Post horarum aliquot infusionem cola;
colaturam calefac cum
Gummi Arabici . partibus viginti,
et solutioni adde

Sacchari crystallisati (Candis)

partes quindecim.
Clarificata albuminis ope cola et ad
gelatinae consistentiam evaporata marmo-
ri oleo illito infunde

Aqua violacea. (Sp.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
uncias quatuor.
Alcoholis . uncias triginta duas.
Stent in infusione per dies quatuor-
decim.

Geßundheitmittel.

Oleum Iridis s. Ireos s. irinum. (Br.
His. Pal. Sar. T.)

℞. Radicis et Florum Iridis
partem unam cum dimid'a.
Olei Olivarum . . . partes tres.
Digere in balneo aquae per duos dies,
refrigerata exprime et macerationem
cum nova herba repete. (Sar.)

T. Macerare jubet Florum Iridis un-
cias quindecim in Olei Olivarum libris
quinque soli exposita per tres vel qua-
tuor dies filtrare hocque cum simili
florum quantitate bis repetere, supre-
mam macerationem per mensem circiter
protrahendo et oleum aliquot die-
rum sepositione clarefactum decanthare.

℞. Radicis et Florum Iridis,

Olei Olivarum,

singulorum partes aequales.

Coque blando igne ad humidi usque
consumptionem. (Pal.)

℞. Radicis recentis Iridis sesquilibram.
Olei Olivarum . . . libras tres.

Digere per horas viginti quatuor, co-
que deinde ad humidi consumptionem,
cola cum expressione, colaturam infun-
de Florum Iridis semunciate, digere per
horas duodecim, coque ad humidi con-
sumptionem et cola. (His.)

℞. Succis Radicis et Florum Iridis,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.
Coque ad consumptionem humidi et
exprime. (Br.)

Unguentum pectorale. (Sar. Wir. Sp.)

℞. Olei Amygdalarum dulcium
uncias quatuor.

— Chamomillae,
— Violarum,

singulorum uncias tres.

Butyri uncias sex.

Adipis Gallinarum,

— Anatum,

singulorum uncias duas.

Cerae albae uncias tres.

Massae liquatae adde

Pulveris Iridis Florentinae

drachmas duas.

— Croci semidrachmam.

Misce bene. — Ehedem Kindern bei
mühsamem Husten und Athmen empfohlen.

Acetum aromaticum. (Fer. T.)

℞. Aceti albi libras sex.

Radicis Iridis,

Petalorum Rosarum,

— Dianthi,

singulorum unciam unam.

Cinnamomi,

Nucis moschatae,

Caryophyllorum,

Corticis Aurantii,

Storacis,

Benzoës,

singulorum drachmas duas.

Majoranae,

Menthae,

Thymi,

Dictamni Cretici,

singulorum unciam unam.

Post digestionem per mensem fiat
moderato calore destillatio.

I s a t i s .

Isatis tinctoria, L.; Waib, Scharte,
Färberwaib; Pastel (Gal.); Woad (Ang.);
Wede (D.); Pastel (His. Lus.); Ver-
wede (Bel.); Guado (I.); Linilo (Pol.);
Vejde (Succ).

Br. Gal. Be. G.

♂ (Tetradymia Siliculosa, L.; Cru-
ciferae, J.) Eine Europäische Pflanze.
(Blackw. t. 246. Schk. t. 188. Lam. t.
554. Zorn. Ic. pl. t. 191. Bert. Bild. II,
10. f. 1.)

Man wendet das Kraut (herba Glasti s. Isatis) an; es besteht aus glatten, etwas blaugrünen Blättern, von denen die Wurzelblätter lanzettförmig und gefielt, die Stängelblätter fiedrig, halbumbfassend und am Grunde in zwei Anhänge verlan-

gert sind. Es hat einen scharfen und etwas bitteren Geschmack.

Man zieht daraus einen dem Indigo ähnlichen Stoff, Indigotin (Indigotinum s. Indigotina) oder Isatin (Isatina s. Isatinum).

J.

J a c e a .

In den Pharmacopöen kommen zwei Pflanzen dieses Namens in Erwähnung:

1) *Jacea nigra*, Moe.; gemeine schwarze Flockenblume; *Jacée* (Gal.); Common knapweed (Ang.); Knopurt (D.); Knopkruid (Bel.); Knapper (Suec.); Erba trinitas, Suocera, Nuora, Fiore del pensiero (I.).

Gal. Gen.

2) (Syngenesia Polygamia Frustranea, L.; Synanthereae, Cuss.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 519.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Jaceae nigrae) ist holzig und hat einen schwach abstringirenden Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem ästigen, harten, steifen, rauhen, fast glatten Stängel, dessen untere Blätter gezähnt, die oberen fiedrig, eirundlanzettig und gewöhnlich ganz sind. Es hat einen süßlichbittern Geschmack.

Schwach abstringirend und tonisch.

2) *Viola tricolor*, L.; Dreifaltigkeitsblume, Stiefmütterchen, Freisamfrant; *Pensée* (Gal.); Three coloured violet (Ang.); Stedmodersblomst (D.); Pensamientos (His.); Driekleurige Viool (Bel.); Fiore del pensiero (I.); Fiolek potrogny, Brat zsiostra (Pol.); Amor perfetto (Lus.); Wdowki (R.); Styfmorsblomster (Suec.).

A. Am. An. B. Ba. Bel. Ham. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. Fi. G. M. Sp.

3) (Syngenesia Monogamia, L.; Violaceae, J.) Eine sich in ganz Europa findende Pflanze. (Hayne III. 4. 5. blackw. t. 44. Planch t. 641. Düss. off. Pl. II. 8. Zorn Ic. pl. t. 290.)

Man wendet das Kraut (herba Jaceae s. *Viola tricoloris* s. Trinitatis) an; es besteht aus einem ästigen, breitflügeligen Stängel mit abwechselnden, eirunden, gezähnten, von fieberspaltigen Nebenblättern beblätterten Blättern. Es hat einen etwas scharfen Geschmack.

Reizend, blutreinigend, harntreibend, besonders gegen Flechten und Milchgrind empfindlich.

Extractum Jaceae. (Fenn.)

℞. Herbae Jaceae . partem unam, Aquae bullientis . . partes sex. Coque per horae quadrantem, cola, exprime; residuum cum nova Aqua coctum itidem coquatur; liquores commixti in balneo aquae evaporent.

HassP. inter praeparata nominat sed parationem non communicat.

Decoctum Herbae Jaceae s. Violae tricoloris cum Aqua. (B*. Fi.)

℞. Herbae Jaceae . drachmas sex. Aquae fontanae . quantum sufficit ut coquendo unciae sex colaturae obtineantur. — Gegen Milchschorf, Flechten und Kopfgrind. — Gabe, alle zwei Stunden einen Eßlöffel.

℞i. Herbae recentis drachmam unam vel duas (siccae drachmam unam), Aquae q. s. ut decocti libra una obtineatur.

Decoctum Jaceae s. Herbae Violae tricoloris cum lacte. (B*. Au, Fi.)

℞. Herbae Jaceae . . semunciam. Lactis vaccini . . libram unam.

Coque leniter et cola. — In denselben Fällen wie das vorhergehende empfohlen. — Die vorgeschriebene Gabe Morgens und Abends zu wiederholen.

℞i. ut decoctum aquosum, loco aquae Lac sumendo.

Infusum Herbae Jaceae. (Au.)

℞. Herbae Jaceae . drachmas duas. Aquae bullientis . . uncias duas.

Infusione peracta colaturae adde Vini stibiatii . . scrupulum unum. Syrupi Althaeae . drachmas duas. Gabe, alle zwei Stunden einen oder zwei Kaffeelöffel.

℞. Herbae Jaceae, Sacchari Lactis, singulorum drachmas duas. Sulphuris praecipitati, Magnesia subcarbonicae, singulorum semidrachmam. Gabe, einen Scrupel alle zwei Stunden.

Mixtura in haematuria chronica, Tisana leniens. (B.)

℞. Seminum Cannabis unciam unam.
Aqueae . . . quantum sufficit
ut decocti libra una obtineatur. Sub
finem adde

Florum Jaceae . . semunciam.
Stent in infusione per tempus ali-
quot, colaturae infunde
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Jalapa.

*Convolvulus Jalapa, L.; Jalape, Za-
lappwurzel; Jalap (Gal.); Jalapa (Ang.);
Galapa (B.); Jalap (D.); Jalappe (Bel.);
Scialappa, Sciarappa, Gialappa, Jalapa
(I.); Jalappa (His. Lus. Suec.); Jalo-
py (Pol.).*

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC.
Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer.
Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass.
HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.
Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. Be.
Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.

2) (Pentandria Monogynia, L.; Con-
volvulaceae, J.) Eine Pflanze Mexico's.
(Ann. du Mus. II. 40. 41. Plenck t. 94.
Berl. Jahrb. XXV. Fl. méd. IV. 207.
Bert. Bild. III. 18. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel (radix Jalapa-
pae s. Jalappii s. Gialappeae s. Ghela-
pae s. Rhaharbari nigri s. Gelappii s.
Mechoacannae nigrae) an; sie ist dick,
lang, herb, in runden oder biden, sehr
schweren, runzligen Stücken, welche außen
schwärzlichbraun, innenbig aschgrau, mit
concentrischen Linien, mit glattem, welligem,
überall mit glänzenden Punkten bestreutem
Bruche. Das Pulver ist bräunlichgelb; der
Geruch eigenthümlich, der Geschmack scharf,
beißend und etwas widerlich.

Sie enthält, außer Gummi, Harz, Sa-
mehl u. einen eigenthümlichen Stoff, die
Jalapine (Jalapina), in welchem Pume
ben Grund ihrer Wirkung sucht.

Gabe des Pulvers, ein oder zwei Scru-
pel.

§. I. Präparate, welche die Jalape in
Substanz enthalten.

*Pulvis laxans s. purgans, Pulvis
laxans cum sale s. cum Mercurio, Pul-
vis laxativus vegetabilis, Pulvis Jalapa-
e compositus s. salinus s. tartaricus
s. hydrargyratus, Pulvis Radicis Jalapa-
pae cum Natro s. Kali sulphurico s.
cum Hydrargyro muriatico miii, Spe-
cies diojalappae, Specificum jalappinum.*
(Am. B*. BorC. Br. D. DD. Ed. Fenn.
Ful. Gal. GalM. Gen. His. Li. Pal.
RC. Suec. Wir. Wür. WW. Au. C. Ca.
E. Huf. Pie. Ra. Sa. Sp. Sw.)

1) Dñue ein Salz.

℞. Pulveris Jalapae . . unciās duas.
Sacchari albi . . unciām unām.

Misce diu triturando. (Wür.) —
Gabe, eine halbe bis eine ganze Drachme.

℞. Jalapae grana duo.
Rhei,

Cinnamomi,
singulorum granum unum.

Misce. (Ra.) — Für ein Kind.

℞. Jalapae drachmam unām.
Scammonoi scrupulum unum.

Ipecacuanhae grana decem.

Fiat pulvis in partes granorum octo
dividendus. (Pie.) — Dumas verschrieb
es gegen Verschleimung.

℞. Radicis Jalapae
partes viginti quatuor.

— Mechoacannae
partes duodecim.

— Rhei,
Cinnamomi,

singulorum partes octo.

Gummi Guttae . . . partes tres.

Foliorum siccatorum Soldanellae
partes sex.

Anisi partes duodecim.

Fiat pulvis. (Gal.)

2) Mit Salpeter.

℞. Jalapae pulveratae unciām unām.
Nitri depurati . . . semunciam.

Misce. (Gen.)

*Pulvis ad ulcera crurum (Sw.) Jalapa-
pae drachmam unām, Nitri tres; — ei-
ne halbe Drachme zweimal täglich.*

3) Mit einem Eisensalz.

℞. Jalapae,
Millepedum praeparatarum,
Crocii Martis aperientis,

singulorum grana sedecim.

Auf eine Gabe. (Pie.)

4) Mit Weinsteinkali.

℞. Jalapae semidrachmam.
Cremoris Tartari scrupulum unum.

Auf eine Gabe. (Ful.)

Am. Ed. Suec. C. E. et Sw. Jalapae
partem unam et duas Cremoris Tarta-
ri; — Sp. Resinae Jalapae partem unam
cum dimidia, Cremoris Tartari partes
duas cum dimidia; — RC. et Au. Ja-
lapae et Cremoris partes aequales.

℞. Jalapae,
Zingiberis,
Cremoris Tartari,

singulorum grana decem.

Auf eine Gabe. (Sw.)

℞. Radicis Jalapae
unciās duas cum dimidia.

Cremoris Tartari drachmas duas.
Olei Cinnamomi drachmam unam.
Fiat pulvis. (Pal. Wir.)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari,

Elaeosacchari Foeniculi,
singulorum partes aequales.

Fiat pulvis. (Huf.)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari,
Magnesiae purae,
singulorum partes aequales.

Misce diu triturando. (His.)

℞. Jalapae . . . drachmam unam.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Gummi Guttae . . . grana sex.
Divide in partes sex. (E.)

℞. Jalapae . . . scrupulum unum.
Rhei . . . scrupulos duos.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Olei essentialis Cinnamomi
guttam unam.

Misce. (Sa.)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari,
singulorum uncias duas.
Resinae Jalapae drachmas tres et
grana duodecim.

Scammonei
drachmas duas cum dimidia.
Cinnamomi . . . sesquidrachmam.

Misce. (B*. Br.)

℞. Jalapae . . . uncias duas.
Tartari solubilis . . . semunciam.
Sacchari . . . uncias quatuordecim.
Olei essentialis Aurantii
drachmas duas.

Elaeosaccharum para cui sal et jalapa admisceantur. (Ca.) — Gabe, zwei ober drei Drachmen in einem Rdssel (chopine) gekochtem Pomeranzensaft. — Ein sehr angenehmes, unter dem Namen sucre orange purgatif (Saccharum aurantiacum purgans) bekanntes Purgirmittel.

5) Mit schwefelsaurem Kali oder Natron.

℞. Jalapae . . . partes duas.
Kali sulphurici . . . partem unam.
Misce. (D.) — Gabe, eine halbe Drachme.

℞C. et Sw. Jalapae et Sulphatis partes aequales; — DD. loco Kali Natron sulphuricum sumendum jubet.

℞. Radicis Jalapae . . . semidrachmam.
Kali sulphurici . . . semiscrupulum.
Olei Foeniculi . . . guttam unam.
Fiat pulvis. (BorC. WW. Au.) — Auf ein ober zwei Mal.

℞. Radicis Jalapae . . . scrupulos duos.
Resinae Jalapae . . . grana quatuor.
Kali sulphurici,
Sacchari albi,
singulorum grana decem.

Fiant doses quatuor. (Sa.)

℞. Radicis Jalapae . . . uncias duas.
Ipecacuanhae . . . scrupulos quatuor.
Kali sulphurici . . . semunciam.

Gabe, zwei Scrupel für einen Erwachsenen. (Li.)

℞. Radicis Jalapae,
Scammonei,
singulorum partem unam.
Kali sulphurici . . . partes duas.

Fiat pulvis. (GalM.)

℞. Radicis Jalapae . . . sesquiunciam.
Resinae Jalapae,
— Scammonei,
singulorum drachmas tres.

Cremoris Tartari,
Kali sulphurici,
singulorum unciam unam.
Olei essentialis Cinnamomi
scrupulum unum.

Resinis cum Amygdalarum dulcium drachmis duabus contritis adde radicem, sales et denique oleum. (Wir.) — Gabe, ein halber bis ganzer Scrupel bis eine halbe Drachme.

6) Mit schwefelsaurem Magnesia.

℞. Radicis Jalapae,
Magnesiae sulphuricae,
singulorum semidrachmam.
Olei essentialis Foeniculi
guttas duas.

Fiat pulvis. (B*.)

℞. Radicis Jalapae,
— Gentianae,
singularum unciam unam.
— Zingiberis drachmas duas.
Magnesiae sulphuricae uncias duas.
Fiat pulvis. (Fenn. Suec.)

Pulvis anthelminticus. (Au. Sw.)

℞. Radicis Jalapae,
— Valerianae,
Seminis Cinae,
singulorum unciam unam.

Gabe, Morgens eine halbe bis ganze Drachme. (Su.)

℞. Seminum Tanacetii . . . grana sex.
Ferri sulphurici . . . grana tria.
Radicis Jalapae . . . semidrachmam.
Morgens in Wasser zu nehmen. (Au.)

Pulvis febrifugus et purgans. (Ca.)

℞. Jalapae . . . uncias duas.
Cremoris Tartari
drachmas quatuordecim.

Kali sulphurici,
Succi Allii,
singulorum unciam unam.

Chinae . . . drachmas sex.
Scammonei . . . semunciam.
Tartari natronati drachmas tres.
— emetici . . . drachmas duas.

Nitri . . . drachmam unam.
Croci,
Gummi Guttae,
singulorum grana duodecim.
Cinabaris . . . grana sex.

Gabe, achtzehn Gran bis eine halbe Drachme bei Wechselfiebern und Wurmschwärden.

Boli purgantes s. cathartici, hydragogi s. resolventes. (GalM. B. Pic. Sa. Sw.)

℞. Jalapae pulveratae partes decem.
Scammonei . . . partes quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Misce bene. (GalM.)

℞. Radicis Jalapae semidrachmam.
— Zingiberis . . . grana sex.
Syrupi Rosarum solutivi
quantum sufficit.

Addi potest si necesse, Cremoris
Tartari scrupulus unus vel Mercurii
dulcis grana quinque. (Sa.)

℞. Jalapae pulveratae grana decem.
Electuarii lenitivi
scrupulos quatuor.

Adde si necesse est, Mercurii dulcis
grana decem. (Sa.)

℞. Jalapae . . . grana viginti.
Mercurii dulcis . . . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat bolus unus. (Sw.)

℞. Radicis Jalapae, Kali sulphurici,
singulorum semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Misce sedulo. (Sw.)

℞. Jalapae pulveratae,
Zingiberis,
Gummi Guttae,
Cremoris Tartari, singulorum grana
quinque ad decem.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat bolus. (Sw.)

℞. Jalapae pulveratae grana duodecim.
Gummi Guttae,
Mercurii dulcis,
singulorum grana sex.

Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Fiat bolus. (Sw.)

℞. Radicis Jalapae semidrachmam.
Resinae Scammonei,
Gummi Guttae,
Salis Absinthii,
singulorum grana sex.

Syrupi Rhamni quantum sufficit
ut fiant boli tres. (Pic.)

℞. Jalapae pulveratae,
Sacchari, singulorum grana viginti
quatuor.

Pulveris Rhei . . . grana triginta.
Syrupi de Cichorio compositi
quantum sufficit.

Fiant boli duodecim. (B.)

Pilulae laxantes s. purgantes. (Ful.
Ham. T.)

℞. Pulveris Jalapae drachmam unam.
— Aloës,

Mercurii dulcis,
singulorum semidrachmam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum.

(Ham.)
T. Rhei, Aloës, Jalapae, singularum
pulv. partes aequales, fiant cum Syrupi
simplicis q. s. pilulae.

℞. Saponis Alicantini uncias duas.
Extracti Aloës gummosi,
Pulveris Rhei,
— Jalapae,
singulorum unciam unam.

Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Misce. (Ful.)

Gabe, zehn, zwanzig bis dreißig Gran
(bis eine halbe Drachme T.).

Panes saccharati purgantes. (Bo. Ca.
Pic. Sp.)

℞. Jalapae pulveratae
drachmas viginti.

Farinae uncias duas.
Ovorum no. 24.

Sacchari libram unam.

Fiant panes sexaginta. (Ca. Pic.)
Bo. Jalapae drachmas duas, Sacchari
libram unam, Anisi drachmas duas,
Farinae uncias octo et Vitellos Ovo-
rum no. 8.; — Sp. Farinae, Sacchari,
singulorum uncias quatuor, Vitellos
Ovorum no. 3 et Resinae Jalapae quan-
tum placet.

Trochisci anthelmintici. (Ful.)

℞. Pulveris Jalapae unciam unam.
— Florum Tanacetii

sesquiunciam.
— Ferri sulphurici semunciam,
— Sacchari albi uncias sex.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiant trochisci ducenti quadraginta.

— Gabe, ein, zwei Stück oder mehr, nach
dem Alter.

*Morsuli s. Trochisci solventes s. solu-
tivi.* (Fer.)

℞. Pulveris Jalapae . uncias duas,
— Scammonei unciam unam.

Chocolatae . uncias quindecim.
Fiant morsuli septuaginta duo. —
Ein Stück auf ein Mal.

Electuarium hydragogum s. purgans,
(Br. Ca. E. Sin.)

℞. Jalapae pulveratae,
Kali sulphurici,
singulorum scrupulos duos.

Resinae Scammonei
scrupulum unum.

Gummi Guttae . grana decem.
Mellis . . . quantum sufficit.

Misce. — Gabe, alle zwei Stunden ei-

nen Kaffeelöffel. (Ca.) — Gegen Bandwurm, nachdem man drei Tage vorher das mit Sinn bereitete electuarium vermifugum Kuttingeri zu geben angefangen hat.

℞. Pulveris Jalapae . . . semunciam.
— Zingiberis scrupulos quatuor.
— Kali sulphurici

drachmas tres.
Roob Sambuci rubri uncias duas.
Oxymellis colchici . . . uncias tres.

Misce. (Ful.) — Gabe, zwei bis sechs Drachmen.

℞. Pulveris Jalapae,
— Salis de Seignette,
singulorum drachmam unam.

Contervae Nasturtii uncias quatuor.
Syrupi Fumariae . . . uncias duas.

Misce. (Sm.) — Gabe, ein Kaffeelöffel täglich zwei oder drei Mal.

℞. Jalapae pulveratae

scrupulum unum.

Cremoris Tartari drachmas sex.
Kali sulphurici . . . drachmas duas.

Syrupi Althaeae quantum sufficit.

Misce. (Sm.) — Gabe, Morgens zweimal einen Kaffeelöffel voll.

℞. Cremoris Tartari,
Jalapae pulveratae,
Nitri, singulorum . . . semunciam.

Confectionis Sennae unciam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Misce. (E.) — Gabe, haßelnußgroß, vier oder fünf Mal täglich.

℞. Radicis Jalapae . . . semunciam.
Kali sulphurici . . . drachmas duas.

Oxymellis scillitici unciam unam.
Roob Juniperi,
— Ebuli,

singulorum uncias duas.

Syrupi Rhamni quantum sufficit.

Misce. (Ca.) — Gabe, eine Drachme in kurzen Zwischenräumen, bis reichliche Ausleerung erfolgt ist.

℞. Roob Juniperi,
Pulpae Tamarindorum,

singulorum uncias quatuor.

Radicis Jalapae . . . sesquiunciam.
Scammonii electi unciam unam.

Cinnamomi,
Foeniculi,

singulorum drachmas duas.

Sacchari clarificati uncias decem.

Misce. (Br.) — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Electuarium s. Conditum ad vermes s. vermifugum, Opiatum vermifugum. (Ful. GalF. GalH. Ca. Huf. Sa. Vm.)

℞. Pulveris Jalapae,
— Valerianae,

Kali sulphurici,
singulorum drachmam unam.

Oxymellis scillitici . . . uncias tres.

Misce. (Ful. Sa.) — Gabe, zwei bis sechs Drachmen.

GalF. GalH. et Ca. loco sulphatis Kali tartaricum adhibent.

℞. Jalapae,
Rhei, singulorum partem unam.

Valerianae . . . partes duas.
Kali sulphurici . . . partes quatuor.

Santolinae . . . partes octo.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.

Misce sedulo. (Vm.)

℞. Pulveris Valerianae

— Jalapae sesquidrachmam.
— Seminis Cinae drachmam unam.

— Tartari tartarisati drachmas duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Misce. (Huf.)

Confectio Anisi laxativa. (Wir. Sp.)

℞. Anisi . . . uncias tres.
Calefac in vase amplo, cochlearia aliquot Sacchari ad plumam cocti adspargendo; adde tunc sensim

Pulveris Resinae Jalapae drachmas tres cum dimidia.

— Cinnamomi drachmas duas.

Agita donec massa siccata et Sacchari quantitas unciarum viginti quatuor sit consumpta. (Sp.)

Wir. Anisi sesquiunciam, Sacchari libram unam et mixturam e Jalapae,

Mechoacannae albae, singularum pulveratarum semuncia, Diagrydii sulphurati, Cinnamomi, singulorum pulv.

drachma una.

Dieses Präparat war ehemals sehr stark in Gebrauch, besonders bei Kindern; heutzutage wendet man es nur noch sehr wenig an.

Opiatum stimulant. (Pie.)

℞. Limaturae Chalybis porphyrisatae,
Gummi Ammoniaci pulverati,

singulorum unciam unam.

Millepedum praeparatum drachmas sex.

Extracti Aloës . . . drachmas tres.

Pulveris Jalapae . . . semunciam.

— Castorei,
— Croci,

singulorum drachmas tres.

Extracti Gentianae quantum sufficit.

Gabe, Morgens eine Linze, gegen Schwindel und Schwindel.

Opiatum antiherpeticum. (Pie.)

℞. Limaturae Chalybis porphyrisatae,
Myrrhae,

Gummi Ammoniaci, singulorum drachmas sex.

Extracti Hellebori nigri
drachmas duas.

Jalapae pulveratae . . . semunciam.
Millepedum praeparatorum

drachmas quinque.
Syrupi Fumariae quantum sufficit.

Zeyen Sage lang, Morgens nüchtern zu nehmen.

Emulsio purgans. (GalM.)

R. Amygdalarum dulcium mundatum no. 12.

Syrupi Sacchari unciam unam.

Aquae uncias quatuor.

Emulsioni adde

Jalapae pulveratae grana viginti.

Potio purgans. (Huf. Ra. Sm.)

R. Pulveris Jalapae semidrachmam.

Decocti Cichorii uncias quatuor.

Misce. (Ra.)

Huf. Jalapae grana triginta sex et Decocti Prunorum siccatorum uncias quatuor.

R. Pulveris Jalapae grana triginta.

Natri sulphurici drachmas quinque.

Syrupi Mellis unciam unam.

Decocti Cichorii uncias sex.

Misce. (Ra.)

Potio purgans major. (GalM.)

R. Sennae drachmas duas.

Natri sulphurici drachmas quatuor.

Aquae uncias sex.

Coque per sexagesimas aliquot, cola et adde

Pulveris Jalapae compositi (GalM.)
grana duo ad quatuor.

Mixtura vermifuga et purgans. (Sm.)

R. Tartari natronati,

Jalapae pulveratae,

Valerianae sylvestris,

singulorum drachmam unam.

Oxymellis scillitici uncias quatuor.

Gabe, für Erweichene Morgens um sieben und um neun Uhr einen Eßlöffel voll.

§. II. Präparate, welche das wirksame Princip der Jalappe ohne das zu seiner Ausziehung angewendete Weiskübel enthalten.

Extractum Jalapae gummosum. (Vm.)

R. Gummi Arabici partem unam.

Jalapae grossiuscule pulveratae
partes duodecim.

Macera jalapam ut mollescat, in Aquae sufficiente quantitate, tunc cum gummi trituratam bis in emulsionem tere; residuo bis cum Aquae partibus septuaginta duabus cocto, decocta bullientia cola; tunc bullitione ad partem octa-

vam voluminis redacta commisce cum emulsione et totum, blando igne et continua agitatione, vaporando ad extracti consistentiam redige.

Extractum Jalapae resinolum. (Vm.)

R. Jalapae contusae et a pulvere subtili separatae quantum vis.

Aquam adsperge donec mollis sit redita, tunc Aqua addita cola exprimendo, quod repetatur quamdiu residuum in emulsionem verti potest; liquores deinde commixti ad extracti consistentiam evaporent.

Extractum Jalapae aquosum. (Du. Sw. Vm.)

R. Liquoris a depuratione Jalapae relictii quantum vis.

Albuminis ope clarificatum ad extracti spissitudinem consume. (Sw. Vm.)

R. Radicis Jalapae grossiuscule contusae et a pulvere separatae

quantum vis.

Infunde in vase amplo, Aquae frigidae duplum circiter pondus addendo, per duos vel tres dies in maceratione relinque, decantha absque agitatione et liquorem filtratum ad extracti consistentiam consume. (Vm.)

Extractum Jalapae alcoholicum. (Am. Du. Ed. Fer. Ful. Gen. Li. Lon. LonN. Lus. Suec. Wir. Wür. C. T.)

R. Radicis Jalapae grossiuscule pulveratae libram unam.

Alcoholis (0,840)

partes (octarios) quatuor.

Post quatuor dies digestionis alcoholis decantha, residuum coque cum Aquae octariis decem (congio uno) ad duos redigendis, decoctum colatum consume, tincturam in retorta distillationi subijce et liquores, quum spissescere coeperint, commixtos ad massae pilularum consistentiam consume. (Am. Du. Ed. Fer. Gen. Lon. LonN. C.)

Fi. Aquae quantum sufficit, sed infusionem tantum adhibet et in fine tincturam et infusum commixta in balneo aquae salito ad extracti consistentiam evaporare jubet; — Wür. Pulveri Jalapae Alcoholis tantum infundere jubet ut digitorum quatuor crassitimetatur, totum blando calore digerere et tinctura decanthata, residuum cum Aqua per horam unam coquere, colare cum expressione, colaturam in balneo aquae ad mellis consistentiam consumere, ei sub finem tincturam sensim addendo et continue agitando ut massa homogenea neque grumosa obtineatur; — Suec. Macerare per dies qua-

tuor Jalapae libram unam in Alcoholis unciis sexaginta quatuor, residuum coquere in Aquae unciis centum sexaginta quatuor ad triginta duas redigendis, decoctum vaporationi, tincturam destillationi, subjicere, tunc, quum spissescere coeperint, commixta ad aptam spissitudinem consumere; — Wir. quod ad rem attinet, eodem modo procedit; — Lus. Digere per dies quatuor Jalapae libram unam in Alcoholis quatuor, residuum coquere cum Aquae libris decem ad duarum remanentiam, tunc decoctum evaporatum et tincturam destillatam mixta ad aptam consistentiam redigere; — Ful. et Li. Digere Jalapae libram unam in Aquae Vitae sex, residuum coquere cum Aquae libris tribus et decoctum tincturamque ad extracti consistentiam redacta rite consumere.

T. ut resinam parari jubet eam tamen differentia, ut destillata tinctura nec per aquam praecipitata, ad mellis consistentiam statim consumatur.

Obste, sech bis funfzehn Gran.

Resina Jalapae s. Gialappae s. Jalappae. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Wür. Br. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Jalapae grossiuscule contusae quantum vis.

Pluribus digestionibus, singula per dies aliquot, in Alcohole calenti extrahere, cola fortiter exprimendo, et alcohole destillatione elicitio, residuum Aqua tepida lotum sicca atque pulvera. (Pal.)

℞. Radicis Jalapae quantum vis.

Digere aliquoties in Alcohole calido, tincturis mixtis et filtratis Aquae quadrante circiter ponderis adde et alcohole destillando ex balneo aquae elicitio, resinam in fundo vasis residuam Aqua calida lotam balnei aquae ope sicca. (Ba. Bor. Bor4. Br. Fenn. Ful. Han. Hass. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür. Sw.)

HassP. quamque digestionem cum Alcoholis 12° B. quadruplo per dies tres continuare jubet.

℞. Tincturae Jalapae quantum vis.

Dodrante in balneo aquae destillatione abstracto, residuo Aquae pondus aequale addendo, praecipitatum ortum in filtro excipere, lotum bene cum Aqua destillata et exstillatum, caute exprime et in Alcohole tepido dissolutum ad siccum vaporando consume. (Gal.)

T. Radicis libras duas in Alcoholis 35° B. per dies sex vel octo digerere, tincturam filtrare, hoc repetere, tunc destillando, blando calore, trientes duos vel dodrantem alcoholis adhibiti elicere, Aquae pluvialis vel destillatae pondus triplum infundere, liquorem sepositione clarificatum decanthare, praecipitatum Aqua abluere, siccatum et in Alcohole moderato calore solum ad mellis consistentiam evaporare, et in rotulas redactum vaporis balnei vel solis calore penitus exsiccare; — Fi. fere eodem modo procedit. Radicis quantum vis, Alcoholis 24° quantum satis et Aquae frigidae partes quadraginta vel quinquaginta sumendo.

℞. Radicis Jalapae contusae partem unam.

Alcoholis . . . partes sex. Digestione repetita ex balneo arenae radicem penitus extrahe, et tincturis commixtis ad dimidium evaporatis, residuo Aquam infunde et praecipitatum bene lotum caloris blandissimi ope sicca. (A. An. D. Lus. Sar. Br. Sp.)

℞. Radicis Jalapae pulveratae libras quatuor.

Alcoholis (0,907) libras sedecim. Destillent leni igne, spiritus librae duae, residuum refrigeratum exprimendo colatum sepone; spiritum obtentum additis duodecim libris Alcoholis (0,907) residuo reaffunde, et destillatione libram unam elice; residuo tunc refrigerato et iterum cum expressione colato, liquores mixtos post dierum octo sepositionem decantha, adde Aquae libras sex, spiritum leni igne destillationis ope elice, resinam vasi adhaerentem Aqua bullienti lava, donec liquidum saporis expers evadat et Alcoholis rectificati ope mollefactam in massam redige, quae igne blandissimo siccetur. (Ams.)

℞. Radicis Jalapae pulveratae libras quatuor.

Alcoholis (30°) libras decem. Digere ex arena, saepius agitando, per triduum et cum residuo novaeque Alcoholis quantitate operationem repete, colatiris sepositione et decanthatione depuratis adde Aquae libras octo, misce et omni alcohole destillationis ope, blando igne, elicitio, residuum bene lotum et Alcoholis paucillo molle redditum in massam redige quae lente siccetur. (B. Bel.)

℞. Jalapae pulveratae partem unam. Alcoholis rectificati partes sex.

Radici in balneo aquae tepido alcoholis duos trientes infunde, stent per horas viginti quatuor, tunc refrigerata

cum expressione forti colentur; residuum cum reliquo alcohole digestum itidem exprime; colaturis filtratis adde Aquae frigidae partes novem absque vasis agitatione; resina postquam subsedit, horis viginti quatuor lapsis, decantha, Aqua resinae infusa, alcohol destillationis ope in alembico, eliciatur; resinae priori quantitati eam quae liquido residuo inest affunde, lava totum primo cum Aqua frigida deinde cum calida et lente in balneo arenae sicca. (Vm.)

Das durch Präcipitation mittelst Wasser erhaltene Harz wird *Magisterium Jalapae* genannt. — Es wird als Purgirmittel nie allein angewendet, indem es heftige Kollik, übermäßiges Purgiren und selbst Darmentzündung hervorbringt. Man giebt es in Pillen, mit Extracten. — Gabe, vier bis sechs Gran, in Pillen; verschreibt man es in Pulver, mit Mandeln oder Pinienrüßsen abgerieben, was jedoch nicht nachzuahmen ist, so kann man bei sehr starken Purgiren bis zu einem halben Scrupel und selbst bis zwölf Gran steigen.

Resina Jalapae praeparata. (Bor4. Sp.)

℞. Resinae Jalapae,
Amygdalarum dulcium,
singularum partes aequales.
Pulveratas bene misce.

Pilulae purgantes. (Ca. Vm.)

℞. Radicis Jalapae,
Scammonae,
singularum uncias quatuor.
Extracti catholici unciam unam.
Alcoholis . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (Ca.)
— Gabe, von zwei bis fünf Stück, bei Wasserfucht und Krankheiten von Ästhenie.
Vm. Resinae, Scammonae, singularum partem unam, Extracti catholici duas et Alcoholis sufficientem quantitatem.

Pilulae cephalicae. (Sp.)

℞. Massae pilularum Succini,
Extracti Rhei,
— panchymagogi,
. Resinae Jalapae,
singularum semunciam.
Gabe, eine halbe Drachme. — Sie haben den Namen von ihrer früheren Anwendung bei sogenannten serben Kopfkrankheiten.

Sapo jalapinus s. Jalapae. (B. Ba. Bor. Bor4. D. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. Ca. Fi. Sm. Sw. T. Vm.)

℞. Resinae Jalapae pulveratae,
Saponis medicati rasi,
singularum partes aequales.
Alcoholis (20^o) quantum sufficit.

Liquata blando calore evaporent, continue agitata ad massae pilularum consistentiam. (B. Ba. Bor. D. Gal. Ham. Han. HassP. Li. O. Pol. Sax. Ca. Sw. Vm.)

T. Saponem Alicantium et Alcoholem 30^o adhibet; — *Fi.* Alcoholem 30^o; — GalM. Saponis partem unam et Tincturae Jalapae duas; solutio in balneo aquae evaporet; — Bor4. Resinae, Saponis, singularum uncias duas, Spiritus Vini rectificati quantum requiritur, solutio ad pilularum massae consistentiam evaporet ut totius massae remanentis pondus sit unciarum quatuor cum dimidia; — Vm. Resinae partem unam, Saponis unam cum dimidia et Alcoholis quantum sufficit; — Hass. Saponis et Resinae, singularum partes aequales et Aquae quantum satis ad resinam humectandam, et liquationem blando igne faciliorem reddendam, alcohole omisso.

Gabe, bei Kindern gehen bis zwanzig Gran.

Pulvis hydragogus. (Sw.)

℞. Saponis jalapini,
Cremoris Tartari,
singularum partes aequales.
Gabe, fünf bis dreißig Gran alle vier oder fünf Tage (?).

Pilulae Jalapae s. purgantes. (Bor4.)

℞. Saponis jalapini . . . partes tres.
Radicis Jalapae pulveratae
partem unam.
Misce ut fiat massa, ex qua formetur pilulae ponderis granorum duorum.

Pilulae laxantes s. laxativae. (Li.)

℞. Saponis jalapini,
Rhei pulverati,
singularum unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel für Erwachsene.
Sm. Pilulas granorum quatuor e saponis jalapino solo parari jubet.

Mixtura saponacea purgans. (B*. Ca.)

℞. Alcoholis rectificati semilibram.
Resinae Jalapae,
Saponis amygdalini,
singularum unciam unam.
Solutionem filtra. (Ca.) — Gabe, Kindern eine bis anderthalb Drachmen.

℞. Saponis jalapini,
Syrupi Althaeae
singularum grana decem.
Tincturae Cinnamomi
grana viginti.
Misce. (B*) — Auf einmal.
℞. Saponis jalapini uncias sedecim.

Alcoholis . uncias triginti duas.
Syrupi Sacchari uncias sedecim.
Tincturae alcalinae,
Olei Menthae piperatae,
singulorum drachmam unam.
Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.
(B*.)

Oleum Ricini artificiale. (B*.)

℞. Resinae Jalapae . grana novem.
Saponis Veneti . . . grana tria.
Olei Amygdalarum dulcium
sesquiunciam.

Tritura simul. — Bogler verschieb
alle Stunden oder zwei Stunden einen Ess-
löffel für Erwachsene.

Morsuli s. Tabellae purgantes. (Br. Pal.
Wir. Sp.)

℞. Resinae Jalapae drachmam unam.
Amygdalarum dulcium excortica-
tarum . . . drachmas tres.

Trituratis bene adde
Cardamomi minoris

scrupulum unum.
Cinnamomi . . . scrupulos duos.
Sacchari rosati ad plumam cocti
uncias septem cum dimidia.

Fiant morsuli. (Br. Pal. Wir.)

Sp. cardamomum et cinnamomum
omittit. — Gabe, je nach dem Alter von
einer bis sechs Drachmen.

*Diacydonium jalapinum s. lucidum
jalapinum s. solutivum pellucidum, Ge-
latina purgans.* (Br. Sp.)

℞. Gelatinae Cydoniorum
uncias triginta duas.
Resinae Jalapae cum Nucleis Pineae
tritae . . . uncias duas.

Misce bene. (Sp.)

℞. Gelatinae Cydoniorum
uncias sexaginta quatuor.
Resinae Jalapae uncias quatuor.
Alcoholis . . . uncias duodecim.

Solutionem resinae alcoholicam cum
gelatina misce. (Sp.)

Br. Gelatinae libras duas cum dimi-
dia, Resinae uncias quatuor et sedecim
Alcoholis.

Electuarium pectorale laxans. (Sp.)

℞. Looch sani et experti uncias duas.
Syrupi Rhoeados drachmas sex.
Resinae Jalapae sesquidrachmam.
Misce bene. — Ein Purgirmittel,
welches bei Schleimkrankheiten der Kinder
empfohlen worden istf.

Electuarium hydragogum. (Sp.)

℞. Roob Ebuli,
— Juniperi,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Rhamni . unciam unam.

Pulveris Resinae Jalapae
sesquidrachmam.

— Kali sulphurici
drachmas sex.

Gabe, eine halbe bis eine Unze.

*Emulsio laxans s. purgans s. Jalapae,
Julep purgans.* (Gal. R. Bo. Pic. Sa.
Sm. Sw.)

℞. Resinae Jalapae semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aqua unciam unam.

Contere. (Sw.)

℞. Resinae Jalapae . . grana octo.
Vitelli Ovi,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.

Aqua semunciam.
Resina cum saccharo et vitello tri-
tis fiat aquae ope emulsio. (R.)

℞. Resinae Jalapae grana duodecim.
Sacchari albi . drachmas duas.
Tere diu, sensim addendo

Vitellum Ovi no. ̄.
Triturare continua, partitum addendo
Emulsionis simplicis

uncias quinque.
Aquaе Florum Aurantiorum
drachmas duas.

Misce bene. (Gal.)

Sm. Resinae grana octo ad decem,
Vitellum Ovi unius, Sacchari uncias
duas, Emulsionis sex et Aquaе Florum
Aurantii drachmas duas.

℞. Resinae Jalapae . . grana duo.
Amygdalarum dulcium . . no. 8.
Aquaе Cinnamomi drachmas sex.
— Cerasorum nigrorum
unciam unam.

Fiat emulsio. (Sa.)

℞. Emulsionis communis uncias sex.
Resinae Jalapae,
— Scammonei,
singularum grana octo.

Sacchari drachmas duas.

Misce. (Pic.)

Bo. Emulsioni uncias quatuor, Re-
sinae Jalapae grana octo, Scammonei
grana sex et Sacchari drachmas sex.

§. III. Präparate, welche den wirksamen
Bestandtheil der Jalappe zugleich
mit dem zum Ausziehen angewen-
deten Vehikel enthalten.

A. Auszug durch Wasser.

Potio purgans anglica. (Pie.)

℞. Natri phosphorici drachmas sex.
— subcarbonici,
Jalapae pulveratae,
singulorum grana viginti quatuor.
Sacchari . . grana triginta sex.

Aquae uncias quatuor,
Coctis per sexagesimas duas et fil-
tratis adde

Alcoholis Citri guttas duas
et quo momento potio hauritur
Acidi tartarici pulverati
grana quadraginta.

Purgativum Leroyi. (Fer. Fi. T.)

℞. Scammoniei Aleppensis uncias duas.
Radici Turpethi unciam unam.
Jalapae uncias octo.
Aquae Vitae (20°) libras duodecim.

Digere in balneo aquae, calore 20°,
per horas duodecim, filtra et adde Sy-
rupum cum Infuso e Sennae unciis
octo et Aquae bullientis libris duabus
et Sacchari libris duabus cum dimidia
paratum.

Fi. et T. quatuor gradus indicant:

1) Scammoniei sesquiunciam, Radici
Turpethi drachmas sex, Jalapae uncias
sex, Alcoholis 20° libras sedecim et
Syrupum cum Sennae mundatae unciis
sex, Aquae bullientis libris duabus,
Sacchari albi libris tribus paratum;
2) Scammoniei uncias duas, Radici
Turpethi unciam unam, Jalapae octo,
Alcoholis 20° libras sedecim, Sennae
uncias octo, Aquae bullientis libras
duas et uncias octo, Sacchari libras
tres et uncias quatuor; 3) Scammoniei
uncias tres, Radici Turpethi sesquiun-
ciam, Jalapae libram unam, Alcoholis
21° libras sedecim, Sennae libram
unam, Aquae bullientis libras quatuor,
Sacchari albi duas et uncias octo; 4)
Scammoniei uncias quatuor, Jalapae,
Sennae, singularum uncias sedecim,
Radici Turpethi uncias duas, Alcoho-
lis 22° libras sedecim, Aquae bullientis
libras quatuor et uncias octo, Sacchari
albi libras duas.

Gabe, einen bis zwei Eßffel täglich (eine
Halbe bis höchstens eine Unze, worüber der
Krzg bestimmen muß Fi.). — Ist für den
großen Schaden, den die unvorsichtige An-
wendung desselben unter denen, welche gern
zu Quacksalbermitteln ihre Zuflucht neh-
men, angestiftet hat, leider nur zu berühmt.

*Syrupus jalapinus s. de Jalapa s. Ja-
lapae aromatizatus.* (Gal. Sw*. T.
Vm.)

℞. Jalapae subtilissime pulveratae
drachmas decem.

Seminum Coriandri,
— Foeniculi,
singularum semidrachmam.

Aquae uncias duodecim cum dimi-
dia.

Lagenae immitte quae ad collum us-
que repleatur, tunc balneo aquae im-

mersa coque per sexagesimas viginti,
quo facto balneum ab igne remotum
gradatim refrigescat. Repone deinde
lagenam et liquori post horas viginti
quatuor decanthato et colato adde
Sacchari albi

uncias vffinti quinque,
quae balnei aquae calore solvantur.
(Gal.)

T. Omnium duplicem quantitatem
sed eundem agendi modum indicat.

℞. Gummi Arabici,
Resinae Jalapae,
singularum partem unam.

Triturando simul, addita sensim
Aquae sufficiente quantitate emulsi-
onem spissam para, quae cum
Syrupi Rhei

partibus sexaginta quatuor
commisceatur. (Vm.)

Sw*. Syrupi partes triginta duas.

Gabe, Kindern zwei bis vier Drachmen.

B. Auszug durch Bier.

Cerevisia purgans. (Ca. Pr.)

℞. Jalapae drachmas tres.
Rhei drachmas duas.
Aloës Socotrinae semidrachmam.
Cerevisiae vel Hydromellis

libras duas.

Macera, saepius agitando, per dies
duos et filtra. (Ca.) — Gabe, ein oder
zwei Pfund bei lymphatischen Subjecten.

Ca. praeterea: Jalapae, Rhei, singu-
lorum drachmas duas, Aloës semidrach-
mam et Cerevisiae octarium unum.
(*Infusum purgans.*)

℞. Jalapae,
Rhei, singularum drachmas duas.
Cerevisiae . . . octarium unum.

Post duos dies macerationis filtra.
(Pic.) — Gabe, Morgens ein oder zwei
Gläser.

*Cerevisia antihydrica s. ad hydro-
pem.* (Sw*. Vm.)

℞. Radicis Jalapae . . . semunciam.

— Inulae,

— Calami,

Baccarum Lauri,

— Juniperi,

Corticis Aurantiorum,
singularum unciam unam.

Radici Bryoniae,

— Rubiae,

Seminum Dauci sylvestris,
singularum sesquiunciam.

Foliorum Absinthii manipulos duos.

Cerevisiae fortis octarios quatuor.

Macera per plures dies, decantha et
residuo infunde

Cerevisiae fortis octarios duos.

Post sufficientem macerationem iterum decantha, colaturasque commisce. Gabe, vier Unzen mehrmals täglich.

C. Auszug durch Wein.

Vinum antiapoplecticum. (Ca.)

℞. Radicis Jalapae . . . semunciam.
— Armoraciae sesquiunciam.

— Rhei,
Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.

Nitri . . . semidrachmam.

Vini albi libras duas cum dimidia.

Post dies quatuor frigidae digestionis filtra et adde

Tincturæ aromaticæ ammoniatæ drachmas duas.

Gabe, Morgens nüchtern drei bis vier Unzen.

D. Auszug durch Alkohol.

Tinctura Jalapae s. Convolvuli Jalapae. (Am. B. Bel. Du. Ed. GalM. Gen. Ham. Lon. LonN. Lus. Suec. Wür. Br. C. Sw.)

℞. Jalapae partem unam.

Alcoholis (20°) . . . partes octo.

Digere blando calore per dies sex et cola. (B. Bel.)

GalM. Jalapae partem unam et quatuor Alcoholis (22°); — Du. Jalapae

uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Am. Lon. LonN. et

C. Jalapae uncias octo et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Ed et Sw.

Jalapae partem unam et quinque Alcoholis (0,935); — Lus. Jalapae uncias

quatuor et Aquae Vitae libram unam; — Suec. Jalapae partem unam et Spiritus tenuis quatuor; — Wür. Jalapae

uncias tres et Aquae Vitae libram unam; — Han. Jalapae uncias octo et

Spiritus rectificati triginta; — Br. Jalapae uncias tres et unam libram Spiritus rectificati; — Gen. Jalapae semi-

libram et Aquae Vitae libras duas.

Purgirend. — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Tinctura Resinae Jalapae. (Br. Gal. HassP)

℞. Resinae Jalapae scrupulos quatuor. Alcoholis concentrati

drachmas decem.

Post sufficientem digestionem filtra. (Br.)

HassP. Resinae partem unam, Spiritus Vini rectificatissimi partes sex; solutio ex tempore fiat, ita ut tincturæ filtratæ pondus partes sex aequet; — Gal. Resinae partem unam, Alcoholis

(26°) quatuor et sex dies digestionis.

Diese Tinctur ist wirksamer, als die bei

Wurzel. — Besser bereitet man sie auf der Stelle, indem man zehn Gran Harz in einer Drachme Branntwein auflöst und nöthigen Falls zwei Drachmen Mandel- oder Althausyrup zusetzt. Dieß ist die Gabe für einen Erwachsenen.

Tinctura Jalapae confortans s. aromatica. (Ams.)

℞. Jalapae uncias tres.

Corticis Citri unciam unam.

Cinnamomi semunciam.

Seminum Anisi . . . drachmas duas.

Alcoholis (0,834) . uncias sedecim.

Post dies octo digestionis filtra.

Mixtura Olei Ricini cum Jalapa s. purgans. (Au.)

℞. Tincturæ Jalapae,
Sacchari albi,

singulorum drachmam unam.

Olei Ricini,

Mannae, singulorum unciam unam.

Syrupus Rosarum quantum sufficit.

Gabe, jede halbe Stunde zwei Eßfel, bei der Materkoffel.

Tinctura Jalapae composita, Elixir Jalapae compositum s. Citri purgans s. anthelminticum Suecorum, Essentia catholica purgans Rothii, Tinctura purgans. (Gal. R. Suec. Wür. Ca. Pie. Sp.)

℞. Corticis recentis Citri

sesquiunciam.

Alcoholis uncias sex.

Infunde per horas viginti quatuor, tum tincturam decanthatam infunde

Resinae Jalapae . . . unciae uni.

Post solutionem filtra. (Sp.)

℞. Jalapae electae . . . semilibram.

Scammonaei unciam unam.

Alcoholis (22°) libras sex.

Post octo dierum macerationem decantha et cola. (Gal.)

℞. Jalapae semilibram.

Scammonaei uncias duas.

Turpetuli vegetabilis

drachmam unam.

Aquae Vitae libras sex.

Post viginti quatuor horarum infusionem cola. (Ca.)

℞. Jalapae uncias quatuor.

Scammonaei semunciam.

Gummi Guttae . drachmas duas.

Alcoholis Aqua diluti libras duas.

Post tres dies digestionis cola cum expressione. (Suec.)

℞. Jalapae uncias quatuor.

Seminum Carthami . uncias duas.

Scammonaei semunciam.

Gummi Guttae . drachmas duas.

Spiritus Corticum Citri

sesquilibrum.

Post dies aliquot decantha; residuo

infunde

Spiritus Citri . . . libram unam.
Digere iterum; liquoribus mixtis, dodrantem destillatione elice et quod remanet ad usum serva. (Wür.)

Pic. eandem formulam sed nihil de destillatione postrema monens et pro secunda digestionem Spiritus Citri semilibram praescribens; — **Sp.** Quinque substantiarum illarum solidarum eadem quantitates sed libras duas Alcoholis simplicis, infusionem residui tamen non repetendo nec destillationem partis unius producti jubendo; — **Br.** Infundere jubet Jalapae uncias novem, Seminum Carthami sex, Scammonaei et Gummi Guttae, singulorum drachmis duabus, Spiritus Citri libras quatuor.

Reizend, purgirend, wurmtreibend. — Gabe, sechzig bis hundert Tropfen für einen Erwachsenen mit syrupus Rhamni.

Potio purgans. (Ra.)

Rx. Tincturae Jalapae compositae unciam unam vel duas.

Syrupi Rhamni semunciam ad unciam unam.

Aquae Cichorii . . . uncias quatuor.

Aqua Vitae s. Spiritus purgans. (Ca.)

Rx. Aquae Vitae (20°) octarios octodecim.

Sacchari crudi . . . libras octo.

Jalapae . . . libras tres.

Baccarum Juniperi . . . uncias decem cum dimidia.

Nitri . . . drachmas septem.

Scammonaei,

Rhei,

Calami,

Cinnamomi, singulorum uncias tres cum dimidia.

Post octo dies infusionis filtra. — Gabe, anderthalb Unzen.

Jasminum.

Jasminum officinale, L.; Jasmin; Jasmin commun (Gal.); Gelsomino (His.).
Br. Fer. Gal. His. R. Sax. Wir. Be. Br. M. Sp.

Ein Strauch (Diandria Monogynia, L.; Jasmineae, J.) des mittägigen Euro-pa's, des Orient's und Indien's. (Zorn Ic. pl. t. 153. Blackw. t. 13. Plenck t. 9.)

Man wendet die Blüthen (fiores Jasmini) an; sie sind weiß, gestielt und bilden weitläufige Strauße. Frisch haben sie einen angenehmen Geruch, der Geschmack ist etwas bitter.

Spiritus Jasmini. (Sp.)

Rx. Olei Jasmini . . . uncias sedecim.
Alcoholis . . . uncias octodecim.

Misce fortissime agitando, tunc ad frigidum locum posito, spiritum ab oleo congelato defunde.

Essentia Jasmini. (T.)

Rx. Florum Jasmini . . . quantum vis.

In scatulam e lamina alba confectam quadrilateram et pollices 6 ad 8 altam, operculo munitam, in cujus fundo pannus laneus oleo Behen impraegnatus positus est,ingere, ita ut pannus pollicis dimidii circ ter altitudinem tegatur et hoc modo scatula alternis stratis florum et panni repletur, lamina deinde crystallina aut plumbea et postremo operculo obtegens, post horas 12 aut 15 flores exemit cum novis mutantur, quod repetendum est. Pannus deinde exemitis Alchohole rectificato frigido superinfuso compressis et lotis, liquidum hoc, oleo expresso impraegnatum retortae tubulatae infunde et destillatione balnei aquae ope partem tertiam aut dimidiam elice.

Juglans.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in der Medicin benützt:

1) **Juglans cinerea, L.;** weiße Walnusz; Noyer cendré (Gal.); Butter nut, white walnut (Ang.).

Am. C.

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Juglandae, Cand.) Südamerica's. (Big. Med. Bot. II. t. 92.)

Man wendet die innere Rinde des Stammes und der Wurzel an, welche purgirend wirkt. Die der frischen Wurzel soll Blasen ziehen.

2) **Juglans regia, L.;** Nußbaum, Walnusz; Noyer commun (Gal.); Walnut tree (Ang.); Akirut, jowz, Khusif (Ar.); Walsky orch (B.); Ho-tao (C.); Valnood (D.); Akirut (Duk. Hin.); Nogal (His.); Noce (I.); Olass-dio (Ma.); Girdigan, Charmughz, Jouzirumie (Pe.); Orzeszina wloska (Pol.); Nogueira (Lus.); Greziak orechi (R.); Walnaetraet (Suec.).

A. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. Galm. Gen. Ham. Hah. Hass. Hassp. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Terebinthaceae, J.), welcher, in Persien ursprünglich zu Hause, in ganz Europa gezogen wird. (Fl. méd. V. 250. Blackw. t. 347. Plenck t. 672. Schk. t. 302. Berr. Bild. VIII. 27.)

Man wendet die Frucht (Nux Juglans s. Juglandis) entweder reif (nucis Juglandae) oder unreif (Nucis immaturae) an. Es ist eine eifrunde Steinfrucht mit

einer grünen, fleischigen Hülle oder Schale (cortex s. putamen nucis Juglandis) von bitterem sehr herben Geschmack. Die darin eingeschlossene Nuß (nucleus nucis Juglandis) besteht aus einer harten, brüchigen, Holzigen, braungelben, außen gefurchten, geruch- und geschmacklosen Schale, welche einen viertappigen, sehr unregelmäßigen Kern enthält, der unter einem gelblichen, sehr dünnen, abstringirenden Fellschen (epidermis nuclei Juglandis) ein süßes, öliges Fleisch von sehr angenehmem Geschmack einschließt.

Electuarium antihydrophobicum. (B*.)

℞. Nucum Juglandium maturarum no. 30.

Herbae Ratae manipulum unum.

Mellis uncias octo.

Contere. — Von Extractivig gerührt. — Man läßt Morgens und Abends vor dem Essen einen Eßlöffel nehmen.

Oleum Nucum Juglandium s. Juglandis regiae. (An. Bor4. Br. Gal. Hass. HassP. His. Li. Pal. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. Pid. T. Vm.)

℞. Nucum Juglandium maturarum quantum vis.

Putamine septisque remotis nucleos contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo et pastam sacco e tela confecto (cilicino aut cannabino Bor4.) inclusam frigide inter duas laminas stanneas (laminis in aqua fervente tepefactis Bor4.) exprime.

HassP. inter materiae medicae substantias nominat.

Dieses Öl kann, wenn es frisch und nicht ranzig ist, das Süßmandelöl ersetzen.

Roob Nucum s. Corticis Nucum Juglandis regiae, Roob Diacaryi Galeni, Diacaryon. (A. B*. Br. Ful. Pal. Wir. Wür. Sp. Sw)

℞. Nucum Juglandium immaturarum libram unam.

Contusas in mortario coque cum Aquae libris duabus per horas aliquot; cola exprimendo et succum cum Mellis despumati pondere aequali ad aptam consistentiam consume. (Br. Ful. Wir. Sp. Sw.)

℞. Succu expressi Nucum Juglandium immaturarum libras duas.

Mellis libram unam.

Coque blando igne, spumam dehauiendo, ad aptam consistentiam. (A. B*. Pal. Wür. Sp.)

Schwach abstringirend, auflösend, besonders äußerlich.

Extractum Nucum Juglandium s. Juglandis s. Nucum Juglandium viri- Pharmacopoea universalis. II.

dium. (A. Am. B*. Ba. Bor. Bor4 Br. D. Fenn Han. Hass. HassP. Li. Pal. R. Sax. Suec Wir. C. Vm.)

℞. Nucum Juglandium viridium ante maturitatem decerptarum

quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, Aquae paxillum addendo et succum exprime qui statim in balneo aquae, sub finem cum spatula continue agitatus, evaporet. (A. B*. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Han. Pol. Sax. Suec. Vm.)

HassP. ut extractum Aconiti I. p. 60.

℞. Putaminum Nucum Juglandium partem unam.

Aquae purae partes sex.
Coque, cola et colaturam vaporando rite consume. (Am Hass. Li. R. Wir. C. Pid.)

Reizend, tonisch, bitter, antiscorbutisch, wurmtreibend. — Gabe, ein halber Scrupel bis eine halbe Drachme. Man wandte es ehemals auch äußerlich, als reinigendes Mittel, bei übelaussehenden, selbst venerischen Geschwüren an.

Das Wallnusschalenextract bildet die Basis des *Remedium antiuenerum Mitivé*, zu welchem Lyon und Cabet zwei verschiedene Formeln gegeben haben:

1) ℞. Foliorum Juglandis,

— Apri,

— Trifolii,

singulorum pondus aequale.

Contusis simul succum exprime, qui ad massae pilularis consistentiam inspissetur. (Lyon.) — Gabe, zwei bis sechs Stück sechsgranige Pillen täglich mit einer Zifane von botrys oder scordium.

2) ℞. Foliorum Juglandis

sesquunciam.

Jalapae pulveratae

unciam unam.

Foliorum Angelicae,

— Cardui benedicti,

— Saponariae,

singulorum uncias quatuor.

Fiat infundendo extractum aquosum, quod evaporatum in pilulas granorum sex dividatur. (Cadet.)

Außerdem führt Cabet noch folgenden Syrup an:

℞. Foliorum viridium Juglandis

libras viginti.

Stent cum Aqua fervida in infusione per horas viginti quatuor; infunde tunc

Foliorum viridium Angelicae

libris sedecim.

Stent iterum per horas viginti quatuor, ita ut in balneo aquae continue calida teneantur; superfunde deinde

Foliorum Saponariae libris sedecim.

Rosarum meschatarum

unciis duodecim.

Rosarum vulgarium . uncias sex.
Sennae mundatae

uncias viginti sex.

Infusis per horas viginti quatuor adde et in iis solve Sacchari crudi libras triginta septem, tum coque, albuminis ope clarifica et ad syrapi consistentiam redige.

Rittie ließ den Kranken Morgens, zwei Stunden vor dem Frühstück, acht, und zwei Stunden vor dem Abendessen, vier Stück Pillen nehmen, und zugleich außerdem Morgens nüchtern vier Löffel Syrup in einem Glase Wasser und zwei Löffel zwei Stunden vor dem Abendessen.

Mixtura Nucum Juglandium, Guttae anthelminticae. (Ham. Au.)

℞. Extracti Juglandis drachmas duas.
Aquae Cinnamomi unciam unam.

Gabe, sechszig Tropfen für ein Kind von zwei Jahren und hundert für einen Erwachsenen.

Essentia s. Tinctura Corticis viridis Nucum Juglandis. (D.)

℞. Corticis Juglandis recentis concisii
uncias sex.

Spiritus Vini Gallici libras duas.

Stent blando calore in digestionem per dies quatuor, tum filrentur. — Bitter, abstringirend, tonisch, aufregend.

Aqua Nucum Juglandium. (Fr.)

℞. Florum Juglandium recentium
libras undecim.

Juglandium recentium immaturarum
libras duodecim.

Aquae communis
libras triginta sex.

Coque in lebetes stanneo florum libram unam cum Aqua ad quadrantis fluidi consumptionem et decoctum colatum cum reliquis floribus in alembico cupreo stanno obducto macerati oni per unum diem subice, quo facto duo trientes fluidi destillent; hanc aquam destillatam nucum viridium contusorum libris sex infunde, ut post unius diei macerationem trientes duo destillent; tum nucibus rejectis, decocto aquam destillatam affundendo reliquias nucum libras sex adde, quo facto aquae librae decem distillatione elicantur. — Gabe, eine bis sechs Unzen.

Decoctum Drupae Juglandis regiae s. Corticis viridis Nucum Juglandium. (B*. Gen. Au.)

℞. Corticum Juglandium viridium
unciam unam.

Aquae bullientis uncias decem.

Coque per horae quadrantem et cola. (B*. Gen. Au.)

℞. Nucum Juglandium paulo ante maturitatem decerptarum et siccatarum uncias tres.

Aquae fontanae uncias quatuor.
Decoque ad dimidium et colaturae adde

Mellis albi uncias duas.
Dissolve. (Gen.)

Bei rebellischen venerisch-mercuriellen Krankheiten und solchen, welche sehr reizbare Personen befallen, gerührt. Frank empfiehlt die Flüssigkeit bei Flechtengeschwüren in Waschungen.

Infusum Juglandis compositum. (Sw*.)

℞. Corticis Juglandis sicci,
Foliorum Juglandium,
singulorum manipulos quatuor.

Aquae quantum sufficit
ut colaturae librae octo obtineantur.
Post unius horae infusionem adde

Calcariae muriaticae sesquiunciam.
Abstringirend, äußerlich in Bädern bei 36 bis 38° R. gegen Scrofulen, Lungentuberkeln und im Allgemeinen gegen alle Krankheiten, deren Grund man in das Lymphsystem setzt.

Decoctum Drupae Juglandis regiae s. compositum s. Pollini s. antisypiliticum Pollini. (B*. GalF. Au. Fi. Ra. Sa. Sw. Sy. T.)

℞. Corticis Juglandium viridium
uncias decem.

Radicis Sarsaparillae.
— Chinae,

Fumicis,
Antimonii sulphurati (in nodulo),
singulorum semunciam.

Aquae uncias sexaginta quatuor.
Decoque in vase leviter tecto ad dimidii remanentiam. (B*. GalF. Au.)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,

singulorum uncias duas.
Corticis Juglandium siccatorum
libram unam.

Antimonii sulphurati in nodulo,
Fumicis in nodulo,
singulorum uncias duas.

Aquae libras viginti.
Decoque ad librarum decem remanentiam. (B*.)

℞. Radicis Sarsaparillae uncias tres,
— Chinae sesquiunciam.

Antimonii crudi in nodulo
uncias duas.

Nucum Juglandium integrarum
no. 30.

Aquae libras decem.
Decoque ad librarum decem remanentiam. (Sa.)

℞. Corticis Juglandis uncias octodecim.

Radix Sarsaparillae,

— Chinae,

Antimonii sulphurati, in nodulo.**Pumicis in nodulo,**

singulorum semunciam.

Aquae **libras octo.**

Post horas duodecim macerationis coque in vase tecto, tunc nodulis remotis coquendo continua ad librarum quatuor liquidi remanentiam et cola absque filtratione. (Sy.)

Fi. Corticis recentis uncias decem, Radicum et Mineralium, singulorum semunciam et Aquae libras quatuordecim post macerationem per noctem unam ad dimidiam decoquendas; — **T.** ut antea, sed Corticis tantum uncias quinque.

Sy. Decoctum syphiliticum roborans: Antimonii uncias quatuor, Pumicis, Sarsaparillae, Chinae, singulorum uncias duas, Nucum ante maturitatem siccatarum no. 40, et Aquae libras viginti ad decem redactas.

R. Corticis Juglandium siccati unciam unam.

Sassaparillae,

Chinae, singulorum uncias duas.

Antimonii sulphurati in nodulo

uncias quatuor.

Pumicis in nodulo uncias duas.**Aquae** **libras viginti.**

Coquendo dimidium consume. (Gal. Sw.)

R. Chinae griseae,**Sassaparillae,**

singulorum uncias tres.

Pumicis,**Antimonii crudi,**

singulorum sesquiunciam.

Corticis Juglandium libram unam.**Aquae** **libras octo.**

Decoque ad octarii remanentiam et colaturae adde

Kali subcarbonici drachmas duas.**Dissolve. (Ra.)**

Steigend, tonisch, bei Ausschlag, Flechten und hartnäckigen venerischen Uebeln empfohlen. — Gabe, Morgens und Abends ein Pfund. — Auch äußerlich in Waschungen.

J u j u b a e.

Zizyphus sativus, Cand.; Brustbeerstrauch; Jujubier (Gal.); Jujevtree (Ang.); Azufeifas (His.); Jotlenboom (Bel.); Giuggiolo (I.); Anafegas (Lus.).

An. Ba. Br. Fer. Gal. HassP. His. Wir. Be. Fi. G. M. Sp.

Ein Strauch (Pentandria Digynis, L.; Rhamnaceae, J.) Ostindien's, welchen man im südlichen Europa zieht. (Lamk. III.

gen. t. 185. f. 1. Plenck t. 142. Nouv. Duh. III. t. 16.)

Man wendet die Früchte, Brustbeeren (Jujubae s. Baccae Jujubae s. Zizyphi) an. Es sind Steinfrüchte von der Gestalt und Größe einer Olive, von rothgelber oder rother Farbe, welche unter einer dicken Schale ein weiches, gelbes, schleimiges, süß und schleimig schmeckendes Fleisch, und von demselben bedeckt, einen länglichen, harten, gefurchten Kern enthalten.

Nach Ainslie's Bericht gebrauchen die Indier die Abkochung der Wurzel gegen manche Fieber, jedoch ist er der Meinung, daß sie wohl keine großen Kräfte besitzen möge.

Species pectorales cum fructibus s. pro decocto Florum et Fructuum s. bechicae. (HassP. P.J. Wir.)

R. Radicis Liquiritiae uncias duas.**Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,**

— Endiviae,

singulorum drachmas duas.

Florum Boraginis,

— Buglossi,

— Violarum,

— Rosarum,

singulorum drachmam unam.

— Lupuli drachmas duas.

Jujubarum,**Siliquae dulcis,****Prunorum Damascenarum,**

singulorum uncias duas.

Tamarindorum unciam unam.**Grossisculae concisa misce. (Wir.)**

Pal. Siliquam omittit, praescribit tamen Jujubarum, Prunorum et fructuum Sebestenae, singulorum no. 20; — HassP. Siliquae, Jujubarum, singulorum uncias tres, Dactylorum, Caricarum, Passularum minorum, Hordei mundi, singulorum uncias quatuor, Radicis Liquiritiae, Herbae Capillorum Veneris, Veroniceae, Hyssopi, Florum Verbasci, singulorum uncias duas.

Fructus pectorales. (Gal.)**R.** Jujubarum,**Dactylorum enucleatorum,**

• Ficum,

• Uvarum passarum,

singulorum partes aequales.

Misce.**Pulpa Jujubarum. (Gal. Fi. T.)****R.** Jujubarum quantum vis.**Aquae** quantum sufficit.

Coque ad emolliendos fructus, pulpam per crinium trajice, et aquam decocti cum ea commiscens totum blando igne ad aptam consistentiam consume.

Fi. Jujubarum libras septem, Infusi

Sennae, Sacchari, singulorum libras tres, caeterum ut Gal. ea tamen differentia, ut pulpa cum syrupo ex infusione et saccharo parato commixta, totum ad aptam consistentiam consumatur; — T. ut pulpam dactylorum.

Pasta Jujubarum. (B*. Ba. Gal. Fi. T.)

℞. Jujubarum . . . libram unam.
Gummi Senegalensis libras sex.
Sacchari puri . . . libras quinque.
Aquae filtratae . . . libras triginta.
Tincturae Corticis Citri

unciam unam.

Coque in aquae libris decem et cola decoctum; in aquae reliquo gummi dissolve, colaturas commisce et, addito saccharo, albumina quinque cum Aqua subacta addendo, coque, spumam eximendo; liquorem ad tertiam partem redactum per linteum cola et ad syrupi spissi consistentiam redige; adde tunc tincturam et evaporationem in aquae balneo ad extracti mollis consistentiam usque continua, quod in formas ferreas stanno obductas, oleo oblititas effusum in vaporario sicca. (Gal.)

Fi. ut Gal. sed loco tincturae Aquae aromaticae Citri uncias duas; — T. Jujubarum enucleatarum uncias decem coquere in Aquae sufficiente quantitate, Albumina cum Aquae circiter uncia una subacta et Tincturae alcoholicae Citri drachmas tres cum pondere aequali Aquae dilutae, caeterum ut antea; — B* et Ba. coquere praescribunt Jujubarum, Dactylorum, Passularum minorum, singulorum partem unam in Aquae partibus triginta sex ad viginti quatuor redactis, colaturae addere Sacchari pondus duplum et tunc Albuminis cum Aquae pauxillo subacti partem dimidiam et ad syrupi consistentiam redactis addere, continue agitando, Mucilaginis Gummi Arabici partes viginti quatuor et ad aptam consistentiam redacta ac in modulos effundere blandoque calore siccare.

Syrupus de Jujubis. (Br. Wir. Sp.)

℞. Jujubarum recentium uncias tres.
Liquiritiae . . . drachmas sex.
Capilli Veneris Monspelici,
Florum Violarum,

singulorum drachmas quinque.

Seminum Malvae,

— Cydoniorum,

— Papaveris albi,

singulorum drachmas tres.

Aquae fontanae

libras duas cum dimidia.

Coque ad unciarum octodecim liquidi remanentiam et in iis dissolve

Gummi Tragacanthae electi
drachmam unam.

Sacchari albi uncias triginta duas.
Serva. (Br. Wir.)

℞. Jujubarum uncias tres.

Radicis Liquiritiae,

Capilli Veneris Monspelici,

Hordei mundati,

singulorum unciam unam.

Aquae uncias quadraginta quatuor.

Coque ad unciarum triginta sex remanentiam, sub finem addendo
Florum Violarum uncias quinque.

Cum colatura et

Seminum Malvae unciis quinque.

— Cydoniorum,

— Papaveris albi,

— Melonum,

— Lactucae,

singulorum drachmis tribus

emulsione parata, in liquore dissolve

Sacchari uncias viginti quatuor.

Gummi Tragacanthae

drachmas tres.

Coque ad syrupi consistentiam. (Sp)

Decoctum pectorale. (Sar. Ca. T.)

℞. Jujubarum,

Caricarum pinguium concisarum,

Uvarum passerum mundatarum,

Radicis Liquiritiae,

singulorum semunciam.

Aquae communis . . . libras sex.

Coque fructus in aqua, donec haec ad tertiam partem sit redacta, adde liquiritiam ab igne removens, infunde per tempus aliquot et cola. (Sar.)

Ca. Fructuum pectoralium uncias duas et Aquae libras duas cum dimidia, coctione ad libras duas redactas; — T. Foliorum siccatum Farfarae uncias sex, Caricarum siccatum, Uvarum passerum, Jujubarum siccatum, singulorum uncias duas, Aquae libras duodecim. Coque ad tertiae partis consumptionem, addendo Radicis Liquiritiae uncias duas.

Jusculum pectorale. (Pie. Sm.)

℞. Pulmonis vitulini,

Colli vervecis,

singulorum no. $\frac{1}{2}$.

Jujubarum no. 20.

Dactylorum no. 12.

Uvarum Damascenarum

semunciam.

Radicum Napi . . . uncias duas.

Gruti drachmas duas.

Conservae Angelicae unciam unam.

Aquae octarios duos.

Ehulliant. (Pie.)

℞. Pulmonis vitulini concisi,

Pulli gallinaei pelle privati,

singulorum no. $\frac{1}{2}$

Jujubarum . . . no. 12 aut. 15.
Hórdei perlati
occhlearia duo majora.

Aquae
octarium unum cum dimidio.

Parte tertia consumpta, absque depumatione et aliquot momenta antequam ab igne removeris, adde Foliorum viridium Pulmonariae manipulum unum.

Juniperus.

Drei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöden angeführt:

1) *Juniperus communis*, L.; Wachholder, Kabbig; Génévrier commun (*Gal.*); Juniper (*Ang.*); Galowec (*B.*); Ene, Enebaer (*D.*); Enebro (*His.*); Genevar (*Hel.*); Ginepro (*I.*); Jalowiec (*Pol.*); Zimbro (*Lus.*); En (*Suec.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

Ein Baum oder Strauch (*Diocia Monadelphia*, L.; *Coniferae*), welcher in Europa einheimisch ist. (*Blackw.* t. 187. *Planck* t. 719. *Schk.* t. 338. *Diet. d. Sc. nat. Livr. VII. Bert. Bild. VIII. 32. Fl. méd. IV. 181.*)

Man wendet das Holz, die Spitzen und die Früchte an.

Das Holz (*lignum Juniperi*, *lignum cedrinum*) ist fest, schwer und sehr harzig und hat eine außen graue oder röthlichbraune, innen gelbliche oder röthlichgelbe Rinde. Der Geruch ist angenehm und balsamisch, der Geschmack gewürzhaft, harzig und etwas bitter.

Die Spitzen oder Enden der Zweige sind dünn und bestehen aus Stenden, meist zu drei vereinigten, schmalen, spitzen, harten und stehenden Blättern (Nadeln).

Die Früchte sind kugelig, schwärzliche Beeren von harzigem Geruch und balsamischem, etwas bitterem und zugleich süßlichen Geschmack.

Alle Theile der Pflanze, und besonders die Beeren, werden als kräftig harntreibend angesehen. Auch legt man dem Holze Kräfte gegen die Syphilis bei.

Gabe des Pulvers, zwei bis sechs Drachmen.

2) *Juniperus Virginiana*, L.; Birginischer Wachholder; Génévrier de Virginie, Cèdre rouge (*Gal.*); Common red cedertree (*Ang.*).

Am. C.

Ein Baum (*Diocia Monadelphia*, L.; *Coniferae*, J.) Nordamerica's. (*Pluk. Alm.* 201. t. 197. f. 4. *Big. Am. Bot. T. IV. t. 45.*)

Die Blätter sind ganz einfach, lanzettförmig und spizig. Sehr jung angewendet können sie die Sadebaumblätter ersetzen.

3) *Juniperus Sabina*, L.; Sadebaum, Sevenbaum; Sabine (*Gal.*); Savine (*Ang.*); Sawina neb klassterska chwojka (*B.*); Sevenhom (*D.*); Sabina (*His. I. Lus.*); Seevenboom (*Bel.*); Sawina (*Pol.*); Saefwenhom (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

Ein Strauch Südeuropas und der Levante. (*Bull. t. 139. Blackw. t. 214. Planck t. 720. Schk. t. 338. Zorn Ic. pl. t. 525.*)

Man wendet die Blätter (*folia s. herba Sabinae*) an; sie sind entgegengesetzt, eiförmig, etwas spizig und auf dem Rücken gewölbt. Sie haben einen harzigen, gewürzhaften, sehr durchdringenden Geruch und einen sehr bitteren Geschmack.

Kräftig reizend, aufregend und die Reinigung treibend.

Conserva Juniperi. (*Sw.*)

℞. *Baccarum recentium Juniperi*
uncias octo.

Contusis adde sensim
Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Solve leviter calefaciendo.

Conserva Sabinae. (*Han. Pol. Sax. Sw.*)

℞. *Foliorum Sabinae contusorum*
partem unam.

Sacchari albi pulverati partes duas.
Contere. (*Pol. Sax. Sw.*)

Han. Foliorum partem unam et tres Sacchari.

Pulvis diureticus. (*B*. Au.*)

℞. *Baccarum Juniperi tostorum,*
Radice Pimpinellae albae,
singularum grana quinquas.

Nitri antimoniati . . . grana tria.

Von 3 Euben empfohlen. (*B*.*)
℞. *Baccarum Juniperi tostorum,*
Sacchari albi,

singularum partes aequales.
Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen

Kaffeeöffel. (*Au.*)

Pulvis emmenagogus. (*E.*)

℞. *Herbae Sabinae,*
Zingiberis,

singularum drachmam unam.
Kali sulphurici . . . drachmas duas.

Divide in partes sex. — Gabe, ein
Stück zweimal täglich.

Pulvis Sabinae compositus. (*RC.*)

℞. *Pulveris Herbae Sabinae,*
Ferri carbonici praecipitati,
Zingiberis vel

Pulveris aromatici,
singulorum partem unam.
Misc. — Gabe, eine halbe Drachme
bis zwei Scrupel täglich zwei Mal, bei
Hypochondrie, Amenorrhoe, Verdauungsbe-
schwerden.

Pulvis vermifugus. (E.)

℞. Sabinae . . . grana duodecim.
Sennae,
Spigeliae,

singularum scrupulos duos.

Fiant doses sex. — Man nimmt drei
Lage hintereinander Morgens ein Stück
und verschluckt hierauf Ricinusöl, worauf
man, wenn es nöthig ist, wieder von vorn
anfängt.

Boli emmenagogi. (B. Ca.)

℞. Pulveris Sabinae drachmam unam.
Syrupi Artemisiae quantum sufficit
Extracti Aristolochiae,
— Artemisiae,

Pulveris Croci,
— Castorei,

singulorum semidrachmam.

Fiant boli triginta sex — Gabe, ein
Stück drei oder vier Mal täglich, bei
Amenorrhoe. (Ca.)

℞. Extracti Sabinae grana quatuor.
Pulveris Foliorum Taxi grana sex.
Mellis despumati,
Pulveris Liquiritiae,
singulorum quantum sufficit.

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück
alle drei Stunden. (B.)

• *Pilulae emmenagogae. (B+.)*

℞. Extracti Sabinae . . . semunciam.
Pulveris Herbae Sabinae
drachmas duas.

Olei essentialis Sabinae

quantum sufficit

ut fiant pilulae ponderis granorum
duorum. — Gabe, acht Stück Morgens
und Abends.

℞. Pulveris Sabinae,
Extracti Chamomillae,
singulorum sesquidrachmam.
Ferri oxydati nigri,
Extracti Aloës,

singulorum grana quindecim.

Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, sechs Stück auf einmal, bei Bleich-
sucht.

Electuarium antiarthriticum. (Ham.)

℞. Pulveris Sabinae drachmam unam.
— Calami . . . drachmas duas.
Mellis despumati . . . uncias duas.

*Extractum, Roob Juniperi. (A. An. B.
Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer.
Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP.*

*His. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir.
Wür. Fi. Pid. Sw. T. Fm.)*

℞. Baccarum Juniperi integrarum
partem unam.

Aquae tepidae . . . partes quatuor.
Stent in infusione per horas quadra-
ginta octo, subinde agitata, tum colata
subsident; liquor decanthatus blando
igne ad extracti consistentiam evapo-
ret. (Ba. Gal. GalM.)

*Fi. Baccarum maturarum libras duas
in Aquae tepidae libris octo per horas
48 digerere agitando subinde, colare et
novam Aquam addere quamdiu fluidum
saporem praebet, liquores commixtos
per semihoram coctos et calide
absque expressione colatos, leni calore
ad extracti consistentiam redigere. Si
infusionibus addas Sacchari uncias octo,
Rob Juniperi habes. — T. Baccarum
maturarum libras decem cum
Aquae bullientis quinquaginta digere
loco tepido, subinde agitando; post
duos dies decantha liquorem, igne
aperto lente ad $\frac{1}{2}$ consume et cuique li-
brae, Sacchari uncias tres addendo bal-
nei aquae vel vaporis ope ad consisten-
tiam roob consume.*

℞. Baccarum Juniperi quantum vis.

Contunde cum Aquae tepidae pau-
xillo humectans et pauxillum Fermenti
Cerevisiae addens; fermentata calore
15 ad 20° R. cola parumper exprimendo;
liquorem coquendo ad dimidium
redige, albuminis ope clarifica et va-
porando ad extracti consistentiam con-
sume. (Vm)

℞. Residui e destillatione Spiritus Ju-
niperi . . . quantum vis.

Clarificatum rite consume. (Sw.)

℞. Baccarum Juniperi contusarum
libras octo.

Aquae fervidae libras duodecim.
Digere per tres dies, tum in alembi-
co destillationi subjice, donec oleum
cum aqua prodire cessaverit, quod se-
posito residuum fortiter exprime, ad
extracti consistentiam consume et oleum
bene cum hoc commisce. (Sar.)

℞. Baccarum Juniperi contusarum
libras quatuor.

Aquae bullientis libras duodecim.
Digere per dies duos aut tres, tunc
ad mollitiem baccarum usque coque,
cola exprimendo, et liquorem sepositum
in balneo aquae ad extracti consi-
stentiam consume. (His.)

Bor. Bor4. Gen. Han. Li. O. RC. et
Sax. Baccas coquendo in Aqua emolli-
tas leviter exprimere et colaturam ad
mellis vel syrupi spissioris consi-
stentiam evaporare jubent; — Pal. Mace-
rare eas per dies duos in Aqua absque

ebullitione et succum expressum ad eundem consistentiae gradum redigere; — Fenn. repetere macerationem cum eadem Aqua, donec baccae fere sint saporis expertes et liquorem absque bullitione ad mellis consistentiam consumere; — HassP. Baccharum quantum vis cum Aquae sufficiente quantitate per dimidiam horam coquere, modice exprimere et succum expressum leni calore ad mellis consistentiam consumere.

℞. Baccharum Juniperi libram unam.
 Aquae libras quatuor.
 Stent in balneo aquae in infusione; colaturae sepositione depuratae adde Sacchari albi . . . libram unam.
 Evaporent leni igne ad mellis consistentiam. (An.)

Vm. macerare jubet per horas duodecim Baccharum contusarum partes duas in Aquae quadraginta octo, per crinium trajicere absque expressione, residuum cum Aquae partibus viginti quatuor maceratum itidem colare, in colaturis mixtis solvere Sacchari albi partem unam et albumine clarificatum ad mellis consistentiam redigere; — Fer. Macerare per duos dies Baccharum libras sex in Aquae viginti quatuor, macerationem cum nova Aqua repetere, donec haec saporis expertes evadat, liquoribus commixtis et colatis addere Sacchari libras duas et albumine clarificatas probe consumere.

℞. Baccharum Juniperi quantum vis.
 In pulpam redige Aquae quantitatem necessariam addendo et coque in Aquae quantitate sufficiente per semihoram, per crinium trajice et residuum exprime; dissolve in succi partibus quatuor Sacchari albi partem unam et ad consistentiam mellis consume. (A. B. Bel. D. Ham. Pal. Wür.)

Br. Ful. Han. R. Wir. *Pid.* et *Sw.* prescribunt Sacchari libram unam pro libris octo Baccharum bullitioni subjectarum; — T. residui expressi, banei aquae vel vaporis calore ad syrupi consistentiam inspissati librae cuique Sacchari uncias tres addere et bene mixta in vaporis vel aquae balneo ad mellis consistentiam redigere.

Dieser Extract führt, bloß zur Sonigbich abgedampft und besonders mit Zucker verüßt, den Namen *Roob Juniperi s. Baccharum Juniperi, Succus Juniperi inspissatus.*

Zeichen, gewürzhaft, blähungtreibend, majenstärkend; die Hautausdünstung und Harnabsonderung bethätigend. — Gabe, ein halbe bis eine Unze, am häufigsten in Wasser.

Extractum Sabinae aquosum. (Du. Fer. Pal. Sax. Wir. Fl.)

℞. Summitatum Sabinae libram unam.
 Aquae fontanae . . . librae sex.
 Macera in loco calido per dies quatuor, tum coque leviter, cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Pal. Wir.)

℞. Summitatum Sabinae libram unam.
 Aquae purae libras octo.
 Decoque ad dimidium, cola exprimendo et liquorem blando igne ad massae pilularis consistentiam consume. (Du.)

Fer. Coquere jubet Sabinae partem unam in Aquae tribus et decoctum clarificatum evaporare; — *Fl.* Sabinae partem unam, Aquae octo ad dimidium coquere, albumine clarificare, et balnei aquae ope ad extracti consistentiam redigere.

℞. Summitatum Sabinae partem unam.
 Aquae communis . . . partes octo.
 Infusa per horas viginti quatuor coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquore, post horarum viginti quatuor sepositionem ad aptam consistentiam evaporent. (Sax.)

Gabe, zehen Gran bis eine halbe Drachme, zwei oder drei Mal täglich.

Extractum Sabinae alcoholicum. (Wür.)

℞. Summitatum Sabinae,
 Alcoholis,
 singulorum libram unam.
 Aquae communis . . . libras octo.
 Digeri blando calore per tres dies, cola exprimendo, sepone, liquorem decantha et alcohole destillando elicito, residuum vaporatione ad aptam consistentiam consume.

Electuarium de Junipero s. diureticum.
 (Sar.)

℞. Roob Juniperi,
 Mellis purificati,
 singulorum libram unam.
 Baccharum Juniperi uncias quatuor.
 Cinnamomi,
 Corticis sicci Aurantiorum,
 singulorum semunciam.
 Roob et melli blando calore liquatis adde reliqua pulverata.

Solutio Roob Juniperi. (B*)

℞. Roob Juniperi . . . uncias quatuor.
 Aquae Juniperi . . . libras duas.
 Mixtis bene, adde
 Tincturae Juniperi uncias duas.
 Aetheris nitrici . . . semunciam.
 Misce bene.

Reizend, von van Swieten bei Bauchwasserfucht gerühmt. — Gabe, alle drei Stunden eine bis zwei Unzen.

Eliair juniperinum s. malvaticum juniperinum. (Sp.)

℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Vini Maderani uncias duodecim.
Mixta bene per linteum trajice.
Reizend, blähung- und harntreibend. —
Gabe, ein Eßfel auf einmal.

Potio juniperina s. hydragoga. (B. Au. Ca. Sa.)*

℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Aquae Juniperi libras duas.
Mixtis bene, adde
Spiritus Juniperi . uncias duas.
Misce. (B*. Au. Ca.)
℞. Roob Juniperi . unciam unam.
Aquae Juniperi . . uncias sex.
Spiritus Juniperi . . semunciam.
— Nitri dulcis semidrachmam.
Misce, (Sa.)
Gabe, alle zwei oder drei Stunden zwei Unzen.

Tinctura s. Essentia Sabinae. (Ham. HassP.)

℞. Foliorum Sabinae partem unam.
Alcoholis partes sex.
Stent per plures dies in digestionem,
tum colentur cum expressione et fil-
trantur.

HassP. ut tincturam croci I. p. 574.
Gabe, dreißig Tropfen mehrmals täglich.

Potio emmenagoga. (E.)

℞. Tincturae Sabinae unciam unam.
— Hellebori nigri semunciam.
— Castorei . drachmas duas.
Gabe, vierzig Tropfen dreimal täglich.

*inctura Sabinae kalina s. arthritica,
(B*. Au. Sw. Vm.)*

℞. Foliorum recentium Sabinae
unciam unam.
Tincturae alcalinae . uncias sex.
Stent in digestionem per dies quatuor.
B*. Au. Vm.)

Ex tempore paratur solvendo Olei
essentialis Sabinae drachmas duas in
Tincturae alcalinae unciis sex.
Sw. Sabinae unciam unam et Tin-
cturae alcalinae unciis octo.

Ceratum s. Unguentum Sabinae. (Am. B. Ba. Du. Ed. Lon. LonN. Suec. C. Fi. Sw. T. Vm.)*

℞. Foliorum recentium Sabinae
partes duas,
Cerae flavae . . . partem unam.
Axungiae Porci partes quatuor.
Foliis cum axungia coctis ceram ad-

de. (B*. Ba. Du. Ed. Lon. LonN. Suec. Sw. Vm.)

Am. et C. miscere jubent Cerati resinosi partes sex et Sabinae pulveratae partem unam; — Fi. Foliorum, Cerae et Axungiae easdem quantitates ut antea, in vase ferreo lente coquere ad coloris viridis extractionem et humidi consumptionem; — T. Ceram et Axungiam liquatas cum Foliis ad humidi consumptionem coquere.

Nis epispasticum angewendet.

Oleum Baccarum Juniperi aethereum, Aethereolum Baccarum Juniperi. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Sw. T.)

℞. Baccarum Juniperi contusarum
quantum vis.
Aquae quantum sufficit.
Destillent et oleum separetur. (Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Suec. C.)

Ba. Baccarum partem unam et tres Aquae; — Fer. Ful. et Sw. Baccarum unam et quatuor Aquae; — D. et Vm. Baccarum unam, Aquae sex; — Bor. Han. O. Pol. et Sax. Baccarum unam et octo Aquae; — Bor4. et HassP. ut Bor. caeterum ut oleum absinthii, corticum aurantiorum, calami etc.; — Gal. Baccarum quinque et Aquae septem; — An. et Br. Baccarum tres et decem Aquae; — His. Baccarum unam et Aquae quadraginta; — T. Baccarum quantum vis, Aquae duplum pondus; destillando dimidium vel duae partes quintae liquidi adhibiti elice, cohoba usque quantitas requisita sit obtenta.

℞. Baccarum Juniperi partes quatuor.
Aquae partes sedecim.
Salis culinaris . . . partem unam.
Post tres dies macerationis fiat destillatio. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Baccarum Juniperi quantum vs.
Aquae Juniperi quantum sufficit.
Post horas duodecim fiat destillatio. (Wür.)

Gabe, zwei bis zehn Tropfen in einem Bechfel.

Oleum Ligni juniperini aethereum, Aethereolum Ligni juniperini. (A. Han. Pal.)

℞. Ligni Juniperi . partem unam,
Aquae partes octo.
Destillent. (Han.)
Pal. Ligni partem unam et sex Aquae;
— A. Ligni unam et duodecim Aquae.
Sar. Oleum obinet destillando liq-

num raspatum prope ignem apertum et oleum foetidum a liquore claro, qui antea prodit, separando.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Juniperi. (BorC. HassP.)

℞. Olei essentialis Juniperi guttas duodecim.
Sacchari pulverati . . . semunciam
Triturando misce.
HassP. Olei guttas quatuor, Sacchari drachmas duas.

Pulvis excitans. (Au.)

℞. Sacchari albi . . . semunciam.
Olei essentialis Juniperi

guttas tres.

Terendo fiat elaeosaccharum, qui adde Salis culinaris drachmam unam. Divide in partes duodecim. — Gabe, drei Etüd täglich, bei weißen Gelenkschwülsten.

Oleum Sabinæ aethereum, Aethere-oleum Sabinæ. (A. Ams. An. Bor. Bor4. Br. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wür. C. Pid. Sw. T. Vm.)

℞. Foliorum Sabinæ quantum vis.
Aque pure . . . quantum sufficit.
Destillent. (Ams. Ed. Fer. R. C.)

T. Sabinæ partem unam, Aquae hulentis duplum pondus, destillent et repetitæ cohobationi subjiciantur; — Ful. et Sar. Sabinæ partem unam et tres Aquae; — Sw. Sabinæ unam et quatuor Aquae; — Vm. Sabinæ unam et sex Aquae; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Sabinæ unam et octo Aquae (caeterum ut oleum calami aethereum Bor4.); — A. Sabinæ unam et Aquae duodecim; — An. Sabinæ sex et viginti Aquae; — Gal. Sabinæ quinque et septem Aquae.

℞. Herbae Sabinæ partes

partes viginti quinque.

Aque partes sexaginta quatuor.

Salis culinaris . . . partes tres.

Destillent. (Br. Hass. Pal. Pid.)

℞. Herbae Sabinæ quantum vis.
Aque destillatæ Sabinæ quantum sufficit.

Destillent. (Wür.)

Gabe, vier bis zwanzig Tropfen in einem Trank.

Potio emmenagoga. (Ca. Ra.)

℞. Aquae Artemisiæ uncias quinque.
Syrupi Florum Aurantiorum

unciam unam.

Aque Florum Aurantiorum

semunciam.

Olei essentialis Rutæ,

Olei essentialis Sabinæ,
singulorum guttas sex.
Kaffeelöffelweise.

Aqua Juniperi. (A. B*. Ba. BorC. Gal. Hass. HassP. Li. Sax. Wür. Br. Fi. Pid. Sw. T. Vm.)

℞. Baccarum Juniperi partes duas.
Aque . . . partes quindecim.
Destillent partes quatuor. (Gal.)

T. Baccarum partem unam, Aquae quatuor; destillent partes duae; — B*. Ba. Baccarum partem unam et quinque Aquae; destillent partes duae; — Wür. Baccarum partem unam et Aquae duodecim; — A. Baccarum unam et decem Aquae; destillent partes sex; — Br. Baccarum unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor vel sex (Hass. Li. Pid.) vel duodecim (Fi.); — Sax. Baccarum unam, Aquae viginti duae; destillent quindecim; — Sw. Baccarum unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes viginti; — HassP. Baccarum libras tres, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti quatuor.

℞. Foliorum recentium Juniperi partem unam.

Aque Vitæ . . . partem dimidiam.
— pure

partes centum sexaginta.

Destillent partes quadraginta, oleum separa et aquam serva. (Vm.)

℞. Elaeosacchari Juniperi drachmam unam.

Aque destillatæ . . . uncias octo.
Dissolve. (BorC.)

Aqua Sabinæ. (Wür. Pid.)

℞. Herbae Sabinæ . . . partem unam.
Aque . . . partes octo.

Post macerationem viginti quatuor horarum destillent partes octo. (Pid.)

Wür. Sabinæ partem unam et sex Aquae.

Spiritus Juniperi. (An. Bor4. Br. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Wir. Wür. Pid. T. Vm.)

℞. Baccarum Juniperi partem unam.
Alcoholis . . . partes duodecim.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent. (Ful. Hass. Pid.)

An. et Li. Baccarum partem unam et octo Alcoholis; — Br. Pal. Wir. et Wür. Baccarum unam et duas Alcoholis; — T. Baccarum integrarum

libras tres, Alcoholis 22° libras octo; post trium dierum digestionem destillent trientes duo.

℞. Baccarum Juniperi partem unam.
Alcoholis (Spiritus Vini rectificati)

partes quatuor.

Aquae . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor destillent.
(librae quatuor Bor4. HassP.) (Bor4.
Han. HassP.)

℞. Baccharum Juniperi
libras quindecim.

Sacchari . . . semilibram.
Fermenti Cerevisiae . uncias duas.

Aquā tepida infusa bene dilue et tem-
peraturae + 15 — + 18° R. expone;
post fermentationem alembico infun-
de; additis deinde duplo volumine
Aquae et Spiritus Frumenti libris octo,
destillet spiritus 18 ad 20° indicans.

Spiritus Juniperi compositus, Alcohol Juniperi compositum. (Am. B. Bel. Ed. Lon. LonN. Suec. C. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Baccharum Juniperi libram unam.
Carvi,

Foeniculi, singulorum sesquiunciam.
Aquae Vitae . . . octarios octo.

— purae . . . quantum sufficit
ad prohibendum empyreuma. Destil-
lent octarii octo. (Am. B. Bel. Ed.
Lon. LonN. Suec. C. Sw.)

*Fi. Baccharum libram unam, Semi-
num Cumini, Anisi, singulorum sesqui-
unciam, Alcoholis 25° libras sex, Aquae
communis libras duas; destillent libras
sex; — T. ut Fi. sed Alcoholem 30°
pro aqua simplici Aquam Florum Aur-
rantiorum, duorum dierum maceratio-
nem et distillationem trium dierum cir-
citer duorum.*

℞. Baccharum Juniperi . partes sex.
Foliorum recentium Ribium nigro-
rum . . . partem unam.

Seminum Dauci sylvestris,
— Ribium nigrorum,
singulorum partes duas.

Spiritus Frumenti
partes triginta sex.

Aquae purae partes centum et octo.
Destillent partes viginti quatuor.

(Vm.)

Blähung- und harntreibend. — Gabe,
zwei bis vier Drachmen.

Spiritus Sabinae. (Han. Au.)

℞. Herbae Sabinae . partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Aquae purae . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor maceratio-
nis fiat destillatio.

Linimentum juniperinum. (Au.)

℞. Spiritus Juniperi . uncias duas.
Olei Caryophyllorum,
Balsami Nucistae,
singulorum semidrachmam.

Von Rosenstein bei Erysipelen und
kalten Geschwülsten gerühmt. Chrestien

wendet es in Einreibungen auf das Rück-
grat und die Lenden bei Frauen, welche zu
Nissfällen geneigt sind, an.

Linimentum resolvens et diureticum. (B.)

℞. Spiritus Saponis . . uncias tres.
— Juniperi . unciam unam.

Morgens und Abends auf den Unterleib
eingerieben, bei Bauchwassersucht mit Ato-
nie.

Linimentum excitans. (Au.)

℞. Spiritus Sabinae . . uncias sex.
Olei essentialis Sabinae
drachmam unam.

In Einreibungen, bei giftigen Schmer-
zen.

Tinctura hydragoga. (Bo.)

℞. Radicis Aristolochiae rotundae,
— — longae,
singularum sesquiunciam.

Radicis Zingiberis,
— Armoraciae,
Bulborum Scillae siccorum,
singulorum semunciam.

Summitatum Absinthii,
— Centaurii minoris,
Baccharum Juniperi,
singulorum unciam unam.

Salis Absinthii . . . semunciam.
Alcoholis Juniperi . . . libras sex.

Post dierum octo macerationem fil-
tra. — Reizend, harntreibend, von Boer-
haave bei Wassersucht empfohlen. — Ga-
be, eine Unze täglich viermal.

Infusum Baccharum Juniperi. (B*. BorC.
RC. WW. Au. Ra.)

℞. Baccharum Juniperi contusarum
sesquiunciam,
Aquae bullientis . . . sesquilibrum.

Digere in vase tecto per horam di-
midiam et cola. (BorC. WW. Au.)

Ra. Baccharum drachmas duas et
Aquae libras duas; — B*. Baccharum
unciam unam et Aquae satis ut colaturae
unciae tres obtineantur; — RC.
Baccharum unciam unam, Aquae libram
unam; stent per horam. Interdum ad-
duntur: Aetheris sulphurici alcoholisa-
ti drachmae duae vel Tincturae aro-
maticae vel Calami semuncia.

Xromatisch, schwach urintreibend, bei
Wassersucht empfohlen. — Glasweise.

Infusum Sabinae. (RC. Au.)

℞. Herbae Sabinae drachmam unam.
Aquae bullientis . . uncias septem.

Infunde et cola. — Gabe, alle zwei
Stunden einen Löffel. — Rau rühmt es
bei sogenannten ästhenischen Entzündungen
des Uterus und der Blase.

RC. ut infusum baccharum Juniperi.

Infusum Baccarum Juniperi compositum.
(Sa.)

℞. Baccarum Juniperi contusarum
uncias duas.
Aquae Juniperi . . . libras duas.
Digere blando calore per horas tres,
cola et adde
Roob Juniperi . . . uncias duas.
Oxymellis scillitici sesquiunciam.
Misce. — *Harntreibend.*

Decoctum Juniperi. (Fi. Sa. Sw.)

℞. Summitatum Juniperi uncias tres.
Aquae . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum remanentiam et sub finem adde
Baccarum Juniperi unciam unam.
Cola. — *Reizend, harntreibend, bei Wasser sucht, Asthma und Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, vier bis acht Unzen täglich drei Mal.*

Decoctum Ligni Juniperi. (B*.)

℞. Ligni Juniperi raspati semunciam.
Aquae fontanae . . . uncias sedecim.
Decoque ad dimidium et cola. —
Reizend, ehemals bei der Behandlung venersischer Krankheiten gepriesen. — Der Kranke verbraucht täglich acht Unzen.

Decoctum Sabinae. (B*.)

℞. Herbae Sabinae . . . unciam unam.
Aquae bullientis . . . libram unam.
Decoque ad unciarum sex liquidi remanentiam, cola et adde
Syrupi cujuslibet . . . unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßlöffel.

Potus diureticus, Tisana diuretica. (Sm. Sw.)

℞. Baccarum Juniperi contusarum
manipulum unum.
Aquae semisextarios (semi-setiers)
tres.
Coque per horam dimidiam et colaturae adde
Syrupi Polygalae Virginicae
uncias duas.
Vini albi uncias octo.
Misce. (Sm.)
℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Sinapis,
singulorum unciam unam.
— Dauci . . . drachmas sex.
Foliorum Absinthii drachmas tres.
Cerevisiae . . . libras quatuor.

Infunde frigide et cola. (Sw.)

Decoctum Fructuum Juniperi carminativum, Potus carminativus. (His.)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Anisi,
Salis Ammoniaci,
singulorum unciam unam.
Florum Chamomillae uncias duas.
Aquae libras quatuor.
Coque leviter, cola et colaturae adde
Aquae Vitae libram unam.

Vinum juniperinum s. diureticum. (Au.)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Sinapis,
Armoraciae,
singulorum semunciam.
Kali subcarbonici . . . semilibram.
Vini Rhenani . . . octarios quatuor.
Post aliquot dies cola.

℞. Radicis Zedoariae,
— Scillae,
Baccarum Juniperi,
singularum drachmas duas.
Cinnamomi . . . drachmas tres.
Kali subcarbonici sesquidrachmam.
Vini Rhenani . . . sesquilibram.
Post sufficientem extractionem cola.

Unguentum Juniperi. (Vm.)

℞. Gemmarum Juniperi contusarum
partem unam.
Axungiae Porci fusae partes duas.
Macera per horas duas et cola fortiter exprimendo.

Ceratum Juniperi Virginicae. (Am. C.)

℞. Foliorum Juniperi Virginicae
partem unam.
Cerati resinosi . . . partes sex.
Misce.

J u s t i c i a .

Justicia pectoralis, L.; Zimmermanns-wundheilz; Carmantine pectorale, Herbe aux charpentiers (Gal.).

Gal.

℥. (Diandria Monogynia, L.; Acanthaceae, J.) Eine auf den Antillen wachsende Pflanze. (Jacq. Austr. III, t. 3.) Das Kraut, welches angewendet wird, besteht aus vier kantigen, knotigen, glatten Stängeln mit entgegengesetzten, linienlanzettförmigen, spitzigen, ganzen, glatten Blättern. Es ist schwach abstringirend.

K.

K a l m i a .

Kalmia latifolia, L.; großblättrige Kalmie; Kalmie à larges feuilles (Gal.); Montain laurel (Ang.).

C.

¶ (Decandria Monogynia, L.; Rhododaceae, J.) Eine Pflanze Carolina's und Virginien's. (Trew Ehret. t. 33. f. 1. Catesb. t. 98. Pluk. Alm. t. 379. f. 6. Wangerheim t. 24. f. 50.)

Die Blätter sind eirundlänglich, fest, glatt, ganz, zwei bis drei Zoll lang und einen Zoll breit.

Abstringirend.

Decoctum *Kalmiae latifoliae*. (B*.)℞. Foliorum *Kalmiae* unciam unam.

Aquaе fontanae . . . uncias octo.

Decoque ad dimidium et cola. —

Bei chronischem Durchfall empfohlen. — Gabe, sechzig Mal dreißig Tropfen, bis der Kranke Schwindel empfindet.

K i k e k u n e m a l o .

Resina *Kikekunemalo*.

℞. Wir. M. Sp.

Ein grünliches, halbdurchsichtiges, brüchiges Harz aus America, in dessen Bruch sich gelbe Körner zeigen, von angenehmem Geruch und etwas bitterem Geschmack.

Nach Guibourt ist es eine Art Anime. Nach Virey kommt es von *Bursea gummiifera*. Man gebraucht es jetzt nicht mehr.

K i n o .

Gummi Kino, *Gummi Gambiense*, *Gummi adstringens Fothergilli*; *Kinoharz*, *Kinogummi*, *Gambienfer Gummi*; *Kino*, *Gomme Kino*, *Gomme de Gambie* (Gal.); *Tumble hoau* (*Tam*); *Dummlackwayn*, *Kandamur garittum* (Tel.).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. G. M. Par. Sp. Z.

Man unterscheidet vorzüglich drei Arten Kino.

1) In unregelmäßigen, trocknen, brüchigen, dunkelbraunen, auf dem Bruche fast schwarzen und glänzenden, unbrüchigen, geruchlosen, abstringirend und etwas bitter schmeckenden Massen. Man hält es für die bis zur Trockenheit abgedunstete Abkochung der Zweige von *Naucllea longiflora*, Poir. (Pentandria Monogynia, L.; Rubiaceae,

J.), einem Strauche Indien's. (Rumph Amb. V. t. 34. f. 1.)

2) In sehr kleinen, glänzend schwarzen, undurchsichtigen, aber durchscheinenden, zu dünnen Blättchen zerkleinert, rubinrothen, geruchlosen, deutlich abstringirend schmeckenden Stücken. Es wird für das Product der Abkochung des Holzes von *Coccoloba uvifera* (Octandria Digynia, L.; Polygoneae, J.), einem Baume Jamaica's, gehalten.

3) In löcherigen, trüben, an manchen Stellen röthlichen, glänzenden, an andern schwarzen, geruchlosen Massen von abstringirendem Geschmack. Es scheint aus dem Stamme der *Eucalyptus resinifera*, Sm. (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, J.), einem Baume Neuholland's. (White Itin. 23.) zu fließen.

Es enthält viel Gerbestoff und Extractivstoff, doch kennt man seine Bestandtheile nicht genau. — Eisen-, Silber- und Bleisalze, so wie Gallerte dürfen nicht damit verbunden werden.

Kräftig abstringirend. — Gabe des Pulvers, zehn Gran bis eine halbe Drachme.

Pulvis Kino compositus s. stypticus s. Kino gummosus s. adstringens (Lon. LonN. RC. Au. C. Ca. T.)

℞. Kino . . . drachmas quindecim.
Cinnamomi . . . semunciam.
Opii . . . drachmam unam.
Gabe, ein Scrupel, bei innern Blutflüssen. (Lon. LonN. C. Ca.)

℞. Kino . . . semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Fiat pulvis. — Außerlich bei Blutungen. (Au.)

℞. Aluminis pulverati . . . uncias tres.
Liqua in crucibulo et adde per vices
Kino subtilissime pulverati . . . unciam unam.

Misce et pulvera. (T.) — Statt des Kino ebensoviel Drachenblut hinzugesetzt giebt das Pulvis aluminosus Helvetii L. p. 135.

• *Pilulae e Kino et Camphora*. (Au.)
℞. Kino scrupulos duos;
Camphorae sesquiscrupulum.
Pulveris aromatici scrupulum unum.

Zinci oxydati . . . scrupulum unum.
Fiant pilulae viginti. — Gabe, zwei Stück Morgens und Abends, bei Harnruhr.

Pilulae ad diarrhoeam s. anti diarrheicae. (E.)

℞. Kino grana viginti.
Opii grana duo.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.

Fiant pilulae quatuor. — Gabe, alle
Stunden ein Stüd.

Pilulae stimulantibus ad gonorrhoeam s.
adstringentes. (Sy.)

℞. Kino semunciam.

Balsami Canadensis . . . uncias duas.

Radicis Tormentillae
quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quinque.

Electuarium adstringens. (Sw.)

℞. Kino drachmas sex.

Aluminis,
Cinnamomi,

singulorum drachmas duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Bei Durchfall, chronischer Ruhr und Blut-
stößen. — Gabe, eine Drachme zwei oder
drei Mal täglich.

Potio adstringens. (ParC.)

℞. Rosarum provincialisium
drachmas duas.

Aquae bullientis . . . uncias quatuor.

Infunde per horas duas, cola et adde

Kino semidrachmam.

Aquae Rabelii . . . guttas viginti.

Syrupi Corticis Granati
unciam unam.

Injectio adstringens. (Sw. Sy.)

℞. Kino grana viginti ad triginta.

Aquae bullientis . . . libram unam.

Post unius horae infusionem cola.
(Sw.)

℞. Kino . . . drachmam unam ad duas.

Aluminis grana viginti ad triginta.

Aquae bullientis . . . libras duas.

Post unius horae digestionem cola.
(Sw.)

Bei chronischer Harnröhrentzündung.

Mixtura roborans. (Sw.)

℞. Kino drachmas duas.

Nitri drachmam unam.

Mucilaginis Gummi Arabici
uncias duas.

Electuarii adstringentis
drachmas duas.

Misce triturando et sensim addendo

Aceti sesquiunciam.

Aquae Cinnamomi . . . uncias sex.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Bei Mutterblutfluss. — Gabe, einen
oder zwei Eßffel, alle vier oder sechs Stun-
den.

Syrupus Kino. (Br*. T.)

℞. Kino pulverati grana
sexcenta nonaginta.

Aquae purae libras septem.

Sacchari albi libras duas.

Tritura per horae quadrantem in
mortario marmoreo pulverem cum
Aquae bullientis fere simul infusae li-
bris quatuor. Liquorem refrigeratum
filtra et colaturam reponere. Residuo
reliquas tres Aquae ad 60° calefactae
libras adde et utramque solutionem
commisce. Saccharo clarificato et ad
electuarii consistentiam cocto solutio-
nem adde et ad syrupi consistentiam
consume.

T. Kino purificati uncias duas, Aquae
tepidae libras tres; solutioni adde Sac-
chari libras quatuor.

Tinctura Kino. (Am. An. Br*. Bel. Du.
Ed. Fer. Ful. HassP. Li. Lon. LonN.
Lus. Sax. Br. C. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Kino uncias tres.

Alcoholis (0,930) . . . octarios duos.

Post dies quatuordecim filtra. (Am.
Lon. LonN. C.)

Du. Kino uncias tres, Alcoholis (0,930)

sesquioctarium; — Br*. et Ed. Kino un-

cias duas et Alcoholis (0,935) sesquili-

bram; — Fer. et Sw. Kino uncias duas,

Alcoholis (0,935) libram unam et octo

uncias Aquae Cinnamomi; — Bel. Kino

partem unam et octo Alcoholis (20°); —

Br. Kino partem unam et sedecim Al-

coholis (0,935); — Sax. Kino partem

unam et quinque Spiritus rectificati; —

Vm. Kino unam et sex Alcoholis; —

Lus. Kino uncias duas, Aquae Vitae

sesquilibram; — Ful. Kino drachmas

duas, Aquae Cinnamomi simplicis ses-

quiunciam et Aquae Cinnamomi vino-

sae semunciam; — Li. Kino uncias

duas, Aquae destillatae uncias sex et

Spiritus Nitri dulcis tantidem; — HassP.

Kino uncias duas, Spiritus Vini rectifi-

cati sedecim, sex dierum digestionem

calore 20 ad 24°; pondus tincturae fil-

tratae uncias quatuordecim aequet. —

T. Kino unciam unam, Alcoholis 25°

B. uncias sedecim, digere per dies duo-

decim vel quindecim; — Fi. Kino un-

cias novem, Alcoholis 24° libras tres,

macerata per dies quatuordecim filtra.

Abstringend — Gabe, eine halbe Unze.

RC. Kino sesquiunciam, Corticis Lau-

ri Cassiae unciam unam, Alcoholis di-

luti libram unam. — Gabe, eine bis

drei Drachmen.

L.

L a c.

Milch; Lait (Gal.); Milk (Ang.); Lebn (Ar.); Leche (His.); Dud (Hin.); Melk (Bel.); Latte (I.); Schir (Pe.); Khschira, Payas, Dughda (Sa.); Jaelk (Succ.). Ams. Ba. Bor4. Gal. GalM. Ham. Hass. HassP. His. Succ. Wir. A. G. Pid Sp. T.

Eine undurchsichtige, weiße, etwas fettige, und schwerere Flüssigkeit als Wasser, welche die Brustdrüsen weiblicher Säugthiere kurze Zeit nach der Geburt abzusondern anfangen. Sie hat einen süßen, angenehmen, mehr oder minder zuckerartigen Geschmack und einen eigenthümlichen Geruch, welcher sich in dem Maasse, wie sie erkaltet, verliert.

Man wendet drei Arten Milch an:

1) *Lac vaccinum s. bubulum*; Kuhmilch; Lait de vache (Gal.); Ellakerry (Cy.); Ghayka dud (Duk.); Gaicha dud (Mah.); Susu (Mal.); Gokschira (Sa.); Paschuin paal (Tam.); Au palu (Tel.).

2) *Lac caprinum*; Ziegenmilch; Lait de chevre (Gal.); Jlukirie (Cy.); Chaylie ka dud (Duk.); Leche de cabra (His.); Ajakschira (Sa.); Aatu paal, Velata paal (Tam.); May ka palu (Tel.).

3) *Lac asininum*; Eselmilch; Lait d'anesse (Gal.); Cotalukirie (Cy.); Gädika dud (Duk.); Ghadwa tscha dud (Mah.); Kharakhira (Sa.); Kalady paal (Tam.); Gadilay paala (Tel.).

Die beiden erstern sind einander sehr ähnlich; die letztere enthält weit mehr Rahm als sie.

Ueberläßt man die Milch sich selbst, so trennt sie sich nach einiger Zeit in drei Theile:

1) den Cremor; Milchrahm; Crème (Gal.); Graedda (Succ.);

2) das Caseum; Käse und

3) das Lac eburratum; Buttermilch; Sérum (Gal.); Dogh (Ar.); Schaatssh (Duk.); Mutha (Hin.); Takram, Dandabatam (Sa.); Moru (Tam.); Tsalla (Tel.).

Schlägt man den Rahm, so erhält man die Butter; Butyrum, Beurre (Gal.); Butter (Ang.); Manteca de vacca (His.); Boter (Bel.); Burro (I.); Smaer (Succ.).

A. Ams. B. Ba. Bel. Gal. Hass. His. Li. Pal. Sax. Succ. WW. G. Pid. Sp.

Eine fette und dicke Substanz, von weißer oder gelber Farbe, angenehmem Geschmack und etwas würzigem Geruch, welche, nach Chevreul, Käsestoff, Buttermilch, Elain, Stearin, einen färbenden

Stoff, etwas Buttersäure und ein Del enthält.

Der Käsestoff, welchen man in den Käseberlab findet, führt den Namen présure (Gal. Gen.). Er ist mit Essig-, Salz- und Buttersäure vermischt, welche die Wände dieses Magens absondern, wodurch er einen sauren Geruch bekommt.

Dampft man die Molken ab, so erhält man das

Saccharum Lactis; Milchzucker; Sucre de lait (Gal.); Milksugar (Ang.); Melksukker (D.); Melkzuiker (Bel.); Zuchero di latte (His. I.).

Ams. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. Fi. G. Pid. Sp. T. Vm.

Eine in weißen Parallelepipedon crystallisirende, halburchsichtige Substanz von etwas zuckerartigem, saßem und erdigem Geschmack.

Hydrogale. (Ra.)

R. Lactis vaccini . . uncias quatuor.
Aqueae Hordei . . . libras duas.

Pulvis pectoralis. (B.)

R. Sacchari Lactis . . unciam unam.
Gummi Arabici drachmas quinque.
Elaeosacchari Foeniculi . . . drachmas tres.

Potus Sacchari Lactis, Tisana pectoralis. (Au.)

R. Sacchari Lactis . . semunciam.
Aqueae bullientis . . libras duas.

L a c c a.

Unter diesem Namen sind zwei verschiedene Substanzen bekannt:

1) *Lacca, Gummi Laccae*; Κακκαρον?; Lack, Gummilack; Laque, Gomme Laque (Gal.); Lake (Ang.); Laak (Ar.); Kambalo (Ba.); Lakada (Cy.); Lacca (His. Lus.); Lak'h (Hin.); Balo (Ja.); Ambalu (Mal.); Leka (Pol.); Lakscha (Sa.); Lacka (Succ.); Komburruk (Tam.); Commolekka (Tel.).

Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. E. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. A. Be. Br. G. M. Pid. Sp. T.

Man unterscheidet zwei Sorten Lack.

1) *Lacca in ramulis s. ramis*; Stocklack, Stablack, Stangenlack; Laque en bâtons (Gal.); Sticlack (Ang.). Es ist mehr oder weniger dunkelroth, fast durchsichtig, ungleich, uneben, hart, zerreiblich,

und bildet eine einige Zoll lange, eine Linie dicke Rinde um ein kleines Stöckchen, um welches es jedoch selten ganz herumgeht. Auf seiner Oberfläche bemerkt man viele Köder, welche mit eben so viel eirunden, unregelmäßig neben einander liegenden Sellen zusammenhängen und aus denen ein weißer filziger Stoff hervorkommt.

2) *Lacca in granis*; Körnerlack; *Laque en grains (Gal.)*; *Seed Lac (Ang.)*; sind Stücke des vorigen, von ben Zweigen losgebrosen.

3) *Lacca in tabulis s. massis*; Schellack; *Laque en masses ou en pains (Gal.)*; *Lamplac, Shell lac (Ang.)*; in dünnen Plättchen oder Schuppen, welche durch Schmelzen des vorigen von Unreinigkeiten befreit worden sind.

Das Lack wird durch den Stich des Weibchens von *Coccus Lacca, Ker.*, *Coccus Ficus, L.*, eines halbflügeligen Insects *Indien's* (*Journ. compl. des Sc. méd. T. X. p. 20.*) in der Rinde vieler harziger Bäume hervorgebracht, unter denen man besonders unterscheidet: *Ficus religiosa, L.*, *Ficus indica, L.*, *Croton castanefolium, L.*, *Rhamnus Jujuba, L.*, *Mimosa cinerea, Willd.* und *Mimosa Corinda, Willd.* *Wiréy* hegt und wahrscheinlich mit Recht, *Katreille* entgegen, die Meinung, daß das Harz nicht von dem Insect selbst ausgearbeitet werde, sondern nur nach dem Stich desselben ausfließe, und daß nur die schöne purpurrothe Farbe desselben von dem Weibchen und den Eiern des Insects herrühre.

Es besteht, nach *Funk*, aus Harz, einem eigenthümlichen Stoffe, dem Lackstoff (*Laccinum, Lacc n (Gal.)*), welcher zwischen Wachs und Harz steht, und einem thierischen Farbestoff. *John* will auch eine eigenthümliche Säure, die *Laccsäure (Acidum laccicum, Acide laccique (Gal.)*), darin gefunden haben.

2) *Lacca coerulea, Lacca musica, Tornasolis coerulea, Laccae muscus, Laccmus*; blauer Lack, *Laccmus*; *Tournesol (Gal.)*; *Litmus (Ang.)*; *Lackmus (Bel.)*.

HassP. Fi. T.

Ein Farbestoff, von welchem man zwei Sorten im Handel unterscheidet:

1) *Laccmus* in Brodten oder Steinen, *Tournesol en-pains ou en pierre (Gal.)* (*A. Bel. Br. Du. G. M. Sp.*), in kleinen, geraden Parallelepipeden von blauer Farbe, welches man aus mehreren Flechtenarten bereitet, indem man sie pulvert, mit Weinhefenasche und Kalk mischt und mit Menschenharn gähren läßt.

2) *Laccmus* in Lappen; *Tournesol en drapeaux, Becotta, Nezetta (Gal.)*,

alte Lappen, welche mit dem Saft der Spigen von *Croton tinctorium, L.* (*Monoclea Monadelphia, L.*; *Euphorbiaceae, J.*), einer Pflanze (*Lob. Ic. 26.*) des südlichen Europa's, getränkt, dann getrocknet und dem Dunste eines Gemisches von Harn und ungelöschtem Kalk so lange ausgesetzt worden sind, bis sie eine bläuliche violette Farbe bekommen haben.

Tinctura aquosa Laccae s. Gummi Laccae aquosa. (*Bor4. Br. His. Pal. R. Sar. Sax. Wir. Sp. T.*)

R. *Laccae in granis pulveratae* partem unam.

Aluminis crudi partem dimidiam, Aquae destillatae partes octo. Coque ad dimidii remanentiam; post refrigerationem adde-

Aquae Rosarum rubrarum, — Salviae, singularum partes duas.

Filtra. (R. Sax.)

Fi. et T. Aquae destillatae partes sex, Aquae Rosarum et Salviae, singularum partes tres, caeterum ut antea.

R. *Laccae pulveratae unciam unam, Aluminis semunciam, Aquae Rosarum libras duas.*

Digere in vase tecto et liquorem rubro colore bene impraegnatum filtra. (His.)

R. *Laccae pulveratae unciam unam, Aluminis crudi sesquidrachmam, Aquae Salviae uncias tres. — Rosarum sesquiunciam.*

Coque et filtra. (Sp)

R. *Laccae electae unciam unam, Aluminis crudi pulverati drachmam unam.*

Aquae Salviae, — Rosarum, — Cochleariae, singularum uncias duas.

Coque lente et cola. (Sar.)

Br. Laccae unciam unam, Aluminis drachmas duas et Aquarum, singularum uncias duas; — Wir. Laccae unciam unam, Aluminis sesquidrachmam et Aquarum, singularum sesquiunciam.

R. *Laccae drachmas sex, Aluminis drachmas duas.*

Aquae Salviae, — Brunellae, — Cochleariae, singularum libram unam.

Stent in digestionem absque bullitione, donec liquor colore rubro bene sit impraegnatus et cola. Addere potes Caryophyllorum scrupulos duos. (Pal.)

Reizend, für antiscorbutisch gehalten. — In Waschungen und Gurgelwassern angewendet.

Tinctura Laccae alcoholica. (Ams. Ful. T. Vm.)

℞. Laccae in ramulis pulveratae partem unam.

Alcoholis partes sex.
Infunde per horas duodecim in balneo aquae et filtra. (Vm.)

Ams. Laccae partem unam, Alcoholis (0,884) octo et octo dies infusionis; — Ful. Laccae partem unam et Spiritus Cochleariae sedecim; — T. Laccae unciam unam, Alcoholis 36° libram unam; digere.

Bei Krankheiten im Munde und am Zahnfleisch von Schwäche, meist in Form von Gurgelwasser oder collutorium; sie scheint nur vermittelst des darin enthaltenen Alcohols zu wirken.

Tinctura Laccae alcoholica composita. (Ba. Fer. Lus. R. Sar. Suec. Wür.)

℞. Laccae pulveratae unciam unam.
Myrrhae electae uncias tres.
Spiritus Cochleariae sesquilibram.
Post aliquot dies digestionis cola. (R. Suec.)

Lus. Laccae unciam unam, Myrrhae drachmas tres, Spiritus libras duas et octo dies macerationis; — Fer. Laccae unciam unam, Myrrhae drachmas duas et Spiritus Cochleariae sesquilibram.

℞. Laccae pulveratae uncias duas.
Aluminis crudi pulverati sesquidrachmam.

— Spiritus Cochleariae libram unam.
Digere ex arena tepida et cola. (Sar.)

Wür. digerere jubet Laccae semunciam et Aluminis scrupulos duos in una libra Spiritus Cochleariae, donec liquor pulchrum acceperit rubrum colorem; — Lus. Laccae unciam unam, Myrrhae drachmas tres, Spiritus libras duas et octo dies digestionis; — Ba. Laccae partes quinque, Aluminis unam, Aquae triginta sex et Spiritus quinque.

Schwach reizend, in Waschungen, Gurgelwassern oder Collutorien, bei Mundgeschwüren, welche man von Aethnie herleitet. Die nach der zweiten Formel bereitete Tinctur ist wirksamer als die andere und adstringirend.

Tinctura Laccae kalica. (Bo. Ham. Hass. Fi. Ptd. T. Vm.)

℞. Laccae in granis unciam unam.
Myrrhae electae . . . semunciam.
Pulveratis infunde

Olei Tartari per deliquium semunciam.

In pastam redige, blando igne siccandam et massae pulveratae infunde Spiritus Cochleariae uncias sex.

Post tres aut quatuor dies digestionis filtra.

Fi. et T. Laccae pulveratae unciam unam, Kali subcarbonici drachmas duas; mixta in patina porcellanea per duos dies aëri stent exposita, quo facto infundantur Spiritus Cochleariae librae uni et digerantur etc. (Si loco Spiritus Cochleariae Alcoh. purum adhibetur *Tincturam Laccae spirituosam s. Alcholem cum Lacca habes Fi.*)

Boerhaave empfiehlt diese Tinctur innerlich bei Sicht und Rheumatismen, äußerlich bei scorbutischen Affectionen des Mundes und des Zahnfleisches. Er gab sie in Spanischem oder Madera-Wein. Das kohlensäuerliche Kali ist die Hauptursache ihrer Wirksamkeit.

Tinctura Laccae aluminata. (An. His. Sar. Wür.)

℞. Laccae pulveratae uncias duas.
Aluminis crudi pulverati sesquidrachmam.

Spiritus Cochleariae libram unam.
Digere in arena tepida et cola. (Sar.)

Wür. Laccae semunciam, Aluminis scrupulos duos et Spiritus libram unam; — An. Laccae unciam unam, Aluminis drachmas duas et Spiritus libram unam.

℞. Laccae purae contusae unciam unam.

Aluminis in Aqua dissoluti sesquidrachmam.

Spiritus Cochleariae aut Lepidii uncias octo.

Digere donec liquor bene ruber sit factus et filtra. (His.)

Ebenso gebraucht wie die einfache Tinctur, außerdem ist sie etwas abstringirend.

Tinctura Laccae coeruleae. (Fi. T.)

℞. Laccae in panibus quantum libet.
Alcoholis diluti 20° B.

quantum sufficit.

Digere, subinde agitando per dies aliquot, decantha per ohartam etc.

Die *Tinctura Laccae coeruleae aquosa*, welche mit Wasser vermittelst Maceration bereitet wird

℞. Laccae pulveratae drachmam unam.

Aquae destillatae bulliantis sesquiniunciam.

Solutionem filtra. (Fi.)
bekommt zwar eine intensiver blaue Farbe, ist aber leichter der Verfärbung und dem Verderben unterworfen. (T.)

Charta exploratoria coerulea. (Bor4. T.)

Laccae muscus in pulverem tritus quatuor Aquae partibus infundatur et per viginti quatuor horas reponatur, vas subinde agitando, Liquore filtrato

illinantur segmenta chartae albissimae expansa, quae siccata in vasis bene clausis loco umbroso serventur. (Bor4.)

T. ut chartam exploratoriam aurantium parari jubet I. p. 596.

Charta exploratoria rubefacta s. rubra. (Bor4. HassP. T.)

Charta exploratoria coerulea aceto destillato aut acido muriatico valde diluto rubro inficiatur colore, tum siccatur et servetur. (Bor4. T.)

HassP. Acidum Aceti vel Phosphori adhibet.

Lacryma Iob.

Coix Lacryma, L.; Jiobsthränen; Larme de Iob (Gal.).

Wir. Sp.

⊙ (Monoecia Triandria, L.; Gramineae, J.) Eine ostindische Pflanze. (Rumph Amb. 5. t. 75 f. 2.)

Man wendet den Saamen (semen Lacrymae Iob s. Lithagrostis) an; er ist bläulichweiß, glänzend, sehr hart, eiförmig und am Ende etwas spitzig.

Er galt ehemals als harntreibend.

Lactuca.

Man wendet in der Medicin drei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Lactuca sativa*, L.; Lattich, Gartensalat; Lattuo coltivée (Gal.); Gärtenlettuce (Ang.); Salat, Locyka (B.); Laktuk (D. R. Suec.); Leschuga (His.); Gewoone salade, Lataw (Bel.); Lattuca (I.); Loczyga (Pol.); Leituga (Lus.).

Br. Ed. Fer. Gal. GalM. His. LonN. Wir. Hc. Br. C. G. M. Sp. Z.

⊙ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, Cass.) Eine in Gärten gebaute Pflanze, wo sie viele Varietäten hervorbringt. (Blackw. t. 88. Plenck t. 594. Hayne VII. 30. Fl. méd. IV. 213.)

Man wendet das Kraut und die Saamen an.

Das Kraut herba Lactucae besteht aus länglichen, eiförmigen, welligen Blättern von süßlichem, wässerigen Geschmack.

Die Saamen sind länglich, platt, an beiden Enden spitzig und grau.

2) *Lactuca Scariola*, L.; wilder Lattich, Wildlattich, Beberdistel, wilder Salat; Laitue sauvage (Gal.).

A. Am. Fer. Gal. Li. Wir. Fi. G.

⊙ ober J. Eine in Europa wachsende Pflanze. (Hayne I. 46. Zorn Ic. pl. t. 294.)

Man wendet das Kraut (herba Lactucae sylvestris s. Scariolae) an; es besteht aus abwechselnden, sitzenden, umfassenden, länglichen, am Grunde spießförmigen, oben spitzigen, meist fiederförmigen, am Rande mit einigen dornigen Zähnen

versehene, glatten Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern Geschmack.

3) *Lactuca virosa*, L.; giftiger Lattich, stinkender Lattich, Giftlattich; Laitue vireuse (Gal.); Strong scented lettuce, Hemlock lettuce (Ang.); Locyka lesni neb plana (B.); Stinkende Laktuk (D.); Stinkende salade (Bel.); Salata jadownita, locyga dzika (Pol.); Alsace brava (Lus.).

An. Ba. Bor4. Br. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Pol. R. Sax. Wir. Wür. Br. C. G. M. Sp. Z.

⊙ ober J. Eine Europäische Pflanze (Schk. t. 217. Düss. off. Pfl. IV. t. 22. Hayne I. 47. Zorn Ic. pl. t. 235. Bert. Bld. V. 38. f. 2.)

Man wendet das Kraut (herba Lactucae virosae s. Intybi angusti) an; es besteht aus abwechselnden, sitzenden, umfassenden, langen, eingeschnittenen, an der Spitze stumpfen Blättern, von denen die unteren buchtig und gezähnt sind. Es hat einen widerlichen Geruch und einen scharfen und sehr bitteren Geschmack.

Der Gartensalat wird als beruhigend betrachtet, wirkt aber ohne Zweifel nur erweichend. — Gabe des Safts, eine halbe bis zwei Unzen. Der Giftlattich ist außerordentlich stark reizend, wirkt auf das Nervensystem und vermehrt die Urinaufseherung.

Extractum Lactucae virosae. (A. An. Bel. Bor4. Ed. Ful. Han. Hass. HassP. Li. R. Wir. Wür. Br. Sw. Vm.)

℞. Foliorum Lactucae virosae quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, Aquae paucillim adspargendo, exprime succum et illum statim in aquae balneo, agitando continuè sub finem spatulae ope, consume. (Ed. Ful. Ham. Li. R. Wür. Br.)

Sw. contundere jubet Foliorum libras decem, Aquae libras sex affundendo, succum exprimere et illum semel ebullitum vaporando consumere; — HassP. ut extractum Aconiti, Belladonnae etc.; — Bor4. ut extractum Aconiti.

℞. Herbae Lactucae virosae libram unam.

Contunde in mortario marmoreo et exprime succum; residuum per horam coque cum Aquae libris tribus; cola exprimendo, et succo cum decocto mixto totum simul inspissa. (Hass.)

℞. Herbae recentis Lactucae virosae quantum vis.

Exprime succum, qui in loco, ne fermentet, frigidè servetur; decantha, coque per aliquot momenta et per pan-

num cola, albumine clarificatum iterum cola, dimidium deinde blando igne consume; refrigeratum et iterum albumine clarificatum atque colatum ad extracti consistentiam vaporando redige. (Wir.)

℞. Foliorum Lactucæ virosæ

quantum vis
Contunde cum Aquæ pauxillo et per pannum cola; repone, decantha, super igne coagulatum denuo cola; tum ad massæ pilularis consistentiam evaporatum ab igne remove et addita faecula antea seposita, denuo ad consistentiam aptam vaporando consume. (An. Vm.)

℞. Foliorum recentium Lactucæ virosæ . . . quantum vis.

Contunde in mortario et exprime succum qui in tantum evaporet ut Pulveris Herbae siccae Lactucæ pars quarta sufficiat ad consistentiam extracti ei præbendam. (Bel.)

℞. Foliorum Lactucæ virosæ

quantum vis.
Aquæ . . . quantum sufficit.
Herba pluribus sequentibus bullitionibus perfecte extracta, liquores mixti et decanthati in balneo aquæ evaporant. (A.)

T. ut extractum Cicutæ l. p. 516. præterea autem ut Bel. vel succum expressum, balnei aquæ vel vaporis ope aliquanto condensatum et per manicam laneam filtratum ad mellis consistentiam evaporare, et ab igne remotum, faecula addita, ad extracti vel massæ pilularis consistentiam redigere. Gabe, vier bis zwölff Gran und mehr.

Extractum Lactucæ sativæ. (LonN. T.)

℞. Foliorum recentium Lactucæ libram unam.

Contunde in mortario lapideo, insperso ex quo Aquæ; dein exprime succum, eumque non defaecatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat. (LonN.)

T. Succum expressum et cum Aquæ copia modica dilutum albuminis et caloris ope clarificare, filtrare et vaporando ad extracti consistentiam inspissare.

Aqua Lactucæ sativæ. (Gal. Sar. Fi)

℞. Herbae Lactucæ recentis

partem unam.
Aquæ . . . partes duas.
Destillent partes duæ. (Sar.)

Fi. Lactucæ recentis libram unam, Aquæ communis libras decem; destillent libras sex; — Gal. Lactucæ capitatae partes quinquies mille, Aquæ

duodecies mille et quingentas; destillare partes decies mille, productum in novam Lactucæ recentis quantitatem refundere, Aquæ partes decies mille admiscendo, partes decies mille destillando elicere et tertio hoc repetere. Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Pediluvium sedativum. (B*.)

℞. Lactucæ plantas integras

no. 8. aut 10.
quantum sufficit.
Aquæ . . .
Stent parumper in infusione, tum coquantur. — Nicht durchgeseiht anzuwenden.

Tinctura s. Essentia Lactucæ virosæ. (B* Sax.)

℞. Succo Lactucæ virosæ recens expressi,

Alcoholis concentrati,
singulorum partes aequales.
Macera frigide per aliquot dies et filtra. (Sax.)

℞. Herbae Lactucæ virosæ

unciam unam.
Cinnamomi . drachmam unam.
Alcohol s. concentrati,

Aquæ destillatae,
singulorum uncias quatuor.
Post aliquot dies digestionis cola exprimendo et filtra. (B*.)

Reizend, bei Wasserflüchten empfohlen. — Narcotisch. — Gabe, fünfzehn Tropfen und mehr, allmählig gestiegen.

Lactucarium.

Lactucarium; ὀπώραξ; θηράκειον (Gal.); Lettuce opium (Ang.).

Am. B*. Ed. C. Sp.
Eine dunkelbräune, harte, brüchige Substanz von etwas betäubendem Geruch und einem sehr merklich bittern Geschmack.

Es ist der getrocknete Milchsaft, welchen man dadurch erhält, daß man die Stängel von *Lactuca sativa*, L., in horizontale Scheiben zerschneidet. Auch quillt er aus in die Epidermis gemachten Stichen bis zum Reifen des Saamens ununterbrochen aus. Ueber *Lactucarium* und dessen Gewinnung s. Berl. Jahrb. XX. S. 196. Buchner's Repert. XV. 2. S. 273 und XXV. S. 104. Taschenb. 1823. S. 24.

Nach Caventou enthält das *Lactucarium* kein Morphin, sondern Pepselsäure und Kalk.

Man hält es für Schlaf bewirkend ohne narcotische Nebenwirkung und für ein Verminderungsmittel der Häufigkeit des Pulses und der tierischen Wärme. — Gabe, zwei bis vier Gran und mehr allmählig.

Tinctura Lactucarii. (B* C.)

℞. Lactucarii . . . unciam unam.

Aquae Vitae . . . octarium unum.
Post sufficientem digestionem filtra.
— Gabe, zehn bis sechzig Tropfen.

Syrupus de Thridace. (GalF.)

℞. Succis recentis stiptum Lactucæ,
in tempore florescentiæ foliis pri-
vatarum . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Solve frigide et filtra.

Pilulae torpentes ac resolventes. (B.)

℞. Lactucarii . . . grana duodecim.
Roob Sambuci,
Extracti Liquiritiæ,
singulorum quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, ein
Stück alle drei Stunden, bei hartnäckigem
Husten ohne Auswurf und bei sogenannten
activen Wasserhusten.

Potio nutriens et sedans s. sedativa. (B.)

℞. Lichenis Islandici . . . uncias duas.
Aquae fontanae quantum sufficit
ut decocti unciae octo obtineantur;
colaturae adde
Lactucarii . . . semidrachmam.
Mucilaginis Gummi Arabici
semunciam.
Syrupi Sacchari . . . unciam unam.
Mäßig zu nehmen, bei hartnäckigem
Husten und knotiger Lungenfucht.

L a d a n u m.

Gummi Ladanium; Λαδανον; Labda-
num; Ladanium; Labdanum (Gal.); La-
dan (Ar.); Ladano (His.).

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Gal. Gen.
His. Lus. Wir. Wür. A. Be. Br. G. M.
Sp. T. Z.

Man unterscheidet von diesem Harz zwei
Sorten:

1) *Ladanium in massis;* Labdanum in
Broden, Ladanium en masses (Gal.),
in weichen, schlüpfrigen, bei'm Druck jede
Form annehmenden, schwarzlichrothen oder
schwarzen Massen.

2) *Ladanium in tortis;* Labdanum in
Stücken; Ladanium en bâtons (Gal.), in
walzigen, platten, schraubenförmig gebre-
ten, trocknen, harten, brüchigen, schwarz-
lichgrauen Stücken.

Der Geruch ist angenehm, der Geschmack
schwach, aber balsamisch und etwas bitter.

Dieses Harz schmeckt von selbst aus den
Blättern und Zweigen von *Cistus Creticus*,
L., einem Strauch (Polyandria Mono-
gynia, L.; Cisteae, J.) des Archipels.
(Fl. méd. IV. 212.)

Reizend, aber wenig in Gebrauch.

Emplastrum Ladani s. stomachicum.

(Ams. Lon. Lus. Br. C. Sw. T.
Vm.)

℞. Ladani uncias tres.
Olibani unciam unam.
Liquatis blando calore adde
Olei Nucis Moschatae expressi,
Balsami Peruviani,
Cinnamomi pulverati,
singulorum semunciam.

Misce. (Lus.)

Br. et Sw. Olibani unciam unam,
Ladani tres, Olei Nucis moschatae
semunciam, Cinnamomi tantidem et
Olei Menthae viridis essentialis drach-
mam unam; — C. Ladani uncias
tres, Resinae Pini unciam unam, Olei
Nucis moschatae sesquunciam, Cin-
namomi tantidem et Olei Menthae
drachmam unam.

℞. Emplastri communis,

— Cumin,

singulorum libram unam.

Colophonii semilibram.

Styracis semunciam.

Liquatis igne blando adde

Ladani pulverati . . . uncias duas.

Misce bene. (Amé.)

℞. Ceræ flavae partes sex.

Sebj vervecini,

Colophonii,

singulorum partes quatuor.

Elemi

partem unam.

Liquata macera cum

Seminum Cumini,

Baccarum Lauri,

Florum Meliloti,

singulorum partibus duabus.

Liquorem calidum cola et adde

Emplastri Lithargyri fusi

partes triginta sex.

Gummi Ammoniaci partem unam.

Ladani partes quatuor.

Misce. (Vm.)

℞. Ladani,

Masticis, singulorum semunciam.

Benzoës,

Caryophyllorum,

Nucis moschatae,

singulorum drachmas duas.

Tacamahacæ . . . uncias quatuor.

Pulverata et mixta sparge supra Ce-
ræ flavae uncias tres, Terebinthinæ
uncias duas, singulas fusas; massæ
concresecere coeptæ admisce

Storacis Calamita

unciam dimidiam.

Opii drachmam unam

in Vino albo dissoluta et ad mellis con-
sistentiam redacta; adde, quum empla-
strum consistantiam butyraceam acce-
perit, Olei Menthae, Juniperi et Absin-
thii singulorum guttas aliquot.

L a m i u m.

Lamium album, L.; weißer Bienen-saug, weiße Todtennessel; Ortie blanche (*Gal.*); White dead-nettle (*Ang.*); Hlucha, Mrtwa, Smzadlawa, Kopriwa (*B.*); Daednelde (*D.*); Ortiga maerta (*His.*); Pokozywa martiva (*Pol.*); Ortiga morta (*Lus.*); Blind nesla (*Suec.*).
An. Br. Gal. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. M. Sp. Z.*

2) (*Didynamia Gymnospermia, L.*; *Labiatae, J.*) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Bull. t. 213. Blackw. t. 33. Hayne V. 41. Zorn Ic. pl. t. 30.*)
Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (*herba Lamii albi s. Galeopsidis s. Urticae mortuae*) besteht aus einem saft glatten oder nur wenig behaarten Stängel und herzförmigen, gestielten, spitzigen, spitzig gezähnten Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen styptischen Geschmack.

Die Blüthen, von welchen man nur die Kronen nimmt, sind weiß und haben einen unangenehmen Geruch und einen süßlichen Geschmack. Sie sind erweichend.

L a p i s n e p h r e t i c u s.

Nephræticus lapis; Griesstein; Pierre néphrétique, Jade néphrite ou oriental (*Gal.*); Piedra cananor, Piedra nefritica (*His.*).

His. Wir. Sp.

Ein grüner Stein von fettigem Ansehen. Ehedem gebrauchte man ihn als Amulet und Schutzmittel gegen Epilepsie.

L a s e r p i t i u m.

Die Pharmacopöden führen zwei Arten dieser Gattung an:

1) *Laserpitium latifolium, L.*; Firschnurzel, weißer Engian; Laser à larges feuilles, Gentiane blanche (*Gal.*); Broad leav'd lasserwort (*Ang.*).

Br. Gal. Wir. Be. M. Sp.

2) (*Pentandria Digynia, L.*; *Umbelliferae, J.*) Eine Europäische Pflanze. *Jacq. Fl. Austr. t. 146. Schk. t. 67.*

Man wendet die Wurzel (*radix Gentianae albae*) an; sie ist sehr lang, rund, außen gelblichbraun, innen gelblichweiß. Sie hat einen gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, scharfen und etwas bitteren Geschmack.

Tonisch, reizend.

2) *Laserpitium Siler, L.*; roßkümme-artiges Kaserkraut; Laser sermountain (*Gal.*); Mountain lasserwort (*Ang.*);

Eselskomin (Bel.); Laserpicio siler no (Lus.).

Br. Gal. Wir. Wür. Be. M. Sp.
2) Eine Alpenpflanze. (*Jacq. Fl. Austr. t. 145. Hayne VII. 7.*)

Man wendet den Saamen (*semen Sileris montani*) an; er ist länglich, platt, gefurcht und sehr schmalgestülgt. Er hat einen angenehmen gewürzhaften Geruch und einen scharfen, gewürzhaften und bitteren Geschmack.

Tonisch, reizend.

L a u r u s.

Laurus nobilis, L.; Lorbeerbaum; Laurier commun (*Gal.*); Common sweet bay, Lauretree (*Ang.*); Bob (*B.*); Laurbaertrae (*D.*); Laurel (*His.*); Laurierboom (*Bel.*); Lauro riccio, Alloro, Meloro (*I.*); Bobek drzewo (*Pol.*); Loureiro (*Lus.*); Lagerbaerstraed (*Suec.*).
A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonV. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

Ein Baum (*Enneandria Monogynia, L.*; *Laurineae, J.*), welcher ursprünglich in der Levante zu Hause, im südlichen Europa naturalisirt ist. (*Blackw. t. 175. Plenck t. 315. Schk. t. 310. Dict. d. Sc. nat. Cah. IV. Zorn Ic. pl. t. 52.*)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (*folia Lauri*) sind glatt, hart, ledrig, an den Rändern etwas wellenförmig, vier bis fünf Zoll lang, und haben, wenn man sie reibt einen starken, gewürzhaften Geruch und einen brennenden, gewürzhaften Geschmack.

Die Früchte oder Beeren (*baccæ Lauri*) sind klein, eiförmig, fast so groß wie Rischchen, frisch dunkelblau, getrocknet schwarzlich und runzlig und enthalten, unter einer dünnen brüchigen Schale gelbe oder gelblichbraune Saamen. Sie haben einen gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen etwas bitteren, scharfen und gewürzhaften Geschmack.

Man wendet die Blätter eher als Gewürz denn als Arzneimittel an. Uebrigens sind sie nicht minder reizend, als die Beeren.

Pulvis Lauri carbonicus s. stimulans. (Au.)

R. Baccarum Lauri . . uncias sex. Nucis mo-chatae, Cornu Cervi calcinati, singulorum uncias (?) sex. Liquiritiae uncias triginta sex. Gabe, ein Kaffeelöffel, bei Rhachitis.

Oleum laurinum s. Baccarum Lauri s. Lauri expressum. (A. Bor. Bor4. Br. Ful. Gal. Hass. HassP. His. Lus. Pal. Sar. Wir. Sw. T.).

℞. Baccarum Lauri . quantum vis. Contusas lente in mortario, tere supra lapidem calefactum et exprime. (His.)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis. Contusas in mortario et supra lapidem calefactum tritas coque cum Aqua et post refrigerationem, oleum superficiei inhaerens, collige. (A. Br. Gal. Hass. Lus. Pal. Sar. Suec. Wir.)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis. Contusis in mortario, pastam in sacco e tela confecto inclusam vaporis Aquae bullientis expose et deinde prelo calefacto submitte. (Sw.)

T. Baccas cum Aquae quantitate modica in pastam redigere et hanc sacco e tela confecto inclusam prelo subijcere.

Bor. Bor4. Hass. HassP. O. Pol. et Vm oleum veniale praescribunt.

Reizend, auflösend, bildungtreibend, stärkend, nervenstärkend, bei Krankheiten des Uterus, Krämpfen, Koliken, Würmern bei Kindern, Schmerzen und Schwäche der Gehör-, Ohrenschmerzen.

Enema carminativum. (Li.)

℞. Florum Chamomillae semunciam. Aquae communis libram unam. Coque parumper, cola et adde colaturae

Olei Baccarum Lauri semunciam.

Linimentum aethereum. (Au.)

℞. Aetheris sulphurici drachmas duas. Alcoholis . . . uncias duas. Olei Baccarum Lauri semunciam. In Einreibungen auf Brüste, besonders Stabelbrüche bei Kindern.

Unguentum s. Pomatum laurinum, Oleum laurinum infusum. (Gal. Sar. Fi. Vm.)

℞. Foliorum Lauri . partem unam. Axungiae . . . partes duas. Contunde et coque lente ad consumptionem humidi usque, sub finem addendo

Baccarum Lauri contusarum partem unam.

Post horas decem digestionis in balneo aquae, cola et exprime. (Gal.)

Sar. Digerere per tres dies jubet in balneo aquae Foliorum Lauri recentium concisorum libras tres in Olei Olivarum libris sex, colare fortiter exprimendo et colaturam novae per tres dies digestionis subijcere cum Foliorum et Baccarum Lauri, singulorum sequi-

libra; — *Fi. Axungiae Porci* libras decem, Foliorum Lauri libras duas cum dimidia; per tres dies in infusione calida relictas cola fortiter exprimendo, adde Baccarum contusarum libras decem, infunde itidem per dies tres et cola; post refrigerationem partem aequam liquefac lentissimo calore etc.; — T. Foliorum libras tres, Axungiae libras sex, Baccarum tres, digestionem 24 horarum.

℞. Foliorum recentium Lauri, Olei Amygdalarum dulcium, singulorum partem unam. Baccarum Lauri recentium contusarum . . . partes quatuor. Axungiae Porci . . . partes octo. Folia et deinde baccas contusa coque lente cum axungia per horas duodecim, cola et refrigeratis sedimentum exime; quod restat liqua aut ab initio Aqua calida lava, donec haec clara transeat. (Vm.)

Jeromel Foliorum siccorum et contusorum unciis tribus infundere jubet Axungiae Porci recentis libram unam, vas per horas duodecim eadem caloris vi exponere, colare et axungiam liquare in Olei Baccarum Lauri expressi libra una. Reizend, stärkend.

Unguentum nervinum s. laurinum s. aromaticum s. Rorismarini compositum. (A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. Br. Fi. Pid. Sp. Sw. Vm.)

℞. Herbae Salviae,
— Chamaepityos,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Menthae,
— Lavandulae,
— Hyperici,
— et Florum Primulae veris,

Florum Chamomillae,
— Meliloti,
Summitatum Anethi,
Radicis Pyrethri,
singulorum drachmas duas.

Baccarum Lauri,
— Juniperi,
singulorum unciam unam.

Mastichis semunciam.
Benzoës drachmas sex.
Terebinthinae . . . uncias quatuor.
Olei Lumbri corum,

— Anethi,
— Hyperici,
Adipis vulpinae,
singulorum uncias tres
— humanae,

Adipis Felis Cati veri,
 — caninae,
 singularum sesquiuunciam.
 Terebinthinae Venetae
 unciam unam.

Coque et cola. (Pal.)

℞. Herbae Salviae,
 — Chamaepityos,
 — Majoranae,
 — Rorismarini,
 — Menthae,
 — Rutae,
 — Lavandulae,
 — Hyperici,
 — et Florum Primulae veris,
 Florum Chamomillae,
 — Meliloti,
 — Hyperici,
 Summitatum Anethi,
 Baccarum Lauri,
 — Juniperi,
 singularum drachmas sex.
 Olei Olivarum . . . libram unam.
 Macera per aliquot dies, tum coque
 lente ad humidum usque consumptionem,
 cola et colaturae adde
 Terebinthinae Venetae unciam duas.
 Cerae flavae
 unciam quatuor cum dimidia.
 Olei Terebinthinae unciam unam.
 — Lumbricorum,
 — Lauri,
 singularum unciam duas.
 Benzoës' in Alcoholis concentrati
 unciis tribus solutae unciam unam.
 Fiat unguentum. (Br. Wir.)

℞. Radicis Pyrethri,
 Foliorum recentium Anethi,
 — Lauri,
 — Majoranae,
 — Menthae crispae,
 — Rorismarini,
 — Salviae,
 Florum recentium Chamomillae,
 — Lavandulae,
 — Meliloti,
 — Hyperici,
 singularum partes quatuor.
 Benzoës,
 Mastichis, singularum partes sex.
 Baccarum Lauri,
 — Juniperi,
 singularum partes octo.
 Axungiae,
 Terebinthinae,
 singularum partes sedecim.
 Cerae albae partes quadraginta tres.
 Olei Olivarum
 partes nonaginta sex.
 Contunde folia, baccas, flores et ra-
 dicem cum oleo et axungia, macera in
 vase clauso, calore modico per horas
 quatuor, cola et cum Aqua tepida ab-

lue, adde mastichem et benzoën cum
 terebinthina calefactas, cola et ceram
 fusam admisce, cola absque expressi-
 one et agita donec refrigerint. (Vm.)

℞. Herbae Rutae recentis,
 Summitatum florescentiam Salviae,
 — Majoranae,
 — Rorismarini,
 — Menthae,
 — Chamaepityos,
 — Verbasci,
 — Lavandulae,
 — Hyperici,
 — Chamomillae,
 — Meliloti,
 singularum unciam duas.
 Foliorum Lauri,
 — Juniperi,
 singularum unciam unam.
 Olei Lumbricorum . . . libras tres.
 Macera per dies duos, tunc coque,
 donec humidum omne evanuerit, cola
 et colaturae adde
 Cerae flavae . . . unciam novem.
 Massae semirefrigeratae denuo adde
 Olei Cerae,
 — Terebinthinae,
 singularum unciam duas.
 Unguenti Althaeae unciam quatuor.
 Misce bene. (His.)

℞. Herbae Rorismarini unciam duas.
 — Rutae,
 — Majoranae,
 — Menthae crispae,
 Florum Meliloti,
 — Lavandulae,
 — Chamomillae,
 Baccarum Lauri,
 singularum unciam unam.
 Axungiae Porci . . . libram unam.
 Sebi vervecini . . . semilibram.
 Coque lente ad humidum usque consumptio-
 nem usque et in colatura liqua
 Cerae flavae,
 Terebinthinae,
 singularum unciam duas.
 Olei Lauri . . . unciam quatuor.
 Fiat unguentum. (D.)

℞. Summitatum siccatarum Rorisma-
 rini,
 — Salviae,
 — Lavandulae,
 — recentium Rutae,
 singularum unciam unam.
 Adipis suilli . . . libram unam.
 — vervecini unciam quatuor.
 Olei Lauri . . . unciam octo.
 — Terebinthinae sesquiuunciam.
 Prioribus sex lento calore balnei
 aquae per quadriduum maceratis et ex-
 pressis olea adde. (Fi.)

℞. Herbae Rorismarini,
 — Salviae,

Herbae Lavandulae,

— Rutae,

singularum manipulum unum.

Baccarum Lauri recentium

uncias tres.

Axungiae Porci . libram unam.

Sebi vervecini . uncias quatuor.

Stent per dies quatuor in balneo aquae; coque deinde exprimendo et colaturae adde

Olei Baccarum Lauri uncias octo.

Misce. (Br.) — *Unguentum aromaticum.***R. Herbae recentis Rorismarini**

libram unam.

— — Majoranae,

— — Rutae,

singularum semilibram.

Baccarum Lauri,**Radicis Pyrethri, singularum un-****cias quatuor. (tres Bor4.)**

Axungiae Porci . libras quatuor.

Sebi vervecini . . . libras duas.

Coque ad consumptionem humidam, exprime et adde colaturae

Cerae flavae liquatae semilibram.

Olei Rorismarini,

— Baccarum Juniperi,

singularum uncias tres.

Misce. (B. Bor. Bor4. Han. O. Sax.)

R. Florum Rorismarini,**Foliorum Populi balsamiferae,**

singularum uncias quatuor.

Axungiae Porci . . . libras duas.

Digere per dies quatuordecim, cola et post refrigerationem adde

Aquae destillatae Lavandulae,

— Chamomillae,

— Rutae,

singularum semunciam.

Misce. (Hass.)

R. Foliorum Populi balsamiferae

uncias octo.

Axungiae Porci calidae libras duas.

Post dies quatuordecim cola et adde

Olei Succini,

— Chamomillae,

singularum semunciam.

— Rutae,

— Menthae,

singularum drachmas duas.

Misce. (Pid.)

R. Baccarum recentium Lauri

uncias octo.

Foliorum recentium Lauri

uncias duas.

Contunde et cineribus imposita macera in

Axungiae Porci . uncias sedecim.

Post horas viginti quatuor exprime,

Aqua tepida lota liqua et repone. (Sw.)

R. Sebi vervecini . . partes octo.

Liqua et ab igne remotis et semirefrigeratis adde, agitando bene

Olei Lauri . . partes duodecim.

— Terebinthinae partem unam.

— Succini rectificati

partem dimidiam

— Menthae piperitae,

— Rorismarini,

— Juniperi,

singularum partis octantem.

Misce sedulo. (Sax.) — *Unguentum aromaticum.***R. Axungiae Porci . libras quatuor.****Sebi vervecini . . . libras duas.****Cerae flavae . . . semilibram.**

Mixturae liquatae et semirefrigeratae adde

Olei Lauri uncias duas.

— Rorismarini,

— Baccarum Juniperi,

singularum uncias tres.

Mixta serva (Pol)

R. Axungiae Porci . unciam unam.**Olei Lauri semunciam.**

— Rorismarini,

— Ammoniacy liquidi,

singularum sesquidrachmam.

Misce. (WW.)

R. Sebi cervini uncias sex!

Liquatis adde

Olei Lauri uncias sex.

— Terebinthinae unciam unam.

— Succini rectificati,

— Salis Ammoniacy,

singularum semunciam.

Misce exacte. (Li.)

R. Axungiae Porci uncias tres.**Sebi cervini unciam unam.**

Liquatis lente, adde

Olei Lauri unciam unam.

— Succini semunciam.

— Menthae crispae

drachmas duas.

Tere ad refrigerationem usque. (Ful)

R. Sebi vervecini uncias octo.**Olei Lauri uncias decem.**

Lente liquatis et semirefrigeratis adde

Essentiae Terebinthinae

unciam unam.

Olei Succini depurati semunciam.

Misce. (An. Bel. Succ. Sp. Vm.)

R. Sebi vervecini uncias octo.

Liquatis adde

Olei Baccarum Lauri libram unam.

Essentiae Terebinthinae

sesquiunciam.

Misce bene. (Lus.)

R. Sebi vervecini uncias octo.

Massae liquatae adde

Olei Lauri libram unam.

— Terebinthinae unciam unam.

— Petrae semunciam.

Tere ad refrigerationem usque. (B. R.)

Ans. Sebi uncias octo, Olei Lauri libram unam, Essentiae Terebinthinae unciam unam et Olei Cajeput semunciam.

℞. Unguenti simplicis
libras duas et dimidiam.

Olei Lauri,
Cerae flavae,

singulorum uncias tres.

Mixturae liquatae et semirefrigeratae adde

Olei essentialis Juniperi,

— Serpylli,

singulorum drachmas duas.

Misce. (A.) — *Unguentum aromaticum.*

Diese Salbe, welche äußerlich als stärkend, auflösend und schmelzend angewendet wird, unterscheidet sich fast nur durch den Namen von der vorhergehenden und den folgenden.

Unguentum carminativum. (Ful. Pal.)

℞. Baccharum Lauri . . . semunciam.

Foliorum recentium Chamomillae

manipulos duos.

Meliloti,

Summitatum recentium Abrotani,

— Hederae

terrestris,

— Menthae

crispae,

— Tanacetii,

singularum manipulum unum.

Seminum Cumini,

— Levistici.

singulorum drachmas duas.

Olei Chamomillae . libram unam.

— Anethi,

— Rutae,

singulorum semunciam.

Post dierum quatuordecim macerationem, coque leviter, donec humidum disparuerit et colaturae adde

Cerae flavae . . . uncias duas.

Styracis liquidae . . . drachmas sex.

Olei essentialis Anisi,

— Carvi,

— Menthae,

singulorum drachmam unam.

Misce. (Pal.)

℞. Axungiae Porci . . . drachmas sex.

Cerae flavae . . . drachmam unam.

Mixturae liquatae et semirefrigeratae adde

Olei Lauri . . . drachmam unam.

— Anisi . . . guttas octodecim.

— Carvi . . . guttas duodecim.

Misce. (Ful.)

Erweichend, krampfstillend, Blähungtreibend.

Unguentum laurino-camphoratum s. aro-

maticum camphoratum s. contra per-
niones. (Ba. HassP. Ca.)

℞. Sebi vervecini . . . partes sedecim.

Olei Lauri . . . partes viginti.

Calefac lente et in fine adde

Camphorae in Olei Juniperi pauxillo solutae . . . partes duas.

Misce. (Ba.)

Ca. Liquaro jubet Axungiae Porci,

Adipis bubulae, Olei Lauri, Cerae, sin-

gulorum uncias duas et post refrigera-

tionem addere Camphorae in uncia una

Alcoholis solutae semunciam; — HassP.

Sevi vervecini uncias novem; liquatis

et semirefrigeratis admisce Olei Lau-

rini uncias decem et tandem Campho-

rae unciam unam solutam in Olei Bac-

carum Juniperi, Lavandulae, destillato-

rum singulorum uncia dimidia.

Unguentum martiatum. (Wir. Sp. Vm.)

℞. Foliorum recentium Lauri

uncias octo.

— — Rutae

uncias quinque.

— — Majoranae

uncias quatuor.

— — Rorismarini

uncias tres.

— — Myrti,

— — Ebuli,

— — Menthae,

— — Basilici,

singulorum unciam unam.

Vini albi . . . uncias quatuor.

Olei Olivarum . . . libram unam.

Butyri recentis,

Axungiae ursinae,

— gallinaeae,

Medullae cervinae,

singulorum drachmas sex.

Infunde per dies aliquot, tum coque

lente ad humidi consumptionem usque,

cola exprimendo et colaturae adde

Cerae flavae . . . uncias octo.

Pulveris Storacis drachmas quinque.

— Mastichis . . . semunciam.

— Olibani . . . drachmas tres.

Misce. (Wir. Sp.)

℞. Foliorum recentium Absinthii,

— — Abrotani,

— — Basilici,

— — Calamintae,

— — Balsamitae maris,

— — Chamaedryos,

— — Lauri,

— — Majoranae,

— — Menthae aquaticae,

— — Rorismarini,

— — Rutae,

— — Sabinae,

— — Salviae,

singulorum partes duas.

Contunde in mortario, succum exprime, quo supra ignem coagulato, faeculam exentam lava, Aquam quam potest, separa et solve deinde in

Axungiae Porci
partibus sexaginta quatuor calefactae cum

Seminum Cumini,
— Foenu graeci,
singulorum parte una.

Nucis moschatae . partibus sex.
Adde deinde

Styracis liquidae,
Cerae albae,
singularum partes quatuor.

Cola et donec refrixerint agita. (Vm.)
Steizend, auflösend.

Emplastrum Baccarum Lauri (Br. Pal, Sar. Wir. Sp.)

℞. Baccarum Lauri . uncias quatuor.

Cyperi rotundi,
Corticis Winterani,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singularum unciam unam.

Pulverata admisce mixturae liquatae de

Cerae flavae . . . uncias octo.
Resinae Pini,

Olei Lauri,
— Terebinthinae,
singulorum uncias duabus.

Steizend, auflösend.

Electuarium Baccarum Lauri (Pal Sar. Sp.)

℞. Baccarum Lauri . uncias duas.

Mastichis,
Myrrhae,
Olibani, singularum unciam unam.
Costi Arabicae,
Cyperi rotundi,
singulorum semunciam.

Olei Baccarum Lauri,
Terebinthinae Chiensis,
singulorum uncias tres.

Mellis purificati . sesquilibram.

Melli calefacto adde terebinthinam et olea liquata et deinde reliquas substantias pulveratas. (Sar.)

℞. Baccarum Lauri . sesquiunciam.

Radici Calami . drachmas duas.
Herbae Rutae,

— Menthae,
— Origani,

Seminum Ammi,
— Cumini,

— Nigellae,
— Levistici,

— Carvi,
— Carotae,

Piperis nigri,

Piperis longi,

Castorei,
singulorum drachmas duas.

Sagapeni . . . semunciam.
Opopanacis . . . drachmas tres.

Mellis despumati
uncias quatuordecim.

Misce. (Pal. Sp.)

Alcohol aromaticum. (An.)

℞. Baccarum Lauri . unciam unam.

Myrrhae,
Styracis, singularum drachmas sex.

Cinnamomi,
Zingiberis,
Nucis moschatae,

Caryophyllorum, singularum drachmas duas cum dimidia.

Aquae,
Alcoholis (20°), singularum uncias

quinquaginta quatuor.

Post horas viginti quatuor macerationis destillatio eo producatur, donec productum 30° indicet.

Mit Unrecht nennt An. dieses Präparat Balsamum Fioravanti, dieser enthält keine Serpentininctur.

Lavandula.

Lavandula Spica, L.; Lavendel; Lavande commune (Gal.); Lavandel (Bel. D. Suec.); Lavander (Ang.); Espieigo, Alhugema (His.); Lavendola, Spigo Nardo Italiano (I.); Lawanda (Pal.); Alfazema (Lus.).

A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Hig. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.

℥ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (Bull. t. 337. Hayne VIII. t. 37. Zorn Ic. pl. t. 53.)

Man wendet die blühenden Spitzen (herba et flores s. summitates s. spicae florentes Lavandulae s. Spicae) an; sie bestehen aus aufrechten, verästigten Stängeln mit linienförmigen, sitzigen, weißlichen Blüten und blauen oder violetten, Wirtel bildenden Blüten, welche vereinigt eine unterbrochene Achse zusammensetzen, die durch schmale linienförmige Deckblätter geschützt ist. Sie haben einen durchdringenden, sehr angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, bitteren Geschmack.

Ein kräftiges Reizmittel. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Species aromatica. (Bor. Bor4. GalM.)

- Han. HassP. Pol. Sar. Huf. Sp. Sw.)
- R. Herbae Majoranae,
 — Menthae piperitae,
 — Rorismarini,
 — Serpylli,
 Florum Lavandulae,
 singulorum partes duas.
 Caryophyllorum,
 Cubebarum,
 singulorum partem unam.
 Fiat pulvis grossus. (Bor. Han. HassP. Pol. Sar.)
 Bor4. Majoranae, Rorismarini, Serpylli, Thymi, Florum Lavandulae, singularum partes duas, Caryophyllorum partem unam.
- R. Herbae Rorismarini,
 — Rutae,
 — Salviae,
 — Hyssopi,
 — Lavandulae,
 — Absinthii,
 — Origani,
 — Thymi,
 Foliorum Lauri,
 Florum Rosarum rubrarum,
 — Chamomillae,
 — Meliloti,
 — Sambuci,
 Salis Ammoniaci,
 singulorum partes aequales.
 Fiat pulvis grossus. (Sp.) — Sum Bâhen.
- R. Florum Lavandulae,
 — Chamomillae,
 Herbae Menthae piperitae,
 — Melissaе,
 — Thymi,
 — Majoranae,
 singulorum partes aequales.
 Concisa misce. (Huf.)
- R. Florum et Summitatum Lavandulae,
 — — Melissaе,
 — — Menthae piperitae,
 — — Salviae,
 — — Thymi,
 — — Absinthii,
 — — Menthae aquaticaе,
 — — Origani,
 — — Rorismarini,
 singulorum partes aequales.
 Concisa misce. (GalM.)
- R. Florum Lavandulae,
 — Arnicae,
 Herbae Majoranae,
 Serpylli,
 — Rorismarini,
 singulorum unciam unam.
 Concisa misce. (Sw.)
- Species cephalicae pro fomentatione s.*
- epithemate.* (Pal. Wir. Wür. Fi. T. Vm.)
- R. Herbae Majoranae,
 — Menthae,
 — Melissaе,
 — Serpylli,
 Florum Lavandulae,
 — Arnicae,
 singulorum partes aequales.
 Concisa misce. (Wür.)
- R. Herbae siccatae Origani,
 — — Serpylli,
 — — Thymi,
 — — Menthae Romanae,
 — — Salviae,
 — — Majoranae,
 — — Rorismarini,
 Florum Lavandulae,
 — Rosarum,
 singulorum unciam unam.
 Concisa misce. (Fi. T.)
- R. Herbae et Summitatum Betonicae,
 — — Hyssopi,
 — — Lavandulae,
 — — Majoranae,
 — — Origani,
 — — Rorismarini,
 — — Rutae,
 — — Salviae,
 — — Serpylli,
 Florum Chamomillae,
 — Meliloti,
 — Rosarum,
 — Sambuci,
 Foliorum Lauri,
 siugulorum unciam unam.
 Salis Ammoniaci . . semunciam.
 Concisa et contusa misce. (Pal. Wir. Vm.)
- Infusum Lavandulae.* (GalM.)
- R. Summitatum siccatarum Lavandulae,
 Liquiritiae rasae, singularum drachmas duas cum dimidia.
 Aqueae bullientis quantum sufficit ut colaturae librae duae obtineantur.
- Aqua vulneraria, Tinctura aromatica composita.* (GalM.)
- R. Specierum aromaticarum partem unam.
 Alcoholis (22°) . . partes novem.
 Species cum alcoholis parte dimidia stent in infusione per octo dies et colentur deinde cum expressione; residuo reliquum Alcoholalem infunde et liquores commixtos filtra.
 Außerlich in Bâschungen und Bâhungen, meist mit Wein. — Reizend.
- Acetum Lavandulae.* (Gal. Lus. Pal. Wir. Wür. Fi. Pid. T.)
- R. Florum Lavandulae partem unam.

Aceti albi . . . partes sex.
Macera soli exposita per aliquot dies
et cola cum expressione. (Pal. Wir.
Pid.)

Gal. Lavandulae partem unam, Aceti
sedecim et quatuordecim dies macera-
tionis; — Wür. Lavandulae partem
unam, Aceti novem et tres septimanas
macerationis; — Fi. Lavandulae li-
bram unam, Aceti fortis libras duode-
cim; digere loco tepido per dies sex; —
T. Lavandulae uncias sex, Aceti libras
sex et digestionem per dies sex vel de-
cem.

℞. Florum siccatarum Lavandulae
libram unam.

Aceti libras sex.
Post sex dies macerationis coque pa-
rumper et colaturae adde

Alcoholis semilibram.
Misce bene. (Lus.)
Gewürzhaft, bisweilen in Form von epi-
thema angewendet.

Acetum Lavandulae compositum, *Acidum aceticum aromaticum*, Spiritus aromaticus acetosus, Acetum quatuor latronum. (B*. Fenn. Br. Vm.)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllum,
Nucis moschatae,
singulorum drachmam unam.
Menthae piperitae . . . semunciam.
Lavandulae,
Rorismarini,
singulorum unciam unam.

Aceti uncias octo.
Aque Vitae uncias viginti.
Destillent partes viginti octo. (Vm.)

℞. Herbae recentis Absinthii,
— Menthae crispae,
— Rutae,
— Rorismarini,
singularum sesquiunciam.
Florum siccatarum Lavandulae
uncias duas.

Radicis Calami,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Caryophyllum,
singulorum drachmas duas.
Aceti albi libras decem.
Post diem decem macerationem cola
exprimendo et filtra. (Br.)

℞. Summitatum Absinthii,
— Millefolii,
Herbae Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
Caryophyllum,
Zingiberis,
singulorum drachmas quatuor.
Aceti bullientis
libras septem cum dimidia.

Acidi acetici semilibram.
Macera per dies quatuor, cola expri-
mendo, lacte vaccino clarifica, cola
iterum et adde colaturae
Spiritus Rorismarini
uncias quatuor.

Serva. (Fenn.)
℞. Cinnamomi,
Macidis,
Caryophyllum,
singulorum semunciam.
Ligni Rhodii,
— Santali albi,
Seminum Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Aceti octarios duos.
Digere blando calore per dies duos;
adde deinde

Herbae Absinthii,
— Rorismarini,
— Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
singulorum semunciam.
Herbae Majoranae
drachmam unam.

Stent in digestionem per dies duos,
tunc coque et refrigerata cola. (B*.)

Aqua Lavandulae. (A. Gal. Pal. Sar.
Wir.)

℞. Herbae florentis Lavandulae
partem unam.
Aque communis partes quatuor.
Destillet dimidia pars. (Gal. Pal. Sar.)
Wür. Lavandulae partem unam et
sex Aquae; — A. Lavandulae unam
et duodecim Aquae.
Gabe, zwei bis vier Unzen.

Oleum Lavandulae aethereum, *Aethereoleum Lavandulae*. (A. Am. Ams. An.
B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed.
Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP.
His. Lon. LonN. Lus. Pal. Pol. R. Sar.
Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Pid.
Sw.)

℞. Herbae florentis Lavandulae
quantum vis.
Aque quantum sufficit.
Destillatione oleum quod separatur,
collige. (Am. Am*. B. Bel. Du. Ed.
Per. Ful. Gen. Lon. LonN.; Lus. R.
Suec. Br. C.)

Sw. Herbae partem unam et quatuor
Aquae; — Bor. Han. His. Pol. Sax.
et Fi. Herbae unam et octo Aquae; —
D. Herbae unam, Aquae sex; — An.
Herbae sex et viginti Aquae; — Gal.
Herbae quinque et septem Aquae; —
Ba. Herbae unam et Aquae novem; —
A. Herbae unam et duodecim Aquae;
— T. ut oleum florum aurantiorum L.
p. 527.

℞. Lavandulae partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis communis . . . partes tres.
Destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. Wir.

Pid.)

℞. Lavandulae . . . quantum vis.
Aquae Lavandulae
quantum sufficit.

Destillent (Wür.)

Gabe, zwei bis acht Tropfen.

Bor4. et HassP. Oleum venale.

Linimentum aromaticum, Balsamum Lavandulae (Br. Sw.)

℞. Olei Lavandulae partem unam.
— Nucis moschatae
partes quinque.

Misce. (Br.)

℞. Olei Lavandulae,
— Nucis moschatae,
Butyri Cacao,
singulorum partes aequales.

Misce. (Sw.)

Dieses sehr einfache Präparat erfährt das ungentum nervinum vollkommen, und wird auch von Sw. so benannt.

Oleum Lavandulae (pingue). (Fi. T.)

℞. Florum Lavandulae recentis
libram unam.

Olei. Olivarum . . . libras quatuor.
Macerata calide per duos dies, tunc coque per horae quadrantem, exprime et oleum separa; — T. Florum unciis quindecim, Olei libras quinque, tres macerationes, priores per tres vel quatuor dies, tertiam per mensem circiter protrahendam.

Spiritus Lavandulae. (A. Am. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. C. *Pid.* Sw. T. *Vm.*)

℞. Lavandulae . . . partem unam.
Alcoholis (20°) . . . partes quatuor.
Spiritus destillatione elicuitus 28° indicet. (An. Br. Ed. Hass. Pal. Wir. *Pid.*)

Bel. Lavandulae partem unam et sedecim Alcoholis; — Succ. Lavandulae partem unam cum dimidia et deoem Alcoholis; — Lus. Lavandulae partem unam cum dimidia, et decem Alcoholis; — T. Florum recentium libras duas, Spiritus Vini 32° B. libras octo, destillando libras circiter quinque elice; — Sar. Lavandulae partem unam, Alcoholis quatuor et cohobationem producti supra novam herbam; — D. Lavandulae partem unam, Alcoholis sex et cohobationem supra novos flores; — Wür. Lavandulae partem unam cum dimidia, Alcoholis de-

cem, et cohobationem supra novam herbam; — Fer. Florum libram unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillent librae sex.

℞. Lavandulae . . . partes tres.
Aquae Vitae . . . partes sex.
— purae partes triginta sex.
Destillent partes novem. (*Vm.*)

Bor. Han. O. Pol. et Sax. Lavandulae partem unam, Alcoholis et Aquae, singulorum quatuor; — Ba. Lavandulae unam, Alcoholis (0,900) quatuor et octo Aquae; — A. Lavandulae unam, Alcoholis (0,910) quatuor cum dimidia et Aquae sex; — Fenn. Lavandulae unam cum dimidia, Alcoholis quatuor et tres Aquae; — Du. Herbae sesquilibram, Alcoholis octarios octo et Aquae sufficientem ut empyreuma prohibeatur; — Bor4. HassP. Florum libram unam, Spiritus Vini rectificati libras quatuor, Aquae fontanae quantum satis; post macerationem per horas viginti quatuor, destillando libras quatuor elice.

℞. Lavandulae . . . partes duodecim.
Alcoholis . . . partes sex.
Aquae . . . partes duas.

Partibus sex destillando elicitis productum novae destillationi cum Lavandulae partibus duodecim et Aquae duabus subjiciatur, quo partes sex extrahantur. (*Sw*)

℞. Lavandulae . . . semilibram.
Aquae Lavandulae libram unam.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Post infusionis horas viginti quatuor destillent librae tres. (R.)

Tinctura Lavandulae composita s. aromatica, Spiritus Lavandulae compositus, Alcohol cum Lavandula Spica compositus. (Am. An. B*. D. Du. Ed. Fenn. GalF. Gen. Han. Lon. LonN. Pal. Suec. C. Ca. Sw. *Vm.*)

℞. Spiritus Lavandulae
partes triginta duas.

— Rorismarini partes sedecim.

Cinnamomi,

Nucis moschatae,

singulorum partes duas.

Infunde frigidè per tres dies et adde

Ligni Santali rubri partem unam.

Macerata iterum per aliquot dies, tunc cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Han. Spiritus Lavandulae libras duas, Spiritus Rorismarini unciis octo, Cinnamomi, Nucis moschatae, singulorum drachmas duas, et Ligni Santali rubri semunciam; — B*. et GalF. Spiritus

Lavandulae libras tres, Spiritus Rorismarini unam, Cinnamomi, Nucis moschatae, singulorum semunciam et Santali rubri unciam unam; — *Pal. et Suec.* Spiritus Lavandulae libras tres, Spiritus Rorismarini unam, Cinnamomi, Nucis moschatae, singulorum semunciam et Santali rubri drachmas tres; — *Ca.* Spiritus Lavandulae libras tres, Spiritus Rorismarini libram unam, Cinnamomi, Santali rubri, singulorum sesquiunciam et Nucis moschatae unciam unam; — *Vm.* Spiritus Rorismarini uncias duodecim, Spiritus Lavandulae uncias triginta sex, Cinnamomi, Nucis moschatae, singulorum semunciam, Coccionellae semidrachmam.

℞. Spiritus Lavandulae libras tres.
— Rorismarini libram unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
singulorum semunciam.
Coccionellae contusae
semidrachmam.

Digere, modico igne, per tres dies et cola. (*Fenn.*)

℞. Spiritus Lavandulae libras duas.
— Rorismarini . . . uncias sex.
Pulveris Cinnamomi,
— Nucis moschatae,
singulorum semunciam.
— Santali rubri drachmas tres.

Post digestionem per septimanam filtra et residuo infunde

Spiritus Lavandulae libram unam.
— Rorismarini . . . uncias sex.

Stent in digestionem per tres dies, quo facto colaturae filtratae misceantur. (*An.*)

℞. Spiritus Lavandulae libras tres.
— Salviae . . . libram unam.
Cinnamomi . . . unciam unam.
Nucis moschatae . . . semunciam.
Rasurae Santali albi
drachmas tres.

Post frigidam per octo dies infusionem cola. (*Sw.*)

℞. Spiritus Lavandulae libras tres.
— Rorismarini libram unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Santali citrini,
singulorum semunciam.

Ambrae griseae semiscrupulum.
Croci . . . drachmam unam.

Post octo dies macerationis cola. (*Gen.*)

℞. Spiritus Lavandulae,
— Rorismarini,
singulorum uncias viginti quatuor.
Cinnamomi . . . unciam unam.
Nucis moschatae . . . semunciam.
Caryophyllorum drachmas duas.

Aquae . . . uncias centum viginti.
Destillent liquidi unciae quadraginta octo, in quibus infunde

Ligni Santali rubri drachmas tres et filtra, vel totum absque destillatione, infusioni subijce per plures dies, cum utroque spiritu et filtra. (*Vm.*)

℞. Spiritus Lavandulae
partes octoginta quatuor.

— Rorismarini

partes quadraginta octo.

— Citri . . . partes duodecim.

Cinnamomi . . . partes tres.

Cubeborum,

Caryophyllorum,

singulorum partem unam.

Stent per plures dies in frigida infusione, tum filtrentur (*Vm.*)

℞. Spiritus Lavandulae octarios tres.
— Rorismarini octarium unum.

Nucis moschatae,

Cinnamomi,

singulorum semunciam.

Caryophyllorum drachmas duas.

Rasurae Ligni Santali rubri

unciam unam.

Post decem dies cola. (*Am. Du. C.*)

Lon. LonN. Caryophyllos omittunt;

— *Ed. et Sw.* Spiritus Lavandulae libras tres, Spiritus Rorismarini libram unam, Cinnamomi unciam unam, Caryophyllorum drachmas duas, Nucis moschatae semunciam, Santali rubri drachmas tres et octo dierum macerationem.

℞. Foliorum Lavandulae

partes duodecim.

— Rorismarini . . . partes sex.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

singulorum partes tres.

Cubeborum . . . partem unam.

Aquae Vitae partes centum qua-

draginta quatuor.

Aquae purae

partes ducentas octoginta octo.

Destillent partes centum octo. (*Vm.*)

Spiritus Lavandulae ammoniacalis, Guttae anglicae cephalicae (*T.*)

℞. Spiritus Cornu Cervi (destillatione cornu cervi vel fili. bombycini obtenti) uncias octo.

Olei essentialis Lavandulae

drachmas duas.

Alcoholis 39° B. unciam unam.

vergl. I. p. 165., wo statt Spiritus Fuliginis zu lesen ist Spiritus Cornu Cervi.

D. Lavandulae libras duas, Rorismarini libram unam, Corticis recentis Citri uncias tres, Alcoholis libras duodecim, destillationem ad siccum et infusionem producti cum Cubeborum, Ga-

ryophyllum, singulorum uncia una et Cinnamomi uncis tribus.

Reizenb. — Gabe, von zehn Tropfen bis zu zwei Drachmen in Zuckerwasser.

Aqua odorifera. (B*. Wir.)

R. Herbae Rorismarini,
— Majoranae,
Florum Lavandulae,
singulorum unciam unam.
— Liliorum Convallium,
— Rosarum,
singulorum uncias duas.
Ligni Rhodii,
Corticis recentis Citri,
singulorum sesquiunciam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Caryophyllum . . . sesquiunciam.
Alcoholis . . . libras octo.
Aquae . . . libras quatuor.
Post tres dies digestionis destillent
tres quadrantes. (Wir.)

R. Lavandulae,
Melissae, singularum libras duas.
Radici Calami . . . libram unam.
Caryophyllum,
Herbae Rorismarini,
singulorum semilibram.
— Majoranae,
— Menthae piperitae,
Cinnamomi,
singulorum unciam unam.
Alcoholis . . . libras duas.
Aquae . . . libras triginta.

Destillent unciae viginti. (B*.)

Dieses gewürzhafte Wasser unterscheidet sich fast nur dem Namen nach von dem Karmeliter- und Köhlnischen Wasser. Es dient zu demselben Gebrauch.

L a w s o n i a .

Lawsonia inermis, L.; rothes Mundholz, rothes Egyptisches Färbekraut; Henné (Gal.); Alkanet (Ang.); Pachar (Jav.); Pontalesche (Malab.).

Ba. Gal. Wir. A. M. Sp.

Ein Strauch (Octandria Monogynia, L.; Salicariae, J.) Ostindien's und Africa's. (Hort. Malab IV. p. 117. t. 57.)

Man wendet die Wurzel (radix Alcan-nae verae s. orientalis s. Cypri anti-quorum s. Ligustri Aegyptiaci) an; sie ist dunkelroth und hat einen herben, styptischen Geschmack.

Schwach abstringirend.

In Ostindien gebraucht man die Wurzel der *Lawsonia spinosa, L.*; Henné épineux (Gal.); Ürkan (Ar.); Maritondi (Cy.); Mayndie (Duk.); Daun lacca (Mal.); Mail anschi (Malab.); Henna (Pe.); Sakachero (Sa.); Marudanie (Tam.); Gorunta chettu (Tel.).

Sie hat viel Nützlichkeit mit der vorigen; sie soll bei Ausschlag und andern Hautkrankheiten, sowohl äußerlich als innerlich angewendet, zu einem halben Kaffeelöffel gegeben, nützlich seyn.

L e d u m .

Ledum palustre, L.; Halbbienenkraut, Sumpfsportich; wider Rosmarin, Porstch, Porst; Romarin sauvage (Gal.); Marsh ledum (Ang.); Vild rosmarin (D.); Wilde rosmarjn (Bel.); Ledo (I.); Rozmarin czeski (Pol.); Getporss, Sqwatram (Succ.).

A. Bor. Borå. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Ham. Han. Li. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Be. M. Sp.

♀ (Decandria Monogynia, L.; Rhodorceae, J.) Eine Norddeutsche Pflanze. (Schk. t. 117. Plenk t. 337. Hayne III. 21. Zorn Ic. pl. t. 54.)

Man wendet die Spitzen (herba s. folia Ledi palustris cum floribus s. Rorismarini sylvestris s. Anthos sylvestris) an; sie bestehen aus behaarten, röthlichen Zweigen mit linienförmigen, fast sitzenden, am Rande umgeschlagenen, oben grünen, unten sitzigen und röthlichen Blättern und weißen, einständige, sitzende Dolben bildenden Blüten.

Diese Pflanze wird für narkotisch gehalten und in convulsitischen und Krampfkrankheiten gepriesen.

Infusum Ledi s. Ledi palustris. (B*. Sw. Sy.)

R. Foliorum Ledi palustris
semunciam ad unciam unam.
Aquae bullientis . . . libram unam.
Infunde per horam unam et cola.
Bei Ausschlag, Krätze, Kopfschind. Reicht-husten, venerischen Krankheiten empfohlen.

L e n s .

Ervum Lens, L.; Linse; Lentille (Gal.); Common lentil (Ang.); Lentecchia (I.); Lins (Succ.).

Gal. Re. G. M. Sp.

⊙ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in Europa gebaute Pflanze. (Plenk t. 565. Schk. t. 202. Sturm Fl. D. I. 32 Oed. Fl. Dan. t. 95.)

Man wendet den Saamen (semen Lentis) an; er ist kreisrund, platt, an beiden Seiten bauchig und von gelblicher Farbe.

Ehedem gab man die Abkochung bei Blat-tern; sie ist, schwach bereitet, etwas abstringirend.

L e p i d i u m .

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöden angeführt:

1) *Lepidium latifolium*, L.; Pfefferkraut; Passerage à larges feuilles, grande Passerage (Gal.); Broadleav'd paperwort (Ang.); Peperur (D.); Breedlabig peperkruid (Bel.); Lepidio (I.); Poparaer (Succ.).

Gal. His. Sp.

2) (*Tetradynamia Siliquosa*, L.; Cruciferae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 448. Oed. Fl. Dan. t. 557.)

Man wendet das Kraut (herba Lepidii) an; es besteht aus einem walzigen, glatten ästigen Stängel mit eirundlanzettigen blas- und selbst blaugrünen, gezähnelten oder bisweilen ungetheilten Blättern, von denen die untern gestielt, die obern sitzend und schmal sind. Es hat einen scharfen, gewürzhaften, pfefferartigen Geschmack.

2) *Lepidium Iberis*, L.; kleines Pfefferkraut; Passerage ibérique, petite Passerage (Gal.).

Gen.

3) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 593.)

Man wendet das Kraut (herba Iberidis) an; es besteht aus einem ästigen Stängel, gestielten, lanzettigen, an der Spitze gezähnten oder selbst eingeschnittenen, fiederförmigen oder leierförmigen Wurzelblättern und linienförmigen, ganzen und ganzrandigen Stängelblättern. Es hat einen scharfen, starken, dem der Kresse ähnlichen Geschmack.

Reizend, gegen Scorbut.

Conserva Lepidii. (His.)

R. Foliorum recentium Lepidii

partem unam.

Contundendo pistilli lignei ope in mortario marmoreo in pastam mollem redige, addendo sensim

Sacchari albi pulverati partes duas.

Infusum Lepidii. (B^o.)

R. Herbae Lepidii

semunciam ad unciam unam.

Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae unciae sex obtineantur.

Dieser Aufguss ist, nach Erdmann, in Rußland gegen Wechselstieber in Gebrauch.

— Erbe, alle Stunden einen Löffel.

L i c h e n .

Wir fassen unter diesem Namen folgende Flechten zusammen:

1) *Physcia nivalis*, Cand.; Schneeflechte; Lichen blanc de neige (Gal.).

Wir.

Ein kryptogamisches Gewächs der Alpen und der Pyrenäen. (Dill. Musc. t. 21 f. 56.)

Es besteht (Lichen terrestris cinereus) aus weißen oder gelblichen, am Grunde etwas abtiefenden, oben wieder aufwärts gerichteten, ästigen, fast ausgezackten, krausen Blättern, welche in platte, rundliche oft mit schwarzen Punkten gesäumte Lappchen endigen; die auf den Blättern sitzenden Schildchen sind sehr selten, sitzend, braun und von einem geferbten Rande eingefasst.

Das Pulver dieser Pflanze wurde ehemals als ein specificum gegen die Wuth betrachtet.

2) *Scyphophorus cocciferus*, Cand.; scharlachfarbige Becherflechte, Feuerkraut, Fiebermoos; Lichen cocciferus (Gal.).

Gal.

Diese Flechte (herba ignis s. Musci pyxidati) besteht aus kleinen, oben grünlichweißen, unten weißeren Blättern, von denen walzige, oft ästige Stängel entspringen, welche sich in W. her erweitern, an deren Rändern rotte Höcker sitzen.

3) *Peltigera canina*, Cand.; Hundsflechte; Lichen contre la rage (Gal.); Ashcolour'd ground liverwort (Ang.); Honds moos (Bel.); Musgo canino (Lus.); Hund moss (Succ.).

Br. Gal. M. Sp.

Ein sehr häufig in Holzern auf der Erde wachsendes kryptogamisches Gewächs. (Plenck t. 747. Vaill. Bot. t. 21. f. 16.)

Es besteht diese Flechte (herba Musci canini s. Lichen cinereus terrestris) aus großen, breiten, lebrigen, rundlichen, aschgrauen oder braunen Blättern, welche unten mit rothen, behaarten, ästigen und unter einander zusammenstrebenden Rippen versehen und in rundliche Lappen getheilt sind, von denen einige aufsteigende die rothen, ebenen, länglichen, schreitend stehenden Schildchen tragen; der Rand der letztern ist eingewachsen.

Peltigera venosa, horizontalis, polydactyla und apthosa (Hoffm. Lich. I. t. 6. f. 1. Jacq. Coll. IX. t. 17.), welche von der Französischen Pharmacopoe ebenfalls angezeigt sind, haben viel Ähnlichkeit mit ihr.

Ehemals hielt man diese Pflanze als gegen die Wuth für sehr nützlich.

4) *Scyphophorus pyxidatus*, Cand.; Becherflechte; Lichen en entou noir (Gal.). Ful. Gal. GalM. Ham. Li. M. Sp.

Ein kryptogamisches Gewächs, welches man auf der Erde, auf Holz und an alten Mauern antrifft. (Handb. d. pharmac. Bot. t. XCII. f. 427. Dill. Musc. t. 14. f. 2.)

Dieses Moos (herba Musci pyxidati) besteht aus lappigen oder geferbten, oben etwas grünlichen, unten weißeren Blättern, welche regelmäßig von unten nach oben ausgerandete becherförmige Schildchen tra-

gen, an deren Rande dunkelbraune Höcker sitzen.

Ehedem gegen Husten empfohlen.

5) *Usnea plicata*, *Cand.*; Haarflechte, Wickeflechte; Lichen entrelacé, Mousse de chène (*Gal.*); Hairy treemoss (*Ang.*); Skinslav (*D.*); Musco arboreo (*His.*); Worrig schurffmoos (*Bel.*); Musgo dos carvalhos (*Lus.*); Taf (*Suec.*).

Gal. His. Wir. M.

Ein kryptogamisches Gewächs, welches sich auf den Zweigen alter Bäume häufig findet. (*Dill. Musc. t. 11. f. 1.*)

Es besteht (*Muscus albus quernus s. arboreus*) aus bisweilen über 1 Fuß langen, sehr festen, höckerigen, in durcheinander gewirrte Aeste getheilten, weißlichen Stämmen und vielen fast endständigen, weißen, mit haardünnen Wimpern am Rande versehenen Schülbchen. Es hat einen angenehmen Geruch und einen etwas abstringirenden Geschmack.

Ehedem bezahlte man die, welche auf dem Schädel Erkennter wachsen, dem Gewichte nach mit Gold.

Schwach abstringirend, ehedem für Schmerzstillend gehalten und sowohl um den Magen zu stärken, als auch um Ausflüsse jeder Art zu hemmen und Husten zu mildern, angewendet.

6) *Physcia Islandica*, *Cand.*; Lungenmoos, Isländisches Moos; Lichen d'Islande (*Gal.*); Iceland lichen, Iceland liverwort (*Ang.*); Gaternjk (*B.*); Islandskmoos, Fielgræs (*D.*); Liquen islandico (*His.*); Yslandisch moos (*Bel.*); Lichene islandico, Musco catartico (*L.*); Meck islandzki (*Pol.*); Musgo islandico (*Lus.*); Islandsmosse (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Sar. Pid. Sp. Z.

Ein in Europa, besonders im Norden, sehr gemeines kryptogamisches Gewächs. (*Jacq. Coll. IV. t. 8. f. 1. Plenck. t. 744. Blackw. t. 599. Oed. Fl. Dan. t. 153. f. 879.*)

Es besteht (herba *Lichenis islandici s. Muscus islandicus s. catharticus*) aus häutigen, kastanienbraunen oder olivenfarbigen, am Grunde bräunlichrothen, unten blässhenn, aufrechten, ästigen, in zurückgebogene, fast liniensförmige, vielspaltige, hohle, gezähnte und gefranste Lappen getheilten Ausbreitungen; die breiteren Lappen tragen ebene, sitzende, angebrückte, gleich- oder weniger dunkelgefärbte Schülbchen mit erhabenem, ganzem und gefranstem Rande.

Nach Prouff enthält diese Pflanze in

100 Theilen, 64 Schleim, 33 sazmehlartige und 3 bitteren Stoff.

Es besitzt, je nachdem man ihm den bitteren Stoff entzogen hat oder nicht, entweder bloß nährende oder zugleich auch tonische Eigenschaften. Man hat es besonders in der Lungenschwindsucht gerühmt.

7) *Imbricaria parietina*, *Cand.*; Wandflechte, goldgelbe Schuppenflechte, Piankenflechte; Lichen des murs (*Gal.*); Common yellow lichen (*Ang.*); Guul skorpeboos (*D.*); Maurig schurffmoos (*Bel.*); Vaeggmosse (*Suec.*).

A. Ba. Fer. GalM. Sax.

Ein Kryptogamisch Europa's. (*Fl. Dan. 1005. Hoff. Enum. Lich. XVIII. 1. Hayne V. t. 47. Dill. Musc. t. 24. f. 76.*)

Es besteht aus einem häutigen, geschindeltem, unten weißlichen, oben grünlichen, später in's Goldgelbe und Aschgrau übergehenden Laub mit rundlichen, in Lappen getheilten, krausen, großen, ausgebreiteten Blättern, in deren Mitte zahlreiche Schülbchen mit dunkler gefärbter Scheide und ganzem Rande sitzen.

Bitter, als Ersatzmittel der China bei Wechselstiebern ausgegeben. Doch hat die Schrader'sche Analyse eine Ähnlichkeit mit der China nicht dargethan.

8) *Physcia Prunastri*, *Cand.*; weißes Lungenmoos; Lichen du prunellier (*Gal.*). *Wir. Sp.*

Diese Flechte wächst in Europa. (*Dill. Musc. t. 21. f. 54. 55. A.*)

Sie besteht (*Muscus arboreus s. Acaciae*) aus einer weichen, häutigen, aschgrauen, weißlichen, bisweilen grünlichen, runzeligen, höckerigen, unten milchweißen, ungleich gabeligen, sehr ästigen Ausbreitung mit aufgerichteten, liniensförmigen, verdünnten, ebenen Lappen; die Schülbchen sind einzeln, braun und randständig.

Schwach abstringirend.

9) *Lobaria pulmonaria*, *Cand.*; Lungenflechte; Lichen pulmonaire, Pulmonaire de chène (*Gal.*); Lungwort (*Ang.*); Lungemos (*D.*); Pulmonaria de arbol (*His.*); Longachtig lungwort (*Bel.*); Polmonaria di quercia (*L.*); Hepatica dos avores (*Lus.*); Lungmossa (*Suec.*). *Br. Gal. GalM. Gen. Wir. Wür. Be. Fi. M. Sp.*

Ein besonders im Norden Europa's sehr gemeines kryptogamisches Gewächs. (*Plenck t. 745. Hayne V. t. 48. Zorn Ic. pl. t. 494*)

Es besteht (herba *Pulmonariae arboresae s. Muscus pulmonarius*) aus einer oben gelbgrünen Ausbreitung mit einem Netz hervorstehender Höhlen, unten gleichsam höckerig, weiß und an den Erhöhungen, welche die Höhlen baselbst bilden, glatt, in

den Zwischenrunden derselben braun und behaart.

Species pectorales. (Ful.)

℞. Lichenis Islandici . libram unam.
Radiciſ Althaeae . . . libras duas.
Conciſa miſce.

Pulvis antilyſſus. (Br. Wir. Sp.)

℞. Lichenis terreſtris cinerei . . .
Piperis nigri . . . unciam unam.
Fiat pulvis.

Chocolata Lichenis Islandici, Pasta cacaoſina lichenifera s. *Cacao cum Lichene Islandico.* (Bor4. Sax. Au.)

℞. Seminum Cacao toſtorum,
Sacchari,
ſingulorum libras quatuor.
Lichenis Islandici . . . libras duas.
Salep . . . unciſ tres.

Bon. Rommſborff angegeben. (Au.)

℞. Lichenis Islandici cum Aqua calida loſi et ſiccati partem unam.
Pulveris Salep . . . partem octavam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Mixtiſ exacte adde
Paeſtae Cacao calidae adhuc partem unam.

Fiant tabellae. (Sax.)

℞. Lichenis Islandici unciſ quatuor.
Infunde
Aquaſ communis fervidae . . . libras duas,

in quibus ſolutae ſunt
Kali carbonici e cin. clav.
drachmae duae.

Stent per horas tres. Tum liquorem decantha, reſiduum Aqua communi frigida probe ablutum et ſiccatum in pulverem redige. Hujus pulveris unciſ tribus adde

Cacao toſtae in mortario ferreo calido in maſſam ſubtiliſſimam redactae,

Sacchari albi pulverati,
ſingulorum ſesquilibrum.
Radiciſ Salep pulveratae . . . drachmas tres.

Maſſam intime mixtam aut in ciſtulas effunde ut refrigeratam in pulverem redige. (Bor4.)

Extractum Lichenis Islandici. (Wür.)

℞. Lichenis Islandici mundati . . . quantum viſ.
Alcoholiſ . . . quantum ſufficiat ut quatuor digitorum craſſitiem tegatur; digere blando calore et decantha; reſiduum cum Aqua coctum coletur cum expreſſione; colatura in balneo aquae ad mellis conſiſtentiam evaporet, addita ſenſim tinctura et agi-

Pharmacopoea univerſaliſ. II.

tatione continua ut maſſa homogenea neque grumosa obtineatur.

Infuſum Lichenis Islandici. (Sa.)

℞. Lichenis Islandici drachmas tres.
Aquaſ bullientiſ quantum ſufficiat ut poſt ſemihoram infuſionis et aliquot momenta ebullitionis, colaturae librae viginti obtineantur, quibus adde
Syrupi Rubi Idaei . . . ſesquiunciam.

Syrupus Lichenis Islandici. (Han. Vm.)

℞. Lichenis Islandici . . . unciſ ſex.
Aquaſ bullentiſ . . . libras ſex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam et adde
Sacchari albi . . . libras quinque.
Coque ad conſiſtentiam ſyrupi. (Ham.)
Vm. Lichenis partem unam, Aquaſ triginta quinque ad viginti coctone redactas et decem Sacchari.

Syrupus de muſco querno. (Wir.)

℞. Muſci querni . . . unciſ tres.
Herbae Chenopodii ambroſiaci,
Paſſularum minorum,
ſingulorum ſesquiunciam.
Radiciſ Conſolidae majoriſ . . . unciam unam.

— Liquiritiae . . . ſemunciam.
Aquaſ bullientiſ . . . ſesquilibrum.
Infunde per noctem, tum lente coque. Colaturae unciarum decem clarificatae adde

Baſamaſi Toluſani ſesquidrachmam.
Sacchari albi pulverati . . . ſesquiunciam.

Miſce exacte.

Decoctum Lichenis Islandici. (B*. Sax. Suec. ParC. Ra. T. Vm.)

℞. Lichenis Islandici . . . partem unam.
Aquaſ frigidae . . . partes octo.
Macera per ſemihoram et liquidum decanthatum rejice. Tum coque lichenem cum

Aquaſ . . . partibus triginta duabus ad dimidii remanentiam, cola et expreme. (Sax.)

T. Lichenis unciſ duas, Aquaſ bullientiſ modicam quantitatem, quam decanthatam rejice et lichen coque cum Aquaſ libris quatuor ad dimidii remanentiam. Si aquam prioris bullitionis non rejicias addere poteſ, ad temperandum ſaporem amarum, momento, quo ab igne removes, Radiciſ Liquiritiae modicam quantitatem.

℞. Kali ſubcarbonici drachmam unam.
Aquaſ . . . unciſ triginta duas.
Diuſſolutionem infunde

Lichenis Islandici mundati . . . unciſ duabus.

Post macerationem duodecim hora-

rum liquidum decantha, lichen bene cum Aqua pura ablue et ei infunde

Aquae . unciis quadraginta octo.

Decoque ad unciarum sedecim remanentiam, cola et exprime. (B*. Suec. Vm.)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.

Coque, antea per sexagesimas quinque cum Aqua bulliente bene ablutum, cum

Aquae communis . libris tribus ad librarum duarum colaturae remanentiam. (Ra.)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.

Aqua calida bene abluto adde

Aquae octarios duos cum dimidio.

Coque ad octarii, unius cum dimidio remanentiam et colaturae adde

Syrupi Sacchari . . unciis duas.

Misce bene. (ParC.)

Decoctum Lichenis Islandici (amarum).
(Am. B*. Ed. Gal.M. Lon. LonN. Suec. Au. C. E. Fi. Sa.)

℞. Lichenis Islandici unciam unam.

Aquae purae . . unciis sedecim.

Decoque ad unciarum duodecim colaturae remanentiam. (B*. WW. E.)

Am. Lon. LonN. et C. Lichenis unciam unam, Aquae sesquioctarium, pro triente consumendum; — Ed. Fi. Lichenis unciam unam, Aquae libras duas ad unciis sedecim redigendas; — Du. Lichenis unciis duas, Aquae libras duas ad unciis sedecim redigendas; — Suec. Lichenis libram unam et Aquae unciis viginti quatuor ad sedecim redigendas.

℞C. Lichenis Islandici semunciam, Aquae fontanae sesquilibram ad libram unam coquenda et sub finem addendo Liquiritiae Radicis drachmam unam vel Mellis puri semunciam.

℞. Lichenis Islandici

semunciam ad unciam unam.

Aquae libras duas.

Decoque ad unius librae colaturam, cui adde

Mellis albi . . . unciam unam.

Liqua. (GalM.)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.

Aquae quantum sufficit

ut colaturae sesquilibra obtineatur; post horae quadrantis ebullitionem adde

Syrupi Althaeae,

— Papaveris albi,

singulorum unciam unam,

Misce. (Sa.)

℞. Lichenis Islandici drachmas duas.

Salep grana decem.

Cinnamomi grana octo.

Aquae unciis duodecim.

Coque ad unciarum sex remanentiam et adde

Syrupi Sacchari . . quantum vis.

Misce. (Au.)

Bitter. — Bei Lungenschwindsucht, weissem Fluß, Reichesten empfohlen. — Gabe, vier Unzen drei oder vier Mal täglich.

Decoctum Lichenis Islandici lacteum.
(Au.)

℞. Lichenis Islandici unciam unam.

Seri Lactis . . . unciis viginti.

Decoque ad unciarum duodecim remanentiam et adde

Sacchari lactis . . drachmas sex.

Potio nutriens et sedans. (B.)

℞. Lichenis Islandici abluti

unciis duas.

Rasurae Cornu Cervi unciam unam.

Aquae quantum sufficit

ut potio gelatinosa formetur, cui adde Laudani liquidi Sydenhami

guttas quindecim.

Allmältig ben Tag über zu nehmen. — Bei Lungenschwindsucht mit großen Schmerzen empfohlen.

Decoctum pectorale nutriens. (B.)

℞. Lichenis Islandici . unciis duas.

Turionum Abietis . semunciam.

Aquae quantum sufficit

ut colaturae libra una obtineatur.

Decoctum pectorale nutriens et incitans
s. *Lichenis Islandici compositum.*
(Wür. Au. B. Sw.)

℞. Lichenis Islandici abluti

unciam unam.

Chinae semunciam.

Serpentariae Virginicae

drachmam unam.

Aquae quantum sufficit

ut decocti unciæ quatuor obtineantur, quarum colaturae adde

Emulsionis gummosae

unciis quatuor.

Misce bene. (B.)

℞. Lichenis Islandici,

Hederae terrestris,

singulorum semunciam.

Chinae drachmas duas.

Aquae quantum sufficit

ut decocti librae duae obtineantur, quibus adde

Lactis vaccini . . unciis decem.

Misce bene. (B.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae

drachmas duas.

Lichenis Islandici . semunciam.

Dulcamarae . drachmam unam.

Aquae quantum sufficit

ut unciæ quatuor colaturae obtineantur, quibus adde

- Lactis vaccini . . . uncias sex.
 Misce bene. (B.)
 ℞. Lichenis Islandici . . . semunciam.
 Radicis Polygalae amarae
 unciam unam.
 Aquae libras tres.
 Coque ad colaturae librarum duarum
 remanentiam. (Sw.)
 ℞. Lichenis Islandici . . drachmas sex.
 Fungi Melitensis,
 Radicis Consolidae majoris,
 — Polygalae amarae,
 singularum semunciam.
 Conservae Rosarum rubrarum
 uncias duas.
 Seminum Hyoscyami drachmas tres.
 Aluminis sesquidrachmam.
 Aquae fontanae . . libras quinque.
 Decoque ad librarum trium cum dimidia
 remanentiam et colaturae adde
 Mellis rosati sesquiunciam.
 Misce bene. (Wür.)
 ℞. Ligni Quassiae . . drachmas duas.
 Lichenis Islandici . drachmas sex.
 Aquae uncias tredecim.
 Decoque ad unciarum decem remanen-
 tiam et adde
 Extracti Myrrhae drachmam unam.
 Tartari stibiati grana duo.
 Oxy mellis scillitici unciam unam.
 Gabe, alle zwei Stunden einen Eßfel.
 (Au.)
 ℞. Lichenis Islandici . . uncias duas.
 Boleti salicis,
 Summitatum Millefolii,
 Florum Salicariae,
 Passularum minorum,
 singularum semunciam.
 Harum specierum semunciam coque
 cum Aquae octario uo. (Au.)

Gelatina s. Mucilago Lichenis Islandici.
 (Ams. An. B. Bel. BorC. Fenn.
 Ful. Gal. Han. HassP. Li. Lus. Sax.
 Suec. Wür. Au. Ca. Fi. Huf. T.)

- 1) Ohne den bitteren Stoff.
 ℞. Lichenis Islandici Aquae alcalina
 abluti libram unam.
 Aquae fontanae . . libras duodecim.
 Decoque ad dimidium, cola, expri-
 me et ad locum frigidum repone, ut
 in gelatinam abeat. (Suec.)
 Han. Lichenis Aqua alcalina loti un-
 cias duas, Aquae uncias triginta ad sex
 redactas et quatuor librarum Sacchari
 additionem.
 ℞. Lichenis Islandici partem unam.
 Aquae frigidae . . . partes octo.
 Macera per semihoram, liquidum re-
 jice et residuo infunde
 Aquae . . . partes triginta duas.
 Decoque ad dimidium, tunc ad mel-

lis consistentiam evaporatum in locum
 frigidum repone. (Sax.)

Gal. Ca. Fi. et T. coquere lente ju-
 bent Lichenis uncias duas in Aquae
 sufficiente quantitate, liquidum rejice-
 re, coquere deinde bis residuum in
 Aqua (unciis duabus), decocta conjun-
 gere, addere iis Ichthyocollae solutae
 drachmam unam et Sacchari albi un-
 cias quatuor, colare, clarificare et eva-
 porando ad semilibrae remanentiam
 consumere; — HassP. Lichenis Islan-
 dici uncias tres. Aquae fervidae quan-
 tum sufficit, infunde et rejice aquam,
 lichenem coque in Aquae libris tribus
 ad unciarum decem remanentiam, quae
 leni igne ad sex evaporent.

2) Mit dem bitteren Stoff.

- ℞. Lichenis Islandici . libram unam.
 Aquae libras viginti.
 Decoque ad librarum sex remanen-
 tiam, cola fortiter exprimendo et in
 locum frigidum seponere. (Fenn.)

BorC. Lichenis unciam unam et
 Aquae uncias duodecim ad octo reda-
 ctas; — Huf. Lichenis quantum satis
 ut Aquae quantitas arbitraria in mucil-
 aginam redigatur; — Au. Lichenis un-
 ciam unam et duodecim Aquae ad octo
 redigendas.

- ℞. Lichenis Islandici . . uncias tres.
 Aquae libras quatuor.
 Decoque ad tertiae partis remanen-
 tiam, cola, exprime, vaporando ad li-
 bram unam consume et adde
 Syrupi cujuslibet . . uncias tres.
 Misce bene. (Au.)
 ℞. Lichenis Islandici . sesquiunciam.
 Aquae libras duas.
 Decoque ad colaturam unciarum sex
 et adde

Sacchari albi . . uncias quatuor.
 Ad syrupi spissi consistentiam reda-
 cta refrigerant. (Ams. An. B. Bel. Li.
 Lus.)

· Eo modo procedit *Regnault*, prae-
 scribens Lichenis uncias sex, Aquae
 octarios tres, quadrantem horae ebulli-
 tionis, colaturae evaporationem ad
 octarium usque, additionem Sacchari
 unciarum sex et coctionem ad syrupi
 spissi consistentiam; — *Idt* et *Cheval-
 lier* coquere proposuerunt in globo
 stanneo cochlea instructo, in balneo
 aquae, Lichenis Aqua calida loti unciam
 unam cum Aquae unciis quinque per
 horas tres, decoctum colare et expri-
 mere, addere deinde colaturae Sacchari
 unciam unam, lente ad unciarum qua-
 tuor liquidi remanentiam consumere,
 in ollam effundere et postquam concre-
 verint pelliculam in superficie forma-
 tam tollere. (GalF.)

3) Mit dem bitteren und einem abstringirenden Stoffe.

℞. Lichenis Islandici,
Musci pulmonarii,
Fungi Melitensis,
singulorum drachmas sex.

Aquae . . . quantum sufficit.
Decoque ad colaturae sesquibrae remanentiam, inspissa deinde ut fiat gelatina, cui adde

Sacchari rosati . . . sesquiunciam.
Misce bene. (Wür.)

℞. Lichenis Islandici . . . sesquiunciam.
Musci albi querni,
Petalorum Rosarum,
Radici Polygalae amarae,
singulorum semunciam.

Ichthyocollae . . . unciam unam.
Aquae sufficientem quantitatem.
Coque per horas duas et adde colaturae

Elaeosacchari Citri . . . uncias duas.
Misce bene. (Au.)

Ful. Lichenis Islandici uncias tres,
Fungi Melitensis unciam unam, Aquae
libras quatuor ad tertiam partem redactas, evaporationem colaturae ad consistentiam aptam et additionem Syrupi Sacchari unciarum trium.

Diese Gallerte ist nach der ersten Formel analeptisch und der Eßhrung unterworfen, tonisch nach der zweiten, und abstringirend und selbst blutstillend nach der dritten. — Gabe, zwei bis sechs Eßfel.

Gelatina Lichenis cum China. (Gal.)

℞. Lichenis Islandici . . . uncias duas.
Ichthyocollae . . . drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit.

Coque lichen leviter in aqua, qua rejecta, coque denno bis e serie, duobus decoctis adde ichthyocollam separatim dissolutam et

Syrupi Chinae vinosi . . . uncias sex.
Post levem ebullitionem cola, evaporatione pro parte dimidia consume et ad refrigerandum reponere.

Gelatina Lichenis opiata.

℞. Lichenis Islandici,
Rasurae Cornu Cervi,
singulorum semunciam.

Aquae uncias octo.
Decoque ad unciarum quatuor remanentiam et adde colaturae
Syrupi Opii unciam unam.

Pasta lichenifera s. cum Lichene Islandico. (GalH. Sax.)

℞. Lichenis Islandici . . . libras duas.
Sacchari albi,
Gummi Senegalensis,
singulorum libras octo.

Extracti Opii gummosi
drachmas duas.
Aquae Florum Aurantiorum . . . semilibram.

Coque lichen in Aqua per aliquot tempus; liquido rejecto, coctionem continua, colaturam cum saccharo et gummi separatim dissoluta commisce et ad mellis spissi consistentiam evaporatis adde extractum in aquae florum aurantiorum parte una solum, evaporationem continua, addendo aquae aromaticae quod restat, et coque donec massa non amplius manui adhaereat. (GalH.)

℞. Gelatinae Lichenis Islandici . . . partes duodecim.
Sacchari pulverati . . . partem unam.
Gummi Arabici pulverati . . . partes duas.

Misce saccharum et gummi cum gelatina adhuc calida. (Sax.)

Trochisci Lichenis Islandici. (GalF. GalH.)

℞. Lichenis libram unam.
Aqua frigida abluti coque cum
Aquae libris sex
per sexagesimas viginti; colaturae adde
Sacchari albi 1 bram unam.
Evaporata lente ad siccum pulvera;
hujus pulveris et Sacchari albi partes
aequales commixtae cum Aquae sufficiente quantitate in pastam redige in trochiscos dividendam.

Electuarium incrassans. (Wür.)

℞. Gelatinae Lichenis Islandici (form. Wir.) uncias duas.
Gummi Tragacanthae unciam unam.

Radici Consolidae majoris pulveratae drachmas tres.
Conservae Rosarum rubrarum drachmas sex.

Syrupi Caputum Papaveris quantum sufficit.

Jus pectorale s. Decoctum cum carne pectoralis. (Ca.)

℞. Lichenis Islandici . . . semunciam.
Helicum (omatia) alborum no. 6,
Cordis vervecini partem dimidiam.
Pulmonis vitulini concisi uncias quatuor.

Aquae sesquioctarium.
Coquendo partem tertiam consume.

Hydromel anticatarrhale. (Ca.)

℞. Lichenis Islandici Aqua bulliente abluti uncias duas.
Foliorum Hyssopi semunciam.
Hydromellis libras duas.
Macera per plures dies, cola et adde

Sacchari albi . . . uncias tres.
 Filtra denuo.

Lignum Agallochum.

Lignum Agallochi veri, Xylaloës; Aloëholz, Arabischesholz; Bois d'Aloës ou de Calambac, de Calembouc (*Gal.*); Calumbuk, Agha luchia (*Ar.*); Aggur, Agor (*Beng. Hin.*); Sukkiang (*C.*); Chin hiam (*Co.*); Aghir (*Duk.*); Legno aloe, AgaHocho, Xilaloe (*I.*); Udhndi (*Pe.*); Pae de aloës (*Lus.*); Aguru (*Sa.*)
 Br. Fer. His. Wir. A. Fi. G. M. Sp.

Dieses Holz ist knotig, sehr schwer, berb, fettig und besteht fast ganz aus Harz; es ist außen röthlichbraun, auf der Durchschnittsfläche grauer und mit schwarzen Flecken gezeichnet. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen bitteren Geschmack. Es brennt unter Verbreitung eines sehr angenehmen Geruchs.

Man leitet es von Excoecaria Agallocha; L., einem Baume (Dioecia Triandria, L.; Euphorbiaceae, J.) Cochinchina's her. (*Rumph. Amb. II. t. 79. f. 80.*) Tonisch, reizend.

Species cordiales temperatae. (Wir.)

℞. Sericei crudi usti,
 Eboris ad albedinem usti,
 Corallii rubri,
 — albi, singulorum semunciam.
 Margaritarum praeparatarum
 sesquinciam.

Radicis Doronici,
 — Behen alb,
 — rubri,
 singulorum drachmas tres.

Ligni Agallochi . . . semunciam.
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Ossis cordis cervini,
 singulorum drachmas tres.

Hyacinthi,
 Smaragdi,
 Sapphiri,
 singulorum drachmam unam.
 Croci . . . scrupulos duos.

Fiat pulvis, cui adde
 Foliorum Auri,
 — Argenti,
 singulorum quantum vis.

Ein abgemessenes Präparat, welches man ehemals von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme bei bösartigen Fiebern, Herzklöpfen und Ohnmachten von Furcht gab.

Extractum Ligni Aloës s. Agallochi.
 (Br. Pal. Wir.)

℞. Ligni Agallochi . . . quantum vis
 Alcoholis concentrati
 quantum sufficit

ut lignum penitus extrahatur; tincturam in balneo aquae vaporationi subijce et quod, Alcoholis elicitio, restat, serva. — Man setze ehemals dieses Extract zu Hauptpulvern und Pillen. — Gabe, ein bis zwei Gran.

Tinctura s. Essentia Ligni Aloës s. Agallochi. (Br. His. Wir.)

℞. Rasurae Ligni Agallochi
 sesquinciam.
 Alcoholis concentrati semilibram.
 Post sufficientem macerationem filtra. (Br. Wir.)

His. Ligni partem unam et duodecim Alcoholis.

Reizend, für magenstärkend, auf den Uterus, gegen Kopfschmerz und analeptisch wirkend gehalten. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Lignum Aquilae.

Lignum Aspalathi; Adlerholz; Bois d'Aigle (*Gal.*); Legno d'Aquila, aspalato (*I.*)

Br. Wir. Be. Fi. G.

Dieses Holz ist schmutzig gelb, wenig harzig, faserig, bisweilen schwammig und schwer zu zerbeißen. Der Geschmack ist gewürzhast, aber nicht bitter. Der Geruch ist schwach, moschusartig.

Es stammt, wie man glaubt, von *Aquilaria ovata, Cav.*, einem Baume (Decandria Monogynia, L.), welcher in Ostindien wächst. (*Cav. Diss. bot. 7. p. 377. t. 224.*)

Ein wenig gebrauchtes Reizmittel.

Lignum Brasilense.

Lignum Brasilianum rubrum s. Fernambuci; Brasilienholz; Bois de Brésil, de Fernambouc (*Gal.*); Ibirapitanga (*Bras.*)

Br. Gal. Li. G.

Dieses Holz ist schwer, hart, geruchlos, und von wenig bemerkbarem Geschmack; die rothe Farbe desselben zeigt verschiedene Abstufungen.

Es kommt von *Caesalpinia echinata, Lamk.*, Brésillet (*Gal.*), einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, J.) Brasilien's. (*Piso Bras. p. 164. Ic. hert. Bild. I. 45. fig. 2.*)

Abstringirend, ehemals bei Diarrhoe angewendet, heutzutage aber außer Gebrauch.

Lignum Campechianum.

Lignum Campechiense s. Campechense s. Campecanum s. Brasilianum rubrum s. Sappan s. veruleum; Campescheholz,

Blauholz; Bois de Campeche (*Gal.*); Logwood (*Ang.*); Campektraet (*D.*); Palo de Campeche (*His.*); Campechehout (*Bel.*); Legno di Campaggio (*I.*); Niebieskie drzewo (*Pol.*); Pao de Campeche (*Lus.*); Campektraed (*Suec.*).
Ams. An B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. M. Par.*

Das Campecheholz, welches wir ohne Rinde und Bast erhalten, ist hart, sehr dicht, schwer und außen graulichbraun. Die frische Durchschnittsfläche hat eine dunkelrothe, etwas in's Gelbliche ziehende Farbe mit der Länge laufenden schwärzlichen Adern. Quers durchgefägt zeigt es kleine, wellenförmig gebogene, dunkelrothe Ringe. Der Geschmack ist süßlich, abstringirend, hintennach etwas bitter. Es färbt den Speichel bläulichroth.

Es kömmt von Haematoxylon Campechianum, L., einem Baume (*Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, J.) Südamerica's. (Blackw. t. 493. Plenck t. 329. Bern. bild. III. 43. f. 2. Desc. Pl. Ant. I. 73.)*

Chevreul hat darin einen besonderen färbenden Stoff, das Hamatoxylin oder Hamatin (*Haematoxylinum, Haematinum, Hématine (Gal.)*) entdeckt.

Abstringirend, tonisch.

Decoctum Haematoxyli s. Ligni Campechiani s. Campechensis. (*B*. Ful. His. Wür. E. Sa. Sw.*)

℞. Ligni Campechiani unciam unam. Aquae libras quatuor.

Digere primum, tunc coque ad dimidium remanentiam usque et cola. (*His.*)

B et E. Ligni drachmas duas ad quatuor, Aquae libram unam et decoctionem ad unciarum sex colaturae remanentiam; — Sa. Ligni unciam unam et Aquae quantum satis ad colaturae librae unius remanentiam; — Sw. Ligni raspati unciam unam, Aquae libram unam, reductionem ad dimidium et si necesse est, additionem Tincturae Chinae unciae unius et Tincturae sedativae guttarum triginta; — Ful. Ligni unciam unam, Aquae libras duas et decoctionem ad dimidium.*

RC. Ligni rasi sesquunciam, Aquae fontanae libras duas ad unam decoquere et sub finem addere Corticis Casiae drachmam unam.

℞. Rasurae Ligni Campechiani uncias duas.

Aquae fontanae libras quatuor.

Decoque ad librarum duarum cum dimidia remanentiam et daue

Alcoholis uncias quatuor.

Cinnamomi scrupulos quatuor.

Liquorem, post unam vel duas ebullitiones cola. (Wür.)

Abstringirend, bei Durchfall, chronischer Ruhr, Leberfluß und Blutungen empfohlen. — Gaben, eine bis zwei Unzen alle vier Stunden und öfter.

Extractum Ligni Campechiani s. Campechensis. (*Am. Du. Bor. Bor4. Ed. Ful. Han. HassP. Lon. LonN. Pol. RC. Sax. Wür. C.*)

℞. Ligni Campechiani partem unam. Aquae communis . . . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor, coque deinde per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquores commixti, post viginti quatuor horarum sepositionem, ad aptam consistentiam evaporent. (Sax.)

℞. Rasurae Ligni Campechiani partem unam.

Aquae fontanae partes octo.

Coquendo ad dimidium redacta cola exprimendo; tunc liquor ad massae pilularis consistentiam evaporet. (Am. Du. Ed. C.)

Lon. et LonN. Ligni libram unam, Aquae ferventis congiunium unum per horas 24 macerare, tum ad octarios quatuor decoquere et liquorem adhuc calentem colatum ad idoneam crassitudinem inspissare jubent; — RC. ut extractum Gentianae luteae I. p. 594.

℞. Ligni Campechiani partem unam. Aquae bullientis . . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola cum expressione; residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem coletur et exprimatur; tunc liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni calore ad extracti consistentiam evaporent. (Bor.)

Han. coquere jubet binis vel ternis vicibus sequentibus Ligni partem unam in Aquae sex et colaturas conjunctas vaporando inspissare; — Pol. coquere quater per horae quadrantem quaque vice cum Aquae partibus octo; — Bor4. ut extractum Cascariillae I. p. 427; — HassP. ut extractum Colombo I. p. 561.

℞. Rasurae Ligni Campechiani quantum vis.

Alcoholis quantum sufficit ut lignum quatuor digitorum crassitiam tegatur; stent blando calore in digestionem et decanthentur; residuum cum Aqua per horam unam cocto et cum expressione colato, colatura in balneo aquae ad mellis consistentiam evaporet, addita pedetentim tinctura et inter continuam agitationem ut mas-

sa homogenea neque grumosa obtineatur. (Ful. Wür.)

Sabe, eine bis zwei Drachmen, in einem passenden Behälter.

Potio adstringens. (E.)

R. Extracti Ligni Campechiani drachmas tres.

Aquae uncias septem.

Tincturae Catechu drachmas duas.

Sabe, zwei Eßfel alle drei oder vier Stunden, bei Durchfall und Ruhr.

Elixir adstringens. (Ham. Au.)

R. Extracti Ligni Campechiani drachmas duas.

Aquae destillatae uncias quatuor.

Elixir acidi Halleri drachmam unam.

Misce exacte. (Ham.)

R. Extracti Ligni Campechiani semunciam.

Vini rubri uncias duas.

Sabe, alle zwei Stunden sechsßig Tropfen. (Au.)

Mixtura adstringens. (Sw.)

R. Extracti Ligni Campechiani drachmas tres.

Aquae Cinnamomi spirituosae sesquijunciam.

Contere et adde

Aquae uncias septem.

Tincturae Kino drachmas duas.

Sabe, alle vier oder fünf Stunden zwei Eßfel.

Lignum nephreticum.

Griechholz; Bois nephretique (Gal.); Palo nefritico (His.).

Br. Fer. Gal. His. Wir. *B. G. M. Sp.*

Dieses Holz ist sehr schwer, geruchlos und besteht aus einem weißlichen, sehr dicken Bast und einem rötlichen, sehr harten Kern; die Rinde ist leicht, innen faserig, auswendig schwammig und geborsten. Es hat einen nur wenig bemerkbaren, schwach pfefferartigen Geruch.

Einige leiten es von *Guilandina Moringa*, L., Andere von *Mimosa Unguis cati*, L., und noch Andere endlich, nach *Birey*, von einer *Cissampelos* her. Es kommt aus Neu-Spanien.

Ehedem schrieb man ihm kräftige harn-treibende Eigenschaften zu. Heutzutage ist es nur noch wenig in Gebrauch.

Lignum Rhodii.

Rosenholz, Rhodiser Holz; Bois de Rhodes, de rose, de Chypre (Gal.).

Ams. Bø. Br. Fer. His. Sax. Suec. Wir. *B. Br. G. M. Sp.*

Dieses Holz ist hart, schwer, gelbbraun, in der Mitte dunkler als im Umkreis und besteht aus concentrischen sehr dichten Schichten. Der Geschmack ist etwas bitter; der Geruch, besonders geriechen, stark rosenartig.

Es kommt von der Wurzel und bisweilen von dem untern Ende einer Pflanze, welche man allgemein für *Convolvulus scoparius*, L., hält, einen großen Strauch (*Pentandria Monogyn'a*, L.; *Convolvulaceae*, J.) der Canarischen Inseln. Manche Schriftsteller leiten es von *Genista Canariensis*, L., her; jedoch ist dieß weniger wahrscheinlich.

Reizend, wenig gebraucht.

Oleum Ligni Rhodii essentielle. (Br. Ful. Gal. Pal. Wir.)

R. Rasurae Ligni Rhodii partes decem.

Salis communis partem unam.

Aquae pyrae partes viginti.

Post horarum duodecim macerationem, fiat destillatio et oleum in fundo producti evimatur. (Gal.)

Br et Wir. Ligni partes sex, Salis unam et Aquae triginta sex; — Ful. Ligni unam, Aquae quatuor, absque sale et quatuor dies digestionis; — Pal. Ligni unam, Aquae sex et quinque vel sex dies digestionis.

Dieses Del wird mehr als Schönheits-, denn als Arzneimittel gebraucht.

Aqua Ligni Rhodii destillata. (Gal.)

R. Ligni Rhodii raspati partes duas.

Aquae communis partes sedecim.

Post duodecim horarum infusionem destillent partes octo.

Ligusticum.

Ligusticum Levisticum, L.; Liebstöckel, Baderkraut, Baderkrautliebstöckel, Barmutterkraut; Livèche (Gal.); Common Lavage (Ang.); Apich w. liky, Apich li-becek (B.); Lovstilk, Lohstik (D.); Ligustico (His.); Laveskruid (Hel.); Livistico (I.); Lakotnego ziele (Pol.); Levistico (Lus.); Liebstickie (Succ.).

A. Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *B. Br. G. M. Pid. Sp. Z.*

4 (Pentandria Digynia. L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze des gemäßigten Europa's. (Blackw. t. 275. Hayne VII. t. 6. Düss. off. Pfl. VI. 12. Zorn Ic. pl. t. 233.)

Man wendet die Wurzel und die Samen an.

Die Wurzel (radix Levistici s. Lybi-

stici s. Ligustici s. Laserpitii Germanici) ist einen Fuß lang, fleischig, sehr ästig, außen braungelb, innen weißlich und runzelig. Sie hat einen starken, durchdringenden, wenig angenehmen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher scharfen und widerlichen Geschmack.

Die Saamen sind länglich, gelb und süßfrüppig.

Extractum Ligustici s. Levistici. (Bor. Bor4. O. Pol. Sax.)

℞. Radicis Levistici,

Alcoholis, singulorum libras duas.
Aqueae communis libras novem.

Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholalem destillatione elice et residuum ad aptam consistentiam inspissa. (Pol.)

Bor. O. et Sax. Radicis partes duas,
Alcoholis tres et novem Aqueae; —
Bor4. ut extractum Aconiti I. p. 61.

Essentia Levistici. (Wir.)

℞. Radicis Levistici . . . uncias duas.
Seminum Levistici . . . unciam unam.
Alcoholis . . . uncias decem.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et filtra.

Reizend, für ein Gegengift, blähungs- und harntreibend gehalten. — Man hat sie bei Wassersuchten empfohlen.

L i g u s t r u m.

Ligustrum vulgare, L.; Fiquster; Troëne (Gal.); Liguster (Bel. D. Suec.); Alhena germanica (His.); Ligustro (I.); Zoba (Pol.); Altena (Lus.).

Wir. Sp.

Ein Strauch (Diandria Digynia, L.; Jasmineae, J.) Europa's. (Zorn Ic. pl. t. 112.)

Man wendet die Blätter und die Blüten an.

Die Blätter (folia Ligustri) sind lanzettförmig, ganz und ganzranbig, glatt, von bitterem und abstringirendem Geschmack.

Die weißen, angenehm riechenden Blüten bilden kleine Trauben.

Schwach abstringirend, nicht häufig gebraucht.

Aqua Ligustri, (Pal.)

℞. Florum Ligustri partem unam.
Aqueae . . . partes tres.
Destillet pars una cum dimidia.

L i l i u m.

Lilium candidum, L.; weiße Lilie; Lis blanco (Gal.); White lily (Ang.); Lilium bjle (B.); Hvide lilie (D.); Azucena blanca (His.); Witte lelie (Bel.);

Liglio bianco (I.); Silia (Pol.); Lirio branco (Lus.); Hwit lilja (Suec.).

Ams. An. B. Bel. Br. Per. Gal. Gen. HassP. His. Lus. Sax. Wir. Be. Br. G. M. Sp.

℥ (Hexandria Monogynia, L.; Liliaceae, J.) Eine ursprünglich in der Levante einheimische, in Gärten cultivirte Pflanze. (Blackw. t. 11. Hayne VIII. 26. Plench t. 273. Zorn Ic. pl. t. 462.)

Man wendet die Zwiebel, die Blüten und die Staubbeutel an.

Die Zwiebel ist eirund, gelblich, außen schuppig, unten mit dicken büscheligen Fasern besetzt. Sie hat keinen Geruch, der Geschmack ist etwas scharf.

Die Blüten bestehen aus fünf weißen, gerieften Blättern von einem angenehmen, durch Trocknen sich verlierenden Geruch.

Die Staubbeutel sind länglich und gelb.

Conserva Florum Liliorum alborum.

(Gen.)

℞. Petalorum Liliorum alborum

partem unam.

Sacchari albi . . . partes tres.
Contere.

Pulpa Lilii. (Gal. T)

℞. Bulborum Liliorum mundatorum quantum vis.

In chartam involutos coque sub cinere calido donec facile inter digitos conterere possint; partibus istic remotis contunde reliqua in mortario marmoreo ut fiat pulpa, per cribrum arcte textum trajicienda.

T. Bulbos pastae farinae alicujus cerealis involutos in furno coquere jubet.

Aqua Liliorum. (Gal. Gen. Pal. T.)

℞. Florum recentium Liliorum

partem unam.

Aqueae . . . partes quatuor.

Destillet dimidia pars. (Gal. I.)

Pal. Florum partem unam et tres Aqueae; destillet pars una cum dimidia; — Gen. Florum libras quatuor et Aqueae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent librae sex.

Oleum Liliorum alborum. (Ams. An. B. Bel. Br. Gal. HassP. His. Pal. Sar. Wir. T.)

℞. Petalorum Liliorum recentium

partem unam cum dimidia.

Olei Olivarum . . . partes tres.

Digere in balneo aquae per dies duos, refrigerata exprime et macerationem repete. (Sar.)

HassP. Florum libram unam, Olei sesquibrum, digere ad humidam evaporationem, oleum exprime et refrigeratum serva; — Gal. Petalorum partem

unam, Olei quatuor et tres macerati-
ones sequentes quarum postrema per
menses tres producatur.

℞. Petalorum Liliorum partem unam.

Olei Olivarum . . . partes quatuor.

Post a'quot horas digestionis in aquae
balneo, exprime. (An. B. Bel.)

℞. Petalorum Liliorum partem unam.

Olei Olivarum . . . partes tres.

Macera per dies aliquot in loco ca-
lido, tunc coquendo humidum consume
et cola cum expressione. (Amis, His.)

T. Florum recentium uncias quindecim
cum Olei Olivarum libris quinque
solis calore per 3 vel 4 dies macerare,
filtrare, exprimere, oleo filtrato, novos
flores addere et ita macerationem his
repetere, supremam per mensem cir-
citer protrahendo, filtrare tunc, expri-
mere et oleum post aliquot dierum se-
positionem clarificatum decanthare.

℞. Petalorum Liliorum;

Olei Olivarum,

singulorum partes aequales.

Coquendo humidum consume et ex-
prime. (Pal.)

℞. Petalorum Liliorum . . . partes duas.

Olei Olivarum . . . partes tres.

Post octo dies digestionis coque et
exprime. (Br. Wir.)

Erweichend, für schmerzstillend gehalten.

L i n a r i a .

Zwei Pflanzen dieser Gattung kommen
in den Pharmacopöen vor:

1) *Linaria spuria*, Mill.; Bastardblein-
kraut; Linaire bâtarde. (Gal.)

Gal. Sp.

⊙ (*Didynamia Angiospermia*, L.;
Scrofulariae, J.) Eine in ganz Europa
gemeine Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 913.)

Man wendet das blühende Kraut an;
es besteht aus einem ästigen Stängel mit
behaarten, eirunden, ganzen Blättern und
gelben Blumen mit violetter unterer Lippe,
welche einzeln in den Blattachseln auf lan-
gen fadenförmigen Stielen sitzen.

2) *Linaria vulgaris*, Moe.; gemeines
gelbes Flachskraut, Beintraut, Frauenflachs;
Linaire commune (Gal.); Common
toad flax (Ang.); Vild torslemand (D.);
Linaria (His.); Linaria, Lino selvatico,
Urinaria (I.); Het gemeene vlags-
kruid (Bel.); Lennek pannig maigi
(Pol.); Flyschblomster (Succ.).

Ba. Bor. For4. Br. Fer. Ful. Gal.
Gen. Han. HassP. His. Li. O. Sax.
Wir. Re. Br. M. Sp.

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze.
(Blackw. t. 115. Zorn Ic. pl. t. 442.)

Man wendet das blühende Kraut (herba
et flores *Linariae* s. *Antirrhini*) an; es

besteht aus einem einfachen glatten Stän-
gel mit vielen lanzettförmigen, sitzenden,
dlaugrünen Blättern und gelben, eine dichte
endständige Kehre bildenden Blüthen. Es
hat einen etwas unangenehmen Geruch,
welchen es durch Trocknen verliert. Der
Geschmack ist bitter und widerlich.

Linimentum antihæmorrhoidale, Un-
guentum de *Linaria*. (Ba. Bor. Bor4.
Br. Han. HassP. Li. O. Sar. Sax.
Wir. Pic. Sp.)

℞. Herbae recentis *Linariae* cum floribus . . . libram unam.

Axungiae Porci . . . libras duas.

Coque lente donec humidum evanuerit,
cola et exprime. (Ba. Bor. Bor4.
Han. HassP. O. Sax.)

Br. et Wir. Herbae et Axungiae partes
aequales; — Li. Herbae partem
unam et Adipis tres; — Pic. quantitates
non indicat.

℞. Herbae *Linariae* uncias duodecim.

— Sedi minoris uncias duas.

— Hyoscyami unciam unam.

Butyri . . . uncias octodecim.

Macera per dies aliquot, coque tunc
ad humidum usque consumptionem et
cola exprimendo. (Sp.)

℞. Herbae *Linariae* cum floribus,

Axungiae Porci,

singularum libram unam.

Coque donec humidum evanuerit,
cola cum expressione et adde

Olei Ovorum . . . semunciarum.

— seminum *Hyoscyami* expressi
drachmas duas.

Succi Sedi minoris drachmas tres.

Misce. (Sar.)

L i n u m .

Zwei Arten dieser Pflanzengattung wer-
den in der Medicin angewendet:

1) *Linum usitatissimum*, L.; Lein;
Lin ordinaire (Gal); Flax (Ang.); Buz-
ruk (Ar.); Len. (B. Pol.); Haer (D.);
Ulsikebinge (Duk.); Lino (His. I.); Ti-
si, Pahaha (Hin.); Vlasch (Bel.); Bid-
geramini (Mal.); Tokhemkutan (Pe.);
Linhaca (Lus.); Uma, Atasi (Sa.); Lin
(Succ.); Alleverei, Serru sanulverei
(Tam.); Alivitulu (Tel.)

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer.
Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass.
HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.
Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wür.
WW. X. He. Br. C. Fi. G. M. Par.
Pid. Sp. Z.

⊙ (*Pentandria Digynia*, L.; *Lineae*,
Cand.) Eine wahrscheinlich im Orient ur-
sprünglich einheimische, durch einen großen

Zeit Europa's verbreitete Pflanze. (Blackw. t. 160. Plenck t. 243. Hayne VIII. t. 17. Düss. off. Pl. VIII. t. 6. Bert. Bild. II. 55. f. 1. Zorn Ic. pl. t. 251.)

Der Saame (semen Lini) ist braun, glänzend, eiförmig, länglich, spitzig, platt, ganz glatt, an den Rändern scharf. Er enthält unter einer schleimigen Schale einen weissen, öligen Kern von unangenehmem Geschmack.

Dieser Kern enthält viel Del, die Schale dagegen Schleim. Die Saamen sind erweichend.

2) *Linum catharticum*, L.; Purgirflachs; Lin purgatif (Gal.); Purging flax (Angl.); Liven vildhaer (D.); Cantilagua (His.); Purgierflasch (Bel.); Lino purgativo (I.); Linho purgante (Lus.); Villhaer (Suec.).

Du. Gal. Gen. Li. Lon. LonN. R. Sax. Wir. Be. C. M. Par. Sp.

© Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 368. Plenck t. 244. Hayne VIII. t. 18. Zorn Ic. pl. t. 210.)

Man wendet das Kraut (herba Lini purgativi s. cathartici) an; es besteht aus einem dünnen in gabelige Zweige getheilten Stängel mit eiförmigen, entgegengesetzten, glatten Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen sehr bitteren, widerlichen Geschmack.

Ein wenig gebrauchtes Purgirmittel.

Farinae emollientes. (Gal. Sp.)

℞. *Farinae Seminis Lini*,

— *Foeni graeci*,
singularum partes aequales.

Misce. (Sp.)

Gal. *Farinae Lini*, *Frumenti* et *Hordei*, singularum partes aequales.

Species emollientes pro cataplasmate. (BorC. W.V.)

℞. *Furfuris triticei*,

Seminum Lini contusorum,
singulorum partes aequales.

Misce. (BorC.)

WW. *Seminis Lini partem unam*, *Farinae Frumenti tantidem* et *Furfuris triticei* duas.

Mucilago Seminum Lini. (Gal. Sar. Sw.)

℞. *Seminum Lini* . drachmas duas.

Aquae tepidae . . . sesquiunciam.

Digere super cinere calido per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola exprimendo. (Gal.)

Sw. Triturare jubet *Aquae bullientis* et *seminum*, singularum partes aequales; — Sar. Mäcerare per horas duodecim *Seminum partem unam* in *Aquae partibus decem*, coquere deinde et exprimendo colare.

Cataplasma emolliens. (Gal. GalM. Li. RC. ParC. Ra. Sw.)

℞. *Farinae Seminis Lini quantum vis*.

Aquae bullientis vel *Decocti Althaeae quantum sufficit* ut fiat *cataplasma*. (Sw.)

RC. *Farinae Lini quantum vis* cum *Aquae fontanae* vel *Lactis* sufficiente quantitate ad aptam crassitudinem coquere jubet.

Sw. praeterea coquere jubet per semihoram *Seminum Lini* quantitatem arbitrariam cum *Aquae* sufficiente quantitate, addendo *Micae Panis duri* quantum satis ut fiat *cataplasma*; — Ra. *Farinae Hordei* et *Lini*, singularum partes aequales et *Aquae* sufficientem quantitatem; — GalM. *Farinae Hordei*, *Frumenti* et *Lini* partes aequales et *Aquae* sufficientem quantitatem; — Gal. et ParC. *Farinarum emollientium* uncias quatuor, dilue in *decocti emollientis* quantitate sufficiente et coque tunc, addendo *pulpae specierum emollientium* uncias quatuor vel earum ipsarum specierum pulveratarum unciam unam; — Li. *Seminis Lini pulverati* et *Lactis vaccini bullientis* partes aequales commiscendas.

Infusum Lini s. Lini compositum s. Lini usitatissimi. (Am. B*. Ed. GalM. Lon. LonN. RC. Suec. Au. C. E. Fi. ParC. Ra. Sa. Sw.)

℞. *Seminum Lini contusorum* . . . unciam unam.

Liquiritiae contusae . . . semunciam.

Aquae bullientis . . . octarios duos.

Digere prope ignem per horas quatuor et cola. (Am. B*. Lon. LonN. Suec. Au. C. E. Sa. Sw.)

Fi. *Aquae libras duas*, caeterum ut antea; — Ed. *Liquiritiae drachmas duas*, *Lini unciam unam* et *Aquae libras duas*; — Ra. *Lini drachmas duas*, *Liquiritiae drachmam unam* et *Aquae libras duas*; — GalM. *Lini drachmas duas* cum *dimidia*, *Liquiritiae drachmas duas* et *Aquae* quantitatem sufficientem ut *librae duae colaturae obtineantur*; — ParC. *Lini*, *Liquiritiae*, singularum *drachmas duas* et *Aquae libras duas*; — RC. *Lini uncias duas*, *Liquiritiae semunciam*, *Aquae libras quatuor* infundere per horas tres et colare; interdum additur *Succus Citri* vel *Roob Oxycocci* vel *Oxymel simplex* vel *Saccharum purum* ad gratum saponem.

℞. *Seminum Lini* . . . sesquiunciam.

Pulveris Liquiritiae drachmas tres.

Aquae frigidae . . . libras tres.

Infunde, saepius agitando, et cola. (Sw*)

Erweichend, bei Reiben der Brust und bei Harnwege nützlich. — Man kann anberthaltlitzigen syrupus emulsivus oder Diacodion hinzusetzen.

Infusum Lini cathartici. (B*.)

℞. Herbae Lini cathartici . . . drachmas duas.
 Aquae bullientis . . . uncias duas.
 Infunde et cola. — *Schwach purg-*
rend. — Auf einmal.

Fomentatio emolliens. (Ra.)

℞. Seminum Lini . . . drachmas duas.
 Foliorum Malvae . . . uncias duas.
 Aquae libras duas.
 Coque et cola.

Balneum emolliens. (Ca.)

℞. Specierum emollientium . . . libras quatuor.
 Seminum Lini . . . semilibram.
 Aquae . . . sufficientem quantitatem.
 Coque leviter et cola.

Injectio mucilaginoso. (GalM.)

℞. Seminum Lini . . . drachmas sex.
 Coque leviter in
 Aquae . . . quantitate sufficiente
 ut librae duae colaturae obtineantur.

Potio leniens. (Sm.)

℞. Seminum Lini contusorum . . . drachmam unam.
 Aquae bullientis . . . uncias sex.
 Infunde, cola et post refrigerationem adde
 Syrupi Capiti Papaveris . . . drachmas quatuor.
 Aquae Florum Aurantiorum . . . drachmas duas.

Looch leniens. (Sm.)

℞. Seminum Lini contusorum . . . semunciam.
 Aquae libram unam (chopine).
 Coque ad syrupi consistentiam et adde
 Mellis rosati . . . uncias duas.
Oleum mucilaginosum s. de mucilagibus. (Gal. Sar. Sp. T. Vm.)

℞. Seminum Foenu graeci,
 — Lini,
 singulorum partem unam.

Olei Olivarium . . . partes octo.
 Semina contusa stent per dies duos in balneo arenae; tum cola, sepone et decantha. (Vm.)

℞. Seminum Foenu graeci,
 — Lini,
 Radicis Althaeae,
 singulorum libram unam.
 Aquae fervidae . . . libras decem.
 Digere, subinde agitando, per horas viginti quatuor, cola fortiter exprimendo et adde
 Olei Olivarium . . . libras duas,

Coque donec humidum sit evaporatum et cola absque expressione. (Gal. P.)

℞. Radicis receptis Althaeae uncias duas cum dimidia.
 — — Scillae semunciam.

Seminum Lini,
 — Foenu graeci,
 singulorum uncias duas.

Aquae . . . sufficientem quantitatem.
 Coquendo fiat mucilago, cui adde

Olei infusi Anethi,
 — — Chamomillae,
 — — Liliorum,
 singulorum uncias sedecim.

Coque ad humidum usque evaporationem et cola. (Sp.)

℞. Radicis Althaeae,
 Bulborum Liliorum alborum,
 Seminum Foenu graeci,
 singulorum unciam unam.

Aquae libras duas.
 Olei Olivarium,
 — Lini, singulorum libras duas.

Maceratis radice, bulbis et seminibus in Aqua ut mucilago extrahatur, olea ei admisce, coque lente ad totius usque humidum evaporationem, cola et adde

Florum Liliorum recentium,
 — Chamomillae,
 singulorum libram unam.

Post viginti quatuor horarum in balneo aquae digestionem cola et exprime. (Sar.)

Oleum Lini expressum. (A. Ams. Ba. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Br. Pid. Sw. T.)

In universum ita paratur, ut semina contusa sacco e tela confecto inclusa inter duas laminas stanneas frigide exprimantur; — Gal. contusa mollia reddi jubet expositione per octo sexagesimas aquae bullientis vaporis; — Bor. Bor4. et Li. prelum Aqua bulliente calefactum adhibent (Bor4. praeterea et oleum venale indicat); — Br. Pal. et Wir. pastam antequam exprimat, parumper torrere jubent; — T. Semina tosta, antequam exprimat, oleum, vaporis aquae bullientis exponere jubet *); — Fi. Semina contusa per cribrum trajicere, denuo contundendo in pastam fedigere, quae in vasi ferreo,

*) Condensatur magis, si cum parte septima vel octava ponderis sui Lithargyrii subtilis. pulv. ad colorem rubellum usque coquatur, tunc despumatum et separatione clarificatum decanthatur (*oleum coctum*).

charta interne oblecto immittantur; oleum expressum per chartam filtretur.

HassP. Oleum venale recens expressum indicat.

Dieses Del wird als ein specifisches Mittel gegen Seitenstechen, sowohl innerlich, zu einer halben bis ganzen Unze in Fleischbrühe, als äußerlich, warm mit Wollse auf die schmerzhafteste Stelle aufgeschlagen, angewendet.

Clysmma involvens s. oleosum s. emolliens s. commune. (Li. RC. Au. Ra. Sp. Sw.)

℞. Specierum emollientium

Aquae unciam unam.
libram unam.

Coque et colaturae adde

Olei Seminum Lini . unciās duas.

Misce. (Li. Ra. Sp.)

℞. Lactis vaccini,

Olei Lini,

singulorum unciās quatuor.

Misce. (Sp.)

Sw. Olei unciās duas et octo Decocti Seminum Lini; — Sw. Olei unciās quatuor ad sex et Decocti Hordei tantidem; — RC. Infusi Seminum Lini sine Glycyrrhiza libram unam, Olei unciam unam. Loco Infusi Lini recipi potest etiam Natri muriatici vel sulphurici semuncia vel Saponis sebacei drachmae duae, vel Decocti Hordei vel Avenae vel Radicis Althaeae vel Infusi Florum Chamomillae vel Aquae tepidae libra una.

℞. Herbae Malvae . drachmas duas.

Aquae quantum sufficit
ut unciā decem colaturae obtineantur; adde

Olei Lini unciam unam.

Misce. (Au.)

Liquiritia.

Man wendet unter diesem Namen die Wurzeln zweier zu einer Gattung gehörenden Pflanzenarten an:

1) *Glycyrrhiza glabra*, L.; Süßholz, Säktrienholz; Réglisse commune (Gal.); Liquorice (Ang.); Ussulus (Ar.); Lektorice, Sladky koren, Sladky drewo (B.); Wellmie, Olinde (Cy.); Lakrits (D. Suec.); Mittie luckerie (Duk.); Rogalizia (His.); Jetimadrum (Hin.); Zoethout (Bel.); Legorizia, Ligorizia (I.); Oyot manis (Ja.); Urat manis (Mal.); Bikhmekeh (Pe.); Korzen lakrecyawy czyli slodni (Pol.); Alcacaz (Lus.); Dubez solotko (R.); Madhuko, Yastimadhuka (Sa.); Addimodrum (Tam.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn.

Fer. Pul. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Sy. Z.

℥ (Diadelphia Decandria; L.; Leguminosae; J) Eine Pflanze, welche in den warmen und gemäßigten Gegenden Europa's wächst. (Hayne VI. 41. 42. Bert. Bild. IV. 37. f. 1. Fl. méd. VI. 293.)

Die Wurzel (radix Liquiritiae s. Glycyrrhizae) ist sehr lang, walzig, ästig, holzig, fingerdick, außen braungelbbaschgrau, innen gelblich und geruchlos. Sie hat einen zuckerartigen, etwas schleimigen Geschmack, welcher, wenn man sie lange Zeit kaut, bitter und etwas widerlich wird.

Sie enthält, nach Robiquet, Saamehl, Eiweiß, ein scharfes, flüchtiges Del, einen eigenthümlichen zuckerartigen Stoff, Glycyrrhizin (Glycyrrhizinum), Glycyrrhizine oder Succo-gomme (Gal.) genannt, und einen andern crystallisirebaren Stoff, ebenfalls besonderer Art, welchen man Agedoïdes (Agedoïde Gal.) nennt.

2) *Glycyrrhiza echinata*, L.; Igelstossensüßholz; Réglisse épineuse (Gal.).

Bor. Bor4. D. Fenn. Han. Hass. O. R. M.

℥ Eine Pflanze Affen's und des südlichen Europa's. (Jacq. Hort. Viudob. I. p. 41. t. 95.)

Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen, ist aber dicker.

Species bechicae. (B.)

℞. Radicis Cheiri montani

— unciās duas.

Herbae Veronicae,

— Hederae terrestris, singularum manipulum unum.

— Hyperici . pugillos tres.

— Centaurii minoris

pugillos duos.

Seminum Foeniculi drachmas tres.

Conci-a et contusa misce.

Species pro decocto s. pro potu infantum s. pectorales. (Pal. Wir. Sp.)

℞. Rasurae Cornu Cervi

— unciās sedecim.

— Eboris . unciās quatuor.

Radicis Liquiritiae

— unciās duodecim.

— Polypodii unciās quatuor.

Florum Tiliae . . unciās duas.

Caricarum,

Siliquae dulcis,

— singularum unciās octo.

Seminum Anisi,

— Poeniculi,

— singularum unciās quatuor.

Concisa miscæ. (Sp.)

℞. Rasuræ Cornu Cervi libras duas.

— Eboris . . . libram unam.

Radici Liquiritiæ libras quatuor.

— Polypodii . . . libras duas.

Caricarum pinguium libras quinque.

Dactylorum,

Jujubarum, singulorum libras duas
cum dimidia.

Seminum Coriandri,

— Foen'culi,
singulorum sesquilibram.

Florum Boraginis,

— Buglossi,

— Violarum,
singulorum uncias duas.

Concisa miscæ. (Pal.)

Wir. Cornu Cervi libras duas, Eboris semilibram, Liquiritiæ et Polypodii, singulorum tantidem, Caricarum, Siliquæ duleis, singulorum libram unam, Foeniculi, Anisi, singulorum semilibram, Florum Tiliæ uncias quatuor et Cornu Cervi usque libram unam.

Succus Liquiritiæ crudus s. Extractum Liquiritiæ crudum, Jus Liquiritiæ. (Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. Ed. Ful. GalM. Han. HassP. O. Pol. Sax. Suc. G. M.)

Dieser Saft kommt im Handel in fast walzenförmigen, etwa 6 Zoll langen, höchstens einen Zoll dicken Stücken in Torbeerblätter eingewickelt, vor; er hat einen süßen und zugleich etwas bitteren Geschmack.

Es ist ein Extract, welches man erhält, indem man die Abkochung der Süßholzwurzel bis zur Trockenheit abdampft. Immer ist er mehr oder weniger verbrannt und enthält oft etwas Kupfer. Man bezieht ihn aus Sicilien und besonders aus Spanien.

Succus Liquiritiæ depuratus. (B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. Sax. Vm.)

℞. Succu Liquiritiæ . . . quantum vis.

Solve in Aqua calida, trajice per pannum et ad massæ solidæ consistentiam consume, quæ supra laminam marmoream oleo obductam circumvoluta, in cylindros parvos formata, et prope ignem siccata in bacillos duorum ad triam pollicum longitudine incidatur. (Vm.)

Bor. Bor4. et Hass.P Succus in frustula discissus in Aqua communi solvatur, solum per pannum laneum colatum primo leni igne, tandem in balneo vaporis ad extracti densitatem inspissetur; residuum loco calido siccatum in pulverem redige; — Ba. Macerare jubet Succum unam in Aquæ duodecim per horas viginti quatuor,

colare cum expressione et colaturam vaporando ad siccum consumere.

Succus Liquiritiæ cum Gummi s. gummosus. (Vm.)

℞. Gummi Arabici,

Succi Liquiritiæ,

singulorum partes æquales.

Dissolve quodque separatim in Aqua et solutiones per pannum trajctas atque commixtas vaporando atque semper agitando, ad massæ solidæ consistentiam redige.

Succus Liquiritiæ anisatus. (Vm.)

℞. Succu Liquiritiæ depurati et refrigerentis

uncias quadraginta octo.

Olei Anisi . . . drachmas tres.

Commisce intime, et in baculos teretes supra laminam marmoream oleo obductam forma, quos siccatis in parva frusta concide.

Extractum Succu Liquiritiæ. (Vm.)

℞. Succu Liquiritiæ in frusta minima concisi . . . quantum vis.

Aquæ frigidæ . . . pondus duplum.

Macerare per tres dies in vase amplo ac parum profundo, decantha absque agitatione, filtra et ad extracti consistentiam inspissa.

Extractum Glycyrrhizæ. (A. An. Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. HassP. His. Li. Lon. LonN. Pol. R. RC. Sar. Wür. C. Pid. T. Vm.)

℞. Radici Liquiritiæ . libram unam.

Aquæ bullientis . libras sedecim.

Infunde per horas duodecim, cola, decantha et vaporando, sub finem in aquæ balneo, ad extracti consistentiam inspissa. (His.)

An. et Bel. infundere jubent pro duabus vicibus Liquiritiæ radici libram unam in Aquæ libris octo singula vice et colaturas conjunctas evaporando inspissare; — Fer. infundere per dies duos Liquiritiæ uncias duas in Aquæ lbris decem et colaturam vaporando inspissare.

HassP. ut extractum Cardui benedicti I. p. 418; — RC. ut extractum Gentianæ luteæ I. p. 694; — T. ut extractum Columbo I. p. 561 ubi pro coque macera est legendum.

℞. Radici Glycyrrhizæ quantum vis.

Contunde, Aquæ pauillum addendo, in mortario; succum expressum et sepositione depuratum in balneo Aquæ ad extracti consistentiam consume. (Ful. His.)

℞. Radici Liquiritiæ libram unam.

Aquæ fontanæ . . . libras sex.

Macera in loco calido per dies quatuor et coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam inspissa. (Br.)

Sar. infusionem pro tertia parte consumere, colare et evaporare; — Lon. LonN. et C. Liquiritiæ libram unam in Aquæ octariis octo macerare per horas viginti quatuor et coquere ad quatuor remanentiam, tunc ad idoneam crassitudinem inspissare; — Li. Radicis libras tres infundere in Aquæ bullientis novem per horas duodecim, coquere deinde parumper et colaturam per horas sex sepositam inspissare.

℞. Radicis Liquiritiæ partem unam.

Aquæ . . . partes octo.
Coquendo dimidium consume, cola exprimendo et colaturam blando igne ad massæ pilularis consistentiam redige. (Du.)

R. Coquere jubet Radicis siccatae partem unam in Aquæ sex vel unam Radicis recentis in Aquæ duobus vel tribus, colare exprimendo et liquorem probe inspissare; — D. Coquere Radicis partem unam in octo Aquæ, colare cum expressione et colaturam ad massæ pilularis consistentiam consumere; — Wür. Coquere Radicem in Aquæ sufficiente quantitate per horam unam et decoctum decanthatum ad mellis spissi consistentiam redigere; — Pid. Coquere Radicis libram unam in Aquæ sex et colaturam sepositone depuratam in balneo aquæ evaporare;

℞. Radicis Liquiritiæ libram unam.
Aquæ frigidae . . . libras decem.

Macera per dies duos, subinde agitando, cola, sepone et decantha liquorem, qui tunc ad extracti consistentiam evaporet. (A. Pol.)

℞. Radicis Liquiritiæ grossiuscule pulveratæ . . . quantum vis.

Prelo de Réal immisam et Aqua frigida humectatam, post horas duodecim macerationis aquæ pressioni subjice ut tinctura exprimatur, quæ leni calore ad extracti consistentiam redigatur. (Vm.)

℞. Radicis Liquiritiæ libram unam.
Aquæ frigidae . . . libras quatuor.

Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; residuum itidem cum nova Aqua maceratum coletur; liquores mixti ad extracti consistentiam evaporent. (Gal.)

Pasta s. Gelatina s. Mucilago Liquiritiæ s. Glycyrrhizæ, Saccharum glycyrrhizatam, Glycyrrhiza lucida, Glutien pectorale. (A. B. Bor. Bor4. Br.

D. Gal. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Fi. Sp. Vm.)

℞. Radicis Liquiritiæ rasæ s. concisæ unciâs quatuor.

Aquæ bullientis . . . libras octo.
Macera per horas duodecim, cola et in colatura dissolve

Gummi Arabici

libras duas cum dimidia,

Sacchari albi . . . sesquilibram.

Colata iterum lente consume, donec guttula, supra laminam vitream frigidam abjecta in gelatinam concreascet; tunc pelliculâ sublata in cistulas e laminis ferreis, stanno obductis paratas et oleo inunctas effunde, leni calore sicca et in taleolas concide. (B. Bor. Han HassP. O. Pol.)

Bor4. Radicis unciâs duas, caeterum ut antea; — Li. Radicis unciâs duas, Aquæ libras quatuor cum dimidia, Gummi et Sacchari, singulorum libras duas; — R. Radicis unciâs octo, Aquæ libras quatuor, Gummi et Sacchari, singulorum libras duas cum dimidia; — Sax. Radicis partem unam, Aquæ viginti duas, Gummi novem et sex Sacchari; — Fenn. Radicis libram unam, Aquæ quantitatem sufficientem, Gummi libras tres et Sacchari libras duas cum dimidia; — D. Radicis unciâm unam, Aquæ libras quinque, Gummi libras quatuor et Sacchari libras duas; — Wür. Liquiritiæ unciâm unam, Aquæ libras quatuor, Gummi et Sacchari, singulorum unciâs sedecim; — Sp. Liquiritiæ unciâm unam, Aquæ centum viginti, Gummi sexaginta et Sacchari quadraginta.

℞. Radicis Liquiritiæ unciâs quatuor.

Aquæ . . . unciâs triginta duas.

Decoque ad unciarum viginti quatuor remanentiam et in colatura dissolve

Gummi Arabici . . . libras duas.

Sacchari albi . . . sesquilibram.

Coque leviter ad consistentiam requisitam. (Br.)

Suec. Radicis unciâs novem, Aquæ unciâs sedecim ad decem redigendas, Gummi et Sacchari, singulorum libras tres.

℞. Radicis Liquiritiæ semunciam.

Aquæ bullientis . . . libras tres.

Post horarum duodecim infusionem in colatura dissolve

Gummi Arabici . . . libram unam.

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Cola, vaporando dimidium consume, despuma et adde

Aquæ Florum Aurantiumum

semunciam,

In modulos effunde. (A.)

Fi. Easdem ingredientium quantitates sed gummi et saccharo in infusione dissolutis, despumare, colare, decoquere ad librum sex materiae remanentiam et ab igne remoto aquam florum aurantium addere jubet.

℞. Radicis Liquiritiae partem unam.
Aeque partes septuaginta sex.
Infunde radicem frigidè parte quarta, tunc calide reliqua aqua; post refrigerationem cola et in colatura solve

Gummi Arabici partes quadraginta octo.

Sacchari crystallisati partes viginti quatuor.

Albumine clarificata probe inspissa et in modulos effunde. (Vm.)

℞. Radicis Liquiritiae uncias quatuor.
Aeque libras quinque.
Post horas duodecim infusionis in colatura solve

Gummi Arabici loti,
Sacchari albi,

singulorum libras duas.

Per linteum arcte textum trajecta ad extracti consistentiam consume, subige tunc fortiter, pededentim pro libris quinque massae, addendo

Albuminum Ovorum . . . no. 12.
Aeque Florum Aurantium

uncias quatuor.

Inspissa lente et in tabulam marmoream Amylo conspersam extende. (Gal.)

Pal. et Wir. Radicis uncias quatuor, Aeque libras octo coquendo ad quatuor redigendas, Gummi libras duas cum dimidia, Sacchari tantidem et Albumina cum Aeque Florum Aurantium subacta no. 6.

Pasta Liquiritiae fusca s. anisata, Sacchari Liquiritiae de Blois. (Gal. Sp. T.)

℞. Extracti Liquiritiae,
Sacchari albi,

singulorum libram unam.

Gummi Senegalensis libras duas.
Radicis Iridis Florentinae

drachmam unam.

Olei essentialis Anisi grana viginti quatuor.

Dissolve gummi in Aeque sufficiente quantitate, solutionem cola et ei extractum adde, consume lente ad mellis consistentiam, adde pulverem iridis et continuam evaporationem ad extracti consistentiam, oleum supremum addendo. (Gal.)

Extracti, Sacchari et Gummi Arabici ut antea; Iridis Florentinae scrupulos duos et grana sex, Essentiae Anisi guttas octodecim.

℞. Gummi Arabici uncias triginta duas.

Aeque fontanae

sufficientem quantitatem.

Solutionem cola et in colatura solve

Succi Liquiritiae uncias novem.

Sacchari albi . . . uncias sedecim.

Evaporent lente ad syrapi spissi consistentiam; adde deinde

Pulveris Radicis Iridis Florentinae,

— — Inulae,

singulorum semunciam.

Vaporando continua, donec massa non ultra digitis adhaereat et adde

Olei essentialis Anisi

scrupulos duos.

Effunde in tabulam marmoream oleo obductam. (Sp.)

Pasta Liquiritiae opiacea s. cum Opio. (GalH.)

℞. Gummi Senegalensis,

Sacchari albi,

singulorum partes quingentas.

Aeque Florum Aurantium

partes triginta.

Extracti Liquiritiae frigide parati

partes sexaginta.

— Opii aquosi . . . partes duas.

Solutioni inspissatae gummi et sacchari infunde extracta antea in aeque parva quantitate dissoluta.

Tabellae Liquiritiae. (Vm.)

℞. Extracti Liquiritiae partem unam,
Sacchari super igne liquati

partes sedecim.

Extracto pulverato cum saccharo commixto fiant tabellae Amylo conspergendae.

Trochisci bechici s. bechici albi s. Glycyrrhizae s. e Glycyrrhiza, Confectio de rebecha. (Bor4. Ful. Li. Suec. Au. Sp.)

℞. Gummi Mimosae pulv. uncias duas.

Radicis Iridis Florentinae,

— Glycyrrhizae echinatae,

Seminis Foeniculi,

— Anisi, singulorum pulv. uncias quatuor.

Succi Glycyrrhizae depurati

libram unam.

Sacchari albi . . . libras novem.

Gummi Tragacanthae cum Aeque s. q. in mucilaginem redacti

quantum requiritur

ut fiat l. a. massa, in trochiscos formanda. (Bor4.)

℞. Pulveris Radicis Liquiritiae

unciam unam.

— — Iridis Florentinae semunciam.

— Sacchari crystallisati flavi libram unam.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit

ut fiant trochisci. (Li.)

- ℞. Pulveris Radicis Liquiritiae
drachmas tres.
— — Iridis Florentinae
drachmas sex.
— Amyli . . . semunciam.
— Sacchari albi . . . uncias octo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiant trochisci. (Suec.)

Ful. Liquiritiae uncias octo, Iridis
quatuor, Amyli unam cum dimidia,
Sacchari sex et Mucilaginem Gummi
Tragacanthae.

- ℞. Pulveris Radicis Liquiritiae
sesquiunciam.
— — Iridis Florentinae,
— Gummi Arabici,
singulorum semunciam.
— Sacchari albi
uncias quadraginta octo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
sufficientem quantitatem.

Fiant trochisci. (Sp.)

Baculi Liquiritiae albi. (Wir. Sp.)

- ℞. Gummi Arabici,
Specierum Diaereos simplicium,
— Diatragacanthae,
singulorum semunciam.
Radicis Liquiritiae,
Amyli, singulorum unciam unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiant baculi.

*Trochisci bechici citrini, Liquiritia
cocta citrina, Tabellae Glycyrrhizae
glabrae compositae.* (An. Pal. Suec. Wir.
Sp.)

- ℞. Radicis Liquiritiae,
— Iridis Florentinae,
singulorum unciam unam.
Crocī . . . scrupulos duos.
Sacchari albi . . . libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiant trochisci. (Pal. Wir. Sp.)

- ℞. Pulveris Radicis Liquiritiae
uncias octo.
— Gummi Tragacanthae com-
positi,
— Iridis Florentinae compositi,
singulorum sesquiunciam.
— Croci . . . scrupulos octo.
— Sacchari . . . libras sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiant trochisci. (Sp.)

Suec. Liquiritiae drachmas tres, Iri-
dis drachmas sex, Amyli semunciam,
Crocī scrupulos duos, Sacchari uncias

octo et Mucilaginem Gummi Traga-
canthae.

Bacilli Liquiritiae citrini. (O Sax. Wir.
Pid.)

- ℞. Sacchari albi partes duodecim.
Radicis Liquiritiae partem unam.
— Iridis Florentinae
partem quartam.
Crocī . . . partem octavam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiat massa mollis in baculos divi-
denda, qui super cribro siccentur. (O
Sax.)

- ℞. Sacchari albi . . . libram unam.
Radicis Liquiritiae unciam unam.
— Iridis Florentinae,
Amyli, . . . singulorum semunciam.
Crocī . . . semiscrupulum.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiant bacilli. (Wir. Pid.)

*Trochisci bechici nigri s. Liquiritiae
s. Glycyrrhizae s. Liquiritiae cum Gum-
mi, Tabellae Anisi compositae.* (Ans.
An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Han. Li. Lus.
O. Pal. Wir. Wür. Au. Br. C. Fi. Pid.
Sp. Sw. Vm.)

- ℞. Succī Liquiritiae,
Gummi Arabici,
singulorum partes aequales.
Dissolve succum et gummi quodque
separatim in Aqua, liquores comisce
et vaporando ita consume ut fiant tro-
chisci. (Fer.)

℞. Extracti Liquiritiae,
Gummi Arabici,
singulorum partem unam.

- Sacchari . . . partes duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Solutionem probe inspissa ut fiant
trochisci. (C.)

- ℞. Pulveris Succī Liquiritiae
partem unam.
— Sacchari crystallisati (Can-
dis) albi . . . partes sedecim.
Mannae . . . partes quatuor.
Contritīs adde
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit

ut fiant trochisci. (Vm.)

- ℞. Pulveris Extracti Liquiritiae
uncias octo.
— Sacchari . . . libram unam.
— Gummi Arabici uncias tres.
Aquae Florum Aurantiorum
quantum sufficit.

Fiant trochisci. (Br.)

- Fi. Aquam aromaticam Citri adhibet.
℞. Pulveris Succī Liquiritiae,
— Gummi Arabici,
singulorum partes tres.

Aquae fontanae quantum sufficit.
 Solutioni adde
 Sacchari pulverati . . . partes sex.
 Evaporent lente ad aptam consisten-
 tiam. (Ams. B. Bel. Ful. Li. Lus. Wätr.
 Sw.)
 ℞. Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
 — — Liquiritiae,
 — Anisi,
 — Foeniculi,
 singulorum unciam unam.
 Succo Liquiritiae in Aqua Hyssopi
 dissoluti . . . uncias quatuor.
 Sacchari albi . . . uncias sedecim.
 Mucilaginis Gummi Tragacanthae
 quantum sufficit.
 Fiant trochisci. (Br. Han. Wir.)
 Pal. saccharum omittit; — Lus. foeni-
 culum omittit, reliquis formulae im-
 mutatis; — O. et Sax. Saccharum in
 Aqua Foeniculi dissolvi jubent.
 ℞. Pulveris Radicis Glycyrrhizae,
 — — Iridis Florentinae,
 singulorum uncias tres.
 — Anisi,
 — Foeniculi,
 singulorum semilibram.
 Extracti Glycyrrhizae
 libras duas et uncias octo.
 Sacchari albi . . . libras duodecim.
 Mucilaginis Gummi Tragacanthae
 quantum sufficit.
 Fiant tabellae. (An.)
 ℞. Amygdalarum dulcium excortica-
 tarum . . . uncias duas.
 Contusis, pastae adde
 Pulveris Succo Liquiritiae
 . . . uncias quatuor.
 — Foeniculi . . . semunciam.
 — Sacchari . . . uncias octo.
 Mucilaginis Gummi Tragacanthae
 quantum sufficit.
 Fiant trochisci. (Au. Pid.)
 ℞. Storacis Calamita . . . partes sex.
 Sacchari albi partes centum qua-
 draginta quatuor.
 Contritiss adde
 Amygdalarum dulcium excortica-
 tarum,
 Radicis Iridis Florentinae,
 singulorum partes duas.
 Gummi Tragacanthae
 partem unam.
 Extracti Liquiritiae liquidi
 quantum sufficit.
 Fiant trochisci. (Vm.)
 Vm. praeterea Trochiscorum albu-
 rum partes triginta sex et unam Sto-
 racis Calamita ut fiat cum dissolutio-
 nis aquosae Extracti Liquiritiae massa.
 ℞. Radicis Iridis Florentinae
 . . . uncias tres.
 — Liquiritiae,
 Pharmacopoea universalis. II.

Anisi,
 Foeniculi,
 singulorum uncias quinque.
 Succo Liquiritiae uncias novem.
 Storacis Calamita unciam unam.
 Sacchari albi uncias nonaginta sex.
 Mucilaginis Gummi Tragacanthae
 quantum sufficit.
 Fiant trochisci. (Sp.)
 Trochisci Glycyrrhizae cum Opio s.
 thebaici, Trochisci sedativo-balsamici s.
 pectorales. regis Danorum. (Ed. Lus.
 Suec. Br. E. Sp. Vm.)
 ℞. Succo Liquiritiae,
 Sacchari albi,
 singulorum unciam unam.
 Extracti Opii . . . grana quatuor.
 Fiant trochisci. (Sp.)
 ℞. Radicis Liquiritiae,
 — Althaeae,
 singulorum drachmas novem.
 — Iridis Florentinae,
 Gummi Tragacanthae,
 singulorum drachmas sex.
 — Opii . . . scrupulum unum.
 Sacchari . . . uncias sedecim.
 Aquae . . . quantum sufficit.
 Fiant trochisci. (Vm.)
 ℞. Succo Liquiritiae,
 Gummi Arabici,
 singulorum uncias quinque.
 Opii . . . drachmas duas.
 Tincturae Balsami Tolutani
 . . . semunciam.
 Syrupi Sacchari . . . uncias octo.
 Opio cum tinctura contritis adde
 sensim syrupum et saccharum caloris
 ope mollefactum, deinde gummi et
 trochiscos septingentos viginti forma.
 (Ed. Lus. Suec. Br. Sw.)
 ℞. Gummi Arabici,
 Extracti Liquiritiae,
 Sacchari albi,
 singulorum drachmas duas.
 Opii . . . grana sex.
 Olei Anisi . . . guttas quatuor.
 Aquae . . . quantum sufficit.
 Fiant trochisci quadraginta. (E.)
 Die legtern Trochisten sind bei den Eng-
 ländern unter dem Namen Cough lozan-
 ges of Wistar berühmt.
 Looch sanum et expertum. (Pal. Wir.
 Pid. Sp.)
 ℞. Aquae destillatae Looch sani et
 experti . . . unciam unam.
 Nucleorum Pineae mundatorum,
 Amygdalarum excorticatorum,
 Seminum Papaveris albi,
 singulorum semunciam.
 Fiat emulsio, cujus colaturae adde
 Sacchari albi . . . uncias viginti.

Pulveris Liquiritiae,
 — Gummi Tragacanthae,
 — — Arabici,
 — Amyli,
 singulorum drachmas tres.
 — Iridis Florentinae
 drachmas duas.

Misce diu et celeriter agitando. (Wir.)

R. Radicis Liquiritiae,
Herbae Hyssopi,
 — Capilli Veneris Mospeliaci,
 — Calaminthae montanae,
 singularum semunciam.

Anisi,
 Foeniculi,
 singulorum drachmas duas.

Aquae fontanae,
 uncias viginti quatuor.

Coctis parumper, cum decocto et
 Amygdalarum excorticatarum,
 Nucleorum Pineae mundatorum,
 Seminum Papaveris albi,
 singulorum uncia una
 emulsionem para, cujus colaturae adde

Pulveris Liquiritiae,
 — Gummi Tragacanthae,
 — — Arabici,
 — Amyli,
 — Iridis Florentinae,
 singulorum drachmas sex.

Sacchari albi uncias quadraginta.
 Aquae Cinnamomi . . . uncias duas.

Misce. (Sp.)

R. Cinnamomi,
 Hyssopi,
 Calaminthae,
 Iridis Florentinae,
 Anisi,
 Foeniculi, singulorum semunciam.
 Capilli Veneris Mospeliaci
 manipulum unum.

Aquae fontanae . . . libras duas.

Macera per horas viginti quatuor,
 destillet deinde liquidi libra una, cum
 qua et

Nucleorum Pineae mundatorum
 drachmis quinque,
 Amygdalarum dulcium excortica-
 tarum . . . drachmis tribus
 emulsionem para, cujus colaturae adde

Sacchari albi . . . libras duas.

Pulveris Liquiritiae,
 — Gummi Tragacanthae,
 — — Arabici,
 — Amyli,
 singulorum drachmas tres.
 — Iridis . . . drachmas duas.

Misce. (Pal.)

R. Pulveris Radicis Liquiritiae,
 — — Althaeae,
 singulorum unciam unam.
 — — Iridis Florentinae
 drachmas sex.

Pulveris Gummi Tragacanthae
 unciam unam.

Fiat pulvis, cujus scrupulos quatuor
 extempore cum Syrupi emulsivi uuciiis
 duabus commisce. (Ptd.)

Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe
 Unze.

Looch pulmonale s. de pulmone Vulpis.
 (Li. Wir. Sp.)

R. Pulmonis Vulpis pulverati,
Pulveris Succi Liquiritiae,
 — Herbae Capilli Veneris Mospeliaci,
 — Anisi,
 — Foeniculi,
 singulorum unciam unam.
 ac chari clarificati
 uncias quindecim.

Misce. (Wir. Sp.)

R. Extracti Liquiritiae semunciam.
Aquae Foeniculi . . . uncias duas.

Solutioni adde

Pulveris Hederae terrestris,
 — Anisi,
 — Foeniculi,
 singulorum drachmas duas.

Syrupi Sacchari . . . uncias sex.

Misce. (Li.)

Dieses Looch, welches in Betreff der Wir-
 kung mit dem vorigen viel Aehnlichkeit hat,
 wurde von Mesue eingeführt; es war bei
 Husten und Lungenschwindsucht sehr berühmt.
 — Gabe, zwei bis drei Drachmen.

Elixir pectorale simplex. (Br. Ham.)

R. Succi Liquiritiae drachmas tres.
Aquae Foeniculi uncias quatuor.

Dissolve. (Ham.)

Br. Aquae Foeniculi libram unam et
 Succi Liquiritiae uncias sex.

Infusum Radicis Glycyrrhizae s. Liquiritiae. (BorC. WW. Au.)

R. Radicis Liquiritiae concisae
 unciam unam.

Aquae bullientis
 uncias novem ad decem.

Digesta vase tecto per semihoram,
 cola.

T. Liquiritiae sesquiunciam, Aquae
 bullientis libram unam; stent per ho-
 ras duas in infusione, tunc colentur.

Mel glycyrrhizatum s. Liquiritiae.
 (GalF. Ham. Pal.)

R. Radicis Liquiritiae uncias octo.
Aquae bullientis . . . libras tres.

Macera per horam unam, cola expri-
 mendo, vaporando ad uncias quatuor-
 decim inspissa et adde

Mellis albi . . . libras quinque.

Coque leni igne ad syrupi consisten-
 tiam. (GalF. Pol.)

Havn. infundere jubet per semihoram Liquiritiae sesquiunciam in Aquae fervidae sufficiente quantitate, ut unciae decem colaturae obtineantur, huic addere Mellis despumati duplum et coctione ad syrupi consistentiam redigere.

Syrupus Glycyrrhizae s. Liquiritiae.
(Bor. Br. Han. Wir. Sp. Sw*. Vm.)

℞. Radicis Liquiritiae rasae et contusae partem unam.

Aquae partes tres.

Infunde in aquae balneo tepido per horam unam, tunc in colatura frigida dissolve

Mellis albi partes duas et in calida

Sacchari albi partes duas.

Serva. (Vm)

Sw*. eandem formulam, sed colaturam cuni Melle et Saccharo ad syrupi consistentiam coquere jubet.

℞. Radicis Liquiritiae concisae

uncias octo.

Aquae bullientis libras tres.

Macera, tunc coque leviter per horas quadrantem; cola et evaporatis ad unciarum quatuordecim liquidi remanentiam, adde

Sacchari albissimi,

Mellis despumati,

singulorum libras duas.

Ebulliant. (Bor. Bor4. Han. HassP.)

℞. Radicis Liquiritiae uncias duas.

Capilli Veneris Monspelici

unciam unam.

Hyssopt semunciam.

Aquae libras duas.

Infunde per horas viginti quatuor, tunc ebullitione ad dimidium redactis, colaturae adde

Mellis despumati uncias octo.

Sacchari albi uncias sedecim.

Aquae Rosarum uncias quatuor.

Fiat syrupus. (Br. Wir. Sp.)

Decoctum pectorale. (Sw.)

℞. Radicis Liquiritiae,

Herbae Farfaeae,

— Hederæ terrestris,

singularum uncias duas.

Radicis Inulae unciam unam.

Aquae libras novem.

Decoque ad colaturae unius librae remanentiam. — Gade, drei ober vier Unzen, mehrmals täglich. — Man ver-
füßt diese Tisane mit Zucker, oder besser,
mit Honig

Essentia Liquiritiae. (Br.)

℞. Radicis Liquiritiae concisae

unciam unam.

Aquae Vitae uncias tres.

Post sufficientem extractionem cola et exprime.

Elixir pectorale regis Daniae s. Danorum s. Ringelmanni s. ex Succo Liquiritiae s. pectorale dulce s. Glycyrrhizae s. e Succo Liquiritiae. (Bor. BorC. Bor4. D. DD. Ful. Han. Li. O. Pol. Sax. Wir. Sp. Vm.)

1) Ohne Opium.

℞. Succu Liquiritiae partem unam.

Aquae Foeniculi partes duas.

Alcoholis ammoniacalis partes sex.

Digere blando calore, per horas tres et cola. (DD.)

Li. Succu partem unam, Aquae Foe-

nicali quatuor et duas Alcoholis am-

moniacalis; — Sax. Succu duas, Aquae

Foeniculi sex et duas Alcoholis am-

moniacalis; — Ful. Succu duas, Aquae

Foeniculi sex et tres Alcoholis am-

moniacalis; — Bor4. Han. HassP. Succu

duas, Aquae Foeniculi sex et Alcoholis

ammoniacalis anisati duas; — Sp. Suc-

ci unam, Aquae Foeniculi duas et sex

Alcoholis ammoniacalis anisati; — Vm.

Succu duas, Aquae Foeniculi octo et

duas Alcoholis ammoniacalis anisati.

℞. Succu Liquiritiae partes sex.

Aquae Foeniculi partes duodecim.

Seminum viridum Anisi

partem unam.

Alcoholis ammoniacalis,

partes triginta sex.

Stent in digestionem per horas viginti

quatuor et coentur. (D.)

Vm. digerere jubet Anisi partem unam

in Alcoholis ammoniacalis sex, addere

deinde Aquae Foeniculi partes duode-

cim, Succu Liquiritiae sex et post ali-

quot dies filtrare.

℞. Succu Liquiritiae depurati

unciam unam.

Aquae Foeniculi uncias octo.

Liquoris Ammonii subcarbonici

semidrachmam.

Miscé. (BorC.)

℞. Radicis Angelicae uncias tres.

— Levistici semunciam.

Florum Chamomillae Romanae

sesquiunciam.

Anisi uncias octo.

Foeniculi uncias quinque.

Macidis drachmas tres.

Nucis moschatae,

Myrrhae,

singularum unciam unam.

Kali subcarbonici

uncias octodecim.

Alcoholis libras quatuor.

Aquae fontanae libras duas.

Stent in digestionem per tres dies,
tunc adde

Salis Ammoniaci pulverati
libram unam.

Destillent lente ad librae unius liquidi remanentiam, productum commisce cum

Succi Liquiritiae . unciis quinque solutis in

Aquae Foeniculi . . . libra una.
Adde deinde

Croci orientalis . drachmas duas.
Digere per aliquot dies et filtra.

(Wir.)

2) Mit Opium. Elixir ammoniato-
opiatum, Extractum thebaicum ammo-
niacale. (Bor. O. Pol. Vin.)

R. Succi Liquiritiae depurati
semunciam.

Aquae Foeniculi . . . semilibram.
Dissolve et colaturae adde

Spiritus Salis Ammoniaci anisati
drachmas duas.

Tincturae thebaicae semidrachmam.
Misce bene. (O.)

Bor et Pol. Succi unciis duas, Aquae
Foeniculi sex, Spiritus Ammonii anisati
duas et Laudani drachmas duas; —
Vm. Succi partes octo, Aquae Foeni-
culi viginti quatuor, Spiritus Ammonii
anisati et Laudani liquidi, singulorum
octo.

Reizend, besonders ehemals bei chronischen
Brustleiden empfohlen und für brustflin-
dernd, Auswurf befördernd, blühtreibend,
solikwidrig, magenstärkend, harntreibend
gehalten. — Gabe, sechs und dreißig
bis fünfzig Tropfen. — Es ist ein, nach
dem Gefallen des Arztes, einer Menge Ver-
änderungen fähiges Präparat, welches wohl
verdient, der Vergessenheit entrissen zu
werden.

Liriodendron.

Liriodendron tulipifera, L.; Tulpen-
baum; Tulipier de Virginie (Gal.);
Virginian tuliptree, American poplar
(Ang.); Tulphoom (Bel.); Tulipeiro
(Lus.); Kametraed (Succ.).

Am. C.

Ein Baum (Polyandria Polygynia, L.;
Magnol. eae, J.) Südamerica's. (Cat. Car-
rol. I. t. 43. Duh. éd. nouv. III. t. 18.
Big. II. t. 31. Schk. t. 147. Bert. Bild.
III. 14. f. 1.)

Man wendet die Rinde, besonders die
der Wurzel an; sie ist bitter und gewürz-
haft.

Lithospermum.

Lithospermum officinale, L.; Stein-
saame; Herbe aux perles, Grémil (Gal.);
Gronwell (Ang.); Steenklinde (D.);
Ackensteensaad (Bel.); Stenfrae (Succ.).
Br. Gal. His. Wir. M. Sp.

4 (Pentandria Monogynia, L.; Bo-
ragineae, J.) Eine in Europa gemeine
Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 341.)

Man wendet den Saamen (semen Li-
thospermi s. Milii solis) an; er ist klein,
sehr hart und hat eine harte, glänzende,
perlgraue Schale. Er besitzt keinen Ge-
ruch, aber einen süßlichen, öligen, etwas
abstringirenden Geschmack.

Ehemals wurde der Saame für ein li-
thontripicum gehalten, auch wurde er
bei Ruhr empfohlen; wenigstens könnte er
als Einderungs- und Schmerzstillendes Mit-
tel bisweilen von Nutzen seyn.

Lobelia.

Man wendet in der Medicin zwei Arten
dieser Pflanzengattung an:

1) Lobelia syphilitica, L.; gemeine
Lobelia, blaue Cardinaßblume; Cardinale
bleue (Gal.); Blue lobelia (Ang.); Pok-
kige lobel a (Bel.).

Ams. Br. Ful. Hass. Li. R. Sax. Wir.
Wir. M. Sp.

4 (Pentandria Monogynia, L.; Lo-
beliaceae, J.) Eine Pflanze Nordameri-
ca's. (Plenck t. 649. Schk. t. 269. Düss.
off. Pl. I. 24. Dict. d. Sc. nat. cah. 3.
Zorn Ic. pl. t. 363.)

Man wendet die Wurzel (radix Lobe-
liae) an; sie besteht aus dünnen, weißen,
mehrere Finger langen Fasern. Sie hat
einen unangenehmen, widerlichen Geruch.
Der Geschmack derselben ist, wenn sie frisch
ist, sehr scharf, bei der getrockneten weni-
ger; er wird alsdann tabackähnlich und
hält lange an.

Reizend, Brechen und Purgiren bewir-
kend; als Mittel gegen Syphilis.

2) Lobelia inflata, Willd.; Indischer
Taback; Lobélie renflée (Gal.); Indian
tobacco (Ang.).

Am. C.

⊙ Eine Nordamericanische Pflanze. (Big.
Am. Med. Bot. I. t. 19.)

Die Blätter sind länglich, sitzend, schwach
gezähnt. Sie sind anfangs geschmacklos,
entwickeln aber bald einen stechenden Ge-
schmack und erregen einen beträchtlichen
Speichelfluß. In den Vereinigten Staaten
wendet man sie als brech- und schweißtrei-
bendes Mittel, in der Gabe von zehn bis
zwanzig Gran, in Pulverform an. (Vergl.
v. Froiep's Not. d. Nat. u. Heilf. V.
99.)

Decoctum Lobeliae syphiliticae. (B*.
Sp.)

R. Radicis Lobeliae syphiliticae sic-
catae . . . semunciam.

Aquae fontanae . libras duodecim.
Coquendo tertia parte consumpta,
cola. — Glasweise zu trinken.

Tinctura Lobeliae inflatae. (Am. B*.)

℞. Herbae Lobeliae inflatae siccatae uncias duas.

Alcoholis tenuis . octarium unum.

Post decem dies digestionis filtra.

Ein Reizmittel, welches, nach Cutlet besonders von Zacher, bei convulsivischem Asthma, als ein gutes Mittel die Respirationsschwächen zu heben, gerühmt wird. — Gabe, ein Kaffeelöffel.

Lunaria.

Botrychium Lunaria, L; Mondraute; *Lunaire (Gal.);* Moonwort (*Ang.*); *Maanrude (D.);* Maankruid (*Bel.*); *Lunaria (I.);* Lasgraes (*Suec.*).

Gal. Wir. Sp.

℥ (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Zorn Ic pl. t. 65.)

Man wendet das Kraut (herba Lunariae s. Lunariae Botrytidos) an; es stellt sich als ein gefiedertes, aus acht bis zehn halbmondförmigen Blättchen bestehendes Laub dar. Es hat einen schwach styptischen Geschmack.

Schwach adstringirend.

Lupinus.

Lupinus albus, L; Wollbohne; *Lupin blanc (Gal.);* White lupine (*Ang.*); *Kzjmsky oneb skrkawiczny hrach (C.);* Witte tygebone (*Bel.*); *Lupino officinale (I.)*

Br. Fer. Gal. His. Sax. Wir. Fi. G. M. Sp.

⊙ (*Diadelphia Hexandria, L;* Leguminosae, J.) Eine wahrscheinlich ursprünglich in der Levante einheimische, im südlichen Europa naturalisirte Pflanze. (*Blackw. t. 282. Zorn Ic. pl. t. 321.*)

Man wendet den Samen (semen Lupini) an; er ist groß, scheibensförmig, platt und weiß. Die Mandel, welche er enthält, ist gelb und bitter, ohne Geruch und hat einen mehligten, bitteren und unangenehmen Geschmack.

Ehehem kam er zu dem Mehl von Weizenmehl.

Lupulus.

Humulus Lupulus, L; Hopfen; *Houblon (Gal.);* Hope (*Ang.*); *Humle (D. Suec.);* *Lupulo (His. I.);* *Hoppe (Bel.);* *Chmael (Pol.);* *Hombrecillo (Lus.)*

A. Am. Ams. Ba. Bor. Bor4. Br. Ed. Fenn. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. RC. Sax.

Suec. Wir. Wür. Be. Br. C. G. M. Par. Pid. Sp

℥ (*Dioecia Pentandria, L;* *Urticeae. J.*) Eine in ganz Europa gebaute Pflanze. (*Hayne VIII. 36. Bull. t. 234. Plenck t. 707. Schk. t. 326. Zorn Ic. pl. t. 522. 541.*)

Man wendet die Sprossen der weiblichen Blüthen (*strob. li s. con. s. flores Lupuli*) an; sie sind eisförmig und bestehen aus häutigen, eirunden, hohlen, geschindelten, gelblichen Schuppen. Sie haben einen sehr starken, gewürzhaften Geruch und einen bitteren Geschmack.

Sie enthalten, nach Ves, einen eigenthümlichen bitteren Stoff, das Lupulin (*Lupulina, Lupulinum*), in welchem die Wirksamkeit liegt.

Tonisch, etwas narcotisch, besonders bei scrofulösen Krankheiten, Rhaditis und Drüsenverstopfungen gebraucht, aber auch als Fieber- und beruhigendes Mittel gerühmt.

Gabe des Pulvers, eine halbe bis zwei Drachmen; von dem ausgebrühten Saft, zwei bis vier Unzen.

Species aromaticae s. ad fomentum. (B Bor. Bor4. Pal. Sar.)*

℞. Lupuli . . . libram unam.

Florum Chamomillae,

— Lavandulae,

Herbae Rorismarini,

— Serpylli,

— Tanaceti,

singulorum uncias tres.

Concisa misce.

Bor4. Tanacetum omittit.

Pilulae Humuli Lupuli. (RC.)

℞. Pulveris conorum Lupuli scrupulos duos.

Micae Panis et Syrupi vel

Mucilaginis Gummi Arabici

quantum satis

ut fiat massa in pilulas triginta aequales dividenda. — Gabe, Abends zwei bis drei Stück. — Wirten wie Opium.

Extractum Lupuli s. Humuli (aquosum).

(An. Han Li Lon. LonN. Suec. C.

Vm.)

℞. Lupuli,

Aquae frigidae,

singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim et adde deinde

Aquae bullientis . duplum pondus totius massae; refrigerata cola, albumine clarificata supra ignem colloca et quum liquor spissescere coeperit, per pannum colatum, agitando continue vaporando probe consume. (Vm.)

℞. Humuli . . . partem unam.

Aquae bullientis . . partes octo.

Coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni igne ad extracti consistentiam evaporent. (Han.)

Suec. Coquere jubet parumper Lupulum cum Aquae duplo, exprimere, et residuo cum nova Aqua cocto, liquores commixtos in aquae balneo inspissare; — Li. Macerare per horas duodecim Lupuli libras tres in Aquae bullientis novem, coquere deinde, exprimere et vaporando consumere.

℞. Lupuli libras duas.
Aquae communis libras decem.

Coque per horae quadrantem, cola exprimendo, sepone et liquorem decanthatum ad consistentiam requisitam consume. (An.)

Lon. LonN. et C. coquere jubent Lupuli uncias quatuor in Aquae octariis octo ad quatuor redigendis et colaturam ad idoneam crassitudinem evaporare.

Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Extractum lupuli alcoholicum. (A.)

℞. Lupuli partes duas.
Alcoholis (0,910) partes tres.
Aquae communis partes novem.

Digere in aquae balneo, cola exprimendo, alcoholium distillatione extrahe et quod restat, in balneo aquae ad extracti consistentiam consume.

Die Gabe ist wie bei'm vorigen.

Tinctura Humuli s. Lupuli s. Humuli Lupuli s. Lupuli strobilorum. (Am. An. B*. Ed. Han. Lon. LonN. RC. Suec. C. Sw. Vm.)

℞. Lupuli uncias quinque.
Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia.

Digere per dies octo et filtra. (Ed. Suec.)

Lon. LonN. Lupuli uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos; — B. et Sw. Lupuli semunciam et Aquae Vitae semilibram; — An. Lupuli partem unam et Alcoholis (20°) octo; — Han. RC. Lupuli partem unam et sex Alcoholis (vel deficiente hac tinctura. Pulveris conorum Lupuli grana tria, hora decubitus, superbibendo succi Citri medicae vel Aoidi acetici impuri cochlear sume. Iisdem virtutibus gaudet ut opium. RC.); — Am. et C. Lupuli uncias quinque et Alcoholis octarium unum.

Narkotisch. — Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Infusum Lupuli. (B. Ra.)

℞. Lupuli unciam unam.
Aquae bullientis libras duas.

Infunde et cola. — Gewürzhaft und bitter, bei Scrofeln, Scorbut und sogenannten asthenischen Krankheiten empfohlen.

Ein wirksameres Präparat erhält man durch Infusion des Hopfens in Wein, nachdem man ihn mit einer hinlänglichen Menge Weingeist befeuchtet hat.

Aqua Lupuli. (B*. Han. Vm.)

℞. Lupuli partes octo.
Aquae sufficientem quantitatem.

Destillent partes viginti quatuor. (B*. Han.)

℞. Lupuli partes quatuor.
Aquae Vitae partem quartam.

Aquae partes triginta.
Destillent partes sex. (Vm.)

Magenstärkend und etwas narkotisch. — Gabe, einößel.

Mixtura e Lupulo s. stomachica. (B*.)

℞. Extracti Lupuli aquosi drachmas duas ad tres.

Aquae Lupuli uncias septem.
Solutioni adde

Tincturae Lupuli semunciam ad unciam unam.

Syrupi Corticum Aurantium unciam unam.

Gabe, alle drei Stunden einenößel.

Unguentum Lupuli. (Sw*.)

℞. Lupuli siccati uncias duas.
Axungiae Porci uncias decem.

Digere blando calore per horas aliquot et cola cum expressione.

Bei'm Krebs, um die Schmerzen zu stillen, empfohlen.

Pulvis Lupulini. (GalF. GalH. Ma.)

℞. Lupulini partem unam.
Tere in mortario porocellaneo, sensim addendo

Sacchari albi partes duas.

Unguentum s. Pomatum Lupulini. (GalH. T.)

℞: Lupulini drachmam unam.
Axungiae drachmas tres.

Infunde in aquae balneo et per pannum et tela arcte textum (setaceum T.) cola.

Tinctura Lupulini. (Fer. GalF. Ma. T.)

℞. Lupulini contusi unciam unam.
Alcoholis (36°) uncias duas.

Digere in vase tecto per dies sex, cola fortiter exprimendo et adde

Alcoholis (36°) quantum sufficit ut tincturae unciae tres obtineantur.

T. Lupulini drachmas tres, Alcoholis (35° B.) unciam unam; digere, post dies duos exprime et operatione cum residuo repetita, liquores commixti filtrentur.

Gewürzhaft, bitter und tonisch, nach Yves außerdem auch narotisch. — Die Gabe ist noch nicht bestimmt. *T.* schreibt von seiner Tinctur 40 bis 80 Tropfen vor, in einem passenden Vehikel zu nehmen.

Syrupus Lupulini. (GalF. *Ma. T.*)

℞. Tincturae Lupulini alcoholicae partem unam.
Syrupi communis partes septem.
Misc.

Extractum resinosum vel alcoholicum Lupulini. (T.)

Obtinetur evaporatione tincturae, solis vel evaporatorii calore, in laminis vitreatis.

Gabe, drei bis vier Gran.

Lycopodium m.

Lycopodium clavatum, L.; Streupulvermoos, Bärlapp; Lycopode commun (Gal.); Club moss (Ang.); Mechowe Seweno (B.); Ioramos, Ulvefod, Luse graes (D.); Licopodio (His. I. Lus.); Geknodstaardmos (Bel.); Proszek koltunowy (Pol.); Gulnicht (Suec.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Penn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Hass. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. G. M. Pid. Sp. Z.

♀ (Cryptogamia, L.; Musci, J.) Eine in ganz Deutschland sehr gemeine Pflanze. (Hayne VIII. 47. Zorn Ic. pl. t. 54.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Musci clavati s. terrestris) besteht aus einem sehr ästigen Stängel mit zerstreuten, rippenlosen, gebogenen, in eine Borste endigenden Blättern. Es hat weder Geruch, noch Geschmack.

Der Saame (farina s. pulvis s. semen s. sulphur Lycopodii, Sulphur vegetabile; Bärlappsaamen, Hexenmehl, Trutenmehl, Alpmehl, Willenmehl, Wurmmehl, Klopfpulver, Blüthpulver, Moospulver, Streupulver, Bärlapppulver) ist ein außerordentlich feines, blasgelbes, leichtes, eizigermäßigen fettig anzuführendes Pulver, welches sich an die Finger hängt, weder Geruch noch Geschmack besitzt, sich leicht entzündet und aus kleinen, rundern, etwas platten und halbdurchsichtigen Körnern besteht.

Ausserlich austrocknend, innerlich harne-

treibend — Gabe, zehn Gran Morgens und Abends, bei Harnstrenge der Kinder.

Mixtura Lycopodii s. diuretica. (B. Au.)

℞. Lycopodii . . . drachmas duas.
Aquae purae . . . uncias duas.
Syrupi Althaeae . . . sesquiunciam.
Misc. — Gabe, alle zwei Stunden einen halben Eßffel. (B. Au.)

℞. Magnesia subcarbonicae drachmas duas.

Satura Aceti concentrati sufficiente quantitate.

Adde deinde Aquae Menthae, Syrupi Opii, . . . singulorum uncias duas.

Pulveris Lycopodi drachmas duas. Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßlöffel. (B. Au.)

℞. Lycopodii . . . semunciam. Syrupi Papaveris quantum sufficit ut fiat looch. — Gabe, alle zwei Stunden einen Eßffel.

Lysimachia.

In den Pharmacopoen findet man zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Lysimachia vulgaris*, L.; gelber Weiberich; Lysimaque commune, Chasse-bosse (Gal.); Common loose strife (Ang.); Bastard dueurt (D.); Ls de tintureros (His.); Gemeene wederik (Suec.).

Gal. Wir. Sp. Z.

♀ (Pentandria Monogynia, L.; Primulaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 278. Hayne VIII. t. 15. Oed. Fl. Dan t. 689.)

Man wendet das blühende Kraut (herba e. flores Lysimachiae luteae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit lanzettigen, fast sitzenden, gegenüberstehenden, drei- oder vierzeiligen Blättern und goldgelben, eine endständige Rispe bildenden, Blüthen. Es hat fast gar keinen Geruch; der Geschmack ist etwas bitter und styptisch.

Schwach abstringirend.

2) *Lysimachia Nummularia*, L.; Pfennigkraut; Nummulaire (Gal.); Moneywort (Ang.); Pengekraud (D.); Nummularia (His. I. Lus.); Penningkruid (Bel.); Pieniecznik (Pol.); Penningeart (Suec.).

Br. Gal. Gen. Wir. Be. M. Sp.

♀ Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 542. Hayne VIII. t. 16. Zorn Ic. pl. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba Num-

mulariae s. Centummorbiae) an; es besteht aus einem meist einfachen, schwach piekantigen Stängel mit entgegengesetzten eirunden, runden, kurzgestielten Blättern.

Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas styptisch. Ehedem wendete man es bei Durchfall und Blutungen an.

M.

M a g n e s i u m .

Ein ungedrückliches Metall, von dem man aber folgende Zusammensetzungen anwendet:

Magnesia alba calcinata, Magnesia pura s. usta; gebrannte Magnesia. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. H s. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. Sp. Sw. T. Vin.)

R. *Magnesiae subcarbonicae*

quantum libet.
Calcina igne maxime aucto, in crucibulo, donec particula acido immissa non amplius effervescentiam producat. (Ams. Ba. Bor4. Gal. GalM. Han. O. Pol. Sax.)

T. *Solutioni filtratae e Magnesiae sulphuricae venalis libris duabus in Aquae bullientis libris duodecim infundere jubet Kali subcarbonicum liquidum, donec mixturam chartam curcuma tinctam non rubefaciat; praecipitatum cum Aqua communi tamdiu lotum, donec lotionum aqua illam chartam non amplius rubefaciat et solis vel balnei vaporis ope siccatum ure inter prunas ut antea etc.; — Fi. Magnesiam carbonicam inter prunas ad diminutionem ponderis ejus partium duarum calcinare jubet.*

Die Probe auf Säuren allein ist hinlänglich, um die Reinheit der Magnesia zu prüfen; die einständige (Fenn. HassP. RC. Br.), einständige und längere (Bor.), ein- bis zweiständige (R.), zweiständige (A. B. Bel. D. Du. Ed. His Lon. LonN. Sp. Sw.), dreiständige (Br.) Dagegen der Calcination kann hierzu nicht genügen, da der Stärkegrad des Feuers sehr verschieden gewesen sein kann.

Im Allgemeinen zieht man die gereinigte Magnesia der kohlensauren vor, welche denselben Nutzen gewährt.

Protocarbonas Magnesii, Magnesia alba s. aërata s. subcarbonica s. mitis s. nitri s. Edinburgensis s. salis Ebshamensis s. Epsomensis s. Salis anari s. cretosa s. dulcis s. effervescens, Carbonas Magnesiae s. magnesianum s. magnesianum cum Aqua, Lac terrae Hypocarbonas

Magnesiae, Subcarbonas Magnesiae, Terra amara s. amara aërata s. absorbens mineralis s. talcosa oxyanthracodes, weiße Magnesia, kohlensaure Talkerde, Bittererde.

1) So, wie sie in der Natur vorkommt. Am. DD. Gal. GalM. C. Par. Ja.

Weiß, geschmack- und geruchlos, von erdigem Ansehen, einem etwas dicken Gefüge und einem feinen, sehr zähen Korn.

2) Im Ganzen bereitet.

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Pid. Sp. Sw. T. Vin.

R. *Magnesiae sulphuricae libras duas. Aquae bullientis . . . libras octo. Solutioni filtratae infunde pedetentim aliam solutionem cum Kali subcarbonici libra una et quatuor Aquae fontanae paratam, donec non ultra turbetur; lava praecipitatum Aquâ fontana, et quum haec plumbo acetico adjecto non amplius turbatur, pulverem sicca.*

Bor4. *Magnesiae sulphuricae depuratae, Kali carbonici et cin. clav. a terra silicea liberi, singulorum eandem quantitatem. Solvantur seorsim illa in sextuplo, hoc in quadruplo Aquae communis ferventi; soluta filtrata commixta et spathula lignea agitata coquantur per horam dimidiam, Aqua communi fervida diluantur et per linteum colentur. Quod in linteo remanet, edulcoratum leni calore siccetur. — Praeterea etiam venalem indicat; — HassP. Magnesiae sulphuricae venalis libras sex, Aquae communis calidae duodecim; solutionem filtratam cum Aqua communi calida usque ad libras quadraginta octo dilue et cum hac solutione aliam e Cinerum clavell. depur. libris quatuor et Aquae communis calidae libris viginti quatuor, utramque filtratam, subcalidam (40 — 50°) sensim perpetua sub agitatione commisce; post magnesiae subsidentiam liquorem defunde et sedimentum elutione, primum cum aqua subalida, dein cum*

frigida repetita depura et sicca etc.; — Lon. LonN. Magnesia sulphuricae libram unam, Kali subcarbonici uncias novem, Aquae octarios viginti quatuor; kali in aquae octariis tribus, magnesia in quinque solve, reliquam aquam adijce et coque etc.; — RC. Magnesia sulphuricae et Kali subcarbonici, singulorum partes aequales, separatim quodque in Aquae destill. calidae duplo solve, coque cum Aquae bull. octuplo etc.; — *Fi.* Magnesia sulphuricae libras sex et Salis Tartari libras quatuor, quodque seorsim in pondere quadruplo Aquae fontanae bullientis solvere, filtrare, coquere ad magnesia praecipitationem usque, compositum multa Aqua bullente diluere, post horae dimidia coctionem per pannum gossypinum filtrare; magnesia in filtro remanentem aqua calida lavare et siccare.

Küßer dieses Verfahren, welches man, einige unbedeutende Abweichungen abgerechnet, sonst allenthalben findet, geben Pal Sar. und Wir. noch folgendes an:

℞. Residui lixivii a crystallisatione Nitri (Mater Nitri) quantum libet.

Evaporet ad siccum igne gradatim aucto, donec materia liquefiat et calcinetur, tum massam pulverulentam aquae bullienti immitte, praecipitatum exortum lava et sicca.

Dieses Salz, welches in starker Gabe purgirt, wird nur in geringer Menge angewendet, um gastrische Säuren, deren Gegenwart man Krankheiten zuschreibt, zu neutralisiren. Man hat es auch zur Behandlung der Erzeugung harnsaurer Steine empfohlen. — Gabe, drei bis sechs Drachmen zum Ergiren; sechs bis zwanzig Gran als Absorbens.

Pulvis purgans. (Fer. Au. Ra.)

℞. Magnesia subcarbonicae scrupulos duos.

Cremoris Tartari scrupulum unum.

Misce. (Ra.)

Fer. et Au. praescribunt Magnesiae unciam unam, radice Rhei drachmam unam; — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Pulvis digestivus. (Vm.)

℞. Magnesia subcarbonicae, Acidi tartarici, singulorum partes sedecim, Corticis Cinnamomi partem unam.

Pulvis atrophorus e Magnesia carbonica. (Bor4.)

℞. Magnesia carbonicae drachmas duas, Acidi tartarici triti semidrachmam.

Elaeosacchari Citri drachmam unam.

Misce.

Pulvis paregoricus. (Sa.)

℞. Magnesia albae drachmas duas, Nitri . . . drachmam unam, Corticis Cascarillae scrupulum unum, Massae pilularum de Cynoglossograna sex.

Pulvis Magnesiae compositus s. Magnesiae cum Rheo s. absorbens s. antacidus s. galactopoeus s. nutricum s. infantum s. infantum antacidus s. anodynus s. pro infantibus s. puerorum s. infantum citrinus s. epilepticus Marchionum s. ad termina infantum antacidus s. antiemeticus s. carminativus. (B. Bor4. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. R. Wir. Au. E. Pid. Pio. Sm. Sp. Sw. T.)

℞. Magnesiae, Sacchari albi, singulorum partes aequales.

Per longum tempus triturentur in mortario vitreo. (Gal. T.) — Melius Magnesia pura sumitur. (T.)

℞. Magnesiae . . . grana octo, Cinnamomi . . . granum unum.

Misce. (R.)

Ham. praescribit Magnesiae drachmas sex, Corticis Aurantii pulverati duas; — His. Magnesiae drachmam unam cum dimidia, Radicis Columbo drachmam unam; dividetur in sex partes.

℞. Magnesiae . . . partes sex, Elaeosacchari Menthae piperitae partem unam.

Misce. (Sw*.)

℞. Magnesiae . . . unciam unam, Cinnamomi . . . drachmam unam.

Sacchari . . . unciam dimidiam.

Misce. (R.)

Ful. praescribit Magnesiae unciam unam cum dimidia, Cinnamomi drachmam unam et Sacchari unciam unam; — Li. et Wir. Magnesiae uncias duas, Cinnamomi drachmam unam et radice Liquiritiae unciam dimidiam.

℞. Magnesiae . . . unciam unam, Foeniculi . . . drachmam unam, Sacchari albi unciam dimidiam.

Misce. (Hass. Pid.)

℞. Magnesiae . . . unciam unam, Corticis Aurantii,

Seminum Foeniculi, singulorum drachmas duas.

Misce. (Fer. Ful. Li.)

His. praescribit Magnesiae unciam dimidiam, Foeniculi et Cinnamomi,

singulorum drachmam unam; — *Au.*
Magnesiae unciam unam, Foeniculi et
Corticis Aurantii, singulorum unciam
midiam.

Rx. Magnesiae uncias tres.
Nucis moschatae
drachmam dimidiam.

Cinnamomi
drachmam unam cum dimidia.

Misce. (*Sw.*)

Rx. Magnesiae,
Sacchari Lactis,
singulorum uncias duas.
Corticis Cascarillae drachmas duas.
Elaeosacchari Foeniculi
drachmas sex

Misce. (*Sm.*)

Rx. Magnesiae drachmas sex.
Radici Iridis Florentinae,
Seminum Anisi,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.

Crocii drachmam unam.

Misce. (*B. Han. Sp.*)

HassP. Croci grana viginti.
Rx. Magnesiae unciam dimidiam.
Seminis Cumini drachmas tres.
Radici Iridis Florentinae
drachmas duas.

Crocii drachmam dimidiam.

Misce. (*Pie. Sp.*)

Rx. Magnesiae carbonicae
unciam unam.
Elaeosacchari Foeniculi
semunciam.

Radici Rhei pulveratae
drachmas duas.

Iridis Florentinae pulveratae
sesquidrachmam.

Misce. (*Bor4.*)

Rx. Magnesiae
uncias duas cum dimidia.
Radici Rhei unciam dimidiam.
Visci albi,
Radici Liquiritiae,
singulorum drachmas sex.

Misce. (*Li.*)

O. praescribit Magnesiae unciam
unam, Radici Rhei drachmas duas,
Pulveris analectici drachmam dimidiam.

Rx. Magnesiae unciam dimidiam.
Natri subcarbonic,
Radiois Zingiberis,
singulorum scrupulum unum.

Misce fiat pulvis. (*His.*)

Rx. Magnesiae unciam unam.
Radiois Gentianae,
Seminum Foeniculi,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis (*Au.*)

Die Gabe ist im Allgemeinen ein Kaffee-
bffel voll. Mehrere Pharmacopden, Gal.
und His. unter andern, nehmen statt des

Kohlensäuerlichen Natr's reine Magnesia
welche in der That den Vortheil hat,
daß sie im Magen kein kohlensaures Gas
entbindet.

Pulvis ephracticus Sellii. (Au.)

Rx. Magnesiae subcarbonicae,
Cremoris Tartari,
Florum Sulphuris,
Pulveris Rhei,
— Florum Chamomillae,
Elaeosacchari Foeniculi,
singulorum unciam dimidiam.

Gabe, ein Kaffeelbffel mehrmals tglich
bei Stckungen und Schwche der Unter-
leibeingeweibe.

Bolus Magnesiae crocatus. (GalM.)

Rx. Magnesiae partes quinque.
Crocii partes tres.
Canellae partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

*Tabulae absorbentes s. Magnesiae, Tro-
chisci antacidi s. Magnesiae s. Carbo-
natis Magnesiae. (Am. An. Hd. Gal.
Lus. Br. C. Pie. Sw. Vm.)*

Rx. Magnesiae partem unam.
Sacchari albi partes octo.
Coque septem sacchari partes octa-
vas ad plumam et reliquum trituratum
cum magna commisce. (*Vm.*)

Rx. Magnesiae partem unam.
Sacchari albi partes quatuor.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
cum Aqua Florum Aurantii pa-
ratae quantum sufficit.
Fiant trochisci. (*An. Gal. Fi. T.*)

Ed. et *Pie.* praescribunt Magnesiae
uncias sex, Sacchari uncias tres, Nucis
moschatae scrupulum unum et Muci-
laginis Gummi Tragacanthae quantum
sufficit; — *Br.* Magnesiae uncias tres,
Sacchari unciam unam cum dimidia,
Zingiberis scrupulum unum itemque
Mucilaginem Gummi Arabici; — *Sw.*
Magnesiae uncias quatuor, Sacchari
uncias duas, Zingiberis scrupulum
unum et Mucilaginem Gummi arabici;
— *Lus.* Magnesiae uncias sex, Sacchari
uncias tres, F. bae Pichurum drachmam
dimidiam et Mucilaginem Gummi Tra-
gacanthae; — *Am. et C.* Magnesiae
uncias quatuor, Sacchari uncias duas,
Zingiberis scrupulum unum et Syrupi
Sacchari sufficientem quantitatem.

Chevallier empfiehlt folgende Pa-
stillen:

Rx. Succolatae uncias duas.
Sacchari uncias quinque.
Magnesiae purae unciam unam.
Misce fiat cum Mucilage Gummi
Tragacanthae pasta, ad libitum cum

aromatibus miscenda, e qua fermentur
Morsuli granorum octo, sedevim et
viginti quatuor.

*Electuarium anodynum pro infantibus s.
antacidum s. mithridaticum s. pro in-
fantibus.* (Br. Li. Ca. Sp. Sw.)

℞. Magnesiæ . . . unciam unam.
Seminum Anisi unciam dimidiam.
Syrupi Cichorii compositi
unciæ tres.

Misce. (Br.)

Ca. et Sp. Magnesiæ drachmas sex,
Anisi unciam dimidiam, Croci drach-
mam unam et Syrupi Cichorii compo-
siti sufficientem quantitatem.

℞. Magnesiæ . . . drachmas sex.
Seminum Foeniculi,
Carbonis,
singulorum drachmas tres.
Croci . . . drachmam unam.
Syrupi Sacchari . . . unciæ octo.
Petalorum Rheoados

quantum sufficit

ad tingendum colore rubescenti brun-
neo. (Li.)

℞. Magnesiæ
unciæ unam cum dimidia.
Herbæ Menthæ crispæ
unciæ unam.

Croci . . . drachmam unam.
Radiciis Rhei . . . drachmas duas.
Mellis depurati . . . unciæ sex.
Carbonis . . . quantum sufficit

ad tingendum colore nigrescenti viridi.
(Li.)

℞. Conservæ Menthæ crispæ
unciæ unam.

Pulveris aromatici
drachmam unam.

Magnesiæ . . . drachmas duas.
Syrupi Menthæ crispæ

quantum sufficit.

Misce. (Sw.)

Gabe, eine bis zwei Drachmen und mehr.

Aqua Magnesiæ. (Am. B*. GalH. C.)

℞. Aquæ . . . octarios octo.
Magnesiæ subcarbonicæ

drachmas tres.
Antilæ presoriaræ ope solutioni in-
culcetur volumen circiter decuplum
gas acidî carbonici. (Am. B*)

℞. Magnesiæ carbonicæ (hydratæ)
partes quatuor.

Aquæ acidulæ gasosæ quadruplo
Acidi volumine imprægnatæ

partes quingentas.

Misce. (GalH.)

Aqua Pyramontana factitia. (Gal.)

℞. Aquæ acidulæ, gas acidî carboni-
ci mensuras quinque continen-
tis unciæ viginti cum dimidia.

Salis olinariis . . . grana duo.
Magnesiæ sulphuricæ grana octo.

— subcarbonicæ
grana duodecim.

Ferri subcarbonici grana unum.

*Mixtura antacida, Emulsio Amygdala-
rum composita, Mixtura Subcarbona-
tis Magnesiæ.* (Ham. Han: R.C.)

℞. Magnesiæ drachmam dimidiam.
Aquæ Foeniculi

unciæ unam cum dimidia.

Tincturæ Rhei aquosæ,

Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.

Misce. (Ham.)

℞. Saponis Hispanici

scrupulum unum.

Magnesiæ . . . drachmam unam.

Aquæ destillatæ . . . unciæ tres.

Sacchari albi . . . drachmas duas.

Misce. (Ham.)

℞. Amygdalarum dulcium
unciæ dimidiam.

Seminum Hyoscyami
drachmam unam.

Aquæ Cerasorum nigrorum
unciæ octo,

Facta emulsione, colaturæ adde
Sacchari albi . . . drachmas sex.

Magnesiæ . . . drachmam unam.
Misce. (Ham.)

℞. Subcarbonatis Magnesiæ
drachmam unam.

Aquæ fontanæ vel
— Menthæ crispæ semilibram.

Tincturæ aromaticæ
drachmas duas.

Ammoniaæ liquidæ
drachmam unam.

℞. Bet Carbialgie. — Gabe, eine bis zwei
Unzen. (R.C.)

Potio purgans. (Am. C. E. Pie. Sm.)

℞. Magnesiæ . . . drachmas duas.
Decocti seminum Ciceris

unciæ octo (verrèe).

Syrupi Capilli Veneris unciæ duas.
Misce. (Pie.)

℞. Radiciis Rhei
drachmam unam.

Aquæ . . . unciæ duodecim.
Coctis ad dimidiæ partis remanen-
tiam, colaturæ adde

Magnesiæ . . . drachmam unam.
Essentiæ Anisi

guttas duas ad quatuor.

Misce. (Sm.)

℞. Magnesiæ drachmam dimidiam.
Radiciis Rhei . . . grana sex.

Sacchari . . . drachmam unam.
Essentiæ Menthæ piperitæ

guttas sex.

Aquæ unciæ unam cum dimidia.

Gabe, Kindern einen Kaffeelöffel voll alle zwei Stunden. (E.)

℞. Magnesiae . drachmam dimidiam.
Tincturae Asae foetidae

guttas quadraginta.
— Opii guttas viginti.

Sacchari drachmam unam.
Aquaes unciam unam.

Gabe, fünf und zwanzig Tropfen für ein Kind von zwei bis vier Monaten. — De wees wendet diese Formel sehr häufig an.

℞. Magnesiae . . . drachmam unam.
Liquoris Ammonii subcarbonici

unciam unam.
— purae uncias tres.

— purae uncias quinque cum dimidia.

Misce. (Am. C.)

Potio lithonriptica. (E.)

℞. Magnesiae . . . drachmam unam.
Infusi Gentianae . . . uncias sex.

Von Brande in Köllen von vorherrschender Harnsäure empfohlen. — Gabe, ein Glas voll dreimal täglich.

Phosphas Magnesiae, Magnesia phosphorica. (B.)*

℞. Magnesiae purae . . . quantum libet.
Acidi phosphorici quantum sufficit

ad neutralisandum; tum liquor filtratus evaporet ad siccum.

Man hat dieses Salz bei anfangender Nephritis gerühmt. — Gabe, zehn Gran bis eine halbe Drachme. In stärkerer Gabe, von einer Drachme und mehr, purgirt es.

Magnesia sulphurica, Magnesia vitriolata, Sal amarum s. Anglicanum s. Anglicum s. Anglicanum catharticum s. catharticum amarum s. Eshamense s. Epsomense s. Seidschützense s. Sedlitzense s. Sedlitzense, Sulphas Magnesiae, Terra amara sulphurica s. vitriolata, Vitriolicum Magnesiae; Bittersalz, Schwefelsaure Salterde, Englisches Salz; Proto-sulfate de Magnesium, Sulfate de protoxide de Magnesium, Sulfate de Magnésie, Magnésie sulfatée, Sel de canal, Sel cathartique amer, Sel d'Epsom, de Seidlitz, de Seidschütz, Vitriol magnésien (Gal.); Bittersalt (Ang.); Engelsk Laxeersalt (D.); Sal amargo, Sal de la higuera (His.); Sale amaro (I.); Sal gorzka (Pol.); Sal cathartico amargo (Lus.); Bittersalt, eller engelskt salt (Suec.).

1) Im Handel vorkommend.

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Witr. WW. C. Fi. G. Par. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

In vierseitigen Prismen, welche in vierseitige Pyramiden oder in eine zweiseitige? Spitze ausgehen, weiß, zerfallend, am Feuer schmelzend, von sehr bitterem Geschmack.

Alle Pharmacopöden lassen sie auf die Weise reinigen, daß man sie in heißem Wasser auflöst, und die bis zur Salzhaut verdunstete Flüssigkeit crystallisiren läßt.

2) Im Ganzen bereitet

℞. Magnesiae subcarbonicae pulveratae quantum libet.
Acidi sulphurici (15°)

quantum sufficit

ad neutralisandam magnesiā; cocta leviter et colata evaporet, donec liquor 25 gradus indicat, tum reponatur ad locum frigidum, ut in crystallos abeat.

Purgirend. — Gabe, von drei Drachmen bis zu einer und einer halben Unze in einem Pfund Wasser; eine bis zwei Unzen und mehr, in Klystir. Salzsaures Ammoniak und Kalz, kohlensaures Kali und Natron, essigsaures Blei und salpetersaures Silber dürfen nicht damit verbunden werden.

Liquor Magnesiae sulphuricae. (Bor4)
Ut reagens.

Pulvis salinus compositus s. Cheltenhamensis. (B. Ed. C.)*

℞. Magnesiae sulphuricae,
Salis culinaris,

singulorum partes quatuor.

Kali sulphurici . . . partes tres.

Salia quodlibet separatim pulverata tritundo misce. (B*. Ed. C.)

B*. Sal s. communis grana centum viginti, Salis Epsomensis sexaginta sex, Kali sulphurici decem et Ferri sulphurici granum dimidium.

Gabe, einen Kaffeelöffel voll in einer Pinte Wasser.

Pulvis digestivus. (Br.)

℞. Salis Sedlitzensis . . . uncias duas.
Nitri depurati,

Cremoris Tartari,

Radici Ari maculati pulveratae,
singulorum unciam unam.

Sal s. Ammoniaci . . . drachmas sex.

Misce fiat pulvis. — Dieselbe Anwendung, wie beim vorhergehenden und dem Pulvis stomachicus Birkmanni verwandt.

Pulvis purgans. (E.)

℞. Magnesiae sulphuricae,

Pulveris Chinae,

singulorum drachmas sex.

Misce et divide in quatuor partes. — Gabe, ein Pulver alle zwei Stunden.

Potio cathartica s. laxans, Liquor salinus laxativus, Haustus cathartici salinus, Mixtura e Magnesia sulphuri.

ca, Aqua mineralis cathartica. (Fer. Wir. WW. Au. B. E. Sa. Sw)

℞. Magnesiae sulphuricae,
Mannae calabrinae,
singulorum unciam unam.

Aquae calidae . . . uncias quatuor.
Solutionem cola. (WW.)

℞. Magnesiae sulphuricae
unciam unam.

Aquae bullientis . . . libram unam.
Solutioni adde

Magnesiae grana octo ad decem.
Misce. (Sw)

Swediaur giebt diese Formel unter dem Namen *Potio cathartica* und *Aqua mineralis cathartica*. Die Flüssigkeit kann das Ecdlicher Wasser ersetzen.

℞. Magnesiae sulphuricae,
Tincturae Rhei aquosae,
singulorum unciam unam.

Aquae Melissa . . . uncias duas.

Zuf zwei ober vier Mal, Morgens und Abends, zu nehmen. (Au.)

℞. Magnesiae sulphuricae
unciam unam.

Tartari stibiati . . . granum unum.

Succi Citri . . . unciam unam.

Aquae purae . . . uncias tres.

Gabe, alle zwei Stunden einen Eßffel voll.

℞. Foliorum Sennae unciam dimidiam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut infundendo colatura sit unciarum octo, quibus adde

Magnesiae sulphuricae
unciam unam.

Zuf zwei Mal zu nehmen. (B.)

℞. Foliorum Sennae unciam dimidiam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut infundendo colaturae sit unciarum quatuor, cui adde

Tincturae Rhei aquosae uncias sex.

Magnesiae sulphuricae
unciam unam.

Zuf zwei ober drei Mal zu nehmen. (B.)

℞. Foliorum Sennae . . . drachmas sex.
Mannae,
Magnesiae sulphuricae,

singulorum unciam unam.

Cardamomi minoris drachmas duas.

Aquae bullientis . . . octarium unum.

Infunde per horae quadrantem et cola. — Gabe, alle Stunden eine Tasse voll. (R.)

℞. Foliorum Sennae . . . drachmas tres.
Magnesiae sulphuricae

drachmas sex.

Aquae bullientis . . . uncias sex.

Post duodecim horarum infusionem cola. (Fer.)

Potio salina. (Ham.)

℞. Tartari stibiati . . . granum unum.
Magnesiae sulphuricae

unciam unam.

Dissolve in

Aquae fontanae . . . uncias octo
Solutioni adde

Mellis glycyrrh'zati unciam unam.
Auf vier ober fünf Mal zu nehmen.

(Ham.)

Ca. giebt unter dem Namen *Aqua Tra-*
vezii folgende Formel:

℞. Magnesiae sulphuricae
unciam unam.

Tartari stibiati granum dimidium.

Aquae . . . libras duas.

Gabe, stündlich ein Glas voll, zum Ab-

führen.

Mixtura salina antacidica. (B.)

℞. Magnesiae sulphuricae
drachmas duas.

— subcarbonicae

scrupulum unum.

Syrupi Althaeae
unciam unam cum dimidia.

Aquae florum Chamomillae
uncias duas.

Gabe, alle zwei Stunden einen Eßffel voll, bei Kindern.

Mixtura oleoso-salina. (Ham.)

℞. Salis Anglicani . . . unciam unam.
Aquae . . . libram dimidiam.

Solutioni adde
Olei Ricini cum Vitello ovi triti
unciam unam.

Aqua Sedlitzensis artificialis. (Gal.)

℞. Aquae triplo volumine Gas acidi
carbonici impregnatae
uncias viginti eum dimidia.

Magnesiae sulphuricae
drachmas duas.

— hydrochloricae
grana octodecim.

Dissolve. — Man kann es gehaltreicher und dem natürlichen Wasser ähnlicher machen, indem man vier Drachmen schwefelsaure Magnesia und sechs und breißig Gran salzsaure Bittererde in derselben Menge Sauerwasser auflöst.

Enema purgans s. catharticum, Clyster catharticus. (Du. RC. WW. Au. E. Fi.)

℞. Mannae . . . unciam unam.
Decocti Chamomillae

uncias decem.

Solutioni adde
Olei Olivarum . . . unciam unam.

Magnesiae sulphuricae
unciam dimidiam.

Misce. (Du. C.)
WW. praescribit solutionem Magnesia-

siae sulphuricae drachmarum sex in Aquae calidae uncias decem; — E.

Magnesiae sulphuricae unciarum dua-

rum in infusi Sennae octario uno; aut Salis unciarum duarum in decocti tepidi Amyli octario uno, addendo Olei Olivarum unciarum unam; — R.C. Infusi: Foliorum Sennae uncias quatuor, Magnesia sulphuricae unciarum unam, Aquae tepidae uncias septem, Olei Lini vel Olivarum unciarum unam; — *Fi.* Decocti Malvae uncias decem, Magnesia sulphuricae unciarum dimidiam, Olei Olivarum uncias duas.

R. Florum Chamomillae uncias duas. Seminum Lini . . . unciarum unam. Aquae . . . quantum sufficit ut coquendo unciae sex obtineantur, quarum colaturae adde

Magnesiae sulphuricae unciarum dimidiam.

Olei Lini unciarum unam cum dimidia

Misce. (*Au.*)

R. Decocti Gruti . . . uncias octo. Magnesia sulphuricae drachmas duas.

Saponis medicinalis unciarum dimidiam.

Misce. (*Au.*)

R. Magnesiae sulphuricae drachmas sex. — purae . . . grana sex. Aquae . . . unciarum tres. Tincturae Cardamomi drachmam unam.

Misce. (*Sw.*)

R. Magnesiae sulphuricae drachmas sex. Aquae fontanae . . . uncias tres. Tincturae Sennae . . . drachmas sex.

Misce. (*Sal.*)

R. Magnesiae sulphuricae uncias tres. Kali sulphurici, — tartarici, singulorum unciarum dimidiam.

Aquae . . . uncias quindecim. Solutionem filtra. (*Wir.*)

Aqua amara s. Sulphatis Magnesia carbonicae. (*Fer. Ful. Suec. Fi. Ra. Vm.*)

R. Magnesiae sulphuricae partes septem. Aquae fontanae partes triginta sex. Solutionem colatam Acido carbonico saturam. (*Suec.*)

R. Magnesiae sulphuricae partes tres. Aquae . . . partes viginti duas. Solutioni adde Acidi carbonici liquidi partes viginti duas.

Misce exacte. (*Fenn. Vm.*)

R. Aquae . . . libras tres cum dimidia. Acidi sulphurici partibus sex Aquae diluti . . . drachmas decem.

Magnesiae subcarbonicae drachmas tres.

Dissolve in lagena pro partibus tertis duabus solida repleta. (*Ra.*)

R. Magnesiae sulphuricae unciarum unam.

Aquae purae . . . uncias quatuor. Solutioni adde

Ammonii subcarbonici liquidi, Acidi sulphurici aqua diluti, singulorum scrupulum unum.

Nuf einmal zu nehmen. (*Fer. Fi. T.*) Auch kann man irgend einen Syrup einzusetzen. (*Fi.*) — Man will, mit drei solen Gaben, Wechselstieber mit gastrischen Symptomen ohne China geheilt haben.

Serum lactis aperitivum. (*Sm.*)

R. Seri clarificati libram unam (*chopine*).

Radici et herbae Taraxaci, Herbae Fumariae, Foliorum Nasturtii aquatici, — Chaerophylli, anborum pugillum unum.

Bulliant per sex circiter temporis momenta, tum cola fortiter exprimendo et colaturae adde

Salis Seignette drachmam unam ad duas.

Mellis Narbounensis (*puri*) drachmas sex.

Von van Swieten bei Anschwellungen der Unterleibsorgane empfohlen. Alle Morgen nüchtern vier Gläser in Zwischenräumen von einer Stunde zu nehmen. Nach einem Monat erlegt man es durch Spaawasser.

Protosulphas Magnesia cum Deutosulphate Sodii, Sulphas Magnesia et Soda, Sal Medevense artificiale. (*Fi.*)

R. Magnesiae sulphuricae depuratae libras duas.

Natri sulphurici . . . libram unam.

Aquae fontanae purae libras sex.

Solve salia, per chartam filtra et ad cuticulam usque consume; fluidum calidum adhuc in vase fictili vitreato ad crystallandum seponere etc.

Magnesia hydrochlorica, Proto-hydrochloras Magnesia, Hydrochloras s. Murias Magnesia, Chloruretum Magnesia. (*R.C. Fi. Vm.*)

R. Magnesiae sulphuricae partes decem.

Kali hydrochlorici partes septem.

Pulverata salia misce in patella (*Terrine*) arenacea, superfunde Aquae tepidae dimidium ponderis eorum, refrigerata et decanthata tum evaporent, et crystalli ortis separatis, liquorem concentratissimum lapidi sicco infunde.

R. Magnesiae subcarbonicae

quantum vis.

Acidi muriatici . quantum sufficit.

Magnesiae vasi vitreo ingestae acidum infunde, donec effervescentia cessaverit, filtra per chartam et in vasi vitreo ad siccum usque vaporando redige. (RC. Fi. T.)

Magnesia silicica, Silicas Magnesiae.

1) *Creta gallica*; Französische, Briançonner Kreide; Craie de Briançon.

Br.

In derben, aus kleinen perlmutter- oder seibenglänzenden Schuppen bestehenden Stücken.

2) *Talcum Venetae, Stella Terrae*; gemeiner Talk, Talk; Talc (Gal).

Br. Wir. G. Sp.

In verschiednen gebogenen, glänzenden, grünlichweißen, fettig anzufühlenden, sehr zarten, biegsamen, nicht elastischen, leicht zu rißenden Platten.

Arcanum cosmeticum. (B*.)

R. Talci Venetae . drachmam unam.

Olei Camphorae drachmas duas.

Digere in balneo aquae et misce.

Magnolia.

Magnolia glauca, L.; blaugrüne Magnolie; Magnolier glauque (Gal); Sweet scented magnolia (Ang.).

Am. C.

Ein kleiner Strauch (Polyandria Polygynia, L.; Magnoliaceae, J.) Norbamerica's. (Dill. Elth. t. 168. f. 205. Big. II. t. 27.).

Die Rinde hat einen gewürzhaften, sassafrasähnlichen Geruch.

Tonisch, reizend, schweißtreibend.

Man wendet die Linctur bei chronischen Rheumatismen an; auch gebraucht man sie gegen Wechselfieber.

M a l t u m .

Malthum: Gerstenmalz; Malt (Gal); Byne (Ang.); Malt (D. Succ.); Grano tosto (I.); Stod jeczmienny (Pol.).

Ba. Bor. BorC. Bor4. D. Du. Han. Hass. Pol. R. RC. Sax. Suec. Be. M. Sp.

Gerste, welche man durch Anwendung einer starken Hitze im Reimen unterbrochen hat, welche man dann trocknen läßt und wovon man die Keime trennt.

Das Malz enthält mehr Sagemehl, Zucker und Schleimharz als die nicht gekeimte Gerste; auch ist es dieser als erweichendes Mittel vorzuziehen. Es bildet den Grundbestandtheil des Biers. Bisleicht hat man es etwas zu voreilig unter die antiscorbutischen Mittel gezählt.

Infusum Malthi s. Bynes. (His. Li. Suec. Sp.)

R. Malti grossiuscule moliti

libram unam.

Aquae bullientis libras duodecim.

Infunde per horas aliquot et cola. (Suec. Sp.)

Li. Malti uncias quatuor, Aquae bullientis libram unam et quatuor. horas infusionis; — His. Essentiae Malti octarium unum et tres Aquae bullientis.

Wird dieser Aufguß bis zur Honigdicke abgedampft, so erhält er den Namen *Essentia Malti*; Malzessenz; *Essence de malt*. Auf diese Weise bereitet führt man ihn auf langen Reisen bei sich, um Bier zu bereiten.

Decoctum s. Apozema Malti, Mustum Hordei, Decoctum Malti per se s. acidulum s. compositum. (B*. BorC. Galm. RC. Wür. Au. Sa. Sw.)

R. Malti moliti . . . uncias quatuor.

Aquae . . . libras quatuor.

Decoque ad librarum trium remanent am. (BorC. Au.)

R. Malti semilibram.

Aquae fontanae libras sex.

Decoque ad colaturam librarum quatuor, cui interdum adduntur:

Acidi tartarici drachmae duae vel

— Sulphurici diluti

semuncia vel

Roob baccarum Oxycocci vel

Molasses vel

Oxymellis simplicis vel

Succi Citri uncias tres.

(RC.) — Gabe, allein zum gewöhnlichen Getränk bei Scorbut; in Verbindung mit den genannten Zusätzen täglich ein bis zwei Pfund.

R. Malti uncias sex.

Aquae fontanae . . . libras quatuor.

Post horae quadrantem bullitionis adde

Seminum Foeniculi semidrachmam.

Stent, leni calore, in digestionem vase tecto, tum coentur. (Sa.)

R. Malti moliti . . . uncias quatuor.

Coque cum

Aquae . . . sufficiente quantitate

ut colaturae octarius unus (litre) obtineatur, sub fine addendo

Radici Liquiritiae

drachmam unam.

Decantha. (Galm.)

B*. Malti uncias sex et Aquae libras sex ad quatuor redgendas. In fine addi possunt Foeniculi scrupuli quatuor et Liquiritiae drachmas tres.

R. Malti uncias sex.

Aquae libras quinque.

Ad libras quatuor redactis, colaturae adde

Syrupi Acidi citrici uncias quatuor.

Misce bene. (Sw.)

℞. Malti sicci . . . uncias duas.

Aquae communis libras quatuor.

Coque et colaturae, si necesse est, adde

Oxymellis uncias tres vel quatuor.

Coqui cum malto possunt etiam uvae passae. (Wür.)

Gabe, täglich zwei bis vier Pfund.

℞. Malti Hordei . . . uncias quatuor.

Specierum Turionum Pini comp.

uncias duas.

Aquae fontanae . . . libras quatuor.

Decoque ad librarum trium colaturae remanentiam, vel

℞. Decocti Malti per se

— antiscorbutici aciduli,
singulorum partes aequales.

Gabe, drei bis vier Mal täglich vier Unzen. (RC.)

Gargarisma antiscorbuticum. (Sm.)

℞. Malti . . . unciam unam.

Nasturtii aquatici

manipulum unum.

Aquae . . . libras quatuor.

Decoque ad librarum duarum remanentiam et adde

Aluminis . . . drachmas duas.

Salis Ammoniaci drachmam unam.

M a l v a .

Unter diesem Namen kommen in den Pharmacopöen drei Pflanzen vor:

1) *Althaea rosea*, Cav.; Pappelrosen, Stocrofenibisch; Passerose, Rose trémière (Gal.); Hollyhock (Ang.); Zahradnj neb kzmjky slez (C.); Haestro e (D.); Stokros (Bel.); Alcea, Malvone, Rosone (I.); Czarna roza (Pol.); Stockros (Succ.).

Ba. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Suec. Wir. Wür. Be. Br. Fi. M. Pid. Sp. Z.

♂ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine ursprünglich im Orient einheimische, in Euroäisichen Gärten gebaute Pflanze. (Hayne II. 26. Blackw. t. 54. Cav. diss. II. t. 28 f. 1. Plenck t. 542. Düss. off. Pfl. IV. t. 1. Zorn Ic. pl. t. 236.)

Man wendet die Blüten (fiores Malvae arboreae s. roseae s. hortensis; an; sie sind groß und von sehr verschiedener Farbe; man nimmt nur die dunkelschwarzen oder bräunlichrothen. Sie haben einen schwachen Geruch und einen schleimigen, etwas stypfischen Geschmack.

2) *Malva rotundifolia*, L.; gemeine oder Käsepappel, Gänsepappel, rundblättrige Malve; Mauve à feuilles rondes, petite mauve (Gal.); Round leav'd mallow (Ang.)

Zagecj slez (P.); Store kattervst (D.); Malva de boja redonda (His.); Rondbladige maluwe (Bel.); Malva minore (I.); Szluz ziele (Pol.); Malva ordinaria (Lus.); Kattost (Succ.).

A. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. Pid. Sp. Z.

⊙ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Hayne II. t. 27. Plenck t. 541. Blackw. t. 22. Düss. off. Pfl. V. t. 7. Zorn Ic. pl. t. 237.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut, die Blüten und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae minoris s. vulgaris) ist dünn, walzig, faserig, weiß. Sie hat einen süßen, fast zuckerartigen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem runden, behaarten Stängel und kreisrunden, herzförmigen, fast fünfspitzigen Blättern von schleimigem, etwas bitterem Geschmack.

Die Blüten sind sehr klein, hellpurpurroth, fast weiß.

Der Saame ist klein, nierförmig, schwarz.

3) *Malva sylvestris*, L.; wilde, Balde-Malve; Mauve sauvage (Gal.); Common mallow (Ang.); Lillekattost (D.); Wilde maluwe (Bel.); Malvoine (I.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Ed. Gal. Galm. Gen. Ham. Hass. His. Lon. LonN. Lus. O. Pal. WW. C. M.

⊙ Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 22. Plenck t. 540. Hayne II. t. 28. Düss. off. Pfl. VII. t. 23. Zorn Ic. pl. t. 480.)

Man wendet ebenfalls die Wurzel, das Kraut, die Blüten und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae sylvestris) ist weißlich, von süßem und klebrigem Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem walzigen, schwach behaarten, ästigen Stängel und runden, am Grunde herzförmig ausgebreiteten, an den Rändern gekerbten, in fünf bis sieben kurze Lappen getheilten Blättern.

Die Blüten sind sehr groß, rosenroth, rothgestreift, bisweilen weiß.

Der Saame ist gelblich und glatt.

Beide Pflanzen sind erweichend.

Species emollientes, Species pro gargarismate emolliente. (Ful. Li. Suec. Fi.)

℞. Foliorum Malvae partes duodecim.

Florum Chamomillae partes sex.

Seminis Lini . . . partes tres.

Concisa et contusa misce.

℞. Foliorum siccatorum Malvae,

—

— Althaeae,

Foliorum siccatorum Verbasci,
singulorum uncias sex.
Florum Sambuci . . . uncias tres.
Concisa misce. (Fi.)

Flores bechici. (Gal.)

℞. Florum Malvae,
— Immortellae,
— Farfarae,
— Rhoeados,
singulorum partes aequales.

Misce.

Conserva Malvae. (An. Sar. Wür.)

℞. Florum Malvae contritorum
partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Fiat pasta homogenea. (Wür.)

℞. Florum Malvae cum Sacchari pau-
xillo contusorum partem unam.
Sacchari clarificati . partes tres.
Ebulliant. (Sar.)

℞. Florum Malvae subtil. pulv.
partem unam.

Aquae Malvae quantum sufficit ut
fiat pasta, quae in vase clauso per
horas octo ad decem teneatur, ut pul-
vis penitus mollescat; adde solutionem
Sacchari albi pulver. in Aqua Malvae
et pastae refrigeratae adde Sacchari al-
bi subtilissime pulv. tantum ut omne
Saccharum partes quinque impleat. (T.)

℞. Pulveris Foliorum Malvae sicca-
torum . . . partem unam.
Sacchari albi . partes quinque.
Aquae destillatae . partes duas.
Contere. (An.)

Cataplasma emolliens. (Fer.)

℞. Malvae pulveratae uncias quatuor.
Radici Althaeae pulveratae
uncias duas.

Decocti Althaeae quantum sufficit
ut fiat coctione pasta mollis.

Aqua Malvae. (Sar.)

℞. Herbae Malvae recentis
partem unam.
Aquae purae . . . partes duas.
Destillent trientes duo.

Infusum Malvae s. bechicum. (GalM.
ParC. Ra. Sp. T.)

℞. Foliorum Malvae siccatorum
manipulo tres.
Aquae bullientis libras quatuor.
Infunde et cola. (Sy.)

℞. Foliorum Malvae siccatorum
drachmas duas.
Liquiritiae rasae drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit
ut colaturae octarius unus obtineatur.

(GalM. ParC.)

℞. Florum Malvae drachmas duas.

Pharmacopoea universalis. II.

Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola. (Ra.)

Erweichend.

T. Cujusque partes dimidias jubet.

Decoctum Malvae. (T.)

℞. Foliorum Malvae uncias tres (re-
centium sex).
Aquae . . . libras quatuor.
Decoque ad dimidii remanentiam et
cola.

Decoctum Malvae compositum. (B*. Lon.
LonN.)

℞. Foliorum Malvae siccatorum
unciam unam.
Florum Chamomillae semunciam.
Aquae . . . octarium unum.
Coque per horae quadrantem et cola.
In Bädungen und Rhyffiren.

Tisana pectoralis. (Gal)

℞. Florum bechicorum
drachmas duas.

Aquae bullientis . . libras duas.
Post horae quadrantem infusionis co-
la et adde

Syrupi Capilli Veneris

unciam unam.

Clyster emolliens. (His. Ra. Sp. Sw.)

℞. Foliorum Malvae . semunciam.
Aquae bullientis . . libram unam.
Coque et cola. (Ra.)

℞. Foliorum Malvae unciam unam.
Florum Chamomillae semunciam.
Aquae . . . sesquilibram.
Coquendo partem tertiam consume.

(Sw.)

℞. Foliorum Malvae unciam unam.
Florum Chamomillae,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Aquae . . . uncias duodecim.

Coque et cola. (Sp.)

℞. Foliorum Malvae,
— Betae Cyclae,
singulorum uncias duas.

Aquae . . . libras duas.

Decocto adde

Olei Olivarum . . uncias tres.

Misce bene. (Ra)

His. Decocti Malvae uncias decem,
Mellis et Olei Olivarum, singulorum
uncias duas.

Gargarisma leniens. (Ra.)

℞. Decocti Malvae uncias quatuor.
Lactis vaccini . unciam unam.
Misce.

Fomentatio antihæmorrhoidalis. (Pie.)

℞. Foliorum Malvae,
— Verbasci,
singulorum manipulos tres.

Aquae fontanae . . . libras tres.
Coque et cola.

Unguentum Malvae s. malvinum.
(Fi. T. Vm.)

R. Herbae Malvae recentis
sesquilibram.
Butyri recentis . . . libras duas.
Coque lente ut humidum evanescat
et cola exprimendo. (Vm.)
R. Axungiae Porci colatae libras duas.
Adipis bubuli colati libram unam.
Foliorum Malvae viridium
libras tres.

Axungiae et adipi liquatis adde folia
contusa et coque per horae spatium
et exprime; refrigerato unguento aquam
separa, liquefac et ad consistentiam
melleam consume. (Fi. T.)

Tinctura Alcaeae purpureae. (Fi.)

R. Petalorum Alcaeae purpureae sic-
catorum . . . drachmam unam.
Alcoholis 24^o . . . uncias duas.
Post duorum dierum tepidam infu-
sionem filtra.

M a n g a n e s i u m.

Man wendet in der Medicin von diesem
Metall folgende Präparate an:

Tetroxydum Manganisii, Magnesia
nigra s. viriariorum, Magnesium oxyda-
tum nativum s. nigrum, Manganesium
ochraceum nigrum s. oxydatum nativum,
Manganum oxydatum nativum s.
hyperoxydatum, Manganesium, Manga-
nium, Manganum hyperoxydatum, Mo-
lybdaenum Magnisii, Oxides Manganii
nativa, Oxydum Mangani nativum,
Oxydum Magnisii s. Mangani nigrum
s. nigrum nativum, Peroxydum Manga-
nesii nigrum nativum, Superoxydum
manganicum: Braunstein, Graubraunstein-
erz; Tetroxide de manganèse, Magnésie
noire, Manganèse oxidé, H., Oxide
noir de Manganèse, Peroxide de Man-
ganèse, B., Acide manganésique, Savon
des verriers, Savon de verre (Gal.);
Manganese (Ang.); Brunsteen (D.);
Magnesia (His. Lus.); Magnesia nera,
Manganese, Sapone de Vetráj (I.);
Bruinsteen (Bel.); Mangana (Pol.);
Margarnezi (R.); Brunsteen (Succ.).

A. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br.
D. Du. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han.
Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. RC.
Sax. Suec. Wir. WW. A. C. Fi. G. T.

In matten, in der Farbe vom reinen
Schwarzen bis zum Braunen und Violet-
braunen wechselnden Massen.

Die medicinische Anwendung dieses Dryde
ist beschränkt. Man hat es, mit gleichen

Theilen Schmeer gemischt, bei Kopfgrind,
Krätze und Flechten benützt. Man braucht
auch nur die leidenden Theile mit dem
Pulver zu bestreuen. Besonders aber be-
dient man sich desselben zur Bereitung des
Chlors.

Boli emmenagogi.

R. Mangani oxydati nigri
grana quatuordecim.
Extracti Sabiniae,
— Aloës,
singulorum grana decem.

Fiant boli sex. — Den Tag über zu
nehmen.

Hydrochloras Manganisii, Murias Man-
ganisii. (B*)

R. Manganisii . . . quantum vis.
Acidi hydrochlorici tenuis
quantum sufficit
ad solutionem metalli. Liquor evaporet.

Pilulae Manganisii muriatici s. Hy-
drochloratis Manganisii. (B* Au)

R. Manganisii muriatici
scrupulos duos.

Gummi Arabici,
Radicis Liquiritiae,
singulorum scrupulum unum.

Fiant pilulae granorum duorum, pul-
vere Ciunainomi conspergendae.

Gabe, zehn bis zwanzig Stück bei Flech-
tentübeln.

Man hat auch eine wässrige Auflö-
sung dieses Salzes in Suroelwasser gegen
Schwämmchen gerühmt. Auch das essigsau-
re Mangan, ein Scrupel auf drei Unzen
Wasser, so wie eine Salbe aus gleichen
Theilen schwefelsaurem Mangan und Schmeer
sind gleichfalls empfohlen worden. (Au.)

M a n n a.

Mellæ; Manna; Manne (Gal.); Man-
na (Ang. B. D. I. Lus. Pol. R. Suec.);
Man, Terinjehin (Ar.); Mana (His.);
Schirkischt (Hin. Pe.); Gamburg (Ja.);
Kapurrimba (Mal.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful.
Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass.
HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.
Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A.
Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa.
Sp. Z.

Eine zuckerige Substanz, von welcher
man mehrere Sorten unterscheidet:

1) Manna canellata s. canaliculata s. can-
nulata s. longa; Manna in Stöben, Manne
en bâtons (Gal.); in auf der einen Seite
hohlen, auf der andern gewölbten, leichten,
weißlichen oder hellgelben, bisweilen röth-
lichen Stücken von angenehmem Geschmack,

Manna in lacrymis s. lacrymata genannt, wenn sie kleiner sind.

2) *Manna in sortis s. communis*; gemeine Manna; Manne commune ou en sorte (*Gal.*) in rundlichen Broten oder länglichen, gelblichen, weichen, fettig anzufühlenden, schweren, die Hände beschmierenden Stücken von etwas widerlichem Geschmack. Man nennt sie auch Manna von Syraci oder Serace oder von Capaci (erstere in Nedercalabrien, letztere auf Sicilien gelegen), Manne geracy, Manne capacity (*Gal.*). Die körnigen und weissen Stücke von ersterer werden unter dem Namen Manna electa s. granulosa, Manne choisie ou en grains (*Gal.*) abgefordert.

3) *Manna grassa, spissa, sordida, pinguis*, ist sehr feucht, gelblich, weich, klebrig und mit fremden Körpern verunreinigt.

Man erhält fast alle diese Substanzen durch Einschnitte, welche man in den Stamm von *Fraxinus excelsior*, *L.*, *rotundifolia*, *Link.*, *parviflora*, *Link.*, *subrufescens*, *Mér.*, *Ornus*, *L.* und *argentea*, *Lois.* macht. Die von selbst ausfließende Manna ist selten und in Körnern von der Größe der Weizenkörner, sie führt den Namen Mastichua, Manna di fronde.

Die Manna enthält, nach *Lénaud*, Zucker, einen eigenthümlichen Stoff, Manna genannt und einen ekelerregenden Stoff.

Außerdem kennt man noch die

1) *Manna Brigantina s. laricina*; Manne de Briancon (*Gal.*), in kleinen, weissen klebrigen Körnern. Sie schmilzt im Süden aus den Blättern von *Larix Europaea* aus.

2) *Manna persica*; Manne d'alhagi (*Gal.*); Transchibil, Tarandjabin (*Pe.*), in kleinen gelben, röthlichen oder braunen Körnern, welche im Orient aus den Blättern und Zweigen von *Hedysarum Alhagi* ausfließen.

Trochisci Mannae, Tabellae Calabricae. (*GalF. GalH. Vm.*)

℞. Gummi Tragacanthae partem unam.

Sacchari albi partes nonaginta sex. Contere et adde

Mannae . . . partes viginti quatuor.

Aquae Florum Aurantium

quantum sufficit

ut fiat pasta in trochiscos dividenda.

(*Vm.*)

℞. Radicis Althaeae partes nonaginta sex.

Aquae purae partes duodecies mille.

Coque per sexagesimas sex et adde

Sacchari . . . partes ter mille.

Mannae Calabrinae

partes centum nonaginta duas.

Cola et albumine clarificatis adde
Extracti Opii gummosi partes sex.
Olei essentialis Bergamottae
guttas decem.

Aquae Florum Aurantium
partes nonaginta sex.

In modulos chartaceos oleo obductos effunde et antequam refrigescat in trochiscos divide. (*GalF. GalH.*)

Gelatina laxans. (Pie.)

℞. Carnis vitulinae . . . libras duas.
Aquae octarios duos.

Coque per horas duas et adde
Mannae in lacrymis uncias tres.

Coque iterum per horas duas et per cribrum trajecta ad refrigerantem reponere. — Eßlöffelweise alle Stunden.

Electuarium s. Pulcicula de Manna. (*Fenn. Pal. Suec. Wir. Sw.*)

℞. Mannae purae . . . partes tres.
Olei Amygdalarum dulcium

partem unam.

Tere et adde pedetentim
Syrupi Mannae . . . partem unam.

Misce bene. (*Vm.*)

℞. Mannae electae . . . uncias duas.
Aquae Foeniculi . . . unciam unam.

Tere frigide, cola et colaturam tritura cum

Sacchari unciis duabus.
Iridis Florentinae drachma una.

Producto adde
Olei Amygdalarum dulcium

unciam unam.

Misce. (*Vm.*)

Fenn. et Suec. Mannae uncias duas, Sacchari, Aquae Foeniculi, singulorum tantidem, Iridis Florentinae drachmam unam et Olei Amygdalarum dulcium unciam unam; — Pal. et Wir. Sacchari, Mannae, Aquae Florum Prunellae, singulorum uncias duas, Iridis drachmam unam et Olei unciam unam; — Wir. Mannae, Sacchari, Aquae Rosarum, singulorum uncias duas, Iridis drachmam unam et Olei semunciam.

Ein sanftes Abführmittel, welches besonders bei neugeborenen Kindern empfohlen ist. — Gabe, eine bis vier Drachmen

Electuarium bechicum. (GalF.)

℞. Mannae electae . . . unciam unam.
Aquae Florum Aurantium

quantum sufficit

ut manna trititando in mortario marmoreo mollis fiat; terendo continue

adde

Pulveris Gummi Arabici semunciam.

Extracti Liquiritiae mollis
drachmam unam.

Syrupi Capilli Veneris
quantum sufficit.

Electuarium antihaemorrhoidale. (Ca.)

℞. Mannae in lacrymis uncias duas.
Kali sulphurici,
Nitri,
Magisterii Sulphuris,
singulorum drachmas duas.
Mellis albi . . . quantum sufficit.
Gabe, zwei bis drei Drachmen täglich.

Looch Mannac s. de Manna. (GalH.)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Althaeae,
Mannae in lacrymis,
singulorum partes quatuor.
Aquae Florum Aurantium
partem unam.
— purae . . . partes duas.

Mannam in aqua, blando calore solutam oleo et syrupo mixtis adde et misce exacte.

Dieses Präparat, welches von Chevalier und Zdt vorge schlagen wurde, unterscheidet sich wenig von dem Linctus s. Marmelada Tronchini. Uebrigens giebt es noch ähnliche, unter dem Namen: *Linctus mannatus* (Wür. Sa. Sw.), *Linctus aperiens* (Sa.), *Mixtura laxans* (Sy.) und *Potio purgans* (Pie. Sm.), zu denen die Formeln folgende sind:

℞. Mannae purae . . . uncias tres.
Olei Amygdalarum dulcium
sesquiunciam.

Misce triturando. (Sw.)

Sa. Mannae et Olei partes aequales, Vitelli Ovorum quantitatem sufficientem; — Wür. Mannae, Olei et Syrupi Violarum partes aequales; — Sa. Olei, Mannae, singulorum unciam unam et Syrupi Rosarum solutivi semunciam.

℞. Gummi Arabici . . . unciam unam.
Olei Amygdalarum dulcium
uncias duas.

Decocti Hordei . . . uncias decem.
Mannae . . . unciam unam.
Mellis semunciam.

Misce. (Sy.)

℞. Olei Ricini cum Vitello Ovi subacti,

Mannae electae,
singulorum unciam unam.
Magnesia subcarbonicae
drachmas duas.

Aquae Hyssopi . . . uncias octo.

Misce. (Sm.)

℞. Florum Persicae,
— Violarum, singulorum manipulum diuidium

Aquae fontanae quantum sufficit.
Cottis leviter, in colatura solve
Mannae uncias duas.

Adde deinde

Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.

Misce bene. (Pie.)

Cassia cum Manna, Decoctum Mannae purgans s. laxativum s. carminativum, Potio anglica s. laxativa s. anticolica s. Mannae tamarindinata s. salina mannata, Aqua angelica Viennensis s. laxativa, Manna liquida. (GalM. His. Pal. Au. B. Ra. Sp. T)

℞. Mannae uncias tres.
Aquae communis . . . uncias sex.
Dissolve. (Ra.)

℞. Mannae uncias duas.
Aquae libram unam.

Solutioni adde

Pulpae Cassiae . . . unciam unam.
Kuf zweimal zu nehmen. (B.)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae bullientis . . . uncias quinque.
Mannae electae . . . uncias duas.

Solutionem cola. (Sp.)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae fontanae . . . uncias octo.

Coque et adde

Mannae canaliculatae uncias duas.

Manna vix soluta, vase ab igne remoto infunde Succu Limonum expressi semunciam et cum albumine subacto clarifica, addendo Corticis recentis Limonis frustum, post refrigerationem filtra per linteum. (T.)

℞. Pulpae Cassiae . . . semunciam.
Salis vegetabilis sesquidrachmam.

Mannae uncias duas.
Aquae fontanae . . . uncias quinque.

Solutionem cola. (Sp.)

℞. Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Mannae unciam unam.

Aquae Chamomillae uncias novem.
Solutionem cola. (Au.)

℞. Mannae unciam unam.
Natri sulphurici . . . sesquiunciam.

Aquae uncias sex.
Dissolve. (Au.)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae bullientis . . . uncias octo.

Solutioni adde

Mannae uncias duas.
Salis vegetabilis sesquidrachmam.

Succi Citri fructus no. 1.

Infunde totum Cortici Citri et clarificatum albumine cola. (Pal. Sp.)

℞. Mannae uncias duas.
Foliorum Sennae . . . drachmas sex.

Magnesiae sulphuricae
drachmas duas.

Aquae . . . uncias quatuordecim.
Coque leviter ad librae unius remanentiam et cola deinde. (His.)

℞. Sennae drachmas duas.

Natri sulphurici . . . semunciam.
 Aquae uncias octo.
 Coque per sexagesimas aliquot et
 adde

Mannae uncias quatuor.
 Cola. (GalM.)

℞. Aquae uncias octo.
 Agita cum albumine et adde deinde
 Foliorum Sennae . drachmas tres.
 Mannae uncias tres.
 Cremoris Tartari drachmam unam.
 Dissolutionem coquendo clarificatam
 saepius per pannum cola et adde tan-

dem
 Aquae Cinnamomi
 scrupulum unum.

Xuf einmal zu nehmen. (His.)

℞. Mannae uncias quatuor.
 Foliorum Sennae mundatorum
 unciam unam.

Cremoris Tartari,
 Seminum Anisi,
 singulorum semunciam.

Aquae libras quatuor.
 Digere per horam dimidiam, tunc
 coque parumper et cola.
 Gabe, sechs Unzen. (His.)

Emulsio purgans. (Fer. His. Au. Ra.)

℞. Amygdalarum dulcium
 drachmas quatuor.
 Mannae in lacrymis uncias duas.
 Syrupi Florum Persicae
 unciam unam.
 Infusi Liquiritiae uncias quatuor.
 Aquae Florum Aurantiorum
 drachmas quatuor.

Fiat emulsio. (Ra.)

℞. Emulsionis non saccharatae
 uncias sex.
 Mannae uncias tres.
 Solutioni colatae adde
 Aquae Cinnamomi vinosae
 drachmam unam.

Misce. (His.)

Fer. Emulsionis uncias sex, Mannae
 uncias duas et Aquae Cinnamomi
 drachmam unam.

℞. Emulsionis gummosae
 uncias novem.
 Mannae sesquunciam.
 Dissolve. (Au.)

Serum Lactis mannatum. (Au. B.)

℞. Mannae unciam unam.
 Cremoris Tartari . . . semunciam.
 Seri Lactis clarificati uncias sex.
 Gabe, alle zwei Stunden ein halbes
 Glas (Au)

℞. Pulvae Tamarindorum,
 Mannae, singulorum sesquunciam.
 Seri Lactis . . . quantum sufficit
 ut colaturae librae duae obtineantur.
 (B.)

Potio antihydrica. (Br.)

℞. Succo Iridis uncias tres.
 Mannae sesquunciam.
 Dissolve.

Syrupus Mannae s. de Manna. (Ba.
 Bor4. Br. Ful. Pid.)

℞. Mannae electae . . uncias decem.
 Aquae fontanae uncias duodecim.
 Solutioni colatae adde
 Sacchari albi . . . libram unam.
 Coque ad syrupi consistentiam. (Br.)
 Pid. Mannae uncias duas, Aquae vi-
 ginti et Sacchari libras duas; — Ba.
 Mannae partem unam, Aquae quatuor
 et pro quaque parte colaturae Sacchari
 partem unam cum dimidia; — Ful.
 Mannae unciam unam, Aquae sesqui-
 unciam et Sacchari drachmas sex; —
 Bor4. Mannae electae semilibras, Aquae
 fervidae quantum satis ad colaturam
 unciarum octodecim; solutioni adde
 Sacchari albissimi libras duas; unica
 ebullitione fiat syrupus.

Syrupus e Manna s. Mannae cum Sen-
 na s. de Manna laxativus. (Bor. Br.
 D. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. R.
 Wir. Fi. Sp. T.)

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
 Seminum Foeniculi . . . semunciam.
 Aquae bullientis . . . libras duas.
 Infunde in vase tecto per horas ali-
 quot, cola exprimendo et uncias sep-
 temdecim colaturae adde
 Sacchari albi libras duas.
 Mannae electae semilibram.
 Fiat coquendo syrupus. (O.)

R. Sennae uncias quatuor, Foeniculi
 drachmas duas, Aquae bullientis libras
 duas, Mannae uncias sex et Sacchari
 uncias viginti duas; — Bor. Han.
 HassP. Li. Pal. Sennae uncias quatuor,
 Foeniculi semunciam, Aquae libras
 duas et pro uncis octodecim colaturae
 Sacchari libras duas et Mannae semi-
 libram; — Fi. Foliorum Sennae uncias
 quatuor, Foeniculi drachmas quatuor,
 Mannae calabrae uncias sex, Saccha-
 ri albi, Aquae bullientis, singulorum
 libras duas, digestionem horarum sex,
 additionem albuminum ovorum duo-
 rum et additis saccharo et manna co-
 ctionem ad syrupi consistentiam.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
 Seminum Foeniculi,
 Zingiberis,
 singulorum drachmam unam.
 Aquae bullientis . . . libras duas.
 Post sufficientem digestionem cola
 exprimendo et colaturae depuratae adde
 Mannae Calabrinae . . uncias sex.
 Sacchari albi uncias viginti duas.

Coque ad syrupi consistentiam. (D.)
 ℞. Radicis Polypodii . sesquiunciam.
 Specierum pro Decocto Florum et
 Fructuum,

Passularum minorum,
 singularum uncias duas.

Aquae bullientis
 libras duas cum dimidia.

Infunde per noctem; altero mane
 coquendo parte tertia consumpta, in
 colatura infunde

Foliorum Sennae uncias quatuor.
 Seminum Anisi.

— Foeniculi,

Galangae,

Macidis,

Zingiberis,

singularum drachmam unam.

Post viginti quatuor horarum diges-
 tionem in loco calido cola exprimendo,
 albumine clarifica et adde

Mannae Calabrinæ . uncias sex.

Sacchari albi uncias viginti duas.

Fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

℞. Radicis Polypodii drachmas sex.

— Iridis Florentinae

semunciam.

Uvarum passiarum drachmas tres.

Mellis . . . uncias quatuor.

Aquae fontanae

uncias viginti quatuor.

Decoque ad unciarum liquidi duode-
 cim remanentiam, in colatura per ho-
 ras duodecim infunde

Florum quatuor pectoralium
 manipulum unum.

Foliorum Sennae mundatorum
 sesquiunciam.

Cinnamomi . . . semidrachmam.

In colatura dissolve

Mannae Calabrinæ . uncias tres.

Sacchari . . . uncias duodecim.

Coque ad syrupi consistentiam. (Sp.)

℞. Sennae mundatae . uncias octo.

Seminum Foeniculi . semunciam.

Infunde

Aquae bullientis, cum Kali subcar-
 bonici drachma una impraegnati

libras decem.

Post horarum sex digestionem liqui-
 do adde

Sacchari albi . . . libras octo.

Mannae electae . . . libras duas.

Caloris et albuminis ope clarificata
 ad syrupi consistentiam evaporent, fil-
 trentur etc. (T.)

Marrubium.

Marrubium vulgare, L.; Marienwur-
 gel, weißer Andorn; Marrube blanc (Gal.);
 White horehound (Ang.); Gablecnjk
 bilj (B.); Hyd marrube (D.); Marru-

bio blanco (His.); Witte andoorn (Bel.);
 Marrobio bianco (I.); Szanta biala
 (Pol.); Marrogo branco (Lus.); An-
 doorn (Suec.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Borá.
 Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen.
 Ham Han. Hass. HassP. His. Li. Lon.
 Lon V. Lus. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür.
 WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.
 ♀ (Didymia Gymnospermia, L.;
 Labiatae, J.) Eine in ganz Europa ge-
 meine Pflanze. (Bull. t. 165. Blackw. t.
 479. Plenck. t. 487. Flor. med. IV. 226.)

Man wendet das Kraut (herba Mar-
 rubii albi s. Prassii s. Phrasi) an; es
 besteht aus einem filzigen, ästigen Stängel
 mit eirunden, rundlichen, gefielten, gefe-
 lten, oben runzeligen, unten filzigen weißli-
 chen Blättern. Es hat einen starken, durch
 Trocknen sich verlierenden Geruch und einen
 bitteren, etwas scharfen Geschmack.

Reizen, die Regeln treiben, krampffil-
 lend, fieberwidrig und bisweilen abführend.

Conserva Marrubii albi. (Ams.)

℞. Summitatum Marrubii recentium
 contusorum . . . partem unam.

Sacchari albi . . . partes tres.

Triturando misce.

Succus Marrubii albi. (Wür.)

℞. Herbae Marrubii recentis

quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, aquae
 pauxillo humectando, exprime fortiter,
 succium sepone, decantha et in lagenis
 conserva, cuique librae Alcoholis drach-
 mam unam addendo.

☞ Gabe, eine bis zwei Unzen.

Extractum Marrubii albi aqnosum. (A.

Ams. An. Bor. D. Fer. Han. Hass.

HassP. Li. Lus. O. Pol. Sax. Pid.

Vm.)

℞. Foliorum Marrubii recentium

quantum vis.

Contunde cum Aquae pauxillo et per
 pannum trajice; sepone, decantha et
 prope ignem coagulatum iterum cola;
 ad massae pilularis consistentiam red-
 acto et ab igne remoto adde faecu-
 lam ante repositam et iterum vaporan-
 do ad aptam spissitudinem redige. (Vm.)

℞. Herbae Marrubii partem unam.

Aquae communis . . . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor,
 tunc per horae quadrantem coque et
 cola fortiter exprimendo; residuo cum
 Aquae partibus quatuor cocto, liquores
 commixti, post horarum viginti qua-
 tuor sepositionem ad extracti consisten-
 tiam evaporent. (Li. Sax.)

℞. Herbae Marrubii . . . partem unam.

Aquae bullientis . . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem

et cola exprimendo, residuum cum quatuor partibus Aquae coctum itidem coletur; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni calore ad extracti consistentiam evaporent. (Bor. D. Han. O.)

A. et Pol. Herbam pluribus coctionibus sequentibus penitus extrahere et liquores commixtos et decanthatos in balneo aquae vaporazione inspissare.

HassP. ut extractum Cardui benedicti L. p. 418; — T. ut extractum Centaurii minoris I. p. 449.

℞. Herbae Marrubii albi libram unam. Aquae fontanae. libras decem.

Coque per horas duas, cola exprimendo et liquorem repositum atque per manicam trajectum ita consume, donec non ultra digitis adhaereat. (Ams.)

Hass. Lus. et Pid. coquere jubent Herbae partem unam in Aquae sex, colare exprimendo et liquorem decanthatum post horarum viginti quatuor sepositionem vaporare; — An. Coquere Herbae libras duas in Aquae decem per horae quadrantem et decoctum decanthatum vaporare; — Fer. Coquere Herbae partem unam in Aquae tribus, albumine clarificare et colaturam vaporazione inspissare.

Fi. ut extractum Absinthii.
Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Extractum Marrubii albi alcoholicum. (Bor4. Ful. Wür.)

℞. Herbae Marrubii albi, Alcoholis, singulorum libram unam Aquae communis libras octo.

Digere, blando calore, per tres dies, cola exprimendo, repone et decantha liquorem, alcoholalem distillatione elice et residuum ad aptam consistentiam consume.

Bor4. ut extractum Absinthii.
Mistura Marrubii, Pottiopectoralis. (Au.)

℞. Extracti Marrubii, Graminis, singulorum drachmas duas. Decocti Taraxaci uncias decem. Oxymell's scillitici, Syrupi Foeniculi, singulorum uncias duas.

Gabe, alle zwei Stunden ein halbes Glas.

Syrupus de Marrubio s. Marrubii s. Prassii albi. (Gal. His. T.)

℞. Foliorum Marrubii albi siccatorum uncias duas. Aquae libras duas. Infunde et adde colaturae

Sacchari libras quatuor. Syrupum cola. (His.)

T. Marrubii uncias sex, Aquae bullientis libras quatuor, infunde per horas duodecim et colaturae adde Sacchari pondus duplum.

℞. Foliorum siccatorum Marrubii albi unciam unam.

Aquae destillatae Marrubii albi libras duas.

Digere in balneo aquae, vase tecto, per horas duas, cola, filtra et liquori adde

Sacchari albi duplum. Solve in balneo aquae. (Gal.)

GalH. Infusionis partem unam cum tribus Syrupi communis, antea ad globulum cocti, miscendo syrupum parare jubei.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen. Aqua Marrubii. (Pal. Sar.)

℞. Herbae Marrubii recentis partem unam.

Aquae partes quatuor. Destillet dimidia pars.

M a s t i x.

Mastiche, Resina Mastichis s. Lentisci; Μαστίχη; Mastix; Mastice (Gal.); Mastice (Ang.); Arah, Auluk bagdadie (Ar.); Mastix (D. Suec.); Almacciga (His.); Ramie mustakie (Duk. Hin.); Kinneh (Pe.); Mastyx (Pol.); Almoçeda (Lus.); Rummie mastiki (Tam.); Sakas (Te.).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T. Z.

In Tropfen oder unregelmäßigen, trocknen, zerreiblichen, gelblichen, halburchsichtigen Massen, gerieden von angenehmem Geruch und getaut, sich erweichend, von scharfem, gewürzhaften Geschmack und einem glänzenden, glasigen Bruche.

Es ist ein Harz, welches aus Einschnitten in die Rinde von Pistacia Lentiscus, L., einem Strauche (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, J.) des südlichen Europa's ausfließt. (Blachw. Herb. t. 195. Pienck. t. 710. Düss. off. Pl. IX. 16. Bert. Bild. II. 94. f 2.)

Zonisch, reizend, magenstärkend. Pulvis ad fluorem album. (Pal.)

℞. Radicis Iridis Florentinae semunciam.

Cornu Cervi usti, Gummi Arabici, Ossi Sepiae, Corallii albi praeparati,

Crystalli mineralis (3),

Olibani,

Mastichis,

singulorum drachmam unam.

Fiat pulvis. — Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel und mehr, in einem passenden Vehikel.

Trochisci masticatorii. (Au.)

℞. Mastichis,
Cerae albae,
Zingiberis,

singulorum partes aequales.

Fiant trochisci ponderis drachmae dimidiae.

Massa odontalgica. (B*. Br*.)

℞. Mastichis,
Sandaracae,

singulorum drachmas duas.

Kino grana decem.

Opii grana duo.

Olei essentialis Rorismarini

guttas octo.

Spiritus Cochleariae

quantum sufficit.

Fiat massa mollis. (B*.)

Br* Mastichis, Sandaracae, singulorum drachmas duas, Sanguinis Draconis semidrachmam, Opii grana sex, Olei Rorismarini guttas octo et Spiritus Cochleariae sufficientem quantitatem.

Man füllt damit die angefressenen Zähne aus.

Decoctum mastichinum. (Br.)

℞. Mastichis electi . . . unciam unam.
Crustae Panis albi . . . semilibram.
Macidis drachmam unam.
Aquae purae libras quatuor.

Decoque ad librarum duarum remanentiam, cum Rasura Cornu Cervi clarifica et cola; colaturae adde

Conservae Rosarum uncias quatuor.

Aquae Cinnamomi simplicis uncias duas.

Aqua mastichina. (Br. Pal. Wir. Sp.)

℞. Mastichis uncias quatuor.

Nucis moschatae . . . unciam unam.

Alcoholis libram unam.

Post tres dies digestionis adde

Aquae purae libras quatuor.

Destillent librae tres. (Br. Wir. Sp.)

Pal. Mastichis uncias quatuor, Macidis duas, Caryophyllorum unam, Cinnamomi dimidiam et Vini generosi libras quatuor.

Magensärkenb. — Gabe, bis zu einer Unze.

Spiritus Mastiches compositus s. matricalis. (Ams, B*. Bor. Bor4. Br. Han. O. Pal. Sax. Wir.)

℞. Mastiches,

Myrrhae,

Olibani, singulorum partem unam.

Alcoholis . . . partes viginti quatuor. Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes duae. (B*. Bor. Bor4. Han. O. Sax.)

Br. Cujusque trium dictarum substantiarum sesquinciunciam et Alcoholis libras quatuor.

℞. Mastiches,

Myrrhae,

Olibani,

Succini, singulorum uncias duas.

Alcoholis (0,907) . . . libras tres.

Post quatuor dierum digestionem destillet sesquilibra. (Ams.)

Pal. et Wir. Quatuor substantiarum cujusque semunciunciam et Alcoholis nonaginta sex.

℞. Mastiches uncias quatuor.

Cinnamomi semunciunciam.

Caryophyllorum,

Nucis moschatae,

singulorum drachmas tres.

Zingiberis,

Galangae,

Cardamomi minoris,

Corticis Winterani,

singulorum drachmas duas.

Alcoholis libras decem.

Post aliquot dies digestionis adde

Aquae fontanae . . . libras duas.

Destillent librae novem. (Br. Wir.)

In Aufschwüngen bei Schwäche und Eßstörungen.

Elixir mastichinum s. Mastichis. (Br. Wir.)

℞. Spiritus Mastiches . . . libras duas.

Aquae fontanae . . . libram unam.

Sacchari albi . . . uncias decem.

Misce.

Syrupus mastichinus s. Mastichis.

(Br. Wir.)

℞. Mastichis electi parumper contusi uncias duas.

Aquae Mastiches uncias duodecim.

Infunde in vase bene clauso, per tres dies, cola deinde et colaturae adde

Sacchari albi . . . uncias sedecim.

Oleum Mastiches s. mastichinum. (Br. Sar. Wir. Fi. T. Vm.)

℞. Mastiches partem unam.

Olei Olivarum . . . partes quatuor.

Dissolve in balneo aquae. (Sar. Vm.)

Br. et Wir. vel cujusque partes aequales vel Mastiches partem unam et quatuor Olei Rosarum praescribunt.

T. Mastiches uncias sex, Olei Rosarum libras duas; — Fi. Olei Rosarum libram unam, Mastiches uncias tres, Vini albi generosi uncias qua-

Die enthält kein Harz, aber einen ihm ähnlichen öligen Stoff und viel Saamehl. Ein wenig angewendetes Purgirmittel. — Gabe, von vier Scrupel bis zu zwei Drachmen.

Melilotus.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung kommen in den Pharmacopöden in Erwähnung:

Melilotus coeruleus, Lamk.; blauer Steinklee, Siebengezelt; Mélilot bleu, Faux baume du Pérou, Lotier odorant, Trèfle musqué (Gal.); Blue melilot trifoil (Ang.); Bleauwe melilot (Bel.). Gal. Wir. Sp.

⊙ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in Europa wachsende Pflanze. (Blackw. Herb. t. 284.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Aegyptiaca s. Meliloti coerulei s. Loti odoratae s. urbanae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit aus drei eirunden, fein sägezahnigen Blättchen bestehenden, an der Basis großen gegähnten Nebenblättern begleiteten Blättern; die bläulichen Blüten stehen in den Blattwinkeln auf langen Stielen und bilden Trauben, welche eirunde, gedrängte Köhren zusammensetzen. Es hat einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch und einen etwas scharfen Geschmack.

2) *Melilotus officinalis*, Lamk.; Steinklee, Melilotenklee; Mélilot officinal (Gal.); Melilot trifoil (Ang.); Komonice (B.); Amur, Steenklover, Meloton (D.); Meliloto (His. Lus.); Meliloto, Ghirlandetta, Erba solfanina o vetturina (I.); Meloton (Bel. Suec.); Komonika swojska (Pol.); Meliloto (Lus.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Ber. Fr. D. DD. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WV, Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Hayne II. 31. Bull. t. 255. Blackw. t. 80. Plenck t. 557. Diss. off. Pl. VII. 13. Herr. Bild. VII. 27. f. 1. Zorn Ic. pl. t. 204.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Meliloti citrinae) an; es besteht aus einem glatten, ästigen Stängel mit eirunden, sägezahnigen Blättern und langen Trauben gelber Blüten in den Achseln der oberen Blätter. Der Geruch ist stark und angenehm, der Geschmack bitter und etwas scharf.

Beide Pflanzen sind erweichend.

Sacculus resolvens. (Bo.)

R. Florum Meliloti pulveratorum
unciam unam.
Camphorae . . . drachmam unam,
Misco.

Oleum volatile Florum Meliloti, (T.)
Ut oleum florum aurantii L. 524.

Oleum Meliloti, (Gal. Sar. Sw*.)

R. Florum Meliloti . . . partem unam.
Olei Olivarum . . . partes sex.
Infunde leni calore per dies tres,
cola et filtra. (Sw*)

Sar. Digerere jubet Florum partem unam in Olei duabus in balneo aquae per tres dies, post refrigerationem exprimers et macerationem repetere; — Gal. Macerare soli exposita per tres dies Florum partem unam in Olei quatuor, operationem ternis sequentibus vicibus repetere et tertia vice per menses tres productam; — T. Florum partem unam, Olei duodecim, Flores siccatos tamen in aqua tepida antea mollefactos.

Kuhsüßlich gegen Scropheln und essentstandene Großbeulen.

Emplastrum Meliloti s. Trifolii Meliloti officinalis. (An. B. Bel. Bor. Bor. D. DD. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Fi. Pid. Sp. Sw. Vm.)

R. Ceræ flavæ,
Colophonii pulverati,
Olei Olivarum,
singulorum partem unam.
Liqua et mixturae semirefrigeratae adde

Pulveris Herbae Meliloti

partes duas.

Misce bene. (Sax. Sw.)

Bor. Fenn. Han. Pol. et Suec. Ceræ partes duas, Colophonii unam, Olei unam et duas Meliloti pulverati; — Bor. HassP. Ceræ flavæ libram unam, Colophonii, Olei, singulorum libram dimidiam, Meliloti libram unam; — O. Ceræ uncias quatuordecim, Colophonii, Olei, singulorum uncias sex, Pulveris Meliloti libram unam et Extracti Meliloti unciam unam; — R. Ceræ partes tres, Resinae sex, Sevi vervecini quatuor, Olei unam et duodecim pulveris Meliloti; — An. Ceræ partes octo, Resinae pini quatuor, Terebinthinae duas cum dimidia et Pulveris Meliloti quatuor.

R. Summitatum florescentium Meliloti partes tres,
Sevi hircini . . . partes quatuor.
Coque ad humidam consumptionem,
cola et adde

Colophonii . . . partes sex,
Ceræ . . . partes tres.
Liqua simul.

D. Summitatum florescentium partes quatuor, Sevi hircini quinque, Co-

lophonii octo et Cerae quatuor; —
Ful. Summitatum florescentium tres,
Sevi duas, Resinae Pini tres et Cerae
unam cum dimidia; — *Vm.* Cerae
flavae octo, Resinae Pini quatuor, Te-
rebinthinae unam, quatuor Summita-
tum florescentium, duodecim horas di-
gestionis et additionem Styracis liqui-
dae part's dimidia.

R. Emplastri Plumbi,

Cerae flavae,
singulorum libram unam.

Olei Olivarum . . . uncias sex.

Mixturae fusae ac semirefrigeratae
adde

Pulveris Meliloti . . . uncias octo.

Misce bene. (Bel.)

B. eandem ipsam formulam sed Pul-
veris Meliloti libram unam.

R. Emplastri citrini . . . sesquilibram.

Olei Olivarum . . . libram unam.

Resinae Pini . . . libras sex.

Cerae flavae . . . libras tres.

Gummi Ammoniaci uncias quatuor.

Liquatis post semirefrigerationem sen-
sim adde

Pulveris Herbae floescentis Meliloti
libras duas.

— Absinthii
libram unam.

Misce. (D.)

DD. Sevi vervecini uncias viginti sex,
Resinae Pini triginta sex, Cerae flavae
octodecim, Olei Napi sex, Gummi
Ammoniaci duas, Pulveris Meliloti duo-
decim et Pulveris Absinthii sex; —
Hass. et *Pid.* Emplastri citrini sesqui-
libram, Pulveris Meliloti uncias quin-
que, Pulveris Radicis Althaeae duas,
Gummi Ammoniaci unam et Terebin-
thinae Venetae duas; — *Fi.* Olei Oli-
varum, Florum Meliloti recentium, sin-
gulorum libras duas, Florum Meliloti
sicc. pulv., Terebinthinae, singulorum
uncias sex, Sevi vervecini libram unam,
Cerae flavae uncias octo, Gummi Am-
moniaci, Sagapeni, singulorum sesqui-
unciam; flores recentes cum oleo in-
fundantur et post repetitam digestio-
nem lege artis reliqua addantur.

R. Olei Meliloti . . . libras duas.

Sevi hircini . . . libram unam.

Cerae flavae . . . uncias octo.

Terebinthinae . . . uncias sex.

Liquatis adde

Gummi Ammoniaci,

Sagapeni,

singulorum sesquiunciam.

Pulveris Meliloti . . . uncias sex.

Misce bene. (Sar.)

Li. Emplastri citrini sesquilibram,

Pulveris Meliloti uncias sex et unam

Gummi Ammoniaci.

R. Herbae florentis Meliloti

uncias quatuor.

Florum Absinthii,

— Chamomillae,

Baccarum Lauri,

Seminum Apii,

singulorum drachmas sex.

Styracis semunciam.

Gummi Ammoniaci unciam unam.

Commisce cum mixtura fusa e

Cerae flavae uncias octo.

Sevi hircini uncias quatuor.

Terebinthinae,

Resinae Pini,

singulorum sesquiunciam.

Olei Chamomillae uncias duabus.

Misce bene. (Br. Pal. Wir.)

R. Emplastri Meliloti simplicis

libras tres.

Terebinthinae uncias sex.

Liquatis blando igne adde

Pulveris Florum Chamomillae

— Meliloti,

singulorum uncias tres.

— Radicis Iridis,

— Althaeae,

singulorum unciam unam.

— Croci semunciam,

— Gummi Ammoniaci,

— Bdelli,

singulorum uncias duas.

— Foenu graeci unciam unam.

Misce. (His.)

Ceratum Meliloti simplex s. Baumli,

Unguentum emplasticum. (Fi. T.)

R. Florum Meliloti,

Cerae flavae,

singulorum libras tres.

Sevi bubuli libras quatuor.

Resinae Pini libras sex.

Flores contusi et cum sevo commixti
coquantur ad humidam consumptionem,
colatis adde resinam et iterum cola,
refrigeratis faeces separa, tum liquefac
dentio et oeram adde.

T. Florum libras tres, Sevi bubuli
libras quatuor, Resinae tres, Cerae sex.

Emplastrum Meliloti camphoratum.

(Dl.)

R. Emplastri Meliloti uncias duas.

Camphorae pulveratae

drachmam unam.

Misce sedulb.

M e l i s s a .

Unter diesem Namen finden sich in den
Pharmacopden folgende Pflanzen:

1) *Melissa Calaminta, L.*; Bergmünze;
Calament de montagne (Gal.); Mon-
tain balm (Ang.); Flana mata, Poleg,

Natkowe korenj, Marulka hornj (B.); Berg calaminth (Bel.).

Br. Fer. Gal. Gen. His. Wir. Wür. Br. G. M. Sp. Z.

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (Blackw. t. 166. Bull. t. 201. Plenck t. 501. Zorn Ic. pl. t. 111.)

Man wendet das Kraut (herba Calaminthae s. Calaminthae montanae s. Calmontanae) an; es besteht aus einem behaarten Stängel mit eirunden, ebenfalls behaarten, am Grunde fast herzförmigen, gleichgezähnten, fast stumpfen Blättern. Es hat einen starken gewürzhaften Geruch, welcher sich durch Trocknen sehr vermindert und einen scharfen, gewürzhaften Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

2) *Melissa Nepeta*, L.; poleyartige Kalamint; Calament des champs, petit Calament (Gal.); Field balm (Ang.); Veldkalamint (Bel.).

Gal. Wür.

4 Eine in ganz Europa verbreitete Pflanze. (Blackw. Herb. t. 167.)

Man wendet das Kraut (herba Nepetae s. Calaminthae pulegii odore s. Calaminthae agrestis) an; es besteht aus einem etwas behaarten Stängel mit fast runden und glatten, an jedem Ranke mit zwei oder drei ungleichen Zähnen versehenen Blättern. Es hat einen gewürzhaften Geruch und Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

3) *Melissa officinalis*, L.; Melisse, Melissenkraut, Citronmelisse, Citronenkraut; Mélisse officinale (Gal.); Common balm (Ang.); Buckliulfaristum (Ar.); Melissa, Medunka (B.); Hiertenyd (D.); Mekka subza (Duk.); Torongil (His.); Melissa officinale, Erba Cedronella (I.); Citronenkruid (Bel.); Badrunjbuyeh (P.); Melisse cytrynowa (Pol.); Herva cidreira (Lus.); Citron meliss (Succ.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass. Has. P. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. G. M. Pid. Sp. Z.

4 Eine im mittägigen Europa wachsende Pflanze. (Hayne VI. 32. Blackw. t. 27. Plenck t. 500. Zorn Ic. pl. t. 134.)

Man wendet das Kraut (herba Melissa citrinae s. citratae s. hortensis s. Cedronellae) an; es besteht aus einem vierseitigen, ästigen, fast glatten Stängel mit gestielten, eirunden, am Grunde schwach ausgezähnten, am Ranke geferbten Blättern. Es hat einen angenehmen citronenartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

4) *Dracocephalum Moldavicum*, L.; Türkische Melisse; Melisse de Moldavie, Moldavique (Gal.); Moldavian mint (Ang.).

Br. Gal. Li. Wir. Be. M. Sp.

© (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in der Moldau und in Sibirien wachsende Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 294.)

Man wendet das Kraut (herba Melissa turcicae s. Cedronellae) an; es besteht aus einem vierkantigen, glatten, ästigen Stängel mit eirundlanzettigen, fast glatten, geferbten Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchbringenden, sehr angenehmen Geruch.

Beide letztere Pflanzen sind reizend und werden zu den trampfstillenden Mitteln gezählt.

Species pro thea. (HassP. Huf.)

R. Herbae Melissaec unciam unam.
Foeniculi . . . drachmas tres.
Liquiritiae . . . drachmas duas.
Concisa misce.

Conserva Melissaec. (R. Fi.)

R. Foliorum Melissaec recentium contusorum . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Misce exacte et in loco frigido serva.
Fi. ut Conservam Cochleariae L. p. 545; — T. Foliorum et Sacchari, singulorum pondus aequale, contunde et pulpam per crinium trajice, quae cum libris duabus Sacchari in Aquae dimidio pondere soluti et coquendo vaporati commisceatur.

Cataplasma aromaticum. (Galm. Br.)

R. Herbae Melissaec . . . uncias sex.
Florum Chamomillae uncias tres.
Baccarum Juniperi uncias quatuor.
Coque in

Aquae Vitae sufficiente quantitate ad pastae mollis consistentiam. (Br.)

Galm. coquere jubet Farinae Hordei et Cerealis, singularum partes centum in Vini rubri centum, sub finem addendo Pulveris aromatici partem tertiam.

Extractum Melissaec. (Fer. Sar.)

R. Herbae Melissaec partem unam.
Aquae . . . partes tres.
Coque, cola exprimendo, colaturam albumine clarifica et probe inspissa. (Fer.)

R. Herbae Melissaec recentis et contusae libras octo.

Digere in alembico per tres dies, destillatione in balneo aquae deinde uncias duas circiter extrahe, residuo Aquae tripulum iufunde, coctione trientes duos consume et liquorem clarificatum et

colatum vaporando ad electuarii consistentiam redige eique tepido aquam destillatam adde. (Sar.)

Infusum Melissaë. (GalM. Ra)

℞. Foliorum Melissaë semunciam.
Aque bullientis . . . libras duas.

Infunde et cola. (Ra.)

℞. Herbae siccae Melissaë,
Liquiritiæ rasæ, singularum drachmas duas cum dimidia.

Aque bullientis
sufficientem quantitatem

ut colaturæ libras duas obtineas. (GalM.)

Gewürzhaft, schwach reizend, bei nicht entzündlichen Koliken und Verdauungsbeschwerden von Magenschwäche empfohlen.

Tisana carminativa. (Ca.)

℞. Foliorum Melissaë drachmas duas.

Anisi,
Foeniculi,
Coriandri,

singularum semidrachmam.

Aque bullientis . . . libras duas.

Infunde per horæ quadrantem, cola et adde

Sacchari albi
sufficientem quantitatem.

Syrupus Melissaë. (Wir.)

℞. Foliorum siccatorum Melissaë
uncias quatuor.

Aque destillatæ Melissaë
libram unam.

Digere in vase tecto per dies duos, exprime et adde

Sacchari albi . . . uncias sedecim.
Ebulliant semel.

Essentia Melissaë composita. (Vm.)

℞. Foliorum Melissaë partes duas.

— Rutaë,
— Pulegii,

Corticis Citri recentis, singularum partem unam cum dimidia.

Cinnamomi . . . partem unam.

Spiritus Melissaë
partes viginti quatuor.

Infunde, frigidè per plures dies, cola exprimendo et filtra.

Tinctura Melissaë. (An. Vm.)

℞. Herbae Melissaë partem unam.

Alcoholis (20°) . . . partes octo.
Post tres dies infusionis filtra. —

Reizend.

Oleum Melissaë aethereum, Aethereolum Melissaë. (Br. Fer. Han. Pal. R. Wir. Wür. Pid. Sw.)

℞. Herbae Melissaë recentis
quantum vis.

Aque . . . quantum sufficit.

Destillent et oleum servetur. (Fer. R.)

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — Han. Herbae unam et octo Aquae.

℞. Herbae Melissaë recentis
partes viginti quinque.

Aque partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.

Destillent. (Br. Pal. Wir. Pid.)

℞. Herbae Melissaë recentis
quantum vis.

Aque destillatæ Melissaë
quantum sufficit.

Destillent. (Wür.)

Aqua Melissaë. (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. WW.

Br. Fi. Pid. T. Vm.)

℞. Herbae Melissaë recentis
partem unam.

Aque . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor infusionis destillent partes decem. (Ams. Bor. O. Pal.)

Bor4. Herbae libras duas, Aquae quantum sufficit; destillando libras viginti elice; — HassP. Melissaë libras tres, Aquae sufficientem quantitatem; destillent i brae viginti quatuor; — D. et GalF. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes viginti; — Han. Herbae partem unam et Aquae quantum sufficit; destillent partes tres; — Gen. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes sex; — Gal. Pal. Fi. T. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — An. Herbae partem unam et quinque Aquae; destillent partes quatuor; — Wür. et Br. Herbae partem unam et sex Aquae; destillent trientes duo; — Hass. et Pid. Herbae partem unam et octo Aquae; destillet dimidia pars; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quindecim; destillent trientes duo; — Ba. Herbae partem unam et sedecim Aquae; destillet quarta pars.

℞. Herbae Melissaë recentis
partem unam.

Aque . . . partes quatuor.

Destillet dimidia pars atque destillatio repetatur supra novam herbam. (Sar.)

℞. Herbae Melissaë recentis
partes tres.

Sacculo e tela confecto inclusam medio cucurbitae suspende continentis

Aque . . . partes duodecim
ita ut liquidum attingere non possit; destillent partes sex. (Ful. Li.)

℞. Herbae Melissae florescentis
partem unam.
Vini albi . . . partes quatuor.
Destillet pars dimidia. (Br. Wir.)
Vm. Herbae florescentis partes decem, Aquae Vitae partem dimidiam et Aquae partes centum; destillent partes quadraginta.

Aqua Melissae spirituosa. (Li.)

℞. Aquae destillatae Melissae
partes duas.
Essentiae Melissae partem unam.
Misc.

Aqua Melissae antihysterica. (Wir.)

℞. Foliorum Melissae recentium
libram unam.

• Batcarum Lauri,
Seminum Cumini,
singulorum unciam unam.
Myrrhae semunciam.
Castorei drachmas duas.
Vini albi generosi libras duodecim.
Post sufficientem digestionem destillet dimidia pars.

Spiritus Melissae. (An. Br. Ful. Gal. Li. Lus. Pal. R. Sar. Sax. Wir. Wür. Pid. T. Vm.)

℞. Herbae Melissae partem unam.
Alcoholis (20°) partes duas.
Aquae quantum sufficit.
Destillet spiritus (28°) indicans. (An.)
Vm. Herbae partem unam, Alcoholis tres et sex Aquae; destillent partes duae cum dimidia.

℞. Herbae Melissae partem unam.
Aquae Melissae . . partes duas.
Alcoholis . . . partes octo.
Post horarum viginti quatuor macerationem destillent partes sex. (R.)

Gal. Herbae partes duodecim, Aquae Melissae destillatae tantidem et Alcoholis (22°) triginta sex; destillent partes triginta.

℞. Herbae Melissae partem unam cum dimidia.
Aquae Vitae . . partes decem.
Post horas duodecim destillet dimidia pars. (Lus.)

Br. Pal. Sax. Wir. et Pid. Herbae partem unam et quatuor Aquae Vitae; — Ful. et Li. Herbae. unam et sex Aquae Vitae; — T. Melissae libras duas, Spiritus Vini 32° B. libras octo; destillando libras quinque circiter elice.

℞. Herbae Melissae recentis partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post viginti quatuor horarum digestionem destillent in balneo aquae ferre ad siccum; productum cum nova

herba digere et destillationi subjice. (Sar.)

Wir. Herbae sesquilibrium et sex Alcoholis; destillent iterum supra Herbae uncias tres.

Aqua aromatica, Spiritus aromaticus s. Melissae magistralis officinalis, Alcohol Melissae compositus, Aqua Melissae composita s. Carmelitana s. Carmelitarum s. Melissae spirituosae composita, Spiritus s. Alcohol Melissae compositus. (A. Ams. B. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. HussP. His. Lus. Pal. Sax. Wir. Br. Ca. Fi. Huf. Sp. Sw. Vm.)

℞. Herbae Melissae recentis sesquilibrium.

Corticis Citri recentis uncias quatuor.

Nucis moschatae,
Coriandri, singulorum uncias duas.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
singulorum unciam unam.

Alcoholis libras sex.
Aquae Melissae . . . libras tres.
Post dierum trium digestionem destillent librae sex. (Br. D. Sar. Wir.)

℞. Herbae Melissae uncias duodecim.
Corticis Citri . . . uncias duas.
Nucis moschatae unciam unam.
Coriandri uncias quatuor.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,

singulorum unciam unam.
Rad. Angelicae . . . semunciam.
Alcoholis uncias sexaginta quatuor.

Infunde per aliquot dies et destillando uncias octoginta octo elice. (Fer. Sp.)

Han. Melissae uncias octodecim, Corticis Citri quatuor, Nucis moschatae, Rad. Angelicae, singularum uncias tres, Caryophyllorum, Cinnamomi, singulorum unciam unam, Alcoholis libras sex, Aquae Melissae libras tres et tres dies digestionis; destillent librae septem; — Br. Melissae libras duas, Corticis Citri uncias quatuor, Nucis moschatae uncias duas, Coriandri uncias octo, Cinnamomi, Caryophyllorum, singulorum semunciam, Alcoholis uncias centum viginti et tres digestionis dies; destillent in balneo aquae unciae centum viginti; — Fr. Melissae, Corticum Limonium, Nucis moschatae, Coriandri, eisdem quantitates ut Br. sed Alcoholis libras duodecim, Cinnamomi, Caryophyllorum, Rad. Angelicae, singulorum unciam unam, Aquae libras tres et post trium dierum digestionem, destillationem librarum decem; — Ful. Melissae uncias sedecim,

Corticis Citri quatuor, Cinnamomi duas, Nucis moschatae unam, Caryophyllorum drachmas duas, Vini albi libras octo et viginti quatuor horas digestionis; destillent librae quatuor; — Lus. Melissae libras duas, Corticis Citri uncias quatuor, Cinnamomi uncias duas, Nucis moschatae unam, Caryophyllorum drachmas duas, Aquae Vitae libras decem et tres dies macerationis; destillent librae quinque; — HassP. Melissae recentis libras duas, Corticum Citri recentium uncias quatuor, Nucum moschatarum, Radicis Angelicae, singulorum uncias tres, Caryophyllorum, Cassiae cinnamomeae, singulorum unciam unam, Spiritus Vini rectificati libras sex, Aquae Melissae libras tres; post trium dierum macerationem destillent librae septem; — Ams. B. et Bel. Melissae uncias quatuor, Corticis Citri, Nucis moschatae, Coriandri, singulorum unciam unam, Caryophyllorum, Cinnamomi, singulorum semunciam, Aquae Vitae libras quinque et tres dies digestionis; destillent librae tres; — His. Melissae uncias octo, Corticis Citri, Corticis Aurantii, singulorum uncias duas, Nucis moschatae, Coriandri, singulorum unciam unam, Cinnamomi semunciam, Aquae Vitae libras quatuor et macerationis horas viginti quatuor; destillet dimidia pars; — Sw. Nucis moschatae unciam unam, Coriandri uncias quatuor, Cinnamomi, Radicis Angelicae, singulorum sesquiunciam, Caryophyllorum unciam unam, Corticis Citri uncias duas, Aquae Melissae libras duas, Alcoholis libras quatuor et octo dies digestionis; destillent; — A. Melissae libras duas, Corticum fructuum Citri decem, Radicis Angelicae, Cinnamomi, singulorum uncias tres, Coriandri uncias sex, Alcoholis (0,910) libras undecim et Aquae fontanae libras sex; destillent librae decem.

R. Herbae Melissae,

— Menthae piperitae,

— Salviae,

— Rorismarini,

Florum Lavandulae,

Foeniculi, singulorum uncias tres.

Radicis Angelicae . . . uncias duas.

— Calami . . . uncias quatuor.

Alcoholis . . . libras quatuor.

Aquae sufficientem quantitatem.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent librae duodecim. (B^o.

Huf.)

R. Florum Rosarum rubrarum,

— Rorismarini,

singulorum uncias quatuor.

Florum Lavandulae,

— Liliorum Convallium,
singulorum manipulos tres.

Herbae Majoranae,

— Melissae,
singularum manipulum unum.

Cardamomi minoris,

Caryophyllorum,

Macidis,

Cubebaurum,

singulorum unciam unam.

Cinnamomi . . . uncias duas.

Spiritus Cerasorum nigrorum

octarios sex.

Post decem dies digestionis destillent. (Pal.)

R. Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Nucis moschatae,

Anisi,

Coriandri,

singulorum partem unam.

Hyssopi,

Majoranae,

Rorismarini,

Salviae,

Thymi, singulorum partes duas.

Corticis Citri recentis,

Radicis Angelicae,

singulorum partes quatuor.

Melissae recentis partes duodecim.

Aquae Vitae partes centum nona-

ginta duas,

— purae partes quingentas

septuaginta sex.

Destillent partes centum viginti octo. (Vm.)

R. 1) Melissae . . . partes viginti.

Angelicae . . . partes quinque.

Alcoholis (22°)

partes ducentas quinquaginta.

2) Cinnamomi . . . partes quinque.

Caryophyllorum,

Nucis moschatae,

singulorum partes tres.

Alcoholis (22°)

partes centum et decem.

3) Anisi . . . partes duas.

Coriandri . . . partes quinque.

Corticis Citri siccati

partem unam,

Alcoholis (22°) partes octoginta.

4) Rorismarini,

Majoranae,

Hyssopi,

Thymi,

singulorum partes duas.

Salviae . . . partes quatuor.

Alcoholis (22°)

partes centum viginti.

Destillent seorsim in aquae balneo, tunc productis quatuor commixtis adde

Aquae ponderis totius mixturae partem

decimam et in balneo aquae destillatione quatuor partes quintas elice. (GalM.)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum integrorum,
Nucis moschatae,
Anisi,
Coriandri,
Corticis siccati Citri,
singulorum partem unam.
Alcoholis (22^o) . . partes mille.

Macera harum substantiarum quaque seorsim per dies duos vel tres in Alcoholis partibus nonaginta sex; destillent deinde in balneo aquae et quodque productum seorsim excipe. Praeterea per duos dies in Alcoholis eadem ipsa quantitate infunde et quaque seorsim destillationi subjice

Herbae Angelicae integrae,
— florentis Rorismarini,
— — Majoranae,
— — Hyssopi,
— — Thymi,
— — Salviae,
singularum partem unam.

Macera praeterea et destillationi subjice

Foliorum Melissaec recentium
partem unam.

Recipe deinde urceolos tres, quorum primo infundas .

Spiritus Cinnamomi,
— Coriandri, singulorum partes tres cum dimidia.
— Caryophyllorum,
— Nucis moschatae,
singulorum partes tres.
— Anisi . . . partes duas.
— Corticis Citri
partem quartam

secundo

— Angelicae partes decem.
— Rorismarini . partes sex.
— Majoranae,
— Thymi,
singulorum partes septem.
— Hyssopi . . partes octo.
— Salviae partes quindecim cum dimidia.

Spiritu Melissaec solo tertio urceolo intromisso, commisce contenti urceoli primi partes quinque, quinque secundi et quinque cum dimidia tertii, omnia retortae infunde, adde totius partem decimam Aquae fontanae et Sacchari pulverati partem octogesimam, et destillationem ad quintae partis remanen-

tiam continua, quod in excipulum transit excipiendo. (Gal. Ca.)

T. Aquarum spirituosarum Cinnamomi, Caryophyllorum, Nucum Moschatarum, Coriandri, Anisi, Citri, singularum uncias quatuor, lagenae immixtas Aquae spirituosae Angelicae, Rorismarini, Majoranae, Hyssopi, Thymi, Salviae alii lagenae ingestas; in retortam vitream amplam tubulatam intromissis (singulis 30° B. indicantibus) infunde Aquae spirituosae simplicis Melissaec libras duas, addendo Aquae pluvialis vel destillatae uncias duodecim et Sacchari albi raffinati uncias duas; destillent librae quinque cum dimidia; in lagenis smiri obturatis per tempus aliquot in mixtura e glacie contusa et sale communi immersa tene *).

Aqua dentifricia (Pic.)

℞. Alcoholis . . . uncias viginti.
Spiritus Cinnamomi,
— Lavandulae,
— Citri,
Aquaec Melissaec compositae,
singulorum drachmas quinque.
Misce.

Acetum odoratum s. bezoardicum s. odoriferum s. aromaticum. (B*. Br. Ful.)

℞. Herbae Levistici . uncias duas.
Foliorum Melissaec,
— Rutae,
singulorum uncias quatuor.
Juglandium viridum concisorum
libras duas.
Fructuum Citri recentium contusorum . . . libram unam.
Aceti libras decem.
Post horas duodecim digestionis destillent ferè ad siccum. (Br.)

℞. Aceti uncias duas.
Spiritus Melissaec semunciam.
Olei essentialis Citri,
— Lavandulae,
— singulorum guttas decem.
— — Caryophyllorum
guttas quatuor.
Misce. (B*. Ful.)

Melittis.

Melittis Melissophyllum, L.; Banzenmelisse; Melitte à feuilles de mélisse (Gal.); Bastard balm (Ang.); Vild hier-teus fryd (D); Melissebladig kruisbloem (Bel.).

*) Das Eintauchen in eine kältende Mischung ist nämlich das wirksamste Mittel, den brehlichen Geruch schnell zu beseitigen. (T.)

Gal. Wir. Wüir. M. Sp.

(Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (Jacq. Fl. Aust. t. 26.)

Man wendet das Kraut (herba Melis-sophylli s. Lamii montani s. Melissae humilis) an; es besteht aus einem vierseitigen, behaarten Stängel mit gestielten, eirundlänglichen, spitzigen, getriebten Blättern. Es hat einen unangenehmen, beim Trocknen angenehm gewürzhaft werdenden Geruch und einen etwas bitteren Geschmack.

Reizend, ehemals als ein Mittel, Gries abzuführen und die Regeln zu befördern, betrachtet.

Meloë.

In der Medicin benutzt man zwei Käfer dieser Gattung:

1) *Meloë majalis*, Oliv.; Maikäfer, Maimurm; Meloë de mai (Gal.); Oil beetle (Ang.); Oliebille (D.); Caralejas, Aradejos (His.); Meyworm (Bel.); Majbagge (Succ.).

Fer. Ful. Han. Sax. Wir. Br. G.

Ein zu der Abtheilung der Heteromeren (Trachelides Cantharidae, Lat.) gehöriger, in Europa gemeiner Käfer. (Leach Trans. Soc. Linn. XI. VI. 1. 2. Panz. X. 13.) Der Körper ist bronzirt und kupferroth.

2) *Meloë Proscarabaeus*, L.; Meloë proscarabée (Gal.)

Br. D. Fer. Ful. Han. His. R. Sax. Wir. G. Sp.

Ein Insect (Vermis majalis s. Scarabaeus mutuarius), (Leach. l. c. VII. 6. 7. Panz. X. 12) von violett-schwarzer Farbe, hägrinartig und glänzend.

Electuarium antilyssicum s. ad rabiem. (B*. Ful. Wir.)

R. Meloum absque capitibus no. 24.

Theriaceae uncias duas.

Ligni Taxi drachmas duas.

Radices Serpentariae Virginicae

drachmam unam.

Fungi querni (bédéguar de frêne)

grana viginti.

Mellis in qua insecta sunt suffocata quantum sufficit.

Fiat electuarium. (Wir.)

R. Meloës no. 1

Mellis in cuius libra una insecta

octoginta sunt suffocata

quantum sufficit

ut fiat pulpa.

Theriaceae grana quadraginta.

Olei Meloum infusi guttas sex

Lign: Ebeni parvam quantitatem

Roob Sambuci quantum sufficit.

Misce. (R*.)

Dieses Mittel genöß nur bis zum Jahr 1782 einigen Ruhm als gegen die Wuth

Pharmacopoea universalis. II.

wirkfam. Friedrich II. kaufte das Geheimniß und seit der Zeit ist nicht mehr davon die Rede. Auch würden die Maikäfer nichts gegen diese Krankheit ausrichten, wohl aber könnten sie, wegen ihrer fast blasenziehenden Schärfe, äußerlich in Einreibungen nützlich seyn; auch wendet man sie in Schweden mit Erfolg gegen Rheumatismen an.

Sp's. *Oleum Scarabaeorum.* Scarabaeorum stercorarium uncias octo, Olei Lauri sedecim, coque ad humidum usque consumptionem — wird für nervenstärkend und auflösend gehalten.

Poio antilyssica s. ad rabiem. (B*. Au.)

R. Meloum no. 8.

Theriaceae Andromachae

semunciam.

Salis Cornu Cervi drachmas duas.

Camphorae drachmam unam.

Spiritus Mindereri uncias octo.

Auch Selles Ansehen konnte dieser Position keinen bleibenden Credit erhalten.

Mentha.

Unter den Arten dieser Gattung findet man besonders folgende neun in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Mentha gentilis*, L.; Gartenmünze, Gartenbalfam; Menthe apparente, Baume des Jardins (Gal.)

Gal. Be. G. Sp.

2) (Didynamia Gymnospermia, L.;

Labiatae, J.) Eine Europäische Pflanze.

(Oed. Fl. Dan. t. 736 Schk. t. 158.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae balsaminae) an; es besteht aus einem etwas behaarten, sehr ästigen Stängel mit eirunden, gestielten und gezähnten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen etwas scharfen und bitteren Geschmack.

2) *Mentha aquatica*, L.; Wassermünze, Bachmünze; Menthe aquatique (Gal.); Watermint (Ang.); Czerwena mata (R.); Hesternynie (D.); Yerba buena dos rios (His.); Watermint (Bel.); Mentha aquatica (I.)

A. Fer. Gal. GalM. WW. G. Sp. Z.

2) Eine Pflanze Europa's. (Blackw.

Herba t. 32.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae aquaticae s. rubrae s. Balsami palustri-) an; es besteht aus glatten Stängeln mit ebenfalls glatten, gestielten, eirundherzförmigen, gezähnten Blättern. Der Geruch ist nicht sehr angenehm, aber stark, der Geschmack bitter und etwas scharf.

3) *Mentha arvensis*, L.; Ackerminze; Menthe des champs, Pouliot thyma (Gal.); Corn mint (Ang.)

Gal.

2) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze.

(Oed. Fl. Dan. t. 512.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae equinae s. sylvestris) an; es besteht aus einem vieredigen, schwachen, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden, eirunden, spitzigen, gestielten, stumpfzahnigen, graulichen Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen bitteren, etwas scharfen Geschmack.

4) *Mentha crispata*, L.; Krausemünze, Blumenkopfkrausemünze; Menthe crépue (Gal.); Carted mint (Ang.); Kaderawamata, Bolssam zahrady (h.); Krusemynte (D.); Menta rizada (His.); Kruizenmunt (Bel.); Menta crispa (I.); Fakka (Jan.); Fodor mentha (M); Mienta kedzierzawa (Pol.); Hortel vulgar (Lus.); Miata (R.); Krusemynta (Succ.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WÜR. *Ke. Br. G. M. Pid. Sp. Z.*

4 Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 290. Plenck. t. 467. Fl. méd. t. 232)

Man wendet das Kraut (herba Menthae crispae) an; es besteht aus filzigen Stängeln, mit eirunden oder rundlichen, oben runzligen, unten weißfilzigen, ungleich großgezähnten Blättern. Der Geruch ist stark, balsamisch, eigenthümlich und nicht angenehm; der Geschmack brennend, gewürzhaft und etwas bitter.

5) *Mentha sativa*, L.; zahme Münze, Frauenmünze; Menthe cultivée (Gal.); Nana, Hibbuk (Ar.); Pudina (Duk. Pc.); Menta romana (I.); Widdatilam (Tam.).

Du. His. A. Par.

4 Eine Europäische Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 794.)

Man gebraucht das Kraut (herba Menthae verticillatae s. crispae verticillatae); es besteht aus einem einfachen oder nur wenig ästigen, glatten Stängel mit eirunden, spitzigen, gezähnten, gestielten Blättern. Geruch und Geschmack ähneln dem der Krausemünze.

6) *Mentha rotundifolia*, L.; rundblättrige Münze; Menthe à feuilles rondes, Baume sauvage (Gal.); Mastranzo (His.). Gal. His.

4 Eine Europäische Pflanze.

Man benützt das Kraut (herba Menthae sylvestris folio rotundiore); es besteht aus einem filzigen Stängel mit sitzenden, eirunden oder rundlichen, oben runzligen, unten weißfilzigen, gezähnten Blättern. Es hat einen starken und angenehmen Geruch.

7) *Mentha piperita*, L.; Pfeffermünze; Menthe poivrée (Gal.); Peppermint (Ang.); Pepprowa mata (h.); Pebermynte (D.); Verhubuena de sapor de pi-

menta (His.); Pepermint (Bel.); Mienta pęprzna (Pol.); Hortela apimentada (Lus.); Pepparmynta (Succ.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WÜR. WW. *Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.*

4 Eine in ganz Europa verbreitete, wahrscheinlich aber ursprünglich in England einheimische Pflanze. (Blackw. t. 291. Plenck. t. 463. bert. Bild. IV. 42. f. 2. Fl. méd. t. 233.)

Das Kraut (herba Menthae piperitae s. piperitidis) besteht aus einem ästigen, etwas behaarten Stängel mit gestielten, eirunden, spitzigen oder lanzettigen, gezähnten, glatten, oben dunkelgrünen Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchbringenden, sehr angenehmen Geruch und einen balsamischen, beißenden, brennenden, kampherartigen Geschmack, und läßt dabei zugleich ein Gefühl von Kälte im Munde zurück.

8) *Mentha sylvestris*, L.; Rosmünze; Menthe sauvage (Gal.).

Gal. *Ke. G. M. Sp.*

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 354.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae sylvestris s. long foliae) an; es ist filzig und hat einen mit sitzenden, länglichen lanzettigen, ungleich gezähnten, weißlichen Blättern besetzten Stängel. Der Geruch ist sehr stark und angenehm, der Geschmack bitter.

9) *Mentha viridis*, L.; grüne Münze; Menthe verte, Baume vert (Gal.).

Am. Fer. Gen. Lou. LonN. Sax. B. C. Fi. G.

4 Eine Europäische Pflanze. (Blackw. Herb. t. 290.)

Man gebraucht das blühende Kraut (herba et flores Menthastris). Es besteht aus einem glatten Stängel mit lanzettigen, sitzenden, weitgezähnten Blättern und purpurrothen, wirtelförmig stehenden, eine lange, endständige Kehre bildenden Blüthen. Der Geruch ist angenehm und gewürzhaft.

Alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger reizend; die wirksamste unter allen ist die Pfeffermünze. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme. *Species cephalicae s. nervinae externae.*

(HassP. Li.)

R. Herbae Menthae crispae,

— Majoranae,

— Origani,

— Serpylli,

singularum uncias tres.

Florum Chamomillae,
Florum Lavandulae,
Baccarum Lauri,
— Juniperi,
Seminum Carvi,
singulorum sesquiunciam.

HassP. Herbae Menthae pip., Majoranae, Rorismarini, Serpylli, Florum Lavandulae, singulorum uncias duas. Caryophyllum, Cubebarum, singulorum unciam unam.

Conserva Menthae s. foliorum Menthae crispae, piperitae et viridis. (Ams An. B. Bel. Ful. Gen. Lus. Pal. R. Sax. Wir. Wür. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Foliorum Menthae recentium contusorum . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contere et in loco frigido serva. (B. Bel. Ful. Lus. Pal. R. Wir. Wür. Sw.)
Ams. et Gen. Menthae partem unam et tres Sacchari; — Sar. Cujusque singulorum partes aequales.

℞. Herbae Menthae recentis partem unam.
Sacchari . . . partes duas.
Contunde herbam, pulpam cum saccharo contere et in balneo aquae calefactae ad solutionem sacchari usque. (Vm.)

T. ut conservam Melissae.
℞. Foliorum Menthae pulveratorum drachmam unam.

Sacchari albi drachmas quinque.
Aquae purae . . . drachmas duas.
Misc. (Au.)
℞. Menthae . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras tres.
Mentha cum sacchari libra una in mortario contusa, pulpam per cribrum trajice et cum reliquo saccharo ad mellis consistentiam cocto et adhuc tepido misc. (Fi.)

℞. Florum Chamomillae Romanae, Menthae crispae, Rutae, Calami, singulorum uncias tres. Camphorae . . . drachmas sex.

Fiat pulvis grossiusculus. — Mit warmem Brantwein befeuchtet, auf den Kopf aufzuschlagen.

Infusum Menthae. (DD. GalM. RC. Ra.)
℞. Herbae Menthae piperitae vel aquaticae siccatae, Liquiritiae rasae, singulorum semunciam.

Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae octarius unus (litre) obtineatur; cola. (GalM)

℞. Foliorum Menthae . . . semunciam.
Aquae bullientis . . . libras duas.
Infunde. (Ra.)
DD. Menthae drachmam unam et

Aquae uncias duodecim; — RC. Menthae unciam unam, Aquae bullientis libram unam; stent per horam in vase clauso, tunc colentur; interdum adduntur Aetheris sulphurici alcohol. drachmae duae vel Tincturae aromaticaе vel Calami semuncia.

Schwach reizend, in Fällen, wo man etwas reizend auf den Magen einwirken will, auch bei sogenannten nervösen Coliken empfohlen.

Infusum Menthae compositum. (B*. Du. C.)

℞. Foliorum Menthae communis siccatorum . . . drachmas duas.

Aquae bullientis quantum sufficit ut unciae sex colaturae obtineantur; digere per horam dimidiam in vase tecto, post refrigerationem cola et colaturae adde

Sacchari albi . . . drachmas duas.
Olei Menthae communis

guttas tres.
Tincturae Cardamomi compositae semunciam.

Misce. — Ein sehr angenehmes magenstärkendes und die Ausdünstung beförderndes Mittel. — Gabe, einen bis zwei Eßffel.

Syrupus Menthae s. Menthae crispae. (Ams. An. B. Bor4. Br. Gal. Han. His. Pal. Sar. Wir. T.)

℞. Foliorum Menthae crispae siccatorum . . . uncias duas.
Aquae . . . libras duas.

Infunde et colaturae adde
Sacchari albi . . . libras quatuor.
Syrupum cola. (His. Sar.)

Han. infundere jubet Menthae uncias octo in Aquae libris tribus et in colatura unciarum viginti solvere Sacchari libras quatuor; — Bor4. Menthae uncias duas, Aquae ferventis quantum sufficit et ad colaturam unciarum tredecim Sacchari albi libras duas.

℞. Foliorum Menthae crispae siccatorum . . . unciam unam.
Aquae Menthae crispae distillatae libras duas.

Digere in balneo aquae per duas horas in vase tecto; cola, filtra et liquori adde

Sacchari albi . . . duplum.
Liqua in balneo aquae. (Gal. T.)

Br. et Wir. Menthae uncias quatuor, Aquae distillatae libram unam, duos dies digestionis et Sacchari uncias sedecim ut fiat brevi coctione syrupus.

℞. Succu Menthae crispae sepositione depurati,
Sacchari albi, singulorum libras tres.

Coque. (Pal.)

Sar. Loco sacchari Syrupum communem.

℞. Herbae Menthae siccatae semilibram.

Aquae purae . . . libras quinque.
Macerata per horas duodecim, tunc destillando liquidi uncias quatuor elice, in quibus Sacchari unciæ octo solvantur. Residuo expresso et colato adde Sacchari albi

libras duas et uncias quatuor.
Coque ad consistentiam requisitam et syrupos refrigeratos commisce. (Ams.)

℞. Summitatum Menthae flore centium siccatarum uncias quatuor.

Aquae . . . libras tres.
Infunde in vase tecto per horas duodecim, cola leviter exprimendo, sepone, filtra et adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Clarificata ad requisitam consistentiam evaporent, syrupo refrigerato adde alium praeparatum cum

Aquae Menthae crispae libra una.
Sacchari albi . . . uncias viginti.
Serva. (An.)

B. infundere jubet Herbae siccatae uncias quatuor in Aquae libris quatuor per viginti quatuor horas, destillando deinde elicere liquidi uncias tres et in illo solvere Sacchari uncias sex, residuum exprimere, colaturae addere Sacchari libras duas cum dimidia, leni calore syrupum parare et refrigeratum cum praecedente commiscere.

☞ Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus Menthae piperitae s. piperitidis s. de Mentha piperita. (B. Bel. Gal. F. T.)

℞. Summitatum siccatarum Menthae piperitae . . . unciam unam.

Aquae destillatae Menthae piperitae libras duas.

Digere in balneo aquae per horas viginti quatuor in vase tecto; cola, filtra et liquori adde

Sacchari albi . . . duplum.

Dissolve in balneo aquae et post refrigerationem ver pannum cola. (Gal. T.)

℞. infundere jubet per horas duas, caeterum ut Gal.; — GalH. syrupum parare jubet miscendo infusionis partem unam cum tribus Sacchari communis antea ad globulum usque cocti.

℞. Summitatum Menthae piperitae uncias quatuor.

Aquae . . . sesquilibram.

Digere in vase clauso per tres dies, exprime et sepositione depuratis atque colatis adde

Aquae Menthae piperitae

sesquilibram.

Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat leni calore syrupus. (Bel.)

℞. Herbae Menthae piperitae siccatae uncias quatuor.

Aquae . . . libras quatuor.

Digere in vase tecto per horas viginti quatuor, destillatione liquidi uncias tres elice, cum quibus et cum

Sacchari . . . uncias sex
leni calore syrupum para. Residuo expresso colaturae adde

Sacchari albi libras duas cum dimidia.

Fiat syrupus, qui refrigeratus cum praecedenti commisceatur. (B.)

Syrupus Menthae viridis. (Fi.)

Ut syrupus Menthae piperitae paratur.

Syrupus Menthae piperitae vinosus. (Vm.)

℞. Aquae Menthae piperitae vinosae partes quinque.

Sacchari albi . . . partes novem.
Liqua in balneo aquae tepido et in vase tecto.

Tinctura s. Essentia Menthae piperitae. (Am. An. Br. HassP. C.)

℞. Herbae Menthae piperitae partem unam.

Alcoholis (20°) . . . partes octo.
Post tres dies macerationis filtra.

(An.)
HassP. Eadem ut An. Summitatum et Spiritus quantitates, calore 24 ad 30° per dies sex digerere, tincturam refrigeratam exprimere et filtrare per chartam bibulam jubet; habeat pondus unciarum viginti.

℞. Summitatum florescentium Menthae piperitae, uncias quatuor.

Spiritus Vini rectificati libras duas.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturam infunde

Herbae Menthae piperitae florescentis . . . uncias duabus.

Digere iterum per aliquot tempus, cola exprimendo et filtra. (Br.)

℞. Olei Menthae piperitae drachmas duas.

Alcoholis . . . octarium unum.
Post tres dies digestionis filtra. —

℞. Tinctura Menthae viridis. (Am. C.)

℞. Olei Menthae viridis drachmas duas.

Alcoholis . . . octarium unum.
Dissolve. — ℞. Tinctura.

Oleum Menthae intusum. (Br. O. Sar. Sax. Wir. T.)

℞. Herbae Menthae partem unam.

Olei Olivarum . . . partes octo.
Post aliquot dies digestionis exprime.
(Sax.)

T. Summitatum uncias quindecim,
Olei Olivarum libras quinque; macera
solis calore per 3 vel 4 dies, filtra,
exprime et oleo filtrato aliam similem
summitatum quantitatem addendo, ope-
rationem bis repete, supremo per men-
sem macerationem protrahendo etc.

R. Herbae Menthae partem unam.
Olei Olivarum . . . partes tres.
Digere per dies quatuor in loco ca-
lido, exprime, operationem cum nova
herba repete et filtra. (O.)

Sar. Herbae partem unam et duos
Olei.

R. Herbae Menthae,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.
Coque lente ad humidum consumptionem
et exprime. (Br. Wir.)
Magenstärker, blähungtreibend.

Oleum Menthae aethereum, Aetherco-
leum Menthae.

R. Herbae Menthae recentis
quantum vis.
Aeque fontanae quantum sufficit.
Destillando oleum quod supernatat,
collige. (Am. Ams. B. Bel. Ed. Fenn.
Per. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Succ.
Br. C.)

Ful. et Li. Herbae partem unam et
tres Aeque; — An. Herbae tres et de-
cem Aeque; — Gal. Herbae quinque
et septem Aeque; — D. Herbae unam
et Aeque sex; — Bor. Bor4. Han.
HassP. His. O. Pol. Sax. Fi. Herbae
unam et octo Aeque; — Ba. Herbae
unam et novem Aeque; — A. Herbae
unam et duodecim Aeque; — Sw
Herbae unam et Aeque quatuor; — T.
ut oleum florum Aurantii.

R. Herbae Menthae
partes viginti quinque.
Aeque partes septuaginta quinque.
Salis culinariae . . . partes tres.
Destillant. (Br. Hass. Pal. Sar. Wir.
Pid.)

R. Herbae Menthae . . . quantum vis.
Aeque Menthae destillatae
quantitatem necessariam.
Destillant. (Wür.)

Oleum Menthae sativae indicatum est
a Du. et T.; Oleum Menthae viridis
ab Am. Gen. Lon. LonN. C. Fi. Sw.
T.; Oleum Menthae crispae ab A. Ams.
An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han.
HassP. Lus. O. Pal. R. Sax. Wir. Wür.
Pid. Sw. T.; Oleum Menthae piperitae
denique ab A. Am. Ams. An. B. Ba.
Bel. Bor. Bor4. (venale) ponderis sp. =

0 920) D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal.
Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN.
Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir.
Wür. Br. C. Pid. et Sw.
Gabe, zwei bis sechs Tropfen.

Oleum Menthae crispae terebinthinatum.
(Bor4.)

R. Herbae Menthae crispae
libras triginta.
Olei Terebinthinae libras duas.
Aeque fontanae quantum satis.
Fiat lege artis destillatio et oleum
separetur.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Men-
thae piperitae. (A. Bor. BorC. Bor4.
D. Han. O. RC. Wir. Br*. Fi.)

R. Sacchari albi . . . unciam unam.
Olei essentialis Menthae piperitae
guttas octo.

Tritura simul. (D. Br*.)
Bor. BorC. Han. O. et RC. Sacchari
semunciam et Olei guttas duodecim
(Bor4. duplum adhibet); — A. Sac-
chari drachmam unam et Olei grana
tria; — Fi. Sacchari drachmam unam,
Olei guttas duas ad tres; — Wir.
Sacchari unciam unam, Olei guttas
sedecim; — HassP. Sacchari drach-
mas duas, Olei guttas quatuor. (Eo-
dem modo paratur Elaeosaccharum
Menthae crispae. HassP.)

Rotulae s. Morsuli s. Trochisci Men-
thae piperitae. (A. B*. Ba. P. r4. Ful.
Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Sax.
Wir. T.)

R. Sacchari albi,
Aeque Menthae piperitae,
singulorum uncias duas.
Coque ad electuarii mollis consisten-
tiam, adde elaeosaccharum praeparatum
ex

Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Olei essentialis Menthae piperitae
semidrachma.

Mixturam guttatim instilla tabulae
marmoreae politae et guttas post con-
cretionem leni calore supra cribrum
per plures horas sicca. (Gal.)

Li. et Wir. Sacchari drachmas qua-
tuordecim cum dimidia, Aeque Men-
thae semidrachmam et grana quindecim
et Elaeosaccharum praeparatum
cum Sacchari sesquidrachma et Olei
guttis decem; — Sax. Sacchari quan-
titem arbitrariam, Aeque Menthae
quartam circiter partem et Elaeosac-
chari talem quantitatem ut librae duae
massae totus Olei essentialis drach-
mas circiter duas contineant; — O.
Sacchari semilibram, Aeque Menthae
sufficientem quantitatem et Elaeosac-

charum praeparatum cum Sacchari semidrachma et Olei guttis triginta; — A. Sacchari unciam unam, Aquae Menthae sufficientem quantitatem et Olei essentialis grana viginti quatuor; — T. Sacchari cribrati, Aquae Menthae piperitae, singulorum uncias sex, coque mite calore ad penam; syrupo adde Sacchari grossiuscule pulv. libram unam et Olei Menthae piperitae sesquidrachmam.

℞. Sacchari albi . . . semilibram.
 Aquae destillatae unciam unam.
 Calefao in tantum, donec gutta refrigeratione solida fiat; massae semirefrigeratae adde
 Olei essentialis Menthae
 semidrachmam.

Fiant rotulae. (Hass.)
 Han. Sacchari uncias quatuor, Aquae sufficientem quantitatem et Olei guttas triginta sex; — Ba. Sacchari et Elaeosacchari Menthae, singulorum partes aequales coquere, paululum Aquae Menthae piperitae addendo.

HassP. Sacchari albissimi pulv. quantum vis; sartagini cupreae, stanno probe obductae, rostratae ingesto ad misce Aquae Menthae pip. quantum satis ut fiat massa spissitudinis unguenti, cui, igni admotae sub continua agitatione probe calefactae et liquatae, ingere Sacchari albiss. pulv. quantum satis ut guttulae exemtae indurescant, tunc cuilibet unciae sacchari adhibiti admisce Olei Menthae pip. dest. guttas duodecim, quo facto l.a. cito fiant rotulae etc.

℞. Sacchari ad plumam cocti . . . uncias sex.
 Pulveris Herbae Menthae piperitae drachmas sex.

Mixtis bene, massae semirefrigeratae adde
 Olei essentialis Menthae piperitae guttas triginta.

Fiant rotulae triginta. (Ful.)
 ℞. Sacchari pulverati unciam unam.
 Olei Menthae piperitae guttas sex.
 Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantitatem sufficientem.

Fiant trochisci. (Ful.)
 Fer. Olei semidrachmam, Sacchari uncias sex et mucilaginis Gummi Arabici cum Aqua Menthae parati quantitatem sufficientem.

℞. Ichthyocollae drachmam unam.
 Aquae uncias tres.
 Solutioni adde
 Elaeosacchari Menthae piperitae libram unam.

Fiant trochisci. (B*)

℞. Rotularum Sacchari uncias quatuor.
 Immitte in vas vitreum, antea
 Aetheris acetici guttis triginta
 et

Olei Menthae piperitae guttis duodecim
 probe mixtis agitatione intus obductum.
 Tunc vas bene agitetur ut rotulae perfecte humectentur. (Bor4.)

Aqua Menthae crispae. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Han. Hass. HassP. L. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wür. Br. Pid. Sw. T. Vm.)

℞. Herbae Menthae crispae recentis partem unam.
 Aquae quantum sufficit.
 Post horas viginti quatuor digestionis destillent partes decem. (Ams. B. Bel. Sw.)

Bor D. O. et Pal. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes decem; — Han. Herbae partes octo et Aquae quantum sufficit; destillent partes viginti quatuor; — Fenn. et Suec. Herbae partes quatuor et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes sex; — Lus. Herbae partes sex et Aquae quantum sufficit; destillent partes octo; — Fer. et Pal. Herbae partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae; — An. Herbae partem unam et Aquae quinque; destillent partes quatuor; — Wür. et Br. Herbae partem unam et sex Aquae; destillent partes duae; — Hass. R. et Pid. Herbae partem unam et octo Aquae; destillent partes quatuor; — A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quindecim; destillent partes decem; — Ba. Herbae partem unam et Aquae sedecim; destillent partes quatuor; — Du. Herbae sesquidrachmam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent octarii octo; — T. ut aquam florum Aurantiorum; — Bor4. Herbae libras duas, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti; — HassP. Herbae libras duas cum dimidia, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti quatuor; — RC. Herbae florentis libras duas vel siccatae unam, Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent librae decem.

℞. Herbae Menthae crispae partem unam.
 Aquae partes quatuor.
 Parte quarta destillata productum supra novam herbam cohoba. (Sar.)

℞. Herbae Menthae crispae recentis partes decem.
Aquaе Vitae . partem dimidiam.
— purae

partes centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (Vm.)
Br. Herbae partem unam et Vini albi quatuor; destillet pars una cum dimidia.

℞. Elaeosacchari Menthae crispae semunciam.

Aquaе fontanae . libram unam.
Misce (RC.)

Aqua Menthae piperitae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wür. C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.)

℞. Herbae recentis Menthae piperitae partem unam.

Aquaе sufficientem quantitatem.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes decem. (Ams. B. Bel. D. Sw.)

Am. Du. Lon. et LonN. Herbae sesquilibram et Aquaе sufficientem quantitatem; destillent partes (octarii) octo (LonN. Herbae siccatae sesquilibram vel recentis duplum vel Olei drachmas tres); — Bor. Han. O. et Pol. Herbae partem unam et Aquaе quantum sufficit; destillent partes septem; — Bor4. Herbae libras duas, Aquaе quantitatem sufficientem; destillent librae quatuordecim; — HassP. ut aquam Menthae crispae; — Gen. Herbae partem unam et Aquaе sufficientem quantitatem; destillent partes sex; — Fenn. et Suec. Herbae partes duas et Aquaе quantum sufficit; destillent partes tres; — Lus. Herbae partes tres et Aquaе sufficientem quantitatem; destillent partes quatuor; — Gal. Fi. Herbae partem unam et Aquaе quatuor; destillent partes duae (macerationem per horas ex Fi.); — An. Herbae partem unam et Aquaе quinque; destillent partes quatuor; — A. Br. Wür. et Pid. Herbae partem unam et sex Aquaе; destillent partes duae; — Hass. et R. Herbae unam et octo Aquaе; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae partem unam et Aquaе quindecim; destillent partes decem; — Ba. Herbae partem unam et Aquaе sedecim; destillent partes octo; — RC. ut aquam Menthae crispae; — T. ut aquam florum Aurantiorum.

℞. Herbae Menthae piperitae recentis partes tres.

In sacculum immitte medio cucurbitae Aquaе partes duodecim continen-

tis ita ut liquidum attingere non possit, suspensum, quo facto partes decem destillent. (Ful. Li.)

℞. Herbae Menthae piperitae partes decem.

Aquaе Vitae partem dimidiam.
— purae

partes centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (Vm.)

Ed. et C. miscere iubent Herbae libram unam cum Aquaе quantitate ad prohibendum empyreuma sufficiente, destillando libras decem elicere et producto addere Aquaе Vitae uncias quinque.

℞. Elaeosacchari Menthae piperitae drachmam unam

Aquaе de tillatae uncias octo.
Tere ut solvatur. (BorC.)

℞. Olei essentialis Menthae partem unam.

Sacchari,
Alcoholis (22°),

singulorum partes tres.
Aquaе partes mille et ducentas.

Dissolve! (Gal.)
Gabe, eine bis vier Unzen.

Aqua Menthae viridis. (Am. B*. Lon. LonN. Fi. Sw.)

℞. Herbae florentis Menthae viridis libras tres.

Aquaе sufficientem quantitatem ad prohibendum empyreuma. Post sufficientem digestionem destillent octarii decem. (Am. B*.)

Lon. Herbae sesquilibram et Aquaе sufficientem quantitatem; destillent octarii octo; — LonN. ut aquam Menthae piperitae; — Sw. Herbae partem unam et Aquaе sufficientem quantitatem; destillent partes decem; — Fi. ut aquam Menthae piperitae.

Aqua Menthae spiriuosa s. vinosa s. alcoholica, Spiritus Menthae.

℞. Herbae Menthae recentis partem unam.

Alcoholis (20°) partes quatuor.
Destillet spiritus 28° indicans. (An.)

Bel. Herbae partem unam et sedecim Alcoholis; destillet spiritus 16°; — Br. Pal. et Wir. Herbae partem unam et quatuor Alcoholis; destillet dimidia pars; — Ams. Herbae partes duas et novem Alcoholis; destillent; — Lus. Herbae partem unam cum dimidia et decem Alcoholis; destillent partes quinque; — Sw. Herbae partem unam et Alcoholis quatuordecim; destillent partes quindecim (?); — Br. Herbae libram unam et uncias decem et octo Alcoholis; — Fer. Herbae partem

unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillent partes sex; — *T.* ut spiritum lavandulae.

℞. Herbae Menthae recentis partem unam.

Alcoholis (0,910) partes quatuor cum dimidia.

Aquae partes sex.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes quatuor. (An.)

Ed. Lon. LonN. et C. Herbae partem unam cum dimidia, Aquae Vitae novem et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes novem; — *Vm* Herbae partem unam, Alcoholis tres et sex Aquae; destillent partes duae cum dimidia; — Bor. Bor4. Han. O. et Pol. Herbae partem unam, Alcoholis unam cum dimidia et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes sex; — HassP. Herbae libram unam, Spiritus rectificati libras duas, Aquae quantum satis; destillent librae decem; — *Fi.* Herbae libram unam, Alcoholis 22° septem, Aquae quatuor; destillent librae septem; — Ba. Herbae partem unam, Alcoholis duas cum dimidia et sedecim Aquae; destillent partes octo.

℞. Herbae Menthae recentis partem unam.

Alcoholis partes quatuor.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent fere ad siccum. Macera supra novam herbam et iterum destilla. (Sar.)

Wir. Herbae sesquibram; Alcoholis decem et producti cohobationem supra tres uncias herbae novae; — *Sw.* Herbae partes duodecim, Alcoholis sex et duas Aquae; destillent partes sex, productum cum Aquae partibus duabus infunde Herbae recentis duodecim et destillando partes sex abstrahe.

℞. Herbae Menthae recentis libras duas.

Alcoholis,

Aquae,

singulorum partium aequalium quantum sufficit ut librae octo producti obtineantur, cui adde

Aquae communis,

Sacchari albi,

singulorum uncias duas.

Serva. (Hass *Pid.*)

℞. Herbae Menthae florecentis partes duodecim.

Alcoholis (22°) partes triginta sex.

Aquae Menthae destillatae

partes duodecim.

Post quatuor dies infusionis destillent in balneo aquae partes triginta. (Gal.)

℞. Herbae partem dimidiam, Alco-

holis quatuor, Aquae Menthae unam et viginti quatuor horas infusionis; destillent partes tres.

℞. Olei Menthae pondere scrupulos sex cum semisse.

Spiritus rectificati

octarios quatuor cum semisse.

Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillet lento igne congius. (LonN.)

℞. Aquae Menthae libram unam. Alcoholis unciam unam.

Misce. (Br.)

Spiritus Menthae viridis habent Lon. LonN. C. *Fi. Sw.* et *T.*; *Spiritus Menthae crispae*: A. Ams. An. B. Br. Gal. Li. Lus. R. et *Sw.*; *Spiritus Menthae piperitae*: Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br Ed. Gal. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pal. ol. Sar. Wir. Wir. Br. C. *Fi. Pid. Sw. T.* et *Vm.*

Aqua stomachica s. Menthae composita. (Wir. *Sp.*)

℞. Herbae Menthae crispae recentis uncias tres.

Galangae,

Nucis moschatae,

Cinnamomi,

singulorum unciam unam.

Vini generosi libras octo.

Destillet dimidia pars. (Wir.)

℞. Herbae recentis Menthae uncias viginti quatuor, — — Absinthii uncias tres.

— — Basilici,

— — Pulegii, singularum uncias duas.

— — Rorismarini,

Plorum Lavandulae, singulorum drachmas duas.

Cinnamomi semunciam.

Caryophyllorum,

Coriandri,

singulorum drachmam unam.

Alcoholis uncias sedecim.

Aquae Menthae uncias sexaginta.

Destillent fere ad siccum. (*Sp.*)

☉abe, eine halbe bis eine Unze.

Spiritus Menthae saccharatus, Potio carminativa, Julep de Mentha. (Sa. Sm. *Sw. Vm.*)

℞. Spiritus Menthae piperitae uncias septuaginta quatuor.

— Sacchari uncias duodecim.

Tincturae Menthae piperitae drachmas tres.

Mixta post aliquot dies filtrentur. (*Vm.*)

℞. Aquae Menthae uncias sex.

Spiritus Menthae piperitae,

Syrupi Menthae piperitae, singulorum unciam unam.

Olei essentialis Menthae guttas sex.
 Sacchari semunciam.
 Misce. (Vm.)
 R. Aquae Menthae uncias octo.
 Spiritus Menthae sesquiunciam.
 Syrupi Sacchari semunciam.
 Misce. (Sa.)
 Sw. Aquae Menthae viridis uncias octo,
 Tincturae et Syrupi Menthae, singulorum unciam unam.
 Eßfetweise.

Potio stomachica. (Sm.)

R. Aquae Menthae crispae uncias quatuor.
 — — piperitae,
 — Cinnamomi hordeatae,
 Syrupi Caputum Papaveris, singulorum unciam unam.

Aqua ad tormina infantum, Potio antispasmodica. (Sm. Sp.)

R. Aquae Menthae,
 — Chamomillae, singulorum uncias duas.
 Syrupi Rhoeados,
 — Chamomillae, singulorum semunciam.

Misce. (Sp.)

R. Olei essentialis Cinnamomi guttas duas.
 — Menthae piperitae guttas tres.
 Spiritus Menthae piperitae unciam unam.
 Syrupus Althaeae uncias tres.
 Aquae destillatae Menthae piperitae uncias quatuor.

Misce (Sm.)

Eßfetweise.

M e r c u r i a l i s .

Mercurialis annua, L.; jähriges Bindegeltraut; *Mercuriale annuelle* (Gal.); *Annual mercury* (Ang.); *Merkuryalis*, n. pl. una bazolicka (B.); *Bingelurt* (D.); *Jaarliks hingelkru'd* (Bel.); *Mercorella* (I.); *Mercuryasz* (Pol.); *Bingelaert* (Succ).

Am. An Bel. Br. Gal. Gen. His. Wir. Wür. Be. Br. G. M. Sp. Z.

© (Dioecia Enneandria, L.; Euphorbiaceae, J) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 162 Schk t. 332. Plenck t. 717. Hayne V. 11. Zorn 1c pl. t. 103. 104.)

Man wendet das Kraut (herba *Mercurialis*) an; es besteht aus einem ästigen, glatten Stängel mit eirunden, lanzettigen, gezähnten, hellgrünen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen schleimigen etwas salzigen Geschmack.

Es enthält, nach Feneulle, einen bittern, leicht purgirenden Stoff, Chlorophyll oder Pflanzengrün, Eiweiß, einen fetten

Stoff, flüchtiges Del, pectische Säure, Salze etc.

Clyster s. *Enema purgans*. (Ra.)

R. Herbae *Mercurialis* semunciam.
 Aquae libram unam.
 Coque et cola.

Decoctum Mercurialis. (Sa.)

R. Foliorum *Sennae* drachmas sex,
 Herbae *Mercurialis* manipulum unum cum dimidio.
 Aquae sufficientem quantitatem ut colaturae sesquibra obtineatur.
 Post semihoram ebullitionis in vase tecto adde
 Mellis pectoralis uncias duas.
 Misce.

Mel mercuriale s. *Mercurialis annuae*. (An. Gal. Pal. Sar. Wir. Sp. T. Vm.)

R. Succi *Mercurialis*,
 Mellis electi, singulorum partes aequales.
 Coque despumando, ad syrupi consistentiam et per pannum cola. (Gal. Sar. T.)

An. Pal. et Wir. Mellis partes duas et tres Succi; — Sp. Succi et Mellis ut antea; — Vm. Succi unam et Mellis unam cum dimidia.

Ehedem in Stupfir angewendet. Mit Kugeln bei Blähungskolik, Spysterismus etc. — Gabe, eine bis zwei Unzen in einem erweichenden Decoct.

Syrupus Mercurialis s. *prophylacticus* s. *longae vitae*, *Mellitis Mercurialis composita*. (Gal. Wir. Sp.)

R. Succi *Mercurialis* libras quatuor.
 — Boraginis,
 — Buglossi, singulorum libram unam.

Mellis albi libras sex.
 Coque et despuma; tunc

R. *Gentianae* uncias duas.
 Radicis *Iridis* nostratis uncias tres.
 Vini albi sesquilibram.

Macera per horas viginti quatuor et exprime; colaturam cum succis et melle mixtam coque blando igne ad syrupi consistentiam et cola.

Sp eundem agendi modum indicat, praescribendo tamen Succi *Mercurialis* uncias octoginta sex, Succi *Boraginis* viginti quatuor, Succi *Buglossi* tantidem, Mellis uncias triginta duas, *Gentianae* uncias quatuor, *Iridis* uncias octo et Vini uncias quadraginta octo; — Gal. Succi *Mercurialis* libras quatuor, Succi *Boraginis* et *Buglossi*, singulorum unam, Mellis libras sex, *Gentianae* uncias duas, *Iridis* quatuor et Vini libras duas.

Purgierend, magenstärkend, emmenagogisch.

M E R C U R I U S.

Mercurius vivus, Argentum vivum, Hydrargyrum, Hydrargyrum virginicum, Hydrargyrum; Quecksilber, lebendiges Quecksilber; Mercure, Vif-argent (Gal.); Mercury, Quicksilver (Ang.); Abuk, Zibakl. (Ar.); Chug-yin (Ch.); Quecksolv (D.); Azogue, Mercurio (His. Lus.); Para, Parah (Hin. Duk.); Kwikzilva (Bel.); Argentum vivo, Mercurio (I.); Rassa (Ma.); Seemab (Pe.); Parada, Rasa, Sutam (Sa.); Quicksilver (Suec.); Rasam (Tam. Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Ion. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. C. Fi. Par. T

Das flüssige Quecksilber kann zu medicinischen Zwecken erst dann benutzt werden, wenn es von beigemischten fremden Substanzen gereinigt worden ist. Man nennt es dann:

Mercurius vivus depuratus s. rectificatus, Hydrargyrum purificatum s. depuratum s. purum, Hydrargyrum purificatus. Nicht alle Pharmacopöen geben das dazu anzuwendende Verfahren an.

Ba. Fer. Gen. Han. His. Lus. O. R. Suec. Wir. Br. Pid. et Su. destillare jubent mercurium in retorta communicante cum recipiente pro dimidia parte Aqua repleto; — Fenn. et Hass. eundem agendi modum adhibent, in retortam tamen immittunt mixturam e metalli libris tribus et Sulphuris uncia una; — Bor4. Hydrargyri libram unam cum Ferri limati tantum ut superficies oblecta sit in retorta igne sensim sed non nimis aucto destillationi subjicere et partes novem abstrahere; — LonN. mercurium in retorta ferrea destillare jubet; — RC. in retorta ferrea pro dimidio metallo repleto tuboque ferreo verticaliter erecto, dein recurvato instructa atque cum recipiente vitreo capaci ad dimidium Aqua frigida repleto sic conjuncta ut officium colli superficiei aquae immersum sit, destillare; — Am Ams. Ed. Lon. Sar. et C. Terere Mercurii partes sex cum Limaturae Ferri una et mixturam destillationi subjicere; — Br. Metallum cum Kali subcarbonico vel Calca viva destillare et trajicere deinde per pellem caprae; — Li. in recipiente pro dimidia parte Aqua repleto destillare et per horas duodecim digerere in Acidi nitrici Aquae partibus tribus diluti et deinde bene abluere; — Gen. Destillationem solam indicat; — idem et T.

Sax. Destillare jubet mixturam ex Aethiopsis mineralis et Calcis vivae, singulorum partibus aequalibus; — Ful. liquefacere jubet Sulphuris in baculis uncias sex in mortario ferreo, addere per vice; Mercurii libras duas et post illorum intimum conjunctionem massam nigram inde productam pulveratam cum Calcis vivae pulveratae uncis octodecim mixtam in retortam immittere, atque productum in excipulo Aqua pro parte dimidia repleto recipere; — Fer. Gal. His. Pol. T. et Vm. Cinnabarem cum Limaturae Ferri parte dimidia vel partes aequales eorum destillare; — Fi. Mercurii calefacti libras tres affundere Sulphuri in baculis in crucibulo in fusione existenti, cum spatula ferrea agitando et, tunc massae per momentum refrigeratae et pulveratae addere Limaturae Ferri uncias viginti, destillare etc. (*Mercurius redivivus Cinnabaris.*); — HassP. Mercurii vivi venalis uncias decem, Mercurii nitrosi crystallisati inter parandum mercurium solub. Hahn. ex merc. venali obtenti unciam unam, Aquae destillatae uncias quatuor; mercurius nitrosus in aqua destill. solutus cum mercurio per horas duas vase idoneo subinde agitando coquitur, liquor defunditur et merc. cum Aq. dest. abluitur.

Idi et Chevallier Mercurium in retortam liquatorem pro duobus trientibus solum eo replendam immittere et hanc in furnum, operculo tectum collocare, cui tubus ferreus, in fine nodulo linteo humefacto, cujus una extremitas patinae profundae (*Serrine*) Aqua repletae immergit, instructus adaptatus est; operatione peracta, Aqua decanthatur et metallum chartae Josephinae ope desiccatum per pellem caprae trajicitur.

Professor G. Branchi metallum in lagena epistomio et smiri obturata et parietibus valde resistentibus praedita cum Acido sulphurico per longum tempus agitando et concutiendo saepius, tenere, acidum decanthare et metallum residuum cum multa Aqua ablutum et siccatum per chartam filtrare. (Ein sehr wohlfeiles Verfahren T.)

Das metallische Quecksilber in Substanz wird in nur sehr wenigen Präparaten angewendet, welche an sich selbst schon wenig gebräuchlich sind. In dieser Gestalt bringt es keine Wirkung auf den thierischen Organismus hervor, die augenblicklich, welche von seiner Schwere abhängig ist, und mit Unrecht halten es Viele für ein Gift. Ganz

andere ist sein Verhalten in einem sehr getheilten Zustande. Es ist dann eins der kräftigsten Reizmittel, welche man kennt, und kann selbst giftig werden, entweder durch seine Menge oder durch die Dauer seiner Wirkung, obgleich es im letzteren Falle eine Reihe pathologischer Erscheinungen hervorzubringen pflegt, welche allmählig den Leidenden zum Tode führen.

Obgleich es genugsam erwiesen ist, daß das Quecksilber auf dem Wege der Einsaugung in den Kreislauf kömmt, so weiß man doch nicht, ob seine Wirkungen von einer unmittelbaren Einwirkung auf diejenigen Organe, in deren Gewebe es durch das Blut geführt wird, oder einzig von der sympathischen Reaction der mittelst nervöser Connexe oder ähnlichen Baues mit denjenigen, auf deren Oberfläche man es andringt, abhängig ist; doch scheint letztere Meinung bis jetzt die wahrscheinlichste. Zu ihren Gunsten spricht die unendliche Mannichfaltigkeit der Wirkungen des Quecksilbers nach den äußern Umständen, der Constitution oder dem Zustande des Subjects, nach der Natur des Präparats, der Gabe u. c.; eine Mannichfaltigkeit, welche es zugleich den krampffördernden, Harn und Regeln treibenden, reizenden, purgirenden, Speichel- und Schweißaussonderung befördernden Mitteln zugählet ließ, je nachdem man es nämlich dieien oder jenen Ab- oder Aussonderungsproceß bethätigen sah.

Das Quecksilber ist auf tausendfache Weise von den Ärzten verändert worden, und die Pharmaceuten haben diese Veränderungen noch vermehrt, welche in der That eine große Menge ganz oder doch fast ungeräthlicher Präparate anführen

Metallisches Quecksilber.

§. I. Präparate, in denen die Wirkung des Quecksilbers nicht oder doch auf keine merkliche Weise durch andere Substanzen modificirt ist.

A. Quecksilber in Substanz.

Potio Mercurii vivi s. mercurialis. (B.)

℞. Mercurii purificati
uncias duas ad quatuor.

Divide in doses octo. — Alle zwei Stunden eine Gabe, bei volvulus.

Brera hat einem Kranken das Quecksilber bis zu sechs und zwanzig Unzen gegeben; es bewirkte zwar keine Heilung, erleichterte aber beträchtlich.

Aqua Mercurii vivi cocta s. mercurialis simplex. (Ful. Br. Fi. T.)

℞. Mercurii libras duas.

Aquae communis libras quatuor.
Coque in retorta per horas duas et decantha.

T. Mercurii libram unam, Aquae pluvialis libras duas, coquere per horam unam, (Fi.) per duas.

Wurmwidrig. — Man wendet es, allein oder mit Zucker verfest, bei Kindern gegen Maden und Spulwürmer an. — Gabe, ein- bis sechsährigen, eine halbe bis drei Unzen.

Decoctum Hydrargyri s. Mercurii.
(Wür.)

℞. Mercurii purificati uncias duas.
Aquae Tanaceti libram unam.

Coque in olla fictili tecta, metallum saepius haculo agitando; decantha et adde aquae

Syrupi Florum Persicae
unciam unam,

Wurmwidrig.

Decoctum anthelminticum Rosensteini.
(Au. Pid.)

℞. Radicis Grammis semunciam,
Corticis Aurantiorum

. semidrachmam.

Cinnamomi semiscrupulum.

Aquae fontanae libras octo.

Coque ad triam quadrantium consumptionem, cola et adde

Mercurii uncias duas.

Coque iterum in vase fictili, agitando saepius baculi ope, tunc lente decantha.

Bei Wurmbeschwerden der Kinder in der Gabe von acht Unzen bis zu einem Pfund, allein oder mit Milch, empfohlen.

Emplastrum revolvens s. fundans. (Bo.)

℞. Emplastri diabetani uncias duas.

Succi Solani nigri drachmas duas.

Cum Vitello ovi unius tritis adde

Amalgamatis Mercurii et Plumbi

partium aequalium

drachmas duas.

Cetacei sesquidrachmam.

B. Quecksilber mittelst Schleim zertheilt.

Mucilago mercurialis Plenckii s. Gummi Arabici mercurialis. (Sax. Wir. Br.)

℞. Mercurii purificati

drachmam unam.

Gummi Arabici drachmas duas.

Aquae communis cochlearia duo.

Agita mixturam in mortario pistilli vitrei ope, donec metallum disparuerit.

(Br.)

Sax. et Wir. Mercurii drachmam unam, Gummi semunciam et Aquae sufficientem quantitatem. — Enthält um die Hälfte weniger Quecksilber, als der

vorige.

Reizend, revulsio, wegen letzterer Wirkung er bisweilen als schwächend betrachtet worden ist, denn man hat ihn bei entzündlicher Ruhr und einigen andern entzündlichen Krankheiten empfohlen. Auch hat man ihn äußerlich bei sogenannter venerischer Gonorrhöe, Augen- und Halsentzündung angewendet. Eben so hat man sich desselben auch gegen große Ascaciden bedient. Innerlich giebt man ihn vermischt z. B. mit acht Unzen Aqua Fumariae und einer halben Unze Syrup, zu einem oder zwei Eßffel Morgens und Abends.

Syrupus Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis s. de Mercurio et Gummi s. Mercurii gummosus, Mercurius gummosus Plenki. (B*. Fer. Ful. Gal. Hass. Li. Fi. Sa. Sp. T. Vm.)

℞. Mercurii purificati drachmam unam.
Gummi Arabici pulverati drachmas tres.

Tritura ad extinctionem usque et adde deinde

Syrupi Capiti Papaveris semunciam.

Tritura iterum in mortario marmoreo et in mucilaginem red ge. (B*. Fer. Gal. Hass. Li. Fi. Sp.)

T. Mercurii drachmas duas cum triplici pondere Gummi aliquot guttis Aquae Menthae vel Florum Aurantii additis triturando in mucilaginem red acti ad extinctionem terere et addere Syrupi Diacodii unciam unam.

℞. Mucilaginis Gummi Arabici drachmas sex.

Mercurii . . . drachmam unam.

Tritura ad extinctionem metalli usque et adde

Syrupi Sacchari uncias quatuor.

Misce bene. (Ful.)

℞. Mercurii . . . semidrachmam.

Gummi Arabici sesquidrachmam.

Aquae . . . cochlear unum.

Tritura ad metalli extinctionem usque et adde deinde

Syrupi Violarum . . . uncias duas.

Aquae Florum Sambuci unciam unam.

Misce bene. (Sa.)

℞. Gummi Arabici . . . drachmas tres.

Aquae drachmas septem cum dimidia.

Fiat mucilago, oui adde

Unguenti mercurialis cum Butyro

Cacao parati sesquidrachmam.

Tere simul bene et sensim admisce intime

Syrupi Sacchari . . . uncias sex.

Serva. (Vm.)

Wenn man diesen Syrup anwendet, muß

man ihn so geben, daß der Kranke drei bis sechs oder acht Gran Quecksilber täglich bekommt. Die letztere Formel unterscheidet sich kaum von der des folgenden Präparats.

Conditum hydrargyri-unguinorum, Marmelada mercurialis, Linimentum mercuriale. (Sw. Vm.)

℞. Unguenti Mercurialis cum Butyro Cacao parati . . . drachmas tres.
Mucilaginis Gummi Arabici drachmas sex.

Misce ut fiat emulsio, cui sensim adde

Mell's albi . . . uncias quatuor.

Ein Präparat, welches bei unterdrückter hitziger Harnröhrenentzündung durch Mißbrauch oder unzeitigen Gebrauch von Purgirmitteln empfohlen worden ist. — Gabe, zwei bis vier Kaffeelöffel.

Syrupus mercurialis gummosus de Lagneau. (Ca.)

℞. Mercurii . . . scrupulum unum.

Gummi Arabici . . . unciam unam.

Syrupi Cichorii compositi

quantitatem sufficientem.

Tritura in mortario vitreo ad perfectam metalli extinctionem usque et adde

Syrupi Cichorii compositi sesquiunciam.

Anwendung, wie bei'm vorhergehenden.

Mixtura Mercurii gummosa s. mercurialis, Potio mercurialis Plenki. (Br. Lus. Sar.)

℞. Mercurii . . . drachmam unam.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae semunciam.

Tritura ad extinctionem et adde

Syrupi Sacchari . . . unciam unam.

Aquae destillatae . . . uncias octo.

Misce bene. (Lus.)

℞. Mercurii . . . drachmam unam.

Gummi Arabici drachmas duas.

Syrupi Sacchari . . . semunciam.

Tritura ad extinctionem metalli et adde

Aquae Menthae . . . uncias sex.

— Juniperi compositae unciam unam.

Misce exacte. (Sa.)

℞. Gummi Arabici . . . drachmas tres.

Adspere in mortario marmoreo Aquae paxillum ut mucilaginis consistentiam adipiscatur, cui adde

Mercurii . . . drachmam unam.

Tritura ad perfectam extinctionem et adde sensim continuè terendo

Syrupi kermesini . . . semunciam.

Aquae Fumariae . . . uncias octo.

Misce bene. (Br.)

Die Anwendungsweise siehe oben unter *Mucilago mercurialis*.

Ein in Rücksicht der Wirkung ähnliches Präparat ist Schlessinger's *Solutio Hydrargyri gummosi*.

℞. Mercurii grana decem.
 Cetacei semidrachmam.
 Vitelli Ovi no. 1.
 Syrupi Althaeae unciam unam.
 Aquae destillatae uncias duas.
 Misce triturando. (Au.)

Mixtura mercurialis balsamica. (Br.)

℞. Balsami Copaivae,
 Gummi Arabici,
 singulorum semidrachmam.
 Mercurii drachmam unam.
 Tritura ad extinctionem metalli et adde

Syrupi kermesini,
 Aquae Fumariae,
 singulorum uncias duas.

Misce bene. — Besonders bei Harnröhrenentzündung empfohlen.

Lac mercuriale Plenckii. (B*. Sm.)

℞. Mercurii drachmam unam.
 Gummi Arabici drachmas quatuor.
 Syrupi Caputum Papaveris
 quantum sufficit
 ut fiat mucilago. Post longam triturationem in mortario adde sensim
 Lactis vaccini bullientis
 uncias octo.

In Waschungen bei sogenannter gonorrhöischer Augenentzündung, in Bädern bei Phimosi von Geschwüren auf der Eichel und in Gurgelwasser bei sogenannter syphilitischer Bräune.

Injectio hydrargyrica s. mercurialis simplex. (Sw.)

℞. Unguenti mercurialis
 drachmas duas.
 Mucilaginis Gummi Arabici
 semunciam.

Tritura ut fiat emulsio, cui sensim adde

Aquae uncias tres.
 Bei chronischem Tripper. — Man spricht vier Mal täglich zwei Drachmen ein.

Injectio mercurialis Plenckii. (Sp.)

℞. Mercurii drachmam unam.
 Gummi Arabici drachmas tres.
 Syrupi Caputum Papaveris
 semunciam.

Tritura ad extinctionem et adde

Aquae fontanae uncias duodecim.
 — Rutae uncias duas.

Bei Gonorrhöe und habituellem weißen Fluß.

Einfacher ist folgende Injection Dufesland's.

℞. Mercurii drachmam unam.
 Gummi Arabici semunciam.
 Syrupi Opii

sufficientem quantitatem.

Tere mercurium cum gummi, syrupum sensim addendo, donec omnia in mucilaginem sint conversa. (Au.)

Gargarisma mercuriale Plenckii. (Sp.)

℞. Mercurii semidrachmam.
 Gummi Arabici drachmas tres.
 Syrupi Caputum Papaveris

semunciam.

Mercurii dulcis grana sex.

Tritura ad extinctionem et adde

Decocti e Herbae Clematidis erectae semuncia cum Aqua

uncias viginti sex.

Mellis rosati unciam unam.

Essentiae Myrrhae

drachmam unam.

Bei sogenannten syphilitischen Bräunen und Nasengeschwüren gepriesen.

Trochisci Mercurii saccharini s. de Lagneau. (Ca.)

℞. Sacchari pulverati uncias decem.
 Mercurii uncias duas.
 Gummi Arabici unciam unam.
 Vanilla drachmam unam.
 Fiant l. a. trochisci centum septuaginta sex. — Eine jede enthält zwei Gran Quecksilber.

Trochisci Mercurii saccharati s. saccharini. (Sy.)

℞. Mercurii unciam unam.
 Sacchari crystallisati (Candis)
 uncias duas.

Tritura cum Aquae guttis aliquot ad metalli perfectam extinctionem et adde Mucilaginis Gummi Arabici

quantum sufficit.

Fiant trochisci granorum sex, quibus si necesse est, aliquot guttae Olei essentialis Juniperi vel Florum Aurantium addantur.

Pilulae mercuriales Plenckii s. Hydrargyri gummosae. (An. Bel. Au. Sy. Vm.)

℞. Mercurii gummosi partem unam.
 Micae Panis
 partem unam cum dimidia.

Mellis albi quantum sufficit
 ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Mercurii drachmam unam.
 Gummi Arabici,
 Mellis, singulorum drachmas duas.
 Pulveris Liquiritiae semunciam.

Fiant pilulae trium granorum. (Au.)

℞. Mercurii scrupulum unum.
 Amyli drachmam unam.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.
Tritura ad perfectam extinctionem
usque et adde
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas viginti dividenda. (Sy.)
℞. Mercurii . . . drachmam unam.
Gummi Arabici pulverati
drachmas tres.
Syrupi Rhei
sufficientem quantitatem.
Tritura in mortario marmoreo ad
perfectam metalli extinctionem et adde
Micae Panis albi . . . semunciam.
Fiat massa pilularis. (An. Bel.)

Pilulae mercuriales Plenckii compositae
s. antisiphiliticae Plenckii. (Fer. Gal.
Br. Ca. Fi. Pie. T. Vm.)

℞. Mercurii gummosi . . . partes tres.
Extracti Cicutae . . . partem unam.
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Vm.)
℞. Mercurii purissimi,
Extracti Cicutae,
singulorum drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici
drachmas sex.
Radici Liquiritiae pulveratae
quantum sufficit.

Mercurio cum mucilagine ad extinctionem trito adde liquiritiam ut fiat massa pilularis, in 288 pilulas dividenda. (Fi.)

T Ingredientium dictorum, singuli duplum ut fiant pilulae pondere trium vel quatuor granorum.

℞. Mercurii . . . drachmam unam.
Gummi Arabici . . . drachmas sex.
Tritura ad extinctionem metalli et adde

Extracti Cicutae drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum. (Fer. Gal. Br. Ca. Pie)

Gabe, vier bis sechs Pillen.

Pilulae mercuriales cum Opio. (Fi)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Gummi Arabici pulverati
unciass duas.

Agita in mortario marmoreo, Aquam addendo ut extingatur mercurius et pasta fiat mollis, cui adde

Opii puri pulverati scrupulos octo.
Radici Liquiritiae pulveratae
unciass unam.

Fiat cum Aquae sufficiente quantitate massa in 240 pilulas dividenda. — Gabe, ein bis zwei Stück täglich.

C. Quecksilber mittelst zuckerartiger Substanzen zertheilt.

Mercurius saccharatus, Hydrargyrum saccharatum, Aethiops saccharatus, Oxydum Hydrargyri saccharatum, Saccharum Mercurii vermifugum s. anthelminticum s. mercuriale. (Fer. Ful. Han. His. Li. Sar. Wür. Ca. Fi. Sp. T. Vm.)

℞. Mercurii partem unam.
Sacchari albi partes duas.
Tritura ad perfectam metalli extinctionem usque. (Han. Sar. Sp. Vm.)
Ful. Li. et Ca. Saccharum crystallisatum (Candis) flavum adhibere jubent.
℞. Mercurii partem unam.
Sacchari albi partes duas.
Aque quantum sufficit
ut fiat pasta mollis, quam ad perfectam metalli usque extinctionem tere. (His.)

℞. Mercurii,
Sacchari albi,
singulorum semunciam.
Olei essentialis Tanacetii
guttas viginti sex.

Tritura ad perfectam metalli extinctionem. (Wür.)

℞. Mercurii,
Sacchari albi,
singulorum semunciam.
Cremoris Tartari scrupulos duos.
Tritura ad perfectam metalli usque extinctionem. (Fer. Fi.)

T. duplicem quantitatem ingredientium indicat.

Dieses Präparat wird bei Kindern und zarten Personen, welche an Sphitis leiden, empfohlen. — Man giebt es in Chocolate oder in Kaffee.

Mel hydrargyratum s. mercuriale. (Br. Sw. Sy.)

℞. Mercurii,
Mellis despumati,
singulorum unciam unam.
Tritura ad extinctionem usque.

Potio anodyna s. leniens Andryi. (Ca.)

℞. Aquae Florum Aurantiorum
unciass duas.

— Rosarum,
Syrupi Capiti Papaveris,
singulorum unciam unam.
Mercurii drachmas sex.

Terendo mercurium in syrupo extingue et massam deinde cum aquis commisce. — Bei Cardialgie, Gastrodynie und kramphafstem Erbrechen. — Gabe, ein Essel Morgens und Abends.

Boli coerulei. (Au. E. Sa.)

℞. Mercurii grana decem.

Conservae Rosarum
 scrupulum unum.
 Tritura ad extinctionem usque.
Boli e Mercurio glycyrrhizato. (Au. Sy.)
 ℞. Mercurii . . . grana decem.
 Extracti Liquiritiae mollis
 scrupulum unum.
 Tritura ad extinctionem.
Pilulae Hydrargyri s. coeruleae. (Am. B*. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. Suec. Br. C. Ca. E. Ra. Vm.)
 ℞. Mercurii,
 Conservae Cynorrhodi,
 singulorum drachmam unam.
 Trituratur ad extinctionem, fiant cum pulvere Liquiritiae, pilulae triginta sex aequales. (Ra.)
 Gen. Mercurii partem unam et duas Conservae Rosarum.
 ℞. Mercurii,
 Conservae Rosarum,
 singulorum drachmam unam.
 Tritura cum Mucilaginis Gummi Arabici parva quantitate ad extinctionem usque et adde
 Amyli pulverati . . . uncias duas.
 Fiant pilulae quadraginta octo. (Ed. Br. Ca. E. Vm.)
 ℞. Mercurii . . . drachmas duas
 Conservae Rosarum drachmas tres.
 Extingue mercurium et adde
 Pulveris Liquiritiae
 drachmam unam.
 Fiat massa pilularis. (Am. B*. Du. Lon LonN. Br. C.)
 ℞. Mercurii,
 Conservae Rosarum,
 singulorum drachmas duas.
 Sacchari albi . drachmam unam.
 Post extinctionem metalli adde
 Pulveris Amyli,
 — Succi Liquiritiae,
 singulorum semidrachmam.
 Aquae . . . parvam quantitatem.
 Fiant pilulae ducentae octoginta octo. (Suec.)
 Von den Pillen der ersten Formel enthält jede zwei Gran Quecksilber; die der zweiten je eine anderhalb und von denen der letzten jede bloß einen halben Gran.
Pilulae Mercurii melliti s. Mellis hydrargyriati. (His.)
 ℞. Mercurii,
 Mellis, singulorum unciam unam.
 Post metalli extinctionem adde
 Micae Panis albi recentis
 uncias duas.
 Fiat massa pilularis.
 ℞. Mercurii . . . uncias duas.
 Mellis uncias duas cum dimidia.
 Tritura ad extinctionem et adde
 Pulveris Liquiritiae sesquunciam.

Fiat massa pilularis.
Pilulae Mercurii glycyrrhizati. (Lus. Sy.)
 ℞. Mercurii,
 Mellis, singulorum unciam unam.
 Extracti Liquiritiae uncias duas.
 Fiat massa pilularis. (Sy.)
 ℞. Mercurii,
 Extracti Liquiritiae,
 singulorum partes octo.
 Pulveris Liquiritiae partem unam.
 Fiat massa pilularis. (Sy.)
 Lus. Mercurii partes duas, Extracti tantidem et unam Pulveris.
Pulvis anthelminticus s. vermifugus. (Wür.)
 ℞. Radicis Jalappae . . . semunciam.
 — Valerianae, . . .
 — Filicis Maris,
 Mercurii saccharati,
 singulorum drachmas duas.
 Ferri sulphurici exsiccati
 scrupulos duos.
 Elaeosacchari Tanacetii semunciam.
 Fiat pulvis subtilissimus.
 D. Quecksilber mittelst erbiger Substanzen zertheilt.
Mercurius alcalisatus s. cum Creta, Aethiops alcalisatus. (Du. Ful. Lon. LonN. Wir. Wür. Pid.)
 ℞. Mercurii . . . partes tres.
 Cretae praeparatae partes quinque.
 Tritura ad perfectam usque metalli extinctionem. (Lon. LonN.)
 Ful. Wir. Wür. et Pid. loco cretae Oculos Cancrorum praeparatos, caeterum easdem quantitates secundum Wir; Ful. Wür. et Pid. Mercurii unam et duas Oculorum Cancrorum.
 ℞. Mercurii,
 Mannae, singulorum unciam unam,
 Cretae praeparatae . . . semunciam.
 Tritura mercurium cum manna et guttis aliquot Aquae ad perfectam usque extinctionem; adde Mannae drachmam unam, continue triturando; mixtione perfecta massae infunde Aquae octarium unum, seponere per aliquot tempus et liquidum decantha; ablutione bis repetita, sedimentum humidum adhuc cum reliqua creta commisce et totum super charta josephina sicca. (Du.)
Mercurius alcalisatus s. cum Magnesia. (Du. Li.)
 ℞. Mercurii . . . semunciam.
 Magnesia albae . . . unciam unam.
 Tritura ad perfectam metalli extinctionem. (Li.)
 Du. eundem pulverem quam pro

praeparatione mercurii alcalisati indicat.

Dieses und das folgende Präparat sind die besten, welche man anwenden kann, wenn man metallisches Quecksilber zu geben die Absicht hat.

Boli mercuriales. (Sa.)

℞. Mercurii alcalisati semidrachmam.
Conservae Rosarum
scrupulum unum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Topicum deterisivum. (Bo.)

℞. Mercurii,
Cretae albae,
singulorum semunciam.
Post extinctionem metalli adde
Mellis rosati uncias duas.
Fouquet wendete dieses Präparat auf venerische Geschwüre an.

Liquor resolvens. (Sm.)

℞. Mercurii semidrachmam.
Calcis vivae drachmas duas.
Tritura ad perfectam extinctionem usque et mixturam lagenae ingere repletae Aqua in solutione tenente
Saponis grisei drachmas quatuor.
Dieser Liquor gilt als ein kräftiges Auflösungs- mittel bei kalten und schmerzlosen Geschwülsten, besonders bei Anschwellungen der Schilddrüse. — Man löst ihn erwärmen und trinkt Compressen damit.

E. Quecksilber, mittelst fetter und harziger Körper zertheilt.

Injectio hydrargyro-terebinthinata. (Sw.)*

℞. Mercurii,
Terebinthinae,
singulorum drachmas duas.
Tritura per horam unam et adde deinde
Axungiae semidrachmam.
Fiat cum
Mucilaginis Gummi Arabici
drachmis duabus,
Aquae uncis tribus
emulsio. — Bei hartnäckigen Ausflüssen aus der Harnröhre empfohlen. — Man spritzt davon zwei Drachmen täglich dreimal ein.

Pilulae Mercurii terebinthinati. (Sw Sy.)*

℞. Mercurii partes quatuor.
Terebinthinae partem unam.
Post extinctionem metalli fiat cum
Mucilaginis spissi Gummi Arabici
partibus duabus
emulsio, cui adde deinde

Panis albi biscocci (Biscuit) pulverati quantitatem sufficientem ut fiant pilulae quinque granorum. (Sw*.)

℞. Mercurii unciam unam.
Terebinthinae Venetae
sesquidrachmam.

Metallum extingue addendo si necesse, Essentiae Terebinthinae guttas aliquot; fiat cum

Pulveris Liquiritiae
sufficiente quantitate
pilulae octoginta. (Sy.)

Sw*. praeterea: Mercurii, Terebinthinae, singulorum drachmas duas et post extinctionem, sufficientem quantitatem mixturae e Pulveris Liquiritiae et Radicis Althaeae, singulorum partibus aequalibus.

Pilulae mercuriales. (Fer Pic.)

℞. Mercurii unciam unam.
Terebinthinae quantum sufficit
ad extinctionem metalli; adde

Pulveris Succini,
— Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Althaeae
sufficientem quantitatem

ut fiant pilulae quatuor granorum. (Pic.)

℞. Mercurii unciam unam.
Balsami Meccaënsis se-quiunciam.
Trituratis ad metalli extinctionem exacte admisce

Massae Pilularum cum Opio
drachmam unam.

Fiat massa pilularis. (Fer.)

Gabe, acht bis zwölf Gran.

Unguentum mercuriale s. mercuriale cinereum Hydrargyri s. Hydrargyri cinereum s. Hydrargyri sine et cum Terebinthina s. Neapolitanum. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Galm. Gen. Han. Hass. HassP. His. L. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RG. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. B. Br. C. Ca. Fi. Pid. Ra. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

Da es eine lange und mühevoll Arbeit ist, das Quecksilber gänzlich zu zertheilen, so hat man, um diese zu beschleunigen, verschiedene Mittel vorgeschlagen, welche auf sieben zurückgeführt werden können, nämlich:

- 1) Zusatz von Zerpentin;
- 2) von etwas alter Quecksilbersalbe;
- 3) von einer kleinen Menge oxygenitirter Salbe.
- 4) Verfahren Duffin's. Man bringt das Quecksilber in eine Flasche mit

gewölbtem Spitzulaufenden Grunde, füllt letztere zur Hälfte mit reinem Wasser, schüttelt sie einige Zeitlang, indem man die Oeffnung mit dem Daumen zuhält, läßt dann die Kügelchen sich setzen, gießt das Wasser ab und schüttelt das Quecksilber auf das Fett; zwanzig Minuten sind zu seiner Bertheilung hinreichend. *Bompois* bediente sich, nach *Géé*, eines ähnlichen Verfahrens, welches darin besteht, daß er acht Unzen Quecksilber und sechs Unzen zerlassenen Schmeer mit zwei Unzen Baumöl in eine Flasche von einem Litre Gehalt einträgt, letztere dann verpöfpt und so lange schüttelt, bis das Gemisch die Consistenz eines Zuckersyrups angenommen; hierauf das Ganze in einen Mörtel gießt und es eine halbe Stunde lang stark zusammenreibt.

5) Verfahren *Dumésnil's*. Man thut vier Unzen Fett, ein Pfund Quecksilber und eine Unze süßes Mandelöl in einen Mörtel und schüttelt ihn eine Viertelstunde lang gelinde um, welches zur gänzlichen Bertheilung des Metalls hinreichend ist.

6) Verfahren *Planche's*. Man reibt das Quecksilber mit Eierd zusammen und setzt dann das Fett, wie gewöhnlich, hinzu.

7) Verfahren *Hernandez's*. Man erwärmt den Mörtel, um das Fett zu zerlassen, setzt dann das Quecksilber hinzu und reibt es zusammen, bis zum völligen Erkalten. Das *Hessische Dispensatorium* giebt schon ein ähnliches Verfahren an; man läßt nämlich das Fett am Feuer schmelzen und setzt es dann zurück, hierauf thut man, wenn es kalt zu werden anfängt, das Quecksilber hinzu, und reibt es zusammen.

Unter medicinischem Gesichtspuncte betrachtet, macht es wenig Unterschied, welches Verfahren der Apotheker befolgt. Nur muß er bedenken, daß durch Zusatz von alter Salbe, von *Terpentin* und von organirter Salbe die Salbe einen unangenehmen Geruch bekommt, und daß diejenige, zu welcher *Terpentin* genommen wird, einen schmutzigen Ueberzug auf der Haut zurückläßt.

Uebrigens bringt die Salbe, wenn sie, wie es so häufig zu geschehen pflegt, ranzig ist, gern rothlaustartige Entzündungen auf der Haut hervor, die freilich den allgemeinen Wirkungen, welche man von ihr erwartet, nicht hinderlich sind, da man die Bemerkung gemacht hat, daß sie, je älter, desto wirksamer ist, welche aber doch bisweilen Unbequemlichkeiten und Beschwerden veranlassen.

Außerdem ist die Kenntniß der Verhältnisse des Quecksilbers und seines *Ersciptions* vorzüglich dem Arzte wünschenswerth. Diese Verhältnisse bieten aber eine fast unendliche

Manichfaltigkeit dar. Mehrere *Pharmacopöden* geben nur eine einzige, andere dagegen führen zwei und selbst drei an. Sehr allgemein, jedoch nicht immer, führen die Salben, welche die geringste Menge Quecksilber enthalten, den Namen *Unguentum griseum*. *Unguentum neapolitanum* wird ohne Unterschied zur Bezeichnung beider gebraucht, obgleich, streng genommen, nur die am wenigsten quecksilberhaltigen so genannt werden sollten.

Da die Untersuchungen der neuern *Pharmacopöden* über die wirksamsten Verfahrungsweisen, das Quecksilber zu verbinden und innig mit dem Fett zu mischen, alles das unnütz machen, was früher in dieser Hinsicht gethan worden ist, so wollen wir das in den verschiedenen *Pharmacopöden* angezeigte Verfahren übergehen und uns nur darauf beschränken, die Zusammensetzung der in denselben erwähnten Quecksilbersalben kennen zu lehren. Aus diesem Gesichtspuncte kann man, nach dem Verhältniß des Quecksilbers zu den fetten, ihm als *Ersciptions* dienenden Körpern, zehn Abtheilungen aufstellen. Es kömmt nämlich das Quecksilber vor:

1) Im Verhältniß von 1 zu 1:

An. Ba. Bel. Du. Gal. Galm. Gen. Has. Be. Br. Ca. Ra. Sp. Mercurii et Axungiae Porci preparatae et lotae, singulorum unciam unam.

Fenn. Suec. Mercurii uncias duas, Axungiae Porci et Sevi Hirci, singulorum unciam unam.

Lon. Mercurii libras duas, Axungiae uncias viginti tres et Sevi vervecini unciam unam; — Fer. Fi. Mercurii libram unam, Axungiae uncias novem et Sevi uncias tres; — T. Mercurii uncias quadraginta, Axungiae triginta et Sevi decem.

Sw. Mercurii uncias quatuor, Axungiae tres cum dimidia et Unguenti mercurialis semunciam.

Sy. Mercurii uncias duas, Sevi vervecini semunciam et Butyri Cacao sesquunciam.

Die letztere Salbe ist etwas stärker, als die vorhergehenden, wie auch die von *Vin.* vorgeschriebene:

Mercurii partes sedecim, Unguenti mercurialis partem unam.

Die folgenden sind dagegen etwas schwächer. Sar. Mercurii partem unam, Terebinthinae quantitatem non determinatam sed quae ad metalli extinctionem sufficiat, Axungiae partem unam.

Am. C. Mercurii partes tres, Sevi partem unam et Axungiae partes tres.

GalH. et Ca. Mercurii unciam unam, Olei Ovorum recentis guttas viginti, Butyri Cacao in Olei Amygdalarum

dulcium pauxillo liquefacti unciam unam.

Dieses Verfahren, welches Planché angiebt, liefert eine sehr wohlriechende Salbe, welche, obgleich von größerer Consistenz als die gewöhnliche, sich doch leicht auf der Haut ausbreitet. Man bringt das Quecksilber und das Eieröl in einen kleinen, sehr weiten marmornen Mörser und reibt es eine Viertelstunde lang zusammen, andererseits erwärmt man einen Porcellanmörser und dessen Reule und thut die Scaoaoutter hinein; sobald sie flüssig ist, setzt man das durch das Eieröl zertheilte Quecksilber hinzu, indem man den Mörser insofern warm erhält, daß die Butter in einem gewissen Grad flüssig bleibt; man läßt dann den Mörser allmählig erkalten, indem man das Reiben noch eine Viertelstunde lang fortsetzt.

2) Im Verhältniß von 1 zu 2.

Du. His. Lon. Lon. N. R. Sax. Sw. Mercurii partem unam et duas Axungiae. (Mercurii libras duas, Adipis uncias viginti tres, Sevi unam Lon. Lon. N.)

Bor. Han. Pol. Mercurii libram unam, Sevi vervecini uncias octo, Axungiae Porci sedecim et Olei Citri drachmam unam; — Bor4. et HassP. Oleum Citri omittunt: ut mercurius citrus aboleatur, eum una cum sevo et portunculula ejusdem unguenti, prius praeparati et nondum corrupti terere licet (HassP.) — Ed. Mercurii partem unam, Sevi vervecini et Axungiae, singulorum unam; praelerea Unguenta duo alia indicat: unum cum duplo alterum cum triplo Mercurii; — BorC. O. Mercurii partes duodecim, Sevi vervecini octo et sedecim Axungiae; — Ful. Mercurii semunciam, Sevi vervecini drachmam unam et Axungiae uncias duas; — Ba. Mercurii partes tres, Sevi vervecini duas et quatuor Axungiae; — Am. Mercurii sem libram, Sevi tantidem et Axungiae sesquilibram.

Br. Wir Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae sesquiunciam, Axungiae Porci uncias decem et Olei essentialis Lavandulae drachmam unam.

3) Im Verhältniß von 2 zu 5.

Sax. Mercurii partes quatuor, Terebinthinae quantum satis ad extinguendum et Axungiae Porci partes decem.

4) Im Verhältniß von 1 zu 3:

Am. Ed. C Mercurii e protochlorureto calcis ope praecipitati partem unam et tres Axungiae; — Pid. Mercurii uncias duas, Terebinthinae drachmas quinque, Axungiae uncias quinque et Olei Olivarum semidrachmam; —

Wir. Mercurii unciam unam, Terebinthinae semunciam et Axungiae uncias tres; — RC. Mercurii unciam unam, Terebinthinae semunciam, Unguenti simplicis vel Adipis suillae drachmas quatuordecim.

5) Im Verhältniß von 1 zu 4:

D. Lus. Mercurii, Sevi, singulorum unciam unam et tres Axungiae; — A. Mercurii uncias tres, Terebinthinae semunciam et Cerati citrini libram unam; — B. Bel. Mercurii partes duas, Unguenti oxygenati unam, Axungiae sex et unam Olei.

6) Im Verhältniß von 2 zu 9:

Han. HassP. Li. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae duas et Axungiae sedecim. (Unguentum mitius. HassP.)

7. Im Verhältniß von 1 zu 6:

Gen. Ra. Mercurii unciam unam et sex Axungiae; — Vm. Mercurii partes duas, unam Terebinthinae et Axungiae duodecim; — Fi. Mercurii uncias duas, Axungiae libram unam. (Unguentum mitius.)

Lon. LonN. Unguentum mitius; Unguenti mercurialis communis partem unam et duas Axungiae.

8) Im Verhältniß von 1 zu 8:

Gal. GalM. Unguenti mercurialis unciam unam et tres Axungiae; — T. Unguenti mercurialis uncias decem, Sevi tantidem et Axungiae viginti.

9) Im Verhältniß von 1 zu 10:

An. Unguenti mercurialis uncias tres et Axungiae libram unam.

10) Im Verhältniß von 1 zu 16:

Ed. Unguenti mercurialis partem unam et tres Axungiae.

Nimmt man zu diesen zahlreichen, heutzutage sich findenden Verschiedenheiten noch die bereits in Vergessenheit gekommenen hinzu, so ist leicht einzusehen, mit welcher Vorsicht man bei Besung älterer sowohl als neuerer Abhandlungen über syphilitische Krankheiten zu Werke gehen müsse, wenn man rück sichtlich des Mercur als Heilmittel derselben, richtige Schlüsse daraus ziehen will. Wendet man heutzutage eine Salbe, aus gleichen Theilen Quecksilber und Fett bereitet, an, so reibt man gewöhnlich jedesmal eine halbe bis eine Drachme ein wenn dies täglich, und eine bis zwei Drachmen, wenn es bloß einen Tag um den andern geschieht. Selten reibt man mehr ein, und es ist auch gefährlich, dies zu thun.

Ceratum mercuriale. (Ra.)

R. Unguenti mercurialis uncias quatuor.

Cerati simplicis . unciis decem.
 Misce triturando.
 Besonders zum Verbinden syphilitischer
 Geschwüre empfohlen.

Unguentum s. Pomatum mercuriale oxy-
genatum. (Vm.)
 R. Unguenti mercurialis

partem unam.
 — oxygenati . . . partes duas.
 Ung. oxygenato liquefacto leni calore
 momento quo ut concreseat in eo est,
 ung. merc. admisce.

Unguentum digestivum mercuriale. (Ra.)
 R. Unguenti mercurialis,
 — digestivi simplicis,
 . . . singulorum unciis quatuor.
 Terendo misce. — Zum Verbinden
 venerischer atonischer Geschwüre empfohlen.

Balsamum mercuriale Plenki, (Sp.)
 R. Mercurii . . . drachmas duas.
 Terebinthinae drachmam unam.
 Tritura ad disparitionem globulorum
 usque et adde

Axungiae Porci . . . drachmas sex.
 Balsami Arcaei drachmas novem.
 Mercurii dulcis grana viginti tria.
 Von Plenk zum Verbinden venerischer
 Geschwüre gerühmt.

Unguentum antiarthriticum. (Sw*)
 R. Unguenti mercurialis

drachmam unam.
 — Althaeae . . . drachmas tres.
 Misce. — Man reibt mit einer Drach-
 me von dieser Salbe Abends die von Sacht
 befallenen Theile ein; auch soll sie bei
 chronischer Leberentzündung in Einreibungen
 auf die Lebergegend, unter Zusatz von
 einer halben Drachme Kampfer, von Nutzen
 seyn.

Unguentum s. Pomatum mercuriale San-
chezii. (Sm.)

R. Mercurii . . . unciis quatuor.
 Mellis Narbonensis
 drachmas quatuor.
 Post extinctionem metalli adde
 Camphorae pulveratae
 drachmas quatuor.

Butyri Cacao . . . unciis octo.
 Tritura per horas septuaginta. —
 In Einreibungen. — Gabe, von zwei
 Drachmen bis zu einer Unze.

E. Unguentum mercuriale campho-
 ratum ex Unguenti simplicis unciis una
 et Camphorae drachma una indicat.

Pilulae Unguenti mercurialis. (GalH. Ra.)
 R. Unguenti mercurialis

unciis unam.
 Amyli vel Pulveris Rad. cis Althaeae
 sufficientem quantitatem
 ut fiat pasta homogenea. (GalH.)

Ra. parare jubet cum Unguenti
 drachmis duabus et Pulveris Liquiriti-
 aiae sufficiente quantitate massam in
 centum quadraginta quatuor pilulas
 dividendam.

Pilulae de Sédillot. (Bo. Ca. Pie. Ra.)

R. Unguenti mercurialis unciis tres.
 Saponis medicinalis unciis duas.
 Amyli vel Pulveris Liquiritiae
 unciam unam.
 Fiant pilulae quatuor ad sex gra-
 norum.

Lagneau hat diese Formel folgender-
 maßen verändert:

R. Unguenti mercurialis cum Butyro
 Cacao parati . . . semunciam.
 Sacchari pulverati drachmas duas.
 Mucilaginis Gummi Arabici

quantum sufficit
 ut fiat massa in centum quadraginta
 quatuor pilulas dividenda; addi possunt
 Saponis drachmae duae vel tres.

Ein unannehmliches Präparat, welches
 auch, besonders wegen des darin unbestimmt
 vertheilten Quecksilbers, zu verwerfen ist;
 die Pastillen Lagneau's über die Plenk-
 schen Pillen sind, hinsichtlich ihrer Annehm-
 lichkeit und der genauern Bestimmung des
 darin enthaltenen Quecksilbers weit vorzu-
 ziehen; man konnte den letztern nöthigen-
 falls durch Zusatz von Seife eine purgirende
 Wirkung mittheilen.

Unguentum pedicularum s. Sabadillae
cum Mercurio s. de Staphysagria s. de
Staphysagria compositum. (Br. Han. O.
Pal. Sar. Wir. Ki. Sp.)

R. Mercurii . . . sesquiunciam.
 Axungiae Porci . . . sesquilibram.
 Post extinctioem metalli mixturae
 adde

Staphysagriae pulveratae
 unciis quatuor.

Misce bene. (Sar.)

R. Mercurii . . . unciis duas.
 Terebinthinae . . . unciam unam.
 Tritura ad extinctionem metalli us-
 que et adde

Axungiae Porci . . . libras tres.
 Olei Lauri . . . semilibram.
 Pulveris Sabadillae unciis duas.
 — Radicis Hellebori nigri
 unciam unam.

Misce intime. (O.)

R. Unguenti mercurialis
 unciis octodecim.

Pulveris Sabadillae,
 — Staphysagriae,
 . . . singulorum unciis duas.
 — Hellebori albi unciam unam.
 Olei Lauri . . . unciis novem.
 — Lavandulae unciam unam.

Misce. (Sp.)
 ℞. Saponis Veneti . . . uncias tres.
 Solve in Aquâ et solutionem coque cum

Axungiae Porci . . . libris tribus
 ad humidâ consumptionem usque; adde deinde

Olei Lauri uncias sex.
 Pulveris Seminum Staphysagriae
 uncias duas.
 — Radicis Hellebori albi
 unciam unam.

Mercurii cum Terebinthinae uncia una ad extinctionem triti unciam unam.

Misce sedulo. (Br. Han. Pal. Wir.)

℞. Seminum Staphysagriae, Saponis Veneti, singulorum uncias duas, Mercurii puri sesquiunciam, Terebinthinae quantum sufficit, Axungiae Porci uncias tres.

Emplastrum vel Unguentum Juchii. (Vm.)

℞. Mercurii partes tres.
 Terebinthinae partem unam.
 Tritura ad extinctionem et adde sensim

Sevi vervecini partem unam,
 et tunc mixturam ex
 Terebinthinae parte una.
 Cetacei parte una cum dimidia,
 Cerae flavae partibus quinque,
 liquatis et semiconcretis.

Emplastrum Hydrargyri s. ex Hydrargyro s. hydrargyricum s. mercuriale s. mercuriale resolvens.

1) Ohne Blei. (Ba. Ful. Li. Lus. Sax.)

℞. Mercurii partes tres.
 Terebinthinae partem unam.
 Tere ad extinctionem metalli, tunc ad perfectam refrigerationem usque tritura cum mixtura liquefacta et semi-refrigerata ex

Sevi vervecini
 partibus duabus cum dimidia.

Cerae flavae
 partibus quinque cum dimidia.

Serva. (Ba.)

℞. Mercurii cum parte tertia Terebinthinae extincti partes sex.
 Tritura cum mixtura liquata nec adhuc refrigerata e

Cerae flavae partibus decem.
 Cetacei partibus tribus.
 Sevi vervecini partibus duabus.

Misce. (Sax.)

℞. Emplastri Cerae libram unam.
 Mercurii in Terebinthinae uncia una extincti uncias tres.

Misce triturando. (Li.)

Ful. et Lus. Mercurii partem unam cum Terebinthina extinctam et Emplastri Cicutae vel alius partes sedecim.

2) Mit Blei. (Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Ed. Fenn. Fer. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Pal. R. Suec. Wir. Wür. B. C. Pid. Sp. Sw. Vm.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.
 Liquato lente adde
 Unguenti mercurialis uncias tres.
 Misce exacte. (Fer.)

℞. Mercurii uncias tres.
 Olei sulphurati drachnam unam.
 Tritura ad extinctionem et adde sensim

Emplastri Diachyli simplicis liquati libram unam.

Misce bene. (Lon. LonN. B. C.)

℞. Mercurii partes tres.
 Resinae Pini,
 Olei Olivarum,
 singulorum partem unam.

Liquatis resinae et oleo et mixtis antequam refrixerint, adde mercurium et ad extinctionem metalli usque tritura; adde sensim

Emplastri Diachyli simplicis fusi partes sex

et continuè agitando misce. (Am. B. Ed. C.)

℞. Mercurii uncias quatuor.
 Terebinthinae Venetae semunciam.
 Tritura ad extinctionem et adde sensim

Emplastri diachyli simplicis fusi uncias duodecim.

Misce triturando. (DD.)

Hass. et Pid. Mercurii, Terebinthinae, singulorum uncias tres et Emplastri libram unam; — R. Mercurii uncias tres, Terebinthinae sesquiunciam et Emplastri libram unam; — Sw.

Mercurii uncias octo, Terebinthinae drachmas tres et unam libram Emplastri; — D. et Wür. Mercurii cum Terebinthina ad disparitionem triti sesquiunciam et Emplastri libram unam.

℞. Mercurii uncias tres.
 Axungiae Porci sesquiunciam.
 Sevi vervecini semunciam.

Tritura ad disparitionem globulorum metalli usque et adde sensim mixturam liquefactam ex

Emplastri diachyli simplicis libram unam.

Cerae flavae uncias tribus.
 Misce bene. (Ams.)

℞. Mercurii uncias quatuor.
 Unguenti mercurialis,
 Terebinthinae Venetae,
 singulorum unciam unam.

Tritura ad extinctionem metalli usque, tunc adde mixturam liquatam ex
 Emplastri diachyli gummosi libram unam.

Cerae flavae . . . uncia una.
Misce in mortario leviter calefacto.
(An. Bel.)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Terebinthinae communis
drachmas tres.

Post extinctionem metalli adde
Emplastri diachyli simplicis
uncias duas,

Cerae flavae . . . semunciam
simul liquata. (Fenn. Suec.)

Bor. Bor4. Han. O. Pol. Mercurii
uncias octo, Terebinthinae uncias qua-
tuor, Emplastri libras duas et Cerae
semilibram; — HassP. singulorum cu-
jusque partem dimidiam indicat.

℞. Mercurii . . . partes duodecim.
Terebinthinae Venetae partes tres.

Post extinctionem metalli tritura cum
Styracis liquidae partibus duabus.
Tunc adde

Olei Lauri
partem unam cum dimidia.

Mortario in aquam fervidam collo-
cato, adde sensim

Emplastri diachyli simplicis
partes quadraginta octo.

Cerae flavae . . . partes tres
liquata et bene mixta. (Vm.)

Sw*. Mercurii uncias viginti, Tere-
binthinae quinque, Styracis tres, Olei
Lauri duas cum dimidia, Emplastri
septuaginta et Cerae unam cum dimi-
dia.

℞. Mercurii . . . libram unam.
Terebinthinae . . . uncias quatuor.

Tritura ad extinctionem et adde
Emplastri fusi de Vigo

libras sex et uncias octo.

Misce bene. (His.)

Wir. Emplastro de Vigo simplici ad-
dere jubet Mercurii in Terebinthina
extincti sesquunciam; — Sp. unciam
unam; — Pal. uncias quatuor.

℞. Mercurii . . . uncias tres.
Terebinthinae . . . sesquunciam.

Metallo extincto adde
Emplastri diabolani fusi

libram unam.

Misce bene. (His.)

Reizend, aufstossend und schmelzend. Man
wendet es auf schmerzlose Geschwülste von
Anschwellung der Lymphdrüsen an. Die
zahlreichen Verschiedenheiten hinsichtlich des
Mengenverhältnisses des darin enthaltenen
Quecksilbers sind weniger wichtig als die-
jenigen in Betreff der Salbenform; können
aber demungeachtet auf seine Wirkungs-
weise nicht ganz ohne Einfluß seyn. Die
vorliegende Formel giebt das berühmte *Em-
plastrum de Vigo cum Mercurio*, welches
sich von den andern nur durch seine große
Complication und bestreuen durch die weit

geringere Wirksamkeit unterscheidet, indem
das Quecksilber in demselben durch eine
abentheuerliche Zusammenhäufung ganz ver-
schiedenartiger Ingredienzen gleichsam er-
stickt ist.

Cereoli mercuriales. (Vm.)

℞. Emplastri mercurialis fusi
partes tres.

Cerae flavae liquatae
partem unam.

Misce bene, ut fiant cereoli.

*Emplastrum Ammoniaci s. de Ammo-
niaco cum Mercurio s. mercuriale gum-
mosum s. ammoniaco-mercuriale.*

1) Ohne Blei. (Du. Lon. LonN. Br.
C. Ca. Sp. Vm.)

℞. Mercurii . . . uncias tres.
Terebinthinae

Post disparitionem globulorum adde
Gummi Ammoniaci liquati

libram unam.

Misce bene. (Du.)

℞. Mercurii . . . uncias tres.
Balsami Sulphuris Rulandi (Olei
sulphurat) drachmam unam.

Trituratis ad disparitionem globulo-
rum usque adde

Gummi Ammoniaci liquati
libram unam.

Misce. (Lon. LonN. Br. C. Ca.)

Vm. Mercurii partes novem, Balsami
unam et Gummi triginta sex.

℞. Mercurii . . . uncias tres.
Balsami Sulphuris Rulandi

drachmam unam.

Post extinctionem metalli adde
Gummi Ammoniaci liquati

uncias duodecim.

Terebinthinae . . . uncias tres.

Misce. (Sp.)

2) Mit Blei. (Er. Gal. GalM. Sar.
Wir.)

℞. Mercurii . . . uncias octo.
Terebinthinae Venetae

unciam unam

Styracis liquidae . . . semunciam.

Trituratis ad globulorum usque dis-
paritionem adde

Emplastri diachyli simplicis
libram unam

antea liquati et cum
Gummi Ammoniaci pulverati

semilibra

mixti. Misce bene. (Br. Sar. Wir.)

℞. Mercurii
partes trecentas octoginta,
Terebinthinae purae

partes sexaginta quatuor.

Styracis liquidae
partes centum nonaginta duas,

Trituratis in mortario ferreo ad extinctionem metalli

℞. Emplastri diachyli simplicis partes ducentas quinquaginta.

Cerae flavæ, . . .
Resinae Pini, singularum partes octoginta quatuor.

Liqua et mixturae semirefrigeratae adde mixturam ex

Pulveris Gummi Ammoniaci,

— Bdellii,
— Olibani,
— Myrrhae,

singulorum partes viginti

et deinde

Pulveris Croci partes duodecim et supremò mercurium extinctum; misce intime, addendo antequam penitus refrixerit

Olei essentialis Lavandulae partes octo.

Serva. (Gal.)

℞. Mercurii partes nonaginta quinque. Styracis liquidæ

partes quadraginta octo.

Tritura ad extinctionem usque. Sorsim et simul liqua

Emplastri diachyli simplicis partes trecentas duodecim.

Cerae flavæ . . . partes sedecim. Mixturae adde

Terebinthinae purae,
Resinae purae,
singularum partes sedecim.

Gummi Ammoniaci,
Olibani,
Myrrhae,
singulorum partes quinque.

Admisce deinde

Pulveris Croci . . . partes tres et massam mercurialem jam antea præparatam. (GalM.)

Non diesem Pflaster gilt das schon bei'm Mercurialpflaster Bemerkte.

Ceratum de ranis cum Mercurio reformatum s. mercuriale. (Fi. T.)

℞. Cerati diachyli simplicis libram unam.

Mercurii . drachmas duodecim.
Terebinthinae quantum sufficit.
Fiat secundum artem ceratum.

T. Cerati libram unam et Unguenti mercurialis uncias tres, omnia terebinthina.

Emplastrum ad bubones venereos.

℞. Mercurii . . . drachmas duas. Florum Sulphuris . uncias duas.

Tritis ad disparitionem globulorum usque adde

Plumbi acetici crystallisati drachmas tres.

Mixta exacte subige cum mixtura liquata et semirefrigerata ex

Emplastri Ammoniaci,

— Mel loti,
— Cumini,
— Galbani,
— Sagapeni,

singulorum semuncia.

Emplastrum resolvens e quatuor fundantibus s. ex mixtis quatuor, quae dicuntur resolventia. (Gal. B. Ca.)

℞. Emplastri mercurialis,

— Diachyli gummosi,
— Cicutæ,
— Saponis,

singulorum partes aequales.

Liquata int me misce. (Gal. Ca.)

℞. hoc emplastrum: *Emplastrum resolvens compositum appellans, emplastrum saponis omittit.*

Reizend, schmelzend, reifmachend.

Emplastrum Hydrargyri cum Conio s. resolvens cum Mercurio. (DD.)

℞. Emplastri Hydrargyri,

— Conii,
singulorum semunciam.

Malaxentur.

Emplastrum Hydrargyri s. Mercurii cum Conio et Opio. (DD.)

℞. Emplastri mercurialis cum Conio neciam unam.

Opii pulveratu . smidrachmam. Misce intime.

Axungia antipsorica. (Vm.)

℞. Peroxydi Plumbi partes undecim cum dimidia.

Mercurii . partes novemdecim.

Tritura, guttas aliquot Aquae addendo; post extinctionem cum massa siccata intime commisce

Axungiae Porci partes triginta octo.

Unguentum mundificans Stahlii. (Wir. Sp.)

℞. Mercurii, Plumbi, singularum unciam unam.

Plumbo liquato adde mercurium et mixta tritura cum

Tripelae . . . uncia una.

Pulverem deinde bene misce cum Unguenti albi camphorati

unciis octo.

Bei pforischen Hautkrankheiten empfohlen, besonders trocknen und prurigindfen.

Emplastrum resolvens. (Sm.)

℞. Emplastri de Vigo cum Mercurio unciam unam.

— Cicutæ cum Gummi Ammoniaci . drachmas quatuor.

Mercurii . . . grana triginta.

Minii drachmas duas.
 Styracis liquidae
 quantitatem sufficientem.
 Fiat emplastrum.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Quecksilbers mehr oder weniger durch andere Substanzen modificirt ist.

A. Durch Ammoniak.

Linimentum mercuriale ammoniacale, Sapo mercurialis volatilis. (Ra. Vm.)

℞. Unguenti mercurialis partem unam.
 Ammoniaci liquidi concentrati partes duas.

Tere in mortario et in vase bene obturato serva. (Vm.)

℞. Unguenti mercurialis (e partibus aequalibus),
 Ammonii liquidi,
 singulorum drachmam unam.
 Olei Olivarum unciam unam

Cohere. (Ra.)

Reizend, in Einreibungen zur Auflösung venerischer Leistenbeulen empfohlen.

Linimentum Hydrargyri s. mercuriale ammoniacale camphoratum. (Lon. LonN. C.)

℞. Unguenti mercurialis (e partibus aequalibus),
 Axungiae praeparatae,
 singulorum uncias quatuor.
 Camphorae unciam unam.
 Alcoholis (0,395) parvam quantitatem (minima quindecim).

Ammoniaci liquidi uncias quatuor.
 Trituratae camphorae cum alcohole, cum axungia et cum unguento sensim adde ammonium.

B. Durch Arsenik.

Aethiops auripigmentalis. (Br.)

℞. Mercurii partem unam.
 Auripigmenti partes duas.
 Tritura ad perfectam metalli extinctionem usque.

C. Durch Kampfer.

Unguentum mercuriale camphoratum s. ad blennorrhagiam cordatam. (B. Br. Sy.)

℞. Mercurii,
 Axungiae Porci,
 singulorum partem unam.

Tritura ad disparitionem globulorum et pro uncias duabus mixturae adde Camphorae semunciam. (Br.)

sy. pro uncia una Unguenti cinerei Camphorae semunciam; — B. Unguen-

ti duplicis et Camphorae, singulorum partes aequales.

Bei Tripper mit chorda in Einreibungen längs der Harnröhre.

Unguentum resolvens, Pomatum mercuriale saponaceum. (Sy.)

℞. Unguenti cinerei unciam unam.
 Saponis nigri drachmas duas.
 Camphorae drachmam unam.
 Tritura simul. — Bei Knodenhautentzündungen und Anschwellungen des Kehlkopfes.

D. Durch Eisen.

Aethiops graphiticus, Graphites hydrargyratus. (B. Sa. Vm.)*

℞. Mercurii partem unam.
 Graphitae pulveratae partes duas.
 Tritura ad perfectam globulorum disparitionem usque.
 Wurde gegen Flechten gepriesen. — Gebrauche, siehe Gran.

Electuarium resolvens antiherpeticum. (B.)

℞. Aethiops graphitici drachmas duas.
 Rhei semidrachmam.
 Extracti Cichorii semunciam.
 Mellis despumati
 sufficientem quantitatem.

Misce.

E. Durch Opium.

Linimentum mercuriale opiaceum s. antivenereum. (Sn.)

℞. Unguenti mercurialis (e partibus aequalibus) scrupulos quatuor.
 Olei Amygdalarum dulcium uncias duas.

Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam.

Misce bene. — Bei sehr entzündlichen Eichelgeschwüren, in Bädern oder Einspritzungen, je nach dem Zustande der Wundhaut, zwei oder drei Mal täglich.

Unguentum s. Pomatum mercuriale opiaceum. (v. Ra.)

℞. Unguenti mercurialis grana decem.
 Opii granum unum.
 Misce. (B.)

℞. Pomati mercurialis,
 Cerati opiacei,
 singulorum partes aequales.

Misce bene. (Ra.)

Chaussier verordnete oft zwei oder drei Einreibungen täglich auf den Unterleib aus einer Drachme der letztern Salbe gegen das Ende der Bauchfellentzündung als ein die Entzündung beendigendes Mittel.

Unguentum mercuriale opiatum. (Ra.)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequales) uncias quatuor.

Opii crudi pulverati uncias duas.
Zum Verbinden bestigschmerzender venerischer Geschwüre.

℞. Durch purgirende Substanzen.

Saccharum mercuriale compositum. (Br.)

℞. Mercurii semunciam.

Sacchari albi uncias duas.

Post perfectam metalli disparitionem adde

Pulveris Radicis Jalappae semunciam.

Misce bene.

Pilulae purgativae. (E.)

℞. Massae Pilularum caerulearum scrupulum unum.

Pulveris Aloës grana viginti quinque.

Fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Pilulae bellostii.

℞. Mercurii partes nonaginta sex.

Mellis albi partes ducentas quinquaginta.

Tritura donec globuli disparuerint et adde

Pulveris Agarici albi,

— Aloës Socotrinae,

— Scammonei partes sexaginta quatuor.

— Piperis albi partes duodecim.

Misce fiant pilulae in pulvere e Mechocanna et Jalappae Alcoholis ope extractarum partibus aequalis circumvolvendae. (GalF. GalH.)

Dies ist die eigentliche Formel dieser Pillen, welche zu gleicher Zeit als antisyphilitisches und als Purgirmittel berühmt sind. Sie sind auf sehr vielfach verschiedene Weise verändert worden, und daher hat man eine Menge *Pilulae mercuriales, neapolitanae, antivenerae*, welche sich nur durch die Wahl und die Gabe der dazu genommenen Purgirmittel von einander unterscheiden.

℞. Mercurii partes quatuor.

Mellis partes quadraginta.

Tritura ad extinctionem usque et adde

Aloës Socotrinae,

Macidis,

Cinnamomi, singulorum partem unam.

Fiant pilulae trium granorum. (GalM.)

Diese Formel hat Ähnlichkeit mit der Bellostischen. Die folgende ist eine Abänderung der berühmtesten Pillen von Bar-

barossa durch Lemery, nach welchen, wie bekannt, die Bellostischen gemobelt sind.

℞. Mercurii drachmas sex.

Terebinthinae quantum sufficit ad extingendum metallum; adde

Pulveris Aloës drachmas sex.

— Agar ci albi semunciam.

— Rhei drachmam unam.

Fiat massa pilularis. (Sp.)

℞. Mercurii,

Terebinthinae Venetae,

singulorum unciam unam.

Tritura ad globulorum disparitionem et adde

Scammonei,

Rhei,

Jalappae pulveratae,

Mellis depurati

sufficientem quantitatem ut fiat massa pilularis. (Fer.)

℞. T. Mercurii uncias duas, caeterum ut Fer.

℞. Mercurii,

Scammonei,

singulorum unciam unam.

Cremoris Tartari,

Resinae Jalappae,

Rhei,

Syrupi Sacchari

sufficientem quantitatem. Mercurio cum tartaro et syrui paulillo extincto adde reliqua, ut fiant pilulae granorum quatuor. (Gen.)

Den Bellostischen ähnlich sind auch die *Pilulae mercuriales purgativae*:

℞. Mercurii partes quatuor.

Mellis quantitatem sufficientem ad metalli extinctionem; adde

Pulveris Cinnamomi,

— Macidis,

— Aloës,

— Scammonei,

singulorum partes octo.

Mellis quantum sufficit ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (Gal. Vm.)

Ihnen nahe verwandt sind auch die *Pilulae neapolitanae*.

℞. Mercurii drachmas sex.

Mellis Narbonnensis

quantum sufficit ad extinctionem metalli; adde

Pulveris Aloës Socotrinae

drachmas quatuor.

— Rhei drachmas tres.

— Scammonei drachmas duas.

— Agarici albi

drachmam unam.

— Sassafra,

— Cinnamomi,

Pulveris Macidis,
singulorum scrupulum unum.
Misce bene. (Ca. Pie.)
Baumé hat die Bellosteische Formel
auf folgende Weise verbessert:
℞. Mercurii,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Trituratis cum Mellis pauxillo ad di-
spartitionem metalli adde
Pulveris Scammonaei,
— Jalappae,
singulorum unciam unam.
Mellis despumati quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (An. Sp.)
Ra. Mercurii uncias tres, Cremoris
Tartari grana decem, Scammonaei, Ja-
lappae, singulorum drachmas tres et
Syrupi sufficientem quantitatem; —
Vm. Mercurii partes quatuor, Cre-
moris Tartari duas, Syrupi Sacchari quan-
tum sufficit ad extinctionem metalli,
Gummi Arabici partem unam, Jalap-
pae, Scammonaei, singulorum quatuor
et Syrupi satis ut fiat massa pilularis.
℞. Mercurii,
Scammonaei,
singulorum unciam unam.
Sacchari . . . drachmas duas.
Tritura ad disparitionem metalli us-
que, humectando cum Vini albi pauxil-
lo et adde
Pulveris Jalappae unciam unam.
Misce bene. (Ca.)
℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Terebinthinae Venetae
quantum sufficit
ad extinctionem metalli; adde
Pulveris Scammonaei,
— Jalappae,
— Gummi Guttae,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Sa.)
℞. Mercurii . . . uncias duas.
Mannae in lacrymis unciam unam.
Pulveris Jalappae uncias quatuor.
Terebinthinae,
Florum Sulphuris,
Gummi Guttae pulverati
singulorum drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici
quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas granorum qua-
tuor dividenda. (Ca.)
℞. Mercurii . . . semunciam.
Mucoilaginis Gummi Arabici
unciam unam.
Tritura ad perfectam globulorum
disparitionem et adde
Extracti Ligni Guajaci,
Pulveris Aloës Socotrinae,

Pulveris Jalappae,
singulorum semunciam.
Syrupi Rhei
quantitatem sufficientem
ut fiat massa homogenea. (Sar.)
℞. Mercurii . . . unciam unam.
Sacchari albi . . . semunciam.
Tritura ad perfectam metalli extin-
ctionem, Oxymellis quantitatem suffi-
cientem adspargendo et adde tunc pe-
detentim
Pulveris Scammonaei,
— Jalappae,
singulorum unciam unam.
Oxymellis . . . quantum sufficit
et sub finem
Kali nitrici . . . drachmam unam.
Camphorae . . . grana sex.
Fiant pilulae granorum decem. (Pie.)
Begrifflicherweise ist die Gabe nicht bei
allen diesen Pillen dieselbe. Sie ist nach
der Wirksamkeit der damit verbundenen
Purgirmittel verschieden. Die der Leme-
ry'schen Pillen ist eine Drachme, die der
Baumé'schen eine halbe Drachme.
Pilulae contra taeniam. (Bo.)
℞. Mercurii . . . sesquiunciam.
Axungiae Porci . . . unciam unam.
Post extinctionem metalli adde
Pulveris Aloës Socotrinae
quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas granorum qua-
tuor dividenda.
Pilulae ad gonorrhoeam. (Bo. Pie.)
℞. Aethiopsis mineralis sesquiunciam.
Pulveris Rhei,
— Myrrhae,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Cichorii compositi
quantitatem sufficientem.
Fiant pilulae granorum sex. — Bar-
beyrac ließ davon Morgens zweimal die
Woche, zwei oder drei Monate lang neh-
men.
Pulvis vermifugus mercurialis. (Gal.
Ham.)
℞. Aethiopsis mineralis,
Pulveris Radicis Jalappae, singulo-
rum drachmam unam.
— — Valerianae sylve-
stris . . . drachmas duas.
Misce. (Ham.)
℞. Aethiopsis mineralis,
Pulveris cornachini,
singulorum partes aequales,
Tritura simul in mortario. (Gal.)
*Pilulae antiscrophulosae s. ad scrophu-
las s. Oxydi Antimonii et Sulphureti
Mercurii.* (Gal.)
℞. Aethiopsis mineralis,

Pulveris Scammonei,
singulorum uncias duas.

Oxydi albi Antimonii,
Asellorum praeparatorum,
Saponis amygdalini,
singulorum drachmas tres.

Extracti Liquiritiae vel Syrupi
Quinque Radicum
quantitatem sufficientem.

Fiant pilulae granorum quatuor.

Tabellae anthelminthicae. (Ful.)

℞. Aethiops antimonialis,
Pulveris Radicis Jalapae,
singulorum drachmas tres.
— Florum Tanacetii
unciam unam.
— Cinnamomi
drachmas duas.

Sacchari albi cum Aquae unciis
quatuor ad requisitam, ut fiant
tabellae, spissitudinem cocti
uncias octo.

Fiant tabellae. — *Gabe, eine bis sechs
Drachmen.*

Opiatum aperiens et purgans. (Bo.)

℞. Aethiops mineralis semunciam.
Electuarii leni tivi unciam unam.
Pulveris Sennae,
— Rhe,
— Jalapae,
— Asellorum,
singulorum drachmas duas.
— Scammonei
drachmam unam.
— Magnesiae sulphuricae
semunciam.

Syrupi Quinque Radicum
quantitatem sufficientem.

Bei Unterleibsverstopfungen und Wasser-
sucht. — *Gabe, Morgens nüchtern eine
Drachme.*

G. Durch China.

Electuarium anthelminthicum Heisteri.
(Br. Ca. Sp.)

℞. Mercurii semunciam.
Gummi Arabici unciam unam.
Aquae quantitatem sufficientem.
Tritura ad perfectam metalli in mu-
cilageine disparitionem et adde tunc
Chinae subtilissime pulveratae
unciam unam.

Syrupi Menthae quantum sufficit
ut mixtura consistentiam electuarii mol-
lis obtineat

Die Gabe ist nach dem Alter verschieden.
Gewöhnlich giebt man Morgens und Abends
ein Rasseeißel.

H. Durch Schwefel.

*Aethiops mineralis, Sulphuretum Hy-
drargyri nigrum s. simplex, Hydrargy-*

*rus sulphuratus niger s. cum Sulphure,
Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Mer-
curius cum Sulphure, Pulvis hypnoti-
cus, Aethiops narcoticus; mineralischer
Möhr.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel.
Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal.
Han. His Lon. LonN. O. Pal. Pol. R.
Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Par.
Sp. T. Vm)

℞. Mercurii,

Florum Sulphuris lotorum,
singulorum partes aequales.

Tritura in mortario marmoreo pistilli
vitrei ope ad perfectam globulorum
usque disparitionem et donec in pulve-
rem nigerrimum sit conversum. (A.
Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Du.
Ed. Fer. Han. Lon. Lus. O. Pol. Sax.
C. Fi. Sw. T.)

An. et Bor4. ut trituratio facilius
reddatur, Aquae pauillum addere ju-
bent; — LonN. Mercurii uncias qua-
draginta, Florum Sulphuris uncias
octo; hydrargyrum cum sulphure ad
ignem liquefacto misce et quam pri-
mum intumescat massa, vas ab igne
remove et fortiter tege ne fiat inflama-
tio; deinde in pulverem tere et sub-
lima. (T. cujusque partes aequales.)

Destouches mixturae inter operatio-
nem Kali hydrosulphuratam, Geiger
Ammonium hydrothionicum adspargere
jubent.

℞. Mercurii partes duas.
Florum Sulphuris lotorum

partem unam.
Fac ut supra dictum. (A. Gal. His.
R. Br*. Sp.)

Br. Pal. et Wir. Mercurii partes tres
et duas Sulphuris; — Sar. Mercurii
duas et Sulphuris unam cum dimidia.

Vm. quatuor hujus nominis praepa-
rata habet, nimirum: 1) *Aethiopem mi-
neralem s. Sulphuretum Mercurii tritu-
ratum*, triturando in mortario marmo-
reo pistilli magni ope per horae qua-
drantem Sulphuris in baculis partem
unam cum dimidia et Mercurii no-
vemdecim; 2) *Aethiopem mineralem
Harrisii*, e Mercurii et Sulphuris sin-
gulorum pro arbitrio, triturando mer-
curium cum sulphuris parte duodeci-
ma ad extinctonem, tunc alteram par-
tem duodecimam et postremo succes-
sive reliquum sulphur addendo; 3) *Ae-
thiopem mineralem oxydulatam s. Sul-
phuretum Mercurii oxydulatum* (Sulfure
de mercure à oxidule) triturando Sul-
phuris in baculis partem unam cum
dimidia, Mercurii no em cum dimidia
et Oxydi Mercurii rubri decem et qua-
drantem; 4) *Aethiopem mineralem tri-
turatum duplum s. Supersulphuretum*

Mercurii, triturando partes novem Mercurii et Sulphuris in baculis unam cum dimidia obtinentur.

In *Giornale di Chimica Fisica etc. di Pavia* Decad. II. T. 6. p. 497 sequens agendi modus indicatur: Mercurii purificati libram unam et Acidi sulphurici distillationis ope purificati libras tres in retorta balnei vaporis calori exponere, massam ad siccum ferè redactam et refrigeratam, retorta fractà, a fragmentis vitri mundatam in mortario porphyreo tritura, Florum Sulphuris uncias undecim admiscendo. Mixturam deinde in amplo catino fictili interne vitreato tracta cum Solutione aquosa Hepatis Sulphuris filtrata, in parvis partiunculis addenda et massam continue agitando, quae vivaciter effervesces colorem albo-cinereum et deinde obscurum accipit; seponere tunc per aliquot momenta et liquidum decantha; massae obscurae, quae subsedit, aliam quantitatem Hydrosulphatis sulphurati alcalini in excessu infunde, continue agitando et caloris mitis ope, donec pulchrum colorem nigrum acceperit. Repone, liquidum decantha et materiam pulverulentam residuam cum Aqua repetite ablue, donec haec saporis expertis evadat. Exstillet aethiops obtentus supra filtrum chartaceum et levi calore siccatus, trituretur. — Loco Sulphatis mercurialis Nitras Deutoxydi Mercurii ad siccum quasi redactus adhiberi potest triturando et bene miscendo cum Florum Sulphuris talibus dosibus ut sit pondus ejus pro mercurio ut 10 ad 12. Adhibetur deinde kali sulphuratum ut antea; — Etiam Sublimatus corrosivus (12 unc. in Aq. calidae suff. quant. et cum Flor. Sulph. unc. 7½ mixt.) eodem modo per kali antea dictum tractatur. (T.)

Der mineralische Moth ist nicht, wie man lange Zeit geglaubt, eine Verbindung von Quecksilber und Schwefel, sondern ein bloßes Gemeng beider. Martius hat ihn bereitet, indem er ein Gemeng von Schwefel und Quecksilber in einer Flasche vierzehn Tage lang dem Mechanismus einer Sägemühle aussetzte.

Reizend, gegen Syphilis und Würmer, aber nie allein angewendet.

Pulvis ad strumam s. antistrumalis. (Sm.)

℞. Aethiopsis mineralis drachmas quatuor.
Oculorum Cancri praeparatorum uncias duas.
Succini pulverati unciam unam.
Misce et in doses sexaginta quatuor

divide. — Man nimmt anfangs täglich ein, dann zwei Stück in einem Glase Zuckerkwasser.

Pulvis contra vermes s. vermifugus. (Sp.)

℞. Aethiopsis mineralis drachmas duas.
Pulveris Helminthochorti semunciam.
Olei essentialis Absinthii semiscrupulum.

Zucker empfahet dieses Pulver bei Kindern; er gab davon Morgens und Abends eine Messerspitze voll, was jedoch zu unbestimmt ist, da ein Kind auf jede Gabe nur zwei bis höchstens vier Gran Mohr erhalten darf.

Rotulae contra vermes. (Fer. Wir. Fi.)

℞. Aethiopsis mineralis,
Seminum Cinae,
Helminthochorti,
Cinnamon, singulorum scrupulos duos.
Sacchari albi in Aqua Rosarum soluti et ad consistentiam tabulati cocti . . . uncias quatuor.
Fiant rotulae. (Wir.)

℞. Chocolatae . . . uncias quindecim.
Aethiopsis mineralis drachmas sex.
Seminum Cinae . . . unciam unam.
Fiant rotulae septuaginta duae. (Fer.)
Fi. Chocolatae uncias tredecim, Aethiopsis et Seminum ut Fer. sed in rotulas centum octoginta dividenda.

Opiatum vermifugum. (Pie.)

℞. Aethiopsis mineralis,
Seminum Hyperici,
— Rutae,
— Absinthii,
— Tanaceti,
singulorum semunciam.

Syrupi Absinthii sufficientem quantitatem.

Chirac gab Morgens und Abends eine halbe Drachme und ließ dann eine Abkochung der Wurzel des männlichen Farnkrauts trinken.

Electuarium alterans. (Sa. Sw.)

℞. Aethiopsis mineralis,
Resinae Guajaci, singulorum semunciam.
Pulpaе Prunorum unciam unam.
Syrupi simplicis quantum sufficit.
Bei Scabies und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

Unguentum mundificans. (Wür.)

℞. Aethiopsis mineralis unciam unam.
Axungiae Porci . . . uncias tres.

Misce triturando.
Unguentum e Sulphure hydrargyrato s. aethiopicum s. Mercurii sulphurati. (Sw*. Vm.)

℞. Florum Sulphuris lotorum partem unam.
 Unguenti mercurialis partes duas.
 Diu contritis adde sensim
 Axungiae Porci partes quindecim.
 Misce bene. (Vm.)
 Sw*. Sulphuris partem unam, Unguenti et Axungiae, singulorum duas.
 In Einreibungen bei Krätze von Nutzen.

Unguentum antipsoricum. (Sw*.)

℞. Aethiopsis mineralis unciam unam.
 Saponis viridis semunciam.
 Misce triturando et adde
 Gerati camphorati sesquiunciam.
 Bei hartnäckiger Krätze empfohlen. —
 Es muß ebenso, wie die beiden vorhergehenden, mit Vorsicht angewendet werden.

Ceratum antipsoricum. (Vm.)

℞. Aethiopsis mineralis partes quatuor.
 Sulphureti Plumbi praeparati partem unam.
 Commisce in mortario et adde
 Gerati prope ignem mollefacti partes sedecim.
 Tritura sedulo.

Pilulae resolventes. (Sm.)

℞. Aethiopsis mineralis scrupulum unum.
 Extracti Taraxaci drachmas tres.
 Gummi Ammoniaci drachmas duas.
 Scillae pulveratae semidrachmam.
 Syrupi cuiuslibet sufficientem quantitatem.
 Fiant pilulae granorum trium.
 Fünf pries diese Pillen bei Wasserfucht von Verstopfung der Unterleibs Eingeweide.
 — Gabe, fünf Stück täglich drei Mal.

Pilulae antiherpeticæ. (Bo.)

℞. Mercurii uncias duas.
 Florum Sulphuris,
 Kali sulphurici,
 singulorum semunciam.
 Camphorae semidrachmam.
 Tritura ad disparitionem globulorum et adde
 Resinae Guajaci unciam unam.
 Balsami Peruviani drachmas duas.
 Syrupi Dianthi quantum sufficit.
 Fiant pilulae quatuor granorum. —
 Von Barthéz als schmelzend und Ausdünnung befördernd, bei Flechten und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, Morgens nüchtern drei Stück auf einmal.

K. Durch Schwefel und Spießglanz.

• *Aethiops antimonialis s. antimonialis*

Huzhami, Sulphuretum Hydrargyri et Stibii s. stibiatum s. Hydrargyri nigrum et Stibii s. Hydrargyri stibiatum, Hydrargyrum stibiato - sulphuratum, Spießglanzmoör. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. R. Sar. Sax. Wir. Wür. Br*. Ca. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Mercurii uncias quatuor.
 Antimonii crudi praeparati uncias tres.

Sulphuris uncias duas.
 Tritura ad perfectam extinctionem metalli usque. (Ams. B. Bel. Fenn. Hass. Ca. Fi. Pid. T.)

Gen. Hass. Li. et Pid. guttas aliquot Aquae addere iubent.

Li. Mercurii Antimonii, singulorum unciam unam, Sulphuris semunciam; — Bor. Bor4. Han. HassP. Pol. Sax. et Sw. Mercurii, Sulphuris, singulorum unciam unam et duas Antimonii (laevigati) Bor4. aqua humectata modico calore terere jubet; — HassP. item et aquam adhibet; — Vm. Mercurii partes novem cum dimidia, Antimonii quinque cum dimidia et Sulphuris unam cum dimidia.

℞. Mercurii,
 Antimonii crudi praeparati,
 singulorum partes aequales.
 Tritura. (A. Ba. R.)

Br. D. O. Sar. Wir. Br*. Sp. et Sw. Antimonii partes duas et unam Mercurii.

℞. Mercurii partes tres cum dimidia.
 Kermets mineralis partem unam.
 Tritura ad extinctionem usque. (Vm.)
 Vm. praeterea Mercurii partes duas et tres Sulphuris Antimonii aurati; — Lus. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Sulphuris aurati; — Fer. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Kermets mineralis.

℞. Aethiopsis mineralis (sec. Giornal. d Chim. praep.) uncias quinque.
 Oxydi Antimonii via humida parati unciam unam.

Contere bene in mortario vitreo vel porcellaneo. (T.)

Der Spießglanzmoör ist ebenfalls nur ein Gemeng, welches metallisches Quecksilber sehr zertheilt enthält. — Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

Pulvis ex Aethiope antimoniali s. ex Hydrargyro stibiato-sulphurato. (BorC. WW. Au.)

℞. Aethiopsis antimonialis grana sex.
 Pulveris Radicis Liquiritiae grana decem.

Misce bene. (WW.)

BorC. et Au. Aethiopsis grana quinque et quindecim Liquiritiae.
Alle vier Stunden.

Pulvis ad herpetem. (Ham.)

℞. Aethiopsis antimonialis,
— mineralis,
singulorum semidrachmam.

Pulveris Resinae Guajaci,
— Radicis Liquiritiae,
— Magnesia,
singulorum drachmam unam.

Misce intime.

Pulvis purificans. (Huf.)

℞. Resinae Guajaci semidrachmam.
Aethiopsis antimonialis,
Magnesia subcarbonicae,
singulorum semisrupulum.
Elaeosacchari Foeniculi
semidrachmam.

Gabe, für einen Erwachsenen in vier und zwanzig Stunden; Kindern von sieben Jahren die Hälfte, von vier Jahren ein Drittel.

Pulvis Hydrargyri stibiato-sulphurati cum Cicuta s. aethiopicus. (Au. Vm.)

℞. Aethiopsis antimonialis,
Faeculae siccae Cicutae,
Magnesia subcarbonicae,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.

Misce trititando. — Gabe, vier bis sechszeben Gran. — Von Hufeland bei chronischen Exanthemen der Kinder empfohlen. Es muß aber lange Zeit fortgebraucht werden.

Pilulae aethiopicae s. Mercurii sulphurato-stibiati. (Sy.)

℞. Mercurii . . . unciæ quatuor.
Antimonii crudi . . . unciæ tres.
Sulphuris . . . unciæ duas.

Tritura ad perfectam disparitionem globulorum usque et adde

Mellis sufficientem quantitatem ut fiat massa in pilulas quinque granorum dividenda.

Pilulae aethiopicae compositae. (D. Ham. Lus. Wir. Wür. Au. Sp. Vm.)

℞. Aethiopsis antimonialis unciam; unam.
Extracti Guajaci pulverati semunciam.

Mellis . . . quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Lus.)

℞. Aethiopsis antimonialis,
Resinae Guajaci,
singulorum drachmam unam.
Extracti Dulcamarae drachmas duas.

Syrupi Sacchari sufficientem quantitatem.

Fiant pilulae granorum duorum. (Au.)

℞. Aethiopsis mineralis,
Pulveris Reguli Antimonii medicinalis,
— Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.
Extracti Sarsaparillae unciam unam.

Fiat massa pilularis. (Wir. Sp.)

℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Mellis . . . semunciam.
Tritura ad perfectam metalli extinctionem et adde tunc

Pulveris Sulphuris Antimonii aurati,
— Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.

Mucilaginis Gummi Arabici quantitatem sufficientem ut fiat massa homogœna. (Wür.)

℞. Mercurii . . . partes tres.
Sulphuris Antimonii aurati,
Mellis albi,
singulorum partes duas.

Post extinctionem metalli adde Pulveris Gummi Arabici partem unam.

— Resinae Guajaci partes duas.
Syrupi Sacchari sufficientem quantitatem

ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Sulphuris aurati Antimonii semunciam.

Tritura ad globulorum disparitionem et adde

Saponis Hispanici,
Pulveris Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (D.)

℞. Aethiopsis antimonialis,
— mineralis,
singulorum drachmam unam.
Extracti Cicutae sesquidrachmam.
Pulveris Herbae Cicutae semidrachmam.

Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)

Diese und die vorhergehenden Pillen sind als reinigend und schmelzend in Ruf. Man empfiehlt sie besonders bei Krätze, Wassersucht und bösartigen Geschwüren. — Gabe, bis zu einer halben Drachme.

Pilulae Baldingeri. (Sm.)

℞. Mercurii . . . drachmam unam.
Antimonii crudi scrupulos quatuor.
Florum Sulphuris scrupulos duos.
Opii puri . . . scrupulum unum.
Misce exacte trititando cum Syrupi Althaeae

sufficiente quantitate ut fiat pilulae centum quinquaginta.

Syrham empfahl diese durch Balbin-ger veränderten Pillen bei venerischer Knochen Schmerzen und weißem Fluß, bei Kopfgrind, Scropheln, Krätze. — Gabe, fünf bis sechs Stück täglich.

Pilulae diaphoreticae. (Pie.)

℞. Aethiopsis antimonialis,
Resinae Guajaci,
singulorum semunciam.

Saponis albi,
Extracti Dulcamarae,
singulorum unciam unam.

Conservae Fumariae,
Syrupi quinque Radicum aperientium,
singulorum sufficientem quantitatem.

Gabe, vier Stück Morgens und Abends.
Boli in necrosi syphilitica s. antiveneri. (B.)

℞. Mercurii praecipitati rubri
granum unum.

Aethiopsis antimonialis
grana quadraginta octo.

Roob Sambuci,
Pulveris Liquiritiae, singulorum
sufficientem quantitatem.

Fiant boli octo. — Gabe, Morgens
und Abends ein Stück.

Electuarium purificans. (Sm.)

℞. Mercurii,
Antimonii crudi,
singulorum semunciam.

Resinae Guajaci unciam unam.
Post extinctionem metalli adde Roob
Sambuci cum Aquae Sambuci destil-
latae tertia parte diluti sufficientem
quantitatem ut fiat electuarium.

Von Herrenschanz bei syphiliti-
schen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe,
zweimal täglich eine Drachme, indem man
mit einem Scrupel anfängt und allmählig steigt.

*Electuarium antiherpeticum s. ad herpe-
tem. (Bo.)*

℞. Mercurii . . . scrupulum unum.
Florum sulphuris,
Reguli Antimonii,
singulorum semunciam.

Extracti Dulcamarae,
— Pulsatillae nigricant,
Pulveris Jaceae,
singulorum drachmas duas.

Camphorae . . drachmam unam.
Syrupi Fumariae
sufficientem quantitatem.

Bei hartnäckigen, besonders sogenannten
scrophulösen und venerischen Flechten ge-
rühmt. — Gabe, eine Drachme Morgens
und Abends.

Oxydum Mercurii.

§. I. Mit metallischem Quecksilber ge-
mischt.

Mercurius niger s. solubilis Moscati,

*Pulvis cinereus Hydrargyri, Oxydum
Hydrargyri nigrum s. cinereum, Oxy-
dum hydrargyrosuum, Oxydum hydrar-
gyricum praecipitatum, Oxydulum Hy-
drargyri nigrum, Hydrargyrum oxydu-
latum nigrum. (A. Am. B. Bor. Ed.
Fenn. Fer. Lon. LonN. Suec. Bo. C.
Fi. Par. Sw. T.)*

℞. Mercurii dulcis pulverati
partem unam.
Solutionis Kali caustici,
singulorum partes tres.

Aquae destillatae
partes sex (libram unam).
Coque, subinde agitando, per horam;
pulverem Aqua frigida bene lotum,
blando calore sicca. (A. Fenn. Fer.
Fi. T.)

Bo. Natrum causticum et Sw*. Bary-
tam causticam adhibent.

Bor. recipere jubet Mercurium dul-
cem praecipitatum, adhuc ex praepa-
ratione humidum, in loco frigido et
obscuro macerare cum sufficiente quan-
titate Solutionis Kali caustici, et pul-
verem cum Aqua saepius lotum siccare.

℞. Mercurii dulcis pulverati
partem unam.

Aquae Calcis . . . partes viginti.
Coque, continue agitando per horam,
liquorem decantha, et magma aequali
Aquae Calcis quantitate infusa coque;
pulverem cum Aqua calida bene lotum
lente sicca. (B.)

Ed et C. Mercurii dulcis semunciam,
Aquae Calcis libras quinque semel per
horae quadrantem ebullire jubet; —
Am. Lon. et LonN. Mercurii dulcis
unciam unam et Aquae Calcis octarios
octo

Reizend, Speichelfluß und Purgiren be-
wirkend. — Gabe, von einem achtel bis
zu zwei Gran.

Pulvis Mercurii Moscati. (Au.)

℞. Mercurii solubilis Moscati
grana tria.
Sacchari . . . sesquidrachmam.
Opii . . . grana duo.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück
Morgens und Abends.

boli resolventes. (B.)
℞. Natri subcarbonici scrupulos duos.
Mercurii dulcis . . . grana sex.
Roob Sambuci,
Pulveris Liquiritiae, singulorum
quantitatem sufficientem

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück
alle zwei Stunden.

℞. Mercurii solubilis Moscati
granum unum.
Extracti Cicutae . . grana tria.
— Dulcamarae
sufficientem quantitatem.

Fiant boli tres. — Den Tag über zu nehmen.

Die ersten dieser Bissen werden bei schleichenden Entzündungen, besonders des Bauchfells empfohlen; die andern bei kalten Geschwülsten, scrofulösen oder gichtischen Geschwülsten und Anschwellungen der Eingeweide nach Entzündungen.

Pilulae antivenerae. (Au.)

℞. Mercurii solubilis Moscatis
drachmam unam.

Micae Panis

sufficientem quantitatem.

ut fiant pilulae sexaginta. — Gabe, ein Stück täglich.

℞. Mercurii solubilis Moscatis

grana sex.

Camphorae grana viginti quatuor.

Mucilaginis Gummi Arabici

sufficientem quantitatem

ut fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein bis zwei Stück täglich.

Boli antisymphilitici stomachici. (B.)

℞. Mercurii solubilis Moscatis

granum unum ad quatuor.

Extracti Gentianae

drachmam unam.

Fiant boli tres. — Den Tag über zu nehmen.

Boli resolventes et antisymphilitici. (B.)

℞. Mercurii solubilis Moscatis

granum unum cum dimidio.

Extracti Aconiti grana duodecim.

Fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Pilulae antiarthriticae s. ad arthritidem.

(Au.)

℞. Mercurii solubilis Moscatis

grana decem.

Opii puri,

Extracti Cicutae,

singulorum grana quinque.

Sulphuris Antimonii aurati

scrupulum unum.

Resinae Guajaci drachmam unam.

Balsami Copaiuae

sufficientem quantitatem.

Fiant pilulae ponderis grani unius. — Gabe, zwei bis vier Stück alle zwei Stunden.

Pilulae resolventes. (Au.)

℞. Mercurii solubilis Moscatis

scrupulum unum.

Extracti Millefolii drachmas duas.

— Hyoscyami scrupulos duos.

Rhei pulveratae scrupulum unum.

Fiant pilulae granorum duorum. —

Gabe, fünfzehn Stück täglich, auf drei Mal, bei Drüsenanschwellungen.

Pilulae mercuriales Moscatis. (Bo. Ca.)

℞. Mercurii solubilis Moscatis

scrupulos duos.

Extracti Opii gummosi

grana duodecim.

— mollis Chinae

drachmas duas.

Misce ut fiant pilulae viginti.

Zeromel schlägt statt der Plencsch'schen Pillen folgende Formel vor, welche der eben angegebenen ähnlich ist:

℞. Mercurii solubilis Moscatis

drachmam unam.

Pulveris Radicis Althaeae

drachmas quatuor.

Extracti Cicutae drachmam unam.

Fiant pilulae ponderis gran. duorum.

Trochisci cum Oxydo Mercurii nigri et Saccharo aromatisati Swediaur. (Fi. T)

℞. Mercurii Moscatis unciam unam.

Olei volatilis Citri, guttas viginti.

Sacchari albi pulver. uncias duas.

Fiat cum Mucilage Gummi Arabici pasta in trochiscos 288 dividenda. (Fi.)

T. Sacchari uncias quatuor et Mucilaginem Tragacanthae, caeterum ut Fi., ut fiant trochisci octo circiter granorum.

— Von ersteren enthält jede zwei, von letzteren jebe ungefähr einen Gran merc. solub.

Aqua nigra s. Hydrargyri muriatici mitis nigra s. mercurialis nigra, Lotio Hydrargyri. (B. DD. Au. E. Sw. Sy. Vm.)*

℞. Mercurii dulcis pulverati

grana sedecim.

Aquae Calcis . . . uncias quatuor.

Misce triturando. (DD.)

B*. et Au. Mercurii dulcis drachmas duas et Aquae Calcis libram unam; — Vm. Mercurii dulcis scrupulos duos et Aquae Calcis uncias viginti octo; — E. Sw. et Sy. Mercurii dulcis drachmam unam et Aquae Calcis uncias quatuor.

In Waschungen, besonders von den Engländern, bei sogenannter venerischer Krätze, altem weißen Fluß und bisweilen auch zum Verbinden venerischer Geschwüre.

Injectio vaginalis cum Mercurio s. mercurialis. (Au. B.)

℞. Mercurii dulcis . . . semidrachmam.

Gummi Arabici drachmam unam.

Aquae Calcis . . . sesquiunciam.

— Plantaginis . . . uncias tres.

Dreimal täglich bei Stenorrhöe mit etwas örtlicher Anschwellung. (4.)

Au. Mercurii dulcis, Gummi Arabici, singulorum drachmam unam, Aquae purae et Aquae Calcis, singularum uncias duas.

Mercurius solubilis Moretti. (Gal. Ca. Sw.)

℞. Mercurii . . . uncias quinque.

Acidi sulphurici concentrati

uncias sex.

Immitte in retortam vitream supra balneum arenae et adaptato recipiente distillationem, igne sensim aucto, continua donec nulli amplius vapores evolvantur; vasibus tunc refrigeratis, sal e retorta desumptum tritura in mortario vitreo cum

Mercurii . . . unciis quinque ad perfectam combinationem usque. Coque deinde massam cum

Kali caustici in Aqua dissoluti quantitate sufficiente.

Totum filtro immitte et iterum cum kali coque, donec praecipitatum in Acido acetico penitus dissolvatur, quod deinde cum Aqua pura bene ablutum in loco umbroso siccetur. (Ca.)

Sw*. fere eundem agendi modum indicat, Natrum causticum tamen indicando.

Dieser ist die folgende Formel ähnlich:

℞. Protonitratis Mercurii . . . partem unam.

Aquae destillatae . . . partes sedecim.

Solutioni sensim infunde

Kali puri liquidi . . . quantitatem sufficientem

vel tantum, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem cum Aqua ablutum sicca. (Gal.)

Gabe, wie beim Moscatischen Quecksilber, von welchem es sich im Grunde nicht unterscheidet. Ehedem betrachtete man beide als Protoryde des Quecksilbers; Guibourk hat aber erwiesen, daß sie bloß ein Gemisch von sehr zertheiltem Quecksilber mit rothem Dryb sind.

Unguentum ad scabiem s. antipsoricum. (Sw*.)

℞. Mercurii praecipitati rubri, Mercurii, singulorum partem unam. Sulphuris praecipitati . . . partes sedecim.

Tritura ad disparitionem globulorum et adde

Axungiae . . . partes triginta duas.

Obgleich diese Salbe in der Kräge nicht sehr zu empfehlen ist, so verdient sie doch den Vorzug vor der Double- und Planchese'schen, von denen später die Rede seyn wird. — Gabe, zwei Drachmen bis eine Unze, je nach dem Alter des Kranken, Abends in Einreibung.

Unguentum Hydrargyri griseum. (Sw. Sy.)

℞. Mercurii praecipitati rubri . . . partem unam.

Mercurii . . . partes tres. Trituratis ad extinctionem metalli adde

Axungiae Porci . . . partes octo.

Misce bene. (Sw.)

Sy. Oxydi partem unam, Metallum et Axungiae, singulorum quadraginta octo.

Man glaubte, durch diese Mischung den Uebergang des Quecksilbers in den Zustand des Protoryds zu beschleunigen; dieß findet freilich nicht statt, jedoch ist die Salbe etwas wirksamer als die gewöhnliche Quecksilbersalbe.

Unguentum griseum camphoratum. (Au.)

℞. Unguenti grisei drachmam unam. — albi camphorati . . . drachmas tres.

Lentin empfiehlt diese Salbe in Einreibungen bei sogenannten ästhenischen Rheumatismen.

§. II. Im Zustande der Reinheit.

Dies ist das Oxydum Mercurii rubrum, Deutoxydum oder Peroxydum Mercurii genannt, als man das Metall für zweier Drydationsgrade fähig hielt.

Li. führt es in der Materia medica an, giebt aber noch außerdem das Bereitungsverfahren an.

A. Im Zustande des Hydrats.

℞. Solutionis Sublimati corrosivi aquosae . . . quantum vis. — Potassae causticae . . . sufficientem quantitatem.

Hancilli infunde, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem ablutum sicca. (Suec.)

Aqua muriatico-mercurialis rubra s. phagedaenica, Liquor Muriatis deutoxydo hydrargyro-calcarei, Loto Hydrargyri lutea, Solutio Muriatis Calcis hydrargyrata. (Ams. An. Ba. DD. Fer GalH. GalM. Han. His. R. Sar. Wir. Wür. Br. E. Fi. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi grana decem. Aquae Calcis . . . uncias quatuor.

Tritura sublimatum, aquam sensim addendo. (An. DD.)

Han. R. et Wir. Sublimati grana viginti quatuor et Aquae Calcis uncias sedecim; — GalM. Sublimati grana novemdecim et Aquae Calcis octarium unum; — Sp. Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis uncias duodecim; — Ams. et Wür. Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis libram unam; — Vm. Sublimati drachmam unam et Aquae Calcis uncias triginta duas; — Ba. Sublimati drachmas duas et Aquae Calcis uncias duodecim; — His. Sublimati granum unum ad tria et Aquae Calcis unciam unam; — Fer. Fi. Sublimati grana viginti et Aquae Calcis libram unam.

Bort, Sublimati grana viginti quatuor, Aquae Calcariae uncias sedecim; — HassP. Sublimati grana duo, Aquae Calcis sesquinciam.

℞. Sublimati corrosivi partem unam cum quadrante. Aquae partes trecentas septuaginta quinque.

Solutioni adde
Aquae Calcis . . . partes mille.
Misce bene. (GalH.)

℞. Sublimati scrupulum unum in Aquae quantitate sufficiente solvere et addere Aquae Calcis uncias sedecim; — T. Sublimati grana octo, Aquae destillatae drachmas tres, Aquae Calcis secundae recentis uncias quatuor.

℞. Sublimati corrosivi drachmam unam.
Aquae Calcis . . . libram unam.

Solutioni adde
Aquae Vitae . . . uncias quatuor.
Misce bene. (Wir.)

Sw. et Sy. Sublimati grana triginta ad sexaginta, Aquae libras duas et Aquae Vitae semilibram.

Dieses Präparat besteht aus einer sehr verdünnten Auflösung des salzsauren Kaltes, durch einen Niederschlag getrübt, welcher sich, wenn er eine gelbe Farbe hat, als Hydrat des Quecksilberdeutoxyds und wenn er eine rothe oder besser ziegelrothe Farbe hat, als ein Gemisch des Deutoxyd für mit dem Deutoxyd verhält.

℞. Sublimati corrosivi drachmam unam.
Aquae Calcis primae libras duas.

Tritura. (Sar.)

Da die aqua calcis prima etwas Kali enthält, so findet sich hier in der Flüssigkeit salzsaures Kali vor.

℞. Sublimati corrosivi scrupulum unum.
Kali subcarbonici drachmam unam.

Tritura in mortario vitreo, sensim addendo

Aquae destillatae . libram unam.
Misce bene. (His.)

Dieses Präparat kömmt dem vorhergehenden nahe, unterscheidet sich aber dadurch, daß das aufgelöste Salz bloß hydrochlorisches Kali und der Niederschlag kohlen-säuerliches Quecksilber ist.

Dieses Wasser, welchem man sehr unpassend den Namen Aqua phagedaenica beilegt, indem es in der That eine einfache wässerige Auflösung des Kesssublimats ist, wird als Waschmittel gegen venerische, scrophulöse oder andre Geschwüre von fressendem und böhartigem Character angewendet. Es muß vor der Anwentung umgeschüttelt werden, um den Bodensatz in demselben gleichmäßig zu vertheilen, von welchem es, wenn

Pharmacopoea universalis. II.

nicht die ganze, doch wenigstens den größten Theil seiner Wirksamkeit hat.

Aqua aloëtica mercurialis. (Ful. Sp.)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Aquae Calcis . uncias duodecim.
Solutioni adde
Pulveris Aloës . . drachmas sex.
Mellis rosati . . sesquinciam.
Misce. (Sp.)

Ful. Sublimati scrupulum unum, Aquae Calcis libram unam, Salis Ammoniaci grana duodecim et Extracti Aloës gummosi grana decem.

Gebraucht wie das vorhergehende zum Verbinden von Geschwüren, aber wirksamer und reizender.

Aqua cosmetica. (Vm.)

℞. Amygdalarum amararum contusarum . . . uncias sex.
Decocti Carni bubulae et vitulinae concentrati . . . uncias sexaginta quatuor.

Fiat emulsio, cui adde mixturam ex

Sublimati corrosivi . semuncia.
Succi Citri . . . uncias decem.
Liquoris concentrati Kali subcarbonici . . . semuncia.
Commisce sensim cum

Albuminis subacti . . . uncias sex.

Colatis per pannum adde deinde

Camphorae cum Mucilaginis Gummi Arabici semidrachma in emulsionem redactae semidrachmam.

Dieses Präparat, dessen fortwährender Gebrauch Gefahr bringen würde, muß, so wie alle vermeintliche mercurielle Schönheitsmittel, verworfen werden.

B. Mittelft des Feuers bereitet.

Hydrargyrus calcinatus, Hydrargyri Oxydum rubrum, Calx Hydrargyri rubra, Ardonum corallinum, Praecipitatum per se.

℞. Mercurii . . . quantum vis.

In retortam fundi latioris et plani immitte ita, ut stratum quatuor linearum crassitiem formet; collum prope lampadem extrahe; tunc vase balneo arenae imposito, coque metallum, donec ferè penitus in pulverem rubrum sit conversum. (Du. Fer. Gal. Lon. LonN. Wür. Fr. C. Sw. T. Vm.)

C. Mittelft Salpetersäure bereitet.

Hydrargyrus nitratus ruber, Hydrargyrum oxydatum rubrum s. rubrum praeparatum, Hydrargyri nitrici Oxydum, Mercurius ruber s. corallinus s. corrosivus ruber s. praecipitatus s. nitratus ruber s. praecipitatus ruber praeparatus s. calcinatus ruber, Praecipitatus ruber, Oxydum Hydrargyri s. Hydrargyri completum s. rubrum s. rubrum per Acidum nitricum s. nitratum

s. nitratum rubrum s. nitricum, Oxydum hydrargyricum s. hydrargyricum praeparatum, Panacea Mercurii rubra, Pulvis Joannis s. Johannis s. Johannis de Vigo s. de Vigonis s. principis, Orodes Hydrargyri rubrum, Hyperoxodes Hydrargyri, Deutoxydum s. Peroxydum Hydrargyri.

℞. Mercurii quantum vis.
Acidi nitrici (32°)

sufficientem quantitatem ut omne metallum solvatur; intromitte in retortam fundo plano praeditam et in arenam tepidam impositam, superfunde acidum et parumper calefac; dissolutione peracta, igne aucto liquor ad siccum evaporet; ignem deinde ita auge ut vapores nitrosi solum evolvan- tur et massa pulchrum colorem rubrum acceperit, quam post refrigerationem serva. (A. Ams. B. Bel. Bor. Br. D. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Br. Pid. Sp. Sw. Vm.)

Bor4. Mercurii in Acidi nitrici quantitate sufficiente soluti libram unam in vase idoneo igne primum leni deinde fortiori ad siccum evaporare, tum Mercurii libram unam addendo ad extinctionem usque terere, pulverem in vase fictili non vitreato latioris fundi, interdum spathula vitrea movendo prudenter urere jubet, donec colorem rubicundum referat. — Parari potest quoque ex Praecipitato rubro venali si satis purus prostat, coquendo Aquae destillatae sufficiente quantitate, liquorem decanthando et residuum ablutione edulcorando. (Bor4.)

℞. Mercurii uncias quindecim, Acidi nitrici diluti libras duas et in univ-ersum eundem agendi methodum indicat.

℞. Mercurii partes duas.

Solve coquendo in

Acidi Nitrici . . . partibus tribus et solutionem exsicca; sal siccum subtilissime pulveratum cum

Mercurii partibus duabus Aquae pauxillum adspargendo ad extinctionem usque continere; in cucurbita vitrea latioris fundi, agglutinato alembico et adaptato excipulo Aquae uncias aliquot continente etc. torreatur massa igne lento sensim aucto, donec cucurbitae collum pelliceat ac massa colorem atro-rubrum acquirat. Haec refrigerata squamas splendentes rubras exhibet, quae protracta calcinatione, donec loco vaporum nitrosorum Gas Oxygenium emittere incipiat, dein coctione in

Aquae destillatae partibus decem

digestione tandem calida per horas aliquot cum

Lixivii caustici diluti

parva quantitate ab omni Mercurio nitroso, si forte adhaereat, exacte liberetur. Pulvis remanens repetita aquae destillatae calidae affusione probe elotus et in filtro siccatus servetur. (HassP.)

Lon. LonN., Mercurii libras tres, Acidi nitrici sesquilibram, Aquae destillatae octarios duos misce et coque, donec liquetur mercurius et aqua consumpta materia alba restet, quae in pulverem trita in vas aliud quam minime profundum conjice leni et tunc aucto igne adh bito, donec vapor ruber prodire cessaverit.

Paissé hat folgendes Verfahren kennen gelehrt, welches nach dem der Holländischen Fabrikanten gemobelt ist und für das beste gehalten wird:

℞. Mercurii libras centum.

Acidi nitrici (pond. 1,3 ad 1,37)

libras centum quadraginta.

Dissolve balnei arenae caloris ope, de stillatione evapora et simulac formatio gasis nitrosi decompositionem nitratis indicat, recipiente remoto, per horas octo circiter calore modico sed constante usus continua, donec fomes modo extinctus denuo ignem capiat in retortam introductus.

GalH. Ignem jubet non ita augere, donec oxygenium evolvatur, ut Ba. et Paissé, quod sit indicium decompositionis incipientis oxydi.

Ams. Bor. Ed. Han. His. O. Pal. R. Wür. et C. operationem proposuerunt duabus vicibus perficere et post evaporationem dissolutionis salinae ad siccum, residuum pulveratum in novo vase calcinare.

B. Digerere jubet productum per horas aliquot cum Aquae calidae partibus decem et Kali liquidi parva quantitate ac pulverem deinde cum Aqua calida repetito abluere. Oxydum hoc modo ab acidi nitrici, vel potius subdento-nitratis mercurii, pauxille quod forte illi adhaeserit liberatum prodit.

℞. Salis mercurialis praecedenti modo obtenti,

Mercurii, singulorum partem unam.

Aquae destillatae

sufficientem quantitatem.

Tritura simul ad perfectam globulorum disparitionem usque et calcina deinde, ut supra, in crucibulo. (An. Sw.)
Ba et Fenn. Mercurii partes duas; — Succ. Metallii trientes duos.

T. Paratur decomponendo crystallos Nitratis Mercurii in retortis vitreis vel

in lagenis calori balnei arenae expositis, donec sal colore rubicundo acquisito, vapores nitrosos non amplius exhalet.

RC. Nitratis Hydrargyri liquidi quantum vis in vase vitreo ad siccum coque et pulverem calori moderato exponere, donec colorem laete rubrum prae se tulerit.

Reizend, aufregend, in hohem Grade giftig. Doch hat man es ehedem häufig angewendet und benutzte es noch heutzutage bei der Behandlung syphilitischer Krankheiten, sowohl innerlich zu einem halben bis ganzen Gran, als äußerlich in Einreibungen, mit Speichel, zehn Gran auf jede Einreibung.

Pulvis Hydrargyri oxydati rubri.
(B*. Au.)

℞. Oxydi Mercurii rubri granum unum.
Antimonii crudi drachmas duas.
Triturata in partes octo aequales dividit.

Bei venerischen Uebeln empfohlen. — Gabe, ein Stück auf zweimal, Morgens und Abends, in Wasser. Nöthigenfalls vermehrt man diese Gabe etwas.

Pulvis ex Hydrargyro rubro cum Alumine, Pulvis causticus s. aluminoso-mercurialis s. Supersulphatis Aluminiae et Poiassae compositus s. escharoticus s. angelicus Sharpii. (B*. BorC. Fer. Ful. RC. Au. Fi. Sw. Sy.)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Aluminis crudi partes duas.
Triturando misce exacte. (B*. BorC. Fer. Ful. Au. Sw.)

Sy. Cujusque partes aequalis; — Fi. Aluminis usti unciam unam, Praecipitati rubri semunciam.

℞. Praecipitati rubri, Aluminis calcinati, singulorum drachmam unam.
Pulveris Sabinae semunciam.
Misce intime. (B*.)

Gegen Warzen und wildes Fleisch bei Geschwüren.

Pulvis escharoticus. (B*. RC.)

℞. Praecipitati rubri, Plumbi acetici, Kali fusi, Aluminis, singulorum drachmam unam.
Pulveris Sabinae, Carbonis ligni, singulorum drachmas duas.
Misce triturando ut fiat pulvis subtilissimus.

RC. Aluminis usti, Praecipitati rubri,

Acetatis Cupri, singulorum partem unam, Foliorum Sabinae vel Rhei palmati vel Calami vel Radicis Colombo partes duas vel Carbonis Ligni tantumdem.

Dieses Präparat dient zu demselben Gebrauch, wie das vorige; es ist aber weit wirksamer.

Collyrium siccum. (Ra.)

℞. Oxydi Mercurii rubri grana decem.
Tutiae grana viginti.
Sacchari albi drachmas duas.
Contere. — Bei Hornhautflecken nach chronischen Augenentzündungen in das Auge zu blasen.

Mercurius praecipitatus viridis. (Wir.)

℞. Mercurii uncias quatuor.
Cupri semunciam.
Metallis quoque seorsim in Acidi nitrici sufficiente quantitate dissolutis, solutiones commixtas in lagena balnei arenae ope evapora; residuo infunde Aceti destillati libram unam, digere ad perfectam solutionem usque; tunc destillando aceto elicto massa viridis in retorta residua pulveratur.

Ein heftiges Brech- und Purgirmittel, welches man als specifisch bei venerischen Krankheiten gepriesen und auch äußerlich zur Austrocknung von Geschwüren angewendet hat. Es ist ein fürchterliches Gift.

Bolus ex Hydrargyro oxydato rubro.
(Au. Sy.)

℞. Praecipitati rubri, Opii, singulorum granum unum.
Extracti Liquiritiae quantum sufficit
ut fiat bolus.

Pilulae antivenerae s. syphiliticae s. polychrestae s. Praecipitati rubri. (Ful. Wir. E. Sa. Sy.)

℞. Praecipitati rubri grana octo.
Extracti Liquiritiae quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas duodecim dividenda. (Sy.)

℞. Praecipitati rubri granum unum.
Corallii rubri praeparati grana duo.
Conservae Rosarum quantum sufficit
ut fiat pilula. (Sa.)

℞. Praecipitati rubri grana tria.
Opii pulverati granum unum.
Olei Caryophyllorum guttas duas.
Fiant pilulae tres. (E.)

℞. Praecipitati rubri, Opii puri, singulorum drachmam unam.
Balsami Peruviani quantum sufficit
ut fiant pilulae grani unius. (Wir.)

℞. Praecipitati rubri grana decem.

Sulphuris Antimonii aurati,
Asae foetidae,
singulorum grana viginti.
Opii . . . grana quinque.
Syrupi Caputum Papaveris
quantum sufficit

ut fiat massa pilularis. (Ful.)

Nach jeder der drei ersten Formeln höchstens eine Pille, nach den letzten zwei bis acht Gran. Sie gelten für schmelzend und krampfstillend, welche letztere Eigenschaft auch den vorhergehenden zugeschrieben wird.

Mel mercuriale. (Sw*.)

℞. Praecipitati rubri,
Sacchari albi,
singulorum scrupulum unum.
Trituratis simul, sensim adde
Mellis albi spississimi uncias tres.
Zum Verbinden mancher syphilitischen Geschwüre empfohlen.

Balsamum ophthalmicum rubrum, Unguentum Deutoxydi Hydrargyri nitrati s. Hydrargyri nitrico-oxydi s. Hydrargyri rubri s. ex Hydrargyro oxydato rubro s. Mercurii s. Hydrargyri rubrum s. ophthalmicum rubrum s. Oxydi Hydrargyri rubri s. Oxydi Hydrargyri rubrum Tittmanni s. Oxydi hydrargyrici nitrati s. Subnitratis hydrargyrici, Pomatum de Praecipitato rubro, Butyrum cum Oxydo Mercurii rubro, Unguentum cathaereticum s. corrodens, Ceratum mercuriale, Unguentum s. Pomatum antipsoricum s. Lugdunense (Eyon) s. ophthalmicum Pelliciani. (Am. Ams. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. D. Ed. Ham. Han. HassP. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. WW. Au. Bo. Br. C. Ca. Fi. Huf. Ra. Sp. Vm.)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Axungiae Porci . . . partes triginta duas.

Misce trititando. (B. Bel. Au.)

Am. Ed et C. Oxydi partem unam et octo Axungiae; — Han. HassP. Oxydi unam et decem Axungiae; — Ams. Oxydi unam et Axungiae quadraginta octo; — Huf. Oxydi unam et Axungiae triginta sex; — Au. Oxydi granum unum ad quatuor et Olei Juglandium drachmas duas.

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Butyri recentis blando igne liquefacti . . . partes octo.

Triturando exacte misce. (D. Suec.)
℞i Praecipitati partem unam et tres Butyri; — RC. Praecipitati unam et quatuor Butyri.

℞. Praecipitati rubri . . . partes octo.
Axungiae Porci partes octoginta.
Olei essentialis Citri . . . partem unam.

Misce sedulo. (Bor.)

℞. Praecipitati rubri pulverati
partem unam.
Axungiae praeparatae partes sex.
Cerae albae . . . partes duas.
Tere oxydum cum reliquis liquatis.
(Lon. LonN.)

Bor4. Praecipitati grana decem, Unguenti simplicis unciam unam; — BorC. Praecipitati partem unam, Butyri recentis quatuor et Cerae flavae duas; — Vm. Oxydi partem unam, Butyri duodecim, Cerae flavae sex (*Balsamum ophthalmicum citrinum s. flavum*); — Ra. Oxydi partem unam cum dimidia, Cerae albae quatuor et Butyri viginti quatuor; — R. Oxydi grana septemdecim, Butyri drachmas tres et Cerae albae grana quadraginta quinque; — Sax. Oxydi partem unam, Butyri novem et Cerae albae tres; — Sp. Oxydi drachmas duas et grana quindecim, Butyri uncias tres et Cerae albae drachmas sex; — Han. et O. Oxydi partem unam, Butyri et Cerae albae, singulorum duas.

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Cerae albae . . . partes tres.
Olei Olivarium . . . partes octo.
Cerae cum oleo contritae oxydum admisce et tere. (Br.) (*Ceratum mercuriale*).

Planche (Br*): Oxydi partem unam, Cerae albae quatuor et octo Olei (*Pomatum antipsoricum*); — Wür. Praecipitati partem unam et sex Cerati communis; — Pal. Oxydi partem unam et Cerati decem.

℞. Oxydi rubri Mercurii . . . partem unam.

Unguenti rosati . . . partes octo.

Misce sedulo. (Ra.)

Bo. et Ca. Oxydi partem unam et duas Unguenti rosati.

℞. Praecipitati rubri grana decem.
Camphorae . . . grana sex.
Butyri recentis drachmas duas.

• Contere. (Au.)

Diese Salbe, deren Stärke wegen des so abwechselnden Verhältnisses des Dryds zum Fett, von 1 zu 2 bis 1 zu 48, so verschieden ist, wird als Reizmittel bei chronischen Leiden der Augentlider und des Augapfels, wenn keine Entzündung mehr vorhanden oder nur wenig davon bemerkbar ist, angewendet. Man bringt davon, zweimal täglich, einen bis zwei Gran in den innern Augenwinkel. Doublet empfiehlt die Salbe von Planche gegen Krätze; man theilt die Salbe in jeden Theile, wovon man Abends beim Schlafengehen einen Theil beim Feuer einreibt. Eine Salbe aber, in welcher der Präcipitat zu einem Dreizehntheil enthalten ist, ist sicher

lich ein wenig zu empfehlendes und selbst gefährliches Mittel gegen träge Uebel.

Unguentum ophthalmicum Richterii.
(Han.)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Butyri Cacao,
Azungiae Porci ablutae,
singulorum partes tres.
Butyro et azungiae post liquationem
mixtis et semirefrigeratis oxydum te-
rendo admisce.

Unguentum escharoticum. (E.)

℞. Praecipitati rubri drachmam unam.
Terebinthinae Venetae
unciam unam.
Triturando commisce.

Unguentum antivenereum. (Au.)

℞. Praecipitati rubri grana quinque.
Unguenti Praecipitati grieci
drachmam unam.

Auf einmal einzuruben. — Der bis zum
hinsüßlichen Speichelfluß fortgesetzte Ge-
brauch dieser Salbe, der gleichzeitige Auf-
enthalt im Bett in einem warmen Zimmer
und ein strenges wässeriges Regim während
mehrerer Wochen ist die Methode, welche
Loubrier und Rust zur gründlichen Hei-
lung der Syphilis anpreisen.

*Unguentum fuscum, Unguentum Pi-
cis cum Oxydo Mercurii rubro s. mer-
curiale Baeckingii. (Galm. Ra. Sa. Sm.
Sy.)*

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Unguenti basilici . . partes sex.
Misce exacte. (Sa.)

Sy. Oxydi partem unam et decem
Unguenti; — Sm. Oxydi unam et duo-
decim Unguenti; — Galm. Oxydi
unam et Unguenti sedecim; — Ra.
Oxydi unam et Unguenti quadraginta
oto.

zum Verbinden schmerzloser, besonders
venereischer Geschwür, um die Vitalität der
Gewebe zu bethätigen. Man muß, ohne
sich an eine dieser so verschiedenen Formeln
zu binden, mit einer sehr schwachen Salbe
anfangen, deren Stärke man, je nach der
Wirkung, auf welche man sorgfältig Acht
haben muß, vermehrt oder vermindert.

Unguentum mercuriale. (Sm.)

℞. Praecipitati rubri,
Camphorae pulveratae,
singulorum drachmam unam.
Butyri recentis uncias quatuor.
Cerae virgineae drachmas tres.
Oxydo cum cera in butyro liquata
trito camphoram adde. — Bei Entzün-
dungen der Eichel auf diese alle Abende
beim Schlafengehen vierzehn Tage lang

eingerieben. Ein unschätzbars Mittel, diese
leichte Krankheit, welche bei Reinlichkeit in
wenigen Tagen von selbst aufhört, lang-
wierig zu machen.

Balsamum ophthalmicum. (Vm.)

℞. Oxydi Mercurii rubri
partes quatuor.
Cinnabaris . . . partes duas.
Camphorae . . . partem unam.
Cerati albi

partes nonaginta quatuor.
Terendo misce. — Dieser Balsam
hat viel Nützlichkeit mit der vorhergehenden
Salbe.

*Unguentum stimulare s. Elemi cum Alu-
minc. (Au.)*

℞. Unguenti Elemi . . semunciam.
— Styracis drachmas duas.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Praecipitati rubri grana quindecim.
Aluminis calcinati grana quinque.
Olei Hyperici quantum sufficit.
Micheli hat diese Salbe zum Verbin-
den übelaussehender Geschwüre empfohln.

*Unguentum ad ulcera lymphatica s. scro-
phulosa. (Sw*)*

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Emplastri Cicutae,
Unguenti basilici,
singulorum partes quadraginta.
Misce exacte.

Unguentum ad ulcera venerea. (Sw)*

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Unguenti mercurialis
partes quatuor.
— basilici partes triginta duas.
Misce exactissime.

Unguentum suppurativum. (Sw)*

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Tritura cum Olei camphorati guttis
aliquot et adde deinde
Balsami Arcaei partes duodecim.
Unguenti basilici
partes quadraginta octo.
Misce bene.

*Balsamum ophthalmicum Yveanum s.
de St. Yves, Balsamum mercuriale, Un-
guentum Hydrargyri rubrum. (Br. Ful.
Han. Hass. HassP. Li. R. Sax. Wür.
Au. Ca. Pil. Pie. Sp. Vm.)*

℞. Praecipitati rubri partes quinque.
Florum Zinci . . partes duas.
Mixta cum .
Butyri recentis partibus viginti,
Cerae flavae partibus decem
simul liquatis tritura et misce. (Li.)
Ful. Oxydi Mercurii partes quindecim,
Oxydi Zinci sex, Butyri sexaginta
et Cerae triginta.

℞. Praecipitati rubri partes triginta.
 Florum Zinci partes duodecim.
 Camphorae in Oleo Ovorum dis-
 solutae . . . partes novem.
 Ceræ albae

partes quadraginta octo.

Butyri recentis partes ducentas
 quadraginta octo.

Ceram et butyrum simul liquata et
 mixta fere refrigerata cum pulveribus
 tritura. (Br. Han. Hass. R. Wür. Ca.
 Pid. Pic. Sp.)

HassP. Butyri unciam unam, Ceræ
 scrupulos quatuor, Mercurii calcinati
 rubri scrupulos duos cum dimidio, Flo-
 rum Zinci scrupulum unum, Campho-
 rae in Oleo Ovorum solutae grana
 quindecim; — Vm. Praecipitati partes
 tre, Oxydi Zinci tantidem, Camphorae
 cum Oleo Amygdalarum dulcium tritu-
 ratae unam, Ceræ sedecim et Bu-
 tyri nonaginta sex.

℞. Unguenti Praecipitati rubri simplicis
 partes sexaginta.

Florum Zinci . . . partes duas.

Camphorae . . . partem unam.

Misce bene. (Sax.)

Sp. Unguenti partes nonaginta sex,
 Oxydi Zinci tres et duas Camphorae;
 — Au. Praecipitati rubri grana quin-
 que, Tutiae quatuor, Camphorae duas
 et Butyri recentis drachmas duas, vel:
 Praecipitati grana quatuor, Oxydi Zin-
 ci decem, Extracti Opi tantidem et
 Axungiae drachmas duas.

Diese Salbe ist von der einfachen rothen
 Quecksilberfärbung nur wenig verschieden, doch
 soll sie bei stattfindender Entzündung ihr
 vorzuziehen seyn. Sie gilt für austrock-
 nend, auflösend, kühlend und stärkend. Si-
 cher ist sie sehr reizend.

Unguentum ophthalmicum Dupuytrenii.
 (Ra.)

℞. Oxydi Mercurii rubri

partem unam.

Sulphatis Zinci . . . partes duas.

Axungiae Porci

partes nonaginta sex.

Bei chronischen und rebellischen sogenann-
 ten scrophulösen Augenentzündungen. Man
 streicht sie leicht auf den Rand der Augenlider.

Unguentum ruhrum. (Vm.)

℞. Oxydi Mercurii rubri,

Minii pulverati,

singulorum partem unam.

Axungiae . . . partes octo.

Axungiam cum oxydis, pro parvis parti-
 unculis addendo, contere.

Unguentum Joerdensii. (B*. Au.)

℞. Oxydi Mercurii rubri

partem unam.

Butyri recentis . partes sedecim.
 Miscæ bene et adde

Subacetatis Plumbi liquidi

partes sex.

Tere, donec omne liquidum dispa-
 ruerit.

Unguentum Rustii. (Au.)

℞. Praecipitati rubri

grana quatuor ad sex.

Butyri recentis . drachmas duas.

Subacetatis Plumbi liquidi,

Laudani Sydenhami,

singulorum semidrachmam.

Unguentum Regentii. (Gal. GalM. Pic.)

℞. Butyri recentis cum Aqua Rosa-
 rum loti 4,05.

Camphorae,

Praecipitati rubri,

Acetatis Plumbi, singulorum 0,25.

Tritura diu ut fiat unguentum. (Gal.)

GalM. Praecipitati, Camphorae, Acet-
 atis Plumbi crystallisati, singulorum
 partem unam et Axungiae bene lotae
 octodecim; — Pic. Praecipitati, Acet-
 atis Plumbi, singulorum partes viginti,
 Camphorae unam et Butyri Aqua Rosa-
 rum loti septuaginta.

Unguentum s. Pomatum Desaulti. (Ca.
 Pic. Ra.)

℞. Praecipitati rubri,

Acetatis Plumbi crystallisati,

Aluminis calcinati,

Tutiae, singulorum semunciam.

Sublimati corrosivi granum unum.

Axungiae lotae . . . uncias tres.

Misce triturando. (Ra.)

Pic. Praecipitati, Acetatis, Aluminis,
 Tutiae, singulorum drachmas quatuor,
 Sublimati grana quadraginta octo et
 Axungiae uncias tres; — Ca. Praeci-
 pitati rubri, Lithargyri, Tutiae, Alu-
 minis calcinati, singulorum drachmam
 unam, Sublimati grana duodecim et
 Cerati non loti vel Unguenti rosati
 sufficientem quantitatem.

Diese Salbe ist gegen Flechtenübel und
 chronische Augenlidenentzündungen berühmt.
 Sie unterscheidet sich von den vorigen nur
 durch die stärkere Reizwirkung.

Unguentum s. Pomatum Bellii. (Bo.)

℞. Praecipitati rubri,

Calaminae praeparatae,

singulorum sesquidrachmam.

Lithargyri praeparati

drachmam unam.

Tutiae praeparatae semidrachmam.

Cinnabaris pulverati

scrupulum unum.

Axungiae Porci . . . uncias duas.

Trituratis sedulo adde

Balsami Peruviani
guttas quindecim.

Unguentum ophthalmicum. (Au.)

℞. Praecipitati rubri
grana decem ad viginti.
Butyri recentis . . . drachmas tres.
Aeruginis . . . grana sex ad octo.
Boli albae,
Opii, singulorum scrupulum unum.
Misce triturando. — Benedict emp-
fiehl sie bei'm Flügelfell (pterygium).
℞. Praecipitati rubri . . . grana sex.
Aeruginis . . . grana decem.
Tutiae grana duodecim ad qua-
tuordecim.
Butyri recentis . . . semunciam.
Contere.

Ceraum detergens s mercuriale Falckii.
(Vir. Ca. Pid. Vm.)

℞. Praecipitati rubri porphyrisati
semunciam.
Mercurii dulcis porphyrisati
uncias duas.

Acetatis Plumbi porphyrisati
unciam unam.

Commisce intime cum mixtura li-
quata e

Cerae albae . . . unciis quatuor.
Olei Olivarum . . . unciis sex.

Adde deinde

Olei essentialis Lavandulae
semidrachmam.

Misce bene. (Pid.)

Wür. eandem formulam omisso ta-
merum oleo Lavandulae; — Ca. loco oli-
varum Oleum Juglandis adhibet, Ce-
rae unciam tantum unam praescribens.

℞. Oxydi Mercurii rubri
partem dimidiam.

Acetatis Plumbi crystallisati
partem unam.

Olei Olivarum . . . partes sex.
Cerae flavae . . . partem unam.

Tritis seorsim oxydo et sale cum
olei pauxillo adde reliquum olei et cerae
prope ignem lenem liquefactae et mis-
cellae primum sal deinde oxydum ad-
misce. (Vm.)

Reizend, austrorennd, zum Verbinden
syphilitischer Geschwüre. Man wendet es
in Einreibung oder auf Charpie gestri-
chen an.

Unguentum Falckii. (Ca.)

℞. Praecipitati rubri drachmas duas.
Amalgamatis e Stanni et Mercurii
partibus aequalibus

drachmas quatuor.

Unguenti rosati . . . unciam unam.
Trituratis adde

Olei essentialis Menthae piperitae
guttas viginti.

Gegen Hämorrhoidalnoten empfohlen.

Cereoli Falckii. (Hass. Pid.)

℞. Terebinthinae Venetae
drachmam unam.

Laccae pulveratae semidrachmam.

Liquatis prope ignem adde

Emplastri mercurialis uncias duas.

Mercurii dulcis pulverati
drachmas duas.

Praecipitati rubri porphyrisati
scrupulos duos.

Misce bene agitando ut fiant cereoli.

Sulphuretum Mercurii.

§. I. Sulphuretum nigrum.

Ba, Fer. Li. Suec. Vm.

Man hat es lange Zeit unter dem Na-
men *Aethiops mineralis* mit einer Mischung
aus Schwefel und sehr zertheiltem Queck-
silber verwechselt; allein es unterscheidet
sich von dieser durch die sich gleichbleiben-
den Verhältnisse, und daß man es, nach
Seguin, durch gehöriges Erhitzen in ei-
ner Röhre, in rothes Schwefelquecksilber
(sulfure rouge) verwandeln kann, ohne
daß es etwas von seinem Gewichte verliert.

A. Im Zustande der Reinheit.

I. Mittelfst Feuer bereitet.

℞. Florum Sulphuris lotorum
partem unam.

Liqua leni igne in olla fictili et sen-
sim adde

Mercurii in cochleari ferreo cale-
facti . . . partem unam.

Agita continue, donec massa colorem
nigrum uniformem acceperit et post
refrigerationem porphyrisa. (Ba. Suec.
Vm.)

Fer. Sulphuris partes tres et duas
Mercurii.

II. Durch Fällen (Präcipitation) be-
reitet. *Aethiops mineralis praecipita-
tus, superhydrosulphuretum Mercurii.*

℞. Sublimati corrosivi
partes duodecim cum dimidia.

Hydrosulphatis Ferri,
Acidi sulphurici concentrati,

singulorum partes quinque.

Sublimato in aqua fuso, liquori im-
mitte gas ex duobis reliquis substantiis
et Aquae quintuplo acidi pondere ex-
trictatum; praecipitatum collectum et
lotum sicca. (Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassae
uncias duas.

Florum Sulphuris lotorum
uncias quatuor.

Aquae Calcis . . . libras duas.

Coque in cucurbita vitrea longicollis
super arena, donec sulphur sit dissolu-

tum; refrigerata filtra et liquori guttatim instilla solutionem frigidam Mercurii unciarum duarum in Acidi nitrici uncias quatuor; effervescentia cessata liquorem sepone, quod super praecipitatum natat decantha et hoc Aqua destillata ablutum blando calore sicca. (Fer. Li. Vm.)

Vm. loco subcarbonatis Potassam liquidam praescribit.

B. Mit Schwefelspießglanz gemischt.

Dieses Präparat war ebenfalls mit dem Aethiops antimonialis verwechselt worden.
℞. Sulphuris

partem unam cum dimidia.
Potassae causticae fusae,
Sulphureti Antimonii pulverati, singulorum partes quinque cum dimidia.

Coque in Aqua, donec nihil amplius dissolvatur et filtra. Colaturae coctae instilla Nitratu Mercurii in Aqua soluti, quamdiu praecipitatum formatur, quod lotum siccetur. (Vm)

Vm. praeterea proponit 1) loco solutionis nitratu illum Sublimati corrosivi et liquor subito infundere partes ejus duodecim; 2) liquefacere simul Sulphureti Potassii partes sex et quinque cum dimidia Sulphureti Antimonii, mixturam refrigeratam atque pulveratam cum Aquae pauxillo terere, addere Sublimati corrosivi in Aqua dissoluti partes duodecim vel Mercurii dulcis pulverati viginti et praecipitatum deinde multa Aqua ablutum siccare.

§. II. Sulphuretum rubrum.

Cinnabaris, Sulphuretum Hydrargyri rubrum, Deutosulphuretum Hydrargyri rubrum, Bisulphuretum Hydrargyri; Sinober; Cinabre (Gal.)

A. Cinnabaris nativa; natürlicher Sinober; Cinabre naturel ou natif (Gal.).
An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Ed. Fenn. GalM. Gen. Han. His. Pol. Sax. Wir. Wür. Sp. führen ihn unter den natürlichen Arzneimitteln auf: Er darf aber nicht ohne vorgängige Reinigung durch Sublimiren angewendet werden.

B. Cinnabaris factitia s. artificialis, Hydrargyri Sulphuretum rubrum s. sublimatum. (Am. An. Ba. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. HassP. His. Li. Lon. LonN. Pal. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Par. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Sulphuris sublimati partem unam.
Mercurii . . . partes quinque.
Mercurium sulphuri fuso adde, quam massam, quum intumescit, ab igne remove, vas tegendo ne forte deflagret;

tum pulveratam sublima. (Am. Du. Fer. Lon. LonN. Suec. C.)

An. Wür. et T. Sulphuris partem unam et quatuor Mercurii; — Br. His. Pal. Sar. Wir. et Fi. Sulphuris unam et Mercurii tres; — Gen. Sulphuris unam et Mercurii tres cum dimidia; — HassP. Sulphuris uncias duas, Mercurii uncias duodecim; — Ful. Li. Sax. Br. et Sp. Sulphuris unam et septem Mercurii; — Ba. Sulphuris unam et Mercurii septem cum quinta parte; — Gal. Sulphuris 150 et Mercurii 1,080; — Sw. Partes aequales i. e. sublimationem aethiops sui; — Sw*. Sulphuris quatuor et Mercurii viginti quinque.
℞. Sulphuris in baculis partes tres.
Mercurii . . . partes novemdecim.

Tere ad extinctionem metalli usque et mixturam in retorta in balneo arenae collocata sensim calefaciendo sublima. (Vm.)

Vm. praeterea et modum agendi praemonitum cum iisdem proportionibus indicat.

Reizend, innerlich wenig, aber äußerlich häufig in Räucherungen zu einer oder zwei Drachmen auf einmal, mit Weibrauch angewendet.

Cinnabaris praeparata. (Gal. Li. Sar. Wir. Sp.)

Cinnabaris et artificialis et nativa pulverata et porphyrisata multa Aqua abluatur et moleculae subtilissimae sepositione liquoris colliguntur (Li.); vel antequam porphyrisetur et abluatur, sublimationi submittitur. (Sar. Wir. Sp.)

Sp. Cremorem Cinnabaris indicat obtinendum coquendo Cinnabarem in Aqua et desumendo pelliculas in superficie liquidi formatas, quae siccatae pulverantur.

Pulvis anthelminticus. (Au.)
℞. Sulphurei Mercurii nigri,
Radice Jalapae,
singulorum drachmam unam.
— Valerianae drachmas duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

Pulvis antilyssicus. (Bo.)
℞. Cinnabaris nativae,
— artificialis, singularum
grana viginti quatuor.

Moschi . . . grana sedecim.
Miscet et porphyrisa. — Auf einmal, in einem Löffel Alcohol zu nehmen. — Sicherlich ist die Hundswuth noch nie dadurch geheilt worden.

Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. nobilis Cellensis s. Cellensis aureus. (B*. Br. O. Wir. Sp. Sw.)
℞. Cinnabaris . . . semunciam.

Sacchari crystallisati (Candis)
uncias tres.
Olei Cinnamomi drachmam dimi-
diam ad unam.

Tritura bene. (B*. Br. O. Sw.)

Wir. et Sp. Cinnabaris drachmas sex,
Sacchari uncias duas et Olei Cinnamo-
mi scrupulos duos.

Reizend, als herz- und magenstärkend
sehr berühmt. — Gabe, ein Scrupel.

*Pulvis roborans s. confortans Camera-
rii.* (Wir.)

℞. Cinnabaris nativae drachmam unam.
Cornu Cervi usti
drachmas quinque.

Dentium Apri,
Ungulae Alces,
Boli Armenae,
singulorum semidrachmam.

Terrae sigillatae drachmas duas.
Sardonycis,
Granati,

Hyacinthi,
Sapphiri,
Smaragdi, singulorum grana vi-
ginti quinque.

Succini,
Corallii albi,
— rubri,
Margaritarum orientalium,
Aegagropilae occidentalis,
— orientalis,
singulorum drachmam unam.

Fiat pulvis subtilissimus. — Ein lä-
cherliches Präparat, welches nöthigenfalls
durch das vorübergehende ersetzt werden wür-
de. — Gabe, von einem Scrupel bis zur
halben Drachme.

Pulvis cephalicus Camerarii. (Wir.)

℞. Cinnabaris . . . semidrachmam.
Crystalli mineralis,
Succinij praeparati,
Ungulae Alces,
singulorum drachmam unam.
Cornu Alces absque igne praepa-
rati,
— Cervi absque igne praepa-
rati, singulorum drachmas tres.
Cranii Hominis praeparati
drachmas sex.

Sacchari albi . . . sesquiunciam.

Fiat pulvis. — Nicht weniger lächer-
lich als das vorige und durch den pulvis
analepticus zu ersetzen. — Gabe, von ei-
nem halben bis zu drei Scrupel.

*Pulvis epilepticus ruber s. ad gutteturam
s. antiepilepticus.* (Sax. Wir. Bo.
Pie.)

℞. Cinnabaris nativae,
Succini praeparati,

Unicornu marini,
singulorum unciam unam.

Radiciis Paeoniae,
Corallii rubri,
singulorum uncias duas.

Fiat pulvis. (Wir.) — Gabe, von ei-
nem halben Scrupel bis zur halben Drach-
me.

℞. Radiciis Paeoniae,
Cornu Cervi,
Succini praeparati,
singulorum semunciam.

Castorei . . . drachmam unam.
Cinnabaris . . . drachmas duas,
Fiat pulvis subtilissimus. (Sar.)

℞. Radiciis Paeoniae,
— Valerianae sylvestris,
singulorum unciam unam.

Seminum Rutae,
Myrrhae,
Castorei,
Succini albi,
singulorum semunciam.

Cinnabaris uncias duas.
Fiat pulvis. (Bo. Pie.)

℞. Visci querni,
Cinnabaris,
Ungulae Alces,
singulorum drachmas duas.

Cranii Hominis absque igne prae-
parati semunciam.
Fiat pulvis. (Wir.) — Gabe, einen
halben Scrupel bei Kindern und von ei-
nem Scrupel bis zur halben Drachme bei
Erwachsenen.

*Pulvis cephalicus ruber, Specificum ce-
phalicum.* (Li. Wir. Sp.)

℞. Cinnabaris uncias tres.
Radiciis Paeoniae . . . sesquiunciam,
Cranii Hominis,
Ungulae Alces,

Cornu Cervi absque igne praepa-
rati,
Smaragdi praeparati,
Corallii rubri praeparati,
singulorum drachmas duas.

Margaritarum orientalium praepa-
ratarum,
Unicornu marini,
Succini praeparati,

singulorum semidrachmam.
Trituratis diu fiat pulvis subtilissi-
mus. (Wir.)

Sp. Cinnabaris uncias tres, Paeoniae
sesquiunciam, Smaragdi drachmas duas,
Ungulae Alces drachmam unam, Cra-
nii Hominis scrupulos duos, Corallii et
Cornu Cervi tantidem et Unicornu,
Margaritarum et Succini, singulorum
scrupulum unum.

℞. Cinnabaris,
Succini albi,

Unicornu marini,
Dentium Hippopotami,
singulorum semidrachmam.
Cranii Hominis drachmam unam.
Ungulae Alces,
Corallii rubri,
Chrysolithi,
Smaragdi,
Margaritarum praeparatarum,
singulorum scrupulos duos.
Seminum Paeoniae,
Cornu Cervi absque igne parati,
singulorum sesquidrachmam.
Visci querni . . . drachmas duas.
Radici Paeoniae . . . drachmas sex.
Foliorum Auri no. 2.
Fiat pulvis subtilissimus. (Wir.) —
Dieses Präparat ist noch lächerlicher als die
beiden vorhergehenden. — Gabe, von ei-
nem Scrupel bis zur halben Drachme.

Li. hanc formulam correctam ita indicat:

℞. Cinnabaris praeparatae,
Magnesiae albae,
singularum unciam unam.
Pulveris Visci,
— Paeoniae,
singulorum semunciam.

Fiat pulvis subtilissimus. — Gabe,
von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

*Pulvis antispasmodicus s. nitrosus cin-
nabarinus s. salinus compositus s. tem-
perans ruber s. Stahlii.* (Ams. B. Bel.
Br. Gal. Li. O. Pal. Wir. Ca. Fi. Pie.
Sa. Sw. Vm.)

℞. Cinnabaris partem unam.
Nitratis Potassae partes quatuor.
Sulphatis Potassae partem unam.
Miscer trititando. (B. Bel.)

Ams. et Vm. Cinnabaris partem unam
et quatuor cujusque Salium; — Sw.
Cinnabaris unam, sedecim Nitri et octo
Sulphatis; — Vm. Cinnabaris unam et
Salium, singulorum sedecim; — O.
Cinnabaris unam et duodecim cujusque
Salium; — Fi. Cinnabaris duas et tres
Salium; — Gal. Ca. et Pie. Cinnaba-
ris duas et novem Salium cujusque, —
Li. et Wir. Cinnabaris tres et cujusque
Salium sedecim.

℞. Cinnabaris partem unam.
Concharum praeparatarum,
Kali nitrici,
— sulphurici,
singulorum partes duas.

Fiat pulvis. (Vm.)

Pal. Nitri drachmas sex, Sulphatis,
Concharum, singulorum tantidem et
tres Cinnabaris.

℞. Cinnabaris partem unam.
Oculorum Cancri . . . partes sex.
Miscer trititando. (Sa.)

℞. Cinnabaris porphyrisati
partes quinque.

Oculorum Cancrici,
Corallii rubri praeparati,
singulorum partes octo.

Matris Perlarum praeparatae,
Kali sulphurici,
singulorum partes sedecim.

— nitrici partes triginta duas.
Fiat pulvis tener. (Br. Wir.)

Dieses Pulver ist offenbar reizend; den-
noch hat es lange Zeit als ein kühlendes,
die Hitze im Blute zu mäßigen und die ver-
änderten Feuchtigkeiten der ersten Wege zu
verbessern geeignetes Mittel in Ansehen ge-
standen. Die Gabe ist wegen der Mannich-
faltigkeit seiner Zusammensetzung schwer zu
bestimmen; nach der letztern Formel ist sie
ein bis zwei Scrupel.

Potio temperans. (Sm.)

℞. Pulveris temperantis Stahlis grana
duodecim ad quindecim.

Emulsionis simplicis . . . uncias sex.
Syrupi Althaeae vel Ribium

unciam unam.
Aquae Florum Aurantii

drachmas quatuor.

Misce.

Im Anfang hitziger Krankheiten empfoh-
len. Es kann aber in diesem Falle wegen
der dadurch bebingten Reizung nur schaben
und verbietet daher den gegebenen Namen
nicht.

Bolus ruber s. cinnabarinus. (Sa. Sw.)

℞. Cinnabaris scrupulum unum.
Conservae Rosarum grana quatuor.

Fiat bolus. (Sw.)

Sar. Conservae Aurantii; Sulphureti
mercurialis antimonialis, singulorum
drachmam unam, ut fiat pulvis, cui
addi potest, si requiritur, Moschi vel
Serpentariae Virginicae scrupulus unus.

Diese Bissen sind bei Kopfschmerz und
bei veralteten, sogenannten nervösen Affe-
ctionen gepriesen worden.

B. Cinnabaris semigranum et Roob
Juniperi grana sex, fiat bolus. — Sol-
len mit Erfolg in einem Fall von Bauch-
wassersucht, vier Stück täglich, gegeben
worden seyn.

Boli diaphoretici. (Sm.)

℞. Cinnabaris scrupulum unum.
Camphorae scrupulos duos.

Theriacae unciam unam.

Syrupi Capilli Veneris vel Dianthi
quantum sufficit

ut fiat massa in bolos viginti quatuor
dividenda. — Täglich drei Stück, indem
man zugleich einen sehr warmen Aufguss
von grünem Thee oder Flieder trinkt.

Pilulae Conti cinnabarinæ. (Au.)

℞. Cinnabaris,
Extracti Millefolii,
— Cicutae,
singulorum drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum —
Gabe, sieben Stück Morgens und Abends,
bei venerischen Drüsenanschwellungen.

Trochisci mercuriales. (Sp.)

℞. Cinnabaris porphyrisatae
scrupulos duos.
Succini præparati
scrupulum unum.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit
ut fiant trochisci magnitudinis arbitra-
riae. — Zu Innoberräucherungen.

Ceratum rubrum. (Sw.)

℞. Cinnabaris . . . grana quindecim.
Resinae flavae . . . semunciam.
Cerae flavae,
Axungiae Porci,
singulorum semilibram.

Cinnabarem pulveratam cum reli-
quis fuis et mixtis commisce. — Rei-
zend, austrocknend, zum Verbinden von Ge-
schwüren.

Unguentum nigrum. (Vm.)

℞. Cinnabaris . . . partes tres.
Hydrosulphatis Plumbi
partem unam.
Medullae bubulae partes duodecim.
Misce triturando.

Unguentum Sulphureti Hydrargyri sublimati s. cinnabarinum. (C.)

℞. Cinnabaris . . . uncias duas.
Lithargyri . . . uncias quatuor.
Cerussae . . . sesquunciam.
Mercurii dulcis . . . drachmas duas.
Seorsim pulverata misce et cum mix-
tura liquata e
Cerae flavae . . . uncias sex,
Olei Rosarum . . . Libris duabus
intime commisce.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (Sm.)

℞. Cinnabaris . . . drachmam unam.
Camphorae . . . scrupulum unum.
Cerati communis unciam unam.
Contere. — Von Alibert oft mit
Erfolg zum Verbinden von Flechten ange-
wendet; man wiederholt die Anwendung
wenigstens zweimal täglich.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (Ra.)

℞. Cinnabaris . . . sesquidrachmam.
Salis Ammoniaci semidrachmam
Axungiae Porci . . . uncias duas.

Trituratis simul adde

Aquae Rosarum drachmam unam.
Besonders bei Phthiriasis empfohlen, um
das Jucken zu mäßigen und die Erzeugung
des Ungeziefers zu mindern.

Electuarium antiarthriticum. (Ca.)

℞. Cinnabaris . . . sesquunciam.
Conservae Rosarum uncias duas.
Resinae Guajaci pulveratae
unciam unam.

Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Bei rheumatischen Schmerzen ohne Fie-
ber empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel,
täglich zweimal.

Electuarium purgans. (Ra.)

℞. Sulphureti Mercurii nigri,
Pulveris Jalapae,
singulorum drachmas duas.
Scammonaei . . . drachmam unam.
Scillae,
Resinae Jalapae,
singularum sesquidrachmant.
Syrupi Rhamni
sufficientem quantitatem.

Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen. —
Von Fouquier bei Wassersucht und Ko-
lik von Metall angewendet.

Sparadrap rubrum. (Vm.)

℞. Cinnabaris porphyrisatae
partem unam.
Admisce intime mixturae liquatae e
Terebinthinae . . . partibus sex.
Cerae albae . . . partibus duodecim.
Linteum massae immerge, quod tunc
laevigetur.

*Extractum Opii cinnabarinum, Lau-
danum cinnabarinum. (His.)*

℞. Extracti Opii aquosi drachmas sex.
Crocii pulverati,
Cinnabaris porphyrisatae,
singulorum drachmas tres.
Fiat cum Aquae paxillo massa in
trochiscos dividenda.

*Protochloruretum Mercurii, Antiquar-
tium; Aquila alba s. mitigata, Calome-
lanos, Chlorureum Hydrargyri, Draco
mitigatus, Hydrochloratum Deutoxydi
Mercurii, Hydrargyrum muriaticum dul-
cis s. oxydulatum s. muriaticum mitis s.
dulcis, Hydrargyrum muriaticum mite,
Mercurius dulcis s. muriaticus s. prae-
cipitatus albus s. sublimatus dulcis, Mu-
rias Hydrargyri oxydulati s. mitis s.
suboxygenatus s. hydrargyrosus mitis s.
Oxyduli Hydrargyri mitis, Manna me-
tallorum, Panchymagogum mineralé,
Panchymagogus Quercetanus, Protochlo-
ruretum Hydrargyri, Submurius Hydrar-
gyri s. Hydrargyri mitis s. praecipita-*

Wir. et Sw. ferè eandem formulam. — Die folgende ist eine Modification derselben.

R. Nitratis Mercurii crystallisati,
Mercurii,
singulorum partem unam.
Salis communis dimidium pondus
mixturae. Tritura in mortario vitro
ad extinctionem metalli usque et sub-
lima. (Br.)

3) Verfahren Hermstädt's.

R. Deutosulphatem Mercurii non ablu-
tum, desfillando in retorta ad sic-
cum Mercurii uncias sex et di-
midiam et Acidi sulphurici qua-
tuor obtentum.

Mercurii uncias tres cum dimidia.
Trituratis ad extinctionem metalli
usque adde deinde
Salis communis

uncias quinque et dimidiam.

Misce bene triturando et sublima.
(GalH. Br. C.)

Fer. Mercurii partes duodecim, Aci-
di sulphurici quatuordecim, salis pul-
verationem cum Mercurii partibus duo-
decim, mixtionem massae hoc modo
obtenta partium octo cum tribus Salis
decrepitati et sublimationem; — *Fi.*
Mercurii uncias viginti, Acidi sulphu-
rici uncias decem; mercurii unciæ de-
cem cum acido sulphurico commixtae
in balneo arenae ad siccum destillen-
tur et massa igne vehementer aucto
bene exsiccetur. retorta diffracta mas-
sae in mortario marmoreo reliquae de-
cem unciae Mercurii et Salis marini
decrepitati tres ponderis octantes ad-
dantur, quo facto mixta et subtilissime
pulverata in lagena vitrea pro tertia
parte replenda in balneo arenae igne
per horas quinque nutrito sublimentur
etc.; — *T.* Sulphatis Protoxydi Mer-
curii, Mercurii et Salis communis de-
crepitati, singulorum uncias viginti,
caeterum idem ut GalH. agendij mo-
dus.

R. Mercurii,
Acidi sulphurici,
singulorum uncias quatuor.

Acidum guttatum metallo instilla in
retortam vitream ingesto, quae in bal-
neo arenae calefiat, donec mixtura in
massam albam sit conversa. Apparatu
refrigerato sal pulveratum ad perfectam
metalli usque extinctionem tritura cum
Mercurii

unois duabus cum dimidia.

Adde deinde

Salis marini decrepitati
uncias quatuor et dimidiam.

Mixta calefac pedetentim, donec to-
tum sit sublimatum; productum pul-
veratum iterum sublima. Massam de-

nuo subtilissime pulveratam coque per
horam unam cum dissolutione
Salis Ammoniaci

unciae unius et dimidiae
in Aquae destillatae libris quinque;
filtrato deinde liquore, pulverem Aqua
destillata lotum lente super charta jo-
sephina sicca. (Li.)

LonN. Mercurii libras duas cum
Acidi sulphurici unciis triginta in vase
vitreo coque ad exsiccationem; refri-
gerata cum Mercurii libris duabus in
mortario fictili conterè, ut optime mis-
ceantur, adde Salis marini sesquilibrium
et tere ad extinctionem usque, tum
sublima, sublimatum in pulverem sub-
tilissimum contere, per cribrum trans-
mitte et cum Ammonii muriatici unciis
octo in Aquae destillatae ferventis con-
gio prius liquefacti diligenter misce,
sepone ut subsideat pulvis, liquorem
effunde et pulverem Aqua destillata
fervente saepius abluè, donec Liquore
Ammoniae instillato nihil dejiciatur,
fiat pulvis subtilissimus.

Das salzsaure Quecksilberoxyd ist ein sehr
gebräuchliches Präparat, besonders in Eng-
land, wo es, wie es scheint, als eine Art
Panacee betrachtet wird. In hohem Grade
reizend, wirkt es alterierend, wurmtreibend,
krampfstillend, reinigend, schweiß- harntrei-
bend, als Niesmittel, schmelzend, abfüh-
rend, auflösend oder die Speichelercretion
befördernd, je nach Verschiedenheit der Ga-
be, der Anwendungsweise, der stattfindenden
Umstände, der Constitution des Sub-
jects und der Substanzen, mit welchen man
es verbindet. Besonders hat man es ge-
priesen bei wirklich venerischen oder als sol-
che betrachteten Krankheiten, bei Scro-
phelkrankheit, chronischer Leberentzündung,
convulsivischen Krankheiten, rheumatischen
Schmerzen, veralteten Krankheiten des Haut-
gewebes und hartnäckiger Verstopfung.

Im Allgemeinen wirkt es bloß alterierend,
d. h. als reizendes oder aufregendes Re-
sultivmittel, in der Gabe von einem bis
fünf Gran; von fünf zu fünfzehn Gran
genommen, führt es ab.

Man darf weder Chlor, noch Salpeter-
säure, keine Alkalien, keine kohlensauren
Salze oder ihre Schwefelverbindungen, weder
Kalkwasser, noch Kupfer, und eben so wenig
Eisen und Blei damit verbinden, da es da-
durch zerlegt wird.

§. I. Präparate, in denen die Wir-
kung des salzsauren Quecksilber-
oxyds durch nichts oder wenigstens
nicht merklich verändert wird.

Pulvis e Mercurio dulci. (DD. Sw. Sy.)
R. Mercurii dulcis . . grana duo.

Amyli pulverati scrupulum unum.
Misca. (DD.)
℞. Mercurii dulcis
granum unum ad duo.
Sacchari pulverati
grana quindecim.

Misce. (Sy.)
℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Pulveris Amyli grana duodecim.
— Sacchari albi semidrachmam.

Misce bene. (Sw.)
Alle diese Pulver können auf eine einzige Gabe angewendet werden. Bei venerischen Krankheiten jüngerer Kinder hat man das Folgende empfohlen:

℞. Mercurii dulcis granum unum.
Sacchari pulverati
scrupulum unum.

Misce sedulo et in partes tres divide per diem sumendas.

Eine Mischung von zwei Drachmen mercurius dulcis mit einer halben Unze Zucker und ebensoviel Weisbrot kann in Räucherungen; eine oder zwei Drachmen auf die Räucherung, in manchen Fällen von venerischen Krankheiten von Nutzen seyn. Eine andere Mischung von vier Gran Calomel und einem halben Scrupel Armenischen Bolus, in vier Theile für den Tag getheilt, ist, nach Clares und Brachet's Methode, in Einreibungen auf das Zahnfleisch, die innere Fläche der Rippen, die Zunge und den Gaumen vorgeschlagen worden.

Remedium antitaeniosum, Pulvis vermifugus. (Au.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Cornu Cervi calcinati,
Cinnabaris,
singulorum grana decem.

Alle vier oder fünf Stunden Nachmittags zu nehmen, den Abend trinkt man zwei Unzen Süßmandelöl; den folgenden Morgen nimmt man nüchtern, in Syrup, den dritten Theil eines Pulvers aus einer Drachme Farnkraut, einer halben Drachme Jalappe, ebensoviel Carbenedicten und thierischer Kohle; wenn der Bandwurm nicht abgeht, so nimmt man nach zwei Stunden das zweite, und zwei Stunden später das letzte Drittel. — Von Beck vorgeschlagen.

Injectio ex Muriate Hydrargyri s. e Mercurio dulci. (Sy.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.
Aque destillatae . . . uncias octo.

Bei hitziger Harnröhrenentzündung empfohlen, aber höchstens bei manchen chronischen Harnröhrenentzündungen von Nutzen. Folgende Formel von Lagneau ist vorzüglichster:

℞. Mercurii dulcis porphyrisati
semunciam.
Solutiois Gummi Arabici
uncias duodecim.

Gargarisma antivenericum. (Sy.)

℞. Gummi Arabici drachmam unam.
Decocti Hordei . . . uncias quinque.
Solutiois adde
Syrupi Althaeae . . . sesquiunciam
et tunc admisce, bene agitando
Mercurii dulcis pulverati
grana quindecim.

Enema s. Clyster mercuriale. (Au.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Amyli,
Gummi Arabici,
singulorum semunciam.

Aque uncias octo.
Misce triturando.

Lotio Veratri mercurialis s. antipsorica. (Au.)

℞. Decocti Hellebori albi uncias octo.
Mercurii dulcis drachmam unam.
Nitri drachmas duas.
Salis Ammoniaci . . . uncias duas.
Ein schlechtes Präparat, welches Wilson als ein vortreffliches antipsoricum gepriesen hat.

Mixtura cum Calomelle. (Sa.)

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.
Syrupi Fumariae . . . uncias duas.
Aque Fumariae . . . libram unam.
Halbungen oder ungenweise.

Mel s Muriate Hydrargyri s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis. (Sw. Sy.)

℞. Mercurii dulcis pulverati
drachmam unam ad duas.
Mellis despumati . . . unciam unam.
Misce triturando. — Bei venerischen Halsgeschwüren empfohlen und bei denen der Geschlechtstheile der Salbe vorzuziehen.

Unguentum de Calomelle s. Mercurii dulci. (Sy.)

℞. Mercurii dulcis
drachmam unam ad duas.
Cerati albi absque aqua vel Mellullae bovinæ . . . unciam unam.
Mixturem per horae quadrantem continua. — Bei venerischen Krankheiten, in Einreibungen auf die Haut oder bloß auf die kranke Stelle derselben aufgeschlagen, anzuwenden.

℞. sub eodem nomine indicat pomatum sequens: Mercurii dulcis scrupulos duos, Unguenti basilici unciam unam. — Marryanus rühmte sie bei verschiedenen pustulösen Affectionen der Haut und bei Ausfluß.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum.
(Ra.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.

Unguenti Rosarum drachmas tres.
Dieser ähnlich ist das von Dupuytren
gebrauchte *Pomatum antiherpeticum angli-*
cum (Pie.): Mercurii dulcis drachmam
unam, Axungiae vel Unguenti populei
uncias quatuor; — es ist aber weniger
wirksam.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum.
(Ra.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.

Florum Sulphuris drachmas duas.
Axungiae depuratae unciam unam.
Bon Fougquier empfohlen.

Injectio ad carnem luxuriantem ure-
thrae. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.

Olei Scorpionum unciam unam.
Balsami tranquilli uncias duas.

Nach dem Urinlassen spritzt man unge-
fähr einen großen Fingerhut voll von dieser
Mischung in die Harnröhre und behält sie
wenigstens fünf Minuten lang bei sich.
Dieses wiederholt man einen Monat lang
täglich dreimal. Diese sonderbare Zusam-
mensetzung, welche gegen Fleischauswüchse
der Harnröhre nutzlos ist, da diese selbst
nur auf der Einbildung beruhen, könnte in
manchen Fällen von chronischer hartnäckiger
Harnröhrenentzündung von Nutzen seyn.

Bolus e Muriate Hydrargyri s. Mercurio-
dulci. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis

grana quinque ad decem.

Syrupi simplicis

quantitatem sufficientem

ut fiat cum pulvere Lycopodii bolus
unus. — Soll bei Wasserkopf von Nuz-
zen seyn.

Boli anthelmintico-tonici. (B.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.

Extracti Absinthii

drachmam unam.

Fiant boli quatuor. — Auf einmal.

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.

Extracti Seminis Cinae

drachmam unam.

Fiant boli quatuor. — Alle zwei Stun-

den ein Stück.
Man empfiehlt sie bei Würmern mit et-
was Atonie im Darmcanal.

Boli anthelmintico-nervini. (B.)

℞. Mercurii dulcis

grana quatuor ad octo.

Extracti Valerianae scrupulos duos.

Fiant boli quatuor. — Gabe, alle drei
Stunden ein Stück, bei Wurmkrankheiten
mit nervösen Symptomen.

Pilulae ex Hydrargyro muratico miti
s. e Mercurio dulci. (DD. WW. Au. E.
Ra.)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.

Conservae Rosarum

quantum sufficit

ut fiat pilulae duodecim. (Sar.)

℞. Mercurii dulcis,

Extracti Aconiti,

singulorum drachmam unam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit

ut fiat pilulae centum viginti. (Au.)

℞. Pulveris Mercurii dulcis,

— Micae Panis siccatae,

singulorum semidrachmam.

Aquaе sufficientem quantitatem

ut fiat pilulae triginta, lycopodio con-

spergendae. (DD.)

℞. Mercurii dulcis,

Pulveris Althaeae,

singulorum partes aequales.

Syrupi simplicis quantum sufficit

ut fiat pilulae granorum duorum. (Ra.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.

Succi Liquiritiae pulveratae

sesquidrachmam.

Aquaе quantum sufficit

ut fiat massa, in pilulas sexaginta di-

videnda. (WW.)

Die Gabe dieser Pillen ist je nach der
Bezwirkten Wirkung, nach der Constitution
und nach ihrer eignen Zusammensetzung ver-
schieden; in den ersten ist ein halber, in
den zweiten ein ganzer und in den letzten
bloß ein Viertelgran merc. dulc. enthalten.

Pilulae antiictericae. (Ca.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.

Extracti Saponariae

drachmas duas.

Misce ut fiat massa in pilulas sexa-
ginta dividenda. — Zwei Stück täglich
drei oder vier Mal.

Pilulae resolventes (B.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.

Extracti Taraxaci grana octodecim.

Fiant pilulae quatuor. — In vier
und zwanzig Stunden bei Unterleibsver-
stopfungen zu nehmen.

Pilulae antisymphiliticae et resolventes. (B.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.

Extracti Dulcamarae

quantum sufficit

ut fiat pilulae quatuor. — Den Tag

über zu nehmen.

Bolus ex Sabina s. emmenagogus. (Au.)

℞. Mercurii dulcis grana duo.

Extracti Sabinae grana quatuor.

Syrupi Rhoeados

quantitatem sufficientem.

Fiat bolus unus. — Von Perfect

mit Nutzen bei Manie von Amenorrhoe angewendet.

Pilulae alterantes. (Sa.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Electuarii Scordii drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiant pilulae septuaginta duae.

Pilulae purgantes. (Am. HassP. C.)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Saponis Alicantini
scrupulum unum.

Aquae sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae quadraginta. (Am. C.)
Dieses Präparat muß wegen der Einwirkung der Seife auf das Quecksilber, welches dadurch zerlegt wird, verworfen werden.

℞. Saponis jalappini . partes octo.
Mercurii dulcis . partem unam.
Tincturae Corticum Aurantium
sufficientem quantitatem.

Fiat massa in pilulas ponderis granorum dividenda. — Gabe, für einen Erwachsenen sechs, zwölf bis achtzehn Stück. (HassP.)

Pilulae de Vigarous. (Bo. Pic. Sm.)

℞. Mercurii . . drachmas quatuor.
Sublimati corrosivi
drachmas duas.

Tritura, addendo Succu Citri guttas aliquot, donec metallum sit extinctum et adde deinde

Amyli Tritici . uncias quinque.
Fiat cum Succo Citri massa in pilulas duorum granorum dividenda.

Ein schlechtes Präparat, wegen der ungesüßern Einwirkung des Sublimats und des Calomels auf einander und wegen der Gefahr, den erstern unzerlegt zu geben. Vigars gab anfangs täglich eine Pille und stieg allmählig bis zu drei Morgens und Abends.

Boli in pertussi. (R.)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Belladonnae grana duo.
Terebinthinae . . . grana sex.
Mellis despumati,
Pulveris Liquiritice,
singulorum quantum sufficit
ut fiant boli octo. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück für ein Kind von acht bis zehn Jahren.

Pilulae antivenerae. (Pic.)

℞. Mercurii,
Sublimati corrosivi,
singulorum semunciam.
Radice Pyrethri,
Sennae pulveratae,

Agarici albi,
singulorum unciam unam.
Mellis Narbonnensis

quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum sex. — Von ihnen gibt dasselbe, was von den vorhergehenden gesagt wurde.

Rotulae vermifugae. (Sp.)

℞. Mercurii dulcis . uncias duas.
Sacchari cum Succo Berberidis ad aptam consistentiam decocti
uncias quatuor.
Misce ut fiant rotulae.

Trochisci vermifugi Barthezii. (Bo. Ca. Pic.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilaginis Gummi Arabici
sufficientem quantitatem
ut fiant trochisci magnitudine monetae franc dictae. — Man giebt davon Kindern ein oder zwei, Erwachsenen sechs oder acht Stück.

Trochisci anthelmintici doctoris Ching. (Au.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sacchari albi . drachmas decem.
Essentiae Croci . guttas viginti.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiant trochisci centum viginti. — Gabe, zwei oder drei Stück.

Dragae vermifugae. (Pic.)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Sacchari . . . unciam unam.
Amyli . . . semunciam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae,
Essentiae Bergamottae, singulorum sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae centum quadraginta quatuor ovoideae. — Morgens und Abends ein Stück.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Calomels mehr oder weniger durch fremde Substanzen modificirt ist, nämlich:

A. Durch Aloe.

Opiatum purgans s. purgativum. (Pic.)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Aloës,
singulorum semiscrupulum.
Kali subcarbonici . grana duo.
Syrupi Fumariae
sufficientem quantitatem.

Dieses Präparat ist zu verworfen, weil das Salz einen Theil des Quecksilbers zerlegt.

Pilulae anthelminticae. (Ful. Ham. Au.)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Aloës gummosi,
singulorum scrupulum unum.
— Juglandis,
Asae foetidae,
singulorum scrupulos quatuor.
Essentiae Tanaceti quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Ful. Ham.)

℞. Mercurii dulcis,
Aloës Socotrinae,
Resinae Jalapae,
singulorum drachmam unam.
Tincturae Rhei quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum duorum.
(An.)

Wurmtreibend, Krampfstillend, schmelzend
und laxirend. — Gabe, sechs bis zwanzig
Gran.

Pilulae anthelminticae purgantes. (Ful.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana tria.
Extracti Aloës gummosi,
— Rhei,
— Tanaceti,
singulorum grana sex.
Tincturae Tanaceti
sufficientem quantitatem.
Auf einmal zu nehmen, für einen Er-
wachsenen.

Boli drastici. (Bo Pic.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Aloës Socotrinae,
Scammonae Aleppensis,
singulorum grana sex.
Rhei pulveratae grana quindecim.
Pulpaе Cassiae
sufficientem quantitatem.

Bei rheumatischen Affectionen und Hüft-
weh empfohlen, wegen der heilsamen Ab-
leitung, welche sie bisweilen bewirken,
indem sie Stuhlaussäuerungen und Hämor-
rhoidalfluß hervorrufen.

*Pilulae ad variolam s. prophylacticae
ad variolam.* (Pie. Sp.)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Aloës,
singulorum grana duodecim.
Camphorae . . . grana octo.
Resinae Guajaci grana sedecim.
Fiat massa in pilulas granorum duo-
rum dividenda.

Rosenstein empfiehlt sie als Schutz-
mittel vor Blattern und als Vorbereitungsmittel
zu der Inoculation derselben. — Die Gabe
ist nach dem Alter des Subjects verschieden.

B. Durch Spießglanzpräparate.

*Pulvis alterans Plummeri s. Edinburgensis
s. mercurialis antimoniatu s. ex
Pharmacopoea universalis.* II.

*Hydrargyro muriatico miti cum Sulphure
Stibii aurantiaco s. Hydrargyri
stibiatu.* (B*. Ba. BorC. Br. D. DD.
Fer. Ful. GalM. Ham. Han. HassP. Li.
R. Wir. Au. Ca. Huf. Ra Sp. T)

℞. Mercurii dulcis porphyrisati,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partes aequales.
Diu tritura ad obtinendum pulverem
subtilissimum. (Ba. Br. D. Fer. Ham.
Han. HassP. Li. R. Wir. Ca. Sp. T.)

℞. Mercurii dulcis . . . partem unam.
Sulphuris aurati Antimonii
partes duas.

Misce trititando. (Ful)
℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partem unam.
Sacchari albi . . . partes novem.
Tritura simul. (Ra.)

Huf. Mercurii dulcis semiscrupulum,
Sulphuris aurati tantidem et Sacchari
drachmas tres.

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partem unam.
Gummi Arabici . . . partes decem.
Misce bene terendo. (GalM)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partem unam.
Sacchari albi,
Amyli, singulorum partes decem.
Terendo misce intine. (DD)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris Antimonii aurati,
singulorum partem unam.
Gummi Arabici partes quinque.
Sacchari albi . . . partes octo.
Fiat pulvis subtilissimus. (B*.)

Au. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati,
singulorum partem unam, Gummi quin-
que et decem Sacchari.

Obgleich dieses reizende Präparat als
schmelzendes, alterirendes und reinigendes
Mittel bei Scropheln und venerischen,
besonders Hautkrankheiten sehr in Ansehen
gestanden, so darf man sich doch nicht sehr
darduf verlassen. Die Einwirkung seiner
beiden Bestandtheile auf einander macht
dasselbe, so wie alle Präparate, zu denen
es kommt, zu einem sehr unsichern Mittel.
— Gabe, sechs, acht und zehn Gran von
gleichen Theilen des Gemisches ohne fremde
Substanzen.

*Pilulae Plummeri s. alterantes Plum-
meri simplices s. ex Stibio et Hydrar-
gyro s. ex Hydrargyro muriatico miti
cum Sulphure stibiatu aurantiaco s. an-
titherpeticae s. ex Protochlorureto Mer-
curii cum Sulphure aurato Antimonii.*

(B*. Ful. Gen. Ham. Lus. RC. WW.
Au. Ca. R. Sp. Sw.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partes aequales.
Extracti Liquiritiae

quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas granorum trium
dividenda. (Sw.)

Ca. Mercurii dulcis uncias tres, Sulphuris aurati tantidem, Succu Liquiritiae depurati drachmas duas et Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit ut fiat massa in pilulas granorum sex dividenda; — Au. Mercurii dulcis grana quindecim, Sulphuris aurati tantidem et Succu Liquiritiae drachmam unam ut fiant pilulae granorum duorum; — B*. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum drachmas duas, Extracti Liquiritiae scrupulos quatuor et Mucilaginis Gummi Arabici sufficientem quantitatem; — Ham. Sulphuris aurati semidrachmam, Mercurii dulcis grana quindecim, Extracti Erysimi drachmam unam et Pulveris Liquiritiae quantum satis ut fiat massa in pilulas quadraginta quinque dividenda; — Sp. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum drachmas duas, Extracti Gentianae drachmas quatuor; — RC. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum partes tres, Extracti Gentianae vel amari, Saponis oleosi, singulorum partem unam et si opus, Syrupi simplicis quantum satis ut fiat massa; — Lus. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum drachmas sex et Extracti Liquiritiae quatuor; — WW. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum grana quindecim et Extracti Conii maculati sesquidrachmam ut fiant pilulae sexaginta; — Ra. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum semidrachmam, Extracti Cicutae semunciam et Pulveris Cicutae quantum sufficit ut fiat massa in pilulas triginta sex dividenda; — Gen. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, singulorum scrupulum unum, Roob Sambuci sufficientem quantitatem ut fiant pilulae viginti quatuor.

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Sulphuris aurati Antimonii

semidrachmam.
Extracti Cicutae drachmas duas.

Balsami Copaivae quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Ful.)

Pilulae diaphoreticae (Sm.): Mercurii dulcis, Kermetis mineralis, singulorum scrupulos duos, Syrupi Capilli Veneris quantum sufficit ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda.

Pilulae resolventes Finkii. (Sm.)

℞. Pulveris Plummeri

grana duodecim.
Extracti Taraxaci . . . grana tria.
Gummi Ammoniaci . . . grana duo.
Scillae pulveratae semidrachmam.

Misce ut fiant pilulae trium granorum. — Fünf Stück täglich drei oder vier Mal, und Sichorienthee nachzutrinken. — Besonders nach Wechselniebern und Anschoppungen in den Eingeweiden des Unterleibs mit Dehem der Käse.

Pulvis alterans s. Plummeri compositus.
(Hass. Wür. Pid.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sulphuris aurati Antimonii
drachmam unam.

Resinae Guajaci sesquidrachmam.
Fiat pulvis. (Hass. Pid.)

Wür. Trium harum substantiarum partes aequales et resinam cum aequali Sacchari quantitate triturare.

Pulvis basilicus. (Sa.)

℞. Mercurii dulcis,
Antimonii diaphoretici abluti,
Scamponi Aleppensis,
Cremoris Tartari,
singulorum grana quinque.

Misce exacte.

Pilulae Plummeri s. Submuriatis Hydrargyri compositae s. resolventes cum Mercurio s. depurantes. (Am. B*. BorC. Hass. Lon. LonN. R. Sar. Wir. Wür. Au. Pid. Sp. Sw. Vm.)

℞. Pulveris alterantis simplicis
semunciam.

Resinae Guajaci drachmas quatuor.
Balsami Copaivae quantum sufficit
ut fiat massa, e cujus drachma quaque pilulae duodecim formantur. (Wir.)

℞. Balsami Copaivae partem unam.
Resinae Guajaci partes duodecim.
Contere, addendo sensim

Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,

singulorum partes sex.
Alcoholis . . . quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum grana quinque.

Succu Liquiritiae drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum. (Au.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.
Sulphuris aurati Antimonii
drachmam unam.

Resinae Guajaci,
Extracti Gentianae,
singulorum sesquidrachmam.

Commisce bene. (R.)

- ℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Resinae Guajaci,
singulorum drachmas duas.
Myrrhae . . . drachmam unam.
Balsami Tolu'ani
quantitatem sufficientem.
Fiant pilulae quinque granorum. (Sw.)
- ℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum partem unam.
Resinae Guajaci . . . partes duas.
Trituratis simul adde
Mucilaginis Gummi Arabici
sufficientem quantitatem.
Fiat massa pilularis. (Am. Ed. Lon.)
- C.)
LonN. loco mucilaginis Spiritus rectificati partis quadrantem addit.
- ℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum drachmas sex.
Trituratis simul adde
Resinae Guajaci,
Extracti Liquiritiae,
singulorum drachmas tres.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Wär.)
- ℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum scrupulos duos.
Extracti Dulcamarae,
Saponis guajacini,
singulorum semunciam.
Misce ut fiant pilulae granorum duorum. (Bor.C.)
- ℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Resinae Guajaci,
singulorum partes aequales.
Extracti Fumariae,
Balsami Copaivae,
singulorum quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. (Au.)
- ℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sulphuris aurati Antimonii
drachmam unam.
Resinae Guajaci sesquidrachmam.
Alcoholis quantitatem sufficientem.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, ein bis vier Stück. (Au.)
- ℞. Saponis guajacini,
Extracti Dulcamarae,
singulorum semunciam.
Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum scrupulos duos.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, sieben bis funfzehn Stück, Morgens
und Abends. (Au.)
- ℞. Saponis guajacini sesquidrachmam.
Mercurii dulcis,

- Sulphuris aurati Antimonii,
Radix Polygalae Virginicae,
Camphorae,
singulorum grana quindecim.
Aceti scillitici
sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, wie bei den vorhergehenden. (Au.)
- Pilulae anthelminticae. (Au.)*
- ℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Extracti Rhei compositi,
Asae foetidae,
singulorum drachmam unam.
Fiant pilulae grani unius cum dimidio. —
Gabe, Morgens vier Stück und
täglich um zwei gestiegen.
- Pilulae resolventes. (Sw.)*
- ℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Ferri sulphurici,
Myrrhae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Sacchari
sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae trium granorum. —
Bei Anschoppungen in den Unterleibsge-
weiben nach Wechselstößen. — Gabe, Mor-
gens und Abends vier Stück.
- Pilulae resolventes. (Sa.)*
- ℞. Mercurii dulcis sem drachmam,
Sulphuris aurati Antimonii,
Camphorae,
singulorum scrupulum unum.
Resinae Guajaci . . . semunciam.
Extracti Pimpinellae albae,
— Cicutae,
singulorum drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum.
- Pilulae antiherpeticæ. (Bo.)*
- ℞. Mercurii dulcis . . . grana decem.
Sulphuris aurati Antimonii
grana quinque.
Aethiopsis mineralis grana sexaginta.
Extracti Scabiosae grana triginta.
Syrupi Fumariae quantum sufficit
ut fiant pilulae quatuor granorum. —
Gabe, Morgens nächtern drei Stück und
bis auf sechs Stück täglich auf zwei Mal
gestiegen.
- Pilulae antiveneræe Kaempferi. (Sm.)*
- ℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum scrupulos duos.
Trituratis diu adde deinde
Extracti Saponariae,
Resinae Guajaci,
singulorum scrupulos quatuor.
Camphorae . . . semidrachmam.

Commisce cum

Theriacae sufficiente quantitate ut fiat massa in pilulas granorum duorum dividenda. — Gabe, sechs Stück, täglich drei Mal, mit einer starken Abkochung von China, Kletten- oder Cassaparrilmurzel, und allmählig bis auf zehn oder zwölf Gran gestiegen.

Pulvis Hydrargyri sibiatus cum Hyosciano s. antispasmodicus. (Au.)

℞. Mercurii dulcis,
Extracti Hyosciami,
singulorum granum unum.
Sulphuris aurati Antimonii

Sacchari . . . grana tria.
semidrachmam.
Morgens und Abends bei entzündlichen, asthenischen und Krampffranzheiten. — Besonderen Nutzen gewährt es bei Nyctalopie.

Pilulae sithenicae. (Ca.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Opii puri,
singulorum grana decem.
Kermets mineralis

Sacchari . . . grana quindecim.
quantum sufficit.
Fiant pilulae grani unius. — Bei Lungenschwindsucht, Wasserfuchten und Krämpfen empfohlen. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück.

Pilulae Antimonii compositae. (Br.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphureti Antimonii abluti,
singulorum drachmas tres.
Extracti Gentianae,
Saponis duri,
singulorum drachmam unam.

Trituratis mercurio et sulphureto adde extractum ut fiat cum saponem mollescat massa. — Ein schlechtes Präparat.

Pilulae antisiphiliticae. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis,
Kermets mineralis,
singulorum drachmas duas.
Resinae Guajaci drachmas quatuor.
Balsami Peruviani quantum sufficit ut fiat massa cuius drachma quaeque in pilulas duodecim dividatur. — Besonders bei chronischen vermuthlich siphilitischen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, drei Stück täglich auf drei Mal und allmählig bis auf sechs in vier und zwanzig Stunden gestiegen.

Pilulae resolventes. (B.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Kermets mineralis . . . grana duodecim.

[Roob Sambuci

sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, gegen das Ende von Lungenentzündungen und bei symptomatischem Husten von Würmern bei Kindern.

Pilulae succicae. (Ra.)

℞. Mercurii dulcis sesquidrachmam.
Kermets mineralis,
Aethiopis mineralis,
singulorum drachmam unam.
Micae Panis . . . quantum sufficit ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor. — Gegen Sphilitis.

Pulvis e Mercurio s. mercurialis. (Gen.)

℞. Mercurii dulcis . . . uncias duas.
Pulveris laxantis (e Tartari, Tartari emetici, singulorum drachma una et Sacchari drachmis viginti duabus) . . . unciam unam.
Magnesiae subcarbonicae . . . uncias quinque.

Misce.

Tabellae de Mercurio s. mercuriales. (Gen.)

℞. Mercurii dulcis porphyrisati . . . drachmam unam.
Pulveris laxantis (formulae antea dicta) . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici . . . drachmas duas.
Sacchari albi . . . drachmas tres.
Aquae Florum Aurantiorum . . . quantum sufficit ut fiant tabellae septuaginta duae, (Oleo Bergamottae aromatizandae. — Jede enthält einen Gran mercurius dulcis.

Pulvis diaphoreticus. (E.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum grana sex.
Resinae Guajaci drachmam unam.
Fiant doses sex. — Gabe, Morgens und Abends bei Hautkrankheiten.

Boli resolventes et incitantes. (B.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sedecim.
Kermets mineralis . . . grana octo.
Camphorae . . . grana triginta.
Roob Sambuci . . . quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei Entzündungen der Eingeweide mit Neigung zu Asthenie.

Pilulae antimonialia compositae s. Mercurii dulcis et Opii compositae. (Am. C. Sy.)

℞. Mercurii dulcis . . . semidrachmam.
Opii . . . grana quindecim.
Tartari stibiati . . . grana quatuor.
Conservae Cynorrhodi . . . sufficientem quantitatem

ut fiat massa in pilulas quindecim dividenda. (Sy.)

Am. et E. Mercurii dulcis drachmas duas, Opii drachmam unam, Tartari stibiati sorupulum unum et Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae sexaginta.

Pilulae Muriatis Hydrargyri oxydulati stibiatae. (R.G.)

℞. Tartari emetici grana quindecim.
Mercurii dulcis,
Camphorae cum aliquot guttis Alcoholis in pulverem redactae,
singulorum drachmam unam.
Opii semidrachmam.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum satis

ut fiat massa in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Rheumatische Schmerzen und syphilitische Knochenschmerzen. — Gabe, zwei Stück täglich zwei Mal.

Pilulae hydragogae. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Jamesii,
Scammonei,
singulorum grana quinque.
Fiant pilulae tres. — Auf eine Gabe.

Pilulae expectorantes. (E.)

℞. Mercurii dulcis
grana viginti quatuor.
Scillae semidrachmam.
Tartari stibiati grana sex.
Opii grana octodecim.
Fiant pilulae viginti quatuor. — Gabe, alle Abende ein Stück, bei catarrhalischen Affectionen.

Pilulae hydragogae Janini. (Ca. Hu.)

℞. Aquae communis libras sex.
Jalapae,
Aloës Socotrinae,
Sennae, singularum libram unam
Ferri subcarbonici,
Nitri, singularum uncias octo cum
dimidia.

Agarici,
Mechoacananae,
Rhei,
Scammonei,
Radiciis Ericae,
Hermodactylorum, singularum uncias sex et drachmas duas.
Aethiopsis mineralis uncias quinque.
Cremoris Tartari uncias duas et sesquidrachmam.

Turpethi gummosi,
Gummi Guttae,
Trochiscorum Alhandal,
Mercurii dulcis,
Tartari stibiati,
singulorum uncias duas,

Coque sennam et cremorem in aqua per horae quadrantem, cola fortiter exprimendo et liquori in olla ferrea calefacto adde substantias reliquas porphyrisatas et mixtas, agitando continue, leni igne ut obtineatur massa in pilulas quatuor granorum dividenda, quae in pulvere Jalapae volutae siccentur.

Stark purgirend. — Gabe, nach den Umständen, anfangs vier Pillen und bis zum beabsichtigten Erfolg gestiegen.

C. Durch Stinkasand.

Pulvis Gratiolae cum Hydrargyro s. verinifugus. (Au.)

℞. Herbae Gratiolae scrupulos duos.
Mercurii dulcis . . . grana quinque.
Asae foetidae . . . semidrachmam.
Olei Menthae piperitae guttas tres.
Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. — Von Paragon's gegen Bandwurm gepriesen.

Pilulae anthelminticae. (Au. Sp. Sw*.)

℞. Mercurii dulcis . . . partem unam.
Asae foetidae partes tres.
Ferri sulphurici . . . partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae. (Vm.)
Sw*, loco syrupi Acetum scilliticum addere et pilulas granorum quatuor parare jubet.

℞. Mercurii dulcis,
Asae foetidae,
Rhei,
Sagapeni,
singulorum drachmam unam.
Tincturae Gentianae
sufficientem quantitatem

ut fiat pilulae grani unius. (Sp.)
Gegen Ascariiden und Bandwurm empfohlen. — Gabe, von den erstern zwei, selten drei, zwei Mal täglich.

℞. Extracti Rhei,
— Juglandis,
Asae foetidae,
Mercurii dulcis,
singulorum semidrachmam.
Fiant pilulae grani unius. — Gabe, ein bis vier Stück täglich. (Au.)

Boli anthelmintici et antispasmodici. (B.)

℞. Mercurii dulcis grana sex.
Asae foetidae . . . scrupulum unum.
Extracti Valerianae

scrupulos duos.
Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Wurmkrankheiten mit Epilepsie, Weltstanz und Krampfstößen.

Pilulae resolventes. (Sa.)

℞. Asae foetidae . . . drachmam unam.

Pulveris Glandium Quercus,
Aethiopsis mineralis, singulorum
granum dimidium.

Mercurii dulcis . . . grana quinque.
Syrupi Papaveris,
Pulveris Liquiritiae,

singulorum quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae emmenagogae. (Pie.)

℞. Extracti Taraxaci,
— Saponariae,
singulorum drachmam unam.

Boracis electi,
Asae foetidae,
singulorum semidrachmam.

Aethiopsis mineralis,
Mercurii dulcis,
singulorum grana viginti.

Syrupi Hederae terrestris
sufficientem quantitatem.

D. Durch Copaivabalsam.

Pilulae ad gonorrhoeam. (Ca. Pie. Ra.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Conservae Rosarum rubrarum
uncias quatuor.

Sanguinis Draconis . . . semunciam.
Balsami Copaivae . . . unciam unam.

Fiant pilulae granorum sex. — Bei
veralteten Gonorrhöen von Atonie gerühmt.
— Gabe, ein, dann zwei und drei Stück,
Morgens und Abends, mit eisenhaltigem
Wasser zum Getränk.

E. Durch Katchu.

Pilulae adstringentes. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Catechu,
Balsami Copaivae,

singulorum drachmas quinque.
Syrupi Consolidae majoris
quantum sufficit

ut fiant pilulae centum quinquaginta.
Gabe, vier Stück täglich drei Mal. —
Bei verdächtigem weißen Fluß und sogenannt
atoniſchen Blennorrhöen gepriesen.

℞. Mercurii dulcis . . . grana octo.
Catechu . . . scrupulum unum.
Oculorum Cancrorum

scrupulos duos.
Balsami Copaivae semisrupulum.
Syrupi Chinae vel Consolidae majoris

quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor. —
Von Morand bei Schleimflüssen von Atonie
angewendet. — Gabe, ein Stück täglich
drei Mal und allmählig bis auf sechs
in vier und zwanzig Stunden gestiegen.

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Catechu . . . drachmas duas.
Gummi Arabici scrupulos quatuor.
Terebinthinae ococtae

quantum sufficit

ut fiant pilulae centum quinquaginta.
— Quatin, dessen Formel Sainte-
Marie etwas verändert hat, verordnete
diese Pillen bei weißem Fluß und Tripper,
zu vier Stück täglich drei Mal.

F. Durch Rampher.

Pulvis Hydrargyri cum Camphora s. excitans. (Au.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana viginti quatuor.
Camphorae,
Concharum praeparatarum,
singularum scrupulos duos.

Divide in partes octo. — Gabe, täglich
drei bis vier, bei Wasserſucht, um
die Functionen des absorbirenden Systems
zu befhätigen.

Pilulae muriatis Hydrargyri camphoratae s. Muriatis Hydrargyri oxydulati et Camphorae s. Mercurii dulcis et Camphorae s. mercuriales camphoratae. (RC. Ca. Ra. Vm.)

℞. Mercurii dulcis . . . granum unum.
Camphorae . . . grana duo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit

ut fiat cum pulvere Liquiritiae pilula.
(Ca.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Camphorae grana viginti quatuor.
Mucilaginis Gummi Arabici

quantum satis
ut fiat massa in pilulas duodecim aequales
dividenda. — Gabe, zwei Stück.

Addi possunt pro rei necessitate:
Opii grana duodecim aut Extracti Conii grana
octodecim aut Extracti Hyoseyami tant
idem; — dann giebt man zwei oder drei
Stück. (RC.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Camphorae cum gutt's quinque Alcoholis triturationae

drachmam unam.
Sacchari albi pulverati

drachmas tres.
Mucilaginis Gummi Arabici

quantum sufficit
ut fiant pilulae ducentae quadraginta.
(Ra.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes octo.
Camphorae cum Alcoholo raturatae . . . partes quatuor.

Sacchari albi . . . partes duodecim.
Gummi Tragacanthae

partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.

Fiant pilulae. (Vm.)

G. Durch Zimmt.

Boli purgantes et tonici. (Bo. Pie.)

℞. Mercurii dulcis,

Cinnamomi,
singulorum grana decem.
Hermodyctylorum
drachmam unam.
Syrupi Florum Persicae
quantum sufficit

ut fiant boli decem.

H. Durch Coloquinten.

Pilulae trium diabulorum. (Ca.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana octo.
Trochiscorum Alhandal,
Scammonei Aleppensis,
singulorum grana quatuor.
Syrupi Stoechatis quantum sufficit
ut fiant pilulae quatuor. — Bei Harn-
röhrenentzündung, zur Einberung und Ver-
minderung der Entzündung gerühmt.

Pilulae mercuriales. (Br. Sa.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.
Extracti panchymagogi
sesquiunciam.

Misce ut fiant pilulae. (Br.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.
Massae Pilularum Colocynthidis
cum Aloë . . . unciam unam.
Syrupi Rhamni
sufficientem quantitatem.

Fiat massa pilularis. (Sa.)

I. Durch Spießglanzmoör.

Boli purgantes. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Aethiopsis mineralis grana decem.
Pulpa Cassiae recentis
quantum sufficit.

Morgens nüchtern zu nehmen.

Pilulae antisiphiliticae. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis,
Aethiopsis mineralis,
singulorum drachmam unam.
Farinae Lini in solutione Gummi
Arabici dilutae quantum sufficit
ut fiant pilulae triginta sex. — Im
zweiten Stadium der Harnröhrenentzün-
dung. — Gabe, täglich zwei Stück, Mor-
gens und Abends und alle fünf Tage ein
Purgirmittel.

Pilulae lac repellentes. (Bo.)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Aethiopsis mineralis
drachmam unam.
Kali sulphurici . . . semunciam.
— nitrici . . . drachmam unam.
Camphorae . . . semidrachmam.
Resinae Jalapae scrupulum unum.
Gummi Arabici drachmam unam.
Syrupi Quinque Radicum
quantum sufficit
ut fiant pilulae quatuor granorum. —

Morgens und Abends zwei Stück, mehrere
Stunden vor und nach der Mahlzeit.

Opiatum antisiphiliticum. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis
uncias duas cum dimidia.
Aethiopsis mineralis uncias duas.
Saponis Veneti . . . uncias octo.
Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiat massa homogenea, cui adde

Extracti Boraginis,
— Bugulae,
singulorum uncias tres.

Camphorae . . . semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce sedulo. — Bei venerischen Krank-
heiten mit Scrophelcomplication. — Eine
halbe bis eine Drachme in Pillen oder in
einer passenden Flüssigkeit.

J. Durch Eisen.

Murias Hydrargyri ferratus, Mercurius dulcis martiatus, Hydrochloras Mercurii ferratus, Calomelas ferruginosus. (Ca. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes sex.
Oxydi Ferri nigri partem unam.
Triturata sublima. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes tres.
Hydrochloratis Ferri ammoniacalis . . . partem unam.
Misce bene triturando. (Ca. Sw.)

Bonpartmann in scrophulösen Krank-
heiten, Empfindeschwülsten und Wurmbes-
werden empfohlen. — Gabe, zwanzig
bis dreißig Gran.

Opiatum purgans et tonicum. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Asellorum,
singulorum drachmas duas.
— Croci Martis aperitivi,
— Chinae,
singulorum semunciam.
Extracti Juniperi
sufficientem quantitatem.
Misce sedulo.

K. Durch Guajacharz.

Pulvis errhinus s. sternutatorius. (Au.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana decem.
Camphorae,
Resinae Guajaci,
singularum grana quinque.
Sacchari crystallisati (Sandis)
semidrachmam.
Chinae . . . scrupulum unum.
Divide in partes viginti.
℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Camphorae,
Resinae Guajaci,
singulorum grana decem.

Sacchari crystallisati scrupulos duos.
 Chinae scrupulum unum.
 Olei Caryophyllorum guttas duas.
 Divide in partes viginti.
 ℞. Mercurii dulcis scrupulos duos.
 Camphorae,
 Resinae Guajaci,
 singularum grana decem.
 Sacchari crystallisati scrupulos duos.
 Chinae,
 Radicis Hellebori albi,
 singularum grana decem.
 Olei Cajeput . . . guttas quinque.
 Divide in partes viginti. — Alle drei
 Pulver werden von Kleber bei Amaurose
 gepriesen.
 ℞. Mercurii dulcis granum unum.
 Sacchari grana decem.
 Tincturae Guajaci ammoniatae
 guttam unam.

Misce sedulo.

Pilulae Mercurii dulcis et Guajaci.
 (BorC.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
 Pulveris Succu Liquiritiae,
 — Resinae Guajaci, singulo-
 rum scrupulos quatuor.
 Fiant pilulae octoginta.

Pilulae antiherpeticae. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
 Resinae Guajaci drachmas duas.
 Syrupi Nymphaeae
 quantum sufficit.

Fiant pilulae septuaginta duae. —
 Morgens und Abends zwei Stück mit ei-
 nem starken Hopfenaufguss.

Pilulae antisymphiliticae. (Ca.)

℞. Mercurii dulcis,
 Resinae Guajaci,
 singulorum drachmas duas.
 Pulveris Radicis Althaeae
 uncias quatuor.
 Syrupi Cydoniorum
 quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum quatuor. —
 Albert verordnet fünf bis sechs Stück
 täglich.

Pilulae antirheumaticae. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . granum unum.
 Pulveris Resinae Guajaci,
 — Florum Arnicae,
 singulorum grana quatuor.

Fiant pilulae duae. — Von Biga-
 rous gepriesen; er giebt sie auf einmal.

Pilulae antiarthriticae. (Pie. Sa.)

℞. Mercurii dulcis,
 Resinae Guajaci,
 singulorum drachmam unam.

Saponis medicinalis semunciam.
Extracti Fellis Tauri

drachmas duas.

Ligni Guajaci pulverati

quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum quatuor. —
 Ein Präparat, welches wegen der darin
 stattfindenden Fersehung des salzsauren
 Quecksilberoxyduls zu verwerfen ist. —
 Gabe, zwei bis vier Pillen auf zwei Mal
 den Tag über.

Pilulae antiherpeticae. (B.)

℞. Mercurii dulcis,
 Extracti Rhois toxicodendri,
 singulorum drachmam unam,
 Sulphureti Calcis,
 Resinae Guajaci,
 singulorum drachmas duas.
 Tartari stibiati grana duodecim.
 Extracti Opii gummosi
 grana quindecim.

— Saponariae

quantum sufficit

ut fiant pilulae centum viginti. — Ein
 schlechtes Präparat wegen Fersehung des
 Satomel.

Pilulae mercuriales. (Fer.)

℞. Mercurii dulcis,
 Extracti Guajaci,
 singulorum unciam unam.
 Camphorae . . . sesquidrachmam.
 Balsami Copaivae quantum sufficit
 ut fiat massa pilularis. — Gabe, zwölf
 Gran bis eine halbe Drachme

L. Durch Ammoniakgummi.

Pilulae resolventes. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
 Gummi Ammoniaci in Aceti scil-
 litici sufficiente quantitate soluti
 semunciam.

Rhei drachmas duas.

Saponis albi,

Extracti Saponariae,

singulorum unciam unam.

Conservae Inulae,

Syrupi Quinque Radicum,

singulorum quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum quatuor. —
 Aus der früher genannten Ursache zu ver-
 werfen.

M. Durch Gummigutt.

Pulvis vermifugus. (His.)

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.
 Gummi Guttae

grana sex ad decem.

Gabe, für einen Erwachsenen, Morgens
 in Syrup zu nehmen.

N. Durch Ipecacuanha.

Pulvis Ipecacuanhae hydrargyratus s.
mercurialis. (Succ.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.

Pulveris Radicis Ipecacuanhae
partes quatuor.

Tritura simul.

Enema mercuriale s. mannatum. (Au.)

℞. Mannae . unciam unam ad duas.
Aqua uncias sex.
Olei Ricini cum Vitello Ovi triti
unciam unam ad duas.
Mercurii dulcis scrupulum unum.
Ipecacuanhae pulveratae semidrach-
mam ad drachmam unam.

Loco olei Infusum Jalapae adhiberi
potest.

℞. Mercurii dulcis,
Ipecacuanhae pulveratae,
singulorum scrupulum unum.
Olei Lini unciam unam.
Infusi Chamomillae uncias octo.
Misce sedulo.

O. Durū Jalapae.

Pulvis ad lumbicos s. purgans s. ver-
mifugus s. Jalapae et Muriatis Hy-
drargyri oxydulati. (DD. R.C. Suec.
E. Pie. Ra. Sa. Sw. Sy. Vm.)

℞. Radicis Jalapae . grana viginti.
Mercurii dulcis . grana decem.
Misce. (Siv. Sy.)

Suec. Jalapae partes tres et unam
Mercurii dulcis; — DD. Jalapae par-
tes sex et Mercurii dulcis unam; —
His. Jalapae decem et quinque vel de-
cem Mercurii dulcis; — RC. Jalapae
scrupulum unum, Mercurii dulcis gra-
na quinque.

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.
Rhei grana sex.
Jalapae grana triginta.

Misce. (Ra.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana octo.
Jalapae grana triginta.
Scammonae grana septem.
Sacchari semunciam.

Fiat pulvis. (Pie.) — In Hüßner's
Büch zu nehmen.

Sa. Mercurii dulcis unciam unam,
Resinae Jalapae drachmas duas, Scam-
monae sesquiunciam et Corallii tanti-
dem.

℞. Jalapae partes duas.
Rhei,
Resolinæ, singularum partes sex.
Kali sulphurici . partem unam.
Mercurii dulcis partem dimidiam.
Misce. (Vm.)

℞. Mercurii dulcis,
Jalapae,
Rhei, singulorum grana quinque.
Olei essentialis Cinnamomi
guttam unam.

Fiat pulvis. (His.)

Gabe, funfzehn oder zwanzig Gran, in
Syrup.

Pulvis evacuens s. laxans puerorum.
(B*. Br. Sp.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.
Resinae Jalapae,
Amygdalarum dulcium ex cortica-
rum, singularum drachmas duas.
Sacchari albi . . . unciam unam.
Antimonii diaphoretici
scrupulos duos.

Olei Citri guttas duas.

Fiat pulvis. (B*. Br.)

Sp. Mercurii dulcis unciam unam,
Resinae Jalapae drachmas tres, Amyg-
dalarum dulcium sesquidrachmam, Cin-
nabaris drachmam unam et Sacchari
sesquiunciam.

Gabe, zehn bis zwanzig Gran und mehr.

Pilulae ex Hydrargyro catharticae s.
purgantes cum Hydrargyro muriatico
miti s. Mercurii dulcis et Jalapae sim-
plices s. purgantes de Calomelle. (DD.
Sw.)

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.
Pulveris Radicis Jalapae
semidrachmam.

Mucilaginis Gummi Arabici
sufficientem quantitatem.

Fiant pilulae quindecim. (DD.) —
Auf zwei Mal.

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Radicis Jalapae pulveratae
drachmas duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. (Sw.)
— Gedes bis zehn Stück auf einmal.

Trochisci vermifugi. (GalH.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Radicis Jalapae, singulo-
rum partes viginti quatuor.
Sacchari albi partes quingentas.
Gummi Tragacanthae partes octo.
Aquaе Florum Aurantiorum
sufficientem quantitatem.

Trochisci contra vermes s. hermetici s.
vermifugi. (Br. Sp. Sw*. Vm.)

℞. Mercurii dulcis partes quatuor.
Resinae Jalapae . partem unam.
Sacchari albi . partes sedecim.

Misce exacte et cum

Mucilaginis Gummi Arabici

sufficiente quantitate

fiant massae, in globulos formandae et
pulvere Amyli conspergendae, quarum
pondus pro quoque aetatis anno pro
granis quinque angendum est; quaeque,
modulorum ligneorum ope et depri-
mendo illas, annorum numerum cui
porcus respondet indicans. (Vm.)

*Sw**. Triturare simul jubet Radicis Jalapae et Gummi Arabici, singulorum drachmas duas, mixturam cum Aquae semuncia diluere, emulsiōni huic addere mixturam e Mercurii dulcis drachmis decem, Sacchari albi uncias quatuor et Gummi Tragacanthae sesquidrachma, triturare cum Aquae sufficiente quantitate et massam parare modo praemonito in trochiscos formandam.

℞. Mercurii dulcis drachmas quinque.
Pulveris Cinnamomi

grana quadraginta.

— Resinae Jalapae

grana septuaginta quinque.

Sacchari albi . . . sesquiunciam.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit

ut fiant trochisci (cujus ponderis?).

Für Kinder, so viel Stück als sie Jahre alt sind, doch nicht über zehn. (*Sp.*)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Radicis Jalapae,

singulorum scrupulos duos.

— Seminis Cinae

drachmas duas.

— Sacchari albi

uncias quatuor.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiat massa, cujus quaeque drachma in decem trochiscos dividatur. (*Br.*)

Pilulae Hydrargyri jalappinae s. mercuriales s. purgantes s. ex Resina Jalapae s. laxantes s. Saponis compositae s. Mercurii dulcis et Jalapae saponaceae s. mercuriales saponaceae. (*B. Bor. BorC. Br. Han. Hass. HassP. O. Pol. WW. Huf. Ra.*)

℞. Mercurii dulcis,
Resinae Jalapae,

singulorum partem unam.

Saponis medicinalis partes duas.

Fiant pilulae granorum duorum. — Ein oder zwei Stück auf einmal. (*Br. Ra.*)

℞. Mercurii dulcis . . . unciam unam.

Resinae Jalapae,

Saponis Alicantini,

singulorum sesquiunciam.

Fiant pilulae granorum duorum. — Zwei oder vier Stück auf einmal. (*BorC. WW.*)

℞. Mercurii dulcis . . . sesquiunciam.

Resinae Jalapae,

Saponis Alicantini,

singulorum uncias sex.

Essentiae Aurantiorum

quantum sufficit

ut fiat massa pilularis. — Von sechs bis zu dreißig Gran. (*Hass.*)

℞. Mercurii dulcis . . . partem unam.

Saponis jalappini, partes quinque.

Misce. (*O.*)

B. Bor. Han. Pol. et Huf. Mercurii dulcis partem unam et tres Saponis jalappini; — HassP. f. G. 160 Pilulae purgantes.

Keine gute Zusammenfügung wegen der Zerlegung des Quecksilberoxyduls, wie alle folgende, welche Seife enthalten.

Pilulae Jalapae compositae s. Mercurii dulcis et Jalapae saponaceae compositae. (*Am. C.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas sex et scrupulos duos.

Pulveris Jalapae,

— Rhei,

Saponis Alicantini, singulorum unciam unam.

Tartari stibiati grana octodecim.

Aquae . . . quantum sufficit

ut fiat massa pilularis.

Pilulae hydragogae. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Saponis jalappini,
Pulveris Gummi Guttae,
singulorum drachmas duas:

Fiant pilulae granorum quatuor. — Drei bis sechs auf einmal.

Pilulae cathartico-diureticae. (*RC.*)

℞. Pulveris Scillae . . . grana sex.

— Jalapae . . . grana decem.

Mercurii dulcis . . . grana quatuor.

Pulveris aromatici . . . grana sex.

Fiant cum Syrupō Zingiberis pilulae quatuor granorum, una vice, noctibus alternis propinandae et pulvis Super-tartratis Potassae et Stalagmitidis cambogioidis quovis solutus idoneo liquido, mane insequenti exhibendus. — Opii granum unum subinde addi potest.

Pilulae catarrhales s. mercuriales s. purgantes s. laxantes cum Mercurio. (*D. Pal. Wir. Sa. Sp. Sy.*)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.

Resinae Jalapae drachmam unam.

Extracti panchymagogi

unciam unam.

Olei essentialis Aurantium

guttas triginta.

Fiat massa pilularis. (*D. Sp.*)

Sa. Mercurii dulcis grana duo, Resinae Jalapae tantidem et Extracti panchymagogi grana sex; — Sy. Mercurii dulcis grana quatuor, Resinae Jalapae tantidem et Pilularum Rufi semidrachmam.

℞. Mercurii dulcis,
Scammonci,

Resinae Jalapae,

Extracti panchymagogi,

— catholici,

singulorum drachmam unam.

Tincturae Sassafras quantum sufficit

ut fiant pilulae viginti quinque. —

Gabe, zwei Stück auf einmal; nach zwei Stunden nimmt man eine gleiche Gabe, wenn die erste nicht hinreichend ist.

Pilulae albae. (Ca.)

℞. Mercurii dulcis . . . semidrachmam.
Pulveris Jalapae . . . semunciam.
Croci Martis aperitivi

drachmas duas.
Asellorum . . . scrupulos duos.
Syrupus Quinque Radicum

quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum quatuor. —

Bon Bart hez bei Scropheln empfohlen.

— Gabe, zwei Stück täglich.

Boli purgantes. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana decem.

Resinae Jalapae,
Kali sulphurici,

singulorum grana sex.

Syrupi Cichorii compositi
sufficientem quantitatem.

Chirac machte häufig Gebrauch davon.

Chocolata purgans. (Ro. Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . . unciam unam.

Jalapae . . . sesquiunciam.

Chocolatae simplicis libram unam.

Fiant moruli drachmae unius. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam,
Jalapae drachmas sex et Chocolatae
libram unam.

Pilulae laxantes et resolventes (Ca.)

℞. Radicis Zingiberis,

Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.

Camphorae,

Moschi, singulorum semidrachmam.

Mercurii . . . grana duodecim.

Sublimati,

Turpethi, singulorum grana octo.

Tritura exacte et adde demde

Extracti Jalapae,

— cathartici,

singulorum drachmas duas.

Asae foetidae,

Kali sulphurici,

singulorum semunciam.

Massae pilularum Rufi,

Galbani,

Extracti Liquiritiae,

singulorum drachmam unam.

Balsami Peruviani semidrachmam.

Elixir proprietatis non acidi

quantum sufficit

ut fiant pilulae quatuor granorum. —

Eine unformliche Zusammensetzung. — San-

che verordnete vier Pillen täglich, in-

dem er allmählig bis auf funfzehn stieg.

Tabellae purgantes. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . . semunciam.

Resinae Jalapae scrupulos quatuor.

Scammonae . . . scrupulos quinque.

Sacchari uncias tres.

Gummi Tragacanthae

sufficientem quantitatem.

Erwachsenen eine Drachme, Kindern von

einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Opiatum neapolitanum. (Pie.)

℞. Pulveris Mercurii dulcis,
Jalapae,
singulorum sesquidrachmam.

— Scammonae scrupulum unum.

— Rhei,

— Sennae,

singulorum drachmas duas.

— Guajaci,

— Sassaparillae,

— Chinae,

singulorum semunciam.

Syrupi Rosarum solutivi

sufficientem quantitatem.

Misce exacte. — Bei chronischen Harn-

röhrenflüssen. — Gabe, alle zwei Tage,

Morgens nüchtern eine bis zwei Drachmen,

drei Wochen lang.

Panes (biscuits) purgantes et vermifugi.

(Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . . sesquiunciam.

Pulveris Jalapae . . . uncias tres.

— Coriandri drachmam unam.

Farinae Triticis . . . libram unam.

Sacchari albi . . . sesquilibram.

Ovorum no. 24.

Corticis Citri no. 1.

Essentiae Bergamottae

guttas viginti quatuor.

Aquae Florum Aurantium

unciam unam.

Fiant panes unciae unius. — Jedes

Biscuit enthält funfzehn Gran salzsaures

Quecksilberoxydul und dreißig Gran Jalape.

Pomatum s. Unguentum purgans. (Fer.)

℞. Pulveris Jalapae grana quadraginta.

— Scammonae

grana viginti quatuor.

— Mercurii dulcis

grana duodecim.

Succi gastrici animalis cujuslibet

sufficientem quantitatem

ut fiat pasta.

P. Durch Magnesia.

Boli laxantes Chaussieri. (Ra.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana tria.

Sulphatis Maguesiae

grana quatuor.

Syrupi Rhamni quantum sufficit

ut fiat bolus.

Q. Durch Opium.

Pulvis Mercurii hydrargyrosi thebaic-

us s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis cum

Opio. (DD. Succ. Au.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.

Pulveris Opii . . . granum unum.

— Amyli . . . scrupulum unum.

Misce bene. (DD. Succ.)

Au. Opii grana duo, Mercurii dulcis

sex et Sacchari drachmam unam, in partes sex dividenda. — Als vortreffliches Mittel gegen Leberentzündung gerühmt.

Collyrium siccum. (Ra.)

℞. Mercurii dulcis,
Sacchari pulverati,
singulorum scrupulum unum.
Opii grana quatuor.
Tritura simul. — Bei rebellischen, besonders sogenannten syphilitischen Augenentzündungen empfohlen.

Pulvis diaphoreticus. (E.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sedecim.
Opii grana quatuor.
Ipecacuanhae grana octo.
Fiant doses octo. — Gabe, ein Stück alle Stunden oder zwei Stunden. — Von Chapman bei Ruhr empfohlen.

℞. Opii grana tria.
Ipecacuanhae grana sex.
Mercurii dulcis . . . sesquigranum.
Nitri semidrachmam.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei oder vier Stunden.

Pulvis expectorans. (E.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Opii grana tria.
Ipecacuanhae grana sex.
Nitri drachmam unam.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle zwei oder drei Stunden, in einem Syrup.

Aqua mercurialis balsamica Plenki.

(Sm.)

℞. Mercurii dulcis scrupulos duos.
Tincturae Myrrhae drachmas quatuor.
Laudani liquidi Sydenhami,
Decocti Chinae concentrati,
singulorum unciam unam.

Misce terendo. — Wurde bei schmerzlosen venerischen Geschwüren, wo es die Thätigkeit der Gewebe belebt, einige Mal mit Erfolg gebraucht; man trinkt Charpie damit.

Mixtura antisiphilitica. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Opii puri grana duodecim.
Conservae Rosarum uncias quatuor.

Misce exacte. — Diese Gabe soll zu einer vollständigen antisiphilitischen Behandlung hinreichend seyn. — Man nimmt sie portionenweise des Morgens in Mandelsyrup mit einer concentrirten Abkochung von Guaiac.

Pomatum s. Unguentum antivenericum. (Pie. Sm.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.

Laudani liquidi Sydenhami

drachmas duas.

Cerati Galeni unciam unam.

Exacte trituratis adde

Essentiae Rosarum guttam unam.

Als Schußmittel gegen venerische Uebel, eine Stunde vor dem Weisßtaf auf die Gesicht eingerieben und selbst als aphrodisiacum mit Unrecht empfohlen.

Pilulae Mercurii dulcis et Opii. (DD.)

Sw. Vm.)*

℞. Mercurii dulcis partes duodecim.
Opii partem unam.
Micae Panis partes septemdecim.
Mellis depurati quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum duorum cum dimidio. (Vm.)

Sw. Mercurii dulcis partes quatuor,*
Opii unam, Micae Panis tres et Syrupi Sacchari sufficientem quantitatem ut fiant pilulae grani unius; — DD. Calomelanos partes quatuor, Opii unam et quatuor Micae Panis ut fiant pilulae triginta.

Bei venerischen Krankheiten, besonders mit Geschwüren verbundenen, empfohlen.

Pilulae antihydopicae. (Au.)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Opii scrupulum unum.
Rhei pulveratae drachmam unam.
Extracti Quassae drachmas tres.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, neun bis zehn täglich drei Mal.

Pilulae de Leslie. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.
Opii semigranum.
Misce bene. — Bei Gesichtsschmerz. — Dreimal täglich.

Pilulae purgantes. (E.)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.
Pulveris Rhei . . . grana viginti.
— Opii granum unum.
Fiant pilulae octo. — Gabe, vier Stück auf einmal. Die übrigen, wenn keine Wirkung erfolgt ist, nach einer Stunde.

Pilulae Pringelii. (Gen.)

℞. Extracti cathartici scrupulum unum.
Mercurii dulcis . . . grana quinque.
Opii sesquigranum.
Fiant pilulae duodecim.

Pilulae aperientes hydrargyrateae. (Sw.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Opii grana duo.
Pulveris aperientis sesquunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quinque. — Bei Hämorrhagie und Hohenentzündung.

— Gabe, drei bis vier Stück täglich drei Mal.

Pilulae depurantes. (Ra.)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Extracti Opii grana octodecim.
— Cicutae drachmas quatuor.
Syrupi Althæae
sufficientem quantitatem.

Fiant pilulae triginta duae. — Bei Verstopfung zur Linderung der Schmerzen, von Dubois angewendet, und allmählig gestiegen.

Pilulae sialagogae. (E.)

℞. Mercurii dulcis,
Camphorae,
singulorum scrupulum unum.
Opii . . . grana duodecim.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich drei Mal.)

R. Durch Blei.

Injectio in gonorrhoea. (Sa.)

℞. Gummi Arabici . . semunciam.
Dissolve in
Aquae bullientis unciis duodecim.
Colaturae adde
Mercurii dulcis . drachmas tres.
Plumbi acetici crystallisati
grana quatuor.

Dreimal täglich eine Drachme einzuspritzen, bei Harnröhrenentzündung.

Ceratum exsiccans. (Vm.)

℞. Cerae flavae partes quadraginta.
Liqua et adde
Emplastri simplicis,
Terebinthinae coctae,
singulorum partes quinque
et post horum fusionem

Cerussae . . . partes duas.
Mercurii dulcis . partem unam.
Misce bene.

Candelae s. Cereoli mercuriales. (Ful. Sp. Sw.)

℞. Cerae flavae . . . uncias sex.
Liqua et adde
Extracti Saturni . semunciam.
Pulveris Mercurii dulcis
drachmas duas.

Fiant cereoli. — Plenc empfaht sie zur Wiederherstellung des unterdrückten Trippers. Sie sind aber nicht wirksamer als die gewöhnlichen Bougie's.

Unguentum ad tineam. (E.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Aluminis calcinati,
Cerussae, singulorum semunciam.
Olei Terebinthinae drachmas duas.
Cerati simplicis . sesquiunciam.

Man legt diese Salbe Abends auf und nimmt sie Morgens wieder weg.

S. Durch Rhabarber.

Pulvis catharticus. (Gen. RC. E. Sa. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Rhei . . . partes duas.
Misce triturando. (Sa. Sw.)

RC. Rhei palmati scrupulum unum,
Mercurii dulcis grana sex. (Pro dosi e melle vel syrupo dandus, alio coacta vel tribus vicibus, intervallo duarum trium, quatuor, quinque horarum.)

℞. Mercurii dulcis,
Rhei, singulorum grana decem.
Olei essentialis Cinnamomi
guttam unam.

Misce. (E.)

Gabe, zwanzig Gran.

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Rhei . . . scrupulos quatuor.
Pulveris relaxantis
scrupulum unum.

Misce. (Gen.)

Boli vermifugi. (Sw.)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Rhei semiscrupulum ad scrupulos
duos.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Pilulae Werlhofii. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Extracti Rhei . drachmas duas.
Syrupi Consolidae majoris
quantum sufficit

ut fiant pilulae septuaginta duae. — Gegen verdächtigen weißen Fluß. — Gabe, Morgens und Abends zwei Stück. — Man muß den Gebrauch lange Zeit fortsetzen.

Mixtura anthelmintica. (B.)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Tincturae Rhei aquosae
uncias octo.
Syrupi Cichorii compositi
uncias duas.
Eßfelweise in sogenannten gastrischen
Wurmfiebern.

T. Durch Scamnoneum.

Pulvis purgans anthelminticus, hydragogus. (B. Sw.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Scamnonei . . . partes duas.
Misce. (Sw) — Gabe, fünf bis dreißig Gran, alle vier oder fünf Tage.

℞. Mercurii dulcis,
Diagrydii sulphurati,
singulorum grana tria.

Misce. (B.) — Für ein Kind von sechs Jahren, indem man um so viele Gran, je nachdem das Kind älter oder jünger ist, steigt oder fällt.

Pulvis resolvens s. digestivus. (Sm.)

℞. Mercurii dulcis . . . partes tres.
 Diagrydii sulphurati partes octo.
 Miscæ. — Von Finkle bei Verstopfun-
 gen der Unterleibsteingeweibe empfohlen. —
 Gabe, zwölf Gran, alle Morgen nüchtern,
 mehrere Tage hintereinander, in Kalbfleisch-
 brühe.

Pulvis vermifugus. (Wür. Ca. Sp.)

℞. Mercurii dulcis grana quinque.
 Pulveris Scammonæi grana sex.
 — Rhei . . . grana quatuor.

Miscæ: (Sp.)

Ca. Mercurii dulcis drachmam unam,
 Rhei, Scammonæi, singulorum tantidem
 et Sacchari drachmas tres.

℞. Mercurii dulcis,
 Scammonæi,
 singulorum grana duodecim.
 Gummi Guttae grana quinque.

Miscæ. (Wür.)

Boli Scammonæi compositi Fenn. com-
 ponuntur et pulveribus modo dictis Gon-
 serræ Absinthii et Syrupi Sacchari
 ope in bolos conversis.

Boli anthelmintico-laxantes. (B. Sp.)

℞. Mercurii dulcis,
 Scammonæi,
 singulorum grana decem.
 Gummi Guttae . . . grana sex.
 Confectionis hyacinthinae
 sufficientem quantitatem
 ut fiant boli duo vel tres. (Sp.)

Diese Bissen bilden den Grundbestand-
 theil des berühmten Rufferschen Mittels
 gegen den Bandwurm. Man nimmt sie
 alle Viertelstunden, nachdem man drei
 Drachmen gepulverte Farnkrautwurzel in
 sechs Unzen Eindenblüthsaft genommen
 hat und dazu noch eine oder zwei Tassen
 Thee trinkt.

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
 Diagrydii sulphurati grana octo.
 Roob Sambuci quantum sufficit.
 Fiant boli quatuor. — Ein Stück
 alle zwei Stunden. (B.)

*Trochisci anthelmintici s. hermetici
 Scretæ, Rotulæ anthelminticæ. (Pal.
 Wir. B.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana decem.
 Diagrydii sulphurati
 scrupulum unum.

Saponis albi,
 Mucilaginis Gummi Arabici,
 singulorum drachmam unam.

Fiant trochisci decem. (B.)

℞. Mercurii dulcis . . . sesquiquiam.
 Cornu Cervi absque igne præparati
 scrupulos duos.

Cinnamomi,

Diagrydii sulphurati,
 singulorum scrupulum unum.
 Sacchari albi . . . unciam unam.
 Conservæ Rosarum rubrarum
 drachmas duas.

Fiant mucilaginis Gummi Tragacan-
 thæ cum Aqua Rosarum parati ope
 trochisci sexaginta quatuor. (Wir.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
 Pulveris Herbae Carlinae,
 — Seminis Cinae,
 — Cornu Cervi usti,
 singulorum drachmam unam.

Diagrydii sulphurati
 semidrachmam.
 Cinnamomi . . . semiscrupulum.
 Sacchari albi . . . unciam unam.
 Mucilaginis Gummi Arabici
 quantum sufficit.

*U. Durch Scille.**Pilulae diureticae. (E. Par.)*

℞. Mercurii dulcis,
 Scillæ,
 singulorum grana duodecim.
 Conservæ Rosarum
 quantum sufficit.

Fiant pilulae duodecim. — Gabe
 ein Stück Morgens und Abends. (E.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
 Scillæ . . . grana quatuor.
 Foliorum Digitalis grana decem.
 Myrrhae . . . scrupulum unum.
 Asue foetidae . . . semidrachmam.
 Extracti Gentianæ
 quantum sufficit.

Fiant pilulae quindecim. (E. Par.) —
 Gabe, ein Stück Morgens und Abends.

*Pilulae scillinae et Muriatis Hydrargy-
 ri oxydulati. (RC.)*

℞. Mercurii dulcis . . . partem unam.
 Pulveris Scillæ . . . partes duas.
 — aromatici . . . partes tres.
 Syrupi simplicis quantum sat.
 Bei asthenischen Lungenkrankheiten, Waf-
 fer sucht, Hypochondrie, besonders mit etwas
 Aoc und Seife. — Gabe, sechs Gran
 täglich zwei Mal.

Pilulae antihydopicae. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis
 drachmas duas cum dimidia.
 Scillæ pulveratæ
 drachmas quatuor.
 Oxy mellis scillitici
 quantum sufficit.

Fiant pilulae centum. — Purgirend,
 schmelzend, farnreibend. — Gabe, An-
 fangs Morgens und Abends zwei Stück und
 allmählig gestiegen. Der Kranke trinkt ei-
 nen Aufguß von Ruscus aculeatus mit
 Meerzwiebelnsauerhonig.

Unguentum s. Pomatum resolvens, (Ra.)

℞. Mercurii dulcis,
Scillae pulveratae,
singulorum semidrachmam.
Axingiae praeparatae . . . drachmas duas.

Olei Rosarum . . . guttas quatuor.
Bon Dupuytren in Einreibungen bei
chronischen Gelenkschwellungen.

V. Durch Wurmsaamen.

Pulvis vermifugus. (Au. Sw.)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Rhei uncias duas.
Seminis Cinae unciam.

Fiat pulvis subtilissimus. (Sw.)

Au. Mercurii dulcis, Rhei, Seminis
Cinae, singulorum grana sex et Olei
Cinnamomi guttas duas; — vel: Semi-
nis Cinae grana quindecim, Rhei duo-
decim, Aloës sex, Mercurii dulcis tres
et unum Ipecacuanhae, ut fiant doses
tres. — Ein Stück des Morgens, einem
dreijährigen Kinde.

Bolus vermifugus. (Ra.)

℞. Mercurii dulcis . . . grana duo.
Seminis Cinae . . . grana octo.
Camphorae . . . grana sex.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Electuarium vermifugum. (Sw)*

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.
Pulveris Rhei,
— Seminis Cinae,
— Radicis Valerianae,
singulorum drachmas duas.
Conservae Absinthii sesquunciam.
Oxymellis scillitici . . . quantum sufficit.

Bei Epilepsie mit Wurmcomplication
empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis
eine halbe Unze nach dem Alter und den
Kräften des Kranken.

*Electuarium anthelminticum s. anthel-
minticum Vogleri. (Br. Ca. Fi. Sw.)*

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex ad duodecim.
Pulveris Seminis Cinae . . . drachmas duas.
— Jalappae drachmam unam.
— Cinnamomi semidrachmam.
Syrupi Florum Persicae . . . quantum sufficit.

Morgens in befeuchteter Oblate zu neh-
men. — Gabe, den zwölften Theil dieser
Masse für Kinder von zwei bis vier Jah-
ren, den achten für fünf- bis achtjährige,
den vierten Theil und mehr für Erwach-
sene. Man trinkt darauf eine Tasse von
einem bittern Aufguss.

Fi. Seminis Cinae pulverati drach-

mas duas, Radicis Jalappae unam, Mer-
curii dulcis grana duodecim, Syrupi
Cinnamomi quantum sufficit. — Gabe,
eine bis zwei Drachmen.

W. Durch Terpentia.

*Injectio Muriatis Hydrargyri campho-
rata, Collyrium Fernandezii. (His.)*

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.
Aluminis,
Aetheris sulphurici alcoholisati,
Camphorae,
singulorum scrupulum unum.
Terebinthinae . . . semunciam.
Vitellorum Ovorum . . . no. 2.
Misce terendo in mortario vitreo et
cola exprimendo.

Opiatum adstringens. (Sm.)

℞. Terebinthinae Venetae . . . drachmas quatuor.
Rhei drachmas tres.
Mercurii dulcis semiscrupulum.
Syrupi Gousolidae majoris
quantum sufficit.

Gabe, ein Scrupel, täglich drei Mal,
am Ende von Blennorrhagie.

*Deuto-chloruretum Mercurii, Hydrar-
gyrus muriatus s. muriatus corrosivus,
Hydrargyrum muriaticum corrosivum,
Hydrargyrus corrosivus albus, Hydrar-
gyri Oxymurias s. Permurias, Mercuri-
us muriatus s. sublimatus corrosivus,
Murias Hydrargyri corrosivus s. oxy-
genatus sublimatione s. praecipitatione
paratus, Murias hydrargyricum corrosi-
vum, Murias oxygenatus Hydrargyri
sublimatus, Supermurias Hydrargyri,
Murias Hydrargyri basi Oxidi imper-
fecti, Perchloruretum s. Bichloruretum
s. Bichloretum Mercurii, Murias su-
peroxygenatus, Oxymurias, Deutomu-
rias s. Deutohydrochloras Hydrargyri;
Quecksilbersublimat, salzsaures Quecksilbers-
oxyd. (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4.
D. DD. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM.
Gen Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon.
LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec.
Wir. Wür. Br. C. Fi. Par. Pid. Sp.
Sw. T. Vm.)*

1) Alte Verfahrungsweise.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Acidi nitrici . . . quantum sufficit
ad solutionem metalli, qua peracta, li-
quor ad siccum evaporet et massae
pulveratae addantur

Salis communis decrepitati,
Vitrioli viridis ad alborem calci-
nati, singulorum partes quinque.
Misce bene triturando et in lagenam,
pro dimidio inde replendam immissa
lente calefac in balneo arenae, orifi-

cium lagenae non prius obturando, quam vapores aquosi et acidi euasci cessaverint; tunc illa clausa ignis pedetentim augeatur; evaporatione finita, lagenam frange et massam albam a scoris separa. (Ams. B. Bel. Br Gen. Sar. Wir. Wir. Br. *Pid. Sp. Sw.*)

2) Verfahren Kunze's.

℞. Mercurii . . . unciis duodecim.
Acidi sulphurici concentrati . . . unciis viginti.

Destillent ad siccum; residuo in mortario vitreo pulverato adde

Salis Ammoniaci pulverati . . . pondus suo aequale.

Tritura bene et mixta in lagenam ad dimidium circiter replendam ingere in balneum arenae igne lento et blando calefacto collocandam; quae quamdiu vapores aquosi et acidi evolvuntur aperta, deinde obturamento chartaceo occludatur et ignis sensim augeatur. Operatione finita, lagenam rumpe et massam albam sublimatam ab omni impuritate, faciei internae adhaerente separa. (A. Am. Ba. D. DD. Du. Ed. Fenn. Ham. His. Li. Lus. O. R. Sax. Suec. Wir. C. Sw.)

Bor. Bor4. loco salis ammoniaci Natrium muriaticum siccum adhibent. (Praeterea quoque Sublimatum venalem indicat Bor4.); — Lon. LonN. RC. Mercurii *pondere* libras quas, Acidi sulphurici *pondere* unciis triginta, Natrium muriatici siccati libras quatuor.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Acidi sulphurici (66^b) . . . partes quinque.

Coque ad partium quinque remanentiam. Recipe deinde hujus

Deutosulphatis Mercurii acidi,
Salis marini pulverati,
Oxydi nigri Mangani,

singulorum partes aequales et misce. Post aliquot dies immitte in unam vel plures retortas fundi latioris, ad tertiam partem usque repletas et ad collum balneo arenae immersas; orificio olla parva inversa tecto, calefac pedetentim, donec massa tota sit sublimata. (Galm.)

Gal. Sulphatis, Salis marini, singulorum partes quadringentas octoginta, Oxydi quadringentas quinquaginta; — GalH. partem quartam postremi sufficere dicit, quod nonnisi eo utatur, ut in deutosulphatem mutetur protosulphatis, qui in sale primum obtento adesse posset. — HassP. Mercurii unciis decem, Salis communis sicci uncias octo, Mangani oxydati unciis sex; tritis ad extinctionem usque adde Olei Vitrioli Anglici unciis undecim, cele-

riter agitando etc.; — T. Salis communis siccati vel decrepitati libras quatuor, Oxydi Mangani libram unam, Sulphatis Mercurii ex Mercurii libris quatuor et Acidi sulphurici concentrati quantum sufficit coquendo parati. — Fer. dissolvere jubet Mercurii unciis sex in Acidi sulphurici aequali quantitate, solutionem ad siccum evaporare, residuum cum Salis communis pondere suo aequali terere et mixturam sublimationi subjicere; — Ki. Mercurii libras duas, Acidi sulphurici libras duas cum dimidia, Salis marini siccati libras quatuor, caeterum destillationem ad siccum et sublimationem residui cum sale marino in retorta vitrea pro tertia parte replenda.

3) ℞. Oxydi Mercurii rubri . . . partes decem cum quadrante.

Acidi nitrici quantum sufficit ad oxydi dissolutionem. Evaporatis ad siccum residuum tere cum

Salis communis partibus quinque et mixturam sublimationi subjice. (Vm.)

4) ℞. Mercurii . . . libram unam.

Acidi nitrici quantum sufficit ut metallum caloris ope solvatur. Liquori infunde solutionem calidam ex Salis communis sesquilibra in Aquae sufficiente quantitate, vapores rubri evoluti evitando; praecipitatum abundans primo exortum statim redissolvitur. Mixtura refrigerata sepositione demittit crystallos prismaticas, quibus separatis, liquor supernatans ad cuticulam evaporatus denuo crystallisationi subjiciatur. (Ful.)

5) ℞. Oxydi Mercurii rubri . . . quantum vis.

Acidi hydrochlorici . . . quantum sufficit

ad solutionem. Evaporata in vase vitreo ad crystallisandum reponantur. (An. Sw*. T. Vm.)

Der Aegsublimat. eins der heftigsten Gifte, welche man kennt, wird innerlich als Reizmittel und äußerlich als cathaereticum und in einigen Künften zur Erhaltung thierischer Stoffe angewendet, welche dadurch der Gährung widerstehen, indem sie die Härte des Holzes bekommen. Besonders genos und genießt er als Mittel gegen Syphilis einen großen Ruhm. Die Engländer sehen es als ausgemacht an, daß man in dieser Eigenschaft nicht auf ihn rechnen könne und überlassen daher fast allgemein seine Anwendung den Quacksalbern. Doch verdient er weder einen solchen rücksichtslosen Tadel, noch die übertriebenen Lobeserhebungen von Swieten's. Mit Geschick angewendet, wird er ein heroisches

Arzneimittel, welches unter vielen Umständen von Nutzen ist, obgleich er, einer rohen Empirie und einer blinden Routine überlassen, allerdings großen Schaden stiften kann.

Alkalien, Kohlenäuerliche Salze und alkalische Schwefelsalze, Brechweinstein, essigsaures Blei, salpetersaures Silber, Citweiß, Kleder, Blei, stüchtige Oele, Aufgüsse und Abkochungen abstringirender Pflanzen setzen ihn und dürfen daher nicht mit ihm verbunden werden. Zu Boullay beauptet sogar, alle vegetabilische und animalische Stoffe haben die Eigenschaft, nach einer für einen jeden derselben verschiedenen Zeit ihn zu zerlegen; es sey daher nützlich zu wissen, wie es sich mit einigen sehr allgemein in Gebrauch gegogenen Mitteln verhalte, in denen, nach der Absicht ihrer Erfinder, der Sublimat die Hauptrolle spielen sollte.

Gabe ein Sechszehentheil, ein Achtel, ein Viertel oder ein halber Gran.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Sublimats nicht oder wenigstens nicht merklich, durch einen fremden Stoff verändert ist.

Aqua divina Fernelii s. phagedaenica, Liguor mercurialis s. Muriatis Hydrargyri s. Hydrargyri muriatici corrosivi, Liguor Deutochlorureti Mercurii, Deutohydrochloras Mercurii, Solutio Sublimati corrosivi aquosa. (Ams. B. Ba. BorC. DD. Fer. Ham. Hass. Li. Sax. WW. Ca. Fi. Pid. Sa. Sw.)

℞. Sublimati corrosivi . . . drachmam unam.
Aquae destillatae . . . libram unam.
Triturando in mortario lapideo fiat dissolutio. (Ams.)

B. et Fer. Sublimati drachmam unam et Aquae libras duas; — BorC. DD. Sax. WW. et Sa. Sublimati granum unum et Aquae unciam unam; — Sw. Sublimati grana viginti ad triginta et Aquae libras duas; — Han. Sublimati scrupulum unum et Aquae uncias duodecim; — Li. Sublimati scrupulum unum et Aquae sesquialbram; — Hass. et Pid. Sublimati grana quadraginta quatuor et Aquae libram unam; — Ba. Sublimati partem unam et Aquae viginti quatuor; — Wiv. Sublimati grana decem et Aquae uncias quatuor; — Ca. Sublimati grana duodecim ad octodecim et Aquae libras duas.

Die meisten dieser Auflösungen werden äußerlich, in Waschungen, besonders gegen Krätze angewendet; einige jedoch, z. B. die Pharmacopoea universalis. II.

von Ba., werden als Reagentien angeführt. Man erinnere sich, daß der Sublimat zu seiner Auflösung bei gewöhnlicher Temperatur ungefähr zwanzig Theile und vom kochenden Wasser das Dreifache seines Gewichtes erfordert.

HassP. *Liquor Mercurii sublimati corrosivi*: Sublimati drachma dimidia, Aquae destillatae drachmae decem — ut reagens.

Collyrium ex Muriate Hydrargyri oxygenato, Aqua ophthalmica mercurialis. (Ful. Sw.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae destillatae . . . uncias sex.
Dissolve. (Ful.)

Sw. Sublimati semigranum ad granum unum et Aquae uncias quatuor.

Gilt als austrocknend, auflösend und antisyphilitisch.

Lotio Hydrargyri s. mercurialis. (Gen. Au.)

℞. Sublimati corrosivi . . . scrupulum unum.
Aquae destillatae uncias duodecim.
Acidi hydrochlorici . . . guttas viginti quatuor.
Misce. (Gen.)

Au. solutionem Sublimati granorum trium in Aquae purae vel Rosarum libris duabus.

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Aeruginis . . . grana sex.
Aquae . . . libras duas.
Besonders bei hartnäckiger tinea empfohlen (Au.)

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Praecipitati rubri . . . grana decem.
Spiritus Angelicae, — Korismarini, . . . singulorum drachmas duas.
Aquae . . . octarios duos.
Gegen Krätze empfohlen. (Au.)

Clyster s. Enema mercuriale. (Au.)
℞. Sublimati corrosivi . . . grana sex.
Infusi Seminum Lini uncias octo.
Gegen Ascitiden von Nutzen.

Injectio mercurialis. (Au.)
℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae bullientis . . . unciam unam.
Gegen weißen Fluß. — Augustin empfiehlt, nach Monteggia, bei habituellem Tripper einen Gran Sublimat in vier Unzen Wasser aufgelöst.

Lotio mercurialis Aliberti, Aqua rubra. (Ra.)

℞. Sublimati corrosivi . . . drachmam unam.

Aquae destillatae libram unam.
Alcannae quantum sufficit
ad colorandum.

Man taucht Feinwand oder einen Schwamm in diese Flüssigkeit und badet die mit entzündlichen, besonders venerischen Flechten behafteten Theile damit.

Aqua ophthalmica mercurialis, Collyrium mercuriale. (Au. Huf.)

℞. Sublimati corrosivi semigranum.
Aquae Rosarum . . . uncias tres.
Solutioni adde

Mucilaginis Seminum Cydoniorum
drachmam unam.

Aquae Laurocerasi destillatae
guttas triginta.

Misce (Huf.)

Au. mixturam solutionis Sublimati
corrosivi guttae unius et Aquae destil-
latae unciarum quatuor.

Balneum antisymphiliticum. (Ra.)

℞. Sublimati corrosivi
grana sex ad duodecim.

Aquae destillatae . . . libras octo.
— communis (30°)

libras ducentas.

Man kann auch zwei Drachmen bis eine Unze Sublimat und zweihundert Pfund Wasser nehmen. — Diese Bäder, welche man in einer hölzernen Badewanne nehmen muß, sind ungeachtet der pomphaften Eobeserhebungen, welche man von ihnen macht, sehr gefährlich.

Solutio Sublimati, Potio cum Deutochlorureto Mercurii s. antisymphilitica. (GalM. Gen. E.)

℞. Solutionis Sublimati corrosivi
partes decem.

Gummi Arabici . . . partem unam.
Aquae destillatae partes centum.

Dissolve gummi in aqua et adde solutionem. (GalM.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Aquae purae . . . uncias sex.

Spiritus Cinnamomi,
Syrupi Sacchari,
singulorum unciam unam.

Misce. (E.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.

Acidi hydrochlorici
guttas duodecim.

Syrupi Papaveris . . . unciam unam.
Misce (Gen.)

Gebe, einen oder zwei Eßffel, zwei oder drei Mal täglich.

Gargarisma in ulceribus veneris s. mercuriale s. antisymphiliticum. (Au. B. Ra. Sy.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana sex.
Decocti Hordei . . . libram unam.

Mellis rosati . . . uncias duas.

Misce bene. (Sy.)

Ra. Sublimati granum unum ad duo
in Aquae Althaeae uncias sex vel Sub-
limati grana duo, Aquae destillatae un-
cias quatuor et Syrupi Mellis semun-
ciam; — B. Sublimati granum unum,
Decocti Hordei libram unam et Mel-
lis rosati semunciam.

Clyster s. Enema antisymphiliticum. (Ra.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Aquae destillatae . . . uncias duas.

Decocti Seminis Lini libram unam.

Bei syphilitischen Affectionen des rectum
oder wenn der Kranke den Sublimat nicht
durch den Magen verträgt.

*Injectio in necrosi syphilitica s. deter-
gens. (B.)*

℞. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Decocti Hordei . . . libram unam.

Tincturae Myrrhae
drachmam unam.

Misce.

Aqua phagedaenica composita. (Vm.)

℞. Aquae phagedaenicae uncias sex.
Extracti Myrrhae drachmam unam.

Mixtis et dilutis adde
Tincturae Myrrhae . . . semunciam.

Aqua phagedaenica Pideritii. (Pid.)

℞. Aquae phagedaenicae uncias sex.
Essentiae Croci . . . semunciam.

Solutionis Myrrhae
drachmam unam.

Sief albi Rhazis . . . unciam unam.

Dieses Wasser muß verworfen werden,
von welchem das vorige nur eine weniger
den Regeln der Chemie zuwiderlaufende
Abgleich für sich schon nicht zu empfehlende
Abänderung ist.

*Liquor Hydrargyri oxymercuriati s.
Swietenii s. syphiliticus Turneri s. Swie-
tenii, Murias Hydrargyri spirituosus
liquidus, Solutio Mercurii corrosivi s.
Muriatis Hydrargyri oxygenati s. alco-
holicum Sublimati corrosivi, Aqua Swie-
tenii. (Am. An. B*. DD. Fer. Ful. Gal.
GalM. Gen. Lon. LonN. Sax. Wür. C.
Ca. E. Fi. Sp. Sw. T. Vm.)*

℞. Sublimati corrosivi
grana duodecim.

Spiritus Frumenti bis rectificati
libras duas.

Dissolve terendo in mortario. (An.
Wür. Sp. Sw. Vm.)

DD. Sublimati granum unum et
Aquae Vitae uncias quatuor; — Sax.
Sublimati grana octo et Aquae Vitae
libram unam; — E. Sublimati grana
duo et Aquae Vitae uncias quatuor.

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.
Solutiois adde

Alcoholis unciam unam.
Misce bene. (Am. Lon. LonN. C. Fi.
Sw. T.)

Ra. Sublimati grana sedecim, Aquae
libram unam et Alcoholis sem drach-
mam; — GalM Sublimati partem
unam, Aquae nongentas et Alcoholis
(33°) centum; — Gal. Sublimati grana
octo, Aquae uncias quatuordecim cum
dimidia et Alcoholis (36°) sesqu unciam;
— Fer. Sublimati grana sex, Aquae un-
cias quatuor et Alcoholis uncias octo;
— Ca. Sublimati grana viginti, Alco-
holis (36°) drachmas viginti quinque et
Aquae libras duas.

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.

Sacchari albi semunciam.
Trituratis ad intimam mixtionem us-
que adde

Aquae Vitae uncias decem.
Post di. solutionem filtra. (Sw*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Alcoholis uncias duodecim.

Di. solve et liquori adde
Syrupi balsamici sesquunciam.
Misce bene. (B*. Pul)

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.
Acidi hydrochlorici

guttas duodecim.
Syrupi Capiti Papaveris
unciam unam.

Misce. (Gen.)

Nach mehreren Versuchen blieb Van
Swieten bei zwölf Gran Sublimat auf
zwei Pfund Kornbranntwein. Er gab,
Morgens und Abends einen Eßfel oder eine
halbe Unze von dieser Flüssigkeit, d. h. ei-
nen Viertelgran Sublimat, indem er hier-
auf ein Pfund einer erweichenden Abkochung
mit einem Dritttheil oder Biertheil Milch
versetzt, trinken ließ. Heutzutage läßt man
in Frankreich acht Gran Sublimat in einer
Drachme Alcohol auflösen und die Auflö-
sung mit zwei und dreißig Unzen destillir-
tem Wasser verdünnen. Wenn man mit
Weglassung des Alcohol, welcher zu nichts
nützt, die Verhältnisse der beiden andern
Bestandtheile unverändert läßt, so hat man
eine Flüssigkeit, welche genau einen Vier-
telgran auf die Unze enthält, ein Verhält-
niß, welches sich sehr gut für die Verthei-
lung und Anwendung des Mittels eignet.
Die Formel des Codex gallicus schreibt
einen halben Gran auf die Unze vor, was
der Practiker nie aus dem Auge verlieren
darf, wenn er grobe Fehler vermeiden will.
Man läßt Morgens nüchtern einen Eßfel
oder eine halbe Unze Flüssigkeit, d. h. ei-

nen Achtelgran Sublimat, den ersten Tag;
den folgenden Tag anderthalb Eßfel oder
Dreiviertel Unzen, d. h. drei Sechszeh-
theil; endlich den dritten Tag zwei Eßfel
oder eine Unze, d. h. einen Viertelgran
Sublimat, nehmen und so fort, bis man auf
einen halben Gran gekommen ist, eine
Quantität, welche man nie überschreiten darf.
Dß ist es gut, wenn man die Flüssigkeit
auf zwei Mal, Morgens und Abends, nimmt.
Man giebt sie in einigen Unzen Gersten-,
Leinsoamen- oder Eibischwasser, mit Milch,
mit Gummiwasser, mit Looch gummosum
oder syrupus Gummi arabici; auch kann
man sie einer Pinte Lissane hinzumischen,
welche der Kranke den Tag über glasweise
trinkt.

Liquor Hydrargyri camphorati s. ad
condyliomata. (Au)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Camphorae drachmam unam.
Alcoholis unciam unam.

Ruß empfiehlt diese Flüssigkeit zur Aus-
trocknung und Zerstörung von Condylomen.

Liquor antisiphiliticus. (Br.)
℞. Sublimati corrosivi
grana duodecim.

Aquae Foeniculi,
Alcoholis, singulorum libram unam.
Julep rosati uncias duas.
Misce sedulo

Gargarisma antisiphiliticum. (ParC.)

℞. Liquoris Suieteni uncias duas.
Mellis rosati unciam unam.
Decocti sudorifici uncias sex.

Misce.

Liquor antivenericus. (Pie.)

℞. Sublimati corrosivi grana duodecim.
Camphorae grana quatuor.
Triturata in mortario marmoreo dis-
solve in

Aquae Vitae libris duabus.
In fine adde
Syrupi Rhoeados unciam unam.

Gabe, einen bis zwei Eßfel, Morgens
und Abends in einem halben Pfund Brust-
tissane oder Kuhmilch.

Solutio Marrayati. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi,
Acidi hydrochlorici,
singulorum grana decem.
Spiritus Lavandulae compositi
unciam unam.

Gabe, zwanzig Tropfen, Morgens und
Abends, in sechs Eßfeln weißem Wein oder
Eibischwasser.

Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati
corrodens. (RC.)

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.

Acidi muriatici concentrati
drachmas duas.

Solve. — Jeder Tropfen enthält einen halben Gran Sublimat, muß also gehörig verdünnt werden. — Außerlich bei Gonorrhöen, Warzen, Schrunden, Geschwüren mit Fleischwucherungen.

Mixtura mineralis. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Aqueae destillatae uncias novem.
Solutioni adde
Aqueae Cinnamomi vinosae
uncias duas.

Alcoholis rectificati,
Syrupi Althaeae,
singulorum unciam unam.

Tisana Bourguenodi. (H.)

℞. Succii Liquiritiae . sesquilibram.
Aqueae communis

libras tres cum dimidia.

Solutioni adde
Sublimati corrosivi grana duodecim.
dissoluti in
Alcoholis rectificati uncias duabus.
Gabe, zwei Köffel in einer Pinte Wasser.

℞. *Syrupus antivenericus St. Ildephont.*

(Sm.)

℞. Sublimati corrosivi
grana quindecim.

Alcoholis . . . drachmas duas.
Tritura, donec bullae evanuerint neque quidquam amplius desideat, infunde deinde in

Syrupi Capilli Veneris
uncias viginti quatuor.

Immitte balneo aquae ut alcohol evaporet.

Gabe, anfangs einen, dann zwei oder drei Köffel in einer Pinte einer starken Eibischabkochung, den Tag über zu trinken. Dieses Mittel, drei Wochen oder einen Monat lang fortgesetzt, mit Milch als einzige Nahrung, heilte oft venerische Krankheiten.

Gargarisma antisyphiliticum. (Ca.)

℞. Liquoris Swietenii drachmam unam.
Decocti Hordei . libram unam.
Syrupi Cuisinerii . uncias duas.
Misce.

Aqua caustica ad condylomata s. phagedaenica Grindelii. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Camphorae . drachmam unam.
Alcoholis rectificati unciam unam.

Injectio Whately. (E. Sm.)

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.

Alcoholis . . . unciam unam.
Dissolve et hujus solutionis guttas duas ad viginti misce cum

Aqueae destillatae uncias quatuor.
Sulphatis Zinci

grana quatuor ad decem.

Bei Blenorrhöe empfohlen. — Gabe, eine Drachme auf einmal. Man wiederholt die Einspritzung dreimal täglich. — Der Sublimat ist darin durch das Zinksalz zerlegt.

℞. Sulphatis Zinci grana decem, Sublimati duas et Aqueae Rosarum uncias octo.

Tinctura antisyphilitica. (Au.)

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Balsami Canadensis,
Resinae Guajaci,
singulorum uncias duas

solutas in
Alcoholis . . . uncias quatuor.

Adde
Olei Sassafras . drachmas duas.
Gabe, zehn Tropfen alle Stunden, bei chronischer Gonorrhöe.

Aether mercurialis, Solutio Sublimati corrosivi aetherea. (B*. Fi. T.)

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Aetheris sulphurici unciam unam.
Diese Formel ist von Cheron. — Gabe, vier bis sechs oder zehn bis zwölf Tropfen in Milch, Gummi-, Zuckerwasser; und zwei Drachmen bis eine halbe Unze, äußerlich in Einreibungen in der Nähe der Geburtsheile.

Lange vor Cheron hatte Esfontaine empfohlen, Morgens und Abends in einer Tasse schleimiger Eißene zehn bis zwanzig Tropfen einer Auflösung von vier Gran Sublimat in einer halben Unze Schwefeläther zu nehmen.

Die Stüchtigkeit des Excipiens empfiehlt aber dieses Präparat sehr wenig.

Emulsio Sublimati corrosivi. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aetheris sulphurici
drachmam unam.

Solutionem subige cum
Vitellorum Ovorum . . . no. 2
et adde sensim

Aqueae Menthae piperitae
uncias quinque.

Syrupi Althaeae . unciam unam.

Syrupus mercurialis Cheroni.

℞. Sacchari albi purificati
sesquilibram.
Aqueae destillatae . libram unam.
Saccharo hlando calore in aqua soluto, post perfectam refrigerationem adde

Aetheris mercurialis unciam unam.

Unguentum s. Pomatum Cyrilli s. mercuriale corrosivum s. mercuriale apyralizomenon s. Murtatis Hydrargyri oxygenati; Pomatum Deutochlorureli Mercurii. (B*. Fer. Gal. GalM. RC. Sax. Bo. Br. Ca. Fi. Huf. T.)

℞. Sublimati corrosivi pulverati partem unam.

Axungiae praeparatae partes octo.
Diu in mortario vitreo trituratione tere deinde supra laminam porphyream. (Fer. Gal. GalM. RC. Br*. Fi. T.)

Cirillo hatte zulezt etwas Salmiak zugefetzt, wie sich in Folgendem findet:

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum partem unam.

Axungiae partes octo.
Tritura per horas viginti quatuor. (B*. Sax. Huf.)

℞. et Ca. Sublimati drachmam unam,
Salis Ammoniaci grana decem et Axungiae unciam unam.

Cirillo beschrieb eine Drachme in Einreibungen in die Fußsohlen, Cullerier anfangs nur eine halbe.

Emplastrum corrosivum. (Gen.)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Axungiae Porci . . . semunciam.
Cerae albae . . . drachmas duas.
Misce.

Unguentum s. Pomatum Cyrilli opiaceum. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Axungiae praeparatae partes octo.
Trituratis simul adde

Extracti Opii . . . grana decem
Gegen rebellische Krüpper in schwachen Einreibungen auf das Mittelfleisch.

Unguentum Hydrargyri cinereum fortius. (Han.)

℞. Sublimati corrosivi scrupulum unum.

Mercurii . . . uncias sex.
Sevi vervecini . . . uncias duas.
Axungiae Porci . . . uncias quatuor.

Tritura in mortario lapideo ad perfectam metalli extinctionem usque. — Der Sublimat wird in diesem Präparat bald zerfetzt und in saftsaures Drybul umgeändert.

Unguentum Muriatis oxygenati Hydrargyri s. antipsoricum. (H s. Bo.)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Cerussae . . . partes quindecim.
Axungiae Porci . . . partes triginta.
Misce trituratione. (Bo.)

℞. Butyri recentis uncias quatuor.
Terebinthinae,

Olei Rosarum,
singulorum unciam unam.

Liquatis blando igne adde
Pulveris Cerussae
uncias duas cum dimidia.

Sublimati corrosivi,
Aluminis calcinati,
singulorum drachmas duas.

Vitellorum Ovorum . . . no. 2.
Succi Citri . . . uncias duas.

Misce bene. — Ein schlechtes Präparat, in welchem der Sublimat bald zerfetzt wird und welches daher verworfen werden muß.

Pilulae majores Hoffmanni. (Br. Fer. Ham. Hau. Wir. Au. E. Fig. Ra. Sm. Sp.)

℞. Sublimati corrosivi grana quindecim.
Aque destillatae drachmas sex.

Dissolutioni adde
Micae Panis albi
drachmas duas cum dimidia.

Misce bene ut fiant pilulae centum viginti. — Jede enthält einen Ächelgran Sublimat, auch kann man sie pulvern und mit Zucker vermischen. (Br. Han. Wir.)

Sp. Sublimati drachmam unam,
Aque quantum sufficit ad solutionem et Micae Panis drachmas novem ut fiant pilulae grani unius (sexcentae), quarum quaeque decimam grani partem continet. — Spielmann verordnet, aus einem unbegreiflichen Irrthum, vier bis fünf Stück täglich dreimal.

℞. Sublimati corrosivi . . . grana sex.
Soluto in Aque destillatae sufficiente quantitate adde

Micae Panis,
Sacchari albi,

singulorum quantum satis
ut fiant pilulae centum octoginta, quarum quaeque trigesimam grani partem sublimati continet. (Ham. Au.)

℞. Sublimati corrosivi scrupulum unum,

Alcoholis . . . drachmas duas.

Farinae Triticici . . . drachmas tres.

Aque destillatae quantum sufficit
ut fiant pilulae centum sexaginta, quarum quaeque sublimati octavam grani partem continet. (Ra.)

Fer. et B. Sublimati semigranum,
Alcoholis sufficientem ad solutionem quantitatem et Micae Panis quantum sufficit ut fiant pilulae quatuor.

℞. Sublimati corrosivi grana viginti.

Amyli . . . semunciam.

Gummi Arabici drachmas duas,
Aque communis quantum sufficit
ut fiant pilulae centum sexaginta. (Ra.)

℞. Sublimati corrosivi grana decem,

Sacchari crystallisati (Candis),

Faeculae Solani tuberosi,
singulorum drachmam unam.

Aquae sufficientem quantitatem
ut fiat massa in pilulas octoginta di-
videnda, quarum quaeque sublimati
octavam grani partem continet. (Pie.)

℞. Sublimati corrosivi
grana duodecim.

Aquae destillatae drachmam unam.
Solutioni adde

Mannae in lacrymis
drachmas duas.

Pulveris Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiat massa in pilulas nonaginta sex
dividenda. (Sm.)

Die letztere Formel ist von Pelletan
und die beste von allen. Man giebt Mor-
gens und Abends Anfangs ein, dann zwei
Stück.

Pilulae Vogleri. (B*.)

℞. Succu Liquiritiae depurati
drachmam unam.

Gummi Tragacanthae
scrupulos duos.

Sublimati corrosivi semiscrupulum.
Misce triturando succum cum gummi,
sal in Aquae pauxillo solum infun-
dendo ut fiat massa in pilulas centum
dividenda, quarum quaeque sublimati
decimam grani partem continet.

Pilulae Muriatis Hydrargyri oxydati.
(RC.)

℞. Sublimati,
Salis Ammoniaci,

singulorum grana decem.
Aquae destillatae drachmam unam.

Pulveris Radicis Liquiritiae vel
Amyli scrupulos octo.

Mellis drachmam unam.

Fiat massa in octoginta pilulas di-
videnda. — Gabe, zwei bis vier zwei-
oder dreimal täglich, mit schleimigem Trant.
Häufig mit Zusatz von einem Scrupel
Opium oder acht Gran Brechweinstein zu
der Masse.

Pilulae sialagogae. (E.)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,

singulorum grana quinque.
Aquae destillatae guttas triginta

ad quadraginta.
Conservae Rosarum

scrupulum unum.
Pulveris Liquiritiae

quantum sufficit
ut fiat pilulae quadraginta, quarum
quaeque sublimati partem grani oct-
avam continet.

*Trochisci Muriatis oxygenati Hydrar-
gyri s. escharotici s. escharotici albi.*
(Gal. GalM. His. Fi. T.)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Amyli partes duas.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiant trochisci. (Gal. GalM. Fi.)

His, Sublimati partes quatuor, Amyli
septem et unam Gummi Tragacanthae
pulverata Aquae purae ope in massam
homogeneam redigere jubet

Chocolata antivenerea.

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Spiritus Frumenti quantum sufficit
ad solutionem.

Balsami Peruviani liquidij
drachmas quatuor.

Pastae Cacao praeparatae
uncias quatuordecim.

Sacchari pulverati uncias duas.
Librae quaeque in partes triginta
duas dividatur. — Gabe, von einem Vier-
tel bis zu zwei Theilen. — Ein schlechtes
verwerfliches Präparat.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung
des Sublimats durch fremde Sub-
stanzen mehr oder weniger verän-
dert ist.

A. Durch Eisenhut.

Pilulae Aconiti mercuriales. (B*. Pie.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Extracti Aconiti Napellij

scrupulum unum.
Tritura diu in mortario vitreo ut
fiat pilulae viginti. — In chronischen
Krankheiten des Lymphsystems, und Flech-
ten, besonders mit Kräfte. Scrophel- und
sophilitischer Complication. — Gabe, eine
Pille Morgens und Abends, alle zehn Tage
um eine gestiegen.

B. Durch Alaun.

Aqua Mercurii viriolati s. aluminosa.
(Ful. Au.)

℞. Sublimati corrosivi,
Aluminis,

singulorum drachmas duas.
Aquae communis . libras duas.

Cognendo dimidium consume et fil-
tra. — Ein schlechtes, keine Spur von
Sublimat behaltendes Präparat.

C. Durch Spießglanz.

Electuarium antiherpeticum. (Bo. Pie.)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Antimonii crudi pulverati

semunciam.

Extracti Fumariae unciam unam.
Resinae Guajaci . . . semunciam.
Syrupi Corticum Aurantium
quantum sufficit.

Fouquet verschreibt davon eine halbe bis zwei Drachmen täglich. — Ein schlechtes Präparat.

D. Durch Schierling

Pilulae antisiphiliticae. (Ful. E.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana sex.
Aquaе destillatae quantum sufficit
ad dissolvendum; adde

Extracti Cicutae drachmam unam.
Pulveris Cicutae quantum sufficit
ut fiant pilulae quadraginta octo.

Pilulae antiherpeticæ. (Pic.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana octo.
Rhei . . . drachmam unam.
Saponis medicinalis,
Extracti Conii,

singulorum drachmas duas.

Fiant pilulae sexaginta quatuor. —
Ein schlechtes und verwerfliches Präparat.

Gargarisma Belladonnae cum Hydrargyro s. mercuriale. (Au.)

℞. Herbae Belladonnae,
— Cicutae,
singularum manipulum unum.
Seminis Lini . . . uncias duas.
Sublimati corrosivi
grana sex ad decem.

Aquaе . . . libras duas.
Coque per momenta aliquot. —
Santer empfiehlt dieses Gurgelwasser bei Halsaffectionen nach Charlach.

E. Durch Pfefferkraut.

Syrupus antiscorbuticus Portalii. (GalH. Br. Ca.)

℞. Radicis Gentianae unciam unam.
— Rubiae,

Chinae,
singulorum drachmas quatuor.

Aquaе . . . libras quatuor.
Coque ad libram liquidam duarum
remanentium, cola et adde

Sacchari albi . . . libras tres.
Albuminis ope clarificata coque ad
syrupi consistentiam et cola.

Praeterea

℞. Foliorum Nasturtii aquatici,
— Cochleariae,
singulorum uncias quatuor.

Radicis Armoraciae unciam unam.
Contunde in mortario; in succo expresso et frigide filtrato solve balnei
aquaе ope

Sacchari albi contusi
uncias viginti duas.

Cola, syrupum cum praemonito commisce et adde

Sublimati corrosivi grana quatuor,
antea dissoluti in

Alcoholis . . . drachmis duabus.
Bei Hautkrankheiten, Scropheln, Scorbut und allen syphilitischen Uebeln. — Gabe, eine bis zwei Unzen in einer passenden Lissane.

F. Durch Copaivabalsam.

Opiatum Pajot-Laforesti.

℞. Sublimati corrosivi,
Pulveris Gummi Kino,
Balsami Copaivae,
singulorum semunciam.
Gummi Arabici pulverati
sesquiunciam.

Sacchari albi pulverati
uncias quinque.

Aquaе Menthae quantum sufficit.
Gummi cum aqua in mucilaginem tritis admisce triturando kino, sublimatum et balsamum, miscellae Aqua Rosarum leviter humefactae adde sensim saccharum et Aquaе Rosarum quantum ad electuarii consistentiam ei praebendum sufficit. — Bei chronischen Ausflüssen aus der Uretra und im Anfange higer Harnröhrentzündung. — Gabe, zwei Drachmen Morgens und Abends. — Man giebt es allein, entweder mit einem Aufguss von Gamander oder mit einer Lasse eisenhaltigem Wasser mit Aethersyrup versüßt.

G. Durch Kupfer.

Pulvis causticus Krügeri. (Ca.)

℞. Sublimati corrosivi,
Cupri sulphurici,
singulorum grana decem.
Argentii nitrici . . . grana sex.

Ein schlechtes Präparat, welches auf venerische Auswüchse empfohlen wird; man beseuchet sie damit mittelst eines Pinsels.

Collyrium siccum. (Vm.)

℞. Sublimati corrosivi,
Muratis Cupri,
singulorum grana quatuor.
Iridis Florentinae semidrachmam,
Sacchari albissimi drachmas duas.
Misce.

H. Durch Guajac.

Elixir balsamicum purificans, Essentia balsami Canadensis mundificans, Tinctura balsamica purificans s. antivenerica Falkii. (Wür. Bo, Pid. Pis. Sp. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Alcoholis . . . unciam unam.
Dissolve et solutioni adde
Resinae Guajaci,

Balsami Canadensis,
singulorum unciam unam
dissoluta in
Alcoholis uncias septem.
Filtrata et adde deinde
Olei essentialis Sassafras
drachmas duas.
Misce lagenam agitando. (Bo. Pie.
Sp.)
℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Alcoholis rectificati uncias quatuor.
Dissolve et liquori adde
Terebinthinae Venetae,
Resinae Guajaci,
singularum unciam unam
solutas in
Alcoholis uncias quatuor.
Misce bene et adde
Olei essentialis Sassafras
drachmas duas.

Serva. (Würr.)

Pid. eandem formulam sed loco terebinthinae Balsamum Canadense adhibere jubet.

Ban Moné hat dieses Präparat mit Gluck vereinfacht:

℞. Sublimati corrosivi
scrupulum unum.
Olei Sassafras . . . drachmas duas.
Tincturae Resinae Guajaci
uncias octo.
Aquae Vitae . . . uncias duodecim.
Post dissolutionem filtra.

Ein kräftiges Reizmittel, welches bei vermuthlichen syphilitischen Uebeln und Krankheiten von andern Schärfen empfohlen wird. — Gabe, jetzt bis zwanzig Tropfen, Morgens und Abends, in einem passenden Vehikel.

I. Durch Kleber.

Pilulae Taddai.

℞. Amyli Tritici . . . libram unam.
Fiat cum Aqua destillata pasta, quae sub aqua, amyli removendi causa malaxetur; gluten per horas viginti quatuor hiberno, per octo vel de em horas aestivo tempore sibi ipsi relictum comprime deinde et agitata cum solutione semunciae Saponis amygdalini in Aquae libra una, donec liquor homogeneus evadat, qui per cribrum trajiciatur; Sublimati corrosivi drachmam unam in Aquae sufficiente quantitate dissolve et liquoris glutinosi talem excessum ei tunc infunde, donec flocci exoriri desierint, qui post aliquot horarum repositionem supra linteum recepti et siccati cum Extracto Guajaci vel Juniperi in pastam redigantur in pilulas centum quadraginta quatuor dividendam.

T. Sublimati corrosivi drachmas duas, Aquae destillatae sufficientem quantitatem; solutioni capsulae porcellanae inmissae infunde, continue agitando, excessum glutinis triticei ope solutionis saponis teneri cum Aqua saturatae in emulsionem redacti; praecipitatione peracta miscellam crinio immitte ad separanda coagula sublimati et glutinis, quae collecta et inter manus deinde vero inter diversa strata chartae bibulae compressa, rupta et attenuata denique cum Extracto Graminis in pilulas 288 redigantur. — Jede Pille enthält einen halben Gran.

Tabbei schreibt diese Pillen in venerischen Krankheiten, zu zwei oder drei bis sechs, acht und selbst mehr täglich gegeben; sie sind aber zu verworfen, weil ihre innere Zusammensetzung noch nicht bekannt ist. Der Sublimat ist darin in zerfertigtem Zustande vorhanden, außerdem könnte man deren nicht acht nehmen, welche vier Gran Sublimat gleichkommen würden.

J. Durch Gnadenkraut (Gratiola).

Electuarium antisiphiliticum. (Au. Sy.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana tria.
Extracti Gratiolae drachmas tres.
Roob Sambuci . . . uncias tres.
Misce. — Etoll verordnete diese Latwerge bei schmerzhaften, von syphilitischem Gift hergeleiteten Geschwülsten.

Mixtura antisiphilitica de Haeni. (Sm.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana tria.
Extracti Gratiolae drachmas duas.
— Aconiti drachm. unam.
Roob Sambuci . . . uncias sex.
Misce bene. — Bei chronischer ausgearteter Syphilis empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich, indem man mit der gratiola allmählich bis auf eine halbe Unze steigt.

K. Durch Opium.

Pilulae Sublimati corrosivi cum Opio s. Opii. (BorC. Au.)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Opii purae . . . grana quinque.
Aquae calidae . . . quantum sufficit
ad totius solutionem; adde
Micae Panis albi vetusti pulverati
scrupulos sex.

Succi Liquiritiae

scrupulos quatuor.
Misce ut fiant pilulae centum. — Gabe, ein oder zwei Stück Morgens und Abends. (BorC. Au.)

℞. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
Aquae . . . quantum sufficit.
Solutioni adde
. Opii grana quatuor.

Camphorae grana octo.
 Sacchari semidrachmam.
 Micae Panis . . . quantum sufficit.
 Fiant pilulae quadraginta. — Gabe,
 drei bis fünf, Morgens und Abends. (Au.)

Pilulae antivenerae. (Ra. Sm.)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
 Aëque quantum sufficit
 ad dissolvendum; liquori adde
 Extracti Opii gummosi

grana duodecim.
 — Chinae scrupulum unum.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiant pilulae sedecim, quarum quae-
 que sublimati partem grani quartam
 continet. (Sm.)

Diese Pillen sind von Frank; Du-
 punktren hat sie auf folgende Weise ver-
 ändert:

℞. Sublimati corrosivi,
 Extracti Opii,
 sngulorum semigranum.
 — Chinae . . . grana decem.

Pulveris Chinae quantum sufficit
 ut fiant pilulae duae. (Ra.)

*Solutio Sublimati corrosivi alcoholica
 opiacea. (B*. D.D. Au.)*

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
 Alcoholis uncias quatuor.

Solutioni adde
 Tincturae Opii spirituosae
 drachmam unam.

Misce bene. (DD.)

℞. Sublimati corrosivi
 drachmas(?) duas.
 Aëque Cinnamomi vinosae
 unciam unam.

Solutioni adde
 Laudani liquidi Sydenhami
 scrupulum unum.

Misce bene. (B*.)

Au. Sublimati grana quatuor, Aëque
 Cinnamomi vinosae uncias tres et Tin-
 cturae Opii scrupulos duos. — Es ist
 ein ungeheures Mißverhältniß zwischen
 beiden Formeln, die erste ist aber der zwei-
 ten vorzuziehen.

Liquor Spangenbergii. (Pie. Sm.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
 Tincturae Opii drachmam unam.
 Aëque Rosarum uncias quatuor.
 Als Waschmittel nach verdächtigem Wei-
 schlaf empfohlen.

Injectio mercurialis opiacea. (Ra.)

℞. Sublimati corrosivi
 grana duodecim.
 Aëque destillatae . libras duas.
 Solutioni adde
 Laudani liquidi Sydenhami
 unciam unam.

Bei Frauen, welche an venerischen Ge-
 schwüren leiden.

*Litus Hydrargyri, Collutorium mercuri-
 riale. (Au.)*

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
 Extracti Cicutae,
 — Chamomillae,
 singulorum drachmas duas.
 Tincturae Opii drachmam unam.
 Mellis rosati . . . unciam unam.
 Bon Rust empfohlen.

*Aqua ophthalmica Conradi s. mercuri-
 rialis s. Hydrargyri muriatici corrosivi
 cum Opio, Collyrium ex Hydrargyro
 muriatico corrosivo. (DD. Han. WW.
 Au. Ra. Vm.)*

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
 Infusi Florum Sambuci
 uncias quatuor.
 Tincturae Opii spirituosae
 drachmam unam.

Sublimato in infusione soluto adde
 tincturam (DD.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
 Aëque Florum Sambuci

drachmas sex.
 Tincturae Opii . guttas decem.
 Succu Liquiritiae drachmam unam.

Misce. (Au.) — Man giebt diese Auf-
 lösung innerlich zu zwanzig Tropfen alle
 drei Stunden

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
 Aëque Rosarum uncias quatuor.
 Extracti Opii . . . grana duo.
 Misce. (WW.)

Han. et Vm. Sublimati granum unum,
 Aëque Rosarum uncias sex et Laudani
 liquidi Sydenhami scrupulos duos; —
 Ra. Sublimati granum unum, Gummi
 Tragacanthae scrupulum unum, Aëque
 Rosarum uncias quatuor et Laudani
 liquidi guttas octodecim.

℞. Sublimati corrosivi grana duo.
 Extracti Opii . semiscrupulum.
 Aëque Rosarum uncias quatuor.
 Solutioni adde

Mucilaginis Seminum Cydoniorum
 semunciam.

Diese Formel hat viel Ähnlichkeit mit
 der vorigen. (Vm.)

℞. Aëque Chamomillae unciam unam.
 Seminum Cydoniorum
 grana viginti.

Fiat mucilago, cui adde
 Sublimati corrosivi granum unum.
 Misce sedulo. (Au.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
 Aëque Rosarum . . . uncias sex.
 Laudani Sydenhami
 semidrachmam.

Misce. (Au.)

Gargarisma mercuriale. (Ra.)

- ℞. Foliorum siccorum Cicutae semunciam.
 Aquae sesquilibram.
 Coque et adde colaturae
 Sublimati corrosivi . . . grana tria.
 Laudani liquidi Sydenhami
 drachmam unam.
 Mellis uncias duas.

Elixir Weighti. (Vm.)

- ℞. Opii drachmam unam.
 Pimentae drachmas duas.
 Serpentariae Virginicae
 drachmas tres.

Aquae Vitae
 uncias octoginta duas.

Infunde frigide, post sufficientem
 extractionem cola exprimendo et cola-
 turae adde

Resinae Guajaci drachmas decem
 et post hujus solutionem

Sublimati corrosivi semidrachmam.
 Dissolve et filtra.

Cereoli mercuriales dissolubiles. (Au.)

- ℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
 Extracti Opii drachmam unam.
 Aquae uncias duas.
 Gummi Arabici quantum sufficit
 ut fiat solutio spissa, cui repetitò fila
 gossypina immergantur, post quam-
 que immersionem siccanda. — *Besten*
empfohl sie bei chronischer Gonorrhoe.

L. Durch Blei.

Trochisci de Minio s. escharotici. (Gal.
Sar. Wir. Ca. Fi. Sp. T. Vm.)

- ℞. Sublimati corrosivi partes duas.
 Minii partem unam.
 Micae Panis pulveratae
 partes quatuor.

Aquae Rosarum quantum sufficit.
 Fiant trochisci voluminis et formae
 grani avenae. (Gal. Sp.)

Wir. Sublimati partem unam, Minii
 tantidem, Amyli duas, Micae Panis
 tantidem et Mucilaginis Gummi Tra-
 gacanthae sufficientem quantitatem; —

Vm. Sublimati partes duas, Minii unam,
 Micae Panis octo et Aquae sufficientem
 quantitatem; — *Sar.* Sublimati,
 Minii, singulorum drachmam unam,
 Micae Panis unciam unam et Aquae
 quantum sufficit; — *Ca.* Sublimati
 unciam unam, Minii semunciam, Mi-
 cae Panis uncias sex et Aquae suffi-
 cientem quantitatem; — *Fi.* Minii
 drachmam dimidiam, Sublimati drach-
 mam unam, Micae Panis unciam dimi-
 diam, Aquae Rosarum quantum suffi-
 cit; — *T.* Micae Panis uncias tres,
 Sublimati corrosivi drachmas sex et
 Aquae Rosarum quantum sufficit.

Injectio hydrargyro-saturnina s. de
Plumbo et Mercurio, Solutio hydrargy-
rata. (Sw. Sy.)

- ℞. Lithargyri unciam unam.
 Sublimati corrosivi semidrachmam.
 Aceti uncias quinque.

Digere in loco calido per horas duo-
 decim, vas saepius agitando; partem
 liquidi limpidam decantha et hujus li-
 quoris drachmis duabus vel quatuor
 adde

Aquae destillatae uncias quatuor.
 Misce bene. (Sy.)

- ℞. Sublimati corrosivi,
 Plumbi acetici crystallisati,
 singulorum semidrachmam.

Aquae Rosarum libram unam.
 Dissolve. (Sy.)

- ℞. Sublimati corrosivi . . . grana duo.
 Aquae purae uncias sedecim.

Solutioni adde
 Plumbi subacetici liquidi
 guttas triginta.

Misce bene. (Sy.)

Sw. Sublimati semigranum, Aquae
 uncias quatuor et Subacetatis guttas
 octo; — vel: Sublimati semiscrupu-
 lum, Aquae uncias quindecim et Sub-
 acetatis drachmas duas, — vel: Sub-
 limati semidrachmam, Subacetatis un-
 cias quinque et cuique drachmae mis-
 cellae harum substantiarum simul tri-
 turatarum Aquae librae unius additio-
 nem.

Ein schlechtes Präparat. — Man hat
 es bei chronischer und selbst bei heftiger
 Harnröhrenentzündung empfohlen.

Lotio Plumbi composita s. exsiccans.
 (Sw.)

- ℞. Acetatis Plumbi liquidi,
 Sulphatis Zincii,
 singulorum semunciam.

Sublimati corrosivi grana viginti.
 Aquae libras duas.

Ein schlechtes Präparat, welches man
 bei manchen pruriginösen Ausschlägen an
 dem Scrotum und den Geschlechtstheilen
 empfohlen hat.

Aqua antiherpetica Cardinalis de Lugnes.
 (Bo. Ca. Pic.)

- ℞. Sublimati corrosivi
 sesquidrachmam.

Cerussae drachmas quatuor.
 Aluminis drachmas tres.

Aluminis Ovi no. 1.
 Aquae Rosarum uncias octo.

Commisce bene. (Pic.)

Bo. et Ca. Sublimati semunciam, Ce-
 russae uncias duas, Aluminis unciam
 unam et Aquae communis libras duas.

Ein schlechtes Präparat; man trinkt

Compressen damit, welche vorsichtig auf Flechten anzuwenden sind.

Liquor ad condylomata, Aqua caustica, Aqua cathartica Plenckii. (Wür. *Au. Ca. Sv. Sy. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Aluminis,
singulorum unciam unam.

Cerussae,
Camphorae,
singulorum drachmam unam.

Alcoholis,
Aceti albi,
singulorum uncias duodecim.

Misce et absque filtratione serva.
(Wür. *Vm.*)

Ca. Sublimati drachmas duas, Aluminis, Cerussae, Camphorae, singulorum tantidem, Alcoholis et Aceti, singulorum sesquiliagram.

℞. Sublimati corrosivi
drachmam unam.

Aluminis,
Camphorae,
Acetatis Plumbi crystallisati,
singulorum semidrachmam.

Alcoholis,
Aceti, singulorum semunciam.

Misce bene. (*Sy.*)

Au et Sv. omisso plumbo Sublimati drachmam unam, Aluminis, Camphorae, singulorum semidrachmam, Aceti, Alcoholis, singulorum semunciam; — vel: Sublimati uncias duas, Aluminis tantidem, Camphorae drachmas duas, Alcoholis et Aceti, singulorum libras duas.

Ein schlechtes Präparat; man trinkt Plumaceur damit, welche man auf venerische Auswüchse applicirt. — Das folgende ist noch weniger rationell und muß ganz verworfen werden.

Aqua mercurialis s. Stettinensis ad usus externos. (Br. Wir.)

℞. Florum Granati . . . semunciam.
Plumbi acetici crystallisati,
Tartari albi,
singulorum drachmam unam.

Radicis Tormentillae
drachmas duas.

Aluminis saccharati unciam unam.
Sublimati corrosivi,
Ligni Santali rubri,
singulorum drachmam unam.

Alcoholis rectificati
uncias sedecim.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo. (Br)

℞. Cerussae unciam unam.
Aluminis drachmas sex.
Lithargyri semunciam.

Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.

Aquae Solani nigri,
— Plantaginis,
— Rosarum,
— Nymphaeae,
singulorum uncias quatuor.

Aceti semilibram.
Coque leviter et absque colando serva. (Wir.)

Unguentum siccativum. (*Sv.*)

℞. Tutiae praeparatae,
Sublimati corrosivi,
singulorum scrupulum unum.

Oxydi Mercurii rubri,
Acetatis Plumbi,
Aluminis calcinati,
singulorum drachmas duas.

Axungiae Porci uncias quatuor.
Misce triturando.

M. Durch Rhabarber.

Pilulae mercuriales. (GalF. Ra.)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Alcoholis guttas aliquot.
Solutioni pedetentim adde

Pulveris Rhei,
— Resinae Guajaci,
singulorum drachmam unam.

Extracti Liquiritiae
quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quinque.
(GalF.)

Ra. Sublimati scrupulum unum, Rhei drachmas duas, Saponis medicinalis semunciam, Pulveris Liquiritiae et Syrupi Florum Aurantium quantum sufficit ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor. — Die letztere Formel ist zu verwerfen.

N. Durch Scammonium.

Pilulae Scammonii hydrargyrosae s. mercuriales s. e Scammonio compositae. (Suec.)

℞. Sublimati corrosivi,
Scammonii,
singulorum grana duodecim.

Gummi Gutti . . . grana quinque.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae sex. (!)

Durch Zusatz einer Drachme Rhabarberextract und durch Vertheilung der Masse in vier und zwanzig Pillen würde man ein leichter zu handhabendes und weniger gefährliches Präparat erhalten.

O. Durch Senna.

Pilulae antivenerae Lassonne. (*Sm.*)
℞. Sublimati corrosivi
grana octodecim.

Mercurii dulcis
 grana quinquaginta quatuor.
 Diu trituras adde
 Resinae Guajaci semidrachmam.
 Sennae pulveratae
 drachmam unam.
 Syrupi Dianthi quantum sufficit
 ut fiant pilulae duorum granorum. —
 Gabe, drei Stück täglich, allmählig gestie-
 gen. — Ein schlechtes Präparat.

Iodureta Mercurii.

§. I. Proto-Ioduretum.

Fer. GalH. Ma. T.

℞. Protonitratis Mercurii crystallisati
 partes centum.

Aquae . . partes quadringentas.
 Dissolve, filtra liquorem et ei sen-
 sim infunde

Iodureti Potassii in Aqua Acido
 nitrico acidulata dissoluti
 quantum sufficit

ut non amplius enascatur praecipita-
 tum, quod filtro receptum Aqua des-
 stillata abluatur, donec a potassa non
 amplius nigrum praecipitur, quo facto
 siccatum a luce tutum serva.

T. Obtinetur reciproca decomposi-
 tione Hydriodatis Potassae et Nitratis
 Protoxydi Mercurii.

§. II. Deuto-Ioduretum.

Fer. Fi. Ma. T.

℞. Sublimati corrosivi
 partes septuaginta.
 Iodureti Potassii partes centum.

Dissolutis seorsim in Aquae destil-
 latae sufficiente quantitate, liquores
 filtrati sensim commisceantur; praeci-
 pitatum in filtro receptum Aqua destil-
 lata ablue, donec saporis expers eva-
 dat, quo facto siccatum et pulveratum
 a luce tutum servetur. (Ma.)

℞. Solutionis Hydriodatis Potassae
 quantum vis.

Infunde ei guttatim solutionem Sub-
 limati corrosivi, donec nihil amplius
 praecipitur; praecipitatum lotum sic-
 ca. (Fer. Fi.)

T. Solutioni filtratae Hydriodatis
 Potassae puri unciae dimidiae vel unius
 in Aquae destillatae sufficiente quanti-
 tate solutionem infundere jubet filtra-
 tam Sublimati corrosivi cum Aqua des-
 stillata paratam.

Die Quecksilberioduren sind kräftige Reiz-
 mittel, von denen das zweite an Wirksam-
 keit selbst den Sublimat übertrifft; man
 hat sie besonders bei der Behandlung vene-
 rischer Krankheiten mit Schrophelcomplica-
 tion angewendet. Es bedurfte bisweilen
 nur einer Berührung von wenigen Augen-
 blicken mit dem Deutoiodure, um eine sehr

heftige rothlaufartige Hautentzündung her-
 vorzubringen. Man fängt mit einem Sechszehnthel an und steigt allmählig bis zu ein-
 nem Viertelgran.

*Solutio Deuto-iodureti Mercurii alcoho-
 lica, Alcohol cum Deuto-iodureto Mer-
 curii.* (Fer. GalF. GalH. Fi. Ma.)

℞. Deuto-iodureti Mercurii
 grana viginti.
 Alcoholis (36°) . . sesquiunciam.

Dissolve. (GalF. GalH. Ma.)
 Sechs und zwanzig Tropfen enthalten
 beinahe einen Achtelgran Jodüre.

Fer. Alcoholis unciam unam tantum
 praescribit; — Fi. Alcoholis 36° un-
 ciam unam, Deuto-iodureti scrupulum
 unum. — Sehen Tropfen enthalten einen
 Sechszehnthelgran Jodüre. — Gabe, ze-
 hen, fünfzehn und zwanzig Tropfen in ei-
 nem Glase destillirtem Wasser, da das gemeine
 reine Wasser eine Zersehung bewirken würde.

Solutio Deutoiodureti Mercurii aetherea.
 (GalF. Ma.)

℞. Deutoiodureti Mercurii
 grana viginti.

Aetheris sulphurici sesquiunciam.
 Die Gabe ist etwas geringer als bei der
 alcoholischen Auflösung.

Pilulae Iodureti Mercurii. (Fer. GalF.
 GalH. B. Ma.)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii
 granum unum.

Extracti Liquiritiae
 grana duodecim.

Pulveris Liquiritiae
 quantum sufficit
 ut fiant pilulae octo. (Ma.)

GalF. et GalH. loco extracti liquiri-
 tiae Extractum Juniperi adhibent.

℞. Deuto- vel Protoiodureti Mercurii
 granum unum.

Pulveris Liquiritiae grana sex.
 Roob Sambuci quantum sufficit
 ut fiant pilulae octo. (Fer.)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii
 granum unum.

Extracti Juniperi grana sedecim.
 Pulveris Liquiritiae

quantum sufficit
 ut fiant holi octo. (B.)

Gabe, Morgens und Abends zwei Stück,
 bis vier auf die jedesmalige Gabe gestiegen.

*Unguentum s. Pomatum Iodureti Mer-
 curii.* (GalH. B. Ma. Pie. Ra. T.)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii
 grana viginti.

Axungiae praeparatae
 sesquiunciam.

Misce trititando. (Ma.)
 T. Deutoiodureti drachmam unam,

Axungiae praeparatae unciam unam; mercurius extingue in axungiae pondere circiter aequali et adde tunc per vices reliquam axungiam. Paratur quoque extempore.

℞. Deutoiodureti Mercurii grana quindecim.
Axungiae . . . unciās duas.
Essentiae Bergamottae guttas viginti.

Misce. (Ra.)

℞. Protoiodureti Mercurii semidrachmam.
Axungiae . . . sesquiunciam.
Essentiae Bergamottae guttas quindecim.

Misce. (Ra.)

℞. Iodureti grana quindecim, Axungiae unciam unam et Essentiae Caryophyllorum guttas viginti.

Zur Beschleunigung der Vernarbung schmerzloser Geschwüre, auch zum Einreiben auf Drüsen geschwülste empfohlen. Die mit dem Deutoiodure ist reizender als die andere, und muß in geringerer Menge angewendet werden.

Cyanuretum Mercurii.

Hydrocyanas s. Prussias Mercurii, Borussias s. Cyanuretum Hydrargyri, Mercurius hydrocyanicus, Hydrargyrium Borussicum s. hydrocyanicum s. bicanatum; blausaures Quecksilber. (B*. Bel. Fer. Gal. HassP. Br*. T. Vm.)

℞. Coerulei Borussici partes duas.
Oxydi rubri Mercurii partem unam.

Pulverata et bene mixta in capsulam vitream ingere usque infunde

Aquae purae . . . partes octo.
Coque continuè cum spatula ferrea agitando, donec mixtura flavium colorem acceperit, filtra deinde et residuum ablue cum

Aquae purae . . . partibus quatuor.
Liquores commixti vaporent, donec guttula, corpori frigido instillata, concreseat; tum ad locum frigidum repone, ut in crystallos abeat, quae nova crystallisatione purificentur. (Bel. Fer. Gal. T.)

HassP Coerulei Parisiensis puri partes duas, Oxydi tres, coquere cum Aquae destillatae partibus sedecim per semihoram etc. residuum Aquae destillatae fervida quantitate necessaria eluere et crystallos si flavescentes evadunt, resolutione in Aqua destillata et coctione cum Mercurii calcinati rubri parva quantitate a ferro liberare et nova crystallisatione depurare; — GalH. ab initio Coeruleum borussicum Acido sulphurico vel muriatico tenui lavare ju-

bet, ut alumen separetur, quo neglecto agendum foret cum incerta et variabili Ferrocyanati ferri quantitate

℞. Oxydi rubri Mercurii partes decem.

Coerulei borussici partes septem.
Pulverata seorsim, secundo pauxillum Alcoholis addendo, in retortam immitte cum

Aquae . . . partibus octoginta.
Coque in balneo arenae, donec massa colorem flavescenti viridem acceperit; filtra bis per eandem chartam; residuum Aqua frigida edulcoratum in balneum arenae remitte et tunc ab igne remove; lente in crystallos abeat et nova crystallisatione purificetur. (B*. Vm.)

℞. Oxydi rubri Mercurii drachmas duodecim.

Coerulei Borussici . . . unciās octo.
Aquae destillatae unciās viginti septem.

Porphyrisata seorsim oxydum et sal cum Aquae unciis novem in capsulam porcellaneam immitte, et per semihoram cocta inter continuam agitationem, decantha et filtra; residuo infunde Aquae bullientis unciās octodecim; coque per semihoram et filtra; colaturae commixtae evaporent ad cuticulae usque apparitionem et sepositione in loco frigido in crystallos abeat. (B*.)

Ein fürchterliches Gift, welches man in venerischen Krankheiten versucht hat, das aber seiner verderblichen Eigenschaften wegen, worin es noch über dem Sublimat steht, nicht angewendet werden sollte. Man giebt es wie den letztern, aber in etwas minder starken Gaben. Außerdem hat es nur pharmaceutischen Nutzen.

Hydrocyanas Mercurii, Liquor antisiphiliticus Chaussieri. (Ra.)

℞. Cyanureti Mercurii grana octo.
Aquae destillatae libram unam.
Jede Unze enthält einen halben Gran Cyanüre.

Unguentum Cyanureti Mercurii. (Ra.)

℞. Cyanureti Mercurii grana sedecim.
Axungiae Porci . . . unciam unam.
Essentiae Oitri guttas quindecim.
Bei schuppigen feuchten Flechten mit starker Entzündung und heftigem Jucken empfohlen.

Ammoniuretum Hydrargyri s. Mercurii. (B*. Br. Fi. Vm.)

℞. Oxydi rubri Mercurii pulverati partes duas.
Ammoniaci liquidi concentratissimi partem unam.

Agitata vivaciter reponere deinde per horas aliquot; agita iterum et sic perge, donec massa ad spectum crystallinum prae se ferat, decantha deinde et leviter lotam sicca. (B*. Vm.)

Rx. Praecipitati (Oxydi albi Mercurii) albi . . . quantum vis.

Ammoniaci liquidi quantum sufficit ad dissolutionem praecipitati. (Br. Fi.)

Bessere Formel giebt ein ganz von der vorigen verschiedenes Product, nämlich Ammoniumquecksilberfulphat.

Das Ammoniumquecksilber ist äußerlich zur Zertheilung von Crostosen empfohlen worden.

Linimentum Ammoniuretii Mercurii. (Br*.)

Rx. Olei Olivarum drachmas novem Ammoniuretii Mercurii semunciam.

Contere in mortario vitro. — Dieses Einiment besteht aus Ammoniumquecksilberfulphat.

Boras Hydrargyri, Sal sedativum mercuriale, Mercurius boraxatus. (B*. Sp. Sw*. Vm.)

Rx. Mercurii, Acidi nitrici concentrati, singulorum uncias duas.

Solutione peracta, liquori Aquae partibus quatuor diluto et filtrato infunde sensim solutionem aquosam Subboratis Sodae, donec nullum prodeat amplius praecipitatum, quod lotum sicceatur. (Sp. Sw*. Vm.)

Rx. Mercurii dulcis . . . partes 22.2. Boratis neutralis Sodae — 26.5.

Tritura simul in mortario vitro; post horae quadrantem adde Aquae parvam, deinde majorem et denique magnam quantitatem; liquido decanthato, praecipitatum bene ablue, donec aqua saporis sit expers et sicca. (B*. Vm.)

Dieses Salz kann den mercurius dulcis ersetzen. — Gabe, zwei Gran täglich, allmählig gestiegen.

Carbonas Mercurii. (Per. Fi. T. Vm.)

Rx. Dissolutionis Sublimati corrosivi saturatae . . . partes quatuor.

Acidi carbonici liquidi partes sedecim.

In lagenam intromissis adde sensim, probe agitando, solutionem ex

Carbonatis neutralis Potassae parte una.

Lagena tunc per quatuordecim vel plures dies in loco frigido relicta, crystallos in superficie liquidi conspicuas leviter ablue et sicca. (Vm.)

Man kann hierher die Formel von Pal.

zur Bereitung des Turpethum mineralis ziehen, wovon man, wenn man sich nach ihr richtet, nicht ein Atom erhält, da nach derselben eine Auflösung des Sublimats durch eine andre von kohlensäuerlichem Kali zerlegt werden soll.

Rx. Acetatis Mercurii . quantum vis.

Aquae bullientis quantum sufficit ad dissolvendum; liquori calido adhuc filtrato infunde Ammonium subcarbonicum liquidum, donec praecipitatum edere cessaverit, quod lotum sicceatur. (Per. Fi. T.)

Mercurius praecipitatus fuscus s. Wurtzii, Turpethum rubrum. (Li.)

Rx. Protonitratis Mercurii liquidi libras duas.

Infunde sensim

Natri subcarbonici liquidi quantitatem sufficientem donec nullum amplius provocetur praecipitatum, quod separatum et Aqua calida lotum sicceatur.

Phosphas Hydrargyri s. Mercurii, Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum. (B*. Bor. O. C. Sw. Vm.)

Rx. Nitratis Mercurii . quantum vis. Infunde sensim

Solutionem aquosam Subphosphatis Sodae . . . quantum sufficit ut non amplius prodeat praecipitatum, quod ablutum sicceatur. (B*. Bor. O. Sw. Vm.)

Rx. Sublimati corrosivi quantum vis.

Dissoluto in Aqua calida adde sensim Solutionis aquosae calidae Subphosphatis Sodae quantum sufficit ut non amplius exoriatur praecipitatum, quod lotum sicca. (Sw*. Vm.)

Rx. Mercurii dulcis . . . partem unam.

Subphosphatis Sodae partes duas. Bene mixtis adde, triturando in mortario vitro

Aquae calidae . . . partes quatuor.

Post horam unam liquida decanthato praecipitatum lotum super filtro sicceatur. (Sw*. Vm.)

C. Solutionem Nitratis Mercurii ope illius Subphosphatis Sodae decomponere jubet.

In England und Deutschland hat dieses Präparat einigen Ruf gegen rebellische und ausgeartete syphilitische Uebel, in Frankreich ist es dagegen wenig in Gebrauch. — Gabe, ein halber oder ganzer Gran, in Pulver mit Zucker und Zimmt, auch äußerlich in Salbenform. Bouvet glaubt, statt seiner so wie für viele andere ähnliche Präparate die von ihm entdeckte Phosphas ammoniaci-mercurialis, welche sehr leicht aufzuleben ist, anwenden zu können. Dieses

Präparat kömmt mit dem merc. dulcis und wahrscheinlich mit noch andern Quecksilbersalzen zu dem Praecipitatus roseus oder Rosa mineralis, welchen man erhält, indem man in eine wässrige Auflösung des salpetersauren Quecksilbers Urin gießt; man verschrieb ihn ehemals als Purgirmittel zu sechs bis zehen Gran.

Subdeutosulphas Hydrargyri s. Mercurii, Calx Mercurii vitriolata, Hydrargyrus vitriolatus, Mercurius vitriolatus s. flavus s. corrosivus flavus s. emeticus flavus s. praecipitatus flavus s. causticus flavus s. luteus, Oxydum Hydrargyri sulphuricum, Sulphas Hydrargyri s. Hydrargyri luteum s. cum excessu Oxydi, Subsulphas Hydrargyri peroxidati s. flavus, Turpethum minerale, Praecipitatus flavus, Sulphas Mercurii oxydulatum; Mineralturpith. (A. Ams. B*. Br. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. HassP. Li. Lus. Sar. Wir. Wür. Br. C. Fi. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Mercurii partem unam.

Acidi sulphurici . . partes duas.
Calefac gradatim, donec massa alba salina prodierit, qua igne aucto siccata Aqua destillata adpersa, totum in mortario vitreo trituretur; sepono deinde, liquidum decantha et pulverem in fundo subsidentem Aqua destillata ablue, donec haec saporis expert evadat. (Ams. Gen. Lus. Sar. Wür.)

B*. Mercurii partes duas et Acidi unam cum dimidia; — Br. Mercurii tres et Acidi quatuor cum dimidia; — Gal. Mercurii duas et Acidi (66°) duas cum dimidia; — Am. Ed. C. et Sp. Mercurii duas et tres Acidi; — Du. Mercurii unam et Acidi unam cum dimidia; — Br. Fer. et Wir. Singulorum partes aequales; — Vm. Mercurii 190 et Acidi 200; — HassP. Mercurii uncias quatuor, Acidi Vitrioli concentrati uncias quinque in cucurbita calefacere ad ebullitionem acidi et donec massa salina in cucurbita restans sicca appareat, caeterum fere ut Ams. Gen. etc.; — Fi. Mercurii libras duas, Acidi sulphurici tres, Aquae destillatae vel pluvialis viginti, acido in retorta vitrea mercurio intuso in balneo arenae ad siccum destillent etc.; — Fluido solutionibus inservienti infunde Spiritum Salis Ammoniaci per Alkali fixum, donec pulvis albus praecipitatur, qui pluries lotum et siccatum praebet *Oxydum album Mercurii* in praeparatione Ammoniuret Mercurii adhibitum. (Fi.)

Li. Mercurii uncias quinque, Acidi sulphurici concentrati sex; solutione peracta, sal siccum et pulveratum in lagenam immitte continentem Aquae

bullentis libras duas et Olei Tartari per deliquium unciam unam, tunc praecipitatum separatum sicca.

℞. Acidi sulphurici pondere ipsi aequali diluti . . . quantum vis.

Oxydi rubri Mercurii

quantum sufficit ad saturandum acidum. Evaporatae ad siccum et pulveratae massae infunde Aquae bullentis pondus decuplum, agita, sepono, decantha et praecipitatum lotum sicca. (Vm.)

T. parare jubet trituratione in mortario porphyreo Sulphatam Deutoxydi Mercurii et inter continuum triturationem Aquam bullentem affundendo, post aliquot momentorum sepositionem liquidum decanthare, pulveri residuo novam Aquae quantitatem per vices infundere, donec pulchrum colorem flavum acceperit, et siccare.

Ein heftiges Brech- und Purgirmittel welches man ehemals als Sicherungsmittel gegen Pocken empfahl, heutzutage aber nur noch bei hartnäckigen Granthemen angewendet, gegen welche es noch für das wirksamste aller Quecksilberpräparate gilt. — Gabe, von einem Viertelgran zwei oder drei Mal täglich, bis zu einem, zwei oder höchstens drei Gran.

Boli emetici. (Pie. Sa.)

℞. Turpethi mineralis grana septem.
Conservae Rosarum rubrarum scrupulum unum.

Fiat bolus unus. (Sa.)

Pie. Turpethi grana quinque.

Beide Gaben sind zu stark, besonders die erste, drei Gran sind hinreichend. — Beförder man verzichtet auf ein solches Brechmittel ganz.

Unguentum Turpethi mineralis s. Sulphatis Hydrargyri s. Oxydi albi Mercurii per Acidum sulphuricum. (B*. Br. Ca. Ra. Sm. Sw.)

℞. Turpethi mineralis pulverati

partem unam.

Axungiae Porci . . partes octo.
Tritura sal in mortario vitreo, cum axungia lenti calore liquata commisceo et ad refrigerationem usque tritura. (Sm. Sw.)

Br. Turpethi partem unam et quatuor Axungiae; — Ca. et Ra. Turpethi unam et sedecim Axungiae.

℞. Turpethi mineralis pulverati

partem unam.

Cerati simplicis . . partes decem.

Misce bene. (B*.)

Alibert wendet diese Salbe oft an zur Reizung mancher Fledten.

Unguentum s. Pomatum antihyperpeticum Oullerieri. (Pie. Ra.)

℞. Turpethi mineralis,

Laudani liquidi Sydenhami,
singulorum drachmam unam.
Florum Sulphuris lotorum
semidrachmam.
Axungiae Porci . unciam unam.
Tritura simul.

*Unguentum s. Pomatum antiherpeticum
Chevallieri.* (GalH.)

℞. Turpethi mineralis drachmas duas.
Calcaris muriaticae drachmas tres.
Olei Amygdalarum dulcium
drachmas sex.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Misce trituvando.

*Sulphas Mercurii, Sulphas Protoxydi
et Deutoxydi Mercurii.* (GalH. Br. T.
Vm.)

℞. Mercurii . . . uncias tres.
Acidi sulphurici
uncias quatuor cum dimidia.

Calefac, balnei arenae ope, in re-
torta, donec vapores acidi sulphurosi
prodire coeperint, tunc ab igne remo-
vetur et massam salinam formatam sepa-
ratim in lagena vitrea serva. (Br.)

Vm. jubet: 1) commiscere Oxydi ru-
bri Mercurii partes decem cum dimi-
dia et Acidi sulphurici quinque, Aqua
sensim addita, et commixtione perfecta
ad perfectam usque siccitatem calefa-
cere; — 2) coquere Mercurii et Acidi
partes aequales ad perfectam exsicca-
tionem usque; — 3) calefacere simul
Mercurii partes novem cum dimidia et
Acidi decem, et massam ad siccum
evaporatam adhuc calidam trituvare
cum Mercurii partibus 4,75.

Diese vier Verfabrungsweise geben, viele-
leicht mit Ausnahme der zweiten, ein Deu-
tosulphat mit einer gewissen Menge Pro-
tosulphat vermischt

T. 1) Mercurii partem unam in du-
plici circiter Acidi sulphurici concen-
trati pondere coquere et ad siccum re-
digere — vel 2) Solutioni Nitratu Proto-
xydi Mercurii infundere parvum ex-
cessum Sulphatis Sodae, decanthare et
praecipitatum album obtentum in fil-
tro chartaceo extillare. — Sulphas
deutoxydi eodem modo ut 1) sed in
proportionem ut 1 ad 5 adhibitis mer-
curio et acido.

Secundum GalH. Protosulphas obti-
netur decompositione Protonitratu puri
in Aqua Acido nitrico acidulata solu-
ti per sufficientem quantitatem Sul-
phatis Sodae vel Potassae, praecipita-
tum sedulo abluendo et a luce tutum
siccando. (GalH.)

Beide sind in der Medicin ungebrauchlich,
dienen aber, besonders das erste, zu mehre-
ren pharmaceutischen Operationen.

*Subdeutosulphas ammoniaco-mercuria-
lis, Oxydum album Mercurii per Aci-
dum sulphuricum.* (Br. Fi. Sw.)

℞. Mercurii . . . libras duas.
Acidi sulphurici . . libras tres.

Digerendo in balneo aquae dissolve,
tunc liquorem aqua dilue, praecipita-
tum turpethi mineralis formatum sepa-
ra et supersulphati mercuriali super-
natanti infunde sensim Subcarbonatem
Ammoniaci liquidi vel Ammonium cau-
sticum liquidum, donec praecipitatum
nou amplius evadat, quod Aqua destil-
lata bene ablutum leni igne siccetur.

Fi. s. vorige Seite. — Dieses Präpa-
rat dient nur zur Bereitung des von Brug-
natelli, uneigentlich sogenannten Ammo-
niuretum Mercurii.

*Hyposulphitis Mercurii et Potassae, Sul-
phis sulphuratus Potassae et Mercurii.*
(Vm.)

℞. Hyposulphitis Potassae
partes duas cum dimidia.

Oxydi rubri Mercurii partem unam.
Dissolve sal in Aqua bulliente, adde
oxydatum pulveratum et agita ad dis-
solutionem usque; liquorem adhuc ca-
lidum filtra, tunc postquam refruxerit,
crystallos Aquae frigidae paululo ablu-
tas solve in Aquae calidae minima
qua potest quantitate, et liquorem no-
vae crystallisationi subijce.

Auf gleiche Weise bereitet man die Hy-
posulphitis Mercurii et Sodae und die Hy-
posulphitis Mercurii et Ammonii.

*Sub-Protonitras Mercurii, Hydrargy-
rum oxydatum nigrum s. oxydulatum
nigrum, Oxydulum Hydrargyri Hahnemannii s. salinum s. aminocacale, Mer-
curius solubilis Hahnemannii, Calx cin-
nerea Mercurii, Oxydum Hydrargyri
cinereum s. nigrum mediante Ammoniae
praecipitatum s. ammoniacale s. nitrico-
ammoniacale s. salinum s. hydrargyro-
sum, Oxodes Hydrargyri nigrum, Oxy-
nitras Hydrargyri et Ammoniae, Prae-
cipitatus niger s. solubilis niger, Pro-
oxydum Hydrargyri nitrico-ammonia-
cale, Sub-Protonitras Hydrargyri et
Ammoniae, Hydrargyrum oxydulatum
nitrico-ammoniatum, Mercurius praeci-
pitatus niger, Pulvis Hydrargyri ci-
nereus, Turpethum nigrum, Sahnem-
ann'sches Quecksilber.* (A. An. B. Ba.
Bel. Bor. Bor4. D. Du. Gal. GalM.
Ham. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pol. R.
R.C. Sax. Wir. Br. Ca. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Acidi nitrici . . uncias quinque.

Infunde in cucurbitam vasi magno
Aqua frigida repleto immersam et loco
frigido positam; adde

Mercurii purissimi . semunciam.
Metallo dissoluto, iterum unam pri-

mum, deinde uncias tres cum dimidia adde, balneum, si ut c lefiat in eo e. t. refrigeraciendo. Crystalli si quae oriuntur, quae ab acido non dissolvuntur, vaporationi spontaneae subijce et tunc liquorem decantha. Crystallus Aquae destillatae pauxillo ablutas in filtro absque calore sicca, tunc in Aquae destillatae libris quinque dissolve, et solutionem filtratam agitando Ammoniaci saturac. eponere decantha liquidum supernatans praecipitatum, quod Aqua destillata lotum et aëri expositum absque igne siccatum pulvera. (Li.)

Hass P. fere eodem modo procedit; — RC. Mercurii arbitrariam quantitatem in Acidi nitrici sufficienti intra phialam vasi amplo, aqua fluviali frigida repleto impositam solve, crystallis Aqua destillata ablutis, solutis et filtratis addere guttas m, saepius agitando, Ammoniae liquidae quantum sufficit ad mercurium penitus praecipitandum, pulverem repetitis vicibus Aqua fervida abludere et absque calore siccare.

Dies ist das von Hahnemann selbst empfohlene Verfahren; das in allen andern Pharmacopoen angezeigte ist nicht wesentlich davon verschieden.

R. Mercurii . . . partes tres.
Acidi nitrici 33° . . . partes duas

In phialam immissa et in balneo arenae collocata modice calefac et coquendo continua, donec crystalli formari coeperint; ab igne remove, agita ut crystallisatio confusa provocetur, mortario vitro immitte, triturando, et adde Aquae destillatae parvam quantitatem cum Acidi nitrici pauxillo commixtam; seponere, decantha et eandem operationem cum residuo repete, donec nihil mercurii quod non sit dissolutum, remaneat; liquoribus commixtis guttatum instilla Ammoniacum causticum liquidum, continue agitando; post subsidentiam pulvis pluribus vicibus Aqua lotus et supra filtrum eguttatus in balneo vaporis siccetur. (GalM.)

Das Operativverfahren ist fast überall dasselbe. In. und Br. nehmen statt des caustischen Am. eine Auflösung des kohlenstoffigen Ammoniums.

Stoiz hat folgendes Verfahren vorgeschlagen.

R. Protinitris Mercurii crystallati partes octo.

Acidi nitrici (1,250) partem unam
Aquae destillatae bullientis

partes octoginta.

Dissolutioni refrigeratae adde

Ammoniaci liquidi (0,95)
partes quatuor.

Aquae destillatae, partibus octo.
Agita, filtra et praecipitatum sicca.
(GalF.)

R. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati recenter parati

quantum placet.

Aquae destillatae quantum satis ut sit P. spec. = 0,01. Mixtis instilla inter continuam agitationem

Liquorem Ammoniaci caustici Aquae destillatae partibus octo dilutum quamdiu praecipitatum inde natum colore nigro apparet, evitando liquoris perfectam neutralisationem. Sedimentum filtratione separatum Aqua destillata abluere et inter chartam bibulam leni calore loco umbroso sicca. (Bor4.)

T. Nitratem Protoxydi Mercurii in Aqua destillata solve, liquidum decanthare a materia flava non dissoluta et infundere Ammonium causticum, donec praecipitatum nigrum floccosum oriri cessaverit, filtro imponere, et Aqua communi lavare, donec haec saporis expersevadat, oxydum deinde in loco umbroso vel vaporatorii ope siccare.

Nach Soubeiran ist das, vermittelst des von den meisten Pharmapoden vorgeschriebenen Verfahrens erhaltene Hahnemann'sche Quecksilber eine Mischung von salpetersäuerlichem Quecksilber mit einer Quantität salpetersäuerem Ammoniumquecksilberoxydul (protinitrat ammoniacum-mercuriel) welche je nach dem befolgten Verfahren verschieden und von der stärkern oder geringern Säuerung des angewendeten Protinitrats abhängig ist und wodurch das Product mehr oder weniger dunkelfarbig und auch mehr oder weniger in Salpetersäure auflöslich wird, indem das salzförmliche Salz allein schwarz, das Doppelsalz im Gegentheil weiß ist. Er schließt daher, daß man das Protinitrat in der möglichst kleinsten Menge Säure auflösen müße, welches auf die Weise geschieht, daß man jedesmal auf das crystallisirte salpetersäure Salz von sehr schwach gesäuertem Wasser eine geringere Menge aufgießt, als zu seiner gänzlichen Auflösung nöthig ist und das Reiben fortsetzt, um die Flüssigkeit vor dem Abgießen gänzlich zu sättigen. Diese Vorsichtsmaßregeln sind unter chemischem Gesichtspunct sicherlich sehr lobenswerth; aber findet dasselbe in medicinischem Hinsicht statt, was hier den Pharmaceuten allein interessiren muß? Sicher nicht. Den Arzt kümmert es wenig, ob das salpetersäuerliche Quecksilber salpetersäures Ammoniumquecksilberoxydul (protinitrat ammoniacum-mercuriel) enthält, um so mehr da dieses chemische Eigenschaften besitzt, welche denen des doppelten Protinitrats sehr ähnlich sind, und alle diese Prä-

parate auf gleiche Weise, d. h. reizend und aufregend, auf den Organismus wirken, daher sich höchstens nur durch einen unbestimmbaren oder unbestimmten Grad in der Reizung, welche sie hervorbringen, von einander unterscheiden.

Das Hahnemann'sche Quecksilber, welches, besonders in Deutschland, einen so großen Ruhm genossen hat, wendet man zu einem Gran mit fünf bis zehn Gran Tragant; oder Süßholzwasserpulver an. — Gewöhnlich setzt man noch einen halben oder einen ganzen Gran Opium hinzu.

Trochisci Hydrargyri s. mercuriales.
(Sw.)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni
unciam unam.

Olei essentialis Aurantii
guttas viginti.

Sacchari albi . . . uncias duas.
Mucilaginis Gummi Arabici

quantum sufficit
ut fiant trochisci decem granorum. —
Gabe, ein Stück täglich zwei oder drei Mal.

Bolus ex Hydrargyro, Boli mercuriales.
(Sw.)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni
grana tria.

Extracti Liquiritiae
quantum sufficit.

Misce bene.

Pilulae Hydrargyri s. ex Hydrargyro oxydulato nigro s. e Mercurio solubili Hahnemanni. (RC. WW. Ra. Sw. Sy.)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni
grana quindecim.

Succi Liquiritiae pulverati
semunciam.

Syrupi simplicis quantum sufficit
ut fiant pilulae centum et quindecim.
(WW.)

RC Sw. et Sy. Mercurii solubilis
drachmam unam et Extracti Liquiritiae
(vel Mellis RC) quantum satis ut
fiant pilulae granorum quatuor (centum
viginti RC.), Cinnamomo (pulvere
corticis Cassiae RC.) adspersendae.

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni
grana viginti.

Gummi Arabici,
Sacchari pulverati,
singulorum semidrachmam.

Fiant pilulae triginta. (Ra.)

Pilulae ex Hydrargyro diureticae s. mercuriales diureticae. (Sw.)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni
semidrachmam.

Conservae Scillae
grana viginti ad triginta.

Olei sulphurati . . . guttas tres.
Adde triturando

Pulveris Scillae quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor. —
Bei sogenannten Schleimkrankheiten der
Lunge, Wassersucht, hartnäckigem Catarrh,
im Anfang der Phthisis. — Gabe, alle
zwei Tage drei bis vier Stück, Abends
beim Schlafengehen

Mel mercuriale. (RC. Sw.)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni
drachmam unam.

Mellis despumati
unciam unam ad duas.

Tritura simul.

RC. Mercurii solubilis drachmas duas,
Mellis unciam unam.

Syrupus ex Oxydulo Hydrargyri Hahnemanni s. Mercurio solubili Hahnemanni. (B*.)

℞. Mercurii solubilis Hahnemanni
grana viginti.

Gummi Arabici drachmam unam.
Mellis rosati . . . quantum sufficit.

Tere in mortario marmoreo ut intime
miscantur et adde

Syrupi Althaeae . . . uncias tres.
Gabe, einen Essel Morgens und Abends.

Protonitras Mercurii, Nitras Protoxydi Mercurii, Calx Mercurii, Hydrargyrum nitricum, Mercurius nitrosus, Nitras Hydrargyri.

§. I. Im festen Zustande.

An. D. Fer. Li. Wir. Wür. Sw. T. Vm.

℞. Acidi nitrici 26° . . . quantum vis.
Infunde in vas, aqua frigida vel glacie circumdatum et immitte per plures vices

Mercurii sufficientem quantitatem
donec crystalli in liquore appareant,
quo per horas viginti quatuor seposito,
crystalli collectae et ablatae siccentur.
(An. D. Fer. His. Li.)

℞. Mercurii sesquiunciam.
Acidi nitrici unciam unam.

Mixta saepius per dies circiter
quatuor agita, quo facto vaporazione spontanea
quae prodierunt crystalli inter chartam
premedo siccentur. (Wir.)

Wür. Digerere jubet in phiala balneo
arenae imposita Aquae fortis et Mercurii,
singulorum partes aequales et liquorem tunc
blando igne evaporare, donec massa alba et
sicca remaneat.

℞. Mercurii partem unam.
Acidi nitrici 28° partes duas.

Majorem metalli partem caloris levis
ope dissolve in acido; liquor tunc
evaporatus seponatur ut in crystallos
abeat. (Gal.)

Da man bei Befolgung dieses Verfahr-

rens viel Deutnitrat erhalten würde, so hat Perry folgendes vorgeschlagen:

℞. Mercurii . . . partes ducentas.
Acidi nitrici (25°)

partes centum octoginta.

Stent in solutione, donec vapores nitrosi non amplius appareant; adde deinde

Aquae destillatae calidae
partes centum

Post levem ebullitionem decantha liquorem, qui statim in crystallos est abiturus. (GalH.)

℞. Ba. Phialam continentem Mercurii partes tres, Acidi nitrici et Aquae destillatae, singularum duas balneo arenae impositam, igne gradatim aucto calefacere, donec vapores aquosi non ultra evolvantur et liquorem deinde crystallisationi subjicere; — T. Mercurii libram unam, Acidi nitrici uncias sex et Aquae destillatae vel pluvialis libras duas in retorta, subinde agitando, exponere moderato calori.

Vm. Mercurium in Acido nitrico Aquae bullientis pondere triplo diluto coquere jubet, providendo ut aliquid metalli non dissolutum remaneat, decanthare deinde et crystallisationi subjicere.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Liquor Hydrargyri nitrici s. Hydrargyri nitrici oxydulati, Nitras Hydrargyri s. Oxyduli Hydrargyri liquidus, Liquor Nitris Hydrargyri s. hydrargyrosi s. Bellostii, Protonitras Hydrargyri solutus, Liquor Mercurii nitrosi frigore paratus, Aqua mercurialis s. mercurialis salina s. ad gangraenam, Mercurius nitrosus alior. (Am. An. B. Bor. Bor4. Br. D. Gal. GalM. Han. HassP. O. Pal. RC. Br. Fi. Pie. Ra. Sp. T.)

℞. Mercurii . partes centum viginti.
Acidi nitrici 33°

partes centum quinquaginta.

Dissolve blando calore et solutioni infunde

Aquae destillatae partes nongentas.
Post aliquot dies cola et serva. (Gal. GalM.)

Han. duplicem agendi modum indicat: 1) Mercurii, Acidi nitrici, Aquae destillatae, singulorum unciam unam in phialum introducere Aquae frigidae immergendam et illic relinquere, donec bullae non amplius exoriantur, solutionem hoc modo obtentam in lagena bene obturata super Mercurii metallici pauxillo servare et addere Acidi ni-

trici guttas aliquot, si pulveris flavescens aliquid separari coeperit; 2) recipere Mercurii unciam unam et duas Acidi nitrici vel quantum satis ad dissolvendum blandi caloris ope metallum: — RC. Mercurii quantum vis, Acidi quantum satis.

An. et Br. Mercurii uncias duas dissolvere in Acidi sex et salis unciam unam liquefacere in Aquae destillatae libris tribus; — Sp. Metallum dissolvere in Acidi nitrici pondere aequali et drachmam unam salis obtenti in Aquae uncias duabus; — O. dissolvere Metallum unciam unam in Acidi nitrici sufficiente quantitate et addere Aquae sufficientem quantitatē ad obtinendas liquidum uncias quatuor; — Bor. et Pol. eodem modo procedere sed Aquae satis addere ad obtinendas uncias quinque; — Ams. Calide in Acido dissolvere Mercurii quantum solvi potest et liquori addere Aquae calidae partes duodecim; — Bor4. Mercurii uncias quatuor, Acidi nitrici duas, Aquae destillatae drachmis tribus dilutas, vas loco frigido et si necesse est, in aliud, Aqua frigida repletum positum reparatur quam dū crystalli enascuntur, quarum a liquore et Mercurio separatarum et inter chartam bibulam albam premendo absque calore siccatarum partibus octo inter terendum adde Acidi nitrici partem unam et tum Aquae destillatae fervidae quantum sufficit ut p. spec. solutionis sit = 1,100 — 1,110, quae filtrata super mercurio depurato servetur; — HassP. Mercurii, Acidi et Aquae destillatae, singulorum unciam unam (si hujus liquoris pars una cum duabus Aquae destillatae miscetur, habes *Liquorem Mercurii nitrosi dilutum, frigore paratum*; ut reagens. HassP.); — B. Li. et Pie. dissolvere blandi caloris ope drachmam unam Mercurii in Acidi duabus et addere deinde Aquae fontanae uncias duodecim; — D. Dissolvere Salis crystallisati drachmas duas in Aquae destillatae uncia una; — Fi. T. Salis unciam unam, Aquae destillatae libras tres.

Dieses Präparat war einige Zeit lang unter dem Namen *Remedium Ducis d'Anzin* und *Remedium capucinatorum* zu zwei oder drei Tropfen in einem Glase lauwarmen Wassers oder eines Brust- oder Schweißtreibenden Tranks gegeben, berühmt, heutzutage ist es fast ungebrauchlich, man nennt es nur noch selten bei chronischen venetischen Geschwüren an. Nach Bor4. 5 Tropfen. Das trockne Salz ist in letztern Zeiten als ein sehr wirksames cathaereticum gegen dieselben Uebel empfohlen worden.

Liquor mercurialis. (Pic.)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici,
singulorum unciam unam.
Dissolve et adde
Aquae Plantaginis . . . libras duas.
— Rosarum,
Laccae,
singulorum quantum sufficit.

In Wäsungen und Bädungen bei alten und atonischen Geschwüren, Pusteln, Schwämmchen und Flechten, welche man von venerischem Gift abhängig glaubt.

Lotio mercurialis Manryi. (Ra.)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Acidi nitrici . . . uncias quatuor.
Dissolve et adde
Aquae purae . . . libras decem.

In Wäsungen bei Krätze. — Gabe, eine halbe Unze Morgens und Abends. — Ein bequemes, wohlfeiles und die Wäsche nicht beschmutzendes Präparat. Man hat es auch bei prurigo formicans und gegen phthiriasis nützlich befunden. Man kann auf das Eitre zwei Drachmen Kampfer zusetzen, wodurch es weniger reizend wird.

Aqua grisea s. grysea Gohlii s. a. s. noviam. (B*. Br. Hass. Pal. Sar. Wir. Ca. Pid. Sp. Vm.)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici,
singulorum unciam unam.

Dissolve blando calore metallum in acido et adde liquori decoctum praeparatum cum Aquae libris quinque ad quatuor redactis, in quibus coquantur

Radicis Chelidonii majoris,
— Aristolochiae rotundae,
Herbae Rutae,
— Scordii,

Petalorum Rosarum rubrarum,
singulorum uncia una.

Misce heue. (B* Br. Pal. Sar. Wir.)

Sp. Dissolutioni Mercurii unciae unius in Acidi nitrici aequali quantitate addere jubet decoctum et Radicis Chelidonii semuncia, Aristolochiae rotundae, Solani nigri, Rutae et Rosarum pallentium, singulorum uncia una cum Aquae libris decem ad octo redactis paratum.

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Acidi nitrici . . . uncias duas.

Dissolve leni calore et cuilibet liquidi semunciae adde succum expressum vel decoctum maxime saturatum e

Radicis Chelidonii majoris,
— Aristolochiae rotundae,
singularum libra una.

Misce sedulo. (Hass. Ca. Pid.)

℞. Protonitratis Mercurii liquidi concentrati . . . partem unam.

Succi Chelidonii majoris depurati
partes duodecim.

Misce. (Vm.)

Dieses Wasser hat Ähnlichkeit mit den vorigen, ist aber schwächer. — Man wendete es ehemals sehr häufig in Wäsungen bei venerischen Geschwüren an.

Syrupus Belletii mercurialis. (B*. GalH. Au. Ca.)

℞. Protonitratis Mercurii
partes triginta.

Aquae leviter acidulatae
partes ducentas.

Dissolve et liquori adde
Syrupi communis partes ter mille

quibus niagis concentratis adde deinde
Aetheris nitrici alcoholisati
partes decem.

Serva. (GalH.)

Ca. dissolvere jubet, secundum Bouillon-Lagrange, Nitratis Mercurii sesquidrachmam in Aquae quam minima quantitate et liquorem miscere cum Syrupi communis frigidi libra una et Aetheris nitrici rectificati semidrachma, in lagena, qua servatur, agitando; — B*. secundum Virey Acetatis Mercurii drachmam unam in Aquae destillatae pauvillo solvere, addere Aetheris nitrici drachmas duas et tunc Syrupi Gummi, e Gummi uncia una et Syrupi communis libra una parati libram unam; — Au. miscere jubet Nitratis liquidi sesquidrachmam, Liquoris Hoffmanni semidrachmam et Syrupi Sacchari uncias sedecim.

Dieser Syrup ist von dem Bellet'schen sehr verschieden, welcher nur aus einem zuckerhaltigen Salpeteräther ohne ein Atom Quecksilber bestand. Uebrigens ist dieses, so wie alle ätherischen Quecksilberpräparate, ein unsicheres und in seine Wirkungen sich nicht gleichbleibendes Mittel, da es eine so große Neigung hat sich zu zersetzen. Der Arzt darf es also nicht anwenden, um so weniger, da er es leicht durch eine auf der Stelle bereitete Mischung von einigen Tropfen Quecksilbersalpetersäure in drei oder vier Unzen mit Aethersyrup verflüchtigen lassen kann.

Pilulae ex Hydrargyro nitrico s. Zelleri. (Au. Sm.)

℞. Protonitratis Mercurii
grana decem.

Succi Liquiritiae
grana quadraginta.

Misce ut fiant pilulae sexaginta. (Sm.)

Au. Nitratis crystallisati grana decem et Micae Panis grana centum nonaginta ut fiant pilulae granorum duorum.

Gegen Syphilis. — Gabe, ein bis zwei

Stück in vier und zwanzig Stunden und allmählig bis auf sechs täglich gestiegen.

Potus mercurialis Belletii. (B.)

℞. Syrupi Belletii,
Aquae destillatae,
singulorum semunciam.

Morgens zu nehmen, bei Rhachitis und Scropheln.

Unguentum ad scabiem s. citrinum s. Hydrargyri citrinum s. Hydrargyri compositum s. Hydrargyri nitrati s. Nitriis Hydrargyri s. Nitratis hydrargyrici s. mercuriale citrinum s. mercuriale citrinum Baumé s. Supernitratis Hydrargyri, Adeps Nitrate Hydrargyri medicatus, Balsamum mercuriale. (A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. Suec. Br. C. Ca. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici,
singulorum unciam unam.

Dissolve metallum in acido caloris balnei arenae ope; liquori adde

Olei Olivarum . . . uncias quatuor.

Axungiae Porci . . . uncias octo ut fiat unguentum (Sa. Sy.)

Du. et Sw. Mercurii unciam unam, Acidi duas, Olei libram unam et Axungiae uncias quatuor; — Am. Ed. RC. et C. Metallum partem unam, Acidi duas, Olei (Olivarum vel Napi RC.) novem et tres Axungiae. — *Unguentum mitius* harum trium (excepta RC) pharmacopoeiarum triplum Olei et Axungiae continet; — Lon. LonN. Metallum unciam unam, Acidi fluidrachmas undecim, Olei fluiduncias quatuor et Axungiae uncias sex.

℞. Mercurii partes sexaginta quatuor.
Acidi nitrici (32°)

partes nonaginta sex.

Solutioni refrigeratae adde

Axungiae liquatae . . . partes mille per vices et sub continua trituratione infusas. (Gal.)

His. Mercurii et Acidi, singulorum partem unam et decem Axungiae; — A. Ams. Bor. Bor4. D. Fenn. Ful. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Suec. Br. et Pid. Metallum unam, duas Acidi (vel quantum requiritur Bor4.) et duodecim Axungiae; — An. et Sp. Metallum tres, Acidi quatuor, et Axungiae triginta duas; — Vm. Metallum partem unam, Acidi quantum satis, ad dissolvendum et Axungiae partes quindecim; — Gen. Mercurii uncias duas, Acidi quantum satis ad dissolvendum et Axungiae libras duas; — Fer. T. Metallum unciam

unam, Acidi quantum satis ad dissolvendum et Axungiae libram unam; — *Fi. Axungiae uncias octo, caeterum ut Fer.*
℞. Protonitratis Mercurii liquidi

partem unam.

Calfac et adde pedetentim

Axungiae Porci liquatae

partes quatuor.

Tere ad refrigerationem usque. (Pol.)

B. et Bel. Liquoris mercurialis partes tres et sedecim Axungiae.

Die Zusammensetzung der gelben Salbe ist nicht genau bekannt; man weiß nur, daß die durch das Salz und das Fett bewirkte Zerlegung je nach der Menge der angewendeten Säure, nach dem Grade ihrer Stärke und besonders nach dem Alter der Salbe verschieden ist; frisch besteht sie aus oxygenirter Salbe, aus salpetersaurem Quecksilberoxydul und aus sehr zertheiltem Quecksilber; es scheint aber, daß in dem Maße, wie sie älter wird, das salpetersaure Oxydul ganz zerfällt und sich in essigsaures Quecksilber verwandelt.

Reizend, aufsteigend, austrocknend, schweißtreibend, gegen Syphilis, psora; sie wird bei Hautkrankheiten häufig angewendet. Im Allgemeinen sorgt man, sie durch Zusatz einer der bereits in ihr enthaltenen gleichen Menge Fett zu verdünnen.

Unguentum Duboisii. (Ra.)

℞. Protonitratis Mercurii

drachmas duas.

Unguenti Cucumerum

semunciam.

Misce sedulo. — Bei leichten Flechten in Einreibungen auf die kranken Theile.

Unguentum s. Pomatum saturno-mercuriale. (Au. Vm.)

℞. Mercurii . . . partes quatuor.

Plumbi . . . partem dimidiam.

Soluta seorsini metalla, quodque in Acidi nitrici 34°

sufficiente quantitate

misce cum

Olei Amygdalarum dulcium

partibus viginti quatuor.

Axungiae Porci

partibus quadraginta octo

primò solutionem mercurialem deinde plumbicam; tere bene et refrigerationis momento modulis chartaceis infunde. (Vm.)

℞. Unguenti citrini drachmas duas.

— saturnini . . . drachmas sex.

Misce trititando. (Au.)

Bon Armstrong bei tinea favosa empfohlen.

Cereoli mercuriales. (Sw*)

℞. Cerae flavae . . . uncias sex.

Olei Olivarum . . . unciam unam.

Liquatis adde
Protonitratis Mercurii liquidi
drachmas duas.

Misce sedulo ut fiant cereoli.

Pomatum s. Unguentum ad tineam. (E.)

℞. Unguenti citrini . . semunciam.
— Picis liquidæ
unciam unam.

Misce trititando.

*Deutoni-tras Mercurii, Nitras Deutoxy-
di Mercurii. (B. Bel. T. Vm.)*

1) Im festen Zustande.

℞. Oxydi rubri Mercurii quantum vis.
Acidi nitrici quantum sufficit
ad sciendum blandi caloris ope oxy-
dum; liquidum deinde decantha et forti
vaporacioni subijce ut orientur cry-
stalli. (Vm.)

T. Mercurium rubrum cum Acidi
nitrici diluti quantum ad perfectam so-
lutionem sufficit, coquere et addere per
vices Acidum nitricum 36° B., donec
solutio salis marini vel Acidum hydro-
chloricum non amplius ab illo turbe-
tur; vel: conjungere statim Acidum
nitricum dilutum cum Oxydo rubro.

2) Im flüssigen Zustande.

*Liquor Hydrargyri nitrici oxydati,
Mercurius nirosus, Liquor Nitratu hy-
drargyrici.*

℞. Oxydi rubri Mercurii partes tres.
Acidi nitrici puri, dimidio Aquæ
diluti . . . partes sex.

Solve leni calore, oxydum sensim
acido addendo et liquorem serva. (Bel.)

B. Oxydi partes tres et quatuor aci-
di, producto addere Aquæ puræ par-
tes duodecim (*Aqua mercurialis*); —
Bor4. Oxydi rubri unciam unam, Acidi
nitrici quantum sufficit, Aquæ destil-
latæ tantum ut pondus totius sit un-
ciarum octo. P. sp. = 1,175—1,185; —
Vm. conterere jubet Oxydi rubri partes
tres et Aquæ tantidem, miscellam le-
viter calefacere, addere Acidi nitrici
quantum sufficit ad dissolutionem et
liquidum post horas viginti quatuor
decantare.

Die Aqua mercurialis dieser letztern
Pharmacopöen unterscheidet sich demnach von
der vorhergehenden in Betreff der che-
mischen Zusammensetzung, aber die Einwir-
kung auf die lebenden Gewebe ist ganz oder
fast dieselbe.

Protonitratis Ammoniaci et Mercurii.
(Sw. Sy.)

℞. Acidi nitrici Aqua diluti
libram unam.
Infunde ei sensim

Ammonii subcarbonici liquidi
uncias septem.

Effervescentia cessatâ adde

Mercurii uncias octo.

Metallo balnei vaporis ope dissoluto
liquor ad crystallisationis punctum us-
que evaporat.

*Guttulæ albae Wardii, Solutio Ni-
tratis Hydrargyri ammoniacalis. (B*.
Sw. Sy.)*

℞. Protonitratis Mercurii et Ammo-
niaci unciam unam.

Aquæ Rosarum uncias tres.
Dissolve.

Ein in England berühmtes Präparat. —
Gabe, zwei oder drei Tropfen in einer
Gersten-, Grütze- oder Cassaparillaabkochung.

*Unguentum Nitratu Mercurii et Am-
moniacæ. (B*.)*

℞. Nitratu Mercurii et Ammoniacæ,
Oxydi Zinci,

singulorum partem unam.

Axungiae Porci partes quatuor.

Misce trititando.

Protoiodas Mercurii. (B Vm.)*

℞. Protonitratis Mercurii quantum vis.
Iodatis Potassæ quantum sufficit.

Nitrato adde iodatum pro partiuncu-
lis sed celeriter; præcipitatum lotum
sicca.

Deutoiodas Mercurii. (Vm.)

℞. Sublimati corrosivi partes 12.7.

Iodatis Potassæ . . . partes 15.6.

Dissolutis seorsim, solutiones cale-
factas in lugena commisce et agita;
decantha et præcipitatum lotum sicca.

Hydrochloras Mercurii et Ammoniacæ.

§. I. Im festen Zustand, aber im
Wasser auflöslich und crystallisir-
bar.

*Sal Alembroth s. sapientiae s. vitæ
s. scientiæ. (An. Bel. Gal. Fi. T. Vm.)*

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum partes aequales.
Sublima. (Gal.)

Nach Soubeiran erhält man auf diese
Weise bloß eine sehr veränderliche Mischung
von Sublimat und Calmia. Er empfiehlt
daher, mit Ferrarini, Tabbei (t. I. T.),
gleiches Theile von beiden in Wasser auf-
zudünnen, die Flüssigkeit abzdampfen und
sie crystallisiren zu lassen, jedoch nicht
zu vergessen, daß die Verbindung nicht so-
gleich stattfindet, und daß die anfangs sich
bildenden Crystalle eine Mischung von sal
alembroth und einer größern oder gerin-

gera Menge Salmiak sind. Nach ihm besteht das sal Alembroth aus einem Atom hydrochlorsaurem Quecksilber und vier Atomen hydrochlorsaurem Ammoniak.

℞. Praecipitati albi quantum vis.
Acidi hydrochlorici

quantum sufficit ad solvendum blandi caloris ope; vaporata leni igne ad locum frigidum seponere ut in crystallos abeant, quae cum Aquae frigidae pauxillo abluantur. (Am. Bel. Vm.)

Das letztere Präparat führt den Namen *Murias hydrargyro-ammoniacale acerrimum* und *Hydrargyrus muriatus ammoniacalis fortior*.

§. II. Im festen, aber im Wasser unauflöslichen Zustande.

Calx Hydrargyri alba, Hydrargyrum praecipitatum a bun s. ammoniato-muriaticum s. bichloratum cum Oxydo et Ammonio muriatico s. oxydatum muriaticum ammoniatum s. muriaticum praecipitatum, Hydrochloretum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico, Mercurius cosmeticus s. praecipitatus albus, Murias Oxydi Hydrargyri ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacalis insolubilis s. Ammoniacae superhydrargyricus, Praecipitatus albus, Submurias ammoniaco-hydrargyricus s. Hydrargyri ammoniatus s. praecipitatus, Lac mercuriale; weißer Präcipit. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Per. Ful. Hon. Hass HassP. Lon LonN. Lus. O. Pol. Sax. Suec. Würt. Br. C. Pi. Sw. T. Vm.)

1) ℞. Sublimati corrosivi,

Salis Ammoniaci,

singulorum uncias octo.

Dissolve in

Aquae destillatae bull'entis

libris octo.

Filtera liquorem et ei pedetentim infunde Natrum subcarbonicum liquidum (Natr. carb. crudum in Aq. dest. suff. quant. solutum), donec praecipitatum non amplius oriatur, quod Aqua frigida lotum in loco umbroso siccetur. (Bel. Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. Sw.)

Reliquae pharmacopoeae, a quibus hic agendi modus indicatur, Kali subcarbonicum praescribunt; sed An. B. Fer. Lus. Sax. Suec. Pi. et T. Sublimati et Salis Ammoniaci partes aequales; Ba. Salis unam et duas Sublimati; Am. Lon. LonN. et C. Sublimati semilibram et Salis uncias quatuor (Liquoris Potassae Subcarbonatis octarium dimidium, Aquae destillatae

octarios quatuor Lon. LonN.); Vm. Sublimati partem unam et Salis unam cum dimidia indicant.

2) ℞. Sublimati corrosivi quantum vis. Aquae calidae quantum sufficit ad dissolutionem; liquori infunde Ammoniacum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod Aqua destillata ablutum siccetur. (Sw. Vm.)

3) ℞. Mercurii,

Acidi nitrici,

singulorum uncias octo.

Solutio metallo, adde

Aquae destillatae libras quatuor.

Liquori deinde infunde solutionem filtratam e

Salis Ammoniaci uncias duabus,

Kali subcarbonici uncia una

in Aquae destillatae libris quatuor, donec nihil amplius praecipitur; pulverem in filtro receptum bene abluere et sicca. (Hass.)

Ful. dissolvere jubet Mercurii uncias sex in Acidi nitrici duodecim, liquori addere Aquae destillatae uncias septuaginta duas, mixturae infundere dissolutionem Salis Ammoniaci unciarum duodecim in Aquae destillatae uncias viginti quatuor et instillare deinde Kali subcarbonicum liquidum, donec non amplius oriatur praecipitatum.

℞. Nitratis Mercurii . uncias octo.

Dissolve in

Aquae destillatae

sufficiente quantitate

et filtra. Solutioni adde

Salis Ammoniaci in Aqua soluti

uncias quatuor.

Liquori deinde sensim instilla

Solutionis Natri subcarbonici aquosae

sufficientem quantitatem

vel tantum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod lotum siccetur. (D.)

℞. Liquoris a Mercurio dulci secundum methodum Scheelii praeparato decanthati quantum vis.

Infunde Ammonium liquidum, donec praecipitatum oriri cessaverit, quod Aqua frigida abluere. (Ams. Du. et C.)

T. Loco sublimati corrosivi Sulphas Mercurii adhiberi potest, ad cuius solutionem Aqua, in qua Salis Ammoniaci pondus aequale solutum est, sumitur. (!)

Soubertan sieht den weißen Präcipitat als eine Mischung von einem Atom Quecksilberoxydchlorid und drei Atomen Ammoniumquecksilberoxydul (mercuriate d'ammoniaque), das heißt, als eine Zusammenfügung an, in welcher das Quecksilberoxyd die Rolle einer Säure spielt. Guitbourt hatte es schon als eine Mi-

ſchung von Queckſilberdeutochlorür und von Ammonium mit dem Deutoxyd des Queckſilbers (ammoniare de deutoxide de mercure) angeſprochen.

§. III. Im flüſſigen Zuſtande.

Aqua mercurialis composita, Liqueur Murialis hydrargyro-ammoniacalis s. Hydrargyri ammoniati, Mixtura s. Solutio mercurialis, Murias hydrargyro-ammoniacalis solutus, Liqueur Mercurii s. ammoniaco-mercurialis. (A. B. Bor. Bor4. Gal. Han. Lus. O. Pol. Suec. RC. Au. Sw. Sy. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.

Salis Ammoniaci drachmam unam.

Aquae destillatae libras quatuor.

Dissolve et filtra. (A.)

Vm. Sublimati grana viginti sex, Salis decem et Aquae libras quatuor; —

B. Sublimati drachmam unam, Salis tantidem et duas libras Aquae; — Lus. Sublimati scrupulum unum, Salis semiscrupulum et Aquae libram unam; —

Sw. Sublimati, Salis, singulorum drachmam unam et Aquae libras quatuor; —

Sy. Sublimati grana sexaginta quatuor, Salis Ammoniaci drachmam unam et Aquae uncias quatuor; —

Au. Sublimati grana sex, Salis duodecim et unam libram Aquae; —

RC. Sublimati grana octodecim, Salis Ammoniaci drachmam unam, Aquae destillatae libram unam. (*Aqua phagedaenica s. Solutio Murialis Hydrargyri oxydati et Ammoniacae fortior* RC. — Aquae vel Alcoholis diluti quantitate triplici sumta habes *Solutionem dilutiorem.*)

Solutio Murialis Hydrargyri oxydati corrosivus RC.: Sublimati drachmam unam, Salis Ammoniaci drachmas duas, Alcoholis diluti unciam unam.

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.

Aquae purae . . . uncias quatuor.

Dissolve et praecipita

Ammoniaci liquidi

sufficiente quantitate.

Redissolve praecipitatum

Acidi hydrochlorici

quantitatis sufficientis

ope et serva. (Vm.)

℞. Salis Alembrothi crystallisati

grana decem.

Aquae destillatae uncias decem.

Dissolve et adde

Syrupi communis . . . uncias duas.

Misce bene. (Vm.)

℞. Sublimati corrosivi

grana viginti quatuor.

Aquae . . . uncias quatuor.

Dissolve, filtra et liquori instilla

Ammonii liquidi quantum sufficit

decompositionem completam. Adde

Acidi hydrochlorici quantum satis ad redissolvendum praecipitatum et tunc

Aquae . . . uncias octodecim.

Mellis rosati . . . unciam unam.

Post horam unam cola. (Vm.)

℞. Sublimati corrosivi,

Salis Ammoniaci, singulorum grana

na viginti quatuor.

Aquae destillatae . . . libras duas.

Solutioni adde

Mellis rosati . . . unciam unam.

Misce bene. (Bor. Han. O. Pol.)

Bor4. Mel rosatum omittit.

Fenn. et Suec. Sublimati grana sex, Salis Ammoniaci tantidem, Aquae calidae unciam unam, Aquae destillatae uncias novem ad diluendam solutionem et Syrupi communis uncias duas.

Hierher gehört auch der *Liqueur van Swietenii* von RC.: Sublimati grana sex, Salis Ammoniaci duodecim, Aquae destillatae vel Alcoholis diluti libra una.

Ehedem gab man den weißen Präcipitat innertlich von einem bis zu drei Grau; heutzutage wendet man ihn bloß äußerlich an. Das Sal Alembroth, sowohl fest, als besonders flüſſig, wird sehr allgemein gebraucht. Doch sollten sich die Practiker desselben, wegen der veränderlichen Zusammensetzung, nicht bedienen. Man hat zwar im Allgemeinen, wenn man den Salmiak mit dem Sublimat verbindet, keinen andern Zweck als die Auflöslichkeit des letztern zu begünstigen; allein obgleich die gegenseitige Einwirkung dieser Salze auf einander nicht auf der Stelle so vollständig einzutreten scheint, daß sich nicht wenigstens noch ein Theil Salmiak verflüchtigen könnte, so ist doch soviel sicher, daß sie nach einiger Zeit Statt hat, und daß dann der mit dieser Eigenthümlichkeit unbekanntete Arzt etwas Anderes verschreibt, als was er zu geben die Absicht hatte. Dieß ist ohne Zweifel eine der Ursachen, warum die Urtheile über den Sublimat so verschiednen ausgefallen sind. So uberein empfiehlt mit Recht, die Mischung aus beiden Salzen nicht zu lange in den Apotheken vorräthig zu halten weil, man möge dieß auch für sich so vortheilhaft ausgeben, nothwendig nach einiger Zeit, wegen der Säure, immer unzersetzter Sublimat sich findet, und zwar im Verhältniß immer stärker im Grunde, als an der Oberfläche der Flasche. Er ist daher der Meinung, daß man die Mischung erst in dem Augenblicke, wo sie aufgelöst werden soll, vornehmen müsse, und giebt gleichen Verhältniſstheilen jedes Ingrediens den Vorzug, weil ein schwacher Ueberschuß von Salmiak nicht schaden könne.

Aqua caustica ad condylomata, Mixtura gummosa ex Hydrargyro muriatico s. Sublimato corrosivo. (DD. WW.)

- ℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.
Aquae destillatae . . . uncias duas.
Dissolve in mortario vitreo et adde
Gummi Arabici pulverati
drachmas duas.

Neußertlich angewendet.

Injectio adstringens. (E.)

- ℞. Sublimati corrosivi . . . grana tria.
Salis Ammoniaci
granum unum vel duo.
Aquae uncias quatuor.
Bei chronischer Gonorrhoe empfohlen.

Solutio Weikardi. (Br*. Ca.)

- ℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana quatuor.
Aquae destillatae . . . uncias duas.
Laudani liquidi Sydenhami
guttas triginta sex.
Olei essentialis Cinnamomi
gut. am unam.

Bei der Behandlung venerischer Krankheiten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen, Morgens und Abends, in Milch oder Gummiwasser.

Looch antisiphiliticum, Linctus antisiphiliticus. (Sw*.)

- ℞. Hydrochloratis Mercurii et Ammoniae semidrachmam.
Opii grana quatuor.
Sacchari scrupulos quatuor.
Tr turantia simul adde
Mellis albi uncias quatuor.
Gabe, zwei Drachmen, zwei- oder dreimal täglich.

Aqua mercurialis, Mercurius liquidus. (Sp.)

- ℞. Cerussae unciam unam.
Lithargyri semunciam.
Aceti uncias sex.
Coque ad oxydum usque solutionem et liquorem adde
Aluminis drachmas sex.
Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.
Aquae fontanae uncias duodecim.
— Rosarum uncias quatuor.
Serva absque colando. — In einer Menge Hautkrankheiten empfohlen. — Verwerflich.

Syrupus antisiphiliticus s. depurativus Larreyi. (Br. Ca.)

- ℞. Radicis Sassa-parillae scissae et concisae libras duas.

Aquae libras decem.

Macerata per horas duodecim coque per duas et cola; residuum coquatur bis cum Aquae aequali quantitate et qualibet vice coletur; colaturas tres conjunctas seponere; praeterea

- ℞. Petalorum siccorum Rosarum rubrarum semunciam.
Foliorum Sennae mundatorum
uncias duas.

- Seminum Anisi drachmas duas.
Aquae bullientis . . . sesquilibram.
Succi Boraginis calide depurati
semilibram.

Infunde in balneo aquae, vase tecto, per horas duodecim, cola deinde cum expressione et seponere; interea decoctum sassa-parillae ad librarum sex remanentiam evaporet, cui deinde addentur praeter infusum antea dictum

- Sacchari albi,
Mellis albi,
singulorum librae quatuor.

Syrupum Albuminis Ovorum clarificatum bullientem cola per manicam et coquendo prole inspissatum refrigerare fac. Tunc

- ℞. Hujus Syrupi
libras duas cum dimidia.
Salis Ammoniaci,
Sublimati corrosivi,
Extracti Opii,
singulorum grana decem.
Liquoris Hoffmanni
quantum sufficit.

Dissolve opium in Aquae parva quantitate et syrupo adde solutionem; triturata sales cum Aetheris sufficiente ad dissolvendum quantitate; adde sensim, continuè triturando, omnem syrupum et serva in lagenis bene obturatis.

Reizend, alterirend, gegen Syphilis und Flechten. — Gabe, eine Unze Morgens nüchtern, in einer Tasse Sassa-parillaabkochung.

Liquor muriatico-hydrargyro-cupricus ammoniacalis. (Vm.)

- ℞. Hydrochloratis Mercurii et Ammoniae,
— Cupri et Ammoniae,
singulorum sesquidrachmam.
Dissolutis seorsim in
Aquae uncias tribus
solutiones admisce et filtra.

Aqua phagedaenica alba. (Vm.)

- ℞. Salis Alembroth crystallisati
scrupulos duos.
Aquae Calcis uncias viginti octo.

Aqua phagedaenica alba composita. (Vm.)

- ℞. Aquae phagedaenicae albae
partes viginti quatuor.

Mellis rosati . . . partem unam.
Misce bene.

Unguentum ad scabiem Zelleri s. mercuriale album s. mercuriale album Werlhofii s. Hydrargyri album s. Hydrargyri albi s. mundificans Zelleri s. Murialis Hydrargyri ammoniacalis s. rosatum compositum. (Am. Ams. B. Bor. BorC. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Ham. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Lus. Pal. Pol. Sax. Wir. Br. C. Ca. Huf. Pid. Sw. Sy. Vm.)

℞. Praecipitati albi . . . partem unam.
Axungiae preparatae . . . partes octo ad sedecim.

Misce trititando. (Sw. Sy.)

Vm. Praecipitati partem unam et quatuor Axungiae; — B. et Huf. Praecipitati unam et octo Axungiae; — Bor4. Praecipitati unam et Adipis novem; — Am. Ams. Lon LonN. et C. Praecipitati unam et Axungiae duodecim.

℞. Praecipitati albi . . . partem unam.
Cerati albi . . . partes octo.

Contere. (Pol.)

Du. Praecipitati partem unam cum dimidia et Cerati duodecim.

℞. Praecipitati albi . . . partem unam.
Unguenti rosati (s. pomadini HassP.) . . . partes octo.

Misce terendo. (Fer. Ful. Hass. HassP. His. Sax. Ca. Pid.)

Br. Praecipitati partem unam et duodecim Adipis; — Pal. Wir. et Sp. Praecipitati unam et Axungiae septem.

℞. Praecipitati albi . . . partes tres.
Unguenti rosati . . . partes viginti quatuor.

Olei Lavandulae . . . partem unam.
Tritura simul. (Lus.)

Bor. BorC. Br. et Han. Praecipitati partes sedecim, Axungiae centum viginti octo et Olei Citri unam.

Reizend, als Schönheitsmittel betrachtet und gegen fast alle Hautkrankheiten gepriesen. — Man verschreibt diese Salbe mit einem Achtelgran Sublimat, zu einer halben und ganzen Drachme auf jede Einreibung.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (E. Ra.)

℞. Praecipitati albi sesquidrachmam.
Camphorae . . . scrupulum unum.
Axungiae lotae . . . uncias duas.

Misce trititando. (Ra.) — Besonders bei pustulösen Flechten, wenn die Entzündung gemindert ist.

℞. Praecipitati albi grana quindecim.
Nitri . . . semidrachmam.
Florum Sulphuris . . . drachmam unam.

Axungiae Porci . . . uncias duas.
Misce trititando. (E.)

Unguentum s. Pomatum contra s. ad tinea. (Pie.)

℞. Praecipitati albi semidrachmam.
Baccarum Juniperi pulveratarum . . . drachmam unam.

Unguenti rosati . . . unciam unam.
Misce exacte cum Olei Lauri paulillo.

Pomatum s. Unguentum Jadelotii. (Ra.)

℞. Praecipitati albi drachmas duas.
Camphorae . . . grana octo.
Tutiae preparatae . . . grana quindecim.

Butyri recentis . . . drachmas duas.

— Cacao . . . semidrachmam.

Contere bene. — Bei sogenannter scrophulöser Augenentzündung in Einreibungen auf den Rand der Augenlider, alle zwei oder drei Tage, Abends bei'm Schlafengehen.

Unguentum s. Pomatum Janini s. ophthalmicum Janini. (Fer. Bo. Ca. Fi. T.)

℞. Praecipitati albi drachmam unam.
Tutiae . . . Bolii Armenae,

singularum drachmas duas.
Axungiae cum Aqua Rosarum lotae . . . semunciam.

Misce exacte.

Fi. Praecipitati semidrachmam, Florum Ziuci, Boli Armenae, singularum drachma unam, Axungiae drachmas duas; — T. Boli Armenae vel rubrae, Carbonatis Zinti, singularum semunciam, Praecipitati drachmas duas, Axungiae purae unciam unam.

Gebrauch wie bei'm vorigen.

Unguentum antipsoricum. (Pal. Wir.)

℞. Ter-binthinae cum Aqua Rosarum lotae uncias duas et dimidiam.

Dissolve in Vitellisi Ovorum . . . no. 3.

Solutioni adde

Butyri recentis . . . uncias sex.

Olei Lauri . . . unciam unam.

Styracis liquidae . . . semunciam.

Praecipitati albi . . . drachmas duas.

Cerussae pulveratae unciam unam.

Misce sedulo. — Gabe, eine Drachme auf einmal, in Einreibungen. — Ein schlechtes Präparat.

Pilulae specificae s. mercuriales ammoniacales. (Am. B*. Fenn. Gen. Lus. Suec. WW. Bo. Br. C. Fi. Sa. Sm. Sw. Vm.)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Arrowroot . . . scrupulum unum.

Solutionis Salis Ammoniaci aquosae quantum sufficit.

Fiat massa. (Am. C.)

Mit Unrecht nennt Am. diese Pillen *Pilulae Hydrargyri Oxymuriatis*. Die Formel selbst ist schlecht und muß verworfen werden.

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana quindecim.

Aquae destillatae calidae quantum sufficit

ut sales solvantur. Solutioni adde Pulveris Radicis Althaeae

drachmas tres.

Mellis depurati drachmas duas.

Fiat massa in centum viginti pilulas dividenda. (Lus. WW.) Jede Pille enthält einen Viertelgran Sublimat.

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci,
singulorum scrupulum unum.

Dissolutis in Aqua calida adde Sacchari albi pulverati

scrupulum unum.

Micae Panis triticei drachmas duas.

Fiant pilulae centum sexaginta. (Fenn. Suec.) Sie enthalten dieselbe Quantität Sublimat, wie die vorigen. — Br. führt ähnliche an unter dem Namen *Specificum Genevense*.

℞. Aquae destillatae drachmas duas.
Salis Ammoniaci quantum sufficit ad saturandam aquam. Adde

Sublimati corrosivi grana viginti.

Micae Panis . . . quantum sufficit ut fiant pilulae octoginta. (Sa.) — Jede enthält einen Viertelgran Sublimat.

℞. Salis Ammoniaci sesquidrachmam.
Aquae destillatae . . . semunciam.

In solutione dissolve

Sublimati corrosivi semidrachmam.

Fiant cum Micae Panis albi sufficiente quantitate pilulae ducentae octoginta octo. (Gen. Fl.)

B*. Sa. Sm. geben eine andere Formel, welche sich nur durch die Gabe des Sublimats unterscheidet, und nach welcher die Pillen einen halben Gran Sublimat enthalten. Sie führen den Namen *Pilulae antivenercae Swediaur*.

℞. Sublimati corrosivi
grana duodecim.

Salis Ammoniaci . . . semunciam.

Syrup: Sassaparillae,

Pulveris Sassaparillae,

singulorum quantum sufficit ut fiant pilulae ducentae et quadraginta. (Bo.)

Jede enthält nur einen Zwanzigtheilgran Sublimat.

℞. Salis Alembroth drachmam unam.

Panis biscocci pulverati (Biscuit) unciam unam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae centum viginti. (Sw*). Jede enthält einen halben Gran Sublimat.

Vm. Sacchari scrupulum unum, Salis Alembroth scrupulos duos, Micae Panis drachmas duas et Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Die Gabe und Anvendungsweise sind dieselben, wie für die *Pilulae majores Hoffmanni*, welche ihnen vorzuziehen sind.

Pilulae mercuriales Noltii. (Vm.)

℞. Salis Alembroth grana duodecim.

Opii . . . grana novem.

Succi Liquiritiae quantum sufficit ut fiat massa pillularis.

Pulvis escharoticus. (Sm.)

℞. Praecipitati albi . . . grana sex.

Maguesiae subcarbonicae

scrupulum unum.

Sabinae pulveratae

drachmam unam.

Ein wenig wirksames cathaereticum.

Oxalis Hydrargyri s. Mercurii. (B*. Br.)

℞. Solutionis aquosae Nitratis Mercurii frigide paratae et Aqua dilutae quantum vis.

Infunde

Solutionis concentratae Acidi oxalici . . . sufficientem quantitatem vel donec non amplius exoritur praecipitatum, quod Aqua destillata ablutum in loco umbroso siccetur.

Anwendungsweise wie beim salzsauren Quecksilberoxydul. Man hat dieses Salz nur wenig angewendet, jedoch ist es gegen venerische Krankheiten versucht worden.

Protoacetas Mercurii, Acetas Hydrargyri s. hydrargyrosus, Hydrargyrus acetatis, Hydrargyrum acetatum s. acetium, Mercurius aceticus s. acetatus, Oxyacetas Mercurii, Sal. Mercurii acetosus s. mercuriatus acetosus, Sperma Mercurii, Terra foliata Mercurii s. mercurialis. (An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fer. Gal. Han. Lus. Pal. Wir. Br. C. Fi. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Mercurii . . . libram unam.
Acidi nitrici Aqua diluti

libras duas,

Dissolve metallum balnei aquae ope in acido, et liquoris deinde sensim adde solutionis aquosae Kali subcarbonici quantum satis ad praecipitandum omne oxydum, quod Aqua pura ablutum et leni calore siccatum, dissolve in Aceti destillatae sufficiente quantitate, liquorrem filtra et ad cuticulam usque evaporatum crystallationi subijce. (B.)

Lus. et *Sp.* Oxydum Potassae causticae ope praecipitare jubent.

Garot tractare jubet cum Oxydo acetico in quatuor gradibus densitatis et bulliente Hydratem Protoxydi Mercurii obtentum decomponendo Sodae causticae ope Protonitratem a Deutoni-
trate liberum.

℞. Mercurii,

Acidi nitrici Aqua diluti,
singulorum uncias tres.

Gesatâ effervescentia digere super arena calida ut metallum solvatur; liquorem statim commisce cum

Aquae bullientis partibus (?) octo in solutione tenentis

Acetatis Potassae . . . uncias tres.

Trajice celerrime per telam duplicem et refrigeratione in crystallos con-
crescere fac. (Du. Fer. *Vm.*)

Fi. Mercurii, Acidi diluti ut antea, Kali acetici sesquioniciam, Aquae destillatae calidae libram unam et uncias tres; solutioni mercurii in acido adde solutionem kali in aqua destillata, praecipitatum cum Aqua frigida ablue, solve in Aquae dictae libris duabus, coque paululum, et post horae quadrantis sepositionem, liquorem decantha, qui refrigeratus crystallos praebet; — Gal.

Protonitratiss Mercurii partem unam, Aquae destillatae sex, et Acetatis Potassae liquidi quantum satis ad praecipitationem liquoris perfectam; — Ed. et C. Mercurii uncias tres, Acidi nitrici Aqua diluti quatuor cum dimidia, Acetatis Potassae tres et Aquae bullientis libras octo; — Bor. Acetatis Potassae liquidi uncias quinque, Aquae bullientis libras quatuor ad dilutionem et Nitratiss Mercurii liquidi uncias quatuor; — Bor4. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati quantum vis, Aquae partibus quatuor diluto admisce Liquorem Kali acetici, quamdiu praecipitatum crystallinum producitur, quod filtro separatum et Aqua frigida destillata ablutum loco umbroso sicca; — T. Solutioni aquosae crystallorum Nitratiss Protoxydi Mercurii infundere liquorem Kali acetici donec praecipitatio cessaverit; — Br. Mercurii, Acidi nitrici tenuis, singulorum semilibram et Acetatis Potassae uncias octo in Aquae destillatae calidae libris duabus cum dimidia solutae.

Garot empfiehlt folgendes Verfahren, welches am meisten geeignet seyn soll, ein gleichförmiges Product zu geben:

℞. Protonitratiss Mercurii crystallisati partes septem.

Aquae destillatae partes sexaginta.

Acidi nitrici . . . partem unam.

Dissolve sal in acido; praeterea solve Acetatis Sodae crystallisati

partes quinque

in Aquae destillatae partibus sexaginta et solutiones commisce.

Außerdem giebt es noch zwei andere Ver-
fahrungsweisen:

℞. Mercurii dulcis,

Dissolutionis Potassae causticae,
singulorum uncias duas.

Tritura in mortario lapideo et adde Aquae destillatae uncias quatuor.

Coque per horae quadrantem continue agitando; residuum Aqua destillata ablue, donec ab Argento nitrico non amplius turbetur; sicca deinde lenis caloris ope et coque cum

Aceti destillati unciis triginta sex per horae tres quadrantes; liquorem bullientem filtra et refrigeratione in crystallos concrescere fac. (Han. *Vm.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri partes 9,75. Mercurii . . . partes novem.

Contere, subinde Aceti aliquantulum addendo, ad perfectam metalli extinctionem usque; satura deinde cum Aceto destillato calido, filtra subito et crystallisationi subijce. (*Vm.*)

Dieses Verfahren giebt ein Gemisch des Proto- mit dem Deutoni-
trat.

Solutio Acetatis Mercurii. (B*.)

℞. Proto-Acetatis Mercurii grana decem ad duodecim.

Aquae Rosarum . . . uncias quinque.

Dissolve. — Als Trasmittel bei man-
chen Hautkrankheiten empfohlen.

Syrupus mercurialis. (*Vm.*)

℞. Protoacetatis Mercurii partem unam.

Alcoholis minimum quod possit ad solvendum sal ope caloris; solutio-
ni adde

Syrupi Sacchari partes quadraginta octo.

Misce bene.

Linimentum hydrargyro-acetosum. (B* *Vm.*)

℞. Protonitratiss Mercurii partem unam.

Axungiae Porci . . . partes sex.

Olei Olivorum . . . partes duas.

Sal cum axungiae pauxillo in pulve-
rem tere, et si homogenea reddita est miscella adde sensim quod restat axun-
giae et oleum. (*Vm.*)

B*. Salis scrupulos duos ad drach-
mam et Olei Olivarum unciam unam.
Von einigen Ärzten gegen Flechten an-
gewendet.

Dragae s. Pilulae Keyseri, Trochisci

ex Acetate Mercurii. (Ca. E. Sy. T. Vm.)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Acidi nitrici . . . quantum sufficit
ad metalli solutionem. Adde
Acetatis Potassae dissoluti
quantum sufficit

ut omnis mercurius praecipitetur; praecipitatum cum Manna vel Melle et Liquiritiae pulvere contere, ut fiant trochisci. (Sy.)

℞. Acetatis Mercurii
partem unam cum dimidia.

Amyli,
Gummi Arabici,
singulorum partem dimidiam.

Sacchari albi . . . partes septem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Acetatis Mercurii,
Mannae electae,
Gummi Arabici,
singulorum scrupulum unum.

Aquae Rosarum quantum sufficit
ut fiant pilulae viginti. (E.)

℞. Acetatis Mercurii . . . uncias duas.
Sacchari . . . uncias sex.
Gummi Arabici . . . unciam unam.
Pulveris Althaeae,
— Amyli,

singulorum semunciam.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum satis

ut fiant pilulae grani unius Saccharo conspergendae. (Ca.)

T. Quantitates Acetatis, Mannae vel Mucilaginis et Sacchari non indicat sed monet pilulas, quarum quaeque 3 ad 4 grana salis dicti continet, pulvere Amyli esse conspergendas et tres ad quatuor pro die proximandas.

Gabe, zwei Stück Morgens und Abends, allmählig bis auf fünf und zwanzig Stück und mehr auf die Gabe gestiegen. Sie waren lange in Ansehen, heutzutage aber nicht mehr: doch können sie von Nutzen seyn.

Deuto-Acetas Mercurii. (Fer. Sw*.)

℞. Oxydi Mercurii rubri uncias duas.
Acidi aceticus . . . uncias septem
vel quantum ad oxydi dissolutionem
modici caloris ope sufficit; liquor lente
ad siccum evaporet.

Liquor hydrargyro-aceticus. (Vm.)

℞. Oxydi Mercurii rubri
partes decem.

Acidi aceticus concentrati
partes quinque cum dimidia.

Oxydo in lagenam immisso acidum infunde, agita et quum totum album est redditum, in balneo aquae tepido

calefac ad perfectam liquefactionem usque, massam crystallinam albam dissolve deinde in

Alcoholis rectificati
partibus sexaginta.

Filtera et serva.

Tartas Mercurii, Tartas Protoxydi Mercurii, Hydrargyrum tartarisatum, Tartarus mercurialis, Pulvis Constantini s. mercurialis argenteus, Mercurius tartarisatus. (B*. Sw.)

℞. Oxydi nigri Mercurii quantum vis.
Acidi tartarici quantum necesse est.

Coque simul ad perfectam oxydi solutionem usque; evaporent deinde ad gradum necessarium ut liquor refrigeratione in crystallos concreseat.

Gabe, ein biß zwei Gran zweimal täg- lich.

Tartas Mercurii et Potassae. (B. Fer. Gal. Ca. Fi. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Solutionis Mercurii in Acido nitrico saturatae et bullientis
quantum vis.

Guttatim instilla solutionem aquosam saturatam et bullientem Tartratis Potassae neutralis, donec non amplius enascatur praecipitatum, quod, liquore decanthato, binis sequentibus vicibus Aquae frigidae pauxillo ablutum, in Aquae bullientis sufficiente quantitate solve et liquorem ut in crystallos concreseat, ad locum frigidum reponere. (B. Gal. Sw. Vm.)

T. Solutioni Crystallorum Nitratiss Mercurii in Aquae destillatae unciis tribus infundere jubet solutionem aquosam Tartratis Potassae, donec praecipitatum non amplius promoveatur, quod repetito Aqua frigida lotum siccetur.

℞. Oxydi Mercurii e Nitrate per Potassam praecipitati et bene loti
uncias duas.

Cremoris Tartari uncias quatuor.
Tritura simul per horas quatuor, tum coque cum

Aquae destillatae
unciis quadraginta octo.

Liquor ad cuticulum evaporatus in crystallos concreseat (Sp.)

℞. Carbonatis Mercurii (ammoniacalis?) . . . unciam unam.

Cremoris Tartari . . . uncias sex.
Tere in mortario et pulveri infunde
Aquae bullientis libras quatuor.
Solutio evaporata in crystallos concreseat. (Fer. Fi. T.)

Solutio nondum evaporata Aquam s. Liquorem vegeto-mineralem de Pressavino praebet.

Vm. Terere jubet Oxydi Mercurii par-

tes 10,25 et Cremoris Tartari 19,5; miscellae infundere Aquae bullientis quantum satis ad perfectam solutionem, calefacere deinde per horae quadrantem ad ebullitionem usque, colare et crystallisationi subjicere. — Praeterea: 1) triturare simul Sublimati corrosivi partes 12,7 et Tartraris Potassae neutralis 23, mixta terere cum Aquae frigidae sufficiente quantitate, ut hydrochloras potassae exacte separetur, residuum in Aqua bulliente dissolvere, liquorem calefacere, filtrare et crystallisationi subjicere; 2) solutionem saturatam Sublimati corrosivi decomponere Tartratis Potassae et Sodae ope; 3) triturare simul Oxydi Mercurii partes 10,25 et Tartratis neutralis Potassae partes 23; potassam lotionem liberatam separare, residuum dissolvere et liquorem crystallisationi subjicere.

℞. Mercurii uncias duodecim cum dimidia.

Oxydi rubri Mercurii unciam unam et drachmas quinque cum dimidia.

Cremoris Tartari unciam unam et drachmas duas cum dimidia.

Aquae quantum sufficit ut fiat pasta, cui per longum tempus in mortario cineri calido imposito trituratae Aquam bullientem quantum satis ad solutionem adde; liquor filtratus ad cuticulae apparitionem usque evaporet. (Ca.)

Sw et Vm.* eundem agendi modum indicant sed *Sw**: Mercurii partes quinque cum dimidia, Oxydi partes sex, Cremoris Tartari partes viginti septem; — *Vm.* Mercurii partes novem cum dimidia, Oxydi partes decem cum quadrante, Cremoris Tartari partes novemdecim et dimidiam; — *Vm.* praeterea proposuit: 1) terere simul Mercurii dulcis partes 22,2 et Tartratis Potassae 23, Aquam instillare, calefacere, Aqua bulliente addita solutionem conficere, filtrare et crystallisationi subjicere; 2) triturare ad extinctionem usque Sublimati corrosivi partes 12,7, Mercurii 9,5, et addere deinde Cremoris Tartari partes 23; 3) Sulphatem parare ex Oxydi rubri Mercurii 9,5 et Acidi sulphurici concentrati 10, terere hoc sal cum metalli 9,5, massam humectare cum Aquae decem, miscere eam cum Tartratis neutralis Potassae 23, totum in Aqua calida dissolvere et sal mercuriale crystallisatione separare.

Dieses Doppelsalz bildet die Basis des *Liquor vegeto-mineralis Pressavin*, welchen man bereitet, indem man Quecksilber in Salpetersäure auflöst, es durch ein Al-

kali niederschlägt, den Niederschlag mit destillirtem Essig behandelt, ihn durch Zusatz von Cremor tartari wieder fällt und ihn mit Wasser warm auflöst. (*Vm.*)

Dieses Salz ist von dem vorhergehenden nur wenig verschieden; es war einige Zeit berühmt und kann unter denselben Umständen angewendet werden.

Syrupus Tartratis Mercurii. (Bo. Pie.)

℞. Stipitum Dulcamarae libras duas cum dimidia.

Aquae quantum sufficit.

Coque et decocto adde

Sacchari libras decem.

Coque syrupum ad globulum usque et pro octario adde momento quo eo uti vis

Liquoris vegeto-mineralis de Pressavin uncias duodecim.

Misce exacte.

℞. Corticis Mezerei uncias duas.

Aquae quantum sufficit.

Decoctioni adde

Sacchari albi libras tres.

Fac deinde ut antea. — Gabe, zwei bis vier Unzen täglich, auf zwei Mal.

Oleo-Margaras Mercurii, Sapo Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis. (*B*. R. Au. Bo. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Saponis albi partem unam.

Dissolve in Aquae partibus quatuordecim; Iquori instilla solutionem maxime dilutam Protonitratis Mercurii, donec praecipitatum non amplius enascatur; calefac ut magma bene coeat, decantha liquidum et praecipitatum Aqua tepida ablutum commisce cum Aquae 30° R. partibus octo ac pedentim, adde Kali causticum liquidum ad perfectam dissolutionem usque; evaporet deinde, donec liquor digitis non amplius adhaereat.

Äußerlich zur Auflösung von Bubonen. Auch hat man dieses Präparat bei Rheumatismen und chronischen Granthemen empfohlen.

Sapo mercurialis Chaussieri. (Ca.)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequales) uncias tres cum dimidia.

Tritura in mortario vitreo sensim superfundendo

Natri caustici liquidi uncias tres donec miscella magnam acquisiverit tenacitatem; tum in modulo effusam sicca. — Wie das vorige gebraucht.

Unguentum Praecipitati viridis. (*Sw*.*)

℞. Sublimati corrosivi partes duas.

Hydrochloratis Cupri partem unam.

Salibus seorsim in Aqua solutis, mis-

ce solutiones et iis infunde solutionem Saponis albi, praecipitatum filtro receptum lavando edulcora. — Zum Verbinden venerischer Geschwüre empfohlen. Es ist eine feisenartige Verbindung des Quecksilbers mit Kupfer.

Mesembryanthemum.

Mesembryanthemum crystallinum, L.; Eiskraut, Eispflanze, Mittagseblume; Glaciale, Cristalline (Gal.); Ice plant, Diamond fig. Marigold (Ang.); Isplante (D); Hierba de la plata (His.); Yskruid (Bel.); Erba cristallina (I.); Agelada (Lus.); Isaert (Suéc.).

An. R. Ba. Ful. M.

⊙ (Icosandria Pentagynia, L.; Ficoidae, J.) Eine Pflanze des Archipels. (Dill. Elth. 231. t. 180. f. 221. Plenck. t. 397.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem ästigen Stängel mit kleinen, eirunden, wellenförmigen, entgegengesetzten oder abwechselnden Blättern, welche so wie ersterer überall mit sehr großen glänzenden Achselblättern bedeckt sind. Es hat einen faden, etwas widerlichen Geschmack.

Kühlend, aufstößend, bei convulsivischem Husten und Dysurie, so wie als specifisch harntreibendes Mittel gepriesen. — Gabe, vom Saft, ein Eßel alle zwei Stunden.

Conserva Mesembryanthemi crystallini. (Ful.)

℞. Herbae Mesembryanthemi crystallini recentis contusae et cribratae partem unam.

Sacchari albi partes duas.

Misce trititando.

Lincius s. Looch Mesembryanthemi crystallini. (B. Au.)

℞. Succus Herbae Mesembryanthemi crystallini,

Syrupi Musci albi querni, singulorum unciam unam.

Misce. — Gabe, ein halber Eßel täglich sechs Mal, bei convulsivischem Husten der Kinder.

Syrupus Mesembryanthemi crystallini. (Ba.)

℞. Succus expressi Herbae recentis Mesembryanthemi, ebullitione depurati et despumati partem unam.

Sacchari partem unam cum dimidia.

Fiat syrupus.

Mespilus.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung finden sich in den Pharmacopoen angeführt:

1) *Mespilus Germanica*, L.; Mispelbaum; Néflier d'Allemagne (Gal.); Dutenmedlar (Ang.); Mispeltrae (D.); Mispero (His.); Mispelboom (Bel.);

Mispik (Pol.); Nespereira (Lus.); Mispeltraed (Suéc.).

Ams. Gal. His. Wir. Be. M. Sp.

Ein Baum (Icosandria Pentagynia, L.; Rosaceae, J.), welcher auf den Europäischen Gebirgen wächst. (Blackw. t. 154. Plenck. t. 393. Bert. Bild. V. 87. fig. 2. Nouv. Duh. IV. 38.)

Man wendet die Frucht und den Saamen an.

Die Frucht, Mispel (fructus Mespili) ist rundlich, platt gedrückt, fleischig, an der Spitze genabelt, und enthält mehrere einsaamige Fächer. Ihr Geschmack ist herbe und zusammenziehend, wird aber, wenn sie durch Sieden weich geworden und daher in einem der Fäulniß nahe stehenden Zustand (blossissement) gekommen sind, süß, weinig und sehr angenehm.

Der Saame ist knochig, sehr hart und länglich.

Die Frucht ist etwas abstringirend und der Saame gilt als harntreibend.

2) *Mespilus Oxyacantha*, Cand.; Weißdorn; Aubepine, Epine blanche (Gal.); White hawthorn (Ang.); Hagetorn (D.); Espino majuolo (His.); Haagdorn (Bel.); Bianco spino (I.); Boldak (Pol.); Espinheiro alvar (Lus.); Hagtorn (Suéc.). Gal. His. Sp.

Ein Strauch (Icosandria Digynia, L.; Rosaceae, J.), welcher in ganz Europa gemein ist. (Blackw. t. 149. Schk. t. 132. Jacq. Fl. Austr. III. t. 292. f. 2.)

Man wendet die Blüthen (flores Oxyacanthae s. Spinae albae) an; sie sind weiß, groß und in Straüße vereinigt. Sie haben einen angenehmen Geruch, welcher durch Trocknen sich fast ganz verliert. Der Geschmack ist schwach stypfisch.

Mit lauwarmem Wasser aufgegossen, werden sie bisweilen als Hausmittel gegen Husten gebraucht. Die Materia medica verliert an ihnen nichts.

Meum.

Ligusticum Meum, Ro.; Bärwurzel, Hundspeterflie, Herzwurzel, Mutterwurz, Bärenfendel; Meum (Gal.); Common signal (Ang.); Keprnik (B.); Bialerne dild (D.); Meo (His. I.); Beerwortel (Bel.); Olesnik (Pol.); Bjaern dill (Suéc.). An. Bel. Br. Per. Gal. His. Wir. Wür. Be. Br. G. M. Sp. Z.

4 (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in Europa wachsende Pflanze. (Blackw. t. 525. Plenck. t. 201. Hayne VII. t. 12. Zorn Ic. pl. t. 499.)

Man wendet die Wurzel (radix Mei s. Mei athamantici s. Anethi s. Foeniculi ursini) an; sie ist sechs bis acht Zoll lang, fingersdick, runzlig, außen schwärzlichgrau, innen weiß. Sie hat einen starken balsa-

mischen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, harntreibend, Brustmittel, aber wenig gebraucht.

Millefolium.

Achillea Millefolium, L.; Schaafgarbe; Millefeuille commune (*Gal.*); Common milfoil (*Ang.*); Kjebrjcek (*B.*); Raellike, Harhaeus, Jordhumble (*D.*); Millefolia, Milenrama (*His.*); Gemeene duizendblad (*Bel.*); Millefoglio (*I.*); Tysiacznik. (*Pol.*); Milem rama (*Lus.*); Daellika (*Succ.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

4 (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, Cass.) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw. t. 18. Schk. t. 255. Plenck. t. 631. Düss. off. Pfl. I. t. 21. Zorn Ic. pl. t. 29.*)

Man wendet das Kraut und die blühenden Spigen an.

Das Kraut (herba Millefolii s. Achilleae vulgaris) besteht aus langen, behaarten, doppelt gefiederten, in viele lineenförmige Fiedern getheilten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen bitteren, gewürzhaften, etwas adstringirenden Geschmack.

Die Spigen (summitates vel flores Millefolii) bilden endständige, aus dicht stehenden weißen oder purpurothen Blüten zusammengesetzte Sträuße. Sie haben einen etwas unangenehmen, schwach gewürzhaften Geruch, und einen bitteren, etwas scharfen, balsamischen Geschmack.

Reizend, tonisch, krampfstillend, Wundmittel, bei Hysterie, Blähungs- und Hämorrhoidalcolic angewendet. Man giebt den ausgebrückten Saft zu einigen Unzen.

Species contra sputum sanguinis s. adstringentes. (*Pal.*)

℞. Millefolii purpureo-florescentis unciās novem.

Herbae Tormentillae cum radice,
— Pimpinellae albae e tota planta,
— Plantaginis,
— Virgaureae,

Florum Rosarum rubrarum, singulorum sesquiunciam.

Concisa misce.

Succus Millefolii. (*Hars. T.*)

℞. Herbae recentis Millefolii

quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae paxillum adspargendo; exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva.

Extractum Millefolii aquosum. (*A. An. Ba. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. O. Pal. Sax. Suec. Wir. Pid. T. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Millefolii quantum vis.

Contunde cum Aquae paxillo et per pannum cola; sepone, decantha et prope ignem coagulatum iterum cola; tunc ad massae pilularis consistentiam evaporatum ab igne remove, faeculam antea repositam commisce et iterum ad aptam spissitudinem usque vaporando consume. (*Vm.*)

℞. Herbae Millefolii libram unam.

Aquae frigidae . libras duodecim.

Macera per horas quadraginta octo, subinde agitando; cola et colaturā ad librarum duarum circiter remanentiam consumta, liquorem refrigeratum cola et vaporando in balneo aquae, ad consistentiam requisitam consume. (*Han.*)

℞. Foliorum recentium Millefolii,

Aquae frigidae, singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim et adde

Aquae bullientis duplum pondus massae totius. Post refrigerationem colatum et albumine clarificatum igni impone et liquorem, quin spissescere coeperit, per pannum tractatum, continue agitando, probe consume. (*Vm.*)

℞. Herbae Millefolii libram unam.

Aquae fontanae . libras sex.

Digere per horas quatuor, tunc parumper coctum cola exprimendo et colaturam ad extracti spissitudinem consume. (*Li. Pal. Wir.*)

℞. Herbae Millefolii partem unam.

Aquae communis . partes octo.

Infunde per horas quatuor, tunc coque per quadrantem et cola fortiter exprimendo. Residuo cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores commisce, qui per horas viginti quatuor sepositi ad requisitam consistentiam evaporant. (*Sax.*)

℞. Herbae Millefolii libram unam.

Aquae communis . libras sex.

Coque per horam unam, cola exprimendo et colaturam decanthatam post horarum viginti quatuor sepositionem blando igne consume. (*Hass. Pid.*)

Ba. Herbae partem unam, Aquae duodecim et quadrantem horae ebullitionis; — An. Herbae unam, Aquae decem et ebullitionem per horae quadrantem.

℞. Herbae Millefolii partem unam.

Aquae bullientis . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo. Residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem

coletur; liquores tunc commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti consistentiam evaporent. (Bor. D. Han. O.)

Bor4. Millefolii quantum vis, Aquae fervidae decuplum, post 36 horarum sepositionem liquorem exprimendo separa; residuum cum Aquae fervidae quintuplo infunde et post refrigerationem exprime, liquores decanthando collandoque depurati et commixti primo leni calore ad tertiam partem tunc in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem evaporent; — T. summitatum siccatarum libram unam, Aquae bullientis libras octo, 24 horarum infusionem et evaporationem ad extracti consistentiam; — A. Herbam florecentem pluribus sequentibus bullitionibus penitus extrahere, liquores commiscere et decanthatos in balneo aquae consumere; — Succ. coquere eam parumper cum Aquae duplo, exprimere, residuum cum nova Aqua decoquere et liquores commixtos in balneo aquae inspissare; — HassP. ut extractum cardui benedicti.

Extractum Millefolii alcoholicum. (Ful. Pol. Wüir.)

℞. Herbae Millefolii, Alcoholis, singulorum libras duas. Aquae communis libras novem. Digere per horas duodecim, cola exprimendo et Alchhole destillando separato, residuum ad requisitam consistentiam evaporet. (Pol.)
Ful. et Wüir. Herbae libram unam, Alcoholis tantidem, octo Aquae et tres dies infusionis.

Syrupus Millefolii s. de Millefolio. (Gal.)

℞. Foliorum recentium Millefolii semilibram. Aquae bullientis . . . libras tres. Infunde per horas duodecim, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . duplum.
Gabe, eine halbe bis zwei unzen.

Tisana haemastatica. (Pic.)

℞. Caudae vulpinae, Millefolii, Foliorum Plantaginis, — Polygoni, — Urticae, singulorum manipulum unum. Aquae . . . octarios tres. Tertiam partem coquendo consume.

Linctus s. Looch pectoralis. (Br.)

℞. Herbae Millefolii, Pharmacopoea universalis. II.

Herbae Hederæ terrestris, singularum uncias duas cum dimidia.

— Hyssopi, Stipitum Dulcamaræ, singularum unciam unam.

Aquae bullientis . . . libras tres. Post horas duodecim infusionis decoque lente ad dimidii remanentiam; exprime fortiter et adde

Mellis despumati . . . libras tres. Aceti . . . libram unam.

Decoque blando igne ad mellis consistentiam.

Mixtura Millefolii, Poitio excitans. (Au.)

℞. Extracti Millefolii, semunciam. Aquae Menthae piperitæ . . . uncias octo.

Elaeosacchari Menthae semunciam. Gabe, ein Köffel, vier Mal täglich.

Tinctura s. Essentia Millefolii. (Br. Ful. HassP. Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Millefolii . . . uncias tres. Alcoholis . . . uncias sedecim.

Digere per tres dies, cola exprimendo et cum colaturâ infunde

Herbae Millefolii . . . uncias duas. Post sufficientem digestionem cola exprimendo et filtra. (Br. Pal. Wir.)

Ful. et Li. Herbae florecentis partem unam, Alcoholis octo et octo dies digestionis; — HassP. Herbae uncias quatuor, Spiritus Vini rectificati libras duas, digere per dies sex; tincturae expressae et filtratae pondus sit unciarum viginti.

Reizend, ehebem gegen Hämorrhoiden, Mutterblutflüsse und Nierenstein Schmerzen empföhlen. — Gabe, funfzig bis siebenzig Tropfen.

Oleum Millefolii aethereum, Aethereoleum Millefolii. (Br. Ful. Sax. Wir.)

℞. Summitatum florecentium Millefolii . . . partem unam. Aquae . . . partes tres.

Destillando elicited oleum separatur. (Ful.)

Sax. Herbae partem unam et octo Aquae; — Br. et Wir. Herbae viginti quinque, Aquae septuaginta quinque, Salis communis tres et tres dies digestionis.

Gabe, funfzehn Tropfen bis eine halbe Drachme.

Aqua Millefolii. (Han. Vm.)

℞. Herbae florecentis Millefolii libras duas. Aquae purae . . . quantum sufficit. Destillent librae duodecim. (Han.)

℞. Herbae florecentis Millefolii partes quinque. Aquae Vitæ partis quadrantem.

Aquae purae . partes sexaginta.
Destillent partes viginti. (Vm.)
Gabe, zwei bis vier Unzen.

Spiritus aromaticus s. vulnerarius s.
Millefolii s. Rorismarini compositus.
(Fenn. Suec. Vm.)

℞. Summitatum Millefolii
sesquilibram.
— Rorismarini
— Thymi,
singularum semilibram.

Alcoholis,
Aquae, singularum libras octo.
Destillent librae octo. (Fenn.)
Suec. Rorismarini sesquilibram, Mil-
lefolii, Thymi, singularum libram unam
et Aquae Vitae Frumenti purificatae
libras sedecim.

℞. Millefolii florescentis partes tres.
Artemisiae,
Matricariae,
Serpylki, singularum partem unam.
Aquae Vitae . partes sedecim.
— purae
partes quadraginta octo.
Destillent partes sedecim. (Vm.)

Aqua pontificalis s. vulneraria Roma-
na s. Succorum vegetabilium vulneraria,
Balsamum vulnerarium vegetabile, Li-
quor vulnerarius vegetabilis Dippelii,
Spiritus aromaticus s. vulnerarius aci-
dus, Spiritus Millefolii s. Rorismarini
acetatus. (B*. Fenn. His. Suec. Wir.
Vm.)

℞. Herbae Nummulariae,
— Betonicae,
— Chaerophylli,
— Plantaginis,
— Aristolochiae Clematidis,
— Saniculae,
— Verbasci,
— Sedi majoris,
— Sedi minoris,
— Pervincae,
— Pimpinellae albae,
singularum uncias tres.
Foliorum Quercus,
Summitatum Millefolii,
singularum uncias duas.
Contunde, exprime fortiter succum,
qui cum

Aceti . aequali suae quantitate.
Salis culinaris . . uncias quatuor
destillet. Productum serva. (Wir.)

℞. Succu Millefolii,
— Betonicae,
— Origani,
— Pimpinellae albae,
— Sedi majoris,
— Saniculae,

Succi Verbenae,
singularum uncias sex.
— Mari uncias tres.

Kali subcarbonici,
Salis culinaris,
singularum uncias sex.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Aloës Socotrinae . . unciam unam.
Aceti destillati . . libram unam.

Dissolve aloën in aceto, sal in succo
betonicae, kali in succis verbenae et
millefolii, cremorem in succo pim-
pinnellae; liquores commixtos digere per
tres dies et destillando ad siccum re-
dige; productum cum residuo pulvera-
to dilue et novam destillationem in-
stitue, quod tertio est repetendum (His.)

℞. Succorum Origani, Saniculae, Be-
tonicae, Verbenae, Sedi majoris, Pim-
pinellae albae et Millefolii, singularum
uncias sex, Succu Mari tres, Subcarbo-
natis, Salis marini, singularum uncias
sex, Cremoris Tartari quatuor, Aceti
libram unam et Aloës sesqu unciam; post
tres dies digestionis destillet tertia pars.

℞. Spiritus Millefolii compositi
partes duas.
Aceti partem unam.

Misce (Fenn. Suec. Vm.)

Reizend, als Auflösungsmittel bei Quetsch-
ungen und Schymosen betrachtet, auch als
abstringirendes Mittel bei innern Blutflüs-
sen, und zur Verminderung der Schweiß-
schwindfüchtiger gebraucht. — Gabe,
vierzig Tropfen und mehr. — Man könn-
te statt des Weinessigs auch Alcohol neh-
men.

Millepedes.

Oniscus Asellus, L.; Kellerwurm, Kels-
tereseel; Cloporte ordinaire (Gal.); Haters,
Chesbug (Ang.); Skukketruid (D.);
Galminha, Encarrucha (His.); Pisse-
bedden (Bel.); Centogambo, Millepie-
de, Porcelletto (I.); Stonog (Pol.);
Centopea (Lus.); Graesugga (Suec.).
Ams. B. Ba. Bor. Br. Fer. Ful. Gal.
Gen. Han. HassP. His. Li. O. Pol. R.
Sax. Wir. A. Fi. G. Sp.

Der gemeine Kellerwurm gehört in die
Classe der Crustaceen (Isopoda, Onisci-
des; Latr.) und ist allenthalben sehr ge-
mein (Panz. Faun. Germ. fasc. IX. 21.);
er ist aschgrau, glatt, mit schwarzen und
gelblichen Flecken

Die Kellerwürmer gelten für eröffnend,
schmelzend und harntreibend. Ehemal schädte
man sie sehr gegen Wassersucht und Asthma.
— Gabe des Pulvers, 1 Scrupel bis 1
Drachme, des ausgepressten Saftes, eine
halbe Unze. Ful. verordnet in muris non
sub trabibus collectos.

Millepedes praeparati. (Fr.)

℞. Millepedum . . . quantum vis.
Lava in bono vino et mortuos in
balneo vaporis sicca, tunc denuo, ter-
tio vel quarta vice cum novo vino la-
va et sicca.

Conserva Millepedum. (B. Ful. Li. Wir.)*

℞. Millepedum viventium
libram unam.

Sacchari albi
libras duas cum dimidia.

Contere. (B*. Li. Wir.)

Ful. Millepedum partem unam et
Quas Sacchari.

Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Jus Millepedum. (Au.)

℞. Millepedum . . . drachmam unam.
Aeque aromaticae . . . semunciam.
Jussis Carnis . . . uncias novem.
Santtreibenb.

Infusum Millepedum. (Sar.)

℞. Millepedum viventium contusorum
drachmas sex.

Aeque purae . . . uncias tres.

Alcoholis . . . unciam unam.

Post macerationem per horam unam
cola, fortiter exprimendo. — Sant-
treibenb.

Syrupus Millepedum. (Ca.)

℞. Sacchari . . . uncias duodecim.

Radicis Asparagi,

— Liquiritiae,

Uvarum passarum,

Foliorum Parietariae,

Mannae,

singulorum drachmas duas.

Fiat syrupus, tunc

℞. Succis Boraginis,

— Buglosi,

singulorum uncias duas.

Millepedum contusorum

sesquiunciam.

Commisce, filtra et pro uncias qua-
tuor liquoris adde

Sacchari . . . semilibram.

Solve in balneo aquae et syrupum
cum praecedente commisce.

Bei Husten und Keuchhusten empfohlen.

Vinum diureticum. (Ca. Sm. Sp.)

℞. Millepedum viventium
unciam unam.

Contunde et infunde sensim

Vini albi novi aciduli uncias sex.

Cola exprimendo. (Ca. Sm.)

Sp. Millepedum unciam unam, Sac-
chari tantidem et quatuor Vini.

Liquor diureticus. (Pie.)

℞. Millepedum . . . no. 80 ad 40.

Baccarum Alkekengi no. 20 ad 30.

— Juniperi . . . no. 6.

Contunde in mortario marmoreo,
sensim affundendo

Vini albi sufficientem quantitatem.

Cola exprimendo.

Tinctura s. Essentia Millepedum. (Br.)

℞. Millepedum bene siccatorum
semunciam.

Spiritus Vini rectificati uncias sex.

Post sufficientem extractionem cola
exprimendo et filtra.

M o m o r d i c a.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung fin-
den sich in den Pharmacopöden angezeigt:

1) *Momordica Balsamina, L.*; Balsam-
apfel, Wunderapfel; Balsamine, Pomme
de merveille (*Gal.*); Balmappel (*Ang.*);
Balsamaeple (*D.*); Momordica (*His. I.*);
Balsam appel (*Bel.*).

Br. Fer. Gal. Br. Sp.

2) (*Monoecia Monadelphica, L.*; Cucur-
bitaceae, *J.*) Eine Pflanze Ostindiens.
(*Blackw. t. 539 a b. Knorr. del. I. t.*
B. S. Zorn Ic. pl. t. 45.)

Man wendet die Frucht (*fructus Mo-*
mordicae s. Pomum hierosolymitanum)
an; sie ist beerenartig, fast von der Größe
eines Laubeneis, von pomeranz- oder
Scharlachrother Farbe.

Ehedem galt sie als Wundmittel; heut-
zutage bedient man sich ihrer nicht mehr.

2) *Momordica Elaterium, L.*; Esels-
gurke, Eselsstürbis, Springgurke, Sprig-
gurke; Elaterium, Concombre sauvage
(*Gal.*); Squirting concombres (*Ang.*);
Strikawa aneb plana tykwice (*R.*); Co-
hombrillo amargo (*His.*); Ezelskom-
kommers (*Bel.*)

Br. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. His. Lon.

LonN. Sax. Suec. Wir. Be. Br. C. G.

M. Par. Sa. Sp. Z.

⊙ Eine Süd europäische Pflanze. (*Blackw.*
t. 108. Plenck t. 693. Bull. t. 81. Schk. t.
313. Hayne VIII. 45. Zorn Ic. pl. t. 144.)

Man wendet die Wurzel und die Frucht
an.

Die Wurzel (*radix Cucumeris agrestis*
s. as nini s. Momordicae Elaterii) ist
zwei bis drei Zoll dick, einen Fuß lang,
und hat einen unangenehmen Geruch und
einen widerlichen, brennenden Geschmack.

Die Frucht ist eine eirundblängliche, grüne
Beere, welche man halbreif abnimmt. Diese
Frucht enthält, nach Paris, einen eigen-
thümlichen Stoff, das *Elatin* oder *Elat-
erin* (*Elatinum, Elaterinum*), in wel-
chem die Bitterkeit liegt.

Ein sehr heftiges drastisches Purgirmit-
tel, welches ehemals bei chronischer Wassers-

fucht gebraucht wurde, heutzutage aber nicht mehr angewendet wird.

Succus Elaterii. (His. Sar.)

℞. Fructuum Elaterii nondum penitus maturorum . . quantum vis.

Seminibus separatis, reliquum contunde in mortario lapideo, exprime succum, sepone, decantha et partem limpida serva.

Elaterium, Inspissamentum Cucumeris agrestis, Extractum fructus Momordicae Elaterii. (Br. Du. Han. His. Lon. LonN. Sar. Wir. Wür. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Fructuum Elaterii maturorum quantum vis.

Petiolis apicis cultri ope, seminum separandorum causa remotis, contunde pericarpia in mortario pistillo ligneo, Aquam pedetentim addendo; pulpam per cribrum trajice et blando igne ad extracti consistentiam vaporando consume. (Gal. Sar. Wir. Wür. Sp. Sw. Vm.)

Han. His. Lon. et LonN. succum expressum seponere jubent ut subsideat liquidum supernatantem rejicere et sedimentum leni calore consumere; — Du. hocce blando igne inter duo lintea siccare; — Br. praecipitationem digestionis in balneo aquae ope juvare; — T. ut extractum cichorii.

Ein heftiges, ehedem bei Wasserfuchten sehr gebräuchliches Purgirmittel. Man setze es zu andern wassertreibenden Mitteln. Gabe, drei oder vier Gran.

Faecula Cucumeris agrestis. (Gen. Vm.)

℞. Fructuum viridium Elaterii quantum vis.

Contunde cum pistillo ligneo in mortario vitreo et exprime succum, residuum cum Aquae pauxillo contusum itidem exprime; mixtos liquores sepone, decantha, igni impone ut coagulet faecula, remove deinde, cola, faeculam bene lava et blando calore siccata pulvera.

Pilulae hydragogae. (Sa.)

℞. Extracti Elaterii . grana decem.
— Gentianae drachmas tres.

Fiant pilulae quatuor granorum.

Pilulae ex Elaterio s. Elaterii compositae. (Succ.)

℞. Gummi Ammoniaci uncias duas.
Aloës Socotrinae,
Gummi Guttae,
singulorum drachmas duas.
Extracti Elaterii semidrachmam.
Tincturae Absinthii quantum sufficit.
Fiant pilulae sexcentae et quindecim.

Oleum Momordicae. (Br. Sar. Wir. Wür.)

℞. Fructuum maturorum Elaterii partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Digere per dies duos in balneo aquae et exprime; post refrigerationem maceratio repetatur. (Sar.)

Br. et Wir. digerere super cinere calido jubent Fructuum partem unam, Olei Lini partem unam cum dimidia, coquere tunc lente per horam unam ad consumptionem humidi usque et denique digestionem atque coctionem cum novorum fructuum aequali quantitate repetere; — Wür. Coquere lente ad humidi usque consumptionem Fructuum maturorum partem unam in Olei Olivarum duabus.

Bei aufgesprungenen Brustwarzen, Hämorrhoidalschmerzen und Frostbeulen empfohlen.

Oleum Conyzae vel Momordicae compositum. (His.)

℞. Foliorum Conyzae majoris,

— Laureolae,
— Momordicae,
— Calaminthae,
— Rorismarini,
— Majoranae,
— Thymi,
— Rutae,
— Lauri,
— Sabinae,
— Salviae,
singulorum uncias quatuor.

Radices Bryoniae,

— Ari,
— Momordicae,
singulorum uncias duas.

Olei Olivarum . . libras decem.

Macera per dies quatuor, tunc coque lente ad humidi usque consumptionem et cola cum expressione.

Solutio Elaterii, Mixtura hydragoga. (Au. E. Huf.)

℞. Extracti Elaterii granum unum.
Aetheris nitrici . . uncias duas.
Tincturae Scillae,
Oxymellis Colchici,
singulorum semunciam.

Syrupi Sacchari . unciam unam.
Gabe, ein Löffel vier oder fünf Mal täglich in etwas Wasser. (Au. E.)

℞. Extracti Elaterii granum unum.
Aquae Petroselini . uncias sex.
Aetheris nitrici drachmas duas.
Oxymellis scillitici,
Syrupi Rhamni,
singulorum semunciam.
Roob Juniperi . unciam unam.

Tincturae aromaticae

drachmam unam.

Sabe, zwei Edffel alle zwei oder drei Stunden.

Monarda.

Monarda punctata, L.; punctirte Monarde; Monarde ponctuée (Gal.); Mountain balm (Ang.).

Am. C.

⊙ (*Diandra Monogynia*, L.; Labiatae, J.) Eine in Nordamerika einheimische Pflanze. (Pluk. Alm. t. 24. fig. 1.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem sitzigen, weißlichen Stängel mit schmalen, spitzen und überall mit vielen glänzenden Haaren bedeckten Blättern.

Wahrscheinlich wirkt es als Reizmittel.

Oleum Monardae aethereum, *Aethereolum Monardae*. (Am. C.)

℞. Herbae Monardae quantum vis. Aquae . . . quantum sufficit ut herba obtegatur. Destillent.

Moringa.

Moringa oleifera, Lamk.; gemeine Behennuß; *Ben oleifera* (Gal.).

Br. Gal. Ful. Li. Wir. G. Sp.

Ein Baum (*Hexandria Monogynia*, L.; Leguminosae, J.) Malabar's. (Blackw. t. 386. Plenck & 318. Descourt. Fl. méd. d'Ant. t. 27. Fl. méd. III. 63.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (*radix Moringae*) besteht in Stücken von verschiedener Dicke, von gelblicher Farbe, harzigem Bruche und gewürzhaftem Geruch und Geschmack.

Man ist noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich von dieser Pflanze kommt.

Ein fast ungebrauchliches Wurmmittel.

Der Saame, *Ben-Nuß* (*nux Ben s. Been*, *Balanus myrpesica*, *Glaucus unguentaria*), ist eine einfrörmige Nuß mit drei häutigen Flügeln, welche unter einer harten, inorpeligen Rinde eine weißliche Mandel enthält.

Oleum Been s. balatinum. (Ful. Gal. Li. Br. T.)

℞. Nucum Been excorticatarum quantum vis.

Contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo; pastam in succo e tela confecto inclusam. exprime frigide et oleum cola. (Ful. Gal. 6c.)

Li. saccum pastam continentem super Aqua bulliente suspendere, ita ut aquoso vapore imbibatur et tunc prelo submittere jubet.

Erweichend, die Haut röthend, krampfstillend, wurmtreibend, aber wenig in Gebrauch.

Morphium.

Morphina, *Morpheum*, *Morphinum*; *Morphin*, *Morphium*; *Morphine* (Gal.). B*. Bor4. Fer. Gal. Fi. T.

1) Sertürner's Methode.

℞. Extracti Opii partes quingentas. Aquae quantitatem sufficientem ut solutio frigida indicet 8° Ar. Infunde ei

Ammoniaci liquidi 2°

quantitatem sufficientem vel satis ut parvus ejus sit excessus; praecipitatum quod enascitur gelatinosum, separa, crystallos in fundo ortas filtro recipe et siccatas in Acido sulphurico 66° calido et antea Aquae octo partibus diluto solve; liquori infunde Ammonium; praecipitatum quod enascitur exsumendo et Alcohole 22° ablutum in Alcohole 36° bulliente solvendo; solutionem colatam crystallisationi subijce. (Gal.)

2) Pottot's Methode.

℞. Opii . . . quantum vis. Macerationes plures perlice, liquores commixtos ad 2° Ar. usque inspissa, liquido tepido Ammoniacum (causticum) adde ita ut sit ejus parvus excessus, praecipitatum glutinosum inde formatum filtra, infunde frigidè Ammoniaci liquidi novam quantitatem in excessu et praecipitatum in panno e tela arctioris texturae confecto receptum et Alcohole 20° ablutum sicca, pulvera et Alcohole 36° bulliente, parva Carbonis animalis proportione mixto tracta. (GalH. T.)

3) Robiquet's Verfahren.

℞. Opii puri concisi partes trecentas. Aquae commisis . partes mille. Macera per dies quinque, cola et colaturae adde

Magnesia calcinatae

partes quindecim.

Coque per sexagesimas decem, filtra, sedimentum Aqua frigida abluè, sicca et blandi caloris ope in Alcoholicis 22° quantitate sufficiente macera; quod restat, cum Alcohole frigidò ejusdem gradus abluè, sedimentum per momenta aliquot in Alcohole 32° bulliente tenens et liquore colato crystallos refrigeratione inde enatas in Alcohole 36° bulliente solve et solutionem crystallisationi subijce. (B*. Fer. Gal. T.)

Fi. Opii libram unam, Aquae com-

munis libras tres, Alcoholis dictorum trium graduum quantum sufficit et Magnesiae purae grana decem, caeterum ut antea procedere jubet.

4) Verfahren Binfler's.

℞. Opii partes tres.
Aceti partem unam.
Aquae destillatae . partes octo.
Post aliquot dies digestionis materiam separatam pluribus vicibus Aquâ cum Aceto mixta ablue, liquoribus conjunctis Ammonium infunde, praecipitatum filtro receptum per aliquot dies cum Aethere alcoholato tracta; a liquido supernatante morphium a materiis simul cum ea praecipitatis separa, dissolve in Alchhole bulliente 36° et liquorem refrigeratione in crystallos abire fac.

5) ℞. Opii pulverati uncias quatuor. Digere leni calore cum Aquae destillatae unciis triginta duabus, Acidi muriatici uncia una mixtis per horas sex, saepius agitando, et decantha. Residuum ter simili modo digeratur. Liquoribus obtentis adde Natri muriatici uncias sedecim. Sale soluto et materiis sepositione perfecte praecipitatis, filtratis admisce Liquorem Ammonii caustici quamdiu praecipitatum efficitur et miscellam per biduum sepone. Praecipitatum ope filtri separatum Aqua destillata frigida ablutum et siccatum digere cum

Spiritus Vini alcoholisati partibus decem quoties hic ab illo aliquid solvit. Tincturae ferventes filtratae sepositione et destillatione in crystallos redigantur; has Spiritu Vini rectificatissimo frigido ablutas leni calore in

Acidi muriatici Aquae destillatae partibus quatuor diluti sufficiente quantitate solve. Liquor post refrigerationem in massam crystallinam abeat; hanc lintheo inclusam exprime ut ab heterogeneis depuretur. Residuum solvatur in Aquae destillatae fervidae sufficiente quantitate et liquorem refrigeratum cum

Liquore Ammonii caustico ad perfectam morphii praecipitationem usque misce. Praecipitatum in

Spiritus Vini alcoholisati quantitate sufficiente solutum lege artis in crystallos redige. (Bor4.)

Man wendet das Morphin nicht leicht an, weil es im Wasser zu schwer auflöslich ist.

Potio narcotica. (B.)

℞. Morphini semigranum.
Aquae destillatae unciam unam.
Syrupi Papaveris albi drachmam unam.
Abends beim Schlafengehen.

Injectio leniens. (B.)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
— Liliorum,
singulorum semunciam.
Morphini grana duo.
Gegen Dürschmerzen, Schmerzen bei hizeriger Blennorrhagie und Tenesmus bei Hämorrhoidalstift.
℞. Olei Chamomillae,
— Papaveris,
singulorum unciam unam.
Vitelli Ovi no. 1.
Morphini grana duo.
Zur Stillung von Dürstzwang.

Sulphas Morphini s. Morphinæ. (Fer. GalH. Ma. T.)

℞. Morphii puri uncias quatuor.
Dissolve in Alchhole vel in Aqua destillata dilue et caute adde Acidi sulphurici Aquae pondere aequali diluti quantum sufficit ad saturandum alcali. Filtra, lente vapora et crystallisationi subjice. Gabe, von einem Viertel- bis zu einem ganzen Gran in Potion oder in Pillen.

Syrupus Sulphatis Morphii. (Fer. GalF. Ma.)

℞. Morphii sulphurici grana quatuor.
Dissolve in Aqua Acido sulphurico leviter acidulata et commisce cum Syrupi communis tepidi libra una.
Kaffeelöffelweise.

Pilulae deprimentes s. lenientes. (B.)

℞. Morphii sulphurici granum unum.
Olei Olivarum quantum sufficit ad solvendum; adde Ipecacuanhae grana tria.
Fabarum Sti. Ignatii grana duo.
Micae Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Boli lenientes s. deprimentes. (B.)

℞. Morphii sulphurici grana duo.
Olei Amygdalarum dulcium
quantum sufficit ad solvendum sal; adde Ferri sulphurici grana quatuor.
Micae Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit

Fiant holi octo. — Gabe, ein Stüd alle zwei Stunden.

℞. Morphii sulphurici granum unum.
Ipecacuanhae . . . grana tria.
Olei Amygdalarum dulcium

guttas duodecim.
Extracti Aconiti . . . grana sex.

Pulveris Liquiritiae,

Mellis,

singulorum quantum sufficit.

Fiant holi sex. — Gabe, ein Stüd alle drei Stunden.

Acetas Morphii s. Morphei s. Morphinae. (B^o. Bor4. Fer. GalH. Fi. Ma. T.)

℞. Morphii . . . quantum vis.

Dilue in Aqua destillata et adde

Acidi acetici 10^o quantum sufficit ad neutralisandum alcali. Solutio ad siccum evaporet.

Bor4. Morphii (sec. formulam Bor4.) quantum vis, Aceti concentrati Aquae destillatae quantitate aequali diluti sufficientem quantitatem ut liquor perfecte neuter appareat; qui filtratus leni igne ad siccum evaporet. Residuum in pulverem reductum caute serva; — Fi. Morphii partes quatuor, Aquae destillatae partes octo, Acidi acetici quantum sufficit; evaporent primum ad syrupi consistentiam, tunc solis vel lenis evaporatorii caloris ope, donec in massam salinam abierint, quae pulveretur; — T. Morphii grammata (danari*) sex Aquae destillatae modicam quantitatem et Aceti radicalis quantum satis ad saturandum, caeterum ut antea.

Gabe, ein Viertel- bis einen ganzen Gran.

Hierher gehören eigentlich die unter Opium (§ Auszug durch Essigsäure) angegebenen Präparate, bei welchen mehr oder weniger unreines Morphin die Basis ausmacht.

Solutio Acetatis Morphii s. Morphii acetici. (E.)

℞. Acetatis Morphii grana sedecim.

Aquae . . . drachmas sex.

Acidi acetici . . . drachmas duas.

Gabe, sechs bis vier und zwanzig Tropfen.

Guttae lenientes s. deprimentes. (Fer. GalH. Bo. Ca. E. Ma. Ra.)

℞. Morphii acetici grana sedecim.

Acidi acetici . . . guttas quatuor.

Aquae destillatae unciam unam.

Alcoholis . . . drachmam unam.

Gabe, sechs bis zwölf Tropfen, in einem übernden Kranz.

Bolus anticatarrhalis. (Ca. Pié.)

℞. Butyri Cacao drachmam unam.

Gummi Tragacanthae,

Croci,

Mellis Narbonnensis,
singulorum semidrachmam.

Extracti Liquiritiae,

Balsami Sulphuris anisati,

singulorum grana octodecim.

Extracti Hyoscyami albi grana sex.

Morphii acetici . . . grana duo.

Fiant holi triginta sex. — Gabe, ein Stüd alle zwei oder drei Stunden.

Pilulae lenientes. (B. Ca.)

℞. Morphii acetici granum unum.

Conservae Florum Aurantium

grana sedecim.

Fiant pilulae octo. — Gabe, ein oder

zwei Stüd alle sechs Stunden bei Nervenschmerzen und Krebs. Man fann bis auf

drei Gran effigsaures Morphin steigen,

muß jedoch sorgfältig den Erfolg beobachten.

(Ca.)

℞. Morphii acetici granum unum.

Digitalis purpureae grana octo.

Micae Panis,

Mellis,

singulorum quantum sufficit

ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stüd

alle zwei Stunden.

℞. Morphii acetici granum unum.

Sulphuris Antimonii aurati

grana duo.

Extracti Aconiti grana quatuor.

Pulveris Liquiritiae,

Mellis,

singulorum quantum sufficit

ut fiant pilulae octo. — Gabe, ein Stüd

alle drei Stunden. (B.)

Pilulae leviter emmenagogae deprimentes. (B.)

℞. Morphii acetici granum unum.

Olei Olivarum . . . guttas decem.

Solutioni adde

Ipecacuanhae . . . grana duo.

Extracti Hyoscyami grana quatuor.

Micae Panis,

Mellis,

singulorum quantum sufficit

ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stüd

alle drei Stunden, bei Amenorrhoe von

übermäßiger Sensibilität des Uterus.

Holi lenientes. (B.)

℞. Morphii acetici granum unum.

Olei Olivarum . . . guttas decem.

Solutioni adde

Micae Panis,

Mellis,

singulorum quantum sufficit.

Fiant holi sex. — Gabe, ein Stüd

alle zwei Stunden.

Haustus sedans narcoticus, Potio leniens. (B.)

℞. Infusi Chamomillae

uncias quinque.

*) Ein Danaro beträgt 21,67 Grana.

Extracti Lactucæ virosæ grana decem.
 Guttarum Ienientium viginti.
 Syrupi Althæae . . . semunciam.
 Allmältig zu nehmen.

Syrupus Morphii acetici. (Fer. GalF.
 GalH. Bo. Ca. Ma.)

℞. Syrupi Sacchari clarificati
 libram unam.

Morphii acetici . grana quatuor.
 Dissolve sal in Aquæ Acidî acetici
 guttis aliquot acidulatae semidrachma,
 filtra et cum syrupo tepido commisce.
 Kaffeelöffelweise.

Julep leniens s. sedans.

℞. Syrupi Morphii acetici
 unciam unam.

Infusi Hederae terrestris
 uncias quatuor.

Misce.

Emulsio sedativa simplex. (B.)

℞. Emulsionis Gummi Arabici
 uncias octo.

Syrupi Morphii acetici
 unciam unam.

Allmältig zu nehmen.

Citrus Morphini; Morphium citricum.
 (Ma. Par.)

℞. Morphii puri . grana sedecim.
 Acidi citrici crystallisati
 grana octo.

Dissolve totum in
 Aquæ destillatæ . . . uncia una.

Colora solutionem cum
 Tincturæ Coccionellæ alcoholicæ
 drachmis duabus.

Misce bene. (Ma.)

Porter hoc sal parat conterendo Opii
 crudi uncias quatuor cum Acidi citrici
 crystallisati duabus, addendo deinde
 Aquæ bullientis uncias sedecim et li-
 quorem post horas viginti quatuor ma-
 cerationis filtrando. (Par.)

Nutzen, der des essiglauren Morphins.

M o r r h u a .

Gadus Morrhuæ, L.; Stockfisch, Kas-
 beljau; Morhue (Gal.).
 Bor4. HassP.

Sin in den Nordmeeren sehr häufiger
 Fisch. (Bloch Pisc. t. 64. Berz. Bild. I.
 86. fig. 1.)

Man gebraucht den Thran, welchen man
 von der Leber dieses Fisches (Oleum Je-
 coris s. Jecoris Aselli) erhält, und wel-
 cher entweder von freien Stücken ausfließt
 und dann eine helle gelbe Farbe, eine
 etwas dickliche Consistenz, einen schwa-
 chen Fischgeruch und einen ähnlichen Ge-

schmack besitzt, oder aus der gerösteten Le-
 ber gewonnen wird und dann dunkel, un-
 durchsichtig, ersterem an Consistenz zwar
 ähnlich, aber durch den etwas brenzlichen
 Geruch und Geschmack verschieden ist. Seg-
 terer wird vorzüglich angewendet. Man
 empfiehlt ihn besonders bei hartnäckiger
 Gicht, gichtischen Contracturen zc. —
 Gabe, Löffelweise.

M O R U S .

Morus nigra, L.; Maulbeerbaum; Mû-
 rier noir (Gal.); Mulberry tree (Ang.);
 Marusse (B.); Morbaertrae (D.); Mo-
 ras (His.); Moerbezieboom (Bel.); Gelseo
 (I.); Amoreira (Lus.); Mulbaerstraed
 (Succ.).

A. Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D.
 Fer. Gal. Han. HassP. His. Li. Lon.
 LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir.
 Wür. Be. Br. C. G. M. Sp. Z.

Ein Baum (Monoecia Tetrandria, L.;
 Urticeæ, J.), welcher ursprünglich in Per-
 sien einheimisch seyn soll und in Europa
 cultivirt wird. (Blackw. t. 126. Plenck t.
 663. Schk. t. 290. Nouv. Duh. IV. t. 22.)

Man wendet die Früchte, Maulbeere-
 ren (baccae Mori), mures (Gal.), an.
 Es sind Beeren, aus vielen von dem fleischig
 und saftig gewordenen Kelche umgebenen
 und mit einander verwachsenen kleinen Kernen
 gebildet, wovon jedes einen Saamen
 enthält; sie sind eiförmig, länglich, ziemlich
 groß, schwärzlichpurpuroth und haben ein-
 nen süßen Geschmack.

Succus Mororum. (Br. Gal. His. Pal.
 Sax. Suec. Wir.)

℞. Fructuum Mori maturorum
 quantum vis.

Contritis inter manus, massam ad
 locum frigidum seponere, donec liquor
 clarus supernatet et cola exprimendo.
 Succum depuratum in lagenis longicolli-
 bus, strato olei obtectum servare.

Roob Mororum s. Succus Mororum
inspissatus. (A. B*. Br. D. GalF. Li.
 Lus. Pal. Sar. Sax. Wir. Sw. T.)

℞. Fructuum Mori maturorum
 quantum vis.

Tritis in mortario lapideo, massam
 per dies duos in cavam seponere in vase
 fictili tecto, exprime deinde fortiter,
 ad locum frigidum seponere ut succus
 subsident, qui per pannum colatus,
 sub continua agitatione ad mellis con-
 sistentiam usque evaporet. (B*. Lus.)

T. Succi haccarum ad syrupi consi-
 stentiam evaporati libram unam et Sac-
 chari albi uncias tres.

℞. Succî Mororum depurati
 partes quatuor

Sacchari albi . . . partem unam.
Coque ad mellis consistentiam. (Br. D. Li. Wir. Sw.)

Sar. Succo libras quinque et unam Mellis despumati, vel duas Succo et unam Sacchari; — Pal. Sacchari unam et quinque Succo; — A. Sacchari unam et novem Succo; — Sax. Sacchari unam et sedecim Succo; — GalF. Succo unam et Sacchari duas.

Besonders äußerlich, als austrocknendes Mittel, bei Schwämmchen,

Mel Fructuum Mororum. (His.)

℞. Succo Mororum nigrorum
libram unam.
Mellis libras duas.
Aquae quantum sufficit
Coque ad syrupi spissi consistentiam et cola.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Syrupus Mororum s. de Moris s. Mori nigrae. (Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Gal. Gen. Han. HassP. Lon. LonN. O. Pal. Pol. Wir. Wür. C. Sw. Vm.)

℞. Mororum nigrorum non penitus maturorum,
Sacchari albi,
singulorum partes aequales.

Misce leviter agitando et supra ignem lenem colloca, coque parumper et per cribrum sericeum trajice. (Gal.)

Vm. Calefacere simul jubet absque ebullitione Mororum rubrorum et Sacchari, singulorum partes aequales, massam calidam supra oribrum effundere, leviter exprimere, colare per linteum et colaturae addere Sacchari quantum satis ut syrupi consistentiam adipiscatur.

℞. Succo Mororum expressi, colati et repositione depurati
uncias sedecim.

Sacchari albi
libras duas cum dimidia.

Fiat blando calore syrupus. (Ams. Bel.)

Br. D. Pal. Wir. et Wür. Succo uncias decem, Sacchari sedecim; — An. Succo libras quatuor et sex Sacchari; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. et Ol. Succo uncias viginti et Sacchari libras tres; — Sw. Succo uncias sedecim et Sacchari libras tres; — Lon. LonN. et C. Succo octarium unum et libras duas Sacchari; — Gen. Succo sesquilibram et Sacchari libras duas cum dimidia.

Magnes sequentem agendi modum proposuit:

℞. Fructuum Mori nondum maturorum,

Baccarum Rubi paene maturorum, singulorum partes aequales.

Contunde leviter pistilli lignei ope in mortario marmoreo, immitte vasi apto argenteo cum Aquae destillatae parte quinquagesima; coque per aliquot momenta, per crinium trajice absque expressione et per duos ad tres dies seponere ut subsideant; decantha, in lagenas Succo partem circiter decimam ponderis Mororum nigrorum integrorum et bene maturorum continentes, quas obturatas et Aquae immersas per horae quadrantem calefac et remotas serva. Tunc

℞. Succo hujus depurati ac filtrati
libram unam.
Sacchari in massis libram unam
et uncias decem.

Fiat leni calore solutio extemporanea.

Vm. proposuit solvere balnei aquae ope Sacchari partes tredecim in Succo saliti octo. — Gabe, eine bis vier Unzen.

Moschus.

Bisam, Moschus; Musc (Gal.); Mušk (Ang.); Mischk (Ar. Duk. Pe.); Rutta wucła (Cy.); Desmer (D.); Almirole (His.); Kustowrie (Hin.); Muscus (Bel.); Moschio (I.); Dedes (Ja.); Jebat (Mal.); Pizmo (Pol.); Misca (Lus.); Gasturi (Sa. Tam. Tel.); Desman, Mysk (Sa.)

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Br. C. Fi. G. Par. Pid. Sa. Sp.

Ein ziemlich berber und körniger bräunlich-schwarzer Stoff von bitterem gewürzhaften Geschmack und von sehr starkem Geruch, welcher von den Wänden einer vor der Vorhaut des Moschus moschiferus, L., eines wiederäußenden Säugethieres Hien's (Schreber Säugeth. CCXLII. A. E.) liegenden Tasche abgefondert wird.

Der Moschus enthält, nach Biondeau und Guibourt, Ammoniac, Glain, Stearin, Cholesterin, ein flüchtiges Del, Gallerte, Eiweiß, eine unbestimmte Säure ic. Er zerlegt salpetersaures Silber, schwefelsaures Eisen, Kesslublimate, den Aufguß der gelben China.

Reizend, flüchtig, krampfstillend, besonders bei Hysterie, Epilepsie, Reuchhusten, Wasserfheu, Starrkrampf empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen.

Pulvis Moschi opiauis. (Au.)

℞. Moschi . . . grana triginta duo.
Opü grana quatuor.

Sacchari . . . drachmam unam.
Divide in partes duodecim. — Gabe,
stündlich oder öfter ein Stück.

Pulvis aphrodisiacus. (Pit.)

℞. Cinnamomi . . . semunciam.
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Piperis longi,
singulorum drachmam unam.
Moschi . . . scrupulum unum.
Sacchari albi . . . uncias quatuor.

Boli antispasmodici. (Bo. Ca. E. Sa. Sm. Sw.)

℞. Moschi grana decem ad quindecim.
Conservae Corticis Aurantii
semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Addere potes si necesse, Camphorae
grana octo. (Sw.)

Sa. Moschi semiscrupulum, Conservae dictae semidrachmam, et Syrupum Sacchari.

℞. Moschi . . . grana decem.
Cinnabaris . . . grana quinque.
Conservae Florum Aurantium
quantum sufficit.

Fiant unus vel duo boli. (Ca. Sm.)

℞. Moschi,
Nitri, singulorum . . . grana sex.
Camphorae . . . grana quatuor.
Conservae Valerianae
quantum sufficit.

Fiant boli quatuor. (Bo.)

Pulvis Moschi. (Sar.)

℞. Moschi . . . grana quatuor.
Sacchari Lactis . . . grana octo.
Misce. — Auf eine Gabe.

Pulvis Moschi compositus s. alexi-pharmacus sinicus s. antilyssicus Tunchinensis s. Tunquinensis. (B*. GalH. Hass. R. Wir. Wür. Au. Ca. Pid. Sp. Vm.)

℞. Moschi . . . grana sedecim.
Cinnabaris . . . grana duodecim.
Misce. (B*. Wir.) — Die Chinesen nehmen diese Gabe in einem Eßfel Brantwein als Mittel gegen die Wuth.

Sp. Moschi partem unam et duas Cinnabaris; — Piberit hat diese Formel auf folgende Weise verändert:

℞. Moschi . . . grana sedecim.
Radici Valerianae
scrupulum unum.

Camphorae . . . grana sex.
Fiat pulvis. (B*. GalH. Hass. R. Wir. Au. Ca. Pid.)

Vm. Moschi partes octo, Valerianae decem et Camphorae tres.

℞. Moschi . . . drachmam unam.
Florum Zinci
grana viginti quatuor.

Sacchari . . . drachmas duas.
Misce triturando. (Wür.)

℞. Moschi . . . grana quindecim.
Camphorae . . . grana quinque.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat bolus unus, (E.)

℞. Moschi,
Ammonii subcarbonici,
singulorum semiscrupulum.
Conservae Rosarum
quantum sufficit.
Fiat bolus unus. (E.)

Emplastrum moschatum. (Au.)

℞. Cerae albae,
Cetacei, singulorum semunciam.
Camphorae . . . semidrachmam.
Castorei,
Moschi,
singulorum scrupulum unum.

Olei Cajeput . . . guttas decem.
Liquefiant. — Gegen Zahnschmerzen.

Pilulae Moschi s. antispasmodicae s. antihystericae s. emmenagogae s. ad putredinem nosocomialem. (B*. Au. B. Ra. Sm.)

℞. Moschi . . . drachmas duas.
Florum Zinci drachmam unam.

Fiant pilulae triginta. (Ra.) — Bei allen sogenannten nervösen Krankheiten anwendbar.

℞. Moschi . . . semigranum.
Asae foetidae . . . grana duo.

Fiat pilula una. (Ra.)

Au. Moschi drachmas duas et sex Asae ut fiant pilulae granorum duorum, — Gabe, vierzig bis sechzig Stück täglich zwei Mal.

℞. Moschi . . . granum unum.
Asae foetidae,
Gummi Ammoniaci,
singulorum grana duo.

Pulveris Valerianae grana octo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat pilulae duae. (Ra.)

℞. Moschi . . . grana quindecim.
Nitri,

Asae foetidae,
singulorum scrupulos duos.

Extracti Chinae,
— Catechu,
singulorum drachmas duas.

Fiant pilulae granorum sex. (Ra.)

℞. Moschi . . . grana octo.
Ammonii subcarbonici oleosi
grana quinque.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (B*) — Nach While's Beispiel hat Bentin diese Pilula mit Erfolg gegen Sphacelus gebraucht. Dupuytren wendet die folgenden gegen Hospitaläulnis an.

℞. Camphorae grana viginti quatuor.
 Moschi grana octo.
 Extracti Opii grana duo.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Fiat massa pilularis. (Ra.)

℞. Moschi,
 Ambrae griseae,
 singulorum scrupulum unum.
 Opii purificati grana tria.
 Balsami Peruviani quantum sufficit.
 Fiant pilulae viginti quatuor. (Sm.)—

Gabe, sechs Stück täglich auf drei Mal.

℞. Moschi semisrupulum.
 Camphorae scrupulum unum.
 Gummi Ammoniaci scrupulos duos.

Opii purificati grana quatuor.
 Fiant pilulae granorum quatuor. (Sm.)

— Gabe, drei oder vier Stück täglich, bei
 Hysterie und Hypochondrie.

℞. Moschi grana viginti quatuor.
 Extracti Opii grana duodecim.

— Valerianae grana viginti quatuor.
 Fiant pilulae sedecim. (Ra.)

℞. Moschi grana duodecim.
 Roob Juniperi quantum sufficit.

Fiant pilulae novem. — Gabe,
 stündlich ein Stück. (B.)

℞. Moschi grana octo.
 Salis volatilis Cornu Cervi grana quinque.

Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit.

Fiat pilula una. (Au.)

℞. Extracti Myrrhae aquosi drachmam unam.

— Aloës aquosi semidrachmam.

Camphorae grana decem.
 Moschi grana viginti.

Balsami Peruviani quantum sufficit.
 Fiant pilulae. (Pie.) — Barthéz

verordnete sie als emmenagogisch, zu vier
 und zwanzig Gran täglich, auf drei Mal,
 mit Hautentzündung.

℞. Radicis Colombo semidrachmam.
 Kali subcarbopici scrupulum unum.

Extracti Opii gummosi grana duo.

— Hyoscyami albi,
 Ambrae griseae,
 singulorum grana sex.

Moschi grana quatuor.
 Olei essentialis Menthae scrupulum unum.

Syrupi Florum Aurantii quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti quinque. (Bo.)

— Gabe, drei Stück alle zwei Stunden.

Tabellae aphrodisiacae s. vitae. (Co.
 Pie Sm.)

℞. Confectionis Alchermes drachmas duas.

Ambrae griseae,
 Moschi,
 singulorum drachmam unam.

Sacchari libram unam.

Fiant tabellae ponderis scrupuli unius.

— Gabe, drei Stück täglich auf drei Mal.

Diese Tafelchen können Gefähr bringen,
 besonders wenn sie außerdem Canthariden-
 pulver enthalten.

Globuli moschati. (Br. Ful. Li. Pal.
 Wir. Sp.)

℞. Sacchari albi uncias sex.
 Amyli drachmas duas.

Iridis Florentinae drachmam unam.
 Moschi grana duo.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant globuli diversae magnitudinis
 ab illa seminis pisi ad illam globuli

sclopetae usque. — Si massae Laccae
 pictoriae unciam dimidiam addas, ha-
 bes Globulos moschatos rubros. (Wir.)

Man gebrauchte sie ehemals als Stuhlkräpchen.

Trochisci Galliae moschatae s. aliptae
 moschatae s. moschati. (Wir.)

℞. Ambrae griseae drachmas tres.
 Ligni Aloës, drachmas quinque.

Moschi drachmam unam.
 Sacchari albi unciam unam.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit

ut fiant trochisci. — Man setzt sie Pul-
 vern und andern Präparaten als Aroma-
 hinzu.

℞. Storacis Calamita uncias quatuor.
 Ladani,

Benzoës, singulorum unciam unam.

Ligni Aloës drachmas sex.

Sacchari albi sesquiunciam.

Moschi scrupulum unum.

Ambrae griseae drachmam unam.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae cum Aqua Rosarum paratae

quantum sat s.

Fiant trochisci. — Man wendet sie
 nur zu Räucherungen an; ehemals gab man
 sie auch gegen Asthma, bei Kindern zu ei-
 nem, zwei oder drei Gran.

Trochisci Mogolici. (Ca.)

℞. Sacchari uncias tres cum dimidia.
 Gummi Arabici unciam unam.

Extracti Opii sicci drachmas septem.

Caryophyllorum,
 Macidis,
 Nucis moschatae, singulorum drach-
 mas duas cum dimidia.

Moschi grana quinque.

Aquae Rosarum quantum sufficit.
 Fiant trochisci granorum sex. — Rei-
 zend, magenstärkend. — Gabe, zwei Stück
 Abends bei'm Schlafengehen.

Lapis de Goa. (Wir.)

℞. Corallii albi,
 — rubri,
 Bezoar orientalis,
 singulorum unciam unam.
 Margaritarum orientalium,
 Hyacinthi praeparati,
 Topazii,
 Sapphiri,
 Rubini, singulorum semunciam.
 Smaragdi,
 Moschi,
 Ambrae griseae,
 singulorum drachmas duas.
 Foliorum Auri no. 40.
 Gelatinae Cornu Cervi

quantum sufficit
 ut fiat pasta, in globulos ovals for-
 manda, qui siccati poliendo nitentes
 reddantur.

Dieses lächerliche Präparat kam aus In-
 dien und wurde von den Jesuiten einige
 Zeit lang geheim gehalten; es sollte gegen
 Krämpfe und Epilepsie wirksam seyn. —
 Gabe, von einem halben bis zu einem gan-
 zen Scrupel und bis zur halben Drachme.

*Mixtura moschata s. Moschi, Jula-
 ptum Moschi s. moschatum s. antihy-
 stericum, Potio antispasmodica. (Am.
 B*. Han. His. Lon. LonN. Lus. Au. B.
 Br. C. Ca. E. Pie. Ra. Sa. Sw.)*

℞. Moschi grana duodecim.
 Sacchari drachmas duas.
 Aquae uncias duas.
 Misc. (Ra.)

Han. Moschi grana duodecim, Sac-
 chari drachmam unam et Aquae Rosa-
 rum uncias sex.

℞. Moschi scrupulos duos.
 Aquae Rosarum uncias sex.
 Gummi Arabici,
 Sacchari albi,

singulorum drachmam unam.

Tritura moschum cum saccharo, de-
 inde cum gummi et aquam sensim ad-
 de. (Am. B*. Lus. Br. C. E.)

Lon. LonN. Moschi drachmam unam,
 Sacchari, Gummi Arabici, singulorum
 tantidem et Aquae Rosarum uncias sex.

℞. Moschi scrupulos duos.
 Gummi Arabici in Aqua dissoluti
 drachmam unam.

Spiritus Juniperi compositi
 unciam unam.

Syrupi Sacchari drachmas tres.
 Aquae Menthae viridis

uncias quinque.

Misce. (Sw.)

Sa. Moschi scrupulos duos, Mucila-
 ginis drachmam unam, Spiritus Juni-
 peri compositi semunciam, Syrupi drach-

mas tres et Aquae Pulegii uncias quin-
 que.

℞. Camphorae semidrachmam.
 Moschi grana viginti quinque.
 Sacchari albi,
 Mucilaginis Gummi Tragaeanthae,
 singulorum drachmam unam.

Aceti semunciam.
 Aquae Lactucae uncias sex.
 Syrupi Limonum unciam unam.

Misce. (Pie.)

℞. Moschi grana sex.
 Sacchari drachmam unam.

Contere et adde

Aquae Rosarum,

— Melissa,

singulorum uncias duas.

Syrupi Aetheris unciam unam.

Misce bene. (Pie.)

℞. Aquae Rosarum uncias sex.
 — Cinnamom. hordeatae,

— Paeoniae compositae,

Syrupi Dianthi,

singulorum uncias duas.

Aquae Florum Aurantiorum

unciam unam.

Confectionis Alchermes

drachmam unam.

Croci scrupulum unum.

Moschi,

Ambrae griseae,

Ammonii subcarbonici,

singulorum grana duo.

Essentiae Caryophyllorum

guttam unam.

Misce. (Ca. Pie.)

℞. Florum Aurantii,

Caryophyllorum,

Croci,

singulorum scrupulum unum.

Aquae libram unam.

Infunde per horam unam et colatu-
 rae adde

Moschi,

Ambrae griseae,

singulorum grana duo.

Ammonii subcarbonici

granum unum.

Confectionis Alchermes

drachmas duas.

Syrupi Sacchari sesquiunciam.

Misce bene. (His.)

℞. Camphorae drachmas duas.

Moschi scrupulum unum.

Salis volatilis Cornu Cervi

grana sedecim.

Syrupi Corticum Aurantiorum

unciam unam.

Aquae Citri uncias tres.

Stündlich lösselweise zu nehmen. (B.)

℞. Aquae Menthae piperitae,

— Citri,

singulorum uncias duas.

- Moschi grana octo.
Liquoris Hoffmanni,
Spiritus Cornu Cervi succinati,
singulorum semidrachmam.
Laudani Sydenhami guttas viginti.
Allmälig zu nehmen. (B.)
- ℞. Moschi grana duodecim.
Aque Menthae piperitae
uncias tres.
Syrupi Corticum Aurantium
unciam unam.
Gabe, stündlich ein Kaffeelöffel. (B.)
- ℞. Aque Melissae,
— Cinnamomi,
singularum uncias duas.
Camphorae scrupulum unum.
Moschi,
Salis volatilii Cornu Cervi,
singulorum grana quindecim.
Syrupi Narcotini unciam unam.
Allmälig zu nehmen. (B.)
- ℞. Moschi scrupulum unum.
Sacchari albi drachmas duas.
Mucilaginis Gummi Arabici
semunciam.
Aque Cinnamomi,
— Menthae piperitae,
singularum uncias duas.
— aromaticae drachmas duas.
Eßfelweise zu nehmen. (Au.)
- ℞. Moschi scrupulum unum.
Sacchari drachmam unam.
Aque Rosarum uncias octo.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Olei Cajeput guttas viginti.
Eßfelweise zu nehmen. (Au.)
- ℞. Moschi grana sex.
Sacchari drachmam unam.
Liquoris Ammonii succinici
guttas sexaginta.
Laudani Sydenhami guttas viginti.
Aque Florum Sambuci
uncias quinque.
Syrupi Amygdalarum unciam unam.
Stündlich löffelweise zu nehmen. (Au.)
- Clyster s. *Enema antispasmodicum.* (E.
Pie. Sw.)
- ℞. Moschi grana duodecim.
Sacchari scrupulos duos.
Gummi Arabici sesquiscrupulum.
Ammoniaci liquidi guttas triginta.
Aque Seminis Lini uncias quatuor.
Misce. (E.)
- ℞. Infusi Valerianae uncias quatuor.
Moschi drachmam unam.
Misce et adde, si necesse est, Tincturae sedativae guttas quadraginta ad sexaginta. (Pie. Sw.)
- Oleum Moschi.* (T.)
- ℞. Moschi uncias duas.
Olei Olivarum libram unam.

Macera calore 25—30° Cent. in lagenae vitrea, filtra leviter exprimendo, et sepositione in vase clauso clarificatum post dies aliquot decantha.

Tinctura Moschi vinosa. (B*.)

℞. Moschi pulverati unciam unam.
Vini Hispanici uncias sex.
Tritura moschum cum una uncia vini ad dissolutionem usque, adde inde liquoris quod restat et post macerationem per horas viginti quatuor in lagenae bene obturata filtra.
Krampfstillenb.

Tinctura s. Essentia Moschi s. moschata. (Am. B* Bor4. DD. Du. Gal. Han. HassP. RC. C. T.)

℞. Moschi partem unam.
Alcoholis partes quatuor.
Post sex dies digestionis filtra. (DD. Gal.)

Am. B*. Du. et C. Moschi drachmas duas, Alcoholis (0,930) octarium unum et octo dies digestionis; — Han. Moschi drachmas duas et Spiritus rectificati uncias octo; — Bor4. Moschi drachmam unam, Spiritus Vini alcoholisati uncias sex et digestionem per octiduum; — HassP. Moschi drachmam unam, Spiritus Vini rectificati unciam unam, macera per septimanam; pondus tincturae filtratae unciam unam aequet; — T. Moschi scrupulos quatuor, Alcoholis 30° B. uncias duas; — RC. Moschi drachmas duas, Alcoholis libram unam.

Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen täglich mehrmals.

Tinctura Moschi aetherea. (Gal.)

℞. Moschi drachmas duas.
Aetheris sulphurici (46°)
unciam unam.

Macera per duos dies et liquorem alio vasi infunde.

Balsamum Lectorense s. de Lectour s. de Vinceguère s. de Condom. (Sp.)

℞. Camphorae,
Croci, singulorum drachmam unam.
Moschi,
Ambrae,
singulorum semidrachmam.
Petrolei albi,
Olei essentialis Lavandulae,
— — Terebinthinae,
— — baccarum Juniperi,
— — Caryophyllorum,
singulorum unciam unam.
— — Macidis,
— — Nucis moschatae,
singulorum drachmas duas.

Olei essentialis Benzoes

semunciam.

Infunde et oleum si requiritur, decantha.

Schmerzstillend, nervenstärkend, balsamisch.

Pulvis sternutatorius albus, Oleosaccharum cephalicum. (Wir.)

R. Sacchari albi . uncias duodecim.

Ambrae griseae,

Moschi, singulorum semiscrupulum.

Olei essentialis Cinnamomi,

— — Caryophyllorum, singulorum guttas quindecim

— — Anisi,

— — Rorismarini,

— — Lavandulae,

— — Majoranae, singulorum Femidrachmam.

— — Ligni Rhodii,

— — Succini,

singulorum scrupulum unum.

Dissolve ambram in oleis et moschum in Olei Rosarum parva quantitate, tunc omnia cum saccharo commisce.

R. Olei essentialis Majoranae,

— — Caryophyllorum,

— — Ligni Rhodii, singulorum guttas tres.

— — Cinnamomi,

— — Citri,

— — Feniculi,

— — Lavandulae,

singulorum guttas duas.

Moschi grana tria.

Sacchari albi uncias tres cum dimidia.

Misce exacte. —

Als Niesemittel, so wie bei krampfhaften Affectionen und Schlingen der Zunge angewendet. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Mungos.

Ophiorrhiza Mungos, L.; Indische Schlangenzunge; Mungos (Gal.); Indian snake root (Ang.); Mendi, Wal eka-weriya (Cy.); Slangenrod (D.); Ra z de serpente (His.); Ostindische Schlangenzunge (Bel.); Radice di serpe (I.); Kajo ular (Jav.); Colubrina (Lus.); Orinrot (Succ.).

R. His. Wir. A. M. Sp.

♀ (Pentandria Monogynia, L.; Gentianeae, J.) Eine Indische Pflanze. (Plech. Pl. med. t. 90.)

Man wendet die Wurzel (radix Mungos s. serpentum) an; sie ist einfach, gemundet, geringelt, hat eine runzlige, poröse Rinde und keinen Geruch, aber einen sehr bitteren Geschmack.

Ehemals betrachtete man sie als speci-

ficum gegen den Biss giftiger Thiere und demnach als ein Gegengift.

Muscari.

Muscari ambrosiacum; *Muscari odorant*; *Muscari Jaointhe musquée* (Gal.); *Muskeerende hyacinth* (Bel.);

A. Fer.

♀ (Hexandria Monogynia, L.; Asphodeleae, J.) Eine in der Levante einheimische Pflanze. (Kniph. Bot. orig. cent. 10. t. 52.)

Die Wurzel, welche man anwendet, ist dick und bitter. Sie gilt für ein Brechmittel.

Myristica.

Myristica aromatica, Mur.; *Muscatabaum*; *Muscadier* (Gal.).

Ein Baum (Dioecia Monadelphia, L.; Myristiceae; Cand.), welcher auf den Moluden wächst. (Blackw. t. 353. Plenk. t. 425. Lam. Ill. t. 332. 333. Hayne IX. 12. Fl. méd. VI. 242.)

Man wendet den Saamen und dessen Umschlag (arillus) an.

Der Saame führt den Namen *Nux moschata* s. *Myristica*; *Muscatanuß*; *Noix muscade* (Gal.); *Nutmeg* (Ang.); *Jowzalte* (Ar.); *Musskatowakulka* (B.); *Bu-wah-pa* (Ba.); *Jayaphala* (C.); *Jatipullum*, *Sadikka* (Cy.); *Murkad* (D.); *Japhul* (Duk.); *Nuez de especia* (His.); *Jajphul* (Hin.); *Nooten moskaat* (Bel.); *Noce moscada* (I.); *Wohpala* (Jav.); *Japhul* (Mah.); *Buahpala* (Mal.); *Noz moscada* (Lus.); *Jatiphala* (Sa.); *Muskot* (Succ.); *Jadikai* (Tam.); *Jajikaia* (Tel.); *Gasori* (Tern.)

A. Am. An. B. Ba., Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sax. Succ. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.

Ein eirundblättriger, etwas abgerundeter, mit einem röthlichen Fleckchen bedeckter, weißlicher, an der Spitze mit braunen Punkten besprengter Kern, welcher ein weißes, öliges Fleisch besitzt. Er steckt in einer harten, dünnen, braunen oder schwärzlichen, zerbrechlichen, überall unregelmäßig gefurchten Schale. Der Geruch ist sehr angenehm, der Geschmack brennend, gewürzhaft und etwas fettig.

Der Umschlag oder die zwischen der Rinde und der Schale liegende Hülle

Macis s. *Floris Macidis*; *Muscatablütthen*; *Macis*, *Fleurs de muscade* (Gal.); *Mace* (Ang.); *Talzuffur* (Ar.); *Bunga*

pala (Ba.); Wassawasie (Cy.); Jawatrie (Duk. Hin.); Macias (His.); Kambang pala (Ja.); Bunga hua pala (Mal.); Bez-haz (Pe.); Flor de noamoscida (Lus.); Jadiputrie (Tam.); Japatr (Tel).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. H's. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. A. Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sa. Sp.

ist eine lappige, gleichsam netzartige, dünne, knorpelige, halbdurchsichtige, safrangelbe Haut von mustatnaufähnlichem Geruch und Geschmack

Ein kräftiges Reizmittel, welches aber mehr in der Küche als in der Medicin angewendet wird. — Gabe des Pulvers, zehn Gran bis ein Scrupel. Die Mustatblüthen sind weit weniger wirksam als die Ruzf.

Pulvis antihectico-scrophulosus s. ex baccis Lauri compositus s. Nucum moschatarum compositus. (B*.)

℞. Pulveris Nucis moschatae,
— Baccarum Lauri tostarum,
— Cornu Cervi calcinati,
singulorum unciam unam.
— Radicis Liquiritiae
uncias tres.

Gabe, ein halber Kaffeelöffel, zweimal täglich, für Kinder von einem Jahre, zweimal und vierjährigen einen ganzen Löffel.

Bolus aromaticus. (Sa.)

℞. Nucis moschatae scrupulum unum.
Diascordii . . . scrupulos duos.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.
Misce bene.

Spiritus Nucis moschatae s. Myristicae aromatica. (Ed. Du. Li. Lon. LonN. C)

℞. Nucis moschatae . . . uncias duas.
Aquae Vitae
libras novem (congium).
Post duos dies (unum Lon.) macerationis adde

Aquae . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent librae novem (congius). (Du. Ed. Lon. C)

Li. Nucis uncias duas, Alcoholis libras quatuor, Aquae tantidem et horas viginti quatuor macerationis; destillent librae quatuor.

Spiritus Nucis moschatae compositus. (Vm.)

℞. Nucis moschatae . . . partes duas.
Corticis Citri,
— Aurantii,
Melissae,

Menthae crispae,
singulorum partem unam.

Aquae Vitae
partes sexaginta quatuor.
— purae partes centum novaginta duas.

Destillent partes octoginta.

Aqua aromatica spiritiuosa. (Ful.)

℞. Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
Corticis Aurantii,
Zingiberis,
Kali subcarbonici,
singulorum unciam unam.
Aquae Vitae libras sex.
— purae libras duas.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent in balneo aquae Librae quatuor.

Reizend, krampfstillend, blähungtreibend, magenstärkend. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen.

Syrupus Nucistae. (Wir.)

℞. Nucis moschatae pulveratae
uncias duas.
Vini Burgundici . . . libram unam.
Digere in vase tecto per dies tres, cola exprimendo et in colatura solve Sacchari albi . . . uncias sedecim.
Blähungtreibend, magenstärkend.

Syrupus Macidis. (T.)

Ut syrupus Cinnamomi paratur.

Tinctura s. Essentia Macidis s. Macis. (Br. Han. HassP. Pal. Sax. T.)

℞. Macidis partem unam.
Spiritus Vini rectificati
partes decem.

Digere blando calore per dies octo, cola exprimendo et filtra. (Sax.)

Br. Macidis partes tres et Spiritus sedecim; — Han. Macidis uncias quinque et Spiritus libras duas; — HassP. T. Macidis uncias quatuor, Spiritus libras duas.

℞. Macidis uncias quatuor.
Liquoris Kali subcarbonici
uncias duas.

Digere ad completam desiccationem usque, residuo infunde

Spiritus Vini rectificati libras duas.

Post sufficientem digestionem destillent in balneo arenae, pluribus vicibus cohobentur nec unquam ad siccum destillata; productum infunde supra

Macidis quantitatem arbitrariam.

Post aliquot tempus filtra. (Pal.)
Reizend, magenstärkend, auf den Uterus und gegen Kollik wirkend. — Gabe, breiszig Tropfen und mehr.

Oleum Nucistae s. Nucis moschatae,
Oleum aethereo-pingue nucleorum My-

risticae moschatae, Oleum s. Balsamum Nucistae expressum.

1) Wie man es im Handel findet: (Bor4. D. Du. HassP. Lon. LonN. O. Wir.)

2) Eigens bereitet. (A. Ba. Bor. Br. D. Fer. Ful. Gal. Hass. His. O. Pal. Sax. Wir. Br. Pid. Sw. T. Vm.)

℞. Nucis moschatae raspatae

quantum vis.

Tritura in mortario marmoreo calefacto ut fiat pasta mollis, quam sacco et crinibus confecto inter duas laminas stanneas calidas comprime; oleum defunde et per linteum trajice. (Fer. His. T. Vm.)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo leviter calefacto, tum sacco et crine confecto inclusam, vapori aquae bullientis expone, prelo submitte inter laminas stanneas calefactas et oleum super igne liqua. (Ba. Bor. Br. D. Ful. Hass. O. Pal. Wir. Br. Pid. Sw.)

℞. Nucis Moschatae quantum vis.

Contunde lente in mortario, tere deinde supra lapidem calefactum, coque in Aqua, donec oleum supernatet, quod refrigeratione concretum collige. (Gal)

Reizend, magenstärkend, schmerzstillend, tramsfroidrig, blähungtreibend. — Gabe, ein oder zwei Gran für Kinder, anderthalb Scrupel für Erwachsene.

Oleum Nucistae aethereum, Aethere-oleum Nucistae. (An. Br. Hass. His. Pal. R. Sax. Wür. Br. Pid. T. Vm.)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.

Aquae . . . quantum sufficit.
Post tres dies infusionis destillent et oleum separetur. (R. (Br.)

Wür. Nucis partem unam, et quatuor Aquae; — Vm. Nucis unam et octo Aquae; — An. Nucis tres et decem Aquae; — His. Nucis unam et quadraginta Aquae; — Sar. Nucis libram unam, Aquae octo et Salis uncias tres; — Br. Hass. Pal. et Pid. Nucis libram unam, Aquae octo et uncias duas Salis; — T. ut oleum Coriandri.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Oleum Macidis aethereum, Aethere-oleum Macidis. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Pal. Pol. R. Sax. Wir. Wür. T. Vm.)

℞. Macidis . . . quantum vis.

Aquae purae . . . quantum sufficit.
Post sufficientem infusionem destillent. (R.)

Sax. et Wür. Macidis partem unam et quatuor Aquae; — D. et Ful. Ma-

cidis unam et Aquae sex; — Bor. Han. et Pal. Macidis unam et octo Aquae; — Ba. Macidis unam et Aquae novem; — Vm. Macidis unam et decem Aquae; — Pal. et Wir. Macidis libras duas, Aquae sedecim et Salis uncias quatuor; — Bor4. oleum venale; — HassP. Macidis, Salis, singulorum libras duas, Aquae sedecim; post macerationem per horas duodecim destillentur; — T. ut oleum Cinnamomi l. 385.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Elaeosaccharum s. Olcosaccharum Macidis. (Br. HassP. Pal. Wir.)

℞. Olei essentialis Macidis

guttas sedecim.

Sacchari albi . . . unciam unam.

Tritura exacte.

HassP. Sacchari drachmas duas, Olei Macidis guttas quatuor.

Balsamum Nucistae. (Br. Sax. Wir.)

℞. Olei Nucis moschatae expressi drachmas duas.

— essentialis Nucis moschatae scrupulos duos.

Commisce triturando.

Magensstärkend, Kopf- und nervenstärkend.

Mixtura contra diarrhoeam s. antidiarrhoeica. (Pie.)

℞. Balsami Nucistae drachmam unam, Theriacae . . . drachmas duas. Olei essentialis Cumini guttas sex. Auf die Nabelgegend, dem Magenpflaster ähnlich, aufzulegen.

Linimentum excitans. (B*.)

℞. Olei essentialis nucis moschatae, — Caryophyllorum, singulorum semidrachmam. Spiritus Juniperi . . . uncias duas.

Sparadrap ad corpus conditum involvendum. (Sp.)

℞. Cerae albae uncias centum viginti octo. Liguatae et semirefrigeratae adde Olei Nucis moschatae expressi uncias octo.

— essentialis Citri,
— — Neroli,
— — Lavandulae,
— — Thymi,
singulorum uncias quatuor.

Ambrae griseae grana quindecim.

Moschi grana octo.

Zibethi grana quatuor.

Mixturam supra linteum extende.

Myrobalanus.

Myrobalani; Myrobalanen; Myrobalan (Gal.).

Br. Gal. His. Wir. Br. G. M. Sp.

Man nennt so vier verschiedene Arten von Früchten:

1) *Myrobalani belliricae*; Bellirische Myrobalanen; *Myrobalans bellirica* (Gal.); *Beyleluj* (Ar.); *Bullu* (Cy.); *Bulla* (Duk.); *Mirobalanos belliricos* (His.); *Beheyra* (Hin.); *Beyleleh* (Pe.); *Bahira* (Sa.); *Tanikai* (Tain.).

Es sind eirunde, fast kugelige, olivengroße, dunkelgraulichgelbe Steinfrüchte mit fünf unbedeutlichen Rippen, welche einen knöchigen, dicken, fünfseitigen, unregelmäßigen, am Grunde breiten und stumpfen, oben spitzigen Kern enthalten.

Sie kommen von *Myrobalanus bellirica*, Gärtin. (Decandria Monogynia, L.; *Myrobalanaceae*, J.), einem Ostindischen Baume. (Roxb. Corom. t. 198)

2) *Myrobalani chebulae*; große schwarzbraune Myrobalanen; *Myroholans chebules* (Gal.); *Helelije kahuli* (Ar.); *Aralu* (Cy.); *Huldah* (Duk.); *Mirobolanos quebulos* (His.); *Har, Hara* (Hin.); *Helileh kelan* (Pe.); *Haritaka* (Sa.); *Kadukai* (Tam.); *Carakaia* (Tel.).

Es sind eirundlängliche, an beiden Enden dünnere, schwärzlichbraune, mit fünf Furchen, welche mit eben so viel Rippen abwechseln, versehene Steinfrüchte, welche unter einem harten, brüchigen, harzglänzenden Fleische einen knöchigen, fünfseitigen Kern und in demselben einen eirunden länglichen, spitzigen Saamen enthält.

Myrobalani indicae s. nigrae; Indische Myrobalanen; *Myrobalans indiques* (Gal.); *Myrobalanos indicos* (His.);

werden diese Früchte genannt, wenn sie weniger vorgerückt, schon vor der vollkommenen Reife eintrocknen, und wahrscheinlich von irgend einem Insect gestochen sind. Sie sind nussgroß, dunkelschwarz, hart, dorb und zeigen kaum eine Spur von Kern, an dessen Stelle man eine kleine Höhle bemerkt. Ihr Geschmack ist bitter und abstringierend.

Diese Früchte kommen von *Myrobalanus Chebula*, Gärtin., einem Ostindischen Baume. (Gärtin. de fruct. et sem. 1. t. 97. Lamk. Enc. méth. t. 849. f. 4.)

3) *Myrobalani citrinae s. flavae*; gelbe Myrobalanen; *Myrobalanos citrins* (Gal.); *Mirobalanos citrinos* (His.)

Es sind längliche, eiförmige, etwas birnenförmige, blaßgelbe, sehr verschiedenedige und zwischen den Ecken runzlige Steinfrüchte, gleichen inwendig den vorigen sehr, sind aber nur eine Spielart davon.

Sie kommen von *Myrobalanus citrina*, Gärtin., einem Baume Ostindien's. (Lamk. Enc. méth. t. 849.)

4) *Myrobalani emblicae*; aschfarbene Myrobalanen; *Myrobalans emblics* (Gal.); *Pharmacopoea universalis*. II.

Hac min-san, *Cay-houng-ngot* (Co.); *Awusadanelli* (Cy.); *Aunla* (Cy.); *Mirobalanos emblicos* (His.); *Anola*, *Atulej*, *Aunwerd*, *Aongra* (Hin.); *Amleh* (Pe.); *Amalaka* (Sa.); *Nelli kai* (Tain.); *Wusoherikaia* (Tel.).

Es sind beerenförmige dreifknöpfige, runde Kapseln von der Größe eines großen Gallapfels, schwärzlichgrau, mit sechs außen in Rippen erhobenen Klappen und welche inwendig ein breiiges Fleisch mit weißlichen, eckigen Saamen enthalten. Sie besitzen einen sauren und abstringirenden Geschmack.

Sie kommen von *Phyllanthus emblica* (Monoecia Triandra, L.; *Euphorbiaceae*, J.), einem Baume Malabar's. (Rhedede Mal. I. 31. Blackw. t. 400. 401. Plenck t. 659.)

Alle diese Früchte sind heutzutage nicht mehr in Gebrauch; ehemals wurden sie den Purgirmitteln beigezählt. — Gabe des Pulvers, von einer halben Drachme bis zu einer halben Unze.

Myrrha.

Gummi Myrrhae, *Myrrha rubra*; *Zuñova*; *Murrhe*, *Myrrhengummi*, *Myrrhenschleimharz*; *Myrrhe* (Gal); *Myrrh* (Ang.); *Murr* (Ar.); *Madu* (Ba.); *Myrrcha* (H.); *Myrrho* (D.); *Hira bol* (Duk.); *Mirra* (His. I.); *Bol* (Hin.); *Madu* (Jav.); *Manisan lebah* (Mal.); *Mirra* (Pol.); *Myrrha* (Lus.); *Vola* (Sa.); *Myrra* (Suec.); *Valatipolum*, *Palendra holum*, *Villey holum* (Tam); *Balintra holum* (Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. I. u. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. tr. C. Fi. G. M. Par. Pid. Pa. Sp. T. Z.

In Rörnern, deren Farbe vom Braungelben zum Rothem abwechselte, halbdurchsichtig, leicht bröckelnd, mit harzigem Bruch, von angenehmem Geruch und bitterem, etwas gewürzhaftem Geschmack.

Es ist der verdickte Saft, welcher auf Einschnitte aus einer auf der Ostküste Afri- ca's wachsenden Pflanze, welche nach Forsk. eine Art *Amyris* (*Amyris Katak*, Forsk.), nach Bruce eine Art *Mimosa* ist, ausfließt.

Tonisch, aufregend. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer Drachme.

Extractum Myrrhae gummosum s. aquosum. (A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. Fi. Pid. U. Vm.)

R. *Myrrhae electae*, partem unam.

Aquae purae . . partes quatuor.
 Digere in loco calido et vase tecto, tunc sepone ad locum frigidum per horas viginti quatuor; decantha, cola et leni igne ad aptam consistentiam consume. (A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. O. Pol. Sax.)

Br. et Vm. Myrrhae partem unam et octo Aquae; — Fer. Ful. Hass. Li. Wir. et Pid. Myrrhae unam et Aquae sex; — Gal. Singulorum amborum quantum sufficit; — Fi. T. Myrrhae uncias sex, Aquae bullientis libras tres, digestionem leni balnei vaporis calore, duorum dierum sepositionem, decantationem et evaporationem ad extracti consistentiam; — HassP. Myrrhae partem unam, Aquae duodecim.

℞. Myrrhae,
 Limaturae Ligni,
 singularum partem unam.

Mixtas coque cum Aquae pondere earum aequali; submitte deinde prelo de Real et quod proluit, ad extracti consistentiam usque inspissa. (Vm.)

℞. Myrrhae electae . . quantum vis.

Pulveratam bis, cum Aquae partibus quatuor quaque vice, contere; emulsionem commisce et lente, agitando continue, vaporando ad extracti consistentiam consume. (Vm.)

℞. Myrrhae electae . . semilibram.
 Liquoris Kali subcarbonici
 unciam unam.

Misce bene cum spathula lignea et sepone in cavam, per dies quatuordecim; tunc massae infunde Aquam calidam et agitatum sepone; liquorem decantha; residuo novam Aquam calidam infunde, donec non amplius coloretur; colaturae commixtae lente ad extracti consistentiam evaporent. (O. Pal. Sar. Wir.)

Gabe, vier bis zehn Gran täglich mehrmals.

Extractum Myrrhae resinatum. (Sar.)

℞. Myrrhae electae . . quantum vis.
 Tracta cum Alchhole rectificato, tincturam cola, destilla alchholem in aquae balneo et residuum ad extracti consistentiam consume.

Extractum Myrrhae graminatum s. compositum. (Sw*.)

℞. Myrrhae electae . . uncias duas.
 Gummi Arabici . . drachmas duas.

Pulverata cum Aquae sufficiente quantitate in emulsionem redige et in hoc liquore solve

Extracti Graminis uncias quatuor.

Bei Lungenschwindsucht und Gebärmuttergeschwüren empfohlen. — Gabe, eine

bis zwei Drachmen in Wasser, zwei oder drei Mal täglich.

Saccharum Myrrhae s. myrrhatum, Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Myrrhae. (B*. Ful. Li. Wür. Au. Pid. Sp.)

℞. Extracti Myrrhae gummosi
 partem unam.

Sacchari albi . . partes quatuor.

Misce exacte. (Ful. Wür. Pid.)

B*. et Sp. Extracti partem unam et Sacchari albi octo; — Li. Extracti unam et Sacchari Lactis quatuor; — Au. Extracti unam et tres Sacchari Lactis.

Wagenstärtend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis Myrrhae compositus, Pulvis ad ulcera tendinum s. emmenagogus s. balsamicus. (Ams. B. Lus. Au. Bo. Sw.)

℞. Myrrhae,
 Mastichis,
 singularum partes aequales.

Misce ut fiat pulvis. (Sw.) — Bei Knochenfraß und Entzündung der Sehnen. Eine gesunde chirurgische Praxis verwirft es.

℞. Myrrhae semunciam.

Opopanacis,
 Sagapeni,
 Castorei,
 singularum drachmas duas.

Olei Menthae,
 — Rutae,
 singularum guttas quatuor.

Fiat pulvis. (Ams. B.) — Diese Formel hat viel Ähnlichkeit mit der zu den Trochisci Myrrhae.

℞. Myrrhae,
 Sabiniae,
 Rutae,
 Castorei, singularum unciam unam.

Pulverata misce. (Lus.)

℞. Myrrhae semidrachmam.

Olibani,
 Mastichis,
 singularum drachmam unam.

Sarcocollae drachmas duas.

Colophonii semunciam.

Fiat pulvis. (Bo.)

℞. Myrrhae grana duodecim.
 Croci grana tria.
 Olei Caryophyllorum
 guttam unam.

Fiat pulvis. (Au.)

℞. Boracis grana quindecim.

Myrrhae,
 Sabiniae, singularum grana quinque.

Croci grana tria.

Castorei grana duo.

Olei Succini guttam unam.

Fiat pulvis. (Au.)

℞. Myrrhae grana duo.

Florum Sulphuris grana quinque.
 Sacchari albi . . . grana decem.
 Alle zwei Stunden zu nehmen. (Au.)
 ℞. Extracti Myrrhae aquosi
 — Opii . . . semigranum.
 Sacchari albi . . . grana decem.
 Alle zwei Stunden zu nehmen. (Au.)
 ℞. Extracti Myrrhae aquosi
 — Digitalis purpureae,
 — Hyoscyami,
 singulorum semigranum
 Sacchari Lactis . . . grana decem.
 Alle drei Stunden zu nehmen. (An.)
 Diese Pulver werden äußerlich zur Stillung von Blutflüssen angewendet, innerlich als emmenagoga oder gegen chronische Brustleiden, besonders Schleimchwindsucht.
Sperniola Crollii. (Pal. Wir.)
 ℞. Myrrhae electae,
 Olibani, singulorum drachmas duas.
 Croci . . . semidrachmam
 Fiat pulvis subtilissimus, cui bis terve Aqua destillata seminis ranae adsperso et tunc siccato in fine adde
 Camphorae . . . drachmas tres.
 Misce. (Wir.)
 Pal. vices vel trices Aquâ Ranorum imbibere jubet.
 Abstringend, gegen Blutflüsse zu gebrauchen.
Bolÿ Myrrhae. (Sa.)
 ℞. Pulveris Myrrhae,
 Conservae Aurantiorum,
 singulorum scrupulum unum.
 Salis Absinthii drachmas quinque.
 Syrupi simplicis quantum sufficit.
 Fiat massa.
 ℞. Cetacei . . . scrupulos duos.
 Myrrhae . . . scrupulum unum.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Misce sedulo.
Pilulae balsamicae. (Ful. Ham. Li.)
 ℞. Extracti Rhei compositi
 — Myrrhae scrupulos duos.
 Fiat pilulae granorum duorum.
 (Ham.)
 ℞. Extracti aquosi Myrrhae,
 — — Pinî,
 — — Saponariae,
 Gummi Hederae pulverati,
 singulorum drachmas sex.
 Misce. (Li.)
 ℞. Saponis Alicantini,
 Extracti aquosi Myrrhae,
 — — Pini,
 singulorum semunciam.
 Balsami Copaivae quantum sufficit.
 Fiat massa pilularis. (Ful.)

Gabe, zehn bis zwanzig Gran.

Pilulae gummi resinosae. (RC.)
 ℞. Asae foetidae,
 Myrrhae, singulorum partes octo.
 Olei Succini . . . partem unam.
 Fiat cum syrupo simplici massa. —
 Gabe, zehn Gran bis zwei Scrupel bei Echliefengehen oder öfter. — Krampfstil-
 lend, emmenagogisch.
Pilulae balsamicae martiales. (Ham.)
 ℞. Massae Pilularum balsamicarum
 (formula Ham.) drachmas tres.
 Limaturae Ferri porphyrisatae
 drachmam unam.
 Fiat pilulae granorum duorum.
Pilulae stomachicae. (Sm.)
 ℞. Myrrhae . . . drachmas quatuor,
 Extracti Centaurii minoris
 drachmas duas.
 Balsami Peruviani scrupulos duos.
 Fiat pilulae ponderis trium granorum. —
 Gabe, zwölf Stück täglich, auf drei Mal.
*Pilulae Myrrhae amarae cum Ammonia-
 co.* (Au.)
 ℞. Myrrhae,
 Gummi Ammoniaci,
 Extracti Cardui benedicti,
 — Ab-inthii,
 singulorum drachmas duas.
 Acidi succinici drachmam unam.
 Terebinthinae Venetae
 drachmas tres.
 Pulveris Rhei . . . quantum sufficit.
 Fiat pilulae granorum duorum. —
 Gabe, sechs bis zwölf Stück alle drei Stun-
 den oder zweimal täglich, bei Verstopfung
 und Hypochondrie.
*Pilulae Myrrhae cum Arnica s. adstrin-
 gentes.* (Au.)
 ℞. Extracti Myrrhae drachmas duas.
 — Florum Arnicae
 drachmam unam.
 Acidi benzoici . . . scrupulos duos.
 Balsami Copaivae scrupulum unum.
 Succu Liquiritiae quantum sufficit.
 Fiat pilulae granorum duorum. —
 Gabe, sechs Stück alle zwei oder drei Stun-
 den, bei chronischer Gonorrhöe.
Pilulae roborantes. (Pie.)
 ℞. Myrrhae . . . drachmas quatuor.
 Galbani,
 Extracti Trifolii,
 Catechu,
 singulorum drachmas duas.
 Syrupi Corticis Aurantiorum (bi-
 garades) . . . quantum sufficit.
 Fiat pilulae granorum trium. —

Tisfit verordnete sie gegen beginnende Rückenmarks-Erwinnsucht; er gab täglich ein und zwanzig Stük auf drei Mal und ließ dann drei Unzen einer Abkochung von zwei Unzen China, einer Unze Kapervurzstinde, zwei Drachmen Zimmt und einer halben Unze Eisenfeile in zwei und einem halben Pfund Wasser geben.

Electuarium s. Opiatum detergens. (Bo. Sp.)

℞. Myrrhae,
Olibani,
singulorum drachmam unam.
Mellis uncias duas.

Misce. (Bo.)

℞. Myrrhae,
Olibani, singulorum semunciam.
Cetacei drachmas duas.
Tere cum Vitello Ovi et adde
Pulveris Radicis Liquiritiae
quantum sufficit.

Misce. (Sp.)

Am Ende von Peripneumonie zur Erleichterung des Auswurfs empfohlen. — Gabe, eine Drachme in einem Glase warmer Bruststifane.

Theriaca officinalis s. pauperum, Electuarium pro pecoribus, Theriaca diatessaron, Species diapentes. (Ams. Ful. Sar. Fl. Sp. T. Vm.)

℞. Radicis Gentianae,
— Aristolochiae rotundae,
Baccarum Lauri,
Myrrhae, singulorum uncias duas.
Mellis despumati

uncias viginti quatuor.

Misce sedulo. (Ams. Sar. Sp. Vm.)

℞. Quatuor priorum substantiarum et Summitatum Centaurii minoris, singulorum partes aequales absque melle.

℞. Roob Juniperi . . . uncias quatuor.

Myrrhae in Vino Hispanico dissolutae,

Pulveris Radicis Angelicae,
— — Aristolochiae longae,
— — Inulae,
singulorum uncias duas.

Syrupi Corticis Aurantiorum,
— Papaveris alb.,
singulorum uncias octo.

Misce bene. (Ful.)

Wagenstärkend, schweißtreibend, blähungstreibend, die Menstruation befördernd, giftwidrig. — Gabe, von einer Drachme bis zur halben Unze.

Linimentum gingivale mundificans. (Ful.)

℞. Extracti Myrrhae aquosi,
Spiritus Salis dulcificati,
singulorum drachmas duas.
Mellis rosati . . . uncias duas.

Misce.

Electuarium ad gingivas s. gingivale. (Sp.)

℞. Radicis Tormentillae
— sesquidrachmam.
— Caryophyllatae
drachmam unam.
— Iridis Florentinae
semidrachmam.

Herbae Salviae,

— Abrotani,

— Rutae,

Florum Aquilegiae,

Rosarum rubrarum,

— Balaustiorum,

singulorum drachmam unam.

Seminum Cochleariae,

— Aquilegiae,

singulorum sesquidrachmam.

Mumiae Aegyptiacae,

Myrrhae,

singulorum drachmam unam.

Mastichis,

Lacca, singulorum drachmas duas.

Sanguinis Draconis

sesquidrachmam.

Aluminis calcinati semidrachmam.

Mellis rosati . . . quantum sufficit.

Misce sedulo.

Potassidum Myrrhae, Balsamum Myrrhae. (Sw*. Vm.)

℞. Myrrhae pulveratae partes octo.
Potassae causticae fusae

partem unam.

Contere, adde sensim Aquae tantum ut totum possit colari, subsidere fac, decantha et lente ad consistentiam balsami consume. (Vm.)

Sw*. Lixivii Saponariorum uncias duas et Myrrhae unciam unam.

Keusertlich, bei Scropheln und Drüsenanschwellungen.

Unguentum Myrrhae. (Au. Vm.)

℞. Balsami Myrrhae partem unam.
Cerati prope ignem mollefacti

partes octo.

Triturando commisce. (Vm.)

℞. Vitellorum Ovorum . . . no. 2.

Butyri recentis . . . uncias tres.

Myrrhae,

Cetacci, singulorum drachmas duas.

Liquatis et colatis adde

Balsami Peruviani semidrachmam.

Misce. (Au.)

Man hat diese Salbe empfohlen, um den Blatternarben die Empfindlichkeit zu benehmen.

Emplastrum sulphuratum s. diasulphuris Rulandi. (B*. Br. Ful. Pal. Wir. Pid. Sp.)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.

Olei Olivarum . . . uncias quatuor.
 Cerae flavae . . . uncias quinque.
 Liqueatis lente adde
 Pulveris Myrrhae . . . uncias decem.
 Misce bene. (Gal.)
 ℞. Balsami Sulphuris terebinthinati,
 Cerae flavae,
 Colophonii, singulorum uncias sex.
 Pulveris Myrrhae uncias octodecim.
 Ligua et commisce. (E*. Pal. Wir.)
 Sp. Balsami, Colophonii, singulorum
 uncias sex, Cerae uncias duas et no-
 vem Myrrhae; — *Pid.* Balsami un-
 cias tres, Colophonii drachmas tres,
 Cerae semunciam et Myrrhae uncias
 quatuor.

Reizend, auflösend, schmelzend.

Liquor s. Liquamen Myrrhae, Oleum
 Myrrhae s. Myrrhae per deliquium,
 Myrrha liquida, Tinctura Myrrhae
 aquosa, Solutio Myrrhae. (Bor. Bor4.
 Br. D. Fer. Ful. Hass. HassP. His. Li.
 Lus. Fal. Wir. Wür. *Fi. Pid. Sp. Sw.*)

℞. Ovum no. 1.

In Aqua bulliente induratum trans-
 verse concide, et vitello exempto Myr-
 rham pulveratam immitte, utrasque
 partes dimidias filo consue, in sacco
 e tela confecto inclusas in cavam sepe-
 ne et in vase supposito liquidum de-
 fluentem excipe. (Br. His. Pal. Wir.
 Wür. *Sp.*)

℞. Myrrhae pulveratae quantum vis.
 Albuminis Ovi cocti

pondus duplum.

Fiat terendo cum aquae calidae pau-
 xillo pasta, quae in sacco e tela con-
 fecto ad locum humidum ponatur etc.
 (*Fl.*) cuique unciae liquoris spiritus
 vini uncia una addatur, ne putrefiat.

℞. Myrrhae partem unam.

Aquae destillatae partes quatuor.

Digere in balneo aquae et per lin-
 teum trajice. (Bor. Ham. O. Pol. Sax.
Vm.)

Han. Myrrhae partem unam et Aquae
 duas; — Bor4. Extracti Myrrhae un-
 ciam unam, Aquae destillatae uncias
 quinque; solve et liquorem post de-
 canthationem cola; — HassP. Extra-
 cti partes tres, Aquae destillatae fer-
 vidae octo.

℞. Extracti Myrrhae aquosi

drachmas duas.

Olei Cerae semunciam.

Terendo solve. (*Pid.*)

℞. Myrrhae drachmas tres.

Hydromellis semunciam.

Dissolve. (Lus.)

D. Myrrhae quantum fieri potest in
 Hydromelle solvere jubet; — Ful.

Myrrhae drachmas duas et Hydromel-
 lis semunciam.

℞. Extracti Myrrhae aquosi

drachmas duas.

Mellis drachmam unam.

Aquae drachmas tres.

Tritura ad perfectam solutionem us-
 que. (Fer. Hass. Li.)

Fi. Aquae unciam unam.

Balsamisch, säulniswidrig, zum Berbin-
 den mancher Geschwüre.

Solutio s. Essentia Myrrhae alcalisa-
 ta; Liquor Myrrhae alcalisatus. (*Sw.*)

℞. Myrrhae uncias duas.

Aquae bullientis . . . uncias octo.

Natri subcarbonici

drachmam unam.

Digere in balneo aquae per duos
 dies, saepius agitando et cola. — Gabe,
 eine Unze, täglich mehrmals.

Liquor Stimulans et vulnerarius. (*Sm.*)

℞. Calcis vivae uncias duas.

Myrrhae unciam unam.

Tere in mortario marmoreo, sensim
 addendo

Aquae libras duas.

Digere per dies aliquot et decantha.
 Zum Einspritzen bei fistulösen Geschwüren.

Tinctura s. Essentia s. Solutio alco-
 holica Myrrhae. (A. Am. Ans. An. B.
 Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du.
 Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass.
 HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.
 Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür.
 Br. C. *Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Myrrhae electae partem unam.

Alcoholis 22° partes quatuor.

Digere per tres dies (aliquot) et cola.
 (*Gal.*)

Ams. Myrrhae partem unam et Al-
 coholis (0,884) octo; — Br. Myrrhae
 unam et Alcoholis (0,935) octo; — Sw.
 Myrrhae unam et Alcoholis (0,935)
 sex; — Ba. Myrrhae partem unam et
 Alcoholis (0,900) sex; — An. B. et
 Bel. Myrrhae partem unam et Alcoh-
 olis (20°) octo; — A. Myrrhae unam
 et Alcoholis (0,850) octo; — *Fi.* Myr-
 rhae uncias duas et Alcoholis (30°) li-
 bram unam; — T. Myrrhae uncias qua-
 tuor, Alcoholis 25° B. libras duas; — Ful.
 HassP. et Lus. Myrrhae partem unam et
 octo Alcoholis; — Bor. Bor4. D. DD.
 Fenn. Han. O. Pal. R. Suec. Wür. et *Vm.*
 Myrrhae partem unam et Alcoholis
 sex; — Hass. Sax. et *Pid.* Myrrhae
 partem unam et Alcoholis quinque; —
 LonN. Myrrhae uncias quatuor, Spiritus
 rectificati octarios tres; macera per
 dies quatuordecim.

℞. Myrrhae uncias tres.

Alcoholis (0,885) uncias viginti.

Aquae uncias decem.
 Post octo dies digestionis filtra. (Am. Ed. His. RC.)
 Du. Myrrhae uncias tres, Alcoholis (0,930) sesquioctarium et Spiritus rectificati (0,840) semioctarium; — Lon. Myrrhae uncias quatuor, Spiritus rectificati octarios duos, Aquae octarium unum, macera per dies quatuordecim.
 R. Myrrhae uncias tres.
 Camphorae drachmas duas.
 Aquae destillatae uncias tres.
 Contere, sicca, pulvera et digere cum Alcoholis libris duabus.
 Post sex dies filtra. (Li.)
 Reizend, emmenagogisch, wurmtreibend. — Gabe, dreißig bis fünfzig Tropfen. — Man bedient sich dieser Tinctur auch bisweilen, um die Oberflache atonischer Geschwüre zu reizen, sie war in dieser Hinsicht jedoch mehr bei den Alten in Gebrauch
Linctus ad gingivas, Liquor ad ulcera faucium, Collutorium detergens. (DD. Au. Sy.)
 R. Essentiae Myrrhae partem unam.
 Mellis crudi partes quatuor.
 Misce. (DD.)
 Sy. Tincturae Myrrhae unciam unam et Mellis cuprati semunciam.
 R. Herbae Salviae semunciam.
 Aquae bullientis quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur. Colaturae adde
 Tincturae Myrrhae drachmas duas.
 Mellis rosati uncias duas.
 Misce. (Au.)
 R. Aquae Salviae,
 — Cochleariae,
 Tincturae Myrrhae,
 — Aurantii fructuum viridium, singularum drachmas duas.
 Aquae Rabelii sesquidrachmam.
 Mellis rosati unciam unam.
 Misce. (Au.)
Gargarisma detergens. (Fer. Fi.)
 R. Extracti Myrrhae semunciam.
 Decocti Chinae uncias octo.
 Misce.
Lotio phagedaenica. (E.)
 R. Tincturae Myrrhae,
 Aquae Calcis,
 singularum unciam unam.
 Von K i r k l a n d gegen luvitendés Fleisch empfohlen.
Injectio detergens. (Au. B.)
 R. Decocti Hordei libras duas.
 Tincturae Myrrhae drachmam unam.
 Bei chronischem Schnupfen mit Ausfluß aus dem Stirnhöhlen. (B.)
 R. Aquae uncias sex.
 Collae Piscium quantum sufficit ut fiat mucilago spissa. Adde

Liquoris Myrrhae drachmam unam.
 Bei Blasengeschwüren empfohlen. (Au.)
 R. Plumbi acetici drachmam unam.
 Aquae uncias sex.
 Solutioni adde
 Liquoris Myrrhae uncias duas.
 Tincturae Opii unciam unam.
 Bei chronischen Gonorrhöen gebräuchlich. (Au.)
Tinctura s. Essentia s. Solutio s. Mixtura Myrrhae alcalisata. (Br. Hass. Sar. Wir. Pid.)
 R. Myrrhae electae semilibram.
 Kali subcarbonici uncias octo.
 Aquae fontanae sesquilibram.
 Post sex vel octo dies digestionis evaporent in balneo aquae ad mellis consistentiam; residuo infunde
 Alcoholis uncias viginti.
 Digere et filtra. (Br. Wir. Pid.)
 Sa. Myrrhae uncias duas, Subcarbonatis liquidi semunciam et Alcoholis quantum satis ut mixtura aëscicata trum vel quatuor digitorum crassitiem tegatur; — Hass. Myrrhae semilibram, Potassae liquidae quantum satis et Alcoholis uncias viginti.
 Reizend, kräftiger als die einfache Tinctur. — Man wandte sie ehemals, aber wegen der durch das Alkali verursachten Schmerzen, selten an.
Tinctura Myrrhae cum Aqua Rabelii. (T.)
 R. Myrrhae electae pulv. unciam unam.
 Aquae Rabelii uncias quatuor.
 Digere agitando per dies quatuor et filtra. — Zu Einspritzungen, Waschungen etc. bei Fistelgeschwüren.
Elisir Myrrhae. (Wir.)
 R. Essentiae Myrrhae uncias octo.
 — Castorei uncias sedecim.
 Extracti Sabiniae unciam unam.
 Post sufficientem digestionem filtra.
 Reizend, besonders bei Unregelmäßigkeiten in der Menstruation und Gebärmutterkrankheiten empfohlen. — Gabe, vierzig bis fünfzig Tropfen.
Acetum Myrrhae. (Wür.)
 R. Myrrhae pulveratae unciam unam.
 Aceti boni semilibram.
 Digere per aliquot dies in loco blanda temperatura gaudente, tunc per horam in balneo aquae et cola.
Oleum Myrrhae. (Bor4. Wir.)
 R. Myrrhae electae partem unam.
 Arenaes lotae partem unam cum dimidia.
 Destillent in cucurbita vitrea ex arena; oleum a liquore simul prodeunte separa et rectifica.
 Bor4. Myrrhae libras duas, Aquae fontanae octuplum; fiat destillatio e vesica destillatoria, quamdiu oleum ab

empyreumate liberum prodit; oleum limpidum collige.

Aqua Myrrhae (Wir. Sp.)

℞. Myrrhae pulveratae uncias octo. Aquae fontanae . . . libras sex.

Digere in loco calido per tres dies et lenta destillatione libras quatuor abstrahere.

Bei Brust- und Magenbeschwerden, so wie bei solchen von unregelmäßiger Menstruation empfohlen. — Gabe, eine Unze.

M y r t u s .

Myrtus communis, L.; Myrthe, Myrte; Myrte commun (Gal.); Myrtle (Ang.); Arajan (His.); Myrtus (Bel.); Myrto, Mirto (I.); Marta (Lus)

Br. Fer. Gal. H s. Lus. Wir. Be. Br. M. Sp.

Ein Strauch (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, J.) des südlichen Europa's. (Blackw. t. 114. Plenck. t. 374. Zorn Ic. pl. t. 169.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Myrti s. Baeticae sylvestris) sind eiförmig oder lanzettförmig, glatt, schön grün und überall mit halbdurchsichtigen Drüsenpunkten bestreut. Sie haben, besonders gerieben, einen angenehmen Geruch und einen bitteren gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

Die Früchte sind kugelige, dunkelblaue, fast schwärzliche Beeren von sehr starkem gewürzhaften Geruch und abstringirendem bitterem Geschmack.

Abstringirend, aber wenig gebraucht.

Oleum myrtinum. (His. Sar.)

℞. Baccarum Myrti contusarum . . . libras duas.

Foliorum Myrti concisorum . . . manipulos duos.

Olei Olivarum . . . libras quatuor.

Aceti I. dram unam.

Coque ad humidam consumptionem et cola. (Sar.)

℞. Foliorum et Florum Myrti partem unam.

Olei Olivarum partes tres.
Post tres vel quatuor dies digestionis coque ad humidam consumptionem et cola exprimendo.

Syrupus de Myrto. (Gal. Sar.)

℞. Florum Myrti unciam unam.
Aquae destillatae Myrti libras duas.

Digere in balneo aquae per horas duas, vase clauso; cola, filtra et colaturae adde

Sacchari albi duplum.

Solve in aquae balneo. (Gal.)

Sar. miscere jubet Succo depurati et Syrupi communis, ad globum cocti, singulorum partes aequales et blando igne, spatula lignea continue agitando, syrupum parare.

M y x a .

Cordia Myxa, L.; schwarze Brustbeere, Sebestenbaum; Sebestier (Gal.); Lebuok (Ar.); Buhuarie (Bel.); Lolu (Cy.); Mochayet (Eg.); Lesura (Hin); Kendal (Jav.); Bukam padaruka (Sa.); Vidi marum (Tam.); Nekra (Tel.).

Br. Gal Pal. Wir. A. Bc. G. M. Sp.

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Boragineae, J.) Aegyptens. (Rheede Hort. Mal. 4. t. 37. Lam. III. t. 96. f. 3. Blackw. t. 393. Plenck. t. 116. Fl. méd. VI. 322.)

Man wendet die Früchte, Sebesten, schwarze Brustbeeren (fructus Myxae s. Sebestenae) an; es sind glatte, eiförmige, gespitzte, schwarze Steinfrüchte von der Gestalt und Größe einer kleinen Pflaume, welche ein röthliches, geruchloses, saftiges Fleisch von süßem und schleimigem Geschmack enthalten, welches einen tief gesuchten Kern umgiebt.

N .

N a p h t h a .

Naphtia; Naphthe (Gal.)

Br. D. Fer. Gal. Sax. Wir. Fi. G.

Ein flüßiges, durchsichtiges, weißes, schwach gelbliches, etwas fettig anzufühendes Erdharz, welches viel leichter als Wasser, außerordentlich brennbar ist, einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch verbreitet und, unter Ausstoßen eines sehr dicken Rauchs, mit bläulicher Flamme brennt.

Reizend.

N a r c i s s u s .

Narcissus Pseudo-Narcissus, L.; gemeine Narzisse; Narcisse sauvage ou des prés, Faux Narcisse (Gal.); Common affodil narcissus (Ang.); Gaal narcisso (D.); Narcisso silvestre (His.); Goele narcis (Bel.); Narcisso giallo (I.); Paesklija (Succ.).

Fer. Gal.

♀ (Hexandria Monogynia, L.; Nar-

cisseae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Orfila méd. lég. t. 2. Bull. t. 389. Rév. Lil. vol. III. 158.)

Man wendet die Zwiebel und die Blüthen an.

Die Wurzel oder Zwiebel ist klebrig und von etwas scharfem Geschmack.

Die Blüthen sind gelb.

Die Wurzel bewirkt Durgren und Erbrechen — Gabe, zwei Drachmen. — Die Blüthen sind krampfstillend; Gabe, vier und zwanzig Gran.

Extractum Narcissi pratensis. (Gal. Sw*. Vm.)

℞. Florum recentium Narcissi pratensis
libram unam.
Aque libras duas.

Infunde frigide per horas duodecim et cola absque expressione; residuo eandem Aquae fervidae quantitatem infunde et itidem cola; liquoribus commixtis et albumine clarificatis, colatura ad extracti consistentiam evaporet. (Vm.)

Sw*. digerere jubet Florum siccatorum partem unam in Aquae tepidae octo et colaturam clarificatam vaporando consumere; — Gal. Macerare Florum libram unam in Aquae quatuor per Horas viginti quatuor, operationem cum residuo et nova Aqua repetere et liquores commixtos in balneo Aquae consumere.

Reizend, Ekel erregend, Auswurf befördernd und krampfstillend; bei Keuchhusten, convulsivem Asthma und Convulsionen empfohlen. — Gabe, vier bis zwanzig Gran, je nach dem Alter.

Acetum Pseudo-Narcissi. (Sm*. Vm.)

℞. Florum Narcissi pratensis recentium
partem unam.

Aceti albi partes octo.
Infunde blando calore per aliquot horas, cola absque expressione et filtra.
Zur Bereitung des Oxy mel Narcissi angewendet.

Oxy mel Narcissi pratensis. (Sw*. Vm.)

℞. Aceti Narcissi pratensis
partem unam.

Mellis albi . . . partes quatuor.
Dissolve frigide.

Etwas Brechen erregend, Auswurf befördernd, beruhigend, bei Keuchhusten und convulsivem Asthma. — Gabe, ein oder zwei Kaffeelöffel, drei oder vier Mal täglich.

Narcotina.

Narcotinum; Narcotins; Narcotine.
GalH. Fi. T.

℞. Residui Opii Aqua penitus extracti
quantum vis.

Siccatur et grossiuscule pulveratum frigide cum Acido hydrochlorico (4^o) vel Acido pyroacetico (4 vel 5^o) infunde; cola exprimendo; liquori filtrato Ammoniacum in excessu infunde; praecipitatum cum Aqua frigida lotum digerere in Alcohole bulliente (36^o); solutionem refrigerare fac et crystallos Carbonis animalis ope purifica.

Fi. sec. Derosne Opium pluribus cum Aqua frigida macerationibus extrahere, quamdiu fluidum colorem praebet, liquores commixtos deinde ad extracti consistentiam consumere, aetherem infundere et decanthare; aetherem deinde distillatione separare etc.; — T. ut Fi. sed narcotinum e distillatione aetherea obtentum cum Aqua Acido hydrochlorico acidulata tractare, Acido ut saturetur Ammoniacum addere et praecipitatum in Alcohole solum per carbonem animale filtrare, evaporandoque in crystallos cogere.

Betäubend, schwäcbend und giftig, nach Orfila, in hohen Gaben kräftig aufregend, nach Magendie, narcotisch, nach Brera.

Injectio narcotica. (Ca.)

℞. Decocti Lactucæ virosæ
libram unam.

Extracti Belladonnae
sesquidrachmam.
Narcotinae grana sex.
Bei Neuralgien der Hornhäute und der Scheide empfohlen.

Boli e Narcotina. (B.)

℞. Narcotinae purae . . . grana duo.
Olei Amygdalarum dulcium
guttas sex.

Micæ Panis,
Mellis,
singulorum quantum sufficit.
Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Mixtura incitans et sedans, Potio leniens. (B.)

℞. Narcotinae purae
drachmam unam.
Aquae C'tri uncias tres.
Löffelweise zu nehmen.

Nardus.

Zwei Pflanzen sind unter diesem Namen in der Medicin gebräuchlich:

1) *Valeriana Celtica*, L.; Narbenbalbrian, Alpenbalbrian; Nard celtique (Gal.); Espicanardo celtico (His.).

A. Ams. An. Br. Fer. Gal. His. Pal. Wir. Wür. Be. Br. G. M. Sp.

♀ (Triandria Monogynia, L.; Valerianeae, J.) Eine auf den Alpen wachsende Pflanze. (Plenck t. 29. Jacq. Coll. t. I. p. 24.)

Die Wurzel (radix Valerianae Celticae s. Spicae Celticae s. alpinae s. Nardus Celtica) besteht aus langen, mit dünnen gelblichen Schuppen bedeckten Fäserchen. Sie hat einen starken und angenehmen Geruch und einen scharfen, bitteren, gewürzhaften Geschmack.

Zonisch, magenstärkend, harntreibend.

2) *Spica Nardus*; Nardebartgras, Spitznarbenmannsbart; Nard des Indes, *Spica nard* (Gal.); Spikenard (Ang.); *Spica narde* (D.); Nardo de Indias, *Spica nardo* (His.); spikenard (Bel.); *Spigo nardo*, Nardo indiano (I.); Nardo indiano (Lus.); Spikenarde (Succ.); Sukku-naru-pilla (Tam.).

An. Br. Fer. Gal. His. Wir. A. Be. Fi. G. M. Sp.

Man wendet unter diesem Namen (*Spica Indica* s. *Spica Nardus* s. *Nardus Indica*) die untern, von den Rippen der Wurzelblätter umgebenen Enden der Stängel an, an welchen meist noch ein Theil der Wurzel hängt, welche aus einem kleinen rötlichbraunen Köpfchen besteht, woran viele knotige harte Fäden sitzen. Der Geruch ist angenehm; der Geschmack bitter, scharf und gewürzhaft.

Sprengel leitet (nach W. Jones Asiatic research. IV. p. 109.) die Indische Narbe von *Viola Jatamarensis* her, welcher Meinung Guibourt beitrifft. Sehr allgemein glaubt man auch, sie komme von *Andropogon Nardus*, L., ♀ (*Polygamia Monoecia*, L.; *Gramineae*, J.) einer Pflanze Ostindiens (Rumph. Amb. 4. 22. t. 6). Auch Linne bezieht sie, nach Kottler, auf diese Pflanze, aber mit, wie es scheint, gegründetem Zweifel. Reizend, nervenstärkend.

Pulvis Nardi Celticae compositus. (Wür.)

R. Nardi Celticae . . . semunciam.

Zinoi sulphurici scrupulum unum.

Fiat pulvis.

Essentia Spicae Indicae. (Wir.)

R. Nardi Indicae . . . sesquunciam.

Alcoholis uncias sex vel septem. Post sufficientem extractionem cola exprimendo et filtra.

Reizend, als Gegengift betrachtet, Blähungen, Harn und Menstruation treibend. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen.

N a s t u r t i u m.

Wir fassen unter dieser Benennung folgende Pflanzen zusammen:

1) *Tropaeolum majus*, L.; Smbianische Kresse, Capucinerkresse; Capucine, Cresson des Indes, Cresson du Mexique (Gal.); Indian cress (Ang.); Indianisk karse (D.); Capuchinos (His.); Spaensche kers (Bel.); Capucino (I.); Mastracco da Paro (Lus.); Indianisk kresse (Succ.).

Br. Gal. Wir. Be. M. Sp.

⊙ (Octandria Monogynia, L.; Tropaneae, Cand.) Eine Südamerikanische Pflanze. (Curt. Bot. Mag. t. 23. Fl. méd. II. 96.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (*herba Nasturtii Indici* s. *Cardami majoris*) besteht aus einem wässrigen, glatten Stängel mit abwechselnden, ebenen, zumblichen, in fünf oberflächliche Lappen getheilten, schüsselförmigen, langgestielten Blättern.

Die fünfblättrigen Blüthen sind orange-gelb oder purpuroth.

Geschmack und Geruch sind stark und dem der Kresse ähnlich.

Reizend, als antiscorbütisch betrachtet.

2) *Thlaspi sativum*, Cand.; Gartenkresse, Sommerkresse; Cresson Alénois, Cresson des jardins (Gal.); Common cress (Ang.); Hausekerse (D.); Nastuerco (His.); Tuinkers (Bel.); Crescione (I.); Nasturoga (Lus.); Traegardskress (Succ.).

An. B. Br. Gal. GalM. Gen. His. Be. G. M. Pid. Sp.

⊙ (*Tetradynamia Siliculosa*, L.; Cruciferae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 23. Plenck t. 514. Hayne VI. t. 11. Zorn Ic. pl. t. 16.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (*herba Nasturtii hortensis*) besteht aus einem ästigen Stängel mit abwechselnden, gestielten, langgestreckten, glatten, vierspaltigen Blättern.

Die Saamen sind länglich, glatt und braun.

Die Pflanze riecht, wenn man sie reibt, schwach, aber angenehm; der Geschmack ist etwas bitter und scharf.

Reizend, antiscorbütisch.

3) *Sisymbrium Nasturtium*, L.; Wasserkerse, Brunnenkerse; Cresson de fontaine (Gal.); Common watercress (Ang.); Kiericha wodny nebotocny (B.); Wandkarse (D.); Berro (His.); Waterkress (Bel.); Nasturtio, Crescione, Agretto (I.); Rzezucha (Pol.); Agrices (Lus.); Kiaellkrassa (Succ.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. His. Li. Lus. R. RC. Sax. Wir. Wür. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. T. Z.

♂ oder ♀ (*Tetradynamia Siliquosa*,

L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 690. Blackw. t. 260. Plenck t. 525. Hayne V. t. 32. Düss. off. Pfl. VI. t. 6. Fl. méd. III. 138.)

Das Kraut (herba Nasturtii aquatici) besteht aus einem röhrligen, glatten, walzigen, ästigen Stängel mit abwechselnden, unpaarig gestellten, grünen, saftigen, glatten, aus fünf bis sechs sitzenden, ganzen, rundlichen oder eirunden Blättchen, wovon das am Ende befindliche am längsten und fast lanzettförmig ist, zusammengesetzten Blättern. Es hat einen starken, beißenden Geruch und einen etwas scharfen und bitteren Geschmack.

Reizend, antiscorbutisch.

4) *Spilanthus oleraceus*, L.; falsche Fieckblume; Cresson de Para (Gal.); Speat leav'd spilanthus (Ang.).

Fer. Gal. Fi. G.

⊙ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantherae, Cass.) Eine Pflanze Südamerica's. (Jacq. Hort. Vind. t. 185.)

Man wendet das Kraut (herba Spilanthi) an; es besteht aus saftigen Stängeln mit fast herzförmigen, gestielten und gezähnten Blättern. Es hat einen scharfen und brennenden Geschmack und reizt die Speichelabsonderung.

Reizend, antiscorbutisch.

5) *Cardamine pratensis*, L.; Wasser-Kresse, Biesenkresse; Cresson des prés (Gal.); Cuckow flower (Ang.); Engekasse, Vildkasse, Giegeblomster (D.); Koekeshloem (Bel.).

Br. D. Du. Ed. Gal. Gen. His. Lon. LonN. Wir. Wür. Be. C. G. M. Sp.

4 (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (Blackw. t. 228. Plenck t. 517. Hayne V. t. 30. Zorn Io. pl. t. 51.)

Die Blüthen (flores Cardamines s. Nasturtii pratensis s. Cuouli) sind sehr groß, etwas purpurroth, geruchlos und bilden einen schlaffen, am Ende des Stängels stehenden Strauß. Man nimmt nur die stumpfen, eirunden, länglichen, mit schmalen Nägeln versehenen, weißen oder purpurroth geäderten Blätter. Ihr Geschmack ist scharf, bitter und dem der gemeinen Kresse ähnlich.

Reizend, antiscorbutisch.

Conserva Nasturtii. (Ful. R. Sax. Fi. T.)

℞. Foliorum recentium Nasturtii partem unam.

Sacchari albi partes duas.
Contunde folia et cum saccharo exacte misce. (Ful. R.)

Sax. Fi. Foliorum contusorum partem unam et Sacchari tres; — T. Folia cum Sacchari albi pondere aequali

contundere, per crinium trajicere et commiscere jubet cum Sacchari libris duabus in Aquae parte dimidia soluti et ad aptam consistentiam evaporati.

Conserva antiscorbutica. (Sa.)

℞. Conservae Nasturtii aquatici unciās quinque.
Salis polychrestii Gläseri drachmam unam.

Misce.

Aqua Nasturtii aquatici. (Pal. Sar.)

℞. Herbae contusae Nasturtii aquatici partem unam.
Aquae partes duas.
Destillet trientes duo. (Sar.)
Pal. Herbae partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars.

Spiritus Nasturtii aquatici. (Sar.)

℞. Nasturtii aquatici,
Succi Nasturtii,
Aquae fontanae, singulorum libras sex.
Alcoholis libras duas.
Destillet dimidia pars; producto adde Herbae recentis Nasturtii libras tres.

Destillent in balneo aquae.

Succus Nasturtii aquatici. (Hass. Sar. Wür. T.)

℞. Herbae recentis Nasturtii aquatici quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, succum seponē, decantha et in lagenis serva. (Hass. Sar.)
Wür cuique librae succi addit Alcoholis drachmam unam.

☉ Gabe, eine bis zwei Unzen.

Extractum Nasturtii. (Sar. Fi.)

℞. Herbae recentis et contusae Nasturtii libras octo.
Macerā per tres dies in alembico, abstrahē deinde destillationis in balneo aquae ope unciās circiter duas; residuo Aquae triplum infunde; post sex horas digestionis decoque ad tertiae partis remanentiam, clarifica et cola liquorem, cui ad electuarii consistentiam evaporato et nonnisi tepido aquam destillatam adde.
Fi. ut extractum cichorii.

Syrupus de Nasturtio. (Gal. Fi.)

℞. Succi Nasturtii aquatici colati libram unam.
Sacchari albi libras duas.

Fiat in balneo aquae, vase tecto, syrupus, qui post refrigerationem coletur. — ☉ Gabe, eine bis drei Unzen.

Syrupus celotyrbicus Forestii. (Wir. Sp.)

℞. Succi Nasturtii aquatici,

Succi Beccabungae,
singulorum semilibram.

— Fumariae,

— Lupulæ,

singulorum uncias tres.

Misce et coque cum

Sacchari albi . . . unciis sedecim.

Syrupo adde

Aquæ Nasturtii vel Cochleariæ
unciam unam ad duas.

Elizir odontalgicum et antiscorbuticum.

℞. Foliorum recentium et contusorum Spilanthi uncias quatuor.

Alcoholis (℞³) . . . libram unam.

Digere per dies duodecim et filtra.
Reizend, als antiscorbutisch betrachtet. —
Gabe, einen halben Eßlöffel in einem Aufguß der saponaria oder dulcamara.

Nerium.

Nerium Oleander, L.; Rosenlorbeer; Laurier rose (Gal.); Common rosebay (Ang.).

Fer. Gal.

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Apocynæ, J.), welcher angeblich im Orient zu Hauje und im südlichen Europa naturalisirt ist. (*Blackw. Herb. t. 531. Plenck t. 128.*)

Man wendet die Blätter, folia Nerii s. Rhododaphnis s. Rosaginis) an; sie sind lang, lanzettig, spizig, steif, ledrig und sehr dunkelgrün. Sie haben einen etwas bitteren Geschmack.

Man hält sie für narkotisch. — Den Aufguß hat man bei Flechten, das Pulver, mit Fett gemischt, gegen Krätze angewendet.

Nicotiana.

Man wendet in der Medicin zwei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Nicotiana Tabacum, L.; Toback, Tabak; Tabac ordinaire (Gal.); Tabak (D. Suec.); Tobacco (Ang.); Bujjerbhag (Ar.); Tambacco (Ba. Jap.); Pemne. B.; Youly (Caramb.); Sangyen (C.); Dunkola (Cy.); Tumbaku (Duk. Hin.); Tabaco (His. Lus.); Tabak (Bel. Pol.); Nicoziana, Erba di s. Croce, Tabacco (I.); Tambracu (Mal.); Quau-ryetl (Men.); Dhumrapetra (Sa.); Poghei elieg (l'am.); Tamer (Tart.); Poghako (Tel.).*

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. Has. P. His. Li. Lon. LouN. Lus. O. Pol. R. R. C. Sax. Suec. Vir. Wür. Z. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T. Z.

⊙ (Pentandria Monogynia, L.; Solanæ, J.) Eine ursprünglich in Südame-

rica? einheimische Pflanze. (*Bull. t. 285. Blackw. t. 146. Plenck t. 99. Big. Am. med. Bot. t. 40. Bert. Bild. 1. 35. Fl. méd. VI. 326.*)

Man wendet die Blätter (herba Tabaci s. Nicotianæ) an; sie sind sehr groß, sitzend, am Grunde etwas herablaufend, eiförmig, spizig, ganz und fast glatt, frisch grün, getrocknet, gelbbraun. Der Geruch ist stark und unangenehm; der Geschmack scharf, widerlich und betäubend.

Sie enthalten, nach Bauquelin, einen eigenthümlichen crystallinischen Stoff, Nicotianin oder Nicotin (*Nicotianinum, Nicotinum, Nicotianina*), welchen Hermbstädt für sich darzustellen gelungen ist.

2) *Nicotiana rustica, L.; Bauerntabak; Tabac rustique (Gal.)*

Gal.

⊙ Eine ursprünglich in America wachsende Pflanze. (*Blackw. Herb. t. 437. Bert. Bild. I. 35.*)

Man wendet die Blätter (folia Nicotianæ rusticæ s. minoris) an; sie sind eiförmig, ganz, stumpf und etwas herzförmig. Auch sie enthalten Nicotianin.

Hefig reizend, in hohen Gaben giftig, Brechen, blutige Stühle, Nervenzusfälle, wie Schwindel und Schlafsucht, beschleunigten Puls, Schweiß- und Urinabsonderung zu erregen. Sie werden, wie bekannt, als Nies- und Kaumittel, außerdem aber bei chronischen Catarrhen und Wassersucht angewendet. In Agypten dienen sie gegen Ascariden und um die Thätigkeit im Dickdarm aufzuregen, was besonders in Fällen von Scheintod und Schlagfluß von Nutzen ist; auch werden sie äußerlich gegen Kopfgrind und Krätze angewendet. — Gabe des Pulvers, von einem halben bis zu fünf Gran.

Pulvis sternutatorius. (Hass. Pid.)

℞. Foliorum Nicotianæ,

— Majoranæ,

Florum Lavandulæ,

singulorum unciam unam.

Fiat pulvis subtilissimus.

Pulvis cephalicus. (Bo.)

℞. Nicotianæ raspatae semunciam.

Pulveris Majoranæ,

— Convallariæ majalis,

— Mari,

singulorum semidrachmam.

— Hippocastani,

singulorum drachmam unam.

Misce.

Pilulæ Nicotianæ: (Suec. Au, Vm.)

℞. Extracti Nicotianæ

drachmam unam.

— Liquiritiæ unciam unam.

Aceti scillitici quantum sufficit.

Fiant pilulae centum octoginta. (Succ.)
Vm. loco extracti Radicem Liquiritiae et quidem aequalem extracto Nicotianae quantitatem praescribit.

℞. Extracti Nicotianae partem unam.

— Liquiritiae;

Succi Liquiritiae,

singulorum partes tres.

Pulveris Liquiritiae partes duas.

Fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Pulveris Foliorum Nicotianae Virginicae,

Conservae Rosarum,

singulorum drachmam unam.

Mucilaginis Gummi Arabici

quantum sufficit.

Fiant pilulae sexaginta. — Gabe, ein bis drei Stück, zwei oder drei Mal täglich. — Diese Pillen gelten für harntreibend und als gegen Wassersucht nützlich.

Extractum Tabaci s. Nicotianae. (Fenn.)

Ful. HassP. Sax. Succ. Wür. *Vm.*)

℞. Foliorum recentium Nicotianae quantum vis.

Contunde in mortario lapideo; exprime succum, qui statim in balneo aquae ad consistentiam requisitam evaporet. (Wür.)

HassP. ut extractum calendulae, hyoscyami etc.

℞. Foliorum recentium Nicotianae quantum vis.

Contunde in mortario et exprime succum; vaporando consume absque despumatione, donec quarta Pulveris Foliorum siccatorum Nicotianae pars sufficiat ad extracti consistentiam ei praebendam. (Fenn.)

℞. Foliorum Nicotianae,

Aquae frigidae,

singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim, adde tunc

Aquae bullientis . . . duplum ponderis totius massae; post refrigerationem cola, albuminis ope clarifica, igni impone et quum liquor spissescere coeperit, per pannum cola atque, continuè agitando, probe consume. (Sax. *Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae partem unam.

Aquae communis . . . partes duas.

Coque parumper blando igne et cola exprimendo; residuum cum nova Aqua coctum itidem cola; liquores commixtos in balneo aquae ad aptam consistentiam vaporando consume, (Succ.)

Ful. coquere jubet Nicotianae libram unam in octo Aquae et exprimere, massam in Aqua frigida macerare, iterum exprimere et colaturas commixtas evaporare.

Gabe, drei bis sechs Gran.

Extractum Nicotianae mitigatum. (Br. Han. Li. Wir. *Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae quantum vis. Pluribus in Aqua frigida infusionibus totum principium saporis acris extrahe; residuo Aquae bullientis pondus duplum infunde, post refrigerationem exprime et albumine clarificatum ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

Br. Li. et *Vm.* infundere et tunc coquere jubent Foliorum ab acore liberatorum libram unam in Aquae libris decem ad dimidium consumtis.

Reizend, bei Asthma empfohlen. — Gabe, ein Gran, drei oder vier Mal täglich.

Decoctum Tabaci s. Nicotianae. (Sw.)

℞. Foliorum siccatorum Nicotianae drachmas duas ad quatuor.

Aquae bullientis . . . libram unam.

Coque per aliquot momenta, digere deinde per horam unam et cola.

In Klystir, bei Hies, hartnäckiger Verstopfung und Ascitiden. — Von Justa mond auch in Wäsungen bei tinea empfohlen, wo es aber mit vieler Vorsicht angewendet werden muß, indem es sonst Ebel und Erbrechen hervorbringt.

Aqua antipsorica. (Fer. Fi.)

℞. Foliorum siccatorum Nicotianae libras duas.

Aquae . . . libras quindecim.

Coque per horam unam, adde Natri subcarbonici uncias quatuor.

Post horas viginti quatuor cola. — Gabe vier Unzen auf jede Einreibung.

Infusum Tabaci s. Nicotianae Tabaci. (Am. B*. Lon. LonN. R.C. C. Fi. T.)

℞. Foliorum Nicotianae drachmam unam.

Aquae bullientis octarium unum.

Macera in vase leviter tecto per horam unam et cola. (Am. Lon. LonN. C. Fi.)

T. Foliorum drachmam unam, Aquae bullientis libram unam.

℞. Foliorum Nicotianae drachmas duas.

Aquae bullientis uncias quatuor.

Infunde in balneo aquae per horas quatuor, cola exprimendo et adde

Alcoholis . . . unciam unam.

Misce bene. (B*. R.C.)

Reizend, bei Asthma und Brustwassersucht gerühmt. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Fowler: Nicotianae Virginicae unciam unam, digere in balneo aquae per horam unam cum Aquae bullien-

tis libra una, cola cum expressione et colaturae unciarum quatuordecim adde Alcoholis uncias duas. — Bei Asthma und Dysurie, Erwachsenen zu sechzig bis hundert Tropfen. — *Marryat*: Nicotianae uncias duas, infunde cum Aquae fontanae uncias sedecim, colaturae adde Potassae liquidiae drachmam unam. — Gegen Kopfschmerz; man läßt die Haare abschneiden und wäscht die Geschwüre mit diesem Wasser, während man zu gleicher Zeit Morgens und Abends den Kopf mit einer Salbe aus einer Unze Basilicumsalbe und einer bis zwei Drachmen mercurius dulcis einreibt.

Syrupus Nicotianae s. de Nicotiana.

(B*. Br. Ful. Li. Wir. Bo. Pie. Sp.)

℞. Succii Foliorum Nicotianae
libras duas.

Hydromellis simplicis sesquilibram.

Oxymellis simplicis uncias quatuor.

Digere per dies duos vel tres in balneo aquae vel loco modice calido; liquorem clarum decantha, sepone per horas viginti quatuor et post depurationem adde

Sacchari albi libras tres.

Fiat syrupus. (Wir.)

Br. eundem agendi modum sed decoctum e Foliorum Nicotianae uncias sex in Aquae fontanae libris sex ad duas redigendis praescribit.

B* et Sp. Succii Nicotianae uncias quadraginta octo, Oxymellis quatuor, Hydromellis duodecim et Sacchari quadraginta octo; — B. et Pie. Succii uncias tres, Oxymellis quatuor, Hydromellis unam et duas Sacchari.

℞. Foliorum siccatorum Nicotianae
semunciam.

Aquae uncias sex.

Coque per horam et decoctum rejice; residuo adde

Radiciis Liquiritiae unciam unam.

Aquae bullientis uncias duodecim.

Coque per aliquot tempus ad consumptionem partis quartae circiter usque, cola exprimendo et colaturae adde

Mellis despumati uncias octo.

Coque ad consistentiam syrupi. (Ful. Li.)

Clyster s. Enema irritans s. Nicotianae s. tabacinus. (B*. GalM. RC. E. Fi. Ra.)

℞. Foliorum Nicotianae
drachmam unam.

Aquae bullientis quantum sufficit ut unciae octo colaturae obtineantur. (B*. E.)

RC. Foliorum semunciam, Aquae bullientis uncias decem, infunde per horae quadrantem et cola.

℞. Foliorum Nicotianae
unciam unam.

Aquae libras duas.

Coque leviter et colaturae adde

Tartari stibiati grana duodecim.

Dissolve. (GalM. Ra.)

℞. Foliorum siccorum Nicotianae
sesquidrachmam.

Magnesia sulphuricae

drachmas duas.

Aquae communis quantum satis.

Coque leviter per horae quadrantem, colaturae unciarum octo sal adde. (Fi.)

Lotio Nicotianae, Fomentatio exitans.

(Au. Ra.)

℞. Foliorum Nicotianae uncias duas.

Aquae libram unam.

Coque et cola. — *Marryat* und *Niemann* rühmen diese Flüssigkeit in Waschungen gegen Kopfschmerz.

Guttulae diureticae. (Ham.)

℞. Foliorum Nicotianae
drachmam unam.

Aquae bullientis quantum sufficit ut infusionis uncia una obtineatur; colaturae adde

Aquae Cinnamomi vinosae

semunciam.

Cataplasma vomitivum s. Cataplasma

Nicotianae. (RC. E.)

℞. Foliorum Nicotianae unciam unam.

Aquae quantum sufficit ut fiat cataplasma. (E.)

RC. Foliorum Nicotianae unciam unam, Acidi acetici impuri, vel Aquae ferventis quantum satis ut fiat cataplasma.

Man wendet es auf die Magengegend an, wenn man ein Brechmittel durch den Mund nicht beibringen kann, außerdem bei Flechten.

Vinum Tabaci s. Nicotianae s. Nicotianae Tabaci. (Am. B*. Ed. Lus.

RC. Au. C. Sw. Vm.)

℞. Foliorum Nicotianae partem unam.

Vini albi Hispanici

partes duodecim.

Post octo dies macerationis filtra. (Am. B*. Ed. Lus. RC. Au. E. Sw.)

Vm. Nicotianae drachmas duas et

Vini uncias triginta.

Ein kräftiges, bei Wasserflechten empfohlenes Reizmittel. — Gabe, fünf bis dreißig Tropfen (eine halbe bis anderthalb Drachmen RC.) in einem schicklichen Behälter.

Tinctura Nicotianae. (Au. Huf.)

℞. Foliorum Nicotianae uncias duas.

Alcoholis libram unam.

Post tres dies infusionis cola. (Huf.)

Au. Nicotianae Virginicae unciam unam et Aquae Vitae libram unam.

Harntreibend, bei Wassersucht. — Gabe, fünfzig bis neunzig Tropfen dreimal täglich.

Mixtura Nicotianae diuretica, Potio diuretica. (Au.)

℞. Oxymellis colchitici,
— scillitici,
Tinctura Nicotianae,
Aetheris nitrici,
singulorum partes aequales.
Gabe, ein Kaffeetasse, täglich viermal,
bei Wassersucht.

Acetum Nicotianae. (Wür.)

℞. Foliorum siccatorum Nicotianae unciam unam,
Caryophyllorum no. 6.
Aceti libram unam.
Digere per dies quatuor, blando calore et cola.

Oxymel Tabaci s. Nicotianae. (Wür.)

℞. Aceti Nicotianae partem unam.
Mellis albi partes duas.
Coque leni igne, ad syrupi consistentiam.

Oleum Nicotianae. (Gal. Wir. Fi. T.)

℞. Foliorum recentium Nicotianae libram unam.
Olei Olivarum uncias sedecim.
Coque ad consumptionem humidam usque et exprime. (Wir.)

Gal. digerere super cinere calido per horas viginti quatuor jubet Nicotianae libram unam in Olei Olivarum duabus et exprimere; operationem denuo cum novis foliis repetere, leviter coquere et exprimere; — *Fi. T.* item cum Foliorum recentium uncias duodecim, Olei Olivarum libris quatuor.

Reizend, bei Krätze, Frostbeulen, Eczemen und unschmerzhaften Geschwürsten gerühmt.

Linimentum Tabaci s. Nicotianae. (Am. C.)

℞. Foliorum Nicotianae unciam unam.
Axungiae Porci libram unam.
Coque, donec folia conteri possint et cola cum expressione.

Unguentum Nicotianae s. antiscrophulorum. (Br. Sar. Wir. Wür. Au. Pie. Sp. Vm.)

℞. Foliorum Nicotianae libras tres.
Succi Nicotianae uncias novem.
Axungiae Porci sesquilibram.
Post horas duodecim macerationis coque lente ad humidam consumptionem, cola exprimendo et adde
Resinae Pini uncias tres.
Cerae flavae sesquiunciam.
Pulveris Aristolochiae rotundae uncias tres.

Misce. (Br. Sar. Wir. Wür. Pie. Sp.)
Au. Succi Nicotianae uncias tres, Cerae flavae tantidem, Resinae Pini sesquiunciam, Terebinthinae unciam unam et Olei Myrrhae sufficientem quantitatem.

℞. Olei empyreumatici Nicotianae partem unam.
Colophonii partes duas.
Faeculae viridis Nicotianae partes quatuor.

Axungiae Porci partes duodecim.
Dissolve blando igne faeculam in axungia, adde colophonium et refrigerationis momento oleum affunde. (Vm.)

℞. Faeculae viridis Nicotianae partem unam.
Axungiae Porci partes quinque.
Dissolve. (Vm.)

Bei Scropheln, Krätze, Kopfgrind und atonischen Geschwüren empfohlen.

Unguentum mundificans Poterii s. depurans. (Sp.)

℞. Foliorum Nicotianae manipulos sex.
Butyri uncias viginti quatuor.
Terebinthinae uncias quatuor.
Post octo dies insolationis exprime et colaturae adde
Pulveris Gummi Ammoniaci,
— Galbani,
singulorum uncias duas.
Antimonii crudi,
Cinnabaris,
singulorum drachmas tres.

Myrrhae,
Olibani,
singulorum drachmas duas.
Zur Behandlung von Fisteigeschwüren empfohlen.

Ceratum tabacinum s. Nicotianae. (B^t.)

℞. Succi Nicotianae, Cerae flavae, singulorum uncias tres.
Resinae Pini sesquiunciam.
Olei Myrrhae quantum sufficit.

Von Construk bei Flechten ohne begleitende Entzündung und Schmerzen empfohlen.

Emplastrum Tabaci s. de Nicotiana. (Sp.)

℞. Foliorum Nicotianae uncias quatuor.
Olei Olivarum uncias duodecim.
Vini rubri uncias quinque.
Coque ad humidam consumptionem usque, exprime et adde
Cerae flavae,
Colophonii,
singulorum uncia duodecim.

Liquefactis adde

- Pulveris Tacamahücae,
 — Elemi,
 — Myrrhae,
 — Aloës,
 singulorum unciam unam.
 Olei essentialis Nicotianae
 uncias duas.

Nach Eriller bewirkt dieses Pflaster, auf den Unterleib gelegt, Stuhlausstörungen.

Unguentum antipsoricum cum Nicotiana. (Fer. Fi. T.)

- R. Pulveris Sulphuris,
 — Nicotianae,
 singulorum uncias duas.
 — Hellebori albi
 unciam unam.
 — Mari,
 — Nerii, singulorum sem-
 unciam.
 — Salis communis
 drachmas quinque.

Unguenti rosati . . . libram unam.

Misce exacte. (Fer. Fi.)

T. Omnium horum duplicem quantitatem indicat.

Nigella.

In den Pharmacopöen werden drei Pflanzen dieser Gattung angeführt:

1) *Nigella arvensis*, L.; Feldschwarz-
 kummel; Nigelle des champs (Gal.).

G.

⊙ (Polyandria Pentagynia, L.; Ranunculaceae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Hayne VI. t. 17. Blackw. Herb. t. 126.)

Man wendet den Saamen an, welcher schwarz, scharf und gewürzhaft ist.

2) *Nigella Damascena*, L.; Kapucinerkraut, Damasener Schwarzkummel; Nigelle de Damas, Barbiche, Barbe de capucin (Gal.).

Fer. Br.

⊙ Eine Pflanze des südlichen Europa's. (Blackw. Herb. t. 558.)

Der Saame, welchen man anwendet, ist klein, eckig, schwarz und hat einen starken, gewürzhaften Geruch.

3) *Nigella sativa*, L.; zahmer Schwarzkummel, schwarzer Koriander; Nigelle des jardins, faux lumin (Gal.); Small garden fennel flower, Devil in a bush (Ang.); Czerny neb zahradnj kmjn (S.); Hangernes kornrose (D.); Neguilla sativa (His.); Veldrigelle (Bel.); Nigella romana (I.); Nigella ordinaria (Lus.); Swart kummin (Suec.).

Br. Fer. Gal. His. Li. Suec. Wir.
 Wür. Be. Br. M. Sp. Z.

⊙ Eine in der Levante einheimische, im

südlichen Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 558. Plenck t. 49. Hayne VI. t. 16. Bert. Bild. II. 83. fig. 2. Zorn. Ic. pl. t. 119.)

Man wendet den Saamen (semen Nigellae s. Melanthii s. Cumini nigri) an; er ist klein, eiförmig oder länglich, fast dreieckig, an einem Ende stumpf, etwas zusammengedrückt, scharf gerunzelt, außen schwarz, innen grünlichweiß. Er hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen scharfen, gewürzhaften Geschmack.

Schwach reizend, mehr in der Küche als in der Medicin gebraucht.

N o s t o c.

Nostochium commune, Vaucher; gemeiner Nostoc, Kuttelspeichel; Nostoc commun, Crachat de lune, Salive de coucou (Gal.).

Br.

Eine Alge, welche in feuchtem Wetter auf der Erde wächst, und gar keine Wurzel besitzt. (Oed. Fl. Dan. t. 885. f. 2.)

Sie besteht aus einem, anfangs kugelförmigen, dann unregelmäßigen, gefalteten, welligen, sappigen, blasigen, gallertartigen, zitternden Laube von olivengrüner Farbe, welche beim Eintrocknen schwarz wird. Erweichend.

Nux Barbadensis.

Jatropha Curcas, L.; großer Wunderbaum, Barbadoßnußbaum; Pignou des Barbades, Médecinier, Grand haricot de Pérou (Gal.); Angular leav'd physic nut (Ang.); Mara harala (Can.); Rata endaru (Cy.); Bagherenda (Hin.); Dscharrak pagger (Ja.); Caut amanak (Tam.); Nepala, Adivie amida (Tel.).

Br. Gal. G. M.

Ein Strauch (Monoecia Monadelphia, L.; Euphorbiaceae, J.) Brasiliens, Surinams und Jamaicas. (Plenck t. 691. Desc. Pl. Ant. II. 141.)

Man wendet den Saamen, Purgirnuß (semen Ricini majoris, Ficus infernalis, Nux cathartica americana s. Barbadosensis) an; er ist eiförmig, etwas gedrückt, so groß wie eine Haselnuß, schwarzlich und runzelig. Der Geschmack ist scharf und brennend.

Purgirend.

Oleum Ricini Americani. (Sw*.)

R. Seminum Ricini Americanae

quantum visco.

Contunde in mortario; pastam sacco e tela confecto inclusam exprime.

Drahtisch, Brechen erregend, bei Pleur, Wurmern und hartnäckigen Hämorrhoiden empfohlen. — Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Nux vomica.

Brednuß, Krähenaugen; Noix vomique (Gal.); Pelson nut, vomiting nut (Ang.); Khanek-ulkeb (Ar.); Matsin (C.); Kodakadduruatta (Cy.); Braeknaede (D.); Kuehla (Duk. Hin.); Nuez vomica (His.); Breeknoeten (Bel.); Fungo di Levante, Noce vomica (I.); Noz vomica (Lus.); Culaka, Cutaka, Vescha mustibijum (Sa.); Recefkaka (Suec.); Yettie cottay (Tam.); Muscadi, Mustigheza (Tel.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Br. C. Fi. G. Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Sp.

Ein platter, runder, knopfförmiger Saame, von fast einem halben Zoll im Durchmesser auf eine bis zwei Linien Dicke, grau, an der Oberfläche etwas wollig, in der Mitte genabelt, von gleichsam hornartiger Beschaffenheit und ohne Geruch. Der Geschmack ist bitter, scharf und etwas widerlich.

Er kommt von *Strychnos Nux vomica*, L.; gemeines Krähenaugen; Vomiquier (Gal.), einem Baume (Pentandria Monogynia, L.; Apocynaeae, J.) Ostindien's. (Blackw. t. 395. Plenck t. 117. Lam. Ill. t. 119. Hayne I. t. 17. Bert. Bild. I. 84. fig. 1. Fl. méd. V. 249.)

Nach Pelletier und Caventou enthält er Strychnin und Sgafursäure. Auch findet man Brucin darin.

Eines der kräftigsten Arzneimittel, in etwas beträchtlicher Gabe ein Gift, welches krampfhaft und tetanische Contractioren hervorruft. Man wendet es bei Lähmung an. — Gabe des Pulvers, vier bis fünfzehn Gran.

Pulvis Nucis vomicae. (Au.)

℞. Nucis vomicae . . . grana tria.

Gummi Arabici,

Sacchari alb,

singulorum semiscrupulum.

Sufeland empfiehlt dieses Pulver bei Ruhr. — Man verschreibt täglich drei Stück. *Pilulae nervosum et musculare systema vellicantes s. stimulant.* (B. E.)

℞. Nucis vomicae . semidrachmam.

Conservae Rosarum

quantum sufficit.

Fiant pilulae decem. — Gabe, ein Stück zwei oder drei Mal täglich. (E)

℞. Nucis vomicae

granum unum ad sex.

Sacchari albi . . . semiscrupulum.

Roob Sambuci . . . quantum sufficit.

Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden. (B.)

Bei Lähmungen, Epilepsie, Weistanz, Hypochondrie, Hysterie, Melancholie.

Extractum Nucis vomicae aquosum. (An. B. Ba. Bor. Hass. Sax. Wir. Sw.)

℞. Nucis vomicae raspatae libram unam.

Aquae bullientis . . . libras octo.

Digere per horas viginti quatuor, tum coque per horae quadrantem et cola; residuum per quadrantem horae coquatur cum Aquae libris quatuor, quo colato, liquores commixti et post sepositionem decanthati ad extracti consistentiam evaporent. (An.)

B*. Ba. Hass. Sax. Wir. et Sw. fere eundem modum agendi nimirum coquere Nucem vomicam in Aqua nova, donec nullum amplius accipiat amaritiam, et decocta conjuncta evaporare; — Bor4 ut extractum cascarillae.

Reizend, giftig, bei Lähmung empfohlen. — Gabe, zwei bis zwanzig Gran, zwei oder drei Mal täglich und mit Vorsicht gestiegen.

Extractum Nucis vomicae alcoholicum.

(Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. HassP.

Sax. Ca. Ma. Pie. Vm.)

℞. Nucis vomicae raspatae

partem unam.

Alcoholis (22°) partes quatuor.

Calefac in vase tecto per horas viginti quatuor et cola exprimendo; residuum digere cum

Alcoholis (12°) partibus tribus.

Cola exprimendo; liquoribus commixtis, quarta pars in balneo aquae destillet; quod remanet ad extracti consistentiam evaporet. (Fer. Gal.)

℞. Nucis vomicae raspatae quantum vis.

Alcoholis (22°) quantum sufficit.

Digere, Alcoholen novum subinde sumendo donec neque colorem neque saporem accipiat; tinturas commixtas et filtratas destillatione ad quintam partem redige et quod remanet in balneo aquae consume. (Bel. Gal. Han. HassP. Sax. Pie. Vm.)

Bor4 destillatione ad quartam partem redigere et tunc ad consistentiam extracti spissioris balnei vaporis ope consumere jubet.

℞. Nucis vomicae raspatae quantum vis.

Alcohole, temperaturae quam maxime fieri potest, frigida penitus extracta, tinctura lente ad extracti consistentiam evaporet. (Ca. Ma.)

Reizend, giftig, bei Lähmungen jeder Gattung empfohlen. — Man giebt es in Pillen, deren jede einen Gran Extract enthält, indem man mit einer oder zwei anfängt und damit jeden Tag bis zum gewünschten Erfolg steigt. Auf diese Weise hat man die Gabe bis auf vier und zwanzig und dreißig Gran täglich erhöht, bis man tetanische Wirkungen erhielt; aber vier bis sechs Gran sind in den meisten Fällen ausreichend. Dieß gift von dem mit

vierziggrädigem Alcohol bereiteten Extract; das mit schwächerem Alcohol bereitete ist schwächer und enthält viele gummöse Theile.

Extractum Nucis vomicae siccum. (Ma.)

℞. Tincturae Nucis vomicae alcoholicae quantum vis.
Filtrata et in patinis evapora.

Man muß es so gesättigt als möglich und mit sechsunddreißiggrädigem Alcohol bereitet nehmen. — Gabe, ein bis zehn Gran allmählig.

Pilulae anthelminticae. (B.)*

℞. Gummi Ammoniaci,
Saponis Veneti,
Resinae Jalappae,
singulorum scrupulum unum.
Extracti Nucis vomicae alcoholici
semisrupulum.

Essentiae Succini quantum sufficit.
Fiant pilulae grani unius. — Gabe, zwölf Stück in der Woche.

Pilulae excitantes. (Bo.)

℞. Extracti Nucis vomicae resinosi,
Conservae Tiliae,
singulorum semidrachmam.

Fiant pilulae granorum duorum. — Bei Lähmung empfohlen. — Gabe, Morgens nüchtern, ein Stück und alle Wochen um ein Stück geküchelt.

Niemand hat mit Erfolg bei sogenannten spasmodischer Cardialgie eingranige Pillen gegeben, welche aus einem Theil Brechnußextract und fünf Theilen Stinkasand bestanden.

Emulsio cum Nuce vomica, Solutio Extracti Nucis vomicae. (B. Au.)*

℞. Extracti Nucis vomicae
grana decem.
Mucilaginis Gummi Arabici
unciam unam.

Aquae fontanae . . . unciis sex.
Von Huseland bei Ruhr gerühmt. — Gabe, zwei Eßlöfel alle zwei Stunden. — Man kann eine Unze Althee- oder Mandelsyrup zusetzen.

Decoctum Cucumerum cum extracto Nucis vomicae. (Au.)

℞. Extracti Nucis vomicae
semidrachmam.

Decocti Cucumerum unciis sex.
Olei Lini cum Vitello Ovi contriti
unciam unam.

Mellis semunciam.
Gabe, zwei Eßlöfel alle zwei Stunden. — Von Händel als ein vortreffliches Mittel in allen Stadien des Trippers empfohlen.

Tinctura Strychnos s. Nucis vomicae s. Nucum vomicarum. (B. Fer. Gal. Pharmacopoea universalis. II.)*

Li. Sax. Bo. E. Fl. Huf. Ma. Pie. Sw. T. Vm.)

℞. Nucis vomicae raspatae
partem unam.

Alcoholis Aqua diluti partes octo.
Infunde frigide per tres dies, tunc digere in balneo aquae per horas sex; cola exprimendo et filtra. (B*. Vm.)

Sw. Nucis vomicae sesquiunciam et Alcoholis (0,985) libras duas; — Sax. Nucis vomicae partem unam et quinque Spiritus rectificati; — B*. securidum Wiel, Nucis partem unam et quatuor Spiritus rectificati; — Gal. et Li. Nucis partem unam et quatuor Alcoholis (22°); — Huf. Nucis partem unam et sex Alcoholis; — T. Nucis vomicae unciis duas, Alcoholis (36°) libras duas; digere per octo vel decem dies calore 25 ad 30° C.

℞. Extracti sicci Nucis vomicae
grana tria.

Alcoholis (36°) . . . unciam unam.
Dissolve. (Fer. Gal. Bo. E. Fl. Ma. Pie.)

Diese Tinctur, welche anfangs unter dem Namen *Guttae uterinae Reginae Hispanicae* bekannt war, ist ein sehr kräftiges Reizmittel. Man giebt die von Bon Mons zu vierzig bis achtzig Tropfen, die von Magen die ebenfalls tropfenweise in irgend einem Trank. Die Indicationen sind dieselben wie für das alkoholische Extract. Man bedient sich derselben auch äußerlich in Einreibungen, bei Lähmungen und Atrophie einzelner Theile.

Guttae amarae. (Ca.)

℞. Spiritus Absinthii . libras duas.
Nucis Vomicae . libram unam.
Kali subcarbonici liquidi
semunciam.

Fuliginis puri drachmam unam.
Post dies quatuordecim infusionis in balneo aquae exprime et filtra. — Gabe, einen bis höchstens acht Tropfen in einem Glase eines bittern Aufgusses, gegen Windcolik.

Nymphaea.

Zwei Arten dieser Pflanzenzattung sind in der Medicin in Gebrauch:

1) *Nymphaea alba, L.*; weiße Seerose, Seebiume, Wasserlilie, Wasserrose, Saaturwurz; *Nenuphar blanco (Gal.)*; *White waterlily (Ang.)*; *Seebloomster (D.)*; *Nenufar blanco (His.)*; *Witte plompen (Bel.)*; *Nenufaro bianco (I.)*; *Wodna lilia (Pol.)*; *Nymphaea branca (Lus.)*; *Sjaeblad (Succ.)*.

℞. Fer. Gal. Gen. His. Wir. Br. Br. Fi. G. M. Sp.

2 (Polyandria Polygynia, L.; Nymphaeaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 602. Blackw. t. 498 499. f. 2. Plenck t. 429. Hayne IV. t. 35. Schk. t. 142. Pl. méd. V. 247.) Man wendet die Wurzel und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Nymphaeae albae s. Nenupharis s. Nenufaris) ist sehr lang, walgig, dick, knotig, fleischig, außen braun, innen gelblichweiß. Ihr Gewebe ist schwammig, der Geschmack bitterlich und etwas styptisch.

Die Blüthen haben einen angenehmen Geruch, welcher sich durch Trocknen verliert. Sie enthalten viel geschmacklosen Schleim.

Die Wurzel enthält viel Säge- und ist sehr nährend, ungeachtet sie nach dem Glauben des großen Hauens kühlende Eigenschaften besitzen soll. Die Blüthen zählt man ehedem zu den schmerzstillenden und beruhigenden Mitteln.

2) *Nymphaea lutea*, L.; gelbe Seebiume; Nenuphar jaune (Gal.).

Gal.

2) Eine Pflanze Europa's. (Hayne IV. t. 56. Blackw. Herb. t. 491.)

Die Wurzel hat Aehnlichkeit mit der vorigen. Die Blüthen sind gelb.

Species diamargaritae frigidae. (Vir.)

℞. Margaritarum orientalium drachmas sex.

Corallii albi,

— rubri,

Florum Boraginis,

— Nymphaeae albae,

— Rosarum rubrarum,

Granorum Kermes,

Ligni Aloës,

— Santali albi,

— citrini,

singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. — Man empfahl es ehedem bei Schwindsucht und in der Convalescenz von sogenannten bössartigen Fiebern. — Gabe, ein bis zwei Scrupel.

Species de gemmis frigidae. (Vir.)

℞. Eboris philosophice praeparati unciam unam.

Margaritarum orientalium praeparatarum . . . drachmas sex.

Corallii albi,

— rubri,

singulorum semunciam.

Hyacinthi,

Smaragdi,

Sapphiri,

Granati,

Santali albi,

— citrini,

— rubri,

singulorum drachmas tres.

Florum Boraginis,

— Buglossi,

— Nymphaeae,

singulorum drachmas duas.

— Rosarum drachmas tres.

Misce ut fiat pulvis, cui adde

Foliorum Auri . . . no. 20.

Ehedem bei Schwindsucht zur Verminderung der Nachtschweisse empfohlen. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Conserva Nymphaeae. (Sar.)

℞. Petalorum Nymphaeae contusorum, et cum Sacchari pauxillo in pulv. redactorum partem unam. Sacchari clarificati . partes tres. Ebulliant.

Aqua Nymphaeae. (Gal. Pal. Sar.)

℞. Florum Nymphaeae partem unam. Aquae . . . partes quatuor. Post horas sex infusionis destillet dimidia pars.

Infusum Florum Nymphaeae. (Sar.)

℞. Florum recentium Nymphaeae libras duas. Aquae bullientis . libras octo. Digere per octo horas et cola leviter exprimendo; operationem his cum novis floribus repete.

Syrupus Nymphaeae s. de Floribus Nymphaeae albae. (Gal. His.)

℞. Petalorum recentium Nymphaeae albae . . . libram unam. Aquae hüllientis libras quatuor. Infunde per horae quadrantem et cola leviter exprimendo; colaturae adde Sacchari albi . . . libras sex. Fiat syrupus. (His.)

Gal. infundere per horas duodecim jubet Petalorum libras quatuor in Aquae libris octo, colare et leviter exprimere, liquorem per aliquot horas reponere, tunc decanthare, addere Sacchari albi duplum et balnei aquae calore syrupum parare.

Potio antispasmodica. (Pic.)

℞. Emulsionis levis uncias quatuor. Syrupi Nymphaeae . semunciam. — Succini . drachmas duas.

O.

Oesypus.

Wollfett; Suint (*Gal.*); Yelk of wool (*Ang.*); Hisopo humedo (*His.*).

Ein blig-extractiver Stoff von äblem Geruch, welcher in der Schaafwolle steckt.

Das Wollfett enthält, nach Bauquelin, einen fetten thierischen Stoff und kohlen-sauren Kalk mit etwas essigsaurem und salzsaurem Kali.

Es kommt mit zu einigen Pfästern. — Die Spanische Pharmacopde läßt es durch Kochen mit einer hinlänglichen Menge Wasser reinigen, so daß man eine dicke Flüssigkeit erhält, welche man durch ein Seidensieb seicht und dann bis zur Consistenz eines weichen Extracts abbampft.

Olea.

Olivarum Oleum; Baumöl, Olivendöl; Huile d'olive (*Gal.*); Oil of olive (*Ang.*); Bomolie (*D.*); Aceyte comun (*His.*); Olyfoly (*Bel.*); Azeite (*Lus.*); Bomolja (*Succ.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Succ. WW. Be. C. M. Par. Sa. Sp. T.

Ein fettes, flüssiges, fast weißes, gelbliches oder grünliches, geruchloses und sehr süß schmeckendes Del. Es ist das leichteste aller fetten Oele und wird als Nahrungsgegenstand am meisten geschätzt. Die grüne Farbe desselben kommt vom Chlorophyll, die gelbliche, von einem vegetabilischen Stoffe, dessen Farbe erst sichtbar wird, wenn er der Luft ausgesetzt ist und sein Geruch rührt von einem andern eigenthümlichen Stoffe her.

Man erhält es durch Auspressen, Abkochung oder Gährung der Früchte des Delbaums, *Olea Europaea*, L., eines Baums (*Diandria Monogynia*, L.; *Jasminaceae*, J.) des südlichen Europa's (*Blackw.* t. 199 u. 213. *Plenck.* t. 11. *Dict. d. Sc.* nat. cah. 6. *Bert.* Bild. I. 27 f. 1. *Zorn.* Ic. pl. t. 369.) welcher aus Kleinasien seinen Ursprung herzuleiten scheint.

Patio oleosu. (Ra.)

℞. Potjonis gummosae uncias quatuor. Olei Olivarum . . . semunciam.

Auf eine einzige Gabe.

Emulsio o.rosa. (WW.)

℞. Oli Olivarum . . . unciam unam.

Vitelli Ovi no. 1.

Subige et adde

Aquae uncias septem.

Misce bene.

Clyasma oleosum. (R. Sw.)

℞. Decocti emollientis uncias novem.

Olei Olivarum . . . uncias tres.

Mell's unciam unam.

Addi potest Natri sulphurici vel Sals communis semuncia. (*Sw.*)

℞. Decocti Hordei,

Olei Olivarum,

singulorum uncias quatuor.

Misce. (*B.*)

Oleum laterum s. de lateribus s. pholosophorum s. olivarum empyreumaticum. (*Br. Pal. Sar. Wir. T.*)

℞. Laterum contusorum quantum vis.

Oleo Olivarum bene impraegnatos in cucurbita vitrea, in arenae balneo collocata destilla, igne gradatim aucto; oleum a phlegmate simul transeunte separa et nova destillatione cum cinere rectificata.

Reizend, ehebem für auflösend, schmelzend und säuflinverdring gehalten. Man bediente sich desselben auch zur Reinigung von Geschwüren.

Oleae Gummi

s. *Resina s. Balsamum*; Delbaumharz; Gomme d'Olivier (*Gal.*).

Gal. F.

In gelblichen Massen von etwas scharfem Geschmack und Vanillegeruch.

Ein Balsam, welcher in heißen Ländern aus verschiedenen wilden Delbäumen ausfließt.

Er besteht nach Pelletier aus Harz, etwas Benzoesäure und einem besondern Stoff, Olivile genannt.

Wird als abstringirend und reinigend betrachtet.

Oleum Palmae.

Palmae sebaceum; Palmöl; Huile de palme (*Gal.*).

Ams. Br. Ed. Gal. Suec. *Re. M. Sp.*

Ein steifes, butterartiges, goldgelbes Del von einem Weichengeruch und einem sehr süßen Geschmack.

Es kömmt von *Cocos butyracea*, L., Butterbaum, Cocotier du Brésil, einem Baume Südamerica's und Africa's (*Pis. Ind. res. nat. et med.* p. 215.), oder, nach Jacquin, von *Elais Guineensis*. (*Jacq. Stirp. Am.* 360. t. 257. *Bert.* Bild. II. 51. f. 2.)

Es zeichnet sich durch nichts vor andern fetten Oelen aus und man macht fast keinen Gebrauch davon.

Olibanum.

Thus, Thus verum, Gummi Olibani; Kéδqos; Weihrauch; Oliban, Encens (Gal.); Incense (Ang.); Luban (Ar. Mal.); Kadidlo (B.); Virok (D.); Avul cundur (Duk.); Inciensa (His.); Kundir zucl. r (Hin.); Wierook (Bel.); Incenso, Olibano, Cedro fenicio (I.); Incenso (Lus.); Kadzidlo biale (Pol.); Wirach (Succ.); Labaniya (Syr.); Paringhi sambrani (Tam.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wuir. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. T. Z.

Ein Gummiharz in länglichen, unregelmäßigen, erbsengroßen und mehr gefondberten, ober aneinandertklebenden oder je zwei und zwei zusammenhängenden Tropfen, in welchem letztern Falle man es Encens malle oder Encens femelle genannt hat indem man den Vergleich von der Ähnlichkeit seiner Form mit Brustwarzen oder Testikeln hernahm. Es ist trocken, brüchig, halbdurchsichtig, blaßgelb und außen mit einem mehligten Staub überzogen. Im Munde wird es weich und klebt an den Zähnen. Der Geruch ist balsamisch, besonders wenn man es verbrennt; der Geschmack etwas brennend und bitter. Die schönsten Erzeugnisse nennt man Olibanum electum (Encens choisi, Gal.), die unreinern Olibanum in sortis (Oliban en sorte, Gal.).

Man kennt die Pflanze, von welcher der Weihrauch kommt, noch nicht genau. Juniperus Lycia, Phoenicea und thurifera sind es wahrscheinlich nicht, obgleich viele Schriftsteller ihn davon herleiten. Solendrooke meint, er komme von Libanus thurifera, einem auf den Gebirgen Indiens wachsenden Baume (Decandria Monogynia, L.; Terebinthaceae, L.). Andere halten die Pflanze für eine Art Amyris. (A. Katsaf, Forsk.)

Reizend, als harntreibend und Wundmittel angesehen. — Gabe, eine halbe Drachme. — Flüssiger wendet man ihn in Räucherungen an als innerlich.

Pulvis Olibani compositus. (B.)*

- Rx. Pulveris Olibani,
— Corticum Aurantiorum,
singulorum grana decem.
— Corticum Quercus
grana quinque.

Misce. — Heberden rühmte es bei weißem Fluß. — Gabe, alle drei Stunden zugleich mit einer Abkochung von Eichenrinde als Getränk und als Einsprigung. Wahrscheinlich wirkt hier mehr die Eichenrinde.

Species fumales pro suffimento. (Ful.)

- Rx. Olibani,
Baccarum Juniperi,
singulorum uncias quatuor.
Succini,
Cascarillae,
singulorum unciam unam.
Florum Tanaceti . . . uncias duas.
Bei sogenannten kalten Rheumatismen empfohlen.

Pulvis pro suffimento. (RC.)

- Rx. Olibani,
Succini, singulorum partes tres.
Florum Lavandulae partem unam.
Misce.

Pilulae balsamicae. (Au. Sa.)

- Rx. Extracti Cascarillae drachmas duas,
Succi Liquiritiae,
Olibani, singulorum drachmas quinque.
Crocii . . . scrupulos quatuor.
Balsami Peruviani
scrupulum unum.
Fiant pilulae granorum duorum. (Au.)

- Rx. Olibani,
Gummi Arabici,
Succi Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.
Balsami Peruviani quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor. (Sa.)
Gabe, vier bis acht Stück, täglich zwei Mal, bei sogenannten asthenischen Blutspen. — Von Heil empfohlen.

Haustus ex Olibano, Potio excitans. (Au. Sw.)

- Rx. Olibani,
Sacchari albi,
singulorum semidrachmam.
Aquae . . . drachmas decem.
Tincturae Corticum Aurantiorum
drachmas duas.

Misce. (Sw.)

- Rx. Olibani . . . semidrachmam.
Mellis . . . quantum sufficit.
Aquae alexiteriae simplicis
sesquunciam.
— spirituosae Piperis Jamaicensis,
Syrupi balsamici,
singulorum drachmas duas.

Misce. (Sw.)

Zweimal täglich bei weißem Fluß.

O n o n i s.

Resta bonis; Arrête-boeuf (Gal.).
In den Pharmacopöden sind zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:
1) *Ononis Arvensis, L.*; Ackerhauhechel;
Bugrane des champs (Gal.).

An. Br. Gal. Würr.

4 (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (All. Flor. Pedem. I. p. 317. t. 41. fig. 1.)

Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der der folgenden Art.

2) *Ononis spinosa*, L.; stachelige Hauhechel, Ochsenbrechhauhechel, Ochsenbrechpurzel; Bugrane épir-use (Gal.); Thonéd rest narrow (Ang.); Ossenbrecke (Bel.); Anonide, Arresta bove, Barbonaccia, Bonaga (L.); Wilzyny (Pol.).

A. Ams. Bor. Bor4. D Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Pal. Sax. Wir. Br. Fi. G. M. Sp.

Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Blackw. t. 301. f. 1. Plenck t. 553. Düss. off. Pfl. VH. t. 19. Zorn Ic. pl. t. 132.)

Man wendet die Wurzel (radix Ononidis s. Restae bovis) an; sie ist kleinen Fingers dick und stärker, rund, sehr flebrig, außen dunkelbraun, inwendig weißlich, geruchlos und von schleimigem Geschmack.

Beide Wurzeln werden als harntreibend angesehen.

Aqua Ononidis. (Sar.)

℞. Herbae recentis Ononidis contusae partem unam.

Aquae . . . partes duas.

Destillant trientes duo.

Apozema aperiens et tonicum. (Bo. Pic.)

℞. Radicis Ononidis unciam unam.

— Eryngii . . . semunciam.

Cascarillae,

Foliorum Cichorii,

— Taraxaci,

singulorum manipulum dimidium.

Aquae . . . quantum sufficit ut coquendo colaturae vitrum unum obtineatur, cui adde

Natri sulphurici drachmam unam.

Salis Ammoniaci grana quindecim.

Syrupi Cichorii compositi

unciam unam.

Tartari chalybaeati

scrupulum unum.

Misce bene. (Bo.)

Pic. Tartarum chalybaeatum et sal ammoniacum omittit.

Bei viertägigem Fieber, Morgens nüchtern, zehn oder zwölf Tage hintereinander.

O n o s m a.

Onosma echioides, L.; natterkopfige Lemwurz; Orcanette jaune (Gal.); Smalt yellow alcanet (Ang.); Wolowy gazyk cerweny (R.).

Gal. Br. Z.

4 (Pentandria Monogynia, L.; Bo-

ragineae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (Jacq. Aust. t. 295. Schk. t. 31. Plenck t. 81.)

Man wendet die Wurzel an, deren Rinde einen gelbfärbenden Stoff enthält. — Abstringirend.

Wir bringen hier zwei unter *Alcanna* (f. *Anchusa tinctoria*) übergangene Präparate bei:

Unguentum rubrum potabile. (Pal. Wir. Sp.)

℞. Radicis Alcannae libram unam.

Vini rubri . . . semilibram.

Post aliquot dies frigidae macerationis adde

Butyri recentis . . . libras sex.

Coque ad humidam consumptionem usque et cola cum expressione

Unguentum rubrum ad labia oris, Ceratum labiale. (Wir. T.)

℞. Radicis Alcannae sesquunciam.

Cerae albae . . . drachmas sex.

Olei Amygdalarum dulcium

uncias duas.

Vini rubri . . . uncias tres.

Radicem concisam in vino macera, adde oleum et coque lente ad humidam consumptionem usque, in fine ceram addendo; exprime et massam Aquae Rosarum infunde; post refrigerationem liqua hlando igne, adde Olei Cinnamomi guttas decem et in capsulas chartaceas infunde.

T. Cerae flavae uncias duas cum dimidia, Olei Olivarum uncias quatuor, Radicis Alcannae frustum, per aliquot tempus in balneo aquae relinquere et mixturae jam concreoscenti aliquot guttas Olei de Cedro addere.

O p h i o g l o s s u m.

Ophioglossum vulgatum, L.; Schlangenzunge; Ophioglossum, Langue de serpent (Gal.); Adders tongue (Ang.); Slangstunge (D.); Lingua de sierpe (His.); Natertong (Bel.); Lingua di serpente (Lus.); Laeke tunga (Suec.).

Gal. Wir. Sp.

⊙ oder 4. (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine Pflanze, welche man in ganz Europa antrifft. (Blackw. t. 16. Moris. III. t. 5. f. 1. Oed. Fl. Dan. t. 147.)

Man wendet das Kraut (herba Ophioglossi s. Echioglossi s. Linguae serpentariae) an; es besteht aus umfassendem, stunden, stumpfen, ganzen, glatten, rippenlosen Laub und hat keinen Geruch, aber einen schleimigen und süßlichen Geschmack.

Ehedem hielt man es für ein Wundmittel.

O p i u m .

Opium thebaicum, Succus thebaicus, Meconium; Mohnsaft, Opium (Gal.); Meconium (Ang. Pol.); Ufiun (Ar. Mal.); Hapium (Ba.); Abim (Cy.); Afim (Duk.); Opio (His. I. Lus.); Ufiun (Hin.); Turk heulzap (Bel.); Apium (Ja.); Garappa (Mal.); Schirik, Haskasch (Pe.); Apagnum (Sa.); Apini (Tam. Tel.); Madjun (Tu.).

A. Am. Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DI). Du. Ed Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LouN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. A. Be, Br. C. Fi. M. Par. Pid. Sa. Sp. T.

Ein fester verhärteter Saft, welcher zum Theil auf Einschnitte aus den noch nicht reifen Kapseln des Mohns (Papaver somniferum und officinale) (Hayne VI. 40. Blackw. t. 482. 483. Plenck. 417. Düss. off. Pf. VII. t. 24. X. t. 3. Lam. Ill. t. 451. Bertr. Bild. I. 99. f. 1.) ausfließt, zum Theil aber auch durch Auspressen der zerstampften Pflanze gewonnen wird.

Man unterscheidet im Handel zwei Sorten Opium, das Türkische und das Indische. Das erstere besteht in runden, gleichartigen, trocknen, berben, schweren, undurchsichtigen, dunkelbraunen (röthlich-braunen) Kuchen von glänzendem Bruche, welche einen ekelregenden, bittern, scharfen, etwas brennenden Geschmack und einen unangenehmen, ganz eigenthümlichen Geruch besitzen. Das zweite ist bei weitem nicht so konsistent, bisweilen auch flüssig wie Pech und stets zähe. Es hat eine weit dunklere Farbe, einen ekelhafteren, weniger bitteren Geschmack und einen etwas brenzlichen Geruch.

Es ist weit weniger geschätzt und weniger theuer als das andere.

Ungeachtet man sich seit einigen Jahren viel mit Untersuchung der chemischen Zusammensetzung des Opiums beschäftigt hat, so scheint es doch, als sey man noch zu keinem vollständigen Resultate gekommen; wenigstens bleiben wohl noch manche Bestandtheile darin zu entdecken, deren Gegenwart man bis jetzt nur vermutet. Die wichtigsten der bis jetzt bekannten sind die Narcotine, Narcotin, Opian und ein organisches Alkali, welches Serturner entdeckte, die Morphine oder das Morphin, Morphinium, welches sich darin mit einer ebenfalls eigenthümlichen Säure, der Meconsäure, Wahnsäure, vorfindet.

Man hat viel über die Wirkung des Opiums gestritten; Manche halten es für ein kräftiges Reizmittel, Andere für ein unmitttelbar beruhigendes, nie reizendes Mit-

tel. Das Wahre ist, daß es in einer bestimmten Gabe, welche für jedes Individuum verschieden ist, eine reizende Wirkung hervorbringt; in stärkerer Gabe aber beruhigend wirkt, geschehe dieß nun durch einfache Reoulston oder durch unmittelbare Einwirkung auf das Nervensystem, was noch ein Räthsel ist; und daß es in noch höherer Gabe endlich Vergiftung zu Wege bringt. Die Perser, Türken, Chinesen, Syrier, Malaien, welche große Mengen davon auf einmal verzehren, empfinden davon ähnliche Wirkungen, als die Liebhaber geistiger Getränke in unsern Gegenden.

Da das Opium oft mit fremden Stoffen verunreinigt ist, so schreiben mehrere Pharmacopöen (Ams. An. Da. Gal. Sw.) eine Reinigung desselben vor. Einige (Ams. An. et Gal.) lassen es in kochendem Wasser erweichen, den Brei durch Leinwand drücken und es dann bis zur erforderlichen Consistenz abdampfen. Die übrigen (Du. Sw.) lassen es in Weingeist auflösen, die Flüssigkeit filtriren, destilliren, um den Alcohol zu trennen, und sie dann gehörig abdampfen. Fi. u. T. lassen, außer dem letztangegobenen Verfahren noch den Saft mit Regenwasser digeriren u. Das auf diese Weise gereinigte Opium führt den Namen *Opium depuratum s. colatum, Extractum Opii siccum*. Ehedem nannte man es rohes Opium (*Opium brutum s. crudum*), Opium brut ou cru (Gal.).

§. I. Präparate, welche nur einen Theil der Bestandtheile des Opiums mit oder ohne das zu ihrer Ausziehung bereitete Menstruum enthalten.

A. Auszug durch Destillation.

Aqua Opii. (P*. Bor4. Sax. Sw*. Vm.)
R. Opii crudi . . . partem uam.
Aquae communis partes decem.
Destillet liquidi pars dimidia. (P*. Sax.)

Bor4. Opii puri unciam unam, Aquae fontanae quantum satis ut destillando unciae sex obtineantur; — Sw*. destillare jubet partes sex mixturae ex Opii parte una et duodecim Aquae; — Vm. Opium in Aquae partibus sex dissolvere et liquorem ad siccum usque destillare.

Man kennt noch nicht die Zusammensetzung dieses destillirten Wassers, in welchem man das sogenannte giftige oder betäubende Princip des Opiums sucht und welches nach manchen Schriftstellern mit mächtigen narcotischen Kräften begabt seyn soll, das aber wahrscheinlich nicht viel Arzneikräfte besitzt. — Gabe, zwei bis sechs Drachmen mit Zuckersyrup.

B. Zusatz durch Essigsäure.

Acetum Opii s. opiaceum, Tinctura Opii acetosa. (Vm.)

℞. Opii concisi . . . partem unam.
Alcoholis . . . partes sex.
Macera per horas viginti quatuor in balneo aquae tepido. Adde deinde Aceti albi . . . partes sex.
Stent in maceratione frigida per plures dies; tum colata cum expressione filtrantur.

Guttae nigrae, Essentia nigra anglica. (Am. B, GalF. C, Pal. Vm.)*

℞. Opii . . . semilibram.
Aceti Vini . . . octarios tres.
Nucis moschatae contusae . . . sesquiunciam.

Crocii . . . semunciam.
Coque ad aptam consistentiam usque et adde

Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Fermenti Cerevisiae unciam unam.

Stent in digestionem per septem septimanas, tunc aëri exponentur, donec syrupus sit perfectus, qui colatus in lagenas infundatur addito Sacchari paulillo. (Am. B. GalF. C.)

Vm. miscere jubet Opii partes sex, Sacchari albi tres, Nucis moschatae unam cum dimidia, Crocii unam et Aceti Pomorum quadraginta octo, addere Fermenti Cerevisiae partem unam, infundere in vas planum et tectum et mixturam actioni aëris sicci relinquere, donec liquor supernatans syrupi consistentiam acquisiverit, tum decanthatum servare.

Dieses bei den Engländern unter dem Namen *black drops* oder *quaker's black drops* sehr berühmte Präparat verbant seine Wirkung wahrscheinlich dem während der Operation gebildeten essigsauren Morphin.

Man findet schon etwas Ähnliches in dem Formular der Republik Genua (1791) unter dem Namen *Aethiops vegetabilis (Opium torrefactum, Pulvis stagnoticus. Fi.)*. ℞. Opii quantum vis; crucibulo vitreato immittatur; sub agitatione adspargatur pluries vinum album; refrigeratum et pulveratum comburatur simulque denuo humectetur vino; ad dimidium pondus redacto addatur acetum acerrimum, dein siccatur massa. Es mußte etwas Morphin frei werden, welches sich endlich mit der Essigsäure verband.

Extractum Opii acetosum. (Pae.)

℞. Opii concisi . . . unciam unam.
Aceti destillati . . . octarium unum.

Digere per horas quadraginta octo ex arenae balneo, subinde agitando; decanthata et filtrata ad massae pilularis consistentiam evaporent.

Laudanum de Lalouette. (Pie.)

℞. Extracti Opii acetosi drachmas sex.
Vini Hispanici . . . uncias decem.
Aquae Vitae . . . uncias duas.
Eine Drachme der Auflösung enthält vier Gran Extract.

Laudanum nepentes Quercetani s. opatum. (Fi. T.)

℞. Opii concisi . . . uncias duas.
Aceti . . . libras duas.

Digere et cola pluries ad extractonem usque; liquores commixtos ad extracti consistentiam consume. Tunc recipe

Extracti hujus . . . uncias duas.
— Croci . . . unciam unam.

Oculorum Cancri praep. . . drachmas duas.

Boli albae porph. drachmam unam.

Fiat pasta, quae evaporatorii vel aëris ope evaporet. (T.)

Fi. Qcutorum Cancri drachmas sex. Mixtura Sylvii. (Pic.)

℞. Opii . . . grana duo.
Aceti destillati . . . semunciam.

Aquae Plantaginis . . . uncias sex.
Syrupi Papaveris albi . . . unciam unam.

Bei Blutsprien mit Krämpfen empfohlen. — Köstliche.

Collutorium antidontalgicum. (B)*

℞. Radicis Piarnicae drachmas duas.
Salis Ammoniaci drachmam unam.

Opii puri . . . grana duo.
Aquae Salviae destillatae, . . .

Aceti, singulorum . . . uncias duas.

Post unam horam digestionis in balneo aquae cola. — Bon Mayr vorge schlagen.

Topicum leniens s. sedativum. (Bo.)

℞. Foliorum Hyoscyami,
Petalorum Rhoeados,

singulorum unciam unam.
Opii in Aceti sufficiente quantitate soluti . . . grana sex.

Contunde simul ut fiat pasta. — Gegen heftigen Kopfschmerz auf den Kopf zu schlagen.

C. Zusatz durch Wein.

Tinctura Opii vinosa s. simplex s. thebaica genuina. (Ams. Bel. D. Han. Hass. Li. Suec. Fid. Sw. Vm.)

℞. Opii . . . partem unam.
Vini Hispanici partes duodecim.

Post tres dies filtra. (D.)

Vm. Vinum Maderanum et infusio-

nem per mensuram; — Hass. *Pid.* et *Sw.* Opii partem unam, Vini Hispanici octo et digestionem blando calore per unum vel duos dies; — Suec. Opii partem unam, Vini albi sex et octo dies frigidae macerationis.

℞. Opii . . . partem unam.
Vini Malacensis . . . partes octo.

Aquae Vitae (0,907) partes duas.
Post duos dies digestionis cola. (Ams.
Bel. Han.)

℞. Opii uncias duas, Aquae Vitae
quatuor et Vini albi libram unam.
Vinum opiaceum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . . . grana decem.
Vini rubri . . . unciam unam.
Mi. ce.

Fomentatio leniens. (Pie.)

℞. Opii concisi . . . unciam unam,
Vini rubri vel albi sesquioctarium.

Cogendo dimidium consume. — Bei
gichtlichen Schmerzen, Rheumatismen und
Kolik von Nutzen. — Man trinkt Stü-
cke Flanell damit.

*Extractum Opii vinosum, Laudanum
opiatum.* (Gal. Hass. Pid. T. Vm.)

℞. Opii erudi . . . quantum vis.
Vini albi . . . quantum sufficit.

Digere in balneo aquae, cola forti-
ter exprimendo, sepone, decantha et
halnei aquae ope ad extracti consisten-
tiam consume. (Gal.)

Hass. et Pid. Vini duodecuplum Opii
pondus indicant.

℞. Opii in frustula minora concisi
partem unam.

Vini Maderani . . . partes sex.

Macera frigide per plures dies et
cola exprimendo; macerationem resi-
dui repete cum aequali quantitate novi
Vini et colaturas commixtas blando
calore, continue agitando, consume.
(Vm.)

T. Opii uncias quatuor, Vini albi ge-
nerosi libras duas, post dies duos dige-
stionis loco tepido filtra per telam cum
expressione, faeces digere cum dimidia
Vini antea adhibiti parte; liquores com-
mixti et sepositione clarificati ad ex-
tracti consistentiam evaporent.

Dieses Extract enthält mehr Narcotin
und Harz, als das wässerige Extract, au-
ßerdem enthält es aber auch noch alle Ele-
mente des Weins, den Alcohol ausgenom-
men, wodurch es noch schlechter wird; denn
da die Quantität dieser Stoffe je nach der
Weinforte verschieden und stets unbekannt
ist, so kann man nicht genau wissen, wie
viel Opium jedesmal in einer bestimmten
Dosis Extract enthalten ist.

Syrupus opiatius s. Opii vinosus. (Bor.

Pol. Sw. Vm.)

℞. Opii . . . partem unam.

Vini Maderani partes duodecim.

Infunde per dies duos, blando calore,
cola fortiter exprimendo et adde

Sacchari albi . . . partes viginti.

Solve blandi caloris ope et commis-
ce cum

Syrupi communis
partibus centum sexaginta,

Serva. (Vm.)

℞. Extracti Opii

grana viginti quinque.

Vini Malacensis . . . unciam unam.

Dissolve et adde

Syrupi Liquiritiae

uncias viginti quatuor.

Serva. (Bor.)

Pol. loco syrui liquiritiae illumf Al-
thaeae, et Sw. Syrupum Sacchari.

*Tinctura vinosa Opii et aromatica,
Vinum Opii, Vinum aromaticum opia-
ceum, Vinum aromo-opiaceum.* (Am.
Ed. Lon. Br. C.)

℞. Extracti Opii . . . unciam unam.

Cinnamomi contusi,

Caryophyllorum cantasorum,

singulorum drachmam unam.

Vini albi Hispanici uncias sedecim.

Macera per octo dies et cola. (Ed.
Lon. C.)

Am. Opii uncias duas; — Br. Opii
uncias duas, Cinnamomi, Caryophyllo-
rum, singulorum drachmam unam et
Vini libram unam.

℞. Extracti Opii pulverati

uncias duas.

Aquae Cinnamomi uncias decem.

Alcoholis . . . uncias duas.

Vini albi . . . uncias quatuor.

Digere, subinde agitando, per sex
dies et filtra. (Br.)

*Laudanum liquidum s. crocatum s.
compositum, Tinctura Opii vinosa cro-
cata.* (Ful. R. Sax.)

℞. Opii pulverati . . . partem unam.

Croci . . . partem dimidiam.

Vini Hispanici . . . partes novem.

Stent in maceratione per tres dies,
leni calore et colentur. — Eine Drach-
me enthält ungefähr zehn Gran Opium.

*Vinum Opii crocatum, Elixir Papa-
veris, Essentia Papaveris.* (Fenn. Suec.
Vm.)

℞. Opii,

Croci,

singulorum drachmas quinque.

Succi Liquiritiae sesquiunciam.

Vini Maderani . . . uncias triginta.

Digere frigide, decantha et filtra.
(Vm.)

Fenn. Opii, Croci, singulorum scrup-
ulos quinque, Succi Liquiritiae sem-
unciam et Vini Hispanici uncias de-
cem; — Suec. Succi Liquiritiae, Cro-
ci, Opii, singulorum scrupulos quin-
que et Vini uncias decem.

*Laudanum liquidum Sydenhami s.
compositum, Tinctura laudanum s. ano-
dyna s. Opii crocata s. vinosa Opii Sy-
denhami, Vinum Opii aromaticum s.
crocato-opiatum s. Opii compositum s.
paregoricum.* (Ams. B. Bor. Bor4. D.)

Per. Gal. Han. HassP. His. Li. Pal.
Sar. Ca. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Opii unciam unam.

Croci semunciam.

Cinnamomi drachmam unam.

Vini Malacensis uncias novem.

Post tres dies digestionis cola. (Li.)

— Eine Drachme enthält ungefähr zehn
Gran Opium.

℞. Opii uncias duas.

Croci unciam unam.

Cinnamomi drachmas duas.

Alcoholis uncias tres.

Vini Hispanici libram unam.

Post aliquot dies digestionis exprime
et filtra. (Fer. Fi.)

℞. Opii concisi uncias duas.

Croci unciam unam.

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

singulorum drachmam unam.

Vini Malacensis libram unam.

Digere leni calore per dies quatuordecim,
subinde agitando; cola fortiter
exprimendo et filtra. (Ams. B. Ba. Br.
Gal. His. Pal. Sax. Wir. Ca. Sp. Sw.)

D. Croci semunciam; — HassP. Croci
drachmas sex et Vinum Hispanicum;
— Bor. Han. et Pal. Opii uncias qua-
tuor, Croci sesquiunciam, Caryophyl-
lorum, Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae),
singulorum drachmas duas,
Vini Malacensis libras duas; — Boré.
Vini uncias triginta octo. Pond. sp.
f. 045 — 1,055.

Sar. Opii semunciam, Croci drach-
mas duas, Cinnamomi semidrachmam,
Caryophyllorum tantidem et Vini Ma-
derani uncias quatuor cum d. midia.

Bestere Formel enthält demnach etwas
mehr Opium, als die übrigen, von denen
zwanzig Tropfen, d. h. fünfzehn Gran,
einen Gran Opium enthalten.

℞. Cinnamomi,

Caryophyllorum,

singulorum partem unam.

Croci partes octo.

Vini Maderani partes nona-

ginta duas.

Infunde per horas viginti quatuor in
balneo aquae tepido, cola exprimendo,
in colatura infunde frigide et absque
agitatione

Opil partes sedecim.

Post dies decem vel quatuordecim
decantha et filtra (Vm.)

℞. Croci semunciam.

Cinnamomi pulverati,

Caryophyllorum,

singulorum drachmam unam.

Vini Hispanici uncias octo.

Digera, subinde agitando, per tres
dies; in colatura dissolve

Opii depurati unciam unam.
Post horas viginti quatuor digestio-
nis filtra. Residuo aromatico infunde

Vini Hispanici uncias quatuor.

Post sufficientem digestionem forti-
ter exprime; in colatura digere resi-
duum operationis et post filtrationem
utrumque vinum commisce. (An. Bel.)

℞. Opii puri uncias quatuor.

Digere evaporatorii calore per tres
dies in Alcoholis diluti 20° B.; interea
digere

Croci sesquiunciam.

Cinnamomi semunciam

in

Alcoholis 20° B. uncias decem.

Digere totum per tres dies, filtra per
linteum exprimendo, deinde per char-
tam etc. (T.)

Es ist Jedermann bekannt, welchen Ruf
dieser Opiumwein genossen hat und noch
genießt. Merkwürdig sind Sydenham's
eigene Worte darüber: Hanc nostram
praeparationem Laudani officinarum
solido antefereudam virtutibus quidem
non obcenso, sed formam saltem com-
modiorem et majorem dosis certitudi-
nem eidem antepono. Reinet bei an-
dern Erfinder neuer Präparate hat die Be-
scheidenheit dieses Englischen Arztes.

Cataplasma anodynum. (Ca.)

℞. Farinae Seminis Lini,

— Hordei,

singularum libram unam.

Decocti Capiti Papaveris

quantum sufficit.

Coque ad requisitam consistentiam
et cataplasmati infunde

Laudani liquidi Sydenhami drach-
mam unam vel duas.

Bei Entzündungen mit heftigen Schmerzen.

Cataplasma ad cancerum. (Ful. Vm.)

℞. Pulvae Carotae radicum flavarum

partes viginti quatuor.

Faeculae Cicutae viridis siccatae

partes quatuor.

Laudani liquidi Sydenhami

partem unam.

Contere in mortario. (Vm.)

℞. Roob Dauci libram unam.

Pulveris Cicutae uncias duas.

Laudani liquidi Sydenhami

drachmas tres.

Commisce bene. (Ful.)

Als Verbesserungsmittel des Geruchs und
um die Schmerzen bei offenem Krebs zu
stillen, gepriesen.

Clyster sedativum. (Sy.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas
quadraginta ad sexaginta.

Olei Olivarum vel Lini

uncias quatuor.

Misce agitando.

Linimentum narcoticum s. opiaceum.
(ParC. Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
partem unam.

Olei Olivarum . . . partes octo.
Commisce. (Ra.)

ParC. Laudani partem unam et Olei
Amygdalarum dulcium sedecim.

Ceratum opiaceum. (Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydephami
unciam unam.

Cerati Galeni . . . libram unam.
Misce terendo.

Unguentum s. Pomatum opiaceum. (Sm.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drach-
mas duas ad quatuor.

Cerati Galeni . . . uncias duas.
Farinae Tritici quantum sufficit
ad spissam reddendam miscellam.

Man bringt diese Salbe mittelst seiner
Feinwand auf Brandflecken. — Ein sehr
starker wässriger Aufguß des Opiums wür-
de vorzuziehen seyn.

Linimentum narcoticum. (Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
partem unam.

Balsami tranquilli
partes triginta duas.

Commisce bene.

℞. Laudani liquidi . . . partem unam.
Balsami tranquilli partes quatuor.

— Fioravanti . . . partes octo.
Misce exacte.

Linimentum sedans, Pomatum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale. (Pie. Sm.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
drachmas quatuor.

Unguenti populei . . . uncias duas.
Vitellorum Ovorum recentium

no. 2.

Tritura simul. (Sm.)

℞. Unguenti populei . . . semunciam.
Opiti crudi in Vino albo dissoluti

grana quindecim.
Concharum praeparatarum

semidrachmam.

Vitelli Ovi . . . unius.

Olei Lilliorum quantum sufficit.

Misce bene. (Pie.)

Besonders zur Stillung von Hämorrhoi-
dalschmerzen empfohlen.

Unguentum antiophthalmicum. (Pie. Sm.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
drachmam unam.

Albuminum Ovorum recentium
no. 2.

Aquae Rosarum,

Aquae Plantaginis,
singularum quantum sufficit.
Subjige bene.

Linimentum opiato-camphoratum s. opiaceum camphoratum. (Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
semunciam.

Camphorae . . . drachmas duas.

Olei Amygdalarum dulcium
uncias duas.

Linimentum anodynum. (Ful. Ca. Pie.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Camphorae,

singularum partem unam.

Unguenti Althaeae partes sedecim.
Misce triturando.

Linimentum antispasmodicum. (Ham.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Tincturae Cantharidum,

singularum drachmas duas.

Camphorae . . . drachmam unam.

Olei Hyosciami . . . unciam unam.

Linimentum opiaceum et saporatum s. opiato-saponaceum. (Ful. Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
drachmam unam ad duas.

Saponis albi . . . semunciam.

Olei Olivarum . . . uncias quatuor.

Commisce. (Ra.)

℞. Balsami Saponis . . . uncias duas.

Laudani liquidi drachmam unam.

Misce triturando. (Ful.)

Als beruhigend, lindernd und auflösend
empfohlen.

Pilulae lenientes s. sedantes et bechicae.
(Pie.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
guttas viginti.

Gummi Ammoniaci

scrupulum unum.

Fiant pilulae quatuor. — Gabe, zwei
Stück und mehr.

Pilulae narcoticae. (Pie.)

℞. Sacchari crystallisati
unciam unam.

Cinnamomi . . . drachmas duas.

Piperis,

Laudani liquidi Sydenhami,

singularum drachmam unam.

Coriandri . . . scrupulos duos.

Croci . . . semidrachmam.

Moschi . . . semiscrupulum.

Syrupi Capiti Paveris

quantum sufficit.

Diese Pillen gelten als beruhigend und
schweißtreibend. — Gabe, von einem hal-
ben Scrupel bis zur halben Drachme.

Julapium leniens s. sedativum. (Bo. Pic. Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas duodecim.
 Aquae unciam unam.
 Syrupi drachmas duas.
 Auf eine einzige Gabe. (Ra.)
 ℞. Julapii gummosi uncias quatuor.
 Laudani liquidi semidrachmam.
 Misce bene. (Ra.)
 ℞. Syrupi Limonum unciam unam.
 Laudani liquidi guttas quindecim ad viginti.
 Tincturae Ipecacuanhae aquosae cochlear majus unum vel duo.

Aquae Florum Aurantiorum uncias duas.

Misce sedulo. (Bo. Pic.)

Clyster sedativum. (Sy.)

℞. Amyli sesquidrachmam.
 Adde sensim, continue triturando,
 Aquae bullientis . . . semilibram.
 Coque leviter et colaturae adde
 Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam.

Injectio leniens s. depressans. (Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam.
 Decocti Seminis Lini libram unam.
 Commisce.

Mixtura anodyna, Haustus anodynus. (Gen. Bo. Pic. Sm.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami scrupulos duos.
 Aquae Cinnamomi simplicis uncias sex.

Misce. (Pic. Sm.)

℞. Laudani liquidi drachmam unam.
 Aquae Cinnamomi hordeatae uncias sex.

Syrupi Caputum Papaveris unciam unam.

Misce. (Bo.)

Barthez verschrieb diese Mixtur bei sogenanntem krampfhaften Magenschmerz. — Gabe, ein Eßlöffel, vor der Mahlzeit zu nehmen.

℞. Laudani liquidi guttas octodecim.
 Pulveris relaxantis . . grana tria.
 Aquae fontanae . . . unciam unam.
 Syrupi Limonum drachmam unam.
 Misce sedulo. (Gen.)

Mixtura opiacea. (Sa.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami semidrachmam.
 Aquae Menthae piperitae uncias sex.
 Syrupi Sacchari unciam unam.
 Eßfelweise.

Potio paregorica. (Sa.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas duodecim.
 Aquae Rhoeados unciam unam.
 Syrupi Caputum Papaveris sesquiunciam.
 Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

Haustus tonicus adstringens, Potio tonica adstringens. (B.)

℞. Radicis Colombo drachmas duas.
 Aquae bullientis quantum sufficit ad infusionem unciarum octo, quarum colaturae adde
 Laudani liquidi Sydenhami semidrachmam.

Aetheris sulphurici guttas viginti.
 Bei Verdauungsbeschwerden allmählig zu nehmen.

℞. Cascariillae,
 Colombo,

singulorum drachmas duas.
 Aquae bullientis quantum sufficit ad unciarum septem infusionem; colaturae adde

Laudani liquidi Sydenhami,
 Aetheris sulphurici,
 singulorum guttas viginti.
 Bei chronischer Diarrhoe allmählig zu nehmen.

Potio antihæmorrhagica. (Sm.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas quindecim.
 Tincturae Cinnamomi drachmas quatuor ad unciam unam.
 Syrupi Consolidæ majoris uncias duas.

Aquae communis uncias quatuor.
 Gegen Mutterblutflüsse von Atonie. — Gabe, einen Eßfel alle Viertel, alle zwei oder alle Stunden, je nach der Beschaffenheit des Falls.

Potio hypnotica. (Pic.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas quinque.
 Syrupi Nymphaeae uncias duas.
 Aquae Florum Tiliae,
 — Aurantii,
 singulorum uncias duas.
 Auf zwei Mal zu nehmen.

Aqua aromatica cum Opio, Potio leniens. (Au. Pic.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas duodecim.
 Syrupi Caputum Papaveris unciam unam.
 Aquae Lactucæ . . . sesquiunciam.
 — Florum Aurantiorum semunciam.
 Auf zwei Mal zu nehmen. (Pic.)

℞. Aquae Cinnamomi unciam unam.
 — Melissae . . . uncias duas.
 Tincturae Castorei guttas viginti.
 Laudani liquidi Sydenhami
 guttas decem.
 Syrupi Opii . . . semunciam.
 Eßfelweise. — Preßavin rühmte diesen Trank besonders bei Muttertoilf. (Au.)

Potio carminativa. (Sm.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
 guttas decem.
 Aquae Cinnamomi simplicis
 unciam unam.
 Emulsionis simplicis uncias sex.
 Von de Paen bei Windkollif empföhlen. — Gabe, ein Eßfel alle Viertelstunden.

Looch s. Linctus leniens. (Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
 guttas quindecim ad triginta.
 Aquae Florum Aurantiorum
 drachmas duas.
 Looch simplicis uncias quinque.
 Eßfelweise, in größern oder geringern Zwischenräumen und nöthigenfalls auf einmal.

Looch contra tussim. (Sa.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
 semidrachmam.
 Olei Amygdalarum dulcium
 unciam unam.
 Vitellorum Ovi drachmas duas.
 Tritura in mortario vitreo et mixtis adde
 Syrupi Althaeae . . . uncias tres.
 Eßfelweise zu nehmen.

Mixtura sedativo-narcotica pectoralis, Potio pectoralis. (B.)

℞. Emulsionis gummosae uncias sex.
 Laudani liquidi Sydenhami
 guttas quindecim.
 Syrupi Papaveris,
 — Althaeae.
 singulorum unciam unam.
 Müddlig bei convulsivischem Husten zu nehmen.

Emulsio narcotica. (Pie.)

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum
 unciam unam.
 Tere sensim affundendo
 Aquae fontanae . . . uncias sex.
 Emulsioni adde
 Syrupi Papaveris
 drachmas quatuor ad sex.
 Laudani liquidi Sydenhami
 guttas decem ad duodecim.
 Abends zu nehmen.

Potio antiperiodica. (Au. Pie.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,

Aetheris sulphurici,
 singulorum guttas duodecim.
 Aquae Florum Aurantiorum,
 — Tiliae,
 singulorum semunciam.

Dieser Trank soll, vor dem Anfall des Wechselfiebers gegeben, diesen geddhnlich verhüten. (Pie.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
 guttas quindecim.
 Tincturae Ipecacuanhae
 guttas quadraginta.
 Liquoris Ammonii acetici
 semunciam.

Aquae Rosarum . . . unciam unam.
 Sacchari albi drachmas duas.
 Gabe, ein Kaffeelöffel. — B h y t rühmte diese Potion bei periodischen Kopfschmerzen von Gastricismus oder Unterdrückung eines Blutflusses.

Mixtura antilethargica. (Ca. Pie.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
 semidrachmam.
 Aetheris sulphurici drachmas sex.
 Aquae Menthae piperitae
 uncias sex.
 Viertelstündlich Kaffeelöffelweise.

Mixtura opiato-aetherea. (Au.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
 guttas viginti.
 Liquoris Hoffmanni
 drachmam unam.
 Aquae Menthae uncias quatuor.
 Gabe, ein Eßfel alle fünf bis sechs Minuten bis zum Aufhören des Krampfes, bei eingeklemmtem Bruche. — Von Van Geßet empföhlen.

Mixtura sedativa. (Sw^o.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
 semidrachmam.
 Aetheris sulphurici drachmas duas.
 Aquae Menthae piperitae
 uncias sex.
 — Bryoniae compositae
 uncias duas.

Syrupi Papaveris unciam unam.
 Gabe, ein halber bis ein Eßfel alle Stunden.

Potio leniens s. depressans. (Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
 Aetheris sulphurici,
 singulorum guttas quindecim.
 Aquae Florum Aurantiorum
 uncias tres.
 Infusi Florum Tiliae
 uncias quinque.
 Syrupi Capilli Veneris
 uncias duas.
 Eßfelweise zu nehmen.

**Mistura opiato-antidysenterica, Potio
antidysenterica. (Au.)**

℞. Aquae Menthae piperitae unciās tres.
Aetheris sulphurici guttas sedecim.
Laudani liquidi Sydenhami guttas triginta.
Olei essentialis Chamomillae guttas sex.
Sacchari albi drachmas duas.
Gummi Arabici drachmam unam.
Extracti Cascariillae scrupulum unum.
Catechu grana sex.
Pulveris Cinnamomi semidrachmam.

Code, alle Stunden ein Eßfel. — Von
Bucking gerühmt.

D. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Opii s. sedativa s. Opii simplex s. thebaica s. alcoholica s. extracti Opii s. officinalis Opii spiritiuosa, Laudanum liquidum, Alcohol opiatum s. cum Opio. (Am. An. BorC Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Lon. LonN. Lus. RC. Br. C. Fi. Sv. Vm. T.)

℞. Opii puri unciam unam.
Alcoholis (15°) unciās octo.

Triturata in mortario marmoreo digere per horas v. ginti quatuor, subinde agitando; decantha liquorem limpidum et sedimento superfunde Alcoholis (15°) unciās quatuor; post duos dies digestionis cola et colaturas mixtas filtra. (An.)

RC. Opii unciam unam, Alcoholis diluti libram unam, solve terendo et digere per dies septem.

℞. Extracti Opii aquosi partem unam.
Alcoholis (22°) partes duodecim.

Dissolve in lagena bene obturata et cola. (Gal.)

GalM Opii partem unam et Alcoholis undecim; — D. et DD. Opii unam et Alcoholis quadraginta octo; — Br. et Vm. Opii unam et octo Alcoholis; — Lon. LonN. Opii unciās duas cum dimidia et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Am Ed. Br. C. et Sv. Opii unciam unam et Alcoholis (0,935) libram unam; — Du. Opii drachmas decem et Alcoholis (0,930) octarium unum; Fi. Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis 25° unciās sedecim; — T. Extracti sicci unciam unam, Alcoholis diluti 22° B. libram unam.

℞. Opii purificati drachmam unam.
Alcoholis libram unam.
Aquae libras duas.

Dissolve et filtra. (Lus.)

BorC. Opii semunciam, Alcoholis et

Aquae, singulorum unciās tres; — Fer. Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis unciās decem et Aquae sex; — Bor4. Opii unciās quatuor, Spiritus Vini rectificati, Aquae destillatae, singulorum unciās novemdecim, digere, donec opium quantum fieri potest, solutum sit; tum quantum ponderis evaporatione amiserit, Spiritum Vini rectificatum addendo restitue, exprime et post subsidentiam filtra. P. spec. = 0,955 — 0,965.

Der Opiumgehalt dieser Tinctur ist je nach den verschiedenen Formeln sehr verschieden; nach der von Gal. enthalten vier und zwanzig Tropfen, welche = zwölf Gran, einen Gran Opium.

**Extractum Opii alcoholicum. (An. B.
Fer. GalM. Lus.)**

℞. Opii crudi quantum vis.
Alcoholis (25°) quantum sufficit ad dissolutionem succi; filtra liquorem et Aquae destillatae quantitatem sufficientem affundendo praecipita; denuo filtrata blando igne ad extracti consistentiam evaporent. (An.)

℞. Opii libram unam.
Alcoholis quantum sufficit ad dissolvendum; digere in vase clauso, leni igne, subinde agitando; filtra et tincturam distillationi subjice, donec extracti consistentiam acceperit. (Lus.)

℞. Opii crudi unciās duas.
Alcoholis unciās quatuor.

Digere, blando calore, per duos dies, cola exprimendo et filtra; residuum cum Aquae unciis quatuor tritum cola itidem exprimendo; filtra et liquores commixtos vaporazione ad extracti consistentiam consume. (B.)

℞. Opii concisi partem unam.
Aquae purae partes duas.

Stent per horas duodecim in infusione, in vase clauso, subinde agitata et fortiter expressa colentur; residuum infunde in Aquae parte una, tunc in Alcoholis (12°) parte una, sepone, cola et liquores commixtos in balneo aquae ad extracti consistentiam usque consume. (Fer. GalM.)

Dieser Extract wird heutzutage fast nicht mehr angewendet; es enthält mehr Narcotin und Harz als das mit kaltem Wasser bereitete.

**Tinctura antispasmodica Christiani
(Chretien). (Bo. Pic.)**

℞. Opii grana quadraginta octo.
Aquae Vitae (20°) unciās quatuor.

Macera per tres vel quatuor dies.

Bei Mangel oder beschwerlicher monatlicher Reinigung, sogenannter Krampfhafter

Strangurie, Hysterie, nervöser Kolik, rheumatischen Schmerzen, Cardialgie und Wechselfiebern empfohlen. In Einreibungen zu einer Unze täglich zwei oder drei Mal, Man wendet sie bald früh bald spätrirt an.

Laudanum opiatum Rousseau s. Rousseavii, Solutio Opii alcoholisata, Guttae abbatris Rousseau, Vinum opiatum per fermentationem praeparatum. (An. Gal. Ca. T. Vm.)

℞. Mellis albi . . . uncias duodecim.
Aeque calidae . . . libras tres.
Melle liquato, liquorem ad locum calidum reponere; simulac fermentare coepit, adde

Opii electi . . . uncias quatuor
antea dissoluti in

Aeque . . . uncias duodecim.

Stent fermentationi subjecta per mensem in loco temperatura 24° R. gaudente, cola deinde et filtra liquorem, qui ad remanentiam unciarum decem evaporet; cola deinde denuo, adde Alcoholis (20°) uncias quatuor cum dimidia et serva. (Gal. Ca.)

T. Aeque calidae libras duas, Mellis optimi uncias sex, Fermenti Cerevisiae scrupulos duos, Extracti Opii uncias duas in Aeque calidae uncias sex soluti; post triginta vel quadraginta dierum fermentationem evaporent ad remanentiam unciarum sex, quae colata misce exacte cum Alcoholis 34° B. uncias duabus.

℞. Extracti Opii . . . partem unam.
Aeque Vitae hydromellatae . . . partes octo.

Misce et post nonnullos dies sepositiois filtra. (Vm.)

Das Rousseau'sche Laudanum ist concentrirter als das Sydenham'sche. Zwanzig Tropfen oder zwei und zwanzig Gran enthalten drei Gran Opium und sieben Tropfen beinahe einen Gran. Man kann auf dasselbe das anwenden, was weiter unten von den nach Deyeur's und Engelot's Verfahren bereiteten Opiumtracten gesagt werden wird. Doch muß man die Formel von Ban Mons ausnehmen, welche ganz als einfache Opiumtinctur zu betrachten ist. Aber ob sie gleich den Fehler nicht hat, daß die durch die Gährung entstehenden Veränderungen unberechenbar sind, so hat sie doch den, daß sie einen Alcohol von unbestimmter und unendlich veränderlicher Stärke vorschreibt. Man muß sie daher verworfen, und es wäre klug, dieselbe mit den eigentlich sogenannten Rousseau'schen Tropfen ebenfalls zu thun.

Cataplasma sedans s. sedativum. (Sw.)

℞. Cataplasmatibus emollientibus quantum sufficit,

Adde
Tincturae Opii . . . unciam unam vel duas
et commisce bene.

Injectio sedativa s. sedans. (Sw.)

℞. Tincturae Opii . . . guttas quinquaginta.
Aeque destillatae uncias quatuor.
In gewissen Fällen von chronischem Eripis per empfohlen.

Solutio hypnotica s. sedativa. (Sw.)

℞. Extracti Opii aquosi . . . drachmam unam.

Aeque destillatae . . . drachmas quatuor.

Alcoholis . . . semidrachmam
Misce triturando. — Hier oder fünf Tropfen enthalten einen Gran Opium — Mit Unrecht sagt Swediaur dieses Präparat den schwarzen Tropfen der Engländer an die Seite; diese enthalten, wie aus der Zusammenfassung zu erhellen ist, eistigsaures Morphium.

Clyster s. Enema anodynum s. sedativum. (R. E. Sa. Sw.)

℞. Tincturae Opii guttas quadraginta.
Infusi Seminum Lini uncias sex.
Adduntur si necesse est, unciae duae Olei Olivarum. (Sa.)

E. Tincturae drachmam unam et Infusionis Seminum Lini uncias sex; — R. C. Clysteris Amyli *) vel Infusi Seminum Lini sine Glyzyrrhiza uncias quatuor, Tincturae Opii guttas quinquaginta.

℞. Amyli . . . sesquidrachmam.
Aeque bullientis . . . uncias sex.

Dissolve et adde
Tincturae Opii drachmam unam.
Misce. (Sw.)

Gargarisma opiaceum. (GalM. Au.)

℞. Tincturae Opii . . . partem unam.
Decocti Radicis Althaeae . . . partes ducentas.

Misce. (GalM.)
Au. Tincturae drachmam unam et
Aeque uncias decem. — Vogel hat dieses Gurgetwasser bei Bräune gerühmt.

Clyster antispasmodicum. (Sw.)

℞. Tincturae Opii . . . guttas quinque ad decem.
Infusi Valerianae . . . uncias tres.

*) Amyli semuncia, Aeque ferventis semilibra, Olei Lini vel Olivarum vel Butyri semuncia.

Für Kinder.

Syrupus alcoholicus Opii. (Suec.)

℞. Tincturae Opii . . . guttas sedecim.
Syrupi Sacchari . . . unciam unam.
Misce exacte.

Collutorium opiatum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . . . partem unam.
Syrupi Mellis . . . partes viginti.

Collyrium anodynum. (Gal.)

℞. Laudani Rousseau . . . guttas sex.
Gummi Arabici . . . semunciam.
Aquaе Rosarum . . . uncias duas.

Linimentum opiatum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii partes quatuor.
Olei Olivarum . . . partes triginta.

Linimentum excitans. (E.)

℞. Olei Succini rectificati drachmas duas.
— Olivarum . . . semunciam.
Tincturae Opii drachmas duas.
Aquaе Vitae . . . uncias duas.

Man macht damit bei Reuschüssen Einreibungen zwischen den Schultern.

Unguentum emolliens et sedans. (B.)

℞. Linimenti e Cetaceo uncias duas.
Tincturae Opii drachmam unam.
Morgens und Abends auf Hämorrhoidalgeschwülste einzureiben.

Fomentatio leniens s. sedans. (B*.)

℞. Tincturae Opii . . . partem unam.
Olei Succini rectificati partes duas.
Bei Gesichtskrampf in Einreibungen nützlich befunden.

Potio sedans s. leniens. (B. E.)

℞. Tincturae Opii . . . guttas quindecim
ad viginti quique.
Syrupi Papaveris drachmas duas.
Spiritus Cinnamomi drachmam unam.
Aquaе sesquiunciam.
Misce. (E.)

℞. Liquoris Hofmanni drachmas tres.
Tincturae Opii guttas octoginta.
Aquaе Cinnamomi . . . uncias sex.
Gabe, stündlich einen Eßffel. (E.)

℞. Aetheris sulphurici drachmas duas.
Sacchari,
Gummi Arabici,
singulorum sesquidrachmam.
Tincturae Opii guttas sexaginta.
Aquaе Cinnamomi . . . uncias duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel voll. (E.)

℞. Infusi Rosarum . . . uncias sex.
Tincturae Opii . . . guttas viginti.
Syrupi Corticum Aurantium
unciam unam.

Auf viermal, alle drei Stunden zu neh-

men, bei fogenanntem passiven Blutspieien mit Husten. (B.)

Potio absorbens. (E.)

℞. Cretae praeparatae drachmas tres.
Sacchari,
Gummi Arabici,
singulorum sesquidrachmam.
Tincturae Opii guttas sexaginta.
— Kivo drachmas duas.
Aquaе Menthae . . . uncias sex.
Gabe, alle zwei Stunden einen Eßffel, bei Diarrhöe.

Haustus s. Mixtura s. Potio adstringens. (B.)

℞. Corticis Simarubae semunciam.
Aquaе quantum sufficit
ad obtinendas decocti uncias octo.
Colaturae adde

Emulsionis gummosae uncias duas.
Tincturae Opii . . . guttas viginti.
Allmälig zu nehmen, bei Diarrhöe mit Atonie.

℞. Corticis Simarubae . . . semunciam.
Aquaе quantum sufficit
ad obtinendas decocti uncias octo, quarum colaturae addantur

Tincturae Opii scrupulus unus.
Alcoholis uncia una.
Aquaе Cinnamomi . . . semuncia.
Allmälig zu nehmen, in Fällen wo Atonie mit Torpor verbunden zu seyn scheint.

℞. Seminum Cannabis unciam unam.
Aquaе quantum sufficit
ut colaturae libra una obtineatur, cui adde

Extracti Arnicae drachmam unam.
Catechu scrupulum unum.
Syrupi Corticum Aurantium,
— Althaeae,

singulorum unciam unam.
Allmälig zu nehmen, bei Blutharnen und andern, wahrscheinlich passiven Blutflüssen.

℞. Corticis Simarubae . . . semunciam.
Ligni Quassiae drachmas duas.
Aquaе quantum sufficit
ut uncias octo colaturae obtineas, quibus post semihoram ebullitionis addantur

Extracti Gentianae drachma una.
Tincturae Opii . . . semidrachma.
Gabe, vier Eßffel, alle zwei Stunden, bei vermuthlich atonischer Ruhr und Diarrhöe.

Tinctura Opii simplex s. sedativa s. hypnotica s. thebaica s. alcoholica aromatica, Alcohol cum Opio aromaticum s. Opii dilutum, Laudanum liquidum. (Ba. Bor. Fenn. Pul. Gep. HassP. Pol. Sax. Suec. Wür. Fl. Su. T.)

℞. Opii minutim concisi
partem unam.

Aquae Cinnamomi simplicis,
Alcoholis, singulorum partes tres.
Post solutionem cola. (Bor. Hass P.
Pol. Sax.) — Jede Drachme dieser Lin-
ctur enthält zehn Gran Opium.

Fenn. et Gen. Opii partem unam,
Aquae Cinnamomi quinque et quinque
Alcoholis; — Ba. Opii unam, Aquae
Cinnamomi duas et quatuor Alcoholis;
— Suec. Opii unam, Aquae Cinnamo-
mi quatuor et sex Alcoholis; — T.
Opii puri uncias tres, Aquae Cinna-
momi lactiginosae uncias quindecim,
Alcoholis diluti 24° B. uncias novem,
digere per septimanam et filtra.

Sw. duas formulas indicat, nimirum:
Opii drachmam unam, Alcoholis un-
cias decem et Aquae Cinnamomi un-
cias viginti; et: Opii uncias duas,
Aquae Cinnamomi decem et sex Alco-
holis. — Die erstere enthält einen Gran
Opium auf die halbe Unze Sinctur; die an-
dere, welche auch *Fi.* anführt, etwa vier
auf die halbe Drachme.

℞. Opii purificati . . . semidrachmam.
Alcoholis concentrati . . .

uncias decem.
Aquae Florum Chamomillae . . .
uncias viginti.

Post sufficientem digestionem filtra.
(Wir.)

℞. Opii partem unam.
Aquae Florum Chamomillae . . .
partes sex.

— Cinnamomi vinosae . . .
partes duas.

Post tres dies digestionis filtra.

Mixtura opiacea. (Sa.)

℞. Opii crudi . . . granum unum.
Aquae aromaticae cujuslibet
unciam unam.

Solutioni adde
Aquae Cinnamomi vinosae . . .
uncias duas.

Essentia anodyna officinalis. (Pal. Wir.
Sp. Vm.)

℞. Extracti Opii aquosi unciam unam.
Aquae Cinnamomi vinosae . . .
uncias novem.

Post sufficientem digestionem filtra.
— Gabe, fünf, zehn, funfzehn und zwanzig
Tropfen. — Ein Scrupel enthält zwei
Gran Opium.

*Tinctura Opii Eccardi, Tinctura the-
baica Bambergi, Vinum Opii.* (B*. Ham.
Han. LonN. O. Ca. Vm.)

℞. Opii uncias duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Aquae Cinnamomi uncias octo.
— Vitae uncias quatuor.

Stent loco calido in digestionem per
sex dies, tum cum expressione colata
filtrentur.

Eine Drachme enthält zehn Gran Opium,
was auf zehn Tropfen einen Gran beträgt.
Hierher gehört auch das *Vinum Opii*
von LonN. Extracti Opii unioiam unam,
Cinnamomi, Caryophyllorum, singulo-
rum drachmam unam, Spiritus tenuio-
ris fluiduncias sex, Aquae destillatae
fluiduncias decem; macera per dies
octo et cola.

Mixtura sedans et aromatica. (Sw.)

℞. Aquae Menthae piperitae . . .
uncias quinque.
Alcoholis Nucis moschatae . . .
unioiam unam.

Electuarii aromatici
drachmas duas.

Tincturae Opii aromaticae . . .
drachmam unam ad duas.

Sacchari albi drachmas tres.
Bei Carbialgie. — Gabe, alle halbe
oder ganze Stunden drei Eßffel.

Potio sedans s. hypnotica. (Sw.)

℞. Tincturae Opii aromaticae . . .
guttas viginti.
Aquae Menthae crispae
unciam unam.

— Florum Aurantiorum
drachmas duas.

Bei'm Schlafengehen zu geben.

Mixtura anticathartica. (Sw*)

℞. Gummi Arabici . . . drachmas tres,
Syrupi Papaveris . . . sesquiunciam,
Aquae Chamomillae Romanae . . .
uncias sex.

— Cinnamomi unciam unam.
Tincturae Opii aromaticae . . .
scrupulum unum.

Gabe, alle Viertelstunden einen Eßffel.

*Tinctura vinosa Opii anticolica s. alco-
holica Opii composita.* (His.)*

℞. Opii uncias duas.
Radices Zedoariae unciam unam.

— Carlinae,
— Galangae,
— Calami,
singularum semunciam.

Corticis siccati Aurantiorum, . . .
— Citri,

Seminum Anisi,
— Carvi,

Florum Chamomillae,
singulorum drachmas duas.

Macidis drachmam unam.

Caryophyllorum,
Baccarum Lauri,
— Juniperi,
singulorum semidrachmam.

Alcoholis libras tres.

Post dies octo macerationis filtra, —
Gabe, zwei Scrupel.

Essentia anodyna Ludovici. (Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi unciam unam.
Aquae apoplecticae spirituosae

uncias octo.

Gabe, sieben bis zwölf und funfzehn
Tropfen. — Eine Drachme enthält sechs
und einen halben Gran Opium.

Tinctura alcoholica Opii s. Opii crocea,
Elizir paregoricum. (His.)

℞. Opii uncias duas.

Croci semunciam.

Cinnamomi . . . drachmas duas.

Alcoholis,

Aquae,

singulorum uncias duodecim.

Digere per dies octo et filtra. —

Diese Tinctur hat viel Ähnlichkeit mit
dem Sydenham'schen Laudanum. — Ein
Scrupel enthält zwei Gran Opium.

Tinctura antispasmodica Christiani (Chre-
stiani). (Bo.)

℞. Opii crudi . . drachmam unam.

Camphorae . . drachmas quatuor.

Aquae Vitae . . libram unam.

Macera per tres vel quatuor dies et
tunc filtra. — Keuferlich bei rheumati-
schen Beschwerden, Wechselfiebern mit rheu-
matischen Schmerzen complicirt, bei retentio
urinae, Amenorrhoe ic. gerühmt. —
Im letzteren Falle macht man Einreibungen
auf die Schenkelfläche.

*Tinctura Opii camphorata, Elizir pare-
goricum Ph. Dub.* (RC.)

℞. Opii,

Camphorae,

Olei destillati Anisi,

singulorum drachmam unam.

Alcoholis diluti . . libras duas.

Digere per quadriduum. — Eine hal-
be Unze enthält ungefähr einen Gran
Opium. — Gabe, dreißig Tropfen bis eine
und zwei Drachmen. — Mit der dreifach-
en Quantität tinct. Scillae als ein vor-
treffliches Mittel bei Husten und Catarrh
empfohlen.

Linimentum sedativum camphoratum.

(Sw.)

℞. Tincturae Opii aromaticae
drachmam unam vel duas.

Camphorae . . drachmam unam.

Linimenti saponacei sesquunciam.

In Einreibungen und Bähungen auf den
Unterleib, bei Kolik.

Linimentum anodynum. (Au. Sa.)

℞. Linimenti saponacei uncias duas.

Pharmacopoea universalis. II.

Tincturae Opii . . semunciam.
Misce. (Sa.)

Au. Linimenti et Tincturae, singu-
lorum partes aequales.

In denselben Fällen von Nutzen, wie das
vorige. — Kind will durch Einreibungen
mit diesem Liniment mehrmals das Wech-
selfieber geheilt haben.

Linimentum camphoratum opiaceum.
(GalM.)

℞. Tincturae Opii . . partes duas.
Camphorae . . partem unam.

Olei Olivarum partes quindecim.

Tinctura antispasmodica Dumasii. (Pie.)

℞. Opii grana quadraginta.
Camphorae,

Succini,

singulorum semidrachmam.

Alcoholis uncias sex.

In Einreibungen auf die Wirbelsäule,
die Ober- und Unterschenkel.

*Tinctura Opii ammoniata, Elizir pare-
goricum Ph. Edinb.* (RC.)

℞. Opii drachmas duas.

Olei destillati Anisi

semidrachmam.

Alcoholis ammoniati

uncias sedecim.

Macera frigide per septimanam et
per chartam cola. — Eine Drachme
(oder 100 Tropfen) enthalten ungefähr ei-
nen Gran Opium. — Gabe, dreißig Tro-
pfen bis anderthalb Drachmen.

*Tinctura Opii ammoniacalis s. ano-
dyna volatilis s. alcoholica Opii ammo-
niacalis et camphorata s. antispasmodi-
ca camphorata, Elizir paregoricum, Spi-
ritus ammoniacatus.* (Lus. Au. Sw*.
Vm.)

℞. Camphorae Alchhole humectatae
partem unam.

Opium pulverati . . partes duas.

Alcoholis ammoniacalis

partes viginti quatuor.

Post plures dies macerationis filtra.
(Sw*. Vm.)

Lus. Opium drachmam unam, Cam-
phorae scrupulos duos, Tincturae aroma-
ticae ammoniacalis uncias quatuor
et Alcoholis libram unam.

℞. Aquae Vitae . . unciam unam.
Alcoholis ammoniacalis

semunciam.

Opium scrupulos duos.

Camphorae . . scrupulum unum.

Post tres dies digestionis cola. (Au.)

Bei Hysterie und convulsivischen Krank-
heiten empfohlen. — Gabe, eine halbe bis
zwei Drachmen in einem syrupartigen Be-
hälter. — Ricat empfahl diese Tinctur

bei Kopfschmerz, Zahnschmerz und Migräne: man reibt sie in die Hände ein und hält diese vor die Nase.

Laudanum liquidum Warneri, Tinctura Opii ammoniacata. (D. Vm.)

℞. Opii puri,
Saponis Alicantini,
singulorum drachmas sex.
Nucis moschatae drachmam unam.
Camphorae . . . drachmas duas.
Crocī . . . grana quadraginta.
Alcoholis ammoniacalis

uncias novem.
Digere per dies decem, subinde agitando, et tunc decantha. (D.) — Eine Drachme enthält fünf und einen halben Gran Opium.

℞. Opii sesquiunciam.
Nucis moschatae drachmas duas.
Crocī scrupulos duos.
Alcoholis ammoniacalis

uncias octodecim.
Macera et adde deinde
Saponis albi . . . sesquiunciam.
Camphorae semunciam.
Liquor filtratur prout eo uti proposuisti. (Vm.)

Linimentum Saponis compositum s. camphoratum s. anodynum s. spirituosum anodynum, Balsamum anodynum s. arthriticum s. thebaicum, Linimentum s. Tinctura Saponis et Opii, Tinctura alcoholica Opii saponacea. (Am. B*. Ed. Gen. His. Wür. Au. C. Pic. Ra. Sp. Vm.)

℞. Saponis raspati uncias quatuor.
Alcoholis libras duas.
Digere per tres dies, cola et adde
Opii unciam unam.
Camphorae uncias duas.
Olei essentialis Rorismarini

semunciam.
Agita bene. (B*. Ed. C.)
Am. Saponis uncias duodecim, Olei Rorismarini drachmas duas et Alcoholis octarios octo.

℞. Opii drachmam unam.
Saponis albi Hispanici

uncias quinque.
Alcoholis uncias viginti quatuor.
Digere per tres dies, in colatura dissolve

Camphorae uncias duas.
Olei essentialis Rorismarini

semunciam.

Serva. (Sp.)
Wür. Opii drachmas duas, Saponis unciam unam, Camphorae drachmas tres, Olei essentialis semidrachmam et Alcoholis uncias novem; — Gen. Opii unciam unam, Saponis uncias quinque,

Camphorae uncias duas, Olei Rorismarini semunciam et Alcoholis sesquilibrium; — Au. Opii drachmam unam, Saponis unciam unam, Camphorae semidrachmam, Olei Rorismarini drachmam unam et Alcoholis quantum sufficit ad omnia solvenda.

℞. Opii semunciam.
Camphorae drachmas sex.
Saponis albi semunciam.
Crocī drachmam unam.
Alcoholis sesquilibrium.
Digere per septem dies et cola. (His. Pic.)

℞. Croci partem unam.
Alcoholis partes quadraginta duas.
Digere in balneo aquae tepido et adde

Opii concisi partes duas.
Post sufficientem digestionem adde
Saponis albi rasi partes quatuor.
Solutione peracta exprime fortiter et filtra. (Vm.);

℞. Opii unciam unam.
Spiritus Rorismarini
uncias viginti quatuor.
Post aliquot dies macerationis cola exprimendo, filtra et in colatura dissolve

Camphorae . . . drachmas tres.
Saponis e medulla praeparati
uncias sex.
Post sepositionem decantha. (Vm.)

℞. Opii drachmam unam.
Saponis albi plane sicci

semunciam.
Alcoholis uncias quatuor.
Digere per tres dies, cola et adde
Camphorae drachmas duas.
Agita bene. (Ra)

Gabe, dreißig, vierzig oder fünfzig Tropfen in Wein. — In Einreibungen äußerlich, bei Gesichtschmerzen. — Dieser Balsam unterscheidet sich von dem Opobelloc nur durch das in ihm enthaltene Opium.

Balsamum somniferum. (Wir.)

℞. Unguenti populei,
Olei Myristicae expressi,
singulorum unciam unam.
Opii in Alchhole dissoluti

drachmam unam.
Olei Ligni Rhodii guttas sedecim.
Misce bene.

Tinctura Opii benzoica s. Camphorae composita s. Opii camphorata s. sedativa camphorata, Elixir paregoricum, Tinctura alcoholica Opii et Acidi benzoici camphorata, Elixir antiasthmaticum. (Am. B*. Bor. Bor4. D. Du. Ed. GalF. Han. Li. Lon. LonN. Sax. Suec. Bo. Br. C. Ca. Pic. Sw. Vm.)

℞. Opii duri pulverati,

Acidi benzoici,
singulorum drachmam unam.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,930) octarios duos.
Digere per dies quatuordecim et filtra. (GalF. Lon. LonN. C. Pic.)

℞. Opii,
Acidi benzoici,
singulorum drachmam unam.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,935)
libras duas cum dimidia.

Post septem dies digestionis filtra. (Ed.)

℞. Opii,
Acidi benzoici,
singulorum drachmam unam.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Olei essentialis Anisi
drachmam unam.
Alcoholis (0, 930) (Spirit. rectific.)
octarios duos.

Digere per dies septem (quatuordecim et filtra. (B*. Du. Li. Bo. Br. Pic. Sw.)

Bor. Bor4. Han. quatuor priorum singulorum drachmam unam, digere per tres dies (Bor4); — D. Suec. et Vm. Olei Anisi semidrachmam; — Ca. Opii drachmam unam, Acidi benzoici tantidem, Camphorae grana viginti sex, Olei Anisi scrupulos duos et Alcoholis (24°) uncias viginti tres.

℞. Opii,
Acidi benzoici,
Camphorae,
Olei essentialis Anisi,
singulorum partem dimidiam.
Alcoholis partes nonaginta sex.

Post sufficientem digestionem cola. (Sax.)

℞. Opii,
Acidi benzoici,
Olei essentialis Anisi,
singulorum drachmam unam.
Extracti Liquiritiae semunciam,
Mellis despumati . . . uncias duas.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,930) . . . octarios duos.
Stent in digestionem per dies decem, tunc colentur. (Am. B*. C.)

Besonders bei Asthma empfohlen. — Gabe, Erweichungen zwanzig bis hundert, Kindern fünf bis zwanzig Tropfen.

Tinctura Benzoatis Ammoniae composita, Alcohol cum Benzoate Ammoniae compositum, Tinctura Opii ammoniata, Tinctura alcoholica Opii et Benzoatis Ammoniae, Elixir pargoricum. (Am. An. Bel. Ed. GalF. GalH. C. Ca. Pic. Vm.)

℞. Opii drachmas duas.
Croci,

Acidi benzoici,
singulorum drachmas tres.
Olei essentialis Anisi
semidrachmam.
Alcoholis ammoniacalis
uncias sedecim.
Post septem dies digestionis filtra. (Ed. GalF. GalH. C. Ca. Pic.)

Am. Opii, Acidi benzoici, Olei Anisi, singulorum drachmam unam, Extracti Liquiritiae semunciam, Mellis despumati uncias duas, Camphorae scrupulos duos et Aquae Vitae octarios duos.

℞. Croci drachmas sex.
Alcoholis ammoniacalis
uncias triginta duas.

Infunde frigide per duos dies et adde Opii concisi semunciam.

Infunde denuo per aliquot dies et adde
Acidi benzoici . . . drachmas sex.
Olei essentialis Anisi
drachmam unam.

Exprime et filtra. (Vm.)

℞. Croci drachmas quinque.
Tincturae aromaticae ammoniatae
uncias quatuor.

Post dies duos digestionis cola et in colatura solve
Acidi benzoici scrupulos quinque.
Opii depurati . . . drachmas duas.
Stent in digestionem per duos dies, tunc colentur et filtrantur; residuo infunde
Tincturae aromaticae ammoniatae
uncias duas.

Digere per horas viginti quatuor, cola et in colatura solve quod in filtro remansit. Post horas duodecim filtra. Colaturis commixtis adde
Olei essentialis Anisi
guttas triginta duas.

Serva. (An. Bel.)

℞. Opii sicci drachmas duas.
Acidi benzoici semunciam.
Alcoholis ammoniacalis
libram unam.

Post quinque dies digestionis filtra. (Ca. Pic.)

Besonders bei Asthma und Keuchhusten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in einem passenden Erant.

Elixir sudoriferum s. sudoriferum Lettsomi, Tinctura Opii benzoica composita. (Au.)

℞. Ipecacuanhae,
Balsami Tolutani,
singulorum semunciam.
Acidi benzoici,
Opii,
Croci, singulorum drachmas duas.
Camphorae . . . scrupulos quatuor.

Olei essentialis Anisi
drachmam unam.

Alcoholis libras duas.

Post sufficientem digestionem cola.
— Gabe, fünf bis dreißig Tropfen, allmählig gestiegen, bei'm Reuchhusten.

Epithema antiarthriticum. (Bo.)

℞. Aquae Reginae Hungariae
uncias octo.

Spiritus Salis Ammoniaci
semunciam.

Camphorae . . . drachmas duas.

Opii semidrachmam.

Saponis Veneti . . . sesquunciam.

Misce. — Man wendet es warm, mit-
telst seiner Feinwand an und erneuert es
alle Stunden.

Tinctura stibiata. (Au.)

℞. Liquoris Ammonii succinici,

Elixir pargorici,
singulorum drachmas duas.

Laudani liquidi Sydenhami,
Vini stibii,

singulorum drachmam unam.

Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen, alle
zwei Stunden, bei'm Reuchhusten. — Bon
Sahn gepriesen.

Elixir antiasthmaticum Lemort. (Vm.)

℞. Acidi benzoici,

Opii, singulorum drachmam unam.

Kali subcarbonici unciam unam.

Mellis Narbonnensis,

Liquiritiae rasae,

singulorum uncias quatuor.

Olei essentialis Anisi

semidrachmam.

Camphorae . . . scrupulos duos.

Aquae Vitae

uncias triginta quatuor.

Digere in aqua vitae primo cröcum,
deinde opium, liquiritiam, adde sal et
cola post aliquot dies, et exprime; in
colatura dissolve sensim acidum, oleum
camphoram et mel; post subsidentiam
cola per pannum et supra sedimen-
tum rectifica donec liquor perfecte
limpidus sit redditus.

Linimentum sedans aethereum. (Sw*.)

℞. Tincturae Opii aromaticae
drachmas sex.

Aetheris sulphurici drachmas duas.

Misce. — Bei Hsurie und krampf-
haften oder rheumatischen Schmerzen em-
pfohlen.

Mixtura sedans. (Sw.)

℞. Aquae uncias sex.

Tincturae Opii aromaticae,

Aetheris sulphurici,

singulorum drachmas sex.

Syrupi Sacchari . . . unciam unam.
Gabe, stündlich oder alle zwei Stunden
einen Eßlöffel.

Mixtura acida anodyna. *Guttas anody-
nae acidae.* (Ful. Ham.)

℞. Tincturae Opii scrupulos duos.

Acidi sulphurici scrupulum unum.

Aquae destillatae . . . uncias sex.

Syrupi Violarum unciam unam.

Misce. (Ful.)

℞. Essentiae Aurantium

semunciam.

Acidi sulphurici drachmam unam.

Tincturae Opii semidrachmam.

Misce bene. (Ham.)

Nutzen und Gabe wie bei'm vorherge-
henden.

*Tinctura foetida pyro-oleosa s. vermi-
fuga.* (Au.)

℞. Asae foetidae drachmam unam.

Opii,

Salis volatilis Cornu Cervi,

singulorum drachmas duas.

Tincturae Castorei uncias duas.

Rosenstein empfiehlt diese Tinctur gegen
Kopfschmerz — Gabe, dreißig bis vier-
zig Tropfen in Wein oder Brantwein.

E. Auszug durch Wasser.

Infusum Opii aquosum. (Br*. Ra.)

℞. Opii electi . . . unciam unam.

Aquae destillatae . . . uncias octo.

Alcoholis (36°) . . . semunciam.

Infunde opium in aqua per duos vel
tres dies temperatura communi et a
radiis solis tutum; filtra, adde alcoh-
olem et serva in lagunculis bene obtu-
ratis.

Chauffier gebraucht diesen Aufguß statt
des Laudanum liquidum Sydenhami. —
Gabe, innerlich sechszeñ bis vier und zwanzig
oder dreißig Tropfen in einem Trantze;
äußerlich funfzig bis achtzig Tropfen in zwei
Unzen Malvenblüthaufguß.

*Extractum Opii s. Opii gummosum s.
aquosum s. thebaicum, Laudanum opia-
tum s. simplex, Opium colatum s. depu-
ratum s. gummosum.* (A. Ba. Bel. Bor.
Bor4.Br. D.Du.Fer. Ful. Gal. GalM.Han.
HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.
Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. Sa.
Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Opii concisi . . . partem unam.

Aquae frigidae . . . partes quatuor.

Digere in evaporatorio per dies duos,
vas subinde agitando; cola, sepone per
duos dies, filtra ut pellicula removeat-
ur odoris virosi, et lentissimo igne di-
midium consume; sepone deinde per
duos dies in evaporatorium, filtra ite-

rum ut pellicula eodem modo semoveatur, cola et ad extracti consistentiam consume. (Gal.)

℞. Opii concisi . . . sem libram.

Aquae frigidae . . . octarios tres.

Macerata opium in aquae pauxillo ut mollescat; adde sensim aquam reliquam, tritura totum ut bene commisceantur, tunc sepone et colata ad extracti consistentiam consume. (Lon.)

Lon. Opii uncias sedecim, Aquae congium unum.

℞. Opii grossiuscule pulverati

quantum vis.

Tritura cum Aquae frigidae pauxillo, donec haec fusca sit reddita; seponedeinde et tunc decantha; operationem repete donec aqua colorem accipere desiit; liquores commixti in balneo aquae ad extracti consistentiam evaporent. (Fer. Ful. Li.)

℞. Opii crudi . . . quantum vis.

Malaxa sub aquae tenuissimo filo donec nihil amplius dissolvatur et cola; albumine clarificatum ignis vehementis ope vapore et quum liquor spissescere incipit, cola iterum et denique ad extracti consistentiam frequentatim consume. (Bel.)

℞. Opii in frusta minora concisi

partem unam.

Aquae frigidae . . . partes tres.

Macerata per tres dies absque agitatione et decantha; residuo infunde Aquae partes duas et post aliquot tempus decantha; quae operatio adhuc semel repetatur; liquores commixtos cola et albumine clarificatos levi bullitione evapora et praecipitatum prout formatum decantha. (Vm.)

℞. Opii concisi . . . quantum vis.

Aquae frigidae quantum sufficit.

Macerata per horas duodecim, tunc digere leni calore per tempus aequale et cola; cum residuo eodem modo age, donec aqua non amplius coloretur; liquores commixti in balneo aquae ad electuarii spissi consistentiam evaporent; quo in Aqua frigida dissoluto, liquorem sepone, cola et denique ad extracti consistentiam consume. (Suec.)

℞. Opii concisi . . . uncias quatuor.

Aquae communis cum Succo Citri libra dimidia acidulata libras quatuor.

Post solutionem filtra et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume. (Br. Pal. Wir.)

℞. Opii . . . uncias duas

Aquae bullientis . . . libram unam.

Dissolve, liquorem calidum cola, adde Aquae frigidae libram unam, per dies duos aëri exponere, filtra, tunc va-

porando, primum leni igne tunc in balneo aquae ad extracti consistentiam usque consume. (Br. Fi.)

℞. Opii uncias sex, Aquae bullientis libras tres et Aquae frigidae tantidem.

℞. Opii grossiuscule pulverati

partem unam.

Aquae . . . partes quatuor.

Digere per dies duos, blando calore, saepius agitando, liquorem decantha et cola, qui tunc in balneo aquae ad aptam consistentiam evaporet. (A. Bor. D. Han. His. Lus. O. Pal. Sax. Sa. Sp. Sw.)

Bor4. ad massam pilularis consistentiam evaporare et tunc leni calore exsiccare, ut pulverati queat, jubet; — GalM. infusione ad finem perducta liquorem per horas viginti quatuor sepositum filtrare, dimidium ebullitione consumere, iterum seponere et post novam colationem, evaporationem in balneo aquae perficere; — Ba. digerere per horas viginti quatuor, cum residuo eandem operationem repetere, Aquae novae partem quartam sumendo et colaturas commixtas consumere; — HassP. Opii uncias quatuor, Aquae destillatae libram unam in olla murrhina ad opii solutionem tenere saepius agitando, colare, residuum Aqua destillata abluere, colare, et sepositione clarificatum ad electuarii consistentiam evaporare, massam remanentem in Aquae frigidae partibus tribus solvere et fluidum filtratum in balneo aquae ad siccum evaporare.

℞. Opii . . . uncias duas.

Aquae bullientis octarium unum.

Tritura per sexagesimas decem, sepone parumper et decantha liquorem; residuo denuo bis cum eadem Aquae quantitate per idem tempus tritura; liquores commixtos per duos dies in vase aperto aëri exponere, cola et lente ad extracti consistentiam consume. (Du. C.)

Das heutzutage allgemein angenehmen Verfahren hat mit dem von Gal. Uehrsichtheit; es besteht darin, daß man das Opium, je nach seiner Consistenz, zerschnitten oder zerspaltet in kaltem Wasser einweicht, bis es aufgelöst ist, die Flüssigkeiten durchsiebt, sie bis zur Hälfte abdampft, erkalten läßt, und, um das Harz zu trennen, welches sich zum Theil als Sediment scheidet, filtrirt, die klargewordene Flüssigkeit abdampft, sie, nachdem sie erkalte ist, wieder filtrirt und das bis zur Honigdicke abgedampfte Extract endlich mit kaltem destillirten Wasser verbdunnt und es wiederum bis zur Willenmasse abdampft.

Das so gewonnene Extract enthält meconsaures Morphinum, eine kleine Menge Narcotin, färbenden Stoff, etwas Harz,

Schleimharz und Sagmeßl. — Gabe, einen halben bis drei Gran.

Sal essentielle s. Extractum siccum Opii.
(Gal.)

℞. Opii concisi . . . libras duas.

Aquae frigidae . . . libras duodecim.

Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando, et cola; residuum itidem maceratum cum Aquae partibus octo, coletur. Colaturis mixtis et in balneo aquae ad syrupi consistentiam evaporatis, hujus supremi lineas circiter duas patinis infunde et tunc in furno vel balneo aquae ad siccum usque consume et aquas separa.

Extractum Opii aquosum Narcotina privatum. (Fer. Gal. F. T.)

℞. Extracti Opii gummosi

quantum vis.

Aquae pauxillo dilutum cum Aethere depurato in lagenam immitte et mixturam saepius agita; post certum tempus decantha, novum aetherem affunde, donec quod decanthatur vaporando sedimentum non amplius relinquit, extractum deinde ad massae pilularis consistentiam consume.

Dies ist das Verfahren Alph. Peron's, welches Robiquet wieder in Erinnerung gebracht hat. Dublanc schlägt, indem er es für unzureichend erklärt, folgendes vor:

℞. Extracti aquosi Opii frigide parati partes trecentas.

Aquae destillatae

partes centum quinquaginta.

Dissolve; solutioni in retortam immisae superfunde

Aetheris puri . . . partes bis mille.

Destilla, lente calefaciendo, Aetheris partes circiter ducentas; apparatu deprompto aetherem supernatantem decantha; extractum adhuc calidum cum aethere destillato ablutum et vaporatione concentratum in Aqua destillata dissolve et denuo ad aptam consistentiam evapora.

So bereitet, enthält das Opiumextract kein Atom Narcotin.

Extractum Opii Diestii. (Gal.)

℞. Opii . . . libram unam.

Aquae communis libras quatuor.

Coque leviter per horam dimidiam et, cola; residuum bis coquatur cum Aquae aequali quantitate et decoctum tria conjuncta coletur; mixturam in cucurbitam stanneam, balneo arenae lampadis ope calefacto impone, ita ut per sex mensium spatium lente coquatur, subinde Aquae destillatae pauxillum

addendo et in alia vasa transmittendo ut sedimentum separetur; post sex menses refrigeratum et per pannum colatum evaporet in balneo aquae ad consistentiam massae pilularis.

Dieses Verfahren ist mit Recht verlassen worden, da es vor den andern schneller zum Ziele führenden keinen wirklichen Nutzen voraus hat.

Extractum Opii per fermentationem.
(Gal. Ca. T.)

℞. Opii concisi . . . quantum vis.

Aquae,

Fermenti Cerevisiae,

singularum quantum sufficit.

Fermentationi in temperatura apta expone et liquorem, simulae clarus est, Aqua dilue; filtra, tunc coque donec omnis odor virosus evanuerit et denique ad extracti spissi consistentiam consume.

T. Fermenti uncias duas, Aquae libras tres, Opii uncias sex, post fermentationem Aquae novae tantidem etc.

Dieses Verfahren, welches von Deyeur herrührt, ist nicht genau, da die Veränderungen, welche hier mit dem Opium vorgehen, mehr oder weniger groß seyn müssen, je nachdem die Gährung mehr oder weniger vollständig erfolgt ist. Uebrigens hat man sich noch gar nicht darum bekümmert, worin sie eigentlich bestehen.

Extractum Opii cydoniatum Langelotti.
(Sp.)

℞. Opii electi . . . uncias duodecim.

Dissolve in mixtura e

Succi Cydoniorum,

Aquae fontanae,

singulorum uncias sexaginta.

Stent in digestionem per dies aliquot in loco calido, tunc coletur; colaturae adde

Sacchari albi . . . uncias quatuor.

Massam fermentationi subijce per plures menses duranti, subinde spatulae lignae ope agitando; postquam omnis fermentationis motio desiit, cola per linteum et ad extracti consistentiam consume.

Man kann von diesem Extract, und mit noch größerem Rechte, das sagen, was von dem vorigen galt. Es enthält sehr wahrscheinlich essigsaures Morphin.

Laudanum opiatum, Extractum Opii crocatum. (Br. His. Pal. Sar. Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas.

— Croci,

Opobalsami,

singulorum semidrachmam.

Misce bene. (Pal. Wir.)

Br. Pulverem pro Extracti Croci jubet.

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas.

Extracti Croci . unciam unam.
 Matris Perlarum praeparatae,
 Hyacinthi praeparati,
 Corallii praeparati,
 singulorum sesquidrachmam.
 Terrae sigillatae drachmam unam.
 Bezoar . . . scrupulos quatuor.
 Rasurae Cornu Cervi

serupulos duos.
 Pulverata Aquae paxilli ope in pasta redige, de qua trochisci formantur. (His.)

℞. Extracti Opii,
 — Croci,
 singulorum unciam unam.
 Pulveris Succini albi drachmas sex.
 — Castorei . drachmas tres.
 Extractis cum Alcoholis paxillo dilutis pulveres admisce. (Sar.)
Extractum anodynum. (Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi
 — drachmas tres.
 — Cardui benedicti
 drachmas quinque.
 — Calami,
 — Angelicae,
 singulorum unciam unam.

Olei essentialis Caryophyllorum
 guttas decem.
 Misce bene. — Jede Drachme enthält sieben und einen halben Gran Opium.

Laudanum antihystericum. (Wir.)

℞. Extracti Opii . . . semunciam.
 — Castorei drachmam unam.
 — Croci . . . scrupulum unum.
 Olei essentialis Macidis,
 — — Menthae,
 — — Rutae,

singulorum guttas sex.
 Misce ut fiat massa pilularis. — Man hat dieses Präparat bei hysterischer Kolik, um die Krämpfe zu stillen, empfohlen. — Gabe, einen bis zwei Gran.

Laudanum diureticum s. urinarium s. urinarium Micheli, Extractum Opii glycyrrhizatum. (His. Wir. Fi.)

℞. Extracti Opii aquosi
 drachmas duas.
 Succu Liquiritiae sesquinciunciam,
 Trochiscorum Alkekengi,
 Terebinthinae Venetae,
 singulorum semunciam.
 Camphorae . . . drachmam unam.
 Croci . . . scrupulos quatuor.
 Gummi Tragacanthae,
 Mastichis,
 singulorum semidrachmam.

Extractum opii et succum liquiritiae in mortario cum Aquae paxillo diluta in massam melleam redige et iis admisce triturando terebinthinam; adde deinde trochiscos, masticheum,

gummi, camphoram et crocum pulverata; fiat massa in trochiscos dividenda.

Fi. Gummi Tragacanthae, Mastichis, singulorum semunciam, caeterum ut antea.

Man hat dieses Präparat bei Nierencolik, Hämaturie und Strangurie empfohlen — Dreizehn Gran enthalten einen Gran Opium.

Laudanum opiatum cydoniatum, Extractum Opii cydoniatum. (Pal. Wir. Bo.)

℞. Opii concisi . . . semilibram.
 Succu Cydoniorum recens expressi
 libras sex.

Digere blando calore, decantha, filtra et liquori evaporato adde

Olei essentialis Cinnamomi,
 — — Caryophyllorum,
 — — Macidis,
 singulorum semiscrupulum.

Misce bene. (Pal. Wir.)

℞. Opii crudi pulverati
 unciam quatuor.
 Succu Cydoniorum recens expressi
 libras quatuor.

Post tres septimanas digestionis adde
 Caryophyllorum,
 Nucis moschatae,

singulorum unciam unam.
 Calefac leviter, tum in digestionem relinque per dies septem et adde

Croci . . . unciam unam.
 Sacchari albi . . . uncias quatuor.
 Post horas viginti quatuor filtra; evaporata in balneo aquae ad tertiae partis remanentiam serva. (Bo.)

Dieses Präparat, welches heutzutage nicht mehr gehalten werden darf, unterscheidet sich von dem wässrigen Opiumextract durch die mit dem Quittensaft hineinkommenden Unreinigkeiten und durch den Zusatz der Gewürze. Ehedem zählte man es zu den schwach abstringirenden Krampfmitteln und hielt es für nützlich bei Erbrechen, Durchfall, Schlägen, besonders um die Schmerzen zu stillen. — Gabe, Erwachsene einen Gran, Kindern ein Zehnthel, Zwölftel oder ein Zwanzigtheil Gran. Dieses gilt besonders von dem Präparat der zweiten Formel, da das der ersten auf jeden Tropfen einen Gran Opium enthält.

Pilulae sedativae s. hypnoticae. (Ra. Sw. Sy. Vm.)

℞. Extracti Opii aquosi
 quantum placet.

Fiant pilulae grani unius. — Gabe, eine oder mehrere, je nach der Indication.

℞. Extracti Opii . . . grana tria.
 Camphorae . . . grana sex.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiant pilulae sex. (Ra. Sy. Vm.)

℞. Extracti Opii . granum unum.

Camphorae grana sex.
Nitri grana quatuor.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat pilula una. (Ra.)

Pilulae pectorales opiaceae. (Ful.)

℞. Succii Liquiritiae sesquunciam.
Extracti Opii . . . semunciam.
Syrupi Capiti Papaveris
quantum sufficit.
Gabe, zwei bis sechs Gran.

Pilulae balsamicae cum Opio. (Au.)

℞. Extracti Opii . semidrachmam.
Balsami Peruviani
sesquidrachmam.

Myrrhae drachmas tres.
Fiant pilulae grani unius. — Gabe,
stündlich zwei oder drei Stück mit tinctura
Opii abwechselnd. — Von Marcus
empfohlen.

Bolus ad diarrhoeam. (Sm.)

℞. Opii gummosi . granum unum.
Pimentae,
Cassiae lignae,
Croci, singulorum grana quatuor.
Conservae Cynorrhodi
quantum sufficit.

Tabellae Opii. (Vm.)

℞. Extracti Opii frigide parati
partem unam.
Sacchari albi
partes sexaginta quatuor.
Saccharum blando calore fusum cum
extracto commisce ut fiat massa in ta-
bellas sex granorum dividenda.

Morsuli pectorales. (Fer.)

℞. Mucilaginis Lichinis Islandici,
— Gummi Arabici,
singulorum libram unam.
Sacchari libras duas.
Opii sesquidrachmam.
Fiant morsuli granorum viginti qua-
tuor. — Gabe, zehn Stück täglich.

Pulvis anodynus. (Ham. Wir. Ca. Pie.)

℞. Extracti Opii grana duo.
Specierum diatragacanthae
uncias duas.

Misce bene. (Pie.)

℞. Extracti Opii aquosi
drachmam unam.
Corallii rubri praeparati
drachmas duas.

Misce. (Wir.)

℞. Opii,
Ligni Santali rubri,
singulorum scrupulum unum.
Corallii rubri praeparati
scrupulos quatuor.

Misce. (Wir.)

Cataplasma cum Opio s. anodynum.
(Au.)

℞. Farinae Seminis Lini
uncias quatuor.
Aquae quantum sufficit
ut fiat cataplasma, cui adde
Opii semidrachmam.

Linimentum opiaceum. (Ra.)

℞. Infusi Opii aquosi
drachmas quatuor.
Olei Olivarum . . uncias duas.
Subige bene.

Sy.'s Clyster sedans hat viel Ähnlich-
keit mit diesem Siment: Extracti Opii
aquosi grana duo vel tria, Olei Oliva-
rum vel Lini uncias quatuor.

Sw. *Linimentum sedativum:* Extracti
Opii drachmam unam triturare primò
cum Aquae calidae pauxillo deinde
cum Cerati ordinarii drachmis tribus
ad octo.

Auch gehört hierher das folgende Un-
guentum sedativum. (Sw.)

℞. Extracti Opii drachmam unam.
Tritura cum Aquae bullientis pau-
xillo et adde deinde, continue terendo,
Axungiae in mortario calido fusae
unciam unam.

Alle drei Präparate dienen zur Beseiti-
gung von örtlichen Schmerzen.

Collyrium opiaceum. (Ra.)

℞. Extracti Opii gummosi
semidrachmam.
Aquae libram unam.
Dissolve.

Ra. praeterea Extracti grana duo et
Aquae uncias quatuor.

Sicher muß die Kraft dieses Augenwas-
sers je nach den Indicationen verschoben
seyn.

Fomentatio narcotica, Solutio sedativa.
(Ra. Sw.)

℞. Extracti Opii
drachmas duas ad quatuor.
Aquae calidae . . libram unam.
Contere. — In Bähungen bei prurigi-
ösen Hautkrankheiten.

Gargarisma sedativum. (Sw.)

℞. Extracti Opii
drachmam unam ad duas.
Aquae bullientis . libram unam.
Misce triturando et adde
Alcoholis unciam unam.
Bei schmerzhaften Zungen- und Halsge-
schwüren, bei rheumatischen Zahn- oder
Dhrenscherzen und sogenanntem nervösen
Kopfschmerz von Nutzen.

Clyster opiaceum. (Sp. Sw.)

℞. Seminis Lini contusi unciam unam.

Aquae bullientis . . . uncias sex.
Post horam unam infusionis cola et
in colatura solve
Extracti Opii . . . grana duo.

Injectio sedativa. (Ca.)

℞. Extracti Opii . . . grana sedecim.
Infusi Seminis Lini libram unam.

Syrupus Opii s. de Opio s. opiatu s. zhebaicus s. sedativus s. hypnoticus.
(An. Du. Fer. Gal. GalM. His C. Sw*. T. Vm.)

℞. Extracti Opii cum Aqua frigida
parati drachmas tres et grana
sexaginta.

Aquae uncias duas.
Dissolve et adde

Syrupi Sacchari libras novem et
uncias novem cum dimidia.
" Misce, coque per momenta aliquot
et per pannum cola. (Gal.)

GalM. Extracti partem unam, Aquae
quatuor et Syrupi sexcentos; — An.
Opii puri in Aquae pauxillo soluti un-
ciam unam et Syrupi bullientis uncias
quindecim, misce; — His. Extracti
scrupulum unum, Aquae uncias tres et
Syrupi libram unam ad consistentiam
requisitam coquere; — Du. et C. Ex-
tracti grana octodecim, Aquae calidae
uncias octo et Sacchari uncias viginti
novem in solutione solvendae; — Fer.
Extracti drachmas tres, Sacchari libras
quatuor et Aquae libras duas cum di-
midia; — T. Extracti semidrachmam,
Aquae drachmas duas, Sacchari clari-
ficati uncias novemdecim, calefac ad
ebullitionem usque et absque despu-
matione syrupum adhuc bullientem
per telam linteam filtra.

℞. Extracti Opii frigide parati
partem unam.

Syrupi Sacchari partes quadringen-
tas octoginta.

Commisce sensim, triturando in
mortario marmoreo pistilli magni ope.
(Vm.)

℞. Opii minutim concisi sesquiunciam.
Aquae uncias octodecim.

Macera frigide ad perfectam solutio-
nem usque, cola et partibus octo co-
laturae adde

Sacchari albi partes quindecim.
Solve in balneo aquae. (Sw*.)
Gabe, von zwei bis vier Drachmen, zwei-
oder mehrmals täglich.

Injectio Lactis opiata s. anodyna s. opiacea. (E.)

℞. Lactis recens obtenti uncias sex.
Syrupi Opii . . . unciam unam.
Commisce,

Potio narcotica. (ParC.)

℞. Syrupi Opii semunciam.
Aquae Tiliae uncias tres.
— Florum Aurantii
unciam unam.

Misce.

Syrupus Opii emulsivus. (Vm.)

℞. Gummi Arabici . . . partem unam.
Opii partes duas.
Tritura ut fiat cum
Aquae communis

partibus quadraginta sex
emulsio. Sepone et in liquore decan-
thato, blando igne, solve
Sacchari albi
partes ducentas triginta sex.

Clyster leniens s. opiatum. (E. Fi.)

℞. Opii grana duo.
Mucilaginis Gummi Arabici

semunciam.
Lactis tepidi uncias sex.
Fi. Opii granum unum, Gummi Ara-
bici pulverati drachmam unam, Lactis
vaccini uncias septem.

Haustus opiatus, Potio leniens. (Au.)

℞. Opii granum unum.
Aquae unciam unam.
Dissolve. — Auf einmal, für einen
Erwachsenen.

℞. Aquae purae semunciam.
— aromaticae,

Syrupi Opii,
singulorum drachmas duas,
Tincturae Opii . . . guttas decem.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

*Pomatum s. Unguentum leniens s. seda-
tivum. (Pie.)*

℞. Axungiae uncias tres.
Syrupi Opii unciam unam.
Essentiae Rosarum guttas quatuor.
Bei Entzündungen der Haut im Munde
passend.

Syrupus pectoralis. (Ca.)

℞. Sennae,
Radici Liquiritiae, singulorum un-
cias novem et drachmas tres.
Chinae electae
uncias sex et drachmas tres.
Anisi viridis . . . uncias quinque.
Florum Sambuci . . . uncias tres et
drachmam unam.

Summitatum Centaurii
minoris sesquiunciam.

Ipecacuanhae drachmas quinque.
Aquae quantum sufficit.

Coque per longum tempus et cola-
turae adde
Sacchari albi libras octo.

Extracti Opii gummosi drachmas
quatuor cum dimidia.
Gabe, einen halben Kaffeelöffel bis einen
Eßlöffel, in einer halben Tasse Thee.

Syrupus pectoralis Maloeti. (GalH. Bo.
Ca. Pie.)

℞. Jujubarum,
Dactylorum,
Passularum minorum,
singularum unciam unam.

Aquae quantum sufficit.
Coque, sub finem addendo

Capilli Veneris Canadensis
drachmas quatuor.

Liquiritiae drachmas duas.

Cola leviter exprimendo et adde
Sacchari crudi albi libras duas.

Fiat syrupus, cui adde
Extracti Opii cum Aquae pauillo
diluti grana sex.

Coque leviter et cola. — Gabe, eine
Unze in einer Tasse Brustthee.

Injectio leniens. (Ra.)

℞. Caputum Papaveris no. 2.
Stipitum Solani nigri

Aquae communis libram unam.

Coque et colaturae adde
Extracti Opii

grana decem ad viginti.

Mixtura ad dysenteriam. (Sw*.)

℞. Opii grana duo ad tria.
Syrupi Papaveris unciam unam.

Aquae Chamomillae Romanae
unciis sex.

Gabe, einen halben bis einen Eßfel alle
Viertelstunden.

Collyrium narcoticum. (Ca.)

℞. Infusi Foliorum Hyoscyami
semilibram.

Extracti Belladonnae grana octo.
— Opii grana quatuor.

Potio febrifuga. (Bo.)

℞. Aquae destillatae Menthae,
— Florum Aurantiorum,

— Valerianae,
singularum unciis duas.

Tincturae Castorei,
— Succini,

— Asae foetidae, singula-
rum guttas viginti quinque.

Theriaca drachmam unam.

Opii gummosi sesquigranum.

Ammoniaci liquidi guttas duodecim.

Syrupi Corticum Aurantiorum
unciis unam.

In zwei gleichen Dosen, am Tage des
Anfalls, die eine vor, die andre eine Stun-

de nach demselben zu nehmen. Man will
damit Wechselfieber geheilt haben, die der
China widerstanden hatten.

Syrupus Opii succinatus s. Karabe. (An.
GalH. Ca.)

℞. Syrupi Opii libram unam.

Acidi succinici in Aqua dissoluti
scrupulum unum.

Misce exacte. (An)
Ca. Acidi scrupulos duos.

℞. Syrupi Opii libram unam.

Spiritus Succini scrupulos duos.

Misce. (GalH.) —
Gabe, eine halbe bis eine Unze in einer
Potion.

*Pomatum s. Unguentum ad haemorrhoi-
des s. antihæmorrhoidale.* (Pie.)

℞. Extracti Opii in Aquae pauillo
dissoluti semidrachmam.

Cochlearum calcinarum
drachmam unam.

Unguenti populei unciis quatuor.
Cum Vitello Ovi unius subige.

Linimentum anodynum. (Ra.)

℞. Extracti Opii gummosi
drachmas tres.

Unguenti Althæno unciam unam.

Balsami tranquilli,
Olei Amygdalarum dulcium,
singularum unciis duas.

Diese Salbe wurde von Boyer ange-
wendet

Mixtura sedativa. (Sw.)

℞. Aquae Florum Aurantiorum
unciis sex.

Extracti Opii grana tria.

Aetheris sulphurici drachmam unam.

Sacchari albi semunciam.

Eßfelweise alle Stunden oder zwei Stun-
den.

*Collyrium anodynum s. leniens s. se-
dans.* (Ful. E. Vm.)

℞. Mucilaginis Cydoniorum
unciis unam.

Extracti Opii aquosi granum unum.

Camphorae cum gutta una Olei
tritæ grana duo.

Aquae Rosarum unciis duas.

Extractum et camphoram mixta cum
mucilaginis parte una in emulsionem
redige, cui alternatim adde mucilagi-
nem et aquam rosarum. (Ful. Vm.)

E. Opii granum unum, Camphorae
quinque et Mucilaginis Gummi Arabici
unciis unam.

Looch s. Linctus compositus. (Ra.)

℞. Looch albi unciis quatuor.

Extracti Opii . . . granum unum.
 — Chinae . . . grana quatuor.
 Camphorae . . . grana sex.
 Bei Bronchitis mit heftigem Husten und
 vieler Schleimabsonderung.

§. II. Präparate, welche das Opium
 unzersetzt, roh oder gereinigt, ent-
 halten.

A. Präparate, in denen die Wir-
 kung des Opiums gar nicht, oder
 wenigstens nicht merklich, durch
 fremde Substanzen verändert ist.

*Pulvis opiatu s. thebaicu s. Cretae
 compositu cum Opio s. Cornu Cervi
 usti cum Opio s. anodynus.* (Bor. DD.
 Ed. Gen. Han. Lon. LonN. Suec. WW.
 Br. C. E. Vm.)

℞. Opii puri . . . partem unam.
 Sacchari pulverati . . . partes viginti.
 Misce. (DD. WW.)
 Gen. Opii partem unam et Sacchari
 viginti tres.

℞. Opii . . . partem unam.
 Pulveris gummosi . . . partes novem.
 Misce exacte. (Bor. Han.)

℞. Opii . . . partem unam.
 Sacchari albi . . . partes duas.
 Pulveratis adde
 Pulveris gummosi partes duodecim.
 Misce. (Suec.)

℞. Opii . . . partem unam.
 Cornu Cervi calcinati . . . partes novem.

Pulvera. (Br.)
 Lon. LonN. Opii partem unam, Gor-
 nu Cervi usti octo et unam Coccionel-
 lae.

℞. Opii . . . partem unam.
 Calcariae subcarbonicae praeparatae . . . partes novem.

Contere. (Ed.)
 ℞. Opii . . . partem unam.
 Pulveris Cretae compositi . . . partes triginta novem.
 Misce bene. (Lon. LonN. C. Vm.)

℞. Cretae praeparatae . . . sesquidrachmam.
 Cinnamomi . . . drachmam unam.
 Piperis longi . . . grana octo.
 Opii . . . grana sex.
 Fiant doses duodecim. (E.)

*Pilulae opiatu s. ex Opio s. anody-
 naz.* (Am. BorC. DD. Ed. Fer. Han.
 WW. Au. Br. O. E. Sa. Vm.)

℞. Pulveris Opii . . . grana decem.
 — Succu Liquiritiae . . . drachmam unam.
 Fiant pilulae octoginta, quarum qua-

tuor opii granum unum continent.
 (WW.)

DD. Opii grana decem et Succu Li-
 quirittiae scrupulum unum; — BorC.
 et Au. Opii grana decem et Succu scrup-
 ulos quatuor; — Han. et Br. Opii
 partem unam et quatuor Extractu Li-
 quirittiae; — Sa. Opii unam et tres
 Extractu Liquiritiae; — Fer. Opii unam
 et sex Extractu.

℞. Opii . . . partes quatuor.
 Solve frigide in
 Aquae . . . partibus novem.
 Solutioni colatae adde
 Micae Panis albi partes duodecim.

Sepone per aliquot tempus, tunc co-
 la exprimendo et adde
 Amyli . . . partes tres.
 Sacchari . . . partem unam.
 Fiant pilulae. (Vm.)

℞. Opii . . . partem unam.
 Extractu Liquiritiae partes septem.
 Mollefactis singulo separatim in Al-
 cohole tenui adde

Pulveris Piperis Jamaicaensis . . . partes quinque.
 Fiant pilulae granorum quinque.
 (Ed. Br.)

℞. Opii . . . drachmam unam.
 Saponis . . . grana duodecim.
 Aquae . . . quantum sufficit
 ut fiant pilulae sexaginta. (Am. C. E.)

Conditum s. Opiatum antiepilepticum.
 (Sw*.)

℞. Opii . . . semidrachmam.
 Valerianae . . . sesquiunciam.
 Syrupi Papaveris quantum sufficit.
 Gabe ein Kaffeelöffel zwei oder drei
 Mal täglich.

*Unguentum s. Pomatum opiatum, Ce-
 ratum opiatum.* (B. Ca. E. Pic. Ra.
 Vm.)

℞. Opii crudi pulverati . . . drachmam unam ad duas.
 Cetati simplicis . . . uncias quatuor.
 Contere. (Ra.)
 Vm. Opii partem unam et octode-
 cim Cerati.

℞. Olei Olivarum . . . uncias duas cum dimidia.
 Ceru flavae . . . uncias duas.
 Liguatis simul adde

Opii crudi . . . grana duo.
 Misce bene. (B.)

℞. Opii crudi . . . grana viginti.
 Vitellum Ovi . . . no. 1.

Subige et adde
 Cerati Galeni . . . uncias duas.
 Misce triturando. (Ca. Pic.)

℞. Opii . . . grana quinque.
 Rhei . . . grana decem.

Cerati simplicis . sesquiunciam.

Misce trititando. (E.)

Diese Salbe dient zum Verbinden von Wunden oder zum Einreiben auf Geschwülste, Excoriationen, Pusteln, welche heftige Schmerzen verursachen.

Unguentum opiatum. (T.)

℞. Opii crudi subtilissime pulverati unciam unam.

Axungiae praeparatae uncias decem.

Agita in mortario marmoreo ad extinctionem opii usque.

Unguentum sedativo-narcoticum s. narcoticum. (B.)

℞. Opii drachmam unam.

Succi gastrici vitulini quantum sufficit.

Digere leni calore per horas viginti quatuor et adde Axungiae Porci quantum sufficit ut fiat unguentum molle.

In Einreibungen auf die Oberbauchgegend, zu einer halben bis ganzen Drachme täglich, gegen Leibschmerzen, Cardialgie, Krampffolik, Hysterie und Hypochondrie.

Unguentum anodynum s. antispasmodicum. (Gen. Pie.)

℞. Olei Olivarum uncias tres et sesquidrachmam.

Cerae drachmas sex cum dimidia. Opii crudi bene divisi unciam unam.

Coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum denuo coquatur in Aquae uncias quatuor ad duas redactis; tunc decoctum cum cerato opiaceo commisce. (Pie.)

Gen. Opii drachmam unam, Olei drachmas decem et Cerae flavae semunciam.

Bei nervösen, sogenannten asthenischen Affectionen empfohlen.

Unguentum s. Pomatum leniens. (Sm.)

℞. Olei Rosarum, Axungiae Porci, Cerae flavae, singulorum uncias duas.

Leni igne liquatis adde

Opii depurati . drachmam unam.

Trochiscin verband schmerzhaftige Anschwellungen der Brüste damit und ließ es alle zwölf Stunden erneuern.

Suppositorium sedativum s. leniens. (E.)

℞. Opii grana duo.

Saponis albi grana quatuor.

Man bringt es in den Mastdarm, wenn man kein Klystir geben kann.

Emplastrum Opii. (Ed. Ful. Li. Lon. LonN.)

℞. Emplastri Meliloti partes sedecim.

Lente liquatis, antequam refrigeratae sint, adde

Opii crudi pulverati partem unam.

Misce bene. (Li.)

Ful. Opii partem unam et Emplastri viginti quatuor.

℞. Opii pulverati . . . semunciam. Triturando commisce cum mixtura liquefacta e

Resinae Burgundicae uncias tribus.

Emplastri diachyli gummosi libra una.

Misce sedulo. (Ed. Lon.)

LonN. Aquae octarium addere et coquendo ad emplastri consistentiam redigere jubet.

Unguentum opiatum, Linimentum Opii cum Felle vitulino. (B. Au.)

℞. Opii pulverati . drachmas duas.

Digere calide per dies duos cum

Fellis vitulina . uncias duabus.

Adde deinde

Axungiae Porci . . uncias duas.

Olei Bergamottae guttas decem.

Von Breera als ein sehr gutes Bindemittel empfohlen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums durch Zusatz reizender Substanzen mehr oder weniger verändert, bisweilen selbst ganz verdeckt ist.

Trochisci bechici opii s. opiacei. (Am. Wür. C.)

℞. Opii,

Balsami Peruviani,

singulorum drachmam unam.

Sacchari albi . drachmas duas.

Masae Trochiscorum bechicorum

nigrorum . . uncias septem.

Opio cum balsamo et saccharo trituratis adde massam in aqua calida mollefactam et trochiscos granorum decem ad quindecim forma. (Wür.)

Am. et C. Opii drachmas duas, Tincturae Balsami Tolutani semunciam, Syrupi Balsami Tolutani uncias octo, Extracti Liquiritiae, Gummi Arabici, singulorum uncias quinque ut fiant trochisci granorum decem.

Pilulae antiemeticae. (Pie.)

℞. Opii purificati . Igrana quatuor.

Radicis Colombo scrupulos quatuor.

Olei essentialis Menthae piperitae

guttas decem.

Syrupi Caryophyllorum rubrorum

quantum sufficit.

Fiant pilulae triginta. — Gabe, sechs Stück täglich, auf drei Mal.

Pulvis Nitri thebaicus s. sedativus s.

antispasmodicus Rosensteinii. (B. Ful. Li. Suec. Sp.)

℞. Opii partem unam.
Nitri partes quindecim.
Sacchari

partes quadraginta quinque.

Misce simul. (Pul.)

B*, et Suec. Opii partem unam, Nitri undecim et Sacchari quadraginta octo; — Sp. Opii unam, Nitri decem et Sacchari quadraginta octo; — Li. Opii unam, Nitri duodecim, et Sacchari quadraginta octo.

Pulvis anodynus. (Ham.)

℞. Opii puri grana quatuor.
Magnesiae stibiatae drachmas duas.
Divide in partes octo. — Bei Rheumatismus empfohlen.

Pulvis antidyentericus. (Vm.)

℞. Opii,
Tartari stibiati,
singulorum partem unam.
Gummi Arabici,
Sacchari albi,

singulorum partes octo.
Misce. — Dieses und das vorhergehende Pulver haben, hinsichtlich der Wirkung, Aehnlichkeit mit dem folgenden.

Pulvis adstringens. (B.)

℞. Opii,
Ipecacuanhae,
singulorum granum unum.
Cascarillae grana decem.
Drei oder vier Mal täglich, bei rebellischer Diarrhöe von Atonie.

Pilulae e Storace. (Br. Du. Gen. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. Sp. Sw. Vm.)

℞. Storacis Calamita semunciam.
Succi Liquiritiae drachmas tres.
Olibani,
Benzoës,
Mastichs,
Extracti Opii,
singulorum drachmas duas.
Crocii drachmam unam.
Essentiae Succini quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Br. Pal. Wir. Sp.)

Sar. Storacis semunciam, Succi Liquiritiae drachmas duas, Olibani, Benzoës, Myrrhae, Extracti Opii, singulorum drachmam unam, Crocii scrupulos duos et Syrupi Papaveris quantum sufficit; — Vm. Benzoës, Myrrhae, Olibani, Opii, Crocii, singulorum partem unam, Succi Liquiritiae partem unam cum dimidia, Storacis partes duas et Syrupi Sacchari quantum sufficit.

℞. Storacis Calamita uncias duas.

Extracti Liquiritiae,
Crocii, singulorum drachmas sex.
Opii drachmas quinque.
Balsami Peruviani quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (Wür.)

℞. Storacis,
Crocii,
Extracti Liquiritiae,
singulorum unciam unam
— Opii drachmas quinque.
Tincturae Myrrhae
quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (Sw.)

℞. Storacis drachmas duas.
Succi Liquiritiae drachmas tres.
Opii drachmam unam.
Vini Hispanici quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Suec.)

Du. Storacis drachmas tres, Crocii et Opii, singulorum drachmam unam.

℞. Storacis,
Olibani,
Myrrhae, singulorum semunciam.
Opii,
Crocii,
Extracti Liquiritiae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (Gen.)

Reizend, Brustmittel. — Gabe, vier bis zwölf Gran.

Pulvis alexiterius s. anodynus s. diaphoreticus s. diapnoicus s. sudorificus s. sudorificus Doveri s. Doweri, Pulvis Doveri, Pulvis Ipecacuanhae opiatum s. thebaicus s. Ipecacuanhae et Opii s. compositum s. Ipecacuanhae cum Opio. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. B. Br. C. Ca. E. Fi. Pie. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

℞. Pulveris Opii purificati
partem unam.
— Ipecacuanhae partes duas.
— Sacchari albi
partes septem.

Misce bene. (Fer. GalM.)

A. D. et WW. Opii et Ipecacuanhae, singulorum partem unam et octo Sacchari; — DD. Opii et Ipecacuanhae, singulorum unam et viginti Sacchari; — Pie. Opii unam, Ipecacuanhae duas et Sacchari octodecim.

℞. Opii purificati,
Ipecacuanhae,
singulorum partem unam.
Kali sulphurici partes octo.
Pulverata seorsim commisce. (Am. Ba. Bor. BorC. Du. Ed. Fenn. Han.)

HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pol. RC. Suec. Wir. Br. C.)

Ams. B. Bel. Li. R. Sax. et Wür. Opii, Ipecacuanhae, singulorum partem unam et Kali sulphurici partes novem; — B. Opii, Ipecacuanhae, singulorum unam et decem Kali sulphurici; — Bor4. Opii, Ipecacuanhae, singulorum unam, Kali sulphurici sedecim.

℞. Nitri,

Kali sulphurici,

singulorum partes quatuor.

Pulverata et mixta in crucibulum immitte et liqua, massam fluidam in mortarium ferreum infunde et fere refrigeratae adde

Pulveris Opii,

— Ipecacuanhae,

singulorum partem unam.

Fiat pulvis subtilissimus. (Gen. Ca. Sa Sw. Sy.)

Ham. et E. Salium cujusque partes octo et singularum duarum reliquarum substantiarum partem unam; — Vm.

Nitri, Sulphatis, Ipecacuanhae, singulorum quatuor et unam Opii; — An. Salium, singulorum quatuor, Ipecacuanhae duas et unam Opii; — His. Sulphatis quatuor, Nitri sex, Ipecacuanhae unam et unam Opii.

℞. Kali sulphurici,

Nitri, singulorum partes quatuor.

Massae liquatae et refrigeratae adde

Pulveris Extracti Opii,

— Ipecacuanhae,

— Liquiritiae,

singulorum partem unam.

Fiat pulvis. (Gal. Sp. Fi. T.)

Sw*. Sulphatis partes quatuor, Nitri tres et Pulverum singulorum unam.

Bestere Formel ist die von Dover gebene.

Das Dover'sche Pulver, meist Etel und Brechen erregend, wirkt schweißtreibend, wenn der Kranke sich gut bedeckt und warmes Getränk zu sich nimmt. Die Gabe, welche, abgesehen von individuellen und andern zufälligen Umständen, je nach der relativen Menge des Opiums, sehr verschieden ist, beträgt gemeinlich zehn Gran bis eine halbe Drachme.

Pulvis diaphoreticus et sedativus. (B.)

℞. Pulveris Doweri,

— Jamesii,

singulorum grana quatuor.

Alle vier Stunden bei rheumatischen, syphilitischen und hartnäckigen Gichtschmerzen.

Boli sedativi s. diaphoretici. (B. Sw.)

℞. Pulveris Doweri grana viginti ad viginti quinque.

Syrupl Zingiberis quantum sufficit. Morgens zu nehmen. (Sw.)

B. Pulveris Doweri grana sedecim et Roob Sambuci quantum satis ut fiant boli quatuor; vel: Pulveris grana duodecim et Extracti Aconiti sex ut fiant boli sex. — Alle zwei Stunden ein Stück.

Pulvis anodynus. (Ham.)

℞. Magnesiae . . . drachmam unam.

Florum Zinci . . . grana sedecim.

Pulveris Ipecacuanhae,

Opii puri,

singulorum drachmas duas.

Misce sedulo. — Dieses Pulver hat viel Ähnlichkeit mit dem Dover'schen.

Mixtura antiododynica. (Pic.)

℞. Opii . . . grana tria ad quatuor.

Croci semiscrupulum.

Myrrhae semidrachmam.

Succi Malvae semunciam.

Olei Amygdalarum dulcium

uncias duas.

Pic. praeterea: Camphorae et Opii, singulorum grana duo; Olei Caryophyllorum rubrorum sesquunciam.

Beide Mixturen werden langsam in das Ohr eingespritzt.

Mixtura antidontalgica. (Sa.)

℞. Opii puri semigranum.

Olei essentialis Caryophyllorum

guttas decem.

Liquoris Hoffmanni

sesquidrachmam.

Gebrauch, wie bei den vorhergehenden.

Unguentum anodynum s. ad haemorrhoides. (Ful. Wür. Fi.)

℞. Opii,

Croci,

singulorum scrupulum unum.

Vitellum Ovi no. 1.

Unguenti populei,

— nutriti,

singulorum unciam unam.

Misce bene. (Ful.)

Fi. Unguenti nutriti, Unguenti populei, singulorum uncias sex; Opii pulverati drachmas duas, Croci scrupulos duos, Olei Ovorum, scrupulos quatuor; — Wür. Cerati Saturni uncias tres, Unguenti populei tantidem, Opii, Croci, singulorum drachmam unam et Vitellos Ovorum no. 3.

Besonders bei Hämorrhoidal Schmerzen empfohlen.

Pilulae Opii saponaceae s. Saponis cum Opio. (Am. Lon. LonN. Wür. C.)

℞. Opii pulverati . . . semunciam.

Saponis duri . . . uncias duas.

Fiat massa pilularis. (Lon. LonN.)
Am. et C. Opii drachmam unam et
Saponis Alicantini grana duodecim ut
fiant pilulae sexaginta.

℞. Opii purificati,
Pulveris Radicis Liquiritiae,
— — Hellebori albi,
— — — nigri,
singulorum semunciam.
Saponis Starkeyani
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Wür.)

Cataplasma antispasmodicum. (Ca. Pie.)

℞. Cataplasmatris Farinae Seminis Li-
ni in decocto Capitum Papaveris
et Croci decocti uncias quatuor.

Consperge

Pulveris Opii crudi granis viginti.
— Camphorae semidrachma.

Emplastrum antispasmodicum. (Au. E. Sa.)

℞. Emplastri Cumini,
Cerae flavae,
singulorum unciam unam.

Opii,
Camphorae,
singulorum drachmas duas.

Commisce bene. (Sa.)

℞. Opii,
Camphorae,
singulorum semidrachmam.

Emplastri Lithargyri
drachmas duas.

Misce. (E.)

℞. Opii,
Camphorae,
Saponis alb',
singulorum drachmam unam.

Tincturae thebaicae
quantum sufficit

ut fiat massa mollis. (E.)

℞. Opii,
Extracti Hyoscyami,
singulorum drachmas duas.
— Cicutae . . . semunciam.

Misce. (Au.)

℞. Opii,
Salis volatilis Cornu Cervi,
Camphorae,
singulorum semidrachmam.

Petrolei . . . drachmas duas.
Emplastri de Galbano crocatis
unciam unam.

Misce. (Au.)

Balsamum antidontalgicum. (Pal. Wir.
Au. Pie. Sm. Sp. Vm.)

℞. Opii,
Camphorae,
singulorum scrupulos duos.
Dissolutis in Alcoholis pauxillo adde
Olei essentialis Caryophyllorum
drachmam unam.

Olei essentialis Guajaci
drachmas duas.

— Nucis moschatae expressi
drachmas sex.

Misce bene. (Pal. Wir. Ca. Pie. Sp.
Vm.)

℞. Opii,
Camphorae,
singulorum scrupulum unum.
Olei Cajeput . . . drachmam unam.
— Nucis moschatae
drachmas tres.

Misce sedulo. (Sm.)

Man bringt ein wenig von diesem Bal-
sam in die Höhle des cariösen Zahns.

Hierher gehört auch die *Sotirella parva*,
von Br. und Sp. nach *Minderer*, wozu
die Formel folgende ist:

℞. Opii,
Specierum diambrae,
singulorum drachmam unam.
Camphorae,
Croci,
singulorum grana duodecim.
Olei Caryophyllorum
guttas triginta.
— Nucis moschatae
drachmas duas.

Fiat opiatum spissum. — Man bringt
ein Kügelchen davon in den schmerzhaften
Zahn.

℞. Opii semidrachmam.
Extracti Belladonnae,
Camphorae, singulorum grana sex.
Olei Cajeput,
Tincturae Cantharidum,
singulorum guttas octo.
Olei Hyoscyami drachmam unam.

Man bringt ein wenig davon in den
schmerzhaften Zahn. (Au.)

℞. Pulveris Mastichis,
— Sandaracae,
singulorum drachmas duas.
Sanguinis Draconis grana decem.
Opii grana duo.
Olei Rosmarini . . . guttas octo.
Spiritus Cochleariae
quantum sufficit.

Man bringt etwas davon auf das schmerz-
hafte Zahnfleisch. (Au.)

Pilulae antispasmodicae. (Ful.)

℞. Opii,
Castorei,
singulorum grana quindecim.
Camphorae . . . semidrachmam.
Extracti Valerianae,
— Vulvariae,
singulorum drachmas duas.
Tincturae Millefolii
quantum sufficit.

Gabe, zehn bis zwanzig Gran.

Boli antispasmodici. (Pie.)

- ℞. Opii . . . granum dimidium.
 Camphorae . . . grana tria.
 Nitri . . . grana decem.
 Conservae Rosarum . . .
 quantum sufficit.

Auf einmal.

Trochisci Chaussieri. (Ca.)

- ℞. Opii . . . grana sex.
 Camphorae . . . grana viginti unum.
 Sacchari . . . drachmas tres.
 Mucilaginis . . . quantum sufficit.
 ut fiant trochisci quinquaginta. — Bei
 Group und Kopflopfschwindelsucht empfohlen.
 — Gabe, fünf bis sechs Stück täglich.

Trochisci Chaussieri. (Ca. Sw.)

- ℞. Opii . . . scrupulum unum.
 Camphorae . . . drachmam unam.
 Sacchari . . . drachmas novem.
 Gummi Tragacanthae . . .
 semidrachmam.

Aquae . . . quantum sufficit
 ut fiat massa centum quinquaginta tro-
 chiscorum.

Gabe, vier bis sechs Stück täglich.

Pulvis antispasmodicus. (Sw)*

- ℞. Opii . . . semiscrupulum.
 Camphorae . . . scrupulos duos.
 Ammonii subcarbonici . . .
 scrupulos quatuor.
 Amyli . . . grana quindecim.
 Divide in partes octodecim. — Gabe,
 ein Stück alle Stunden in Münzenwasser.

Balsamum ad cancerum. (Bo.)

- ℞. Opii . . . grana viginti quatuor.
 Plumbi acetici crystallisati . . .
 uncias quatuor.
 Camphorae . . . drachmam unam.
 Essentiae Terebinthinae . . .
 uncias duodecim.

Digere per duos dies et filtra.

Unguentum Renal. (Pal.)

- ℞. Opii . . . scrupulum unum.
 Camphorae . . . semiscrupulum.
 Olei Scorpionum,
 Succii Citri,
 singulorum semunciam.
 Unguenti populei sesquiunciam.
 Misce. — Bei Steincolik empfohlen.

Emplastrum anodynum. (Br. Sp.)

- ℞. Emplastri Saponis,
 Ceræ flavae,
 singulorum uncias quatuor.
 Liqua et massae semirefrigeratae
 adde
 Olei Tartari foetidi . . .
 drachmas quinque.

- Opii pulverati . . . semunciam.
 Camphorae . . . drachmas tres,

in

- Olei Seminum Hyoscyami . . .
 drachmis quinque
 solutas. — Bei Gelenkfrantheiten em-
 pfohlen.

Pilulae orientales. (Ca.)

- ℞. Opii purificati,
 Croci,
 Cinnamomi,
 Nucis moschatae,
 Cardamomi minoris,
 singulorum partes aequales.
 Syrupi Florum Aurantii . . .
 quantum sufficit
 ut fiant pilulae trium granorum. —
 Gabe, Abends zwei oder drei Stück.

Pilulae tonicae et hypnoticae. (Pie.)

- ℞. Opii,
 Olibani,
 Storacis,
 Myrrhae,
 Succii Liquiritiae,
 singulorum scrupulos duos.
 Amyli . . . drachmas duas.
 Gummi Tragacanthae,
 — Arabici,
 singulorum semunciam.
 Gabe, ein halber Scrupel bis eine halbe
 Drachme.

Pilulae ad tussim Schroederi. (Fi.)

- ℞. Opii depurati,
 Croci orientalis,
 Myrrhae,
 singulorum scrupulum unum.
 Olibani,
 Succii Liquiritiae,
 singulorum drachmam unam.
 Pulverata cum Syrupio Papaveris albi
 in massam redige. — Gabe, sechs bis
 zwölf Gran.

*Pilulae de Cynoglossio s. Opii com-
 positae, Catapota ad catarrhos, Pilulae
 extracti Opii s. lenientes Mesues. (An.
 B*. Bel. Br. Gal. GalM. Han. His. Pal.
 Sar. Wir. Ca. Pie. Sp. Vm.)*

1) Ohne Bibergeil.

- ℞. Corticis siccati Radicis Cynoglossi
 unciam unam.
 Seminum Hyoscyami albi,
 Opii, singulorum drachmas duas.
 Olibani . . . drachmas sex.
 Croci . . . drachmam unam.
 Balsami Peruviani nigri . . .
 quantum sufficit.
 Misce opium, seorsim pulveratum,
 cum reliquis substantiis, simul pulve-
 ratis et adde sensim balsamum ut fiat
 massa. (Sar.)

R. Pulveris Radicis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
— Opii purificati,
singulorum semunciam.

Myrrhae . . . drachmas sex.

Olibani . . . drachmas quinque.

Storacis Calamita,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

singulorum drachmas duas.

Croci . . . sesquidrachmam.

Syrupi Violarum quantum sufficit
ut fiat massa pilularis, cujus drachma
quaeque, Opii et Hyoscyami, singulo-
rum grana octo continet. (Sp.)

B*. Br. Pal. et Wir. eandem formulam
indicant, sed B*. Myrrhae et Oli-
bani, singulorum drachmas duas; —
Br. Pal. et Wir. Succi Cynoglossi et
Syrupi Violarum quantitatem aequa-
lem.

R. Pulveris Radicis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
— Opii,
singulorum unciam unam.

Myrrhae,

— Olibani,

singulorum sesquunciam.

— Storacis Calamita,

— Caryophyllorum,

— Cinnamomi,

singulorum semunciam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Han.)

2) Mit Sibergeil.

R. Extracti Opii aquosi . . . drachmas tres.

Corticis Radicis Cynoglossi . . . uncias duas.

Croci . . . drachmas quinque.

Castorei . . . drachmas sex.

Syrupi Sacchari drachmas novem.

Fiat massa, cujus quisque scrupulus

Opii grana duo continet. (His.)

Dies ist die einzige Formel, welche das
Schierlingstraub wegläßt.

R. Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami,
Extracti Opii vinosi,
singulorum partes quatuor.

Castorei,

Croci, singulorum partem unam
cum dimidia.

Olibani . . . partes quinque.

Myrrhae . . . partes sex.

Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Vm.)

R. Myrrhae . . . sesquiunciam.

Olibani . . . drachmas decem.

Radicis Cynoglossi,

Seminum Hyoscyami nigri,

Opii, singulorum unciam unam.

Pharmacopoea universalis. II.

Castorei,
Croci, singulorum drachmas tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Bel.)

R. Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami albi,
Opii purificati,
singulorum semunciam.

Myrrhae . . . drachmas sex.

Olibani . . . drachmas quinque.

Croci,

Castorei,

singulorum drachmas duas.

Syrupi Violarum,

— Cynoglossi,

singulorum quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Br. Pal. Wir.)

Gal. GalM. Ca. et Pie. eandem in-
dicant formulam sed loco opii purifi-
cati extractum vinosum et loco syru-
porum dictorum illum Opii, praeterea
Croci et Castorei semidrachmam et
pondus pilularum granorum quatuor
adhibent.

R. Myrrhae . . . drachmas sex.
Olibani . . . drachmas quinque.
Corticis radice Cynoglossi . . . semunciam.

Croci,

Castorei,

singulorum sesquidrachmam.

Pulverata seorsim commisce, adde
Seminum Hyoscyami nigri contu-
sorium . . . semunciam.
et cola totum per cribrum: tum

R. Opii purati . . . semunciam.
Aeque destillatae drachmas duas.

Solve blando calore in mortario mar-
moreo, addendo

Syrupi Opii . . . unciam unam.

Admisce pulveres et adde praeterea

Syrupi Opii quantum satis ut fiat mas-
sa bene subigenda. (Au.)

Pi. löst die radix cynoglossi ganz weg,
da sie durch Trocknen das narkotische Prin-
cip verliere, und substituirt ihr die capita
Papaveris auf folgende Weise:

R. Opii puri,
Capitum Papaveris albi,
Seminum Hyoscyami albi,
Cinnamomi,

singulorum unciam dimidiam.

Gummi Myrrhae drachmas sex.

Olibani in lacrymis

drachmas quinque.

Storacis in lacrymis,

Caryophyllorum,

singulorum drachmas duas.

Syrupi Succi Violarum

quantum sufficit

ut fiat massa pilularis.

Diese berühmten Pillen sind als Veru-

higungsmittel bei Catarrhen, Blutspeten und Harnstrenge sehr in Gebrauch.

Pilulae ad sputum sanguinis Deckers.
(Fi.)

℞. Pilularum de Cynoglosso (Fi.)
drachmas duas.
Laudani nepentes Quercetani

grana sex.
Crocii orientalis scrupulos duos.
Succi Liquiritiae unciam dimidiam.

Succum liquiritiae in aqua destillata calida solutum cum reliquis conjunge, ut fiat massa, in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Gabe, eine bis drei täglich.

Emplastrum contra colicam s. ad tormina ventris. (Sw.)

℞. Emplastri diachyli simplicis
uncias duas.
Galbani unciam unam.
Olei essentialis Carvi
drachmas duas.

Liquatis adde
Opii drachmam unam.

Bei Windcolik, Diarrhoe und Ruhr empfohlen.

Emplastrum anodynum. (Sp.)

℞. Emplastri diapompholigos
unciam unam.
Fuliginis . . . scrupulos quatuor.
Opii pulverati drachmam unam.
Ammonii subcarbonici
scrupulos duos.

Malaxa cum olei Solani sufficiente quantitate. — Decker empfahl es bei Krebs.

Emplastrum odontalgicum. (Br. Sar. Wir.)

℞. Tacamahacae,
Elemi,
Mastichis,
singulorum unciam unam.
Opii drachmas duas.
Misce triturando cum
Terebinthinae Venetae
drachmis duabus.

Bei Zahn-, Kopfschmerzen und catarrhischen Ausflüssen empfohlen. Man streicht es mittelst eines erwärmten Spatels auf Zaffet und bringt es so auf die Wangen und die Schläfe.

Hierher kann man auch das *Emplastrum ad tempora* Br. zählen, welches nach folgender Formel bereitet ist:

℞. Resinae Anime,
— Carannae,
— Elemi,
Mastichis,
Storacis Calamita,

Succini,
singulorum drachmas duas.
Terebinthinae . . drachmas tres.
Opii crudi,
Balsami Peruviani,
singulorum drachmam unam.
Olei Caryophyllorum,
— Succini,
singulorum guttas tres.

Fiat emplastrum. (Br.)

℞. Opii siccati . . . unciam unam.
Mastichis,
Sandaracae, singulorum drachmas
duas et grana septem.

Sanguinis Draconis semidrachmam.
Pulverata seorsim et commixta humecta cum Olei Rorismarini guttis octo, contunde deinde totum in mortario marmoreo, sensim affundendo Spiritus Cochleariae quantum satis ut massa mollis obtineatur.

Auch gehören hierher noch das *Emplastrum cephalicum*, *Emplastrum opiatum*, welche man bei B. Bel. Bor. Bor4. Han. O. Sax. Sp. Vm. findet, und deren Zusammensetzung sehr verschieden ist:

℞. Elemi,
Mastichis,
Olibani,
singulorum uncias quatuor.

Benzoës uncias duas.
Terebinthinae uncias sex.

Liquatis in balneo aquae adde

Balsami Peruviani . . semunciam.
Opii pulverati . . . unciam unam.

Misce bene. (B. Bel. Han. O. Sax.)

Bor. Balsamum Peruvianum omittit; — Vm. Balsami Peruviani partem unam, Opii duas, Benzoës quatuor, Elemi, Mastichis, Olibani, Terebinthinae, singulorum octo; — Bor4. Terebinthinae drachmas tres, Elemi, Olei Olivarum Provincialis, singulorum drachmam unam, liquatis adde Mastiches, Olibani, singulorum pulv. drachmas duas, Benzoës drachmam unam, massae homogeneae adde Opii pulv. drachmam dimidiam.

℞. Tacamahacae,
Styracis liquidae,
Mastichis,
Carannae, singulorum partes octo.
Balsami Peruviani partes quatuor.
Opii,
Olei Succini rectificati,

singulorum partem unam.
Pulveribus carannae, mastichis et tacamahacae in mortario calefacto mixtis adde subigendo styracem et balsamum, tunc opium et oleum. (Vm.)

Vm. praeterea Opii partem unam, Balsami Peruviani duas, Benzoës, Terebinthinae, singulorum tantidem, Ele-

mf, Olibani et Tacamahacae, singulorum quatuor; — Sp. Tacamahacae, Carranae, Storacis Calamita, Mastichis, singulorum unciam unam, Terebinthinae drachmas duas, Opii scrupulos quatuor, Balsami Peruviani semunciam et Olei Succini drachmam unam.

Unguentum hypnoticum. (Wir.)

℞. Unguenti alabastrini,
— rosati,
singulorum semunciam.
— populei . . . uncias duas.
Olei Hyoscyami . . . semunciam.
— Juglandis sesquidrachmam.
Opii in Aqua Rosarum soluti
drachmam unam.

Croci semidrachmam.
Gerae albae semunciam.
Diese Salbe wurde ehemals auf die Schläfe
und die Handwurzel, auf Beinwand gestrichen,
aufgelegt.

Emplastrum regale. (Wir.)

℞. Ceræ flavae sesquilibram.
Resinae Pini semilibram.
Liquatis blando igne, liquorem cola
et massae paullo refrigeratae adde
Pulveris Tacamahacae;
— Elemi,
— Olibani,
— Sanguinis Draconis,
singulorum unciam unam.

Adde deinde

Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanax,
Bdellii,
Asae foetidae,
Resinae Hederae,
singulorum unciam unam.

Extracti Opii,
— Croci,
singulorum drachmas duas.

Solve totum in aceto vini, cola exprimendo; calefac ad mellis consistentiam usque et adde, continue agitando, Terebinthinae Venetae libram unam, Gummi Tragacanthae uncias decem, Castorei semunciam, Ammonii subcarbonici
sesquiunciam.

Ehemal besonders bei Dabem empfohlen.

Trochisci Succini s. de Karabe. (Wir.)

℞. Opii,
Croci,
Myrrhae, singulorum drachmam unam et grana quindecim.
Cornu Cerviusti,
Corallii rubri,
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,

Mastichis,
Laccae,
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
Balaustrorum,
Seminum Papaveris nigri,
singulorum drachmas duas.
Succini drachmas sex.
Mucilaginis Psyllii quantum sufficit
ut fiat massa in trochiscos dividenda.
— Mesue empfahl diese Trochisken bei
Blutflüssen, besonders bei Blutpeien und
Mutterblutfluss, eben so bei Durchfall
und übermäßigem Hämorrhoidalfluss. Jede
Drachme enthält drei Gran Opium. Jetzt
sind sie in Vergessenheit gekommen.

Pilulae antidysentericae. (Lus.)

℞. Opii,
Extracti Catechu,
— Bistortae,
— Angelicae,
— Contrayervae,
— Calami,
— Tormentillae,
— Zedoariae,
— Millefolii,
— Scordii,
— Corticis Granati,
— Rosarum rubrarum,
— Balaustiorum,
— Croci,
— Myrrhae,
— Rhei,
singulorum drachmas duas.

Olei Nucis moschatae
drachmas tres.
— Macidis drachmam unam.

Balsami Peruviani
drachmas tres cum dimidia.
Olei Juniperi drachmas duas.

Fiat massa pilularis. — Gabe, vier
bis acht Gran, drei bis vier Mal täglich,
für Erwachsene.

*Electuarium mithridaticum, Antidotus
mithridatica Democriti.* (Pal. Sar.
Wir. Sp.)

℞. Myrrhae electae,
Croci,
Agarici,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Nardi Indicae,
Olibani,
Seminum Thlaspi,
singulorum uncias decem.
— Dauci uncias septem.
— Foeniculi,
— Anisi,
— Petroselinii, singulorum
uncias quinque.
— Seselios,

- Seminum Hyperici, singulorum un-
cias duas cum dimidia.
- Herbae Schoenanthi uncias octo.
— Pulegii,
— Scordii,
singularum uncias septem.
- Radices Costi Arabici,
— Gentianae,
singularum uncias octo.
— Calami,
— Asari,
— Valerianae,
singularum uncias tres.
— Mei
uncias duas cum dimidia.
- Storacis,
Piperis longi, singulorum uncias octo.
— albi . . . uncias septem.
- Castorei uncias duas cum dimidia.
- Succi Acaciae,
— Hypoistidis,
Malabathri, singulorum uncias octo.
Carpobalsami . . . uncias septem.
- Gummi Arabici,
Opii,
Cardamomi minoris,
Petolorum Rosarum rubrarum,
singulorum uncias quinque.
- Trochiscorum cyphoeo
uncias septem.
- Pulveratis et mixtis adde
Galbani,
Opopauacis, singulorum uncias octo.
Bdellii uncias quinque.
Sagapeni uncias tres.
- Dilue in
Vini Hispanici
unciis quadraginta octo.
- Commisce cum
Mellis unciis octingentis sexaginta
antea tritis cum
Opobalsami,
Terebinthinae,
singulorum unciis octo.
- Misce exacte. (Sp.) — Diese Formel
ist aus Galen entlehnt.
- R. Radices Aristolochiae rotundae,
— Valerianae, singularum un-
cias quatuor cum dimidia.
— Calami uncias quinque et
drachmas tres.
— Gentianae uncias septem
cum dimidia.
— Mei uncias tres et drach-
mas sex.
— Zingiberis
uncias quindecim.
- Herbae Dictamni Cretici
uncias septem cum dimidia.
— Polii montani,
— Scordii Cretici,
singularum uncias decem
cum dimidia.
- Malabathri (Foliorum Dolorum)
uncias duodecim.
- Florum Hyperici
uncias tres cum dimidia.
— Stoechadis Arabicae
uncias duodecim.
— Rosarum rubrarum,
Nardi Celticae, singulorum uncias
septem cum dimidia.
— Indicae uncias quindecim.
- Schoenanthi . . . uncias tredecim.
Seminum Thlaspios
uncias quindecim.
— Seseleos uncias duodecim.
— Dauci Cretici
uncias decem cum dimidia.
— Petroselini Macedonici,
— Foeniculi, singulorum un-
cias septem cum dimidia.
— Anisi
uncias quatuor cum dimidia.
- Baccarum Juniperi unciam unam.
Piperis longi . . . uncias duodecim.
— albi,
Carpobalsami, singulorum uncias
decem cum dimidia.
- Cardamomi minoris
uncias septem cum dimidia.
Crocii uncias quindecim.
Cinnamoni uncias quindecim cum
dimidia.
- Costi Arabicae uncias duodecim.
Cassiae lignae
uncias decem cum dimidia.
- Trochiscorum Agarici
uncias quindecim.
- Castorei uncias duodecim.
- Scinci marini
uncias tres cum dimidia.
- Myrrhae electae uncias sedecim.
Olibani uncias quindecim.
Bdellii uncias decem cum dimidia.
Gummi Arabici
uncias septem cum dimidia.
- Pulverata misce et cribra; tunc in
Vini boni libris octo dissolve
Galbani,
Opopauacis,
singulorum uncias duodecim.
- Sagapeni
uncias quatuor cum dimidia.
- Succi Hypocistidis uncias duodecim.
— Acaciae . . . uncias quatuor.
- Opii electi
uncias septem cum dimidia.
- Solutionem misce cum
Mellis despumati
libris centum et sedecim.
- Pulverem sensim, agitando continuè,
admisce. Miscellae delude infunde
Storacis in granis uncias duodecim
dissolutas in . . .

Terebinthinae clarae
uncias quatuordecim.

Adde denique

Opobalsami . uncias duodecim.
Agita denuo per horas aliquot et in
vase amplo fermentationi subijce. (Wir.)
Bei der folgenden Formel sind die In-
gredienten der Patwerge eben so classificirt
wie bei'm Spherial.

1. Classe. Anisi . drachmas duas cum
dimidia.

Zingiberis drachmas decem.

Macidis,

Caryophyllorum,
singulorum semunciam.

Gentianae drachmas quinque.

Pondus totius est unciarum tres et
sesquidrachma.

2. Classe. Scordii Cretici
drachmas septem.

Nardi Celticae,

Seminum Petroselini, singu-
lorum drachmas quinque.

Piperis longi unciam unam.

Pondus totum uncias tres et drach-
mas unam aequat.

3. Classe. Polii montani
drachmas septem.

Seminum Foeniculi

drachmas quinque.

Valerianae drachmas duas
cum dimidia.

Pondus totum unciam unam et drach-
mas sex cum dimidia aequat.

4. Classe. Cinnamomi drachmas decem.

Zedoariae,

Seseleos,

singulorum unciam unam.

Rosarum rubrarum
drachmas quinque.

Pondus totum uncias tres et septem
drachmas aequat.

5. Classe. Dictamni Cretici
drachmas quinque.

Cassiae lignae,

Cubebarum,

Piperis albi, singulorum
drachmas septem.

Seminum Thlaspios

drachmas decem.

Pondus totius quatuor uncias cum
dimidia aequat.

6. Classe. Seminum Dauci
drachmas septem.

Cardamomi minoris

drachmas quinque.

Galami,

Aristolochiae rotundae,
Angelicae,

Hyperici, singulorum drach-
mas duas cum dimidia.

Pondus totum uncias duas et drach-
mas sex cum dimidia aequat.

Quaque harum sex miscellarum seorsim
pulverata, pulvera seorsim quam-
que substantiarum sequentium:

Myrrhae,

Olibani,

Agarici,

Croci, singulorum drachmas
decem.

Castorei . unciam unam.

Bdellii . drachmas septem.

Scinci marini concisi drach-
mas duas cum dimidia.

Recipe tunc
Nardi Indicae,

Schoenanthi, . singulorum
drachmas decem.

Stoechadis Arabicae,
unciam unam,

Mintum concisa imbibere Muclagine
Gummi Tragacanthae tunc sicca et pul-
vera.

Praeterea pulvera
Trochiscorum cypaeos

drachmas septem
vel eorum ingredientium proportionem
aequalem.

Dissolve deinde
Opii,

Gummi Arabici, singulorum
drachmas quinque.

Succi Hypocistidis
unciam unam.

— Acaciae drachmas duas
cum dimidia

in Vini Cretici sufficiente quantitate;
adde

Mellis despumati . triplum
ponderis totius, cum

Terebinthinae clarae
uncia una

triti. Commisce sensim pulveres et
adde denique

Storaos . unciam unam,

in Oleo Nucis moschatae et Vino dis-
soluti, et fermentationi subijce. (Pal.)

R. Castorei,

Croci,

Olei Nucis moschatae,

Suocini,

Terebinthinae Cypriae,

Galbani,

Myrrhae,

Gummi Arabici,
singulorum sesquunciam.

Galami aromatici,

Costi Arabici,

Aristolochiae rotundae,
Valerianae,
Zedoariae,
singulorum unciam unam.

Foliorum Dictamni Cretici,
— Marrubii albi,
— Rutaee.

Foliorum Serpylli,
 — Pulegii,
 Florum Junci odorati,
 — Chamomillae,
 — Polii montani,
 — Stoechadis Arabicae,
 — Tanacetii,
 Seminum Ammi,
 — Dauci,
 — Cardamomi minoris,

Cubeborum,
 singularum drachmas decem.

Opii electi . . . drachmas sex.

Mellis albi . . . triplum totius.

Vini Maderani quantum sufficit.

Opium in vino dissolutum melli ca-
 lefacto adde, mixturae oleum nucis
 moschatae cum terebinthina liquatum
 tepidum infunde; pulveres cribri ope
 commisce et denique croco pulverato
 vino diluto addito, massam fermenta-
 tionis subjice. (Sar.)

Dieses Präparat, dessen Erfindung man
 dem Mithridat, König in Pontus, zu-
 schreibt, von welchem Pompejus das Re-
 cept mit nach Rom brachte und welches
 Democritus besang, wurde gleich an-
 fangs als giftwürgig, magenstärkend, stär-
 kend, schmerzstillend, mit Einem Worte, als
 eine Panacee betrachtet. Alle neue Phar-
 macopöden lassen es weg. Nach der Formel
 von Wir. enthält jede Unze drei Gran
 Opium und vier Gran Safran.

Julapium mithridaticum. (Sa.)

R. Electuarii mithridatici
 drachmas duas.

Julapii communis absque saccharo
 uncias quinque.

Misce.

*Theriaca, Electuarium theriacale mag-
 num s. Opii compositum s. aromatico-
 opiatum s. opiatum s. thebaicum, The-
 riaca Andromachi, Confectio Opii, Ele-
 ctuarium opiatum polypharmacum. (Ams.
 Au. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fer.
 Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Lon.
 LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax.
 Suec. Wir. Br. C. Fi. Sp. Sw. Vm.)*

Der Name dieses Präparats rühret von
 Alexander her; Andromachus verfer-
 tigte es auf Befehl Neros nach dem schon
 lange vor ihm bekannten Mithridat. Die
 Formel dazu, wie sie von Galen überlie-
 fert wurde, ist folgende:

R. Radicis Iridis Florentinae,
 — Liquiritiae,
 singularum uncias duodecim.
 — Costi Arabici,
 — Rhapontici,
 Radicis Quinquefolii majoris,
 singularum uncias sex.

Radicis Mei,
 — Rhei,
 — Gentianae,
 singularum uncias quatuor.

— Aristolochiae uncias duas.

Herbae Scordii uncias duodecim

— Schoenanthi,

— Marrubii,

— Dictamni Cretici,

— Galaminthae,
 singularum uncias sex.

— Pulegii,

— Ivae,

— Chamaedryos,

Malabathri,
 singularum uncias quatuor.

Florum Rosarum rubrarum
 uncias duodecim.

— Stoechadis . . . uncias sex.

— Hyperici uncias quatuor.

— Centaurii minoris
 uncias duas.

Croci uncias sex.

Carpobalsami uncias quatuor.

Cinnamomi uncias duodecim.

Cassiae lignae,
 Nardi Indicae,
 singularum uncias sex.

— Celticae uncias quatuor.

Piperis longi uncias viginti quatuor.

— nigri,
 Zingiberis, singularum uncias sex.

Cardamomi uncias quatuor.

Agarici,
 Seminum Napi, singularum uncias
 duodecim.

— Petroselini Macedonici
 uncias sex.

— Anisi,

— Foeniculi,

— Nasturtii,

— Scelleos,

— Thlaspios,

— Amomi,

— Ammi,
 singularum uncias quatuor.

— Dauci uncias duas.

Opii uncias viginti quatuor.

Opobalsami uncias duodecim.

Myrrhae,
 Olibani,
 Terebinthinae,
 singularum uncias sex.

Storacis,
 Gummi Arabici,
 Sagapeni,
 singularum uncias quatuor

Asphaltii,
 Opopanacis,
 Galbani, singularum uncias duas.

Succi Acooiae,
 — Hypocistidis,
 singularum uncias quatuor.

Castorei uncias duas.
 Terrae Lemniae,
 Vitrioli calcinati,
 singulorum uncias quatuor.
 Trochiscorum Scillae uncias qua-
 draginta octo.
 — Viperarum,
 — Hedychroi, singulo-
 rum uncias viginti quatuor.
 Tritura balsama, resinas et gummi-
 resinas in Vini sufficiente quantitate ut
 puls spissa obtineatur, quam cum Mel-
 lis boni uncis nongentis et sexaginta
 exacte commisce. (Sp.)
 Sine andre, noch längere Formel läßt
 die dazu kommenden Ingredienzen in sechs
 Classen theilen, auf folgende Weise:
 1. Classe. Radicis Iridis Illyricae,
 Summitatum Scordii Cretici,
 Seminum Napi, singulorum
 sesquiunciam.
 — Anisi,
 — Seseleos,
 Folii Cretici,
 singulorum semunciam.
 Zedoariae electae
 drachmas sex.
 Ponder totius semilibram et drach-
 mas sex aequat.
 2. Classe. Radicis Gentianae,
 Herbae Chamædryos,
 Seminum Foeniculi Cretici,
 — Amomi,
 singulorum semunciam.
 Radicis Quinquifolii majoris,
 Summitatum Marrubii,
 Calaminthae montanae,
 singularum drachmas sex.
 Ponder totius uncias quatuor et
 drachmas duas aequat.
 3. Classe. Radicis Mei vel Angelicae,
 — Valerianae,
 Nardi Celticae,
 Herbae Ivae,
 Seminum Thlaspios,
 singulorum semunciam.
 Aristolochiae longae
 drachmas duas.
 Dictamni Cretici
 drachmas sex.
 Ponder totum uncias tres cum dimi-
 dia aequat.
 4. Classe. Rosarum rubrarum
 sesquiunciam.
 Florum Hyperici semunciam.
 — Centaurii minoris,
 Seminum Dauci Cretici,
 singulorum drachmas duas.
 — Petroselinii Macedo-
 nici . . . drachmas sex.
 Trochiscorum Viperæ
 uncias tres,

Trochiscorum Scillae
 uncias sex.
 Ponder totum uncias duodecim et
 drachmas duas aequat.
 5. Classe. Seminum Ammi,
 Calami aromatici,
 singulorum semunciam.
 Cinnamomi sesquiunciam.
 Cassiae lignae,
 Rhei,
 singulorum drachmas sex.
 Piperis longi . uncias tres.
 Ponder totum uncias septem aequat.
 6. Classe. Zingiberis albi,
 Piperis nigri,
 — albi,
 singulorum drachmas sex.
 Malabathri,
 Cubebarum,
 Cardamomi,
 singulorum semunciam.
 Ponder totius uncias tres et drach-
 mas sex aequat.
 Quaque harum miscellarum seorsim
 pulverata et pulverentur substantiae se-
 quentes:
 Myrrhae,
 Olibani,
 Croci orientalis,
 singulorum drachmas sex.
 Trochiscorum Agarici
 sesquiunciam.
 Castorei,
 Bituminis Judaici, singulorum
 drachmas duas.
 Terrae Lemniae,
 Chalcitidis usti,
 singulorum semunciam.
 Minutim concisa imbibantur Mucila-
 gine Gummi Tragacanthae, et siccata
 pulverentur.
 Schoenanthi,
 Nardi Indicae,
 Stoechadis Arabicae,
 singulorum drachmas sex.
 Pulverata seorsim commisce cum
 Trochiscorum Hedychroi
 uncias tribus.
 Dissolve in Vino Cretico
 Gummi Arabici,
 Sagapeni,
 singulorum semunciam.
 Opopanacis,
 Galbani,
 singulorum drachmas duas
 et solutionem spissam per cribrum se-
 riceum cola. Denique repone
 Terebinthinae Cypriacae
 drachmas sex.
 Storacis Calamita
 drachmas quatuor.
 Quo facto omnes sex classes pulverum,
 pulveres trochiscorum hedychroi et

variarum substantiarum seorsim contusarum, exceptis terra lemnia, croco et chalcite, commisceantur. Inmitte deinde in lebetem magnum

Mellis despumati et tepidi
uncias sex

quas pistilli lignei magni ope in parietibus vasis ita extende ut obtegantur; infunde deinde in lebetem terebinthinam prope ignem fusam cum niellis et vini cretici parva quantitate, tunc solutionem gummatum, itidem cum eisdem Vini pauillo dilutam et leviter calefactam. Adde deinde

Succi Acaciae semunciam.
— Liquiritiae sesquiunciam.

— Hypocistidis semunciam.

Opium Aceti ope purificati
uncias tres

dissoluta seorsim in Vino cretico. Miscam bene trititando, adde Mellis despumati et calidi libras aliquot et adice lente pulverem, cribri arcte texti ope, subinde mel affundendo et continue agitando, ne grumae formentur; infunde deinde terram lemniam et chalcitem in Vino dilutas cum Olei Nucis moschatae pauillo, tunc crocum itidem dilutum. Post agitationem mixturam immitte in vas, cujus nonnisi trientes duos vel quadrantes tres implet, ut fermentationi subjectum volumine augeri posset; agita primum quotidie per hebdomadam, tunc quolibet mense per annum unum, et tunc eo uti incipe. (Pal.)

Man findet dieselbe Formel bei His., jedoch ohne Angabe der Bereitung und ohne Classification der Ingredienzen.

R. Radicis Fraxinellae,

— Scillae praeparatae,
singularum libras duas.

— Iridis Florentinae
libram unam.

— Quinquefolii . . . uncias sex.

— Calami,

— Valerianae,
singularum uncias quinque.

— Rhei,

— Zingiberis albi,
singularum uncias sex.

— Angelicae,

— Gentianae,
singularum uncias quatuor.

— Aristolochiae longae
uncias duas.

— Asari scrupulos sedecim.

Herbae Scordii Cretici
libram unam.

— Dictamni Cretici uncias sex.

— Chamaedryos
uncias quatuor.

— Marrubii albi,

Herbae Galaminthae montanae,
singularum uncias sex.

— Pulegii Cretici,

— Ivae,
singularum uncias quatuor.

— Centaurii minoris
uncias duas.

— Majoranae,

Herbae Mari,
singularum scrupulos sedecim.

Malabathri . . . uncias quinque.

Florum Rosarum rubrarum
libram unam.

— Stoechadis Arabicae
uncias sex.

— Hyperici . . . uncias quatuor.

Seminum Napi . . . libram unam.

— Cardamomi uncias octo.

— Petroselini Macedonici
uncias sex.

— Anisi,

— Foeniculi Cretici,

— Ammi,

— Seseleos,

— Thlaspios,
singularum uncias quatuor.

— Dauci Cretici uncias duas.

Schoenanthi . . . uncias septem.

Nardi Indicae . . . uncias octo.

— Celticae . . . uncias quatuor.

Piperis longi . . . libras duas.

— albi,

— nigri,
singularum uncias sex.

Cardamomi minoris,
Carpobalsami vel Cubebarum
singularum uncias quatuor.

Cinnamomi . . . uncias octo.

Costi Arabici . . . uncias septem.

Ligni Aloes vel Xylbalsami
unciam unam.

— Aspalati scrupulos sedecim.

Trochiscorum Agarici
libram unam.

Myrrhae electae . . . uncias octo.

Olibani electi . . . uncias sex.

Mastichis . . . scrupulos octo.

Gummi Arabici uncias quatuor.

Bituminis Judaici . . . uncias duas.

Terrae Lemniae uncias quatuor.

Castorei . . . uncias duas.

Viperarum Italicarum libras duas.

Pulveratis simul omnibus his substantiis, schoenantho et nardo indica minutim concisis et cum gummi arabico in aqua dissoluto contusis, et lente desiccatis, pulvis cum priori commisceatur.

Pulveri rosarum rubrarum reposito et in vino diluto adde

Chalcitis vel Vitrioli ad alborem usque calcinati uncias quatuor.

Croci Austriaci pulverati unciās octo.
 Ab altera parte in Vini Maderani
 sufficiente quantitate dissolve —
 Opii libras duas.
 Succi Liquiritiae libram unam.
 — Hypocistidis,
 — Acaciae,
 Sagapeni,
 singulorum unciās, quatuor.
 Galbani unciās duas.
 Solutionibus colatis adde
 Mellis despumati
 libras centum sexaginta.
 Pultem vinosam cum rosis, croco et
 chalcite paratam adde, et tunc pulve-
 rem cribrī ope admisce. Adde, tenui-
 que
 Storacis in granis unciās quatuor
 dissolutas in
 Terebinthinae clarae unciās, sex.
 Opopalsami, vel hoc deficiente
 Olei Nucis moschatae
 unciās, tresdecim.

Agita per horam ut mixtura fiat per-
 fecta et in vase magno, pluries, per
 mensem agitando, fermentationi subji-
 ce. (Br. Wir.)

Außer diesen beiden Classificationen der
 Ingredienzen, von denen die eine auf die
 Gleichheit des Gewichts, die andere auf die
 Ähnlichkeit des Ursprungs, gegründet ist,
 findet man noch bei Gal. eine, auf Ähn-
 lichkeit der Natur und der Eigenschaften
 gegründete, welche dreizehn Abtheilungen
 begreift, nämlich:

1. Classe. Scharfe Substanzen.

Pulpae Scillae praeparatae unciās
 tres, drachmas quatuor et grana
 sexaginta.

Radicis Asari grana octoginta octo.

Agarici albi,

Seminum Napi sylvestris,
 singulorum sesquiunciam.

— Thlaspios semunciam.

2. Classe. Bittere Substanzen.

Myrrhae unciam unam.

Summitatum Centaurii minoris
 drachmas duas.

Radicis Gentianae semunciam.

— Rhei drachmas sex.

Herbae Scordii sesquiunciam.

— Chamaedryos,

— Ivae,

Summitatum Hypocisti,
 singulorum semunciam.

3. Classe. Abstringende Substanzen.

Petalorum Rosarum rubrarum
 sesquiunciam.

Radicis Quinquefolii drachmas sex.

Succi Hypocistidis,

Succi Acaciae,
 Chalcitis calcinati,
 singulorum sesquiunciam.

4. Classe. Auständische Gewürze.

Cinnamomi unciās duas cum dimidia.

Cassiae lignae unciam unam.

Zingiberis drachmas sex.

Piperis longi unciās tres.

— nigri unciās sex.

Amomi racemosi unciam unam.

Gardamomi semunciam.

Malabathri drachmas sex.

Schoenanthi

drachmas quatuordecim.

Nardi Indicae unciam unam.

— Celticae semunciam.

Costi Arabici drachmas septem.

Acori veri drachmas quinque.

Ligni Aloës grana octoginta octo.

5. Classe. Inländische Gewürze.

Croci unciam unam.

Corticis siccati Citri,

Calaminiae montanae,

Dictamni Cretici,

Stoechadis Arabicae,

Marrubii albi,
 singulorum drachmas sex.

Pollii montani semunciam.

Mari,

Majoranae, singulorum grana octo-

ginta octo.

Iridis Florentinae sesquiunciam.

6. Classe. Gewürze aus Dolbenpflanzen.

Seminum Petroselini Macedonici,

— Ammi,

— Foeniculi,

— Anisi,

— Seselios,

Radicis Mei,
 singulorum semunciam.

Seminum Dauci Cretici,
 drachmas duas.

7. Classe. Harze und Balsame.

Xylobalsami drachmam unam.

Carpobalsami semunciam.

Opopalsami drachmas quindecim.

Olibani,

Terebinthinae de Chio,
 singulorum drachmas sex.

Mastichis grana viginti quatuor.

Bituminis Judaici drachmas duas.

Storacis Calamita semunciam.

8. Classe. Ueberrichende Substanzen.

Radicis Valerianae majoris
 drachmas quinque.

— Aristolochiae tenuis,

Galbani,

Opopanacis,
 singulorum drachmas duas.

Sagapeni semunciam.
Castorei drachmas duas.

9. Classe. Giftige Substanzen.

Opii uncias tres.

10. Classe. Wirkungslose Erde.

Terrae Lemniae drachmas quatuor.

11. Classe. Schleimhaft, Saugmittel ꝛc.

Gummi Senegalensis
drachmas quatuor.

Micae Panis triticei drachmas quinque et grana quinquaginta.

Farinae Orobi uncias duas drachmas tres et grana quindecim.

Carnis Viperarum uncias duas drachmas duas et grana viginti.

12. Classe. Säfte Substanzen.

Succi Liquiritiae sesquunciam.

Mellis Narbonnensis
libras decem cum dimidia.

13. Classe.

Vini Hispanici
libras duas cum dimidia.

Vinum in tres partes divide, in cuius una mel, in altera opium et in tertia denique gummata et succi solvantur; liquores tres seorsim colatos commisce, adde colcothar, deinde balsama et denique pulveres et masam per annum in vase clauso fermentationi subijce. (Gal.)

Das Opium bildet ungefähr den acht und achtzigsten Theil der Gesamtmasse, was etwas weniger als ein Gran auf die Drachme beträgt.

℞. Aristolochiae longae,
Bituminis Judaici,
Castorei,
Galbani,
Opopanaxi,
Centaurii minoris,
Seminum Dauci sylvestris,
singulorum partem unam.

Amomi racemosi,
Carpobalsami,
Corticis Citri,
Gummi Arabici,
Foliorum Chamaedryos,
— Ivae,
— Malabathri,
— Pulegii montani,

Florum Hyperici,
Nardi Celticae,
Calami,
Radices Gentianae,

— Mei,
— Valerianae,
Sagapeni,
Seminum Ammi,
Anisi,

Seminum Cardamomi minoris,

— Foeniculi,

— Seselios,

— Thlaspidis,

Storacis Calamita,

Succi Acaciae,

— Hypocistidis,

Ferri sulphurici ad alborem calcinati,

Terrae Lemniae,

singulorum partes duas.

Calamintae montanae,

Cassiae lignae,

Costi Arabici,

Dictamni Cretici,

Foliorum Marrubii,

Zingiberis,

Myrrhae,

Nardi Indicae,

Olibani,

Piperis nigri,

Radices Quinquifolii,

— Rhapontici,

Groci,

Seminum Petroselini Macedonici,

Schoenanthi,

Stoechadis Arabicae,

Terebinthinae,

singulorum partes tres.

Agarici,

Balsami Meccensis,

Cinnamomi,

Foliorum Scordii,

Petalorum Rosarum rubrarum,

Iridis Florentinae,

Scillae,

Seminum Erucae,

Succi Liquiritiae,

singulorum partes sex.

Seminum Orobi partes novem.

Specierum Trochiscorum Hedy-

chroi,

Opii,

Piperis longi,

singulorum partes duodecim.

Mellis albi partes sexcentas septuaginta duas.

Vini Malacensis quantum sufficit. Dissolve opium, succos acaciae, hypocistidis et liquiritiae in vini quantitate necessaria; galbanum, opopanaxem et sagapenum primo sola deinde cum gummi vini ope in mucilaginem redacto et tunc cum opobalsamo et terebinthina in emulsionem redige; reliquas substantias pulveratas et cribratas commisce exacte, adde mel et emulsionem et cum quantitate sufficiente vini electuarium forma. (Vm.)

℞. Pulpae Scillae praeparatae

sesquilibram.

Terebinthinae Cypricae,

Olei Nucis moschatae,

Succi Liguiritiae,
Opii,
Viperæ siccatae,
 singulorum uncias novem.
Cinnamomi,
Myrrhae, singulorum uncias octo.
Balaustiarum,
Benzoës electi,
Croci,
Gummi Arabici,
Olibani, singulorum uncias sex.
Angelicæ,
Dictamni albi,
Costi Arabicæ,
Contrayervæ,
Serpentariæ Virginicæ,
Iridis Florentinæ,
Gentianæ,
Valerianæ,
Calamint hæ montanæ,
Ivæ,
Polii montani,
Scordii,
 singulorum uncias quinque.
Baccarum Lauri,
Cardamomi minoris,
Seminum Citri,
 — Petroselinæ Macedonici,
 — Seselios,
 singulorum uncias quatuor.
Vitrioli viridis ad alborem calcinati
 drachmas decem.
Nardi Indicæ,
Castorei, singulorum uncias duas.
Mellis albi, triplicem totius.
Vini Maderani, quantum sufficit.
 Pulvera quæ possunt et pulverem
 per cribrum trajectæ; opio in vino so-
 luto, solutionem cola et eam sex-
 sim cum oleo nucis moschatæ et
 terebinthina simul liquatis melli blando
 igne liquato infunde et tunc pulverem
 admisce. (Sar.)
R. Scillæ pulveratæ,
Iridis,
Scordii, singulorum uncias sex.
Radici Zingiberis,
Dictamni Cretici,
Foliorum Rosarum rubrarum,
Myrrhae in lacrymis,
Radici Gentianæ,
Amomi,
Opii, singulorum uncias novem.
Spicæ Nardi,
Calami, singulorum sesquilibram.
Croci uncias duas et drachmas duas.
Valerianæ radici
 uncias tres et drachmas sex.
Piperis longi
 uncias quatuor cum dimidia.
Cinnamomi sesquinciã.
Seminum Anisi uncias octo.
Castorei,

Galbani, singulorum drachmas tres.
Bituminis Judaici uncias tres.
Storacis in lacrymis,
Sagapeni, singulorum drachmas sex.
Vitrioli ferri ad siccam calcinati
 uncias duas.
Mellis despumati
 libras quinquaginta.
Mellis adhuc calidi parti uni duas
specierum pulveratarum, continue agi-
 tando, ad perfectam conjunctionem us-
 que admisce et deinde Opium in vino
 dissolutum adde et sic porro. (Fi.)
R. Radici Scillæ siccatae
 partes quatuordecim.
 — **Iridis Florentinæ**
 partes sex.
 — **Zingiberis**
 partes viginti duas.
 — **Gentianæ** partes undecim.
 — **Calami**
 partes viginti quatuor.
 — **Valerianæ,**
 — **Rhapontici,**
 singulorum partes tres.
Cinnamomi partes quatuordecim.
Dictamni Cretici partes octodecim.
Scordii partes octo.
Petalorum Rosarum rubrarum
 partes duodecim.
Croci partes quatuor.
Seminum Anisi
 partes quatuordecim.
Gummi Senegalensis partes viginti.
Olibani partes tres.
Terebinthinae partes sex.
Galbani partes quatuor.
Balsami Peruviani liquidi,
Opii purificati,
Succi Liguiritiæ,
 singulorum partes sex.
Agarici albi partes quatuordecim.
Ferri sulphurici partes tres.
Castorei partem unam.
Mellis Narbonnensis partes sexcen-
 tas quinquaginta sex.
Vini Hispanici partes centum quin-
 quaginta octo.
 Pulverata solida misce, vinum in tres
 partes divide, in quarum prima mel
 blando calore liqua, in secunda bal-
 samum et terebinthinam, in tertia
 opium dilue; liquores ambos postremos
 misce et cum Syrupo Mellis per pan-
 num colato commixtis adde sensim,
 continue agitando, pulverem. (GalM.)
R. Scillæ siccatae uncias quatuor.
Iridis Florentinæ semunciam.
Zingiberis,
Dictamni Cretici,
Nardi Indicæ,

Stoechadis Arabicae,
 Croci,
 Myrrhae,
 Gentianae,
 Calami,
 Mei,
 Valerianae,
 Nardi Celticae,
 Amomi racemosi,
 singulorum drachmas sex.
 Piperis longi uncias tres.
 Scordii uncias quatuor.
 Cinnamomi unciam unam.
 Schoenanthi sesquidrachmam.
 Foeniculi sesquunciam.
 Opii drachmas undecim.
 Castorei drachmas duas.
 Storacis semunciam.
 Balsami Meccaënsis uncias duas.
 Sagapeni semunciam.
 Galbani drachmas duas.
 Vini Hispanici quantum sufficit.
 Mellis albi libras quatuor.
 Dissolve opium in vino et mel in
 hujus liquoris libra una; reliquas sub-
 stantias pulvera; balsamum, sagape-
 num et galbanum in balneo aquae li-
 quata dilue in vino mellito et opiato,
 et admisce pulveres. (An.)
 ℞. Radicis Zingiberis,
 — Iridis Florentinae,
 — Nardi Indicae,
 — Celticae,
 — Calami,
 — Gentianae,
 singulorum drachmas sex.
 — Valerianae unciam unam.
 — Scillae uncias tres.
 Foliorum Dictamni Cretici drachmas sex.
 — Calaminthae,
 — Marrubii,
 — Scordii,
 singulorum uncias tres.
 Seminum Anisi,
 — Foeniculi,
 singulorum unciam unam.
 — Cardamomi minoris drachmas sex.
 Piperis longi,
 Succi Liquiritiae,
 Cinnamomi,
 Bituminis Judaici,
 Opii, singulorum uncias duas.
 Storacis in grana,
 Sagapeni,
 Galbani,
 singulorum drachmas tres.
 Castorei sesquidrachmam.
 Pulvera omnes has substantias et in
 sartagine stannea lente liqua
 Terebinthinae; Cypricae uncias sex.
 Adde sensim Mellis despumati tepidi

quantum satis ut uncia quaeque pul-
 veris duas cum dimidia, qui gradatim
 addendus est, contineat, tunc adde
 mixturam tepidam dies duos antea
 praeparatam cum
 Gummi Arabici,
 Vitrioli viridis in Aqua soluti,
 Rosarum rubrarum,
 Gallarum,
 singulorum sesquuncia.
 Vini Hispanici uncias sex.
 Agita electuarium per dies circiter
 sex. (Br.)
 ℞. Radicis Valerianae,
 — Contrayervae,
 — Gentianae,
 Foliorum Scordii,
 Florum Chamomillae,
 Cinnamomi electi,
 Piperis,
 Baccarum Juniperi,
 Corticis Aurantii,
 Seminum Anisi,
 Myrrhae,
 singulorum libram unam.
 Chinae libras quatuor.
 Croci,
 Ferri sulphurici ad alborem calci-
 nati, singulorum libram unam.
 Opii libras duas.
 Mellis Sambuci libras sex.
 — electi
 libras quadraginta octo.
 Meli cum Vini generosi sufficiente
 quantitate despumato adde mel sam-
 buci, crocum et vitriolum, tunc opium
 in vino dissolutum et denique reliqua
 pulverata. (His.) — Zebe Drachme ent-
 hält zwei Gran Opium.
 ℞. Radicis Angelicae uncias sex.
 — Serpentariae Virginicae
 — Valerianae,
 — Scillae,
 — Zedoariae,
 Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae),
 singulorum uncias duas.
 Cardamomi minoris,
 Myrrhae,
 Croci,
 Caryophyllum,
 Ferri sulphurici,
 Opii, singulorum unciam unam.
 Mellis despumati libras sex.
 Meli leviter calefacto adde opium
 in Vini Malacensis sufficiente quanti-
 tate solutum et tunc reliqua pulverata.
 (B*. Bor. GalF. Han. HassP. O. Pol.)
 — Zebe Unze enthält ungefähre fünf Gran
 Opium.
 Bor4. Crocum omittit.
 ℞. Serpentariae Virginicae,
 Contrayervae,
 singulorum uncias sex.

Angelicæ,
 Valerianæ,
 Calami aromatici,
 Gentianæ,
 Zedoariæ,
 singulorum uncias quatuor.
 Cardamomi,
 Myrrhæ,
 Macidis, singulorum uncias duas.
 Opii in Vino Hispanico dissoluti
 drachmas novemdecim.
 Roob Sambuci uncias octoginta.
 Juniperi uncias quadraginta.
 Syrupi Sacchari . . . libras duas.
 Misce bene. (R.)
 R. Radicis Angelicæ . . . uncias sex.
 — Serpentariæ Virginicæ,
 uncias quatuor.
 — Scillæ,
 — Valerianæ majoris,
 Cinnamomi,
 singulorum uncias duas.
 Cardamomi minoris,
 Myrrhæ,
 Croci,
 Caryophyllorum,
 Ferri sulphurici,
 Opii, singulorum unciam unam.
 Mellis despumati . . . libras sex.
 Melli parumper calefacto adde opium
 in Vino Hispanico dissolutum et tunc
 reliquas substantias pulveratas. (D.) —
 Jede Unze enthält etwa fünf Gran Opium.
 R. Radicis Angelicæ . . . uncias octo.
 — Gentianæ . . . uncias sex.
 — Valerianæ . . . uncias tres.
 — Zedoariæ,
 Cardamomi minoris,
 singulorum uncias duas.
 Croci,
 Succi Liquiritiæ,
 Myrrhæ,
 Opii, singulorum unciam unam.
 Mellis uncias septuaginta quinque.
 Dissolve succum, myrrham et opium
 in Vino Hispanico, solutionem cum
 melle calefac et adde, agitando conti-
 nue, pulveres. (Fer. Suec. Sw.)
 R. Radicis Angelicæ . . . partes sex.
 — Serpentariæ Virginicæ
 partes quatuor.
 — Scillæ,
 — Zedoariæ,
 Cinnamomi,
 Cardamomi minoris,
 Myrrhæ,
 Croci,
 Caryophyllorum,
 singulorum partem unam.
 Commisce intime cum
 Mellis despumati partibus duodecim
 et quo momento præscribitur, uncias
 omnes adde

Tincturæ thebaicæ semidrachmam.
 Misce bene. (Sax.)
 R. Opii sicci et pulverati
 partem unam.
 Vini generosi . . . partes quatuor.
 Macera per duos dies in vase clauso,
 tunc adde
 Mellis despumati
 partes septuaginta duas.
 Misce bene et adde, continue agi-
 tando, pulverem ex
 Myrrhæ,
 Croci,
 Protosulphatis Ferri,
 singulorum parte una.
 Caryophyllorum,
 Cardamomi minoris,
 Radicis Valerianæ,
 — Zingiberis,
 singulorum partibus duabus.
 — Angelicæ,
 — Gentianæ,
 singulorum partibus sex.
 Serva. (Ba.)
 R. Pulveris aromatici (Fabæ Pichurim,
 Cardamomi minoris, Cinnamomi,
 singulorum pars una) uncias sex.
 — Serpentariæ Virginicæ,
 uncias tres.
 Mellis despumati quantum sufficit.
 Misce bene. (Lus.)
 R. Nucis moschatae,
 Cardamomi minoris,
 Zingiberis,
 singulorum uncias duas.
 Radicis Serpentariæ Virginicæ
 uncias tres.
 Opii in Vino Hispanico dissoluti
 drachmas tres.
 Mellis despumati pondus triplum
 pulverum. Misce. (Wir.)
 R. Opii pulverati . . . drachmas sex.
 Piperis longi . . . unciam unam.
 Zingiberis . . . uncias duas.
 Carvi . . . uncias tres.
 Syrupi Sacchari octarium unum.
 Tritura opium cum syrupo calido et
 admisce pulveres. (8°. Lon.)
 LonN. Tragacanthæ contritæ drach-
 mas duas addit.
 R. Pulveris aromatici (e Cinnamomi
 partibus quibus, Cardamomi mi-
 noris, Zingiberis, Piperis longi,
 singulorum una) . . . uncias sex.
 Serpentariæ Virginicæ uncias tres.
 Opii puri in Vino Hispanico disso-
 luti . . . drachmas tres.
 Mellis despumati pondus triplum
 pulverum. Misce. (Gen.)
 R. Pulveris aromatici (Cinnamomi,
 Cardamomi minoris et Zingibe-

ris, singulorum partes aequales)
uncias sex.

Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opium in Vino Hispanico dissoluti
semunciam.

Syrupi Zingiberis libram unam.
Misce bene. (Ed. C.)

B. et Bel. eandem formulam, sed loco
syrupi Mel despumatum indicant.

R. Pulveris aromatici (Cinnamomi, Nu-
cis moschatae, Cardamomi mi-
noris et Zingiberis, singulorum
partes aequales) uncias sex.
Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opium in Vino Hispanico dissoluti
drachmas tres.

Mellis despumati
uncias viginti octo.

Melle et opio commixtis adde pul-
veres. (Ams.)

Der Theriak stand lange Zeit als ein-
der wichtigsten Arzneimittel in Ansehen,
und wurde daher jedesmal unter besondern
Feierlichkeiten und unter Aufsicht der Be-
hörden bereitet. Heutzutage hat jeder Apo-
theker das Recht, ihn zu verfertigen, doch
wird er mit Opium bereitet nur verab-
folgt, wenn er von einem Arzte verordnet
ist; im Gegentheil giebt der Apotheker nur
eine analoge, aber ohne Opium bereite-
te Mischung.

Gabe, von einem Scrupel bis zu zwei
und drei Drachmen, allein oder in Wein.

Extractum theriacale. (Sa.)

R. Theriacae . . . quantum vis.
Alcoholis . . . quantum sufficit
ut theriaca digitorum trium crassitium
tegetur; digere per dies tres, decantha
alcoholem, exprime, liquores ambos
commisce et in balneo aquae ad ex-
tracti consistentiam consume.

Nach Guilbert entzieht der Alcohol
dem Theriak flüchtiges Oel, Harz, Serpen-
tin, Balsam und ein grünes Oel. Diese
Analyse ist offenbar sehr unvollständig.

Aqua theriacalis simplex. (Fer. Br.)

R. Theriacae . . . unciam unam.
Dilue in

Aquae purae . . . libris quatuor.
Destillando leni calore libras tres li-
quidi abstrahae. (Br.)

Fer. Theriacae unciam unam et Suc-
ci Omphacii libras quatuor; destillent
librae tres.

Dieses Wasser gilt als giftwidrig, ma-
genstärkend, Blähungen und Würmer trei-
bend. Man wendet es besonders bei Wurm-
krankheiten der Kinder, öftersweise, allein
oder mit andern Zusammensetzungen an.

Aqua theriacalis romana s. Scordii

composita s. theriacalis frigida. (Pal.
Sar.)

R. Theriacae Andromachi semilibram.

Succi Galegae,

— Acetosae,

— Scordii,

— Citri, singulorum libras sex.

Post horas viginti quatuor digestionis
destillent. (Pal.)

Sar. Aquae Scordii libras quatuor,
duas Succi Acetosae, Succi Galegae
tantidem, Succi Limonum unam cum
dimidia et Theriacae uncias quatuor
cum dimidia.

Der Gebrauch ist wie beim vorherge-
henden.

Aqua theriacalis composita. (Wir. Fi. T.)

R. Theriacae Andromachi semilibram.

Radicis Angelicae,

— Valerianae,

— Carlinae,

— Imperatoriae,

— Zedoariae,

singulorum unciam unam.

Herbae Scordii,

— Rutae,

singulorum sesquunciam.

Corticis recentis Citri uncias duas.

Baccarum Juniperi unciam unam.

Aquae purae . . . libras decem.

Destillando libras sex elice. — Die-
ses Wasser unterscheidet sich von dem zu-
sammengesetzten Angelikgeist nur durch die
Abwesenheit des Alcohol.

R. Foliorum recentium Rutae,

Dictamni Cretici,

Scordii,

Corticum recentium Aurantii,

Limonum,

Radicum Contrayervae,

Zedoariae,

Calami,

Galangae, singulorum unciam unam.

Alcoholis 36° B. libras quatuor cum

Aquae pluvialis vel destillatae pon-
dere aequali diluti.

Theriacae uncias octo in Succi Li-
monum pondere aequali dilutae.

Post horas 24 vel 30 macerationis in
balneo aquae salito libras 6 destillando
abstrahae. (T.) — Gabe, eine Drachme
bis halbe Unze in einem passenden Vehikel
als Blähung-, wurmtreibend etc.

Fi. Rutae, Dictamni, Scordii, Radi-
cis Angelicae, Imperatoriae, singulorum
unciam unam, Contrayervae, Zedoariae,
singulorum sesquunciam, Corticis recen-
tis Citri unciam unam, Baccarum Ju-
niperi uncias quatuor, Alcoholis 25°
libras duas, Succi Limonum libram
unam, Aquae communis libras octo,

Theriaca uncias quatuor. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Spiritus theriacalis. (Br. Pal. Wir. Sp.)

℞. Theriaca Andromachi uncias quatuor.

Vini albi . . . uncias sexaginta.

Post sufficientem digestionem destillent unciae triginta. (Br. Wir. Sp.)

℞. Alcoholis concentrati uncias decem.

Theriaca Andromachi uncias quinque.

Myrrhae rubrae uncias duas cum dimidia.

Croci semunciam.

Post septem dies digestionis destillent in balneo aquae; adde, si necesse est, Camphorae drachmas duas. (Pal.)

Dieses Präparat unterscheidet sich von dem zusammengesezten Angetilgeist fast gar nicht.

Essentia s. Tinctura theriacalis. (Br. Sar. Wir. Vm.)

℞. Theriaca partem unam.

Aquae Vitae partes tres.

Post aliquot dies infusionis filtra.

(Vm.) Sar. Theriaca partem unam et sex

Aquae Vitae.

℞. Herbae Scordii, — Dictamni Cretici,

Radicis Angelicae, — Calami,

— Serpentariae Virginicae, Nardi Indicae,

singularum drachmas tres.

Cinnamomi, Cardamomi minoris,

Caryophyllorum, singularum sesquidrachmam.

Opii, Croci, singularum drachmam unam.

Aquae Vitae . . . libram unam.

Infunde frigide per plures dies et filtra. (Br. Wir. Vm.)

Reizend, magenstärkend. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen. Eine Unze dieser Tinctur enthält fast fünf Gran Opium.

Emplastrum stomachicum. (Sw.)

℞. Theriaca Andromachi unciam unam ad duas.

Olei Nucis moschatae drachmas duas.

Mixta supra pellem extende, cujus margo emplastro adhaesivo oblitus est. Bei Magenkrampf und sogenannter Krampfcotit empfohlen.

Scutum stomachicum s. antispasmodicum.

(Pie. Sw.)

℞. Theriaca uncias duas.

Pulveris Mais, singularum quantum sufficit.

Opii grana tria.

Camphorae grana duo.

Misce. (Pie.) — Fouquet empfiehlt es bei Colik, chronischem Erbrechen und krampfhaften Magenbeschwerden.

℞. Theriaca uncias duas.

Nucis moschatae pulveratae drachmas duas.

Misce. — Gleich dem vorhergehenden Magenpflaster angewendet. (Sw.)

Emplastrum antihæmorrhoidale. (Pie. Sm.)

℞. Opii grana decem.

Theriaca drachmas duas.

Misce. (Pie.) Sm. Theriaca drachmas sex et Opii grana quatuor ad sex.

Man wendet dieses Pflaster auf den Nabel an; Balsalva soll es mit dem glücklichsten Erfolg gegen übermäßigen Hämorrhoidalfluß benutzt haben.

Topicum antispasmodicum et tonicum.

(Pie.)

℞. Theriaca drachmas duas.

Opii, Camphorae, singularum grana sex.

Auf die Oberbauchgegend anzuwenden.

Cataplasma Fermenti Panis theriacale s. theriacale s. ad singulum. (His. Sm.)

℞. Fermenti Panis . . . uncias tres.

Theriaca semunciam.

Pulveris Juniperi,

— Rosarum rubrarum,

— Foliorum Menthae,

singularum drachmas duas.

— Caryophyllorum,

— Nucis moschatae,

— Macidis,

singularum drachmam unam.

Aceti rosati . . . quantum sufficit ut fiat cataplasma. (His)

℞. Theriaca uncias duas.

Anisi viridis pulverati drachmas duas.

Olei Caryophyllorum guttas octo.

Aquae Vitae camphoratae quantum satis ad diluendum et cataplasmati consistentiam praebendum. (Sm.)

Das erstere dieser beiden Cataplasmen wurde als Mittel gegen Schlangen auf den Magen anzuwenden empfohlen. Das zweite rühmte Zimmerman gegen clonus hystericus.

Opiatum dysentericum. (Sp.)

℞. Theriaca Andromachi,

Diascordii, singulorum uncias duas.
Pulveris Gummi Arabici

semunciam.

Boli Armenae . . . uncias tres.

Misce sedulo.

Addendo Balsami Locatelli uncias duas, Opium dysentericum balsamicum obtinetur.

Das erstere ist bei einfacher, das letztere bei geschwüriger Ruhr empfohlen worden.

Electuarium adstringens. (Bo. Ca. Pie.)

R. Theriacae,

Diascordii,

singulorum unciam unam.

Aquae destillatae Angelicae,

— — Valerianae,

— — Menthae,

singulorum drachmam unam.

Gummi Tragacanthae

semidrachmam.

Syrupi Chinii sulphurici

quantum sufficit.

Adstringend, von Ball y bei Ruhr und chronischer Diarrhöe gepriesen. — Gabe, eine Drachme zwei oder drei Mal täglich, in Auflösung oder mit einem Eßfel Wasser oder Bordeauxwein verdünnt. (Ca. Pie.)

R. Balsami Locatelli,

Conservae Rosarum,

Theriacae,

Seminum frigidorum unciam unam.

Gabe, ein Kaffeßfel alle vier Stunden, in einem Glase Schaafgarbenthee. (Bo.)

Mixtura theriacalis. (Ra.)

R. Theriacae . . . sesquidrachmam.

Gummi Arabici drachmam unam.

Aquae uncias sex.

Syrupi Sacchari . . . unciam unam.

Eßfelweise.

Potio cordialis. (Bo. Ra.)

R. Theriacae . . . drachmam unam.

Infusi Melissaе uncias septem.

Tincturae Cinnamomi

drachmas duas.

Syrupi Dianthi . . . unciam unam.

Misce. (Ra.)

R. Aquae Artemisiae,

— Matricariae,

— Florum Aurantiorum,

singulorum uncias duas.

— Cinnamomi hordeatae

semunciam.

Theriacae,

Confectionis hyacinthinae,

— Alkermes,

singulorum scrupulum unum.

Trochiscorum Myrrhae

grana viginti quinque.

Macidis pulverati grana quindecim.

Elixir Proprietatis guttas triginta.

Misce-bene. (Bo.)

Eßfelweise.

Potio tonica. (Pie.)

R. Theriacae . . . drachmam unam.

Aquae Florum Aurantiorum,

— vel Vini,

singulorum unciam unam.

Auf einmal zu nehmen.

Potio antispasmodica. (Pie.)

R. Theriacae . . . drachmam unam.

Syrupi Capiti Papaveris

drachmas sex.

Liquoris Hoffmanni,

Tincturae Succini,

singulorum guttas viginti.

Aquae Florum Aurantiorum,

— Matricariae,

— Rutae,

singulorum uncias duas.

Eßfelweise.

Tryphera magna. (Sp.)

R. Opii uncias duas.

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Galangae,

Nardi Indicae,

Zingiberis,

Costi Arabici,

Storacis,

Calami,

Cyperii rotundi,

Iridis Florentinae,

— nostratis,

Peucedani,

Mandragorae,

Lavandulae,

Rosarum,

Piperis,

Anisi,

Opii,

Foeniculi,

Petroselini Macedonici,

Dauci,

Basilici, singulorum unciam unam.

Mellis quantum sufficit.

Pulverata cum melle intime commisce.

Eine schmerzstillende, von Galen angezeigte Latwerge, welche sich nur wenig vom Theriak unterscheidet.

Orietanum. (Wir.)

R. Radicis Aristolochiae longae,

— — rotundae,

— Angelicae,

— Bistortae,

— Carlinae,

— Contrayervae,

— Fraxinellae,

— Gertianae,

— Imperatoriae,

Radicis Quinquefolii,
 — Serpentariae Virgimicae,
 — Tormentillae,
 — Valerianae,
 — Zedoariae,
Foliorum Cardui benedicti,
 — Pulegii,
 — Rutae,
 — Sabinae,
 — Scordii,
 — Scabiosae,
Florum Hyperici,
Corticis Aurantiorum,
 — Citri,
 — Cinnamomi,
 singularum unciam unam.
Viperae siccatae . uncias duas.
Pulverata commisce cum
 Roob Juniperi,
 Mellis despumati,
 singularum libris tribus.
Bene mixtis adde
 Theriacae Andromachi,
 Mithridatici,
 singularum uncias duas.
Olei essentialis Rutae,
 — Succini albi,
 — Caryophyllorum,
 — Juniperi,
 singularum scrupulum unum.
 Diese Satverge soll von Sieron. Ker-
 rante aus Driedeto, wovon sie den Na-
 men führt, erfunden worden seyn. Sie ent-
 hält fast gar kein Opium und verbannt ihre
 Wirkung lediglich der Menge reizender Sub-
 stanzen, welche in ihr enthalten sind. —
 Gabe, von zwei Drachmen bis zu einer hal-
 ben Unze.
Pulvis s. Species Diascordii. (Sar.)
R. Foliorum siccatorum Scordii
 sesquiunciam.
Petalorum Rosarum rubrarum
 unciam unam.
Boli Armenae . . . uncias duas.
Cassiae lignee;
Foliorum Dictamni Cretici,
Galbani,
Storacis Calamita,
 singularum semunciam.
Radicis Bistortae,
 — Gentianae,
Gummi Arabici, singularum drach-
 mas quinque.
Opii drachmas duas.
Fiat pulvis, qui per cribrum trajicia-
 tur.
Diascordium s. Electuarium diascor-
dium s. e Scordio s. Scordii s. Scordii
opiatum s. Fracastoris s. Mimosae Ca-
techu compositum s. compositum Cate-
chu, Confectio japonica s. diascordii,
Conditum catechucium, Electuarium
Scordii opiaceum. (Ams. An. B. Bel.
 Pharmacopoea universalis. II.

Br. Du. Ed. Fer. Gal. GalF. GalH.
GalM. Gen. His. Li. Lus. Pal. Sar.
Suec. Wir. Au. Br. C. Ca. Fi. Sp. Sw.
T. Vm.)
 1) Opine Catechu.
R. Radicis Bistortae,
 — Tormentillae,
 — Gentianae,
Herbae Dictamni Cretici,
 singularum semunciam.
Herbae Scordii . unciam unam.
Seminum Acetosae sesquidrachmam.
Cinnamomi,
Cassiae lignee,
 singularum semunciam.
Piperis longi,
Zingiberis,
 singularum drachmas duas.
Opii sesquidrachmam.
Gummi Arabici,
Galbani,
Storacis, singularum semunciam.
Boli Armenae . sesquiunciam.
Terrae Lemniae unciam dimidiam.
Conservae Rosarum rubrarum
 libram unam.
Mellis despumati uncias triginta.
Dissolve opium, gummi arabicum et
 galbanum in Vini albi uncis tribus,
 commisce bene cum melle, adde reli-
 qua pulverata et denique conservam
 rosarum. (Br. Pal. Sar. Wir. Sp.)
R. Foliorum Scordii . uncias duas,
 — Dictamni Cretici,
Gemmarum Rosarum,
Radicis Bistortae,
 — Gentianae,
 — Tormentillae,
 singularum semunciam.
 — Zingiberis drachmas duas.
Seminum Acetosae sesquidrachmam.
Piperis longi . drachmas duas.
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Pulpa Cassiae,
Storacis Calamita,
Galbani, singularum semunciam.
Extracti Opii . drachmas duas.
Boli Armenae . . . uncias duas.
Mellis despumati,
Vini Hispanici,
 singularum quantum sufficit.
Radices, folia et semina concisa et
 contusa cum reliquis maceratis, solutis
 et holo porphyrisata commisceantur.
 (T.)
Fi. Boli Armenae sesquiunciam, Her-
 bae Scordii unciam unam, Storacis in
 lacrymis drachmas quatuor cum dimi-
 dia, Galbani, Gummi Arabici, Cinna-
 momi, Cassiae lignee, Radicis Tor-
 mentillae, Bistortae, Gentianae, Folio-
 rum Dictamni Cretici, Terrae sigilla-

tae rubrae, singulorum semunciam,
Zingiberis, Piperis longi, singulorum
drachmas duas, Opii, Seminum Aceto-
sae, singulorum se-quidrachman, Con-
servae Rosarum libram unam, Mellis
despumati triplum pondus specierum.
— Innerlich eine halbe Drachme.

℞. Foliorum Scordii . sesquunciam.

Rosarum rubrarum,
Radice Bistortae,

— Gentianae,
— Tormentillae,

Seminum Berberidis,
Cassiae lignae,
Cinnamomi,
Dictamni Cretici,
Storacis Calamita,
Galbani,
Gummi Arabici,

singulorum semunciam.

Zingiberis,

Piperis longi,

Extracti Opii vinosi,

singulorum drachmas duas.

Boli orientalis praeparatae

uncias duas.

Vini Hispanici

libram circiter dimidiam.

Mellis rosati cocti . libras duas.

Dissolve galbanum in vini parva
quantitate et mel in eo quod restat li-
quoris hujus, tunc adde pedetentim
pulveres. (Gal Ca.)

℞. Radicis Bistortae,

— Gentianae,

— Tormentillae,

singulorum partes duas.

— Zingiberis partem unam.

Cinnamomi . . . partes quatuor.

Herbae Dictamni Cretici

partes duas.

Foliorum siccatorum Scordii

partes sex.

Petalorum Rosarum rubrarum

partes tres.

Piperis longi . . . partem unam.

Seminum berberidis,

Gummi Arabici,

Galbani,

Balsami Peruviani liquidi,

singulorum partes duas.

Opii purificati . . . partem unam.

Boli Armenae . . . partes octo.

Vini Hispanici . . . partes triginta.

Mellis partes centum viginti quin-

que.

Fiat electuarium. (GalM.)

℞. Zingiberis,

Gentianae,

Tormentillae,

Dictamni Cretici,

Masticis,

Boli Armenae,

singulorum drachmam unam.

Opii drachmas duas.

Cinnamomi drachmas tres.

Foliorum Scordii,

Petalorum Rosarum rubrarum,

singulorum drachmas sex.

Mellis Rosarum

uncias viginti quatuor.

Pulveres cum melle commisce. (His.)

℞ Zingiberis,

Opii,

Piperis longi,

singulorum partem unam.

Gentianae,

Storacis Calamita,

singulorum partes duas.

Cinnamomi,

Dictamni Cretici,

Gummi Arabici,

Rosarum rubrarum,

Scordii,

Tormentillae,

singulorum partes quatuor.

Boli Armenae . . . partes octo.

Mellis albi partes centum viginti.

Tere opium cum Vino Hispanico ut
fiat puls liquida, cum qua storacem
cum gummi tritum in emulsionem con-
tere; adde deinde mellis paucillum,
tunc pulveres commixtos et denique
mel reliquum; calefac parumper et
agita ad refrigerationem usque. (Vm.)

℞. Gentianae drachmas septem cum

dimidia.

Cinnamomi . . . drachmas septem.

Opii crudi . . . drachmas tres.

Vini albi uncias sex.

Post aliquot dies digestionis cola, fe-

viter exprimendo, et colaturae adde

Pulveris Herbae Scordii uncias tres.

Mellis despumati . . . uncias viginti.

Misce bene. (Li.)

2) Mit Catechu.

℞. Cinnamomi,

Piperis longi,

singulorum semunciam.

Catechu uncias quatuor.

Herbae Scordii,

Radice Tormentillae,

Gentianae, singulorum uncias duas.

Pulverata misce et adde

Opii in Vini diluti

drachmas quinque.

Mellis puri

libras duas cum dimidia.

Vini Hispanici . . . quantum sufficit

ut fiat electuarium. (Br.)

℞. Catechu uncias tres.

Radice Tormentillae,

Nucis moschatae,

Olibani, singulorum uncias duas.

Opium in Vino Hispanico dissoluti
sesquidrachmam.

Syrupi Corticium Aurantium
quantum sufficit

vel pulverum, pondus triplum. (Gen.)

R. Foliorum Scordii,
Catechu,
Radici Tormentillae,
singulorum uncias duas.

Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
singulorum unciam unam.

Opium in Vino Hispanico dissoluti,
sesquidrachmam.

Mellis rosati uncias viginti octo.

Misce opium cum melle, et adde reli-
quas substantias pulveratas. (Ams.)

R. Herbae Scordii . . . uncias tres.
Catechu,
Fabrae Pichurim,
Radici Tormentillae,
singulorum uncias duas.

Opium . . . sesquidrachmam.
Mellis . . . uncias viginti octo.

Tritura opium cum Vino Hispanico,
adde mel paullo calidum et admisce
reliquas substantias pulveratas et mix-
tas. (GalF. Suec.)

R. Catechu . . . uncias quatuor.
Kino . . . uncias tres.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
singulorum unciam unam.

Opium in Vino Hispanico dissoluti
sesquidrachmam.

Syrupi Rosarum rubrarum ad mel-
lis consistentiam usque cocti
libras duas cum quadrante.

Misce. (An. B. Bel. Du. Ed. GalH.
Lus. C. Ca. Sw.)

R. Catechu . . . uncias tres.
Radici Tormentillae,
Nucis moschatae,
Olibani, singulorum uncias duas.

Opium . . . semidrachmam.

Syrupi Rosarum quantum sufficit.

Fiat electuarium. (Au.)

R. Foliorum Scordii,
Catechu, singulorum uncias tres.
Cinnamomi,
Radici Tormentillae,
singulorum uncias duas.

Opium . . . drachmas duas.
Mellis . . . uncias viginti octo.

Vini Hispanici quantum sufficit,
Misce. (Fer.)

Nur das letztere Präparat führt den Na-
men Confectio Japonica, die übrigen über-
den Diascordium correctum genannt, das
erste aufgenommen, welches vom Erfinder
selbst ist.

Das Diascordium gilt als Schweißrei-

vend, giftig, schmerzstillend und sty-
ptisch. Man verordnet es besonders bei
Diarrhöe und Ruhr, zu einer, zwei und
drei Drachmen. Die Wirkung ist mehr
weniger den abstringirenden Substanzen als
von dem darin enthaltenen Opium abhän-
gig.

Electuarium adstringens. (Sa.)

R. Diascordii,
Sanguinis Draconis,
singulorum drachmas sex.

Aluminis,
Catechu,
Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.

Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiat electuarium.

Vinum opiaceum. (GalM.)

R. Diascordii . . . partem unam.
Vini rubri partes viginti quinque.
Dissolve.

Clysmas sedans et adstringens. (R.)

R. Infusi Chamomillae uncias quatuor.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Diascordii . . . drachmam unam.

Misce. — Bei passiven Bauchflüssen,
vergiftlichem Erbrechen, Magen Schmerz und
Krampffollik.

Pilulae antiemeticae. (Pie.)

R. Pulveris Menthae drachmas duas.
— Absinthii scrupulos duos.
— Balaustiorum
scrupulum unum.

Olei essentialis Cinnamomi
guttas duas.

Diascordii . . . drachmam unam.

Syrupi Cydoniorum
quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. — Gabe, sechs
Stück täglich, auf drei Mal.

*Julapium sistens s. adstringens, Mix-
tura sistens s. Opium adstringens sangui-
nis s. ad vomitum sanguinis. (His. Sa.)*

R. Confectionis Japonicae (formula
Ed.) . . . drachmas tres.

Tincturae thebaicae
guttas quadraginta.

Sacchari albi . . . semunciam.

Aquae alexiteriae uncias quatuor.
— Cinnamomi spirituosae
uncias duas.

Misce. (Sq.)

Die beiden folgenden Formeln gehören
ebenfalls hierher, obgleich sie nur die ein-
zelnen Bestandtheile der Confectio Japo-
nica getrennt enthalten.

R. Syrui Capiti Papaveris
unciam unam.

Aquae Rhoeados . . . uncias septem.

Catechu . . . sesquidrachmam.
Laudani liquidi Sydenhami
guttas viginti.

Misce. (Sa.)

℞. Aquae destillatae
uncias duas cum dimidia.
Aceti destillati . . . semunciam.
Opii puri grana duo.
Solutioni adde
Pulveris Corallii rubri
semidrachmam.
— Catechu semiscrupulum.
Syrupi Sacchari . . . unciam unam.
Misce sedulo. (His)

Theriaca coelestis Hoffmanni. (Br. Sp.)

℞. Extracti Radicis Angelicae,
— — Aristolochiae rotundae,
— — Contrayervae,
— — Inulae,
— — Gentianae,
— — Tormentillae,
— — Valerianae,
— — Vincetoxici,
— — Viperinae,
— — Zedoariae,
Foliorum Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
— Scordii,
singulorum drachmas tres.
Extracti Opii unciam unam.
Resinae Cascariillae,
— Ladani,
singulorum drachmam unam.
Storacis Calamita drachmas tres.
Myrrhae semunciam.
Galbani,
Mastichis,
Opopanax,
singulorum drachmas tres.
Resinae Guajaci,
Crocii, singulorum drachmam unam.
Castorei semidrachmam.
Pulveris Viperae,
Salis volatilis Cornu Cervi,
— Succini,
singulorum sesquidrachmam.
Camphorae,
Ambrae griseae,
singularum scrupulum unum.
Balsami Peruviani liquidi
drachmas tres.
Olei essentialis Caryophyllorum,
— Corticis Citri,
— Baccarum Juniperi,
— Succini rectificati, singulorum guttas duodecim.
— Cardamomi,
— Cinnamomi,
— Cubebarum,
— Macidis,

Olei essentialis Nucis moschatae,
singulorum scrupulos duos.

Pulvera substantias pulverandas, resinas et balsama in mortario balnei aquae ope calefacto contunde, adde extracta, pulveri salia volatilia admisce et denique olea essentialia affunde. (Br.)

℞. Myrrhae electae . . . semunciam.
Galbani,
Mastichis,
Opopanax,
singulorum scrupulos duos.

Storacis drachmas tres.
Extracti Cardui benedicti,

— Centaurii minoris,
— Scordii,
— Tormentillae,
— Contrayervae,
— Angelicae,
singulorum semunciam.
— Opii drachmas sex.
— Croci,
— Vincetoxici,
— Valerianae,
— Gentianae,
— Aristolochiae rotundae,
singulorum drachmas tres.

Resinae Ligni Aloës,
— Guajaci,
— Ladani,
singulorum drachmam unam.

Antimoni diaphoretic,
Cinnabaris,
Succini praeparati,
Pulveris Viperae,
singulorum semunciam.

Salis essentialis Succini,
— Cornu Cervi,
singulorum sesquidrachmam.

Olei essentialis Cinnamomi,
— Zedoariae,
— Cardamomi,
— Cubebarum,
— Macidis,
— Caryophyllorum,
— Baccarum Juniperi,
— Citri,
singulorum guttas duodecim.

— expressi Nucis moschatae,
Balsami Peruviani,
singulorum drachmas tres.

Camphorae,
Ambrae griseae,
singularum scrupulum unum.

Misce. (Sp.)

Unterscheidet sich von dem Theriak, mit dem es Ähnlichkeit hat, besonders durch den Mangel des Zuckers und durch die Gegenwart von Salzen, welche auf das Opium einzubringen vermögen; es enthält ungefähr 4 Gran Opium auf die Drachme. — Man hat es vornehmlich als schmerzstillend und

sfäufniswürdig gerühmt. — Gabe, zwei bis vierundzwanzig Gran in Pillen.

Electuarium Hyoscyami opiatum, Philonium Romanum. (His. Pal. Wir. Fi. Sp.)

℞. Piperis albi drachmas quinque.
 Opii drachmas duas cum dimidia.
 Cassiae lignae sesquidrachmam.
 Seminum Hyoscyami albi drachmas quinque.
 — Apii drachmam unam.
 — Petroselinū Macedonicū
 — Foeniculi,
 — Dauci Cretici, singulorum
 grana quadraginta quinque
 scrupulum unum.

Croci
 Nardi Indicae,
 Pyrethri,
 Zedoariae,
 singulorum grana quindécim.
 Cinnamomi sesquidrachmam.

Euphorbii,
 Myrrhae,
 Castorei,
 singulorum drachmam unam.
 Mellis uncias octo et drachmas
 quatuor cum dimidia.

Misce. (Pal. Wir.)

℞. Radicis Pyrethri
 — Zedoariae,
 — Doronici,
 Balaustiorum,
 singulorum unciam unam.
 Piperis longi,
 Seminum Hyoscyami albi,
 singulorum uncias viginti.
 Opii uncias decem.
 Euphorbii,
 Castorei,
 Margaritarum,
 singulorum unciam unam.
 Croci uncias quinque.
 Mellis uncias triginta.

Misce. (Sp.)

℞. Piperis albi
 Seminum Hyoscyami albi,
 singulorum drachmas viginti.
 Opii drachmas decem.
 Croci orientalis drachmas quinque.
 Castorei,
 Spicae Nardi,
 Radicis Pyrethri,
 singulorum drachmam unam.
 Mellis depurati
 libras duas cum dimidia.

Misce. (Fi.)

℞. Seminum Hyoscyami,
 Anisi,
 — Foeniculi,
 Myrrhae,
 Castorei,
 singulorum drachmas sex.

Opii drachmas quinque.
 Cinnamomi unciam unam.
 Croci drachmas duas.
 Florum Chamomillae
 drachmas tres.

Mellis desumati libras duas.
 Misc. Bene. (His.)

Jede Drachme enthält über anderthalb Gran Opium und vier Gran Bilfenfrucht- saamen. — Beruhigend, schmerzstillend, schlafbringend, ehemals besonders bei Windcolik, heftigem Husten und Convulsionen empfohlen. — Gabe, eine halbe bis eine Drachme. — Man wendete es auch in Klystir an.

Electuarium requies Nicolai. (Pal. Wir. Fi. Sp. T. Vm.)

℞. Florum Rosarum rubrarum,
 — Violarum,
 singulorum drachmas duas.

Opii,
 Seminum Hyoscyami,
 — Papaveris albi,
 — Scarioleae,
 — Lactucae,
 — Portulacae,
 — Psyllii,
 Corticis Radicis Mandragorae,
 Nucis moschatae,
 Cinnamomi,
 Zingiberis,
 singulorum sesquidrachmam.
 Sacchari crystallisati (Candis)
 drachmam unam.

Ligni Santali albi,
 — rubri,

Spodii,
 Gummi Tragacanthae, singulorum
 scrupulos duos et grana quinque.
 Sacchari uncias decem.

Commisce cum Aqua Rosarum. (Pal.)

℞. Florum Rosarum rubrarum,
 — Violarum,
 singulorum drachmas sex.
 Seminum Hyoscyami albi,
 — Papaveris alla,
 — Lactucae,
 — Psyllii,
 singulorum semunciam.

Corticis Radicis Mandragorae,
 Nucis moschatae,
 Cinnamomi,
 Zingiberis albi,
 Opii depurati,
 singulorum drachmas tres.

Santali albi,
 — rubri,

Gummi Tragacanthae,
 Spodii, singulorum drachmas duas.
 Sacchari albi uncias viginti.

Dissolve opium in Vini albi uncias tribus, adde pulveres, et admisce Sac-

charum in Aquae Rosarum unciis decem dissolutum. (Wir.)

R. Radicis Mandragorae,

Florum Rosarum,

— Violarum,

Seminum Hyoscyami,

— Papaveris,

— Endiviae,

— Lactucae,

— Portulacae,

— Psyllii,

Opii,

Nucis moschatae,

Cinnamomi,

Zingiberis,

singulorum sesquiunciam.

Santali albi,

— rubri,

Spodii,

Gummi Tragacanthae,

singulorum drachmas sex.

Sacchari crystallisati (Candis)

unciam unam.

Julapii rosati

unciis viginti quatuor.

Misce. (Sp.)

R. Gummi Arabici,

Opii, singulorum drachmas duas.

Zingiberis,

Nucis moschatae,

singulorum drachmas tres.

Cinnamomi

drachmas sex.

Rosarum rubrarum

drachmas quatuordecim.

Seminum Papaveris albi recentium

drachmas octodecim.

Mellis albi

drachmas quatuordecim.

Misce pulveres, gummi arabici et semina papaveris cum opio, contere totum cum melle et salisquos; pulveres commixtos adde. (Vm.)

R. Mellis albi partes triginta duas.

— despumati,

Seminum Anisi,

Calcis subcarbonatae,

singulorum partes octo.

Opii

partem unam.

Cinnamomi,

Nucis moschatae, singulorum par-

tes viginti quinque.

Triture opium cum subcarbonate ad pulverem; adde pulveres reliquorum ingredientium cum nucis moschatae trituratum, tunc admisce primo mel despumatum, deinde mal orudum.

R. Cinnamomi . . . drachmas tres.

Seminum Hyoscyami,

— Papaveris albi,

— Endiviae,

— Portulacae,

— Lactucae,

— Psyllii,

Corticis Radicis Mandragorae,

Zingiberis,

Nucis moschatae,

Florum Violarum,

— Rosarum,

Opii, singulorum sesquidrachmam.

Santali albi,

— rubri,

Eboris calcinati,

Gummi Tragacanthae, singulorum scrupulos duos cum dimidio.

Contundendo laevigandoque etc. pulverata cum Mellis despumati sufficiente quantitate sicut electuarium, cui in fine opium in Vino Hispanico solutum admisceatur. (Vi.)

T. Santali albi scrupulos decem, S. rubri, tantidem, Radicis Mandragorae, Seminum Hyoscyami, albi vel nigri, Papaveris albi, portulacae, Psyllii, Lactucae, Endiviae, Radicis Zingiberis, singulorum drachmas sex, Gummi Tragacanthae scrupulos decem, Florum Violarum, Petalorum Rosarum rubrarum, Nucis moschatae, singulorum drachmas sex, Cinnamomi sesquiunciam, Extracti Opii drachmas sex, Eboris calcinati scrupulos decem, Mellis despumati, Vini Hispanici, singulorum quantum sufficit.

Werkwürdig ist es, daß man dieser Pflanze nie eine andere als eine beruhigende und schlafmachende Wirkung zugeschrieben hat. Sie genos ehedem, einer sehr großen Ruf, ist aber heutzutage fast außer Gebrauch. Man gab sie besonders Kindern zum Brechen; auch wandte man sie auf die Schläfe an. — Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei und einer halben Unze. — Jede Unze enthält, nach der Formel von Wir., fünf Gran Opium.

O p o p o n a x .

Gummi Panacis; Heilwurzgummi; Opopanarz; Panargummi; Opopanargummi; Opopanax (Gal.); Panaxgummi (D.); Opopanaco (His. Lus.); Opopanaco (L.). Amt. AnaB. Bel. Bon. Bor4. Br. D. Fer. Gal. Gen. Han. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. Sax. Wir. Wür. Be. Bz. C. Fi. G. M. Sp. Z.

Ein Gummiharz in unregelmäßigen Stücken, selten in Tropfen, außen von röthlich-gelber, innen von schmutzweißer, mit Roth und Gelb vermischter Farbe und von unburchsichtiger, trockner und zerreiblicher Beschaffenheit. Es hat einen sehr starken, gewürzhaften, aber nicht sehr angenehmen Geruch und einen scharfen, brennenden Geschmack.

Es ist ein vertrockneter Wildkast, welcher nach Einschnitten aus der Wurzel von Pastinaca Opopanax L., einer Pflanz

ze (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae J) des südlichen Europa's und des Orients ausfließt. (Plenck t. 223. Couan III. t. 19. 14.) Nur die im Orient wachsende Pflanze liefert es, von woher es durch Syrien kommt.

Es enthält, nach Pelletier, Harz, Schleimharz und etwas Saugmehl.

Reizend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Fomentum detergens. (B.)

R. Radicis Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Iridis Florentinae,
singularem semunciam.

Opopanax,
Sagapeni,

singulorum drachmas duas.
Guajaci scrupulis quatuor
Caryophylorum drachmas duas.
Camphorae drachmas tres.
Aquae Vitae . . . uncias decem.

Post horas viginti quatuor infusionis cola. — Austrocknend, bei unzeinen syphilitischen Geschwüren empfohlen.

Emulsio anthelmintica. (Bo.)

R. Opopanax,
Saponis Veneti,
singulorum drachmam unam.
Vitelli Ovorum drachmas duas.
Syrupi Artemisiae sesquunciam.
Aquae destillatae Roeniculi
uncias tres.

Gabe, alle Stunden einen Kaffeelöffel voll.

O p u n t i a

Cactus Opuntia, L.; gemeine Indlianische Felsge; Figuer d'Inde (Gal.); Common indian fig (Ang.); Indianisk fige (D.); Higos de pela (His.); Gewoone vygplant (Bel.); Fico d'India (I.); Indiansk ficon (Succ.).

Gal. Gen. M.

1) (Icosandria Monogynia, L.; Ficoidea, J.) Eine Americanische Pflanze, welche im südlichen Europa wächst. (Knorr. Del. I. t. f. a.)

Man wendet die Stängel, uneigentlich Blätter (folia Opuntiae) genannt, an; sie sind platt, von verschiednen Gestalt und Größe, obgleich meist eirund, fingerscheid, saftig und geruchlos. Sie haben einen wässerigen und schleimigen Geschmack.

O r i g a n u m

In den Pharmacopoen werden folgende Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Origanum Creticum, L.*; Cretischer, Spanischer Dostol, Spanischer Dostol.

Candischer Majoran; Origan de Crète (Gal.); Majoram of Candia (Ang.); Ouregao de Creta (Lus.); Spanskhumle (Succ.).

Ams. An. Bor. Bor4. Br. Fenn. Gal. Galm. Han. Hass. O. Sax. Succ. Wir. Be. G. M. Pil. Sp.

1) (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine auf Creta und im südlichen Europa wachsende Pflanze. (Hayne VIII. 7. Dod. Pempt. 284.)

Man wendet die Spitzen (spicae s. herba Origani Cretici) an; sie bestehen aus den rötlichen, behaarten, ästigen Stängeln mit runden, sitzenden, glatten Blättern und purpurrothen, kurze lockere Ähren bildenden Blüten. Es hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend, blähungtreibend. Man wendet sie in Aufguss und äußerlich in Kräutersäckchen an.

2) *Origanum Dictamnus, L.*; Cretischer Dittam; Dictame de Crète (Gal.); Dittamum of Candia (Ang.); Dittamo Cretico (I.); Kretsky dyptam (B.).

An. Br. Fer. Galm. His. Wür. Be. Fl. G. Sp. Z.

Ein kleiner Strauch, welcher auf Candia wächst. (Blackw. t. 462. Plenck t. 497. Hayne VIII. t. 6. Zorn t. pl. t. 542.)

Man wendet das Kraut (herba s. folia Dictamni Cretici) an; es besteht aus einem ästigen, rötlichen, behaarten Stängel, an welchem unten eirunde, ründliche, gestielte, silzige, weißliche und oben ründliche, sitzende, glatte, oft rötliche, mit vielen Drüsenpunkten besetzte Blätter stehen. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen gewürzhaften, etwas bitteren Geschmack.

Reizend, ehemals für Menstruation befördernd gehalten.

3) *Origanum Majorana, L.*; *Apaprop*; Majoran, Majoran; Marjolaine (Gal.); Sweet marjoran (Ang.); Mirzunjusch (Ar.); Maryanka (B.); Merian, Mairan (D.); Murwa (Duk.); Majorana (His.); Mariolen (Bel.); Maggiorena (I.); Majoran (Pol.); Mangrona (Lus.); Majoran (Succ.); Marru (Tam).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Per. Ful. Gal. Galm. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pal. R. Sax. Succ. Wir. Wür. A. Be. Br. C. G. M. Pil. Sp.

4) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Hayne VIII. 9. Zorn t. pl. t. 81.)

Man wendet die Spitzen (herba et flores Majoranae s. Amoraci s. Sampsuchi) an; sie bestehen aus einem vierkantigen Stängel mit eirunden, silzigen, weißlichen

chen Blättern und weissen, in kurzen, ründlichen Aehren, von denen drei oder vier genähert ein Köpfchen bilden, zusammenstehenden Blüthen. Sie haben einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, scharfen, etwas bitteren Geschmack.

Reizend, Niesmittel.

4) *Origanum vulgare*, L.; Wohlgeruth, gemeine Dofte, Dofst, Dofstentkraut; Origan commun (Gal.); Wild marjoram (Ang.); Dobra mysl (B); Vild mairan, tost (D); Oregano (His.); Wilde majolyn (Bel); Origano, Erba da Accinghe, Maggiorana silvestre (I.); Lebiotka (Pol.); Ouregao (Lus.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. Wür. Zc. Br. C. Fi. G. M. Sp. Z.

4 Eine Europäische Pflanze. (Bull. t. 193. Blackw. t. 280. Plenck t. 495. Hayne VIII. 8. Zorn Ic. pl. t. 57.)

Man wendet die Spizzen (herba et flores Origani vulgaris s. Cunilae bulbulae) an; sie bestehen aus einem etwas vieredigen, behaarten, bloß am obern Theile ästigen Stängel mit eirunden, gestielten, unten etwas behaarten Blättern und purpurrothen Blüthen, welche kurze, einen rispigen Strauß zusammensetzende Aehren bilden. Es hat einen gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen scharfen, brennenden, beißenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend und blähungstreibend. In Aufguss, äußerlich in Kräutersächchen.

Infusum Origani. (GalM.)

℞. Summitatum siccatarum Origani, Liquiritiaerasae, singularum drachmas duas cum dimidia.

Aquae bullientis quantum sufficit ut librae duae colaturae obtineantur.

Oleum Origani aethereum, Aethereoleum Origani. (A. Am. An. Bor. Bor4. Br. D. Du. Han. Lon. LonN. O. Pal. Sar. Sax. Wir. Wür. C. Fi. Sw.)

℞. Summitatum florescentium Origani quantum vis.

Aquae . . . quantum sufficit. Destillent. (Am. Du. Lon. LonN. R. C)

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — D. Herbae unam et sex Aquae; — Bor. Han. O. Sax. et 77. Herbae unam et octo Aquae; — A. Herbae unam et Aquae duodecim; — An. Herbae sex et Aquae viginti.

℞. Summitatum Origani partes viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque. Salis culinariae . . . partes tres. Destillent. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Summitatum Origani quantum vis. Aquae destillatae Origani quantum sufficit.

Destillent. (Wür.)

Bor4. oleum origani cretici venale indicat.

Aqua Origani. (A. Pal.)

℞. Summitatum Origani partem unam. Aquae . . . partes duodecim. Destillent partes quatuor. (A.) Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae.

Oleum Dictamni aethereum, Aethereoleum Dictamni. (Sw. T.)

℞. Foliorum Dictamni partem unam. Aquae . . . partes quatuor. Destillent.

T. ut oleum majoranae aethereum.

Syrupus de Dictamno. (Gal. Fi.)

℞. Summitatum siccatarum Dictamni Cretici . . . unciam unam. Aquae destillatae Dictamni

libras duas.

Digere in balneo aquae per horas duas in vase tecto; cola et filtra. Liquori adde

Sacchari albi . . . duplum.

Dissolve in balneo aquae.

Conserva Majoranae. (Sar. Wir.)

℞. Herbae Majoranae contusae partem unam. Sacchari pulverati . . . partes duas.

Commisce. (Wir.)

Sar. Herbae contusae et Sacchari, singulorum partes aequales.

Aqua Majoranae. (Ams. B. Pal. Sar. Sax. WW.)

℞. Herbae Majoranae partem unam. Aquae . . . partes quatuor.

Destillata parte dimidia destillatio supra novam herbam instituat. (Pal. Sar.)

Ams. et B. Herbae partem unam et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes decem; — WW. Herbae partem unam et sex Aquae; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quindecim; destillent trientes duo.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Oleum Majoranae aethereum, Aethereoleum Majoranae. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. Sw. T.)

℞. Herbae florecentis Majoranae quantum vis.

Aquae . . . quantum sufficit. Destillando elioitum oleum separatur. (Ed.)

Ful. et Li. Herbae partem. unam et tres Aquae; — Sw. Herbae unam et quatuor Aquae; — D. Herbae unam et Aquae sex; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Herbae unam et octo Aquae; — Ba. Herbae unam et novem Aquae; — T. ut oleum florum aurantii.

R. Herbae Majoranae

partes viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.

Salis communis partes tres.

Post tres dies macerationis destillent. (Br. Pal. Sar. Wir.)

R. Herbae Majoranae quantum vis.

Aquae destillatae Majoranae

quantum sufficit.

Destillent, (Wir.)

Balsamum Majoranae. (Wir. Sp.)

R. Olei essentialis Majoranae

drachmam unam.

Olei Nucis moschatae

drachmas duas cum dimidia.

Misce. (Wir.)

Sp. Oleorum, singulorum partes aequales.

Butyrum s. Unguentum Majoranae. (Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. Pid. Sp. Vm.)

R. Herbae recentis Majoranae.

Butyri recentis.

singulorum partes aequales.

Contrita coque lente ad humidam consumptionem usque et cola exprimendo. (Hass. Sax. Pid. Sp.)

Hor. Han. et O. Herbae partem unam et duas Axungiae Porci; — Bor4. Adipem suillum loco butyri; — HassP. Herbae et Axungiae, singularum libram unam.

R. Herbae recentis Majoranae.

Butyri recentis.

singulorum libram unam.

Coque ad consumptionem humidam, cola et adde

Olei essentialis Majoranae

guttas triginta.

Misce bene. (Br. D. Pal. Wir.)

R. Butyri recentis partes tres.

Herbae recentis Majoranae

partem unam.

Post horas duodecim digestionis super cinere calido cola exprimendo, lava cum Aqua tepida, liqua, decantha et ad refrigerationem usque agita. (Vm.)

R. Butyri recentis unciam unam.

Aquae destillatae Majoranae

drachmas duas.

Contere, liqua super igne, decantha butyrum et terè cum

Olei essentialis Majoranae

guttis octo.

Misce sedulo. (Ful.)

R. Butyri recentis drachmam unam.

Olei essentialis guttas duas.

Contere. (Li.)

Pal. Axungiae Porci semunciam et Olei Majoranae guttas decem.

Erweichend, auflösend, blähungstreibend.

— Sp. Einreibungen auf den Unterleib und sonst.

Oleum Majoranae infusum. (Br. Wir. Wür. T.)

R. Herbae recentis Majoranae.

Olei Olivarum,

singulorum libram unam.

Macera per aliquot dies, tunc coque igne lenissimo usque ad humidam consumptionem et cola exprimendo. (Br. Wir.)

Wir. Herbae partem unam et duas Olei; — T. ut oleum lavandulae.

O r l e a n a

Orleana terra, Urucu, Pigmentum, Urucu; Orleans; Rocou (Gal.).

Br. Wir. 6a. G. M. Sp. Z.

Ein Körbchengewächs bis vier Pfund schweren Broden oder Kugeln, außen von brauner, innen rother Farbe, weicher Beschaffenheit, thierischen Geruch und abstringirendem Geschmack.

Es ist diese Substanz, der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleansbaumes, Bixa Orellana, L., (Polyandria Monogynia, L.; Tiliaceae, J.) eines demelasmaßigen Baumes in Südamerika (Desc. Fl. Ant. 1. 4. Hayne IX. t. 34.) bedeckt.

O r o b a n c h e

Orobancha Virginiana; Virginische Sommerwurz; Orobanche de Virginie (Gal.); Virginian broom-rapè; Beechdrops, Cancer-root (Ang.).

G.

Eine Schmarotzerpflanze (Didymia Angiospermia, L.; Orobanchaceae, J.) Nordamerica's. (Moris. p. 12. t. 16. f. 9.)

Man hat sie innerlich bei Ruhr und äußerlich bei verschiedenen Geschwüren angewendet. Sie ist abstringirend und besitzt zu gleicher Zeit eine außerordentlich widerliche Bitterkeit.

O r y z a

Oryza sativa, L.; Reis; Riz (Gal.); Rice (Ang.); Aruz (Ar.); Pruisch (Arm.); Men-ho (C.); Lua (Co.); Riis (D.);

Chawl (Duk. Hin.); Arroze (His.); Ryst (Bel.); Riso (I.); Motsj; Góme, Kó (J.); Rískesa (Ma.); Tandul (Mah.); Bras (Mal.); Barinje (Pe.); Ryz (Pol.); Arróz (Lus.); Vrlihi (Sa.); Ris (Succ.); Dúgu (Ta.); Arisi (Tam.); Bium (Tel.).

Ams. An. B. Br. Fer. Ful. Gal. Galm. Hass. HassP. His. Li. R. RC. Wir. A. Be. G. M. Pld. Sp.

⊙ (Hexandria Digynia, L.; Graminæ, J.) Eine in Aethiopien einheimische Pflanze, welche heutzutage in allen warmen Ländern gebaut wird. (Pleack. t. 278. Fl. méd. VI. 299.)

Man wendet den Samen (semen s. grana Oryzae) an; wir erhalten ihn ohne Oberhaut; er ist länglich, stumpf, gefurcht, weiß, trocken, hart, zerreiblich, geruchlos und von mehligem Geschmack.

Er enthält, nach Braconnot, viel Sagmehl mit etwas thierischem Stoff und sehr wenig, nicht crystallisirtem Zucker, Schleimharz, Del und verschiedene Salze.

Er besitzt sehr nährrende Eigenschaften, wird, mit vielem Wasser, verdünnt, etwas erweichend und Anstreb, ist aber mit Unrecht als styptisches Mittel angesehen worden.

Decoctum s. Rissana s. Aqua Oryzae. (18. Gal. Galm. ParC. Ra. Sm. T.)

℞. Oryzae totae semunciam.
Aquae communis libras duas et uncias octo.

Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et colaturae adde

Syrupi Althaeae vel Capilli Veneris unciam unam.

Misce. (Gal.)

℞. Coquere jubet Oryzae uncias duas cum Aquae libris duabus ad sedecim unciarum remanentiam; — T. Oryzae uncias duas, Aquae libras quatuor coquendo ad dimidium redigere jubet; — Ra. Oryzae semunciam cum Aquae libris tribus ad tertiae partis remanentiam.

℞. Oryzae totae uncias duas
Aquae octarios tres.

Coquendo tertiam partem consume, sub finem addendo

Butyri recentis unciam unam.

Sacchari vel Salis pro arbitrio quantum requiritur.

Misce. (Sm.)

℞. Oryzae mundatae et totae unciam unam.

Coque, usque dirupta sit, in Aquae quantitate sufficiente ut colaturae octarius (itis) obtineatur, cui sub finem adde

Corticis Aurantii amari mundati drachmas duas.

Stent in infusione per horae quadrantem et tunc colentur. (Galm.)

℞. Oryzae unciam unam.
Aquae octarios duos cum dimidio.

Decoque ad octariorum duorum remanentiam, sub finem addendo

Liquiritiae drachmas quatuor.

Post refrigerationem cola. (ParC.)

Erweichend, aber nicht abstringend; bei Durchfall und Ruhr empfohlen. — Man kann noch Milch, eine Abkochung von Catechu, Quittensyrup oder sonst einen süerlichen Syrup, Aqua Rabellii it. hinzusetzen. Es ist gut; wenn man damit auf vielfache Art Veränderungen vorzunehmen will, da diese Abkochung so häufig gebraucht wird.

Decoctum pectorale. (Sp.)

℞. Oryzae mundatae unciam unam.
Aquae fontanae uncias centum viginti octo.

Coque, donec oryza sit dirupta, tunc infunde in decocto

Radice Liquiritiae,

— Althaeae,

— s. nigulatum semunciam.

Herbae Capilli Veneris Canadensis,

Flortur Farfaeae,

— singulorum drachmas duas.

— Rhoeados drachmam unam.

Post horae quadrantem decantha.

Potus Oryzae citrae, Decoctum Oryzae acidulatum. (Su.)

℞. Oryzae pulveratae unciam unam.
Aquae libras quatuor.

Coque parumper et adde colaturae Sacchari Hordei semunciam.

Succi Citri unciam unam.

G. S. M. B. Z. G. M. A.

Extractum Cervi; Osmazom; Osmazome (Gal.)

Ca. Vm.

℞. Carnis bubulae partem unam.
Alcoholis partes quatuor.

Carnem in frustula minora concisam per horas duodecim aeris siccitatis torrenti exponere, tunc digere cum alcoholis in loco calido; post horam unam vas refrigeret et deinde liquor filtratur; alcoholis distillatione abstracto residuum per pannum lanam (Stahel) trajice et ad extracti consistentiam consume. (Vm.)

℞. Musculorum adipe privatorum quantum vis.

Concise in pastam tenuissimam, huc pedetentim Aquam frigidam infunde et bene melaxa; liquorem deinde per linteam cola, calfac; coquentem despu-

ma, filtra et ad extracti consistentiam usque consume. (Ca.)

Reizend von angenehmem Geschmack, zur Wiederherstellung des Appetits bei Reconvalescenten. — Gabe, eine Drachme.

O v a.

Ova gallinacea; Hühnerier; Oeufs de poule. (Gal.); Eggs of hen (Ang.); Bayzan (Ar.); Biju (Cy.); Anda (Duk.); Huevo (His.); Hoenderey (Bel.); Ovo di gallina (I.); Tukim (Fe.); Kurzé iajia (Pol.); Anda (Sa.); Haenraegg (Suec.); Koray mutay (Tam.); Guddu. (Tel.)

A. Apis. An. Ba. Bor. BorC. BorG. D. DD. Fenn. Fal. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wtr. WW. A. Br. C. Fl. G. Par. Pid. Sp.

Oleum s. Vitellus Ovorum s. Ovorum expressum. (Am. Bor. BorG. Br. D. Ber. Föl. Gal. Ham. Hass. HassP. His. Li. O. Pal. Pol. RC. Sax. Suec. Wtr. Wtr. Br. Fl. Pid. T. Vm.)

R. Vitellorum Ovorum recentium quantum vis.

In sartagine immisos balnei aquae ope ad frigidum redige, donec inter digitos pressi oleum facile emittant, tunc sacco e tela aretioris tecturæ confectis, inter duas laminas terreas tepiditas exprime et per chartam emporificam balnei aquae calidae, filtra.

Fi. Ova cocta et dura triturate, in vase cupreo stanno obducto ad humidam consumptionem usque calefacere et tunc exprimere; — *Chaussier* Vitellos duris cum Alcohole diluere, in vase tecto calefacere, filtrare, alcoholem destillare et oleum ab aqua separare jubet (GalH. Vm.). — Das auf letztere Weise erhaltene Del hat, nach Senzky, immer den Geruch des Alcohols und ist, nach Van Mons, noch mehr dem Kaugummi ähnlich, als das andere.

Erweichend, lindert, bei schmerzhaften Hämorrhoiden, Frostbeulen, wunden Brustwarzen und ausgeprägten Lippen empfinden.

Clyisma sedans et emolliens; (BorC. DD. B. Pic.)

R. Furfuris bene loti manipulum dimidium.

Aquae purae libras duas.

Decoque ad dimidii remanentiam et colaturae adde

Vitellorum Ovorum no. 3 vel 4.

Misce. (Pic.)

R. Vitellorum Ovorum no. 2.

Olei Rosarum

— Chamomillae,

singulorum uncias tres.

Misce. (B.)

R. Vitelli Ovorum semunciam.

Olei Olivarum drachmas duas.

Misce. (BorC. DD.)

Unguentum s. Pomatum contra strumam. (Sm.)

R. Axungiae unciam unam.

Liquatae leni igne adde

Ovum recens absque testa no. 1.

Subige bene.

Alphonse Beroy wendet es drei oder vier Monate lang auf Kröpfe an und soll sie bisweilen damit zertheilt haben.

Emplastrum flavum. (O.)

R. Vitellos Ovorum coctorum et siccatorem no. 6.

Cerae flavae,

Axungiae Porci,

singulorum uncias quatuor.

Misce exacte.

Mixtura analeptica. (Sm.)

R. Cremoris Lactis uncias sex.

Vitellos Ovorum recentium

no. 2

Sacchari drachmas quatuor ad un-

ciam unam.

Aquae Cinnamomi hordeatae

drachmas sex.

Contere. — Eßlöffelweise, bei Erschlaffung und Schwäche nach zu häufigem geschloßnem Umgang mit Weibern und Opium.

Mixtura ad aphthas s. antiaphthosa. (Sm.)

R. Cremoris Lactis,

Aquae Rosarum,

singulorum unciam unam.

Vitellum Ovi recentis no. 1.

Syrupi Papaveris albi

drachmas quatuor.

Misce. — Eßlöffelweise, in 24 Stunden zu verbrauchen.

Alcohol cum Albumine s. albuminosum. (Vm.)

R. Albumina Ovorum recentium

no. 4.

Subige in vase porcellaneo, sansinter adtendo

Alcoholis uncias duas.

Cataplasma aluminosum. (RC.)

R. Aluminis drachmam unam.

Albumina Ovorum no. 2.

Agitentur fortiter, ut in coagululum coeant. — Bei ostentlicher Augenentzündung, Frostbeulen.

Albumen aluminosum, Coagulatum aluminosum officinale. (Fi.)

R. Aluminis . . . drachmam unam.
Albumen Ovi recentis . . . no. 1.
Aquae Florum Sambuci vel Rosarum unciam unam.

Linimentum Albuminis Ovi. (RC.)

R. Albuminis Ovi recentis,
Alcoholis, vel
— diluti camphorati, vel
Balsami Peruviani partes aequales.
Conquassando misce. — Bel'm Auf-
liegen.

Oxygenium.

Aër purus s. dephlogisticatus s. vitalis; Dryngas, Lebensluft; Oxigène (Gal.).

B*. Fer. Han. HassP. Br. Fi. Sw. T. Vm.

R. Oxydi nigri Mangani quantum vis.
Ad ruborem asque calefac sensim in retorta fictili cum apparatu pneumatochemico communicante; priores gasis, quod evoluitur, partes effugere sinendo, serius prodeuntes in lagenas vitreas excipe, quas sub aqua oclusas et obturaculis piceis munitas in loco frigido serva. (B. Fer. Han. HassP. Sw. Vm.)

R. Peroxydi Manganesi partes tres.
Acidi sulphurici concentrati partes duas.

Misce frigide in mortario vitreo; calcina mixturam ad ruborem usque, gas quod evoluitur, excipe et cum Aqua calois pulsatum serva. (Sw*. Vm.)

R. Nitri pulverati . . . quantum vis.
Calefac in retorta, donec hujus fundus ad ruborem excaudit; gas evolutum excipe, partes priores penitus negligendo. (Br.)

Ban Mons behauptet, der mit Seesalz vermischte Salpeter gebe schneller Drygen, als wenn er sich allein finde.

R. Peroxydi Manganesi partem unam.
Chloratis Potassae partes duas.
Contere, calefac prope flammam spiritu vini alitam et gas, quod evoluitur, excipe. (Vm.)

Fi. Gas e Mangano, vel Oxydo Hydrargyri rubro vel Kali muratico oxygenato extricare jubet: — T. itidem praeterea et alias substantias indicat.

Aqua oxygenata. (Br.)

R. Aquae quantum vis.
Satura machinae compressoriae ope quantum fieri potest, gase oxygenio.
Ein leichtes Reizmittel, welches man bei

Appetitlosigkeit, Mangel der Reinigung, sogenannten sthenischen Wasserkräften, Magenkrämpfen und Hysterie empfohlen hat. — Gabe, eine bis zwei Flaschen in vier und zwanzig Stunden.

Im Allgemeinen ist das Verhältniß des in einem auf diese Weise bereiteten Wasser enthaltenen Drygens die Hälfte des Volums dieses letztern.

Das so bereitete oxygenirte Wasser unterscheidet sich bedeutend von dem, was Lhenard mittelst eines eben so weitläufigen als beschwerlichen und zu sehr in's Kleinliche gehenden Verfahrens erhalten hat und welchem er den Namen *Deutoxydum Hydrogenii* beilegt. Letzteres, so concentrirt als möglich, giebt das vierhundert und fünfundsiebzigfache Volum Gas unter einem Drucke von 0m.775 und bei einer Temperatur von 14°. Auffallend ist es, daß es noch keinem Kratze eingefallen ist, in der Therapie sowohl innerlich, als besonders äußerlich davon Anwendung zu machen, indem er durch Zusatz eines gtd. fern oder geringern Menge Wasser den Grad der Stärke desselben veränderte; und daß unsere Experimentatoren diese Seltsamkeit haben vorbeigehen lassen, die Neugierde des Publicums durch die Erzählung ihrer abentheuerlichen Versuche, einige Wochen lang zu unterhalten. In diesem Bezug darf man die wichtige Beobachtung, Lhenard's nicht aus den Augen verlieren, daß die thierischen und organischen Gewebe sämmtlich das oxygenirte Wasser zerlegen, nach Art der meisten Metalle und Metalloxyde, ohne etwas von ihren Grundstoffen abzugeben und ohne die kleinste Menge Drygen zu absorbiren; ohne demnach die geringste Veränderung zu erfahren, es sey denn, daß das Peroxyd zu stark wäre. Sollte sich dieß aber mit den lebenden Geweben ebenso verhalten? Die Sache verbiente eine Untersuchung, und sollte dieß auch nur seyn, um zu sehen, ob es mit Lhenard's Behauptung seines Nichtigkeits habe oder nicht, daß die Eigenschaft der thierischen Gewebe, ebenso wie Platin, Gold und Silber, das Drygen des oxygenirten Wassers zu entbinden, wahrscheinlich einer und derselben Kraft zuschreiben sey, die fernach auch der Gedanke nicht unvernünftig sey, daß die Secretionen durch eine analoge Kraft von Statten gehen und daß man auf diese Weise begreifen könne, wie ein Organ ohne etwas abzugeben oder etwas einzunehmen, dauernd auf eine Flüssigkeit einwirken und sie in neue Producte umändern könne. Diese rationalen Schlüsse über eine positive Thatsache wären einer gründlichen Untersuchung werth, da sie im Stande sind, die physiologischen und therapeutischen Lehrgedäude von Grund aus umzustürzen.

P.

Paeonia.

Paeonia officinalis, L.; Mönche, Pfingstrose, Sictrose; Pivoine (Gal.); Peony (Ang.); Peonia (His.); Piwoniec (Pol.). Ams. An. Bor. Bor4. Br. Fer. Gal. Gen. Han. His. Pol. R. Sax. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. M. Sp.

♀ (Polyandria Digynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (Blackw. t. 65. 245. Plenck t. 432. Hayne V. t. 26. Düss. off. Pfl. III. t. 13. Fl. méd. VI. 274.)

Man wendet die Wurzel, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Paeoniae) ist dick, lang, knollig und fleischig.

Frisch hat sie einen unangenehmen und viskösen Geruch, welcher sich nach dem Trocknen fast ganz verliert. Der Geschmack ist bitter, süßlich, etwas scharf und schwach adstringirend; die Schärfe verliert sich durch Trocknen.

Die Blüthen (flores Rosae benedictae s. regiae) sind roth. Frisch haben sie einen unangenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bitteren Geschmack.

Der Saame ist geruchlos und fast ohne Geschmack.

Conservae Paeoniae. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Petalorum Paeoniae partem unam. Sacchari pulverati . partes duas.

Contere. (Pal. Wir.)

Sar. Petalorum partem unam cum Sacchari pauxillo terere et pulpam in partibus tribus Sacchari clarificati leviter coquere jubet.

Fascula Paeoniae. (Wir. T.)

℞. Radicis recentis Paeoniae quantum vis.

Raspa et pulpam in sacco e tela confecto inclusam prelo submitte; succo Aquae pauxillum adde, sepone, partem limpidam decantha, sedimentum aëris ope siccatum pulvera.

Aqua Paeoniae. (Gal. Pal. Sar. T.)

℞. Florum Paeoniae partem unam.

Aquae . . . partes quatuor.

Destillet dimidia pars. (Gal. Sar.)

Gal. Florum partem unam et tres

Aquae; destillet pars una cum dimidia;

— T. ut aquam florum Aurantii.

Extractum Paeoniae. (Fer. Wir.)

℞. Radicis Paeoniae concisae libram unam.

Aquae bullientis . . . libras sex.

Infunde per tres dies, tunc coque parumper; cola exprimendo et liquorem ad extracti consistentiam usque consume. (Wir.)

Fer. Coquere jubet Radicis recentis libram unam in tribus libris Aquae, decoctum Albuminis ope clarificare et vaporando consumere.

Infusum Petalorum Paeoniae. (His.) |

℞. Petalorum recentium Paeoniae libras sex.

Aquae bullientis libras duodecim.

Infunde per horas octo, cola exprimendo et colaturam post aliquot tempus decantha.

Syrupus Paeoniae. (His. Pal. Wir.)

℞. Radicis Paeoniae contusae uncias duas.

Aquae libras sex.

Decoque ad librarum quatuor remanentiam et colaturae adde

Sacchari albi . . . libras duas.

Clarifica ut fiat syrupus. (His.)

℞. Florum recentium Paeoniae libras tres cum dimidia.

Aquae fontanae bullientis libras quatuor.

Infunde per horas viginti quatuor, cola exprimendo et in colaturae uncias octodecim solve

Sacchari albi uncias triginta duas.

Serva. (Pal. Wir.)

Gebe, zwei bis drei Drachmen in einem Trank.

Decoctum Carnis s. Jusculum antispasmodicum. (Bo.)

℞. Carnis vitellinae macrae uncias sex.

Radicis Valerianae,

— Paeoniae,

singularum drachmam unam.

Foliorum Cichorii,

— Lactucae, singularum mani-

pulum dimidium.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque et colaturae refrigeratae adde

Pulveris Poliorum Aurantii
semidrachmam.

Aetheris sulphurici guttas decem.
Auf einmal, Morgens nüchtern.

Jusculum antiepilepticum. (Bo.)

℞. Carnis vervecinae uncias quatuor.

Radicis Cichorii,
— Fragariae,
singulorum semunciam.

Foliorum Cichorii,

— Boraginis,

— Lactucae,

— Agrimoniae, singulorum

manipulum dimidium.

— Melissa pugillum unum.

Seminum Papaveris albi

semidrachmam.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque et colaturae adde

Radicis Paeoniae pulveratae

scrupulos duos.

Morgens nüchtern zu nehmen.

Species contra apoplexiam. (Pal. Wir.)

℞. Succini praeparati,

Cornu Cervi philosophice praepa-

rati,

Ligni Aloës,

Radicis Paeoniae,

singulorum semunciam.

Corticis Citri . drachmam unam.

Sacchari perlati . . . uncias tres.

Olei essentialis Cinnamomi

guttas sedecim.

Fiat pulvis. *Completae* appellantur
si addis

Ambrae griseae semiscrupulum.

Moschi . . . grana quinque.

Dieser Pulver wurde ehemals bei Kopf-
schmerzen, Schwindel, Schlagfluss und Epi-
leptie gerührt. — Gabe, eine halbe Drach-
me bis zwei Scrupel.

*Pulvis contra tussim infantum s. anti-
catarrhalis.* (Pal.)

℞. Radicis Paeoniae . . . semunciam.

— Iridis Florentinae

drachmas sex.

— Serpentariae Virginicae

drachmas duas.

Croci . . . drachmam unam.

Sacchari crystallati (Gandis)

unciam unam.

Fiat pulvis. — Gabe, eine Messerspiße
voll.

*Pulvis epilepticus s. Marchionis s. an-
tiepilepticus s. Paeoniae compositus s.
de guttata s. ad guttata s. cephalicus
s. de Carignan.* (Bor4. Br. GalF. GalH.
His. Pak Wir. Ca. Pie. Sp.)

℞. Radicis Paeoniae,

Ammouii subcarbonicæ,
singulorum partem unam.

Cornu Cervi praeparati,

Radicis Fraxinellae,

Visci querni,

singulorum partes duas.

Succini praeparati partes quatuor.

Pulvera. (GalF. GalH. Ca.) — Dies
ist der *Pulvis principis de Carignan* (prin-
cesse de C.). — Gabe, achtzehn Gran,
im ersten, sechs und dreißig im zweiten,
acht und vierzig im dritten, eine Drachme
im vierten Jahre und darüber, bei convul-
sivischen Krankheiten.

℞. Radicis Paeoniae,

— Fraxinellae,

Visci querni,

singulorum semunciam.

Seminum Atriplicis drachmas duas.

— Paeoniae,

Ungulae Alces,

singulorum semunciam.

Cranii humani praeparati

unciam unam.

Corallii rubri praeparati,

Hyacinthi praeparati,

singulorum semunciam.

Foliorum Auri no. 50.

Tritura exacte. (Wir.) — Gabe, ei-
nen halben Scrupel bis halbe Drachme.

℞. Visci albi pulverati uncias duas.

Radicis Paeoniae,

Concharum praeparatarum,

singulorum unciam unam.

Misceantur. Si requiritur, addere li-
cet

Auri foliati . . . quantum libet.

(Bor4.)
℞. Radicis Paeoniae sesquiunciam.

— Contrayervae,

Visci querni,

singulorum drachmas sex.

Rasurae Eboris,

— Cornu Cervi,

— Ungulae Aloës,

Cranii humani praeparati,

Corallii rubri porphyrisati,

Hyacinthi praeparati,

Bezoar occidentalis,

singulorum sesquidrachmam.

Fiat pulvis subtilissimus. (His.)

℞. Visci querni,

Radicis Fraxinellae,

— Paeoniae,

Seminum Paeoniae,

singulorum unciam unam.

— Atriplicis,

Corallii rubri praeparati,

singulorum semunciam.

Ungulae Alces . . . unciam unam.

Fiat pulvis subtilissimus. (Sp.)

℞. Visci querni,

Radicis Valerianae,

Magnesiae, singulorum semunciam.
Seminum Paeoniae,
— Polygoni,

Corallii rubri praeparati,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. (Pie.) — Diese vier For-
meln geben das Pulver, welches besonders
Pulvis ad guttam genannt wird.

℞. Radicis Paeoniae . uncias tres.

Visci querni,
Rasurae Eboris,
— Ungulae Alces,
— Cornu Cervi,

Eboris usti,
Corallii rubri,

— albi,

Margaritarum praeparatarum
drachmas sex.

Foliorum Auri no. 20.

Fiat pulvis. (Wir. Sp.)

℞. Paeoniae uncias tres, Visci, Cor-
nu Cervi, Magnesiae, Eboris calcinati,
Corallii rubri et albi, Nacrae Perlarum,
singulorum drachmas sex et Folia Auri
no. 10.

Diese Formel giebt den *Pulvis epilepti-
cus Marchionis, Pulvis Marchionis*. —
Gabe, von zehn Gran bis zu einer halben
Drachme.

℞. Succi praeparati,
Nacrae Perlarum praeparatae,
Smaragdi praeparati,
singulorum semunciam.

Ligni Aloës,
Radicis Paeoniae,
singulorum scrupulos duos.

Unicornu marini,
Visci querni,
singulorum sesquidrachmam.

Saochari crystallati (Saqdis)
uncias duas.

Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis cepha-
licus albus* — Gabe, eine halbe Drachme
bis zwei Scrupel.

℞. Radicis Paeoniae . semunciam.

Visci querni,
Rasurae Eboris,
— Ungulae Alces,
— Eboris calcinati,
— Cornu Cervi,

Corallii rubri,
— albi,

Margaritarum praeparatarum,
singulorum drachmam unam.

Fiat pulvis. (Pal.) — *Pulvis epilepti-
cus albus*.

℞. Radicis Paeoniae,
Seminum Paeoniae,
singulorum semunciam.

Unicornu marini,
Margaritarum orientalium,
singulorum drachmas duas.

Quinque Lapidum pretiosorum,
singulorum grana quadragin-
ta quinque.

Castorei,

Visci,

Ungulae Alces,

Corallii rubri,

singulorum drachmas duas.

Cranii humani praeparati
sesquidrachmam.

Pulveris Viperæ drachmam unam.

Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis epile-
pticus Cellarii*. — Gabe, von einem
Scrupel bis zur halben Drachme.

℞. Radicis Paeoniae drachmas decem.
— Fraxinellae,

Visci querni, singulorum drachmas
quinquë.

Ligni Aloës,

Seminum Paeoniae,
singulorum drachmas tres.

Corallii rubri,

Nacrae Perlarum,

singulorum semunciam.

Ungulae Alces . drachmas tres.

Succini albi,

Unicornu marini,

singulorum drachmas duas.

Carbonis Tiliae . sesquiunciam.

Fiat pulvis. (Pal. Wir.) — *Pulvis
epilepticus niger*. — Gabe, von fünf
Gran bis zu einem halben Scrupel bei Kin-
dern; eine halbe Drachme bei Erwachsenen.

℞. Radicis Paeoniae,
— Gentianae,
singulorum uncias duas.

Herbae Betonicae,

— Chamaedryos,

— Quinquefolii majoris,

Florum Paeoniae,

— Convallariae,

— Violarum,

— Tiliae,

singulorum unciam unam.

Seminum Coriandri,

— Paeoniae,

Visci querni,

singulorum semunciam.

Rasurae Ungulae Alces uncias duas.

— Asini

drachmas quinque.

— Cornu Cervi,

Cornu Cervi absque igne praepa-
rati, singulorum unciam unam.

Cranii humani . drachmas sex.

Corallii rubri,

— albi,

Margaritarum orientalium,
singulorum semunciam.

Foliorum Auri no. 24.

Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis epi-
lepticus Holsaticus*. — Gabe, von einem
halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Opiatum antiepilepticum. (Bo.)

- ℞. Croci semunciam.
 Sennae mundatae,
 Rhei, singulorum drachmas duas.
 Seminum Paeoniae,
 Salis Ammoniaci,
 Jalapae,
 Scammonaei,
 Hellebori nigri,
 Acidi succi,
 singulorum drachmam unam.
 Cinnamomi . . . scrupulos duos.
 Castorei . . . scrupulum unum.
 Conservae Paeoniae

quantum sufficit.

Gabe, anderthalb Drachmen, Morgens nüchtern. — Gewiß ist, daß die Paeonie in diesem purgirenden Mischmasch eine höchst unbedeutende Rolle spielt.

Electuarium anthelminticum. (Bo. Pic.)

- ℞. Ferri sulphurici,
 Helminthochorti,
 singulorum drachmas duas.
 Radicis Valerianae sylvestris,
 — Paeoniae,
 singularum semunciam.
 Foliorum Aurantii

drachmas quinque

- Aloës drachmam unam.
 Syrupi Paeoniae quantum sufficit.

Gabe, alle Morgen nüchtern eine Drachme bei Epilepsie mit Wurmcomplication. — Es gilt von diesem Präparat dasselbe, was von dem vorhergehenden gesagt wurde.

P a n a x.

Panax Quinquifolium, L.; fünfblättrige Kraftwurzel, Ginseng; Ginseng (Gal.); Ginseng, Ginzang (I.); Jin chen (Ch.); Garent oguen (Ir.); Nindsin, Dsindsom (Ja.); Orkhoda (Ma.); Ginsao (Lus.).

Br. Fer. Gal. Wir. A. Br. C. G. M.

♀ (Polygamia Dioecia, L.; Araliaceae, J.) Eine Pflanze der Chinesischen Tartarei und Canabas. (Bigel. Am. med. Bot. II. t. 9. Woodw. Med. bot. t. 99. Sims. Bot. Mag. t. 1333. Dict. d. Sc. nat. Cah. VI. Fl. méd. IV. 184.)

Man wendet die Wurzel (radix Ginseng) an; sie ist spindelförmig, fingerdick, zwei bis drei Zoll lang, außen rötlich und innen gelblich. Ueber ihrem Halse sitzt ein knotiges und gebrehtes Gewebe, auf welchem man die Spuren der alten eingegangenen Stängel sieht. Ihre Substanz ist halbdurchsichtig, herb und gleichsam hornartig. Sie hat keinen Geruch, der Geschmack ist zuckerig, etwas bitter und schwach gewürzhaft.

Sie enthält viel Saamehl und Schleimhart.

Die Völker Asien's betrachten sie als ein mächtiges aphrodisiacum. Sie hat aber auf diese Benennung nicht mehr Recht, als so viele andre Substanzen, welche durch die Volksbeobachtung dazu erhoben worden sind.

Morsuli Ginseng. (Bo. Ca. Pie.)

- ℞. Sacchari libras decem.
 Vanillae uncias decem.
 Ginseng radices pulveratae

uncias quinque.
 Tincturae Cantharidum

drachmas quinque.

Olei Cinnamomi . . . guttam unam.

Essentiae Ambræ . . . guttas decem.

Mucilaginis . . . quantum sufficit.

Fiant morsuli granorum viginti-quatuor ad triginta. — Gabe, vier oder fünf Stück täglich. — Diese Pastillen können schwere Zufälle hervorbringen, ohne selbst nur für den Augenblick Vermögen hervorzurufen, welche ohnmächtigen Wünschen nicht mehr entsprechen.

P a n i c u m.

Panicum milineum, L.; Hirse; Millet (Gal.); Millet (Angl.); Hirse (D.); Hajo (His.); Geerst (Bel.); Miglio (I.); Proso (Pol.); Milho (Lus.).

Gal. His. M.

⊙ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine Pflanze, deren Vaterland man nicht kennt und welche in mehreren Gegenden Europa's gebaut wird. (Zorn Ic. pl. t. 349.)

Man wendet den Saamen (semen Milii) an; er ist klein und rundlich und enthält unter einer dünnen, rindigen, gelben, glänzenden, zweiflappigen Schale eine weiße, mehligte Substanz.

P a n i s.

Mica Panis albi etc.; Brod, Semmel; Pain (Gal.).

Brod.

Ptisane ax Pane. (B*.)

- ℞. Panis triticei uncias octo.
 Aquae uncias triginta duas.
 Coque per horam, cola et colaturae adde Aquae evaporatae quantitatem aequalem.

Das mit gerösteter Roggenbrodtrinde bereitete Brodwasser giebt ein angenehmes, leicht abstringirendes Getränk.

Stückweise bei Reizungen der Nahrungswege.

Panada Anglorum. (Au.)

- ℞. Pan's secalini tosti . . . uncias sex.

Cinhamomi . . . semidrachmam.
Gortic's recent's Citri

drachmas duas.

Vini albi libras duas.

Coque et cola. — Colaturae addere potes Vitellum Ovi vel Aromata.

Decoctum album s. album Sydenhami s. Cornu Cervi compositum s. Cornu Cervi Elaphi compositum s. Cornu Cervi cum Mica Panis. (An. B*. Bel.) Br. Gal. GalM. HassP. His. Sar. Sax. Ca. ParC. Pie. Ra. Sp. Vm.)

℞. Cornu Cervi raspati uncias duas.

Micae Panis albi uncias quatuor.

Aquae fontanae . . . libras sex.

Coquendo parte tertia consumpta, cola absque expressione (Sar.)

℞. Cornu Cervi,

Micae Panis albi,

singularum drachmas duas.

Aquae fontanae . . . libras tres.

Coquendo partem tertiam consume et colaturae adde

Sacchari albi . . . quantum vis.

Solve. (B*.)

℞. Rasurae Cornu Cervi uncias duas.

Aquae libras tres.

Coque et sub finem adde

Micae Panis albi . . . uncias duas.

Coquendo continua ad librarum duarum usque colaturam, cui adde

Sacchari albi . . . sesquunciam.

Dissolve. (An. Bel.)

℞. Rasurae Cornu Cervi semunciam.

Micae Panis albi unciam unam.

Aquae communis . . . libras tres.

Coquendo tertiam partem consume et colaturae adde

Syrupi Cydoniorum uncias duas.

Misce bene. (Ra.)

℞. Cornu Cervi raspati,

Micae Panis albi,

singularum partem dimidiam.

Aquae . . . partes triginta sex.

Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde

Gummi Arabici partem quartam.

Dissolve. (Sax.)

Han. Cornu Cervi raspati, Micae Panis, singularum semunciam, Aquae libras tres coquendo ad duas consumendas et Gummi Arabici in colatura solvendi drachmas duas.

℞. Rasurae Cornu Cervi,

Micae Panis albi,

singularum semunciam

Aquae fontanae uncias triginta sex.

Coque ad remanentiam colaturae unciarum viginti quatuor, cui adde

Gummi Arabici sesquidrachmam.

Sacchari . . . drachmas duas.

Dissolve. (HassP. Sp.)

Pharmacopoea universalis. II.

Br. coquere jubet Cornu Cervi raspati, Micae Panis. singularum semunciam, Gummi Arabici sesquidrachmam in Aquae libris tribus ad duas coctione consumendis et in colatura dissolvere Sacchari drachmas duas

℞. Micae Panis albi partem unam.

Coque per horam dimidiam cum

Aquae . . . sufficiente quantitate

ut colaturae uncias sexaginta quatuor obtineas, cui in fine adde

Gummi Arabici partem dimidiam.

Cornu Cervi usi partem quartam.

Sacchari . . . partem dimidiam.

Cola per pannum; post refrigerationem decantha et adde

Aquae Cinnamomi

partem dimidiam.

Misce bene. (Vm.)

Gal. et ParC. Coquere jubent Cornu Cervi calcinati drachmas duas cum Micae Panis drachmis sex et Sacchari uncia una, omnia in mortario contusa, in Aquae libris duabus per octo sexagesimas; liquorem bullientem per pannum amplioris texturae leviter exprimendo colare et addere Aquae Florum Aurantium semunciam vel Aquae Cinnamomi drachmas duas; — GalM. Coquere per octo sexagesimas Micae Panis drachmas sex, Cornu Cervi vel Ossium aliorum ad alborem usque calcinatorum drachmas duas in Aquae quantitate sufficiente ut colaturae octarius (litre) obtineatur, colare bullientem levissimae expressionis ope et addere Aquam essentialem Citri et Syrupum simplicem; — His. leviter coquere Cornu Cervi calcinati semunciam, Micae Panis uncias duas cum Aquae libris sex; colare et colaturae addere Syrupum communis uncias quatuor et si vis, Aquae Florum Aurantium vel Cinnamomi vinosae drachmas duas; — Ra. Micae Panis uncias duas, Cornu Cervi calcinati drachmas duas, Aquae libras duas, Syrupi unciam unam et Tincturam Cinnamomi drachmam unam; — Ca. et Pie. Micae Panis uncias duas, Cornu Cervi calcinati drachmas duas, Sacchari uncias tres, Aquae bullientis libras duas et Aquae Cinnamomi semunciam.

Erweiden, lindernd, vorthellhaft bei chronischen Reizungen des Ernährungsorgans, besonders bei hartnäckiger Diarrhoe angewendet. — Glasweise, stündlich. — Man setzt oft mit Stügen 10 bis 20 Tropfen laudanum hinzu.

Gelatina Panis. (B*. GalH. Fi. Vm.)

℞. Micae Panis semisiccatae . . . uncias quatuor.

Aquae destillatae . . . libras duas.

Coque fortiter, cola per cribrum et adde

Sacchari albi . . . libram unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Aquaë Cinnamomi drachmas sex.
Misce (GalH.)

℞. Panis biscociti albi partes quatuor.
Aquaë . . . partes viginti quatuor.

Coque per horam dimidiam, cola per pannum, evaporando ad viginti quatuor partium remanentiam consume et adde

Aquaë Cinnamomi partem unam.
Succi Citri . . . partes duas.
Sacchari albi . . . partes quatuor.
Vini Rhenani . . . partes sex.
Misce. (B*. Vm.)

Fi. Panis biscociti uncias sex, Aquaë libras decem, coque per horam, cola et ad uncias novem consume, tunc adde Vini Hispanici uncias duas, Aquaë Cinnamomi lacteae drachmas duas, Succi Limonum recentium semunciam, Sacchari pulverati sesquiunciam.

Cataplasma de Mica Panis s. emolliens.
(B*. Fer. Ful. Gal. RC. Be. Br. Fi. Sp. T.)

℞. Micae Panis vetusti rasae . . . uncias quatuor.

Lactis vaccini vel Decoccti Althaeae sesquilibram.

Coque ad consistentiam requisitam. (Gal.)

Br. Micae Panis uncias decem et quindecim Lactis absque coctione misce jubet; — B. Lactis libras quatuor et unam Panis simul coquere; — RC. Micarum Panis veterum quantum vis, Aquaë fontanae vel lactis quantum satis; — Fi. Micae uncias tres, Lactis libram unam; — T. Micae partem unam, Lactis quatuor (addendo Malvae siccatae quantitatem quae requiritur, habes *Cataplasma Panis, Lactis et Malvae* (T.)), cujus librae cuique scrupuli duo vel tres Croci addi possunt, quo majorem vim resolventem accipiat.

℞. Micae Panis . . . uncias sedecim.
Pulveris Florum Meliloti,

— Sambuci,

singulorum drachmas duas.

• Lactis . . . uncias quadraginta octo.
Coque sufficienter. (Sp.)

℞. Micae Panis . . . uncias octo.
Butyri recentis . . . uncias duas.
Lactis vaccini . . . uncias octo.

Coque simul. (B*. Ful.)

Man muß das Brodt, bevor man es in der Milch kocht, mit etwas Wasser kochen, um die in ihm enthaltene Essigsäure auszutreiben.

℞. Micae Panis . . . uncias quindecim.
Lactis . . . uncias viginti.
Aquaë bullientis quantum sufficit.

Mica in aqua mollefacta, cola per crinium et cum lacte coque. (Fer.)

Cataplasma acetatum. (RC.)

℞. Micarum Panis vel Farinae cujuslibet . . . quantum vis.
Aceti . . . quantum satis
ut fiat cataplasma. — Bei Geschwulsten, Excoriationen, Verbrennungen, scrophulösen Knochengeschwülsten u.

Spiritus Panis. (Wir.)

℞. Panis triticeus biscociti quantum vis.
Destillet lente ex arena in cucurbita vitrea, igne gradatim aucto, spiritum ab oleo supernatante separa et rectifica.

Aqua Panis. (Wir. Sp.)

℞. Crustae Panis teneris et adhuc calidi . . . uncias quatuor.

Cinnamomi,
Caryophyllum,
Nucis moschatae,

singulorum semunciam.

Vini albi . . . uncias nonaginta sex.
Destillet dimidia pars. — Ein angenehmes Magenmittel. — Gabe, eine halbe Unze.

Papaver.

In den Pharmacopden werden zwei Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Papaver Rhoeas*, L.; Klatschrose, Klapprose; Coquelicot (Gal.); Red poppy (Ang.); Plany neb wlej mak (B.); Klapperose (D.); Amapola (His.); Klapperros (Bel.); Rosolaccio (I.); Papolleira (Lus.); Kornros (Suec.).

A. Ams. An. B. Ha. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. DD. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Wir. Wür. WW. B. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

⊙ (Polyandria Monogynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (Blackw. t. 2. Plenck. t. 418. Hayne VI. 38. Curt. Fl. Lond. III. t. 32. Düss. off. Pfl. VIII. t. 4. Fl. méd. III. 134.)

Man wendet die Blüthen (Flores Papaveris erratici s. Rhoeadis s. Rhoeados) an; sie bestehen aus eirunden, ganzrandigen, rothen Blättern. Frisch haben sie einen widerlichen, nach dem Trocknen gar keinen Geruch. Ihr Geschmack ist schleimig und etwas bitter.

Sie enthalten, nach Riffard, einen fetten gelben Stoff, einen rothen Farbestoff, Schleimharz und Pflanzenfaser.

Man betrachtet sie als beruhigend und etwas narcotisch, aber sie sind fast nur erweichend und lindern. Sie dienen bei nicht

sehr heftigen Lungencatarrhen, weniger jedoch durch sich selbst, als vielmehr durch das Wasser, welches zum Aufgießen angewendet wurde.

2) *Papaver somniferum*, L.; Mohn; Pavot blanc (Gal.); Poppy (Ang.); Khuschkhasch (Ar. Duk.); Bily mak (H.); Ying-suh (C.); Gaysagussa (Can.); Abin atta (Cy.); Valmue (D.); Adormidera (His.); Post (Hin. Sa.); Tamme heul (Bel.); Papavero (I.); Kes (J.); Kuknar (Pe.); Mak bialy (Pol.); Wallmo (Suec.); Casa Casa (Tam.); Cassa Cassa (Tel.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

Eine ursprünglich im Orient einheimische, im südlichen Europa naturalisirte Pflanze. (Lam. Ill. t. 451. Blackw. t. 482. 483. Plenck t. 417. Bull. Herb. t. 57. Düss. off. Pfl. VII. t. 24. X. t. 3. Zorn Ic. pl. t. 371. Bert. Bild. I. 99. f. 1.)

Man wendet die Frucht und den Saamen an.

Die Früchte, Mohnköpfe (capita s. capitula s. capsulae Papaveris) sind kugelige oder eiförmige Kapseln, welche von der in zehn und mehr strahlig auseinandergehende Lappen getheilten Narbe, unter der eben so viele Löcher liegen, gekrönt wird. Der Geruch ist bei der frischen Frucht betäubend, bei der trocknen aber gar nicht mehr zu bemerken. Der Geschmack ist bitter und scharf.

Diese Kapseln haben eine beruhigende und narcotische Wirkung. Sie liefern im Orient das Opium; in Europa findet man in ihnen zwar auch alle Bestandtheile desselben, jedoch in einem sehr verschiedenen Verhältniß, über welches die Chemiker, die sich mit dieser Untersuchung beschäftigt haben, noch getheilte Meinungen sind.

Der Saame (semen Papaveris albi s. nigri s. coerulei) ist sehr klein, nierförmig, etwas runzelig, graulich oder bläulichweiß oder schwärzlich. Das durch Auspressen daraus gewonnene Mohnöl (huile d'oeillette) ist mild und sehr wohlschmeckend.

Conserva Rhoeadis. (Pal. Wir. Ca. T.)

℞. Florum recentium Rhoeadis partem unam.

Sacchari albi . . . partes duas. Contere. (Pal. Wir.)

℞. Foliorum siccatorum Rhoeados pulveratorum . . . partem unam.

Sacchari pulverati partes quatuor.

Aquae . . . quantum sufficit. Miscé triturando. (Ca.)

T. Petalorum pulv. uncias tres, Aquae Rhoeados quantum sufficit, stent per horas 8 vel 10 in vase clauso, donec pulvis mollis fiat, adde solutionem Sacchari albi librarum duarum in Aquae Rhoeados unciis octo in balneo aquae, tunc conjunctis adde Sacchari albi subtilissimi. pulv. uncias octo etc.

Aqua Papaveris erratici s. Rhoeados. (Gal. Pal. Sar. T.)

℞. Florum Rhoeados partem unam. Aquae . . . partes quatuor.

Post sufficientem macerationem destillent partes duae. (Gal. Sar. T.)

Pul: Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia.

Extractum Papaveris erratici s. Rhoeadis. (Br. Fer. Sar. Pid. Vm.)

℞. Caputem Rhoeadis ante decantationem petalorum decerptorum libram unam.

Aquae fontanae . . . libras octo.

Coque per horam unam et exprime succum, qui ad extracti consistentiam evaporet. (Pid.)

Br. tres dies digestionis in Aquae fervidae libris tribus et tunc levem ebullitionem indicat.

℞. Florum Rhoeados recentium quantum vis.

Contusos in mortario macera per horas duodecim in Aquae calidae pondere duplo, cola per crinium, parumper spatulae lignae ope exprimendo, clarifica liquorem cum albumine et ad extracti consistentiam consume. (Fer. Vm.)

℞. Petalorum recentium Rhoeados contusorum . . . libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc distillatione in balneo aquae Aquae uncias circiter duas abstrahé, residuo Aquae tripulum infunde et post horas sex digestionis coquendo trientes duos consume; liquorem clarifica, cola et ad electuarii consistentiam consume, cui nonnisi tepido Aquam destillatam affunde. (Sar.)

Bei heftigem Husten, hartnäckiger Diarrhöe, Lungenschwindsucht und in Fällen empfohlen, wo ein gelindes paregoricum angezeigt ist. — Gabe, von zehn Gran bis zu einem Scrupel für einen Erwachsenen.

Infusum Papaveris erratici s. Rhoeados. (Sar. Ra.)

℞. Florum Rhoeados drachmas duas. Aquae bullientis . . . libras duas.

Infunde. — Erweichend, als gelind

narotisch betrachtet und in dieser Eigenschaft bei Nervenschmerzen angewendet. — *Stabweise.*

Syrupus Papaveris erratici s. rubri s. Rhoeados s. Rhoeadis. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Gal. Gen. Ham. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pal. Pol. Wir. C. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Petalorum recentium Rhoeados
libras quatuor.

Aquae bullientis . . . libras octo.

Infunde per horas duodecim in vase tecto; cola leviter exprimendo, sepone per horas aliquot, decantha et liquori adde

Sacchari albi duplum.

Fiat calor balnei aquae ope syrupus. (Gal.)

Ams. Florum libram unam, Aquae bullientis libras quatuor, horas duodecim; acerationis et ebullitionem usque ad dimidii consumptionem, solutionem librae unius Sacchari in colatura depurata et coctionem ad consistentiam requisitam; — B. Bel. Bor. Han. O. et Pol. Florum libram unam, Aquae bullientis libras duas, horas duodecim infusionis et libras tres Sacchari; — Bor4. Florum uncias duas, Aquae libras duas, digestionem per noctem et parationem syrupi cum colatura unciarum viginti et Sacchari albissimi libris tribus; — HassP. Florum uncias tres, Aquae fervidae libras duas et uncias quatuor, ad colaturam unciarum viginti Sacchari libras tres ut fiat syrupus; — D. Florum sesquilibram, Aquae bullientis libras tres, infusionis horas duodecim, coctionem ad dimidii remanentiam et parationem syrupi additis Sacchari libris tribus; — Du. et C. Florum libram unam, Aquae bullientis uncias viginti, horas duodecim infusionis et Sacchari uncias viginti novem; — His. Florum libram unam, Aquae libras duas, octo horas infusionis et libras quatuor Sacchari; — Lon. LonN. Florum libram unam, Aquae octarium unum et uncias duas, horas duodecim infusionis et Sacchari libras duas cum dimidia; — Pal. Florum libram unam cum dimidia, Aquae bullientis libras tres, infusionis horas viginti quatuor et tres libras Sacchari; — Br. et Wir. Florum libras duas, Aquae libras tres, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari libras quinque et uncias quatuor; — Gen. Florum uncias tres, Aquae bullientis libras tres, decoctionem, macerationem per horas duodecim et Sacchari libras sex; — Li. Florum siccorum libram unam, Aquae bullientis quinque, horas duodecim digestionis,

coctionem colaturae ad dimidii remanentiam et Sacchari libras tres; — Fi. Florum libram unam, Aquae bullientis, Sacchari albi, singulorum libras tres et infusionem per horas viginti quatuor; — T. Florum libras duas, Aquae bullientis libras octo, digestionem duodecim horarum in loco tepido, additionem librarum quindecim Sacchari et parationem syrupi in balneo aquae bulliente.

An. Sw. et Vm. petala in mortario marmoreo contundendo in pulpam redigere jubent; — An. et Vm. Florum partem unam et Aquae bullientis unam cum dimidia et horas duodecim infusionis; — Sw. Florum partem unam, tres Aquae et horas viginti quatuor infusionis; — Vm. Sacchari partes duas pro tribus colaturae; — An. in colatura dissolvere jubet Sacchari uncias octo et Sw. partes quatuor praescribit.

Infusum bechicum. (Sm.)

℞. Florum Rhoeados . . . uncias duas.

Infunde

Acidi sulphurici tenuis
guttas quindecim.

Adde

Sacchari albi uncias duas.

Infunde totum in

Decocti Hordei perlati libra una.

In vierundzwanzig Stunden, zu zwei oder drei Pöffel auf einmal zu verbrauchen, besonders bei den Anfällen des Hustens.

‡ *Morsuli Rhoeados. (Fer. T.)*

℞. Infusi Rhoeados . . . libras sex.

Sacchari libras quatuor.

Clarificata coque ad aptam consistentiam, in laminam marmoream effunde et in tabellas concide.

T. Decocti Papaveris clarificati libram unam, Sacchari albi libras duas.

Acetum Papaveris erratici s. Rhoeados.
(Wir.)

℞. Florum Rhoeados . . . semilibram.

Aceti rubri libras tres.

Macera soli exponendo per dies aliquot et cola exprimendo.

Tinctura Papaveris Rhoeados s. erratici.
(Pal.)

℞. Conservae Florum Rhoeados
unciam unam.

Florum Rhoeados cum Acidi sulphurici sufficiente quantitate adspersorum manipulos tres.

Aquae destillatae Succii Florum Rhoeados uncias triginta.

Digere per horas viginti quatuor, exprime fortiter et adde

Syrupi Succi Florum Rhoeados cum papavillo Acidi sulphurici impraegnatorum uncias octo.
Schwach reizend, ehemals häufig bei sogenannten ächtartigen Fiebern zu einem Eßfel in einem Trank oder Zulep angewendet.

Tinctura Florum Papaveris. (Br. Sax. Wir.)

℞. **Florum Papaveris albi semunciam. Acidi sulphurici drachmam unam. Aquae Florum Papaveris**

uncias quatuor.
Digere per horas viginti quatuor, exprime et filtra.

Beruhigend. — Gabe, eine halbe bis eine Unze. (Br. Wir.)

Sax. **Florum sesquunciam, Acidi semunciam, Aquae bullientis uncias duodecim et horas duodecim macerationis.**

Oleum Papaveris albi s. somniferi. (A. Ra. Bor. Bor4. Br. Gal. Han. HassP. H's. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. Pi. T.)

℞. **Seminum Papaveris quantum vis.** Contunde in mortario marmoreo pistilli lignei ope, et in saccum e tela confectum inclusa frigide exprime.

Bor. HassP. prelum in aqua bulliente calefacere jubent; — Br. Pal. et Wir. Semina antequam exprimuntur, parumper torrere jubent: — Bor4. oleum venale indicat.

Schmerzstillend und Schlafbefördernd.

Pulvis pectoralis. (Pie.)

℞. **Seminum Papaveris albi**

drachmas quinque.
Gummi Arabici,

— Tragacanthae,
Amyli,

singulorum sesquidrachmam.
Seminum Portulacae,

— Althaeae,
— Gossypii,

— Malvae,
Quatuor Seminum frigidorum,
Corticis Cydoniorum, singulorum

drachmas duas cum dimidia.
Tutiae praeparatae,

Succini,
Pulveris Liquiritiae,

Sacchari,
singulorum sesquidrachmam.

Gabe, zwei Drachmen in Rohn- oder Brustbeersyrup.

Electuarium incrassans. (Bo.)

℞. **Conservae Rosarum unciam unam. Syrupi Violarum** uncias duas.

Seminum Papaveris albi

drachmas tres.

Olei Nucis moschatae grana sex.

Bei hartnäckigem Husten. — Gabe, ein Kaffeelöffel alle zwei Stunden.

Emulsio temperans. (Pie.)

℞. **Quatuor Seminum frigidorum**

unciam unam.
Seminum Papaveris albi

uncias duas.
3. Tere, addendo sensim

Aquae Liliorum,

— Rosarum,

singulorum uncias tres.
In colatura dilue

Syrupi Limonum,

— Nymphaeae,

singulorum unciam unam.
Species anodynae. (Ful. Pal. Wür. Sw.)

℞. **Capitum Papaveris libram unam. Radicis Althaeae,**

Seminis Lini,

singulorum semilibram.
Concisa et contusa misce. (Ful.)

Zum Klystir.
℞. **Capitum Papaveris** uncias sex.

Florum Chamomillae,

Foliorum Verbasci,

singulorum uncias tres.
Concisa misce. (Ful.) — Zur Bähung.

℞. **Capitum Papaveris drachmas duas. Foliorum Menthae piperitae,**

Florum Chamomillae, singulorum

manipulum dimidium.
Concisa misce. (Sw.)

℞. **Foliorum Hyoscyami,**

Florum Sambuci,

singulorum unciam unam.
Crocii drachmas duas.

Capitum Papaveris albi

uncias quatuor.
Concisa misce. (Wür.)

℞. **Capitum Papaveris albi concisorum et contusorum cum seminibus,**

Seminum Anethi,

singulorum uncias duas.
Herbae Hyoscyami,

— Cynoglossi,

— Solani nigri,

Foliorum Chamomillae,

singulorum manipulos duos.
Concisa et contusa misce. (Pal.) — Zum Bähnen.

Species pro fotu laterali s. ad pleuriam. (Pal.)

℞. **Radicis Althaeae,**

Capitum Papaveris contusorum cum granis, singulorum uncias duas.

Seminum Lini,

— Foeni graeci,

— Cumini,

Baccarum Lauri,

singulorum unciam unam.

Herbae Malvae,
— Matricariae,
singularum manipulos tres.
Florum Chamomillae
manipulos duos.

Extractum Papaveris albi. (Br. Han.
Lon. LonN. C. Vm.)

℞. Caputum Papaveris a seminibus
liberatorum . . . partem unam.
Aquae . . . partes octo.
Decoque ad dimidii remanentiam,
cola bene exprimendo et in balneo
aquae ad mellis spissi consistentiam
consume.

Narkotisch, schmerzstillend, schlafmachend.
— Gabe, ein bis zwei Gran, ein oder zwei
Mal täglich.

*Decoctum Papaveris s. Caputum Papa-
veris.* ((B*. Lon. LonN.)

℞. Caputum Papaveris contusorum
uncias quatuor.

Aquae communis octarios quatuor.
Coque per horae quadrantem et cola.
In Wdhungen, besonders bei mit Schmer-
zen verbundenen Abscessen und Excoriatio-
nen. Man muß sich jedoch erinnern, daß
alle sogenannte narcotica auf der Epider-
mis beraubte Stellen angewendet, sehr
häufig die Schmerzen vermehren, statt sie
zu mildern.

Clyster anodynum, Papaveris, leniens
(Ra.). Decocta de 1) Caputum Papa-
veris sextuncia et Aquae libra una; 2)
Caputum Papaveris drachmis tribus et
libra una Aquae; 3) denique ex uno
Capite Papaveris et duabus libris De-
cocti emollientis.

Fomentatio leniens ejusd. paratur
coquendo Capita duo Papaveris in
Aquae et Decocti emollientis, singulo-
rum libris duabus.

Lotio sedativa (Sw.). Decoctum Ca-
pitem Papaveris semilibrae in Aquae
libris duabus ad unam libram colatu-
rae redigendis, cui interdum addi pos-
sunt Sublimati corrosivi grana viginti
vel Plumbi subacetici liquidi drachma
una ad tres.

Fomentatio anodyna. (Pal. Sa.)

℞. Specierum anodynarum (formula
Pal.) . . . libram dimidiam.(?)

Aquae libras sex.

Decoque ad librarum quatuor remanentiam et cola. (Pal.)

℞. Caputum Papaveris unciis duas.

Aquae fontanae . . . libras duas.

Coque ad librae unius colaturae remanentiam et adde

Aceti unciam unam.

Misce bene. (Sa.)

Fomentatio antipluretica. (Pal.)

℞. Specierum ad pleuresiam (Pal.)
semilibram. (?)

Lactis vaccini vel Aquae
libras octo.

Decoque ad dimidii remanentiam et
cola. — Erweichend, auflösend, schmerz-
stillend. — Bei Pleur:ste empfohlen, wenn
die Entzündung nicht zu heftig ist.

Gargarisma leniens s. sedans. (Ra.)

℞. Cap'ta Papaveris . . . no. 2.

Seminis Lini . . . drachmam unam.

Aquae bullientis . . . uncias sex.

Colaturae adde

Syrupi Mellis . . . drachmas duas.

Injectio emolliens. (Ca.)

℞. Decocti Caputum Papaveris
libram unam.

Emulsionis communis
uncias quinque.

Albuminis Ovi recentis
drachmam unam,

Bei higer Blennorrhagie empfohlen.

Potio leniens. (Sm.)

℞. Seminis Lini . . . drachmas duas.

Caput Papaveris . . . no. 1.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque per horae quadrantem ad un-
ciarum octo colaturam et adde

Vitellum Ovi recentis . . . no. 1.

Stößelweise in vier und zwanzig Stun-
den, bei Diarrhöen mit vielem Schmerz.

Jusculum pectorale. (Sm.)

℞. Pulli gallinae partem dimidiam.

Napi in frusta concisi . . no. 1.

Aquae octarium unum.

Coquendo partem quartam consume,
in fine addendo

Capitum Papaveris scrupulos duos
ad drachmam unam.

Colaturae adde
Sacchari crystallisati (Sambis)
uncias quatuor.

Gabe, Morgens und Abends zwei Gläser.

Liquor ad nephritidem calculosam.
(Ca. Sw.)

℞. Capitum Papaveris
uncias quatuor ad octo.

Aquae bullientis . . . libras duas.

Coque ad unciarum octo remanen-
tiam, exprime et adde

Nitri depurati . . . unciam unam.

Lotio anodyna. (Sm.)

℞. Capitum Papaveris unciam unam.

Aquae octarios duos.

Coque ad dimidii remanentiam et
colaturae refrigeratae adde

Ammoniaci liquidi
unciam unam ad duas.

Syrupus Papaveris albi s. Papaveris somniferi s. de Meconio s. de Papavere albo s. diacodii s. de Capitibus Papaveris s. Diacodii s. diacodium liquidum Montani. (A. Ams An B. Ba. Bel. Bor. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lns. O. Pal. Sar. Wir. Wür. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Caput Papaveris albi absque seminibus et grossiuscule contusorum . . . partes tres.

Aquae fervidae partes quindecim. Infunde calore 30 ad 40° per horas duodecim, exprime fortiter et parti uni colaturae adde

Sacchari albi . . . partes duas.

Solve. (Ba.)

Li. Papaveris libram unam, Aquae bullientis libras quinque, infusionis horas duodecim et pro libris duabus colaturae Sacchari libras quinque.

℞. Caput Papaveris cum seminibus

uncias octo.

Aquae fontanae . . . libras quatuor. Decoque ad dimidii remanentiam; colaturae sepositione depuratae adde

Sacchari albi . . . libras tres.

Fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

Sp. Sacchari libras quatuor; — Gen. Papaveris libram unam, Aquae libras sedecim et libras quatuor Sacchari; — Fer. Papaveris libram unam, octo libras Aquae et quatuor Sacchari.

℞. Caput Papaveris albi maturorum et siccorum, absque seminibus, concisorum et contusorum libram unam.

Aquae bullientis . . . libras octo.

Digere per horas duodecim, tunc in balneo aquae ad consumptionem dimidii usque evapora; liquorem seponere et adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Coque ad syrupi consistentiam. (Gal.)

Du. infundere jubet Caput non maturorum siccorum absque seminibus libram unam in libris tribus Aquae bullientis per horas duodecim, colare cum expressione, liquidum leni calore ad libram unam consumere, colare per pannum, seponere per horas sex, decanthare et addere Sacchari pulverati uncias viginti novem.

℞. Caput Papaveris albi fere siccorum absque seminibus, concisorum et contusorum

libram unam.

Aquae bullientis libras triginta.

Digesta per horas viginti quatuor coque ad librarum liquidum octo remanentiam, cola exprimendo, ad dimidium consume, seponere ut subsideant et adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Fiat coquendo syrupus. (B-l.)

Hass. Pid. Macerare per horas viginti quatuor Papaveris libram unam in Aquae libris octo, coquere deinde, prouncias novem colaturae addere Sacchari uncias sedecim et semel ebullire jubent; HassP. Caput libram dimidiam, Aquae fervidae libras quatuor macerare per horas viginti quatuor, probe digesta fortiter exprimere et novem s uncias colaturae addere, Sacchari albi uncias sedecim etc.; — Wür. Papaveris uncias octo, Aquae libras duodecim, duodecim horas macerationis, consumptionem ad partem tertiam, colare, ad dimidium evaporare et addere Sacchari libras duas cum dimidia; — Vm. Macerare Papaveris partem unam in Aquae quatuor per horas sex, addere octo Aquae, coquendo ad sex redigere, et syrupum cum Sacchari partibus sex parare; — Sw. Macerare per horas duodecim Papaveris libras duas in Aquae libris triginta, trientes duos consumere, colare cum expressione, colaturam ad dimidium evaporare, colare et syrupum parare cum Sacchari libris quatuor; — Ams. Macerare per horas duodecim Papaveris libram unam in Aquae bullientis viginti quatuor, do-drantem consumere, colare cum expressione, ad dimidium evaporare, denuo colare, sepositione depurare et cum Sacchari libris tribus syrupum parare; — His. Macerare per horas duodecim Papaveris uncias sedecim in Aquae tepidae libris viginti, trientes duos consumere, colare, addere Sacchari libras quatuor cum Aquae sufficiente quantitate, Albuminis ope clarificare et ad syrupi consistentiam coquendo inspissare; — Ed. Infundere per horas duodecim Papaveris partem unam in Aquae quindecim, trientes duos consumere, colare, ad dimidium usque evaporare et cum Aquae partibus duabus syrupum parare; — Lon. LonN. Macerare per horas viginti quatuor Papaveris uncias quatuordecim in Aquae octariis viginti, coctione in balneo aquae ad sedecim redigere, colare exprimendo, ad octarium duorum remanentiam denuo consumere, liquorem bullientem colare, seponere per horas duodecim, decanthare, denuo ad octarium unum evaporare et cum Sacchari libris duabus in balneo aquae syrupum parare; — B. Infundere per horas viginti quatuor Papaveris libram unam in Aquae triginta et ad octo redacta colare, iterum pro dimidio consumere, reponere, decanthare et cum Sacchari

albi libris tribus syrupum parare; — Lus. Macerare per horas duodecim Papaveris libras duas in Aquae viginti quatuor, coquendo trientes duos consumere, colare, iterum ad dimidium evaporare et cum quatuor libris Sacchari syrupum parare; — Sar. Infundere per horas viginti quatuor Papaveris libram unam in octo Aquae, tunc coquere, colare exprimendo et colaturae uncis novem Sacchari sedecim addendo syrupum parare; — Gen. Digerere per horas viginti quatuor Papaveris libras duas in octo Aquae, coquendo dimidium consumere et cum libris quatuor Sacchari syrupum parare; — C. Macerare per horas duodecim Papaveris partem unam in Aquae quindecim, coquendo quadrantes tres consumere, colare exprimendo, denuo ad dimidium evaporare et addere Sacchari partes duas; — Ful. Macerare Papaveris libram unam in Aquae quatuor, coquendo ad dimidium redigere et addere Sacchari ad plumam cocti libras duas; — T. Caputum uncias sex, Aquae calidae circa 60° C. libras quatuor; infunde per horas duodecim, cola; residuum per aequale tempus infunde cum Aquae bullientis libris duabus; liquoribus commixtis et ad dimidium evaporatis adde Sacchari albi libras duas vel Syrupi Sacchari libras tres ut fiat evaporando syrupus.

℞. Caputum Papaveris contusorum absque seminibus . . . libras duas.

Aquae pluvialis . . . libras viginti.
Macerare per horas viginti quatuor, sensim ad ebullitionem usque calorem augendo; cola, sedimentum denuo coque per horae quadrantem cum

Aquae . . . libris decem.

Cola, fortiter exprimendo; liquoribus commixtis et ad dimidium evaporatis adde

Sacchari albi . . . libras octo.
Clarifica et ad aptam consistentiam coque. (An.)

℞i. Caputum libram unam macerare cum Aquae pluvialis libris octo per horas duodecim, tunc per horam dimidiam coquere, solvere in colatura Sacchari libras quatuor et clarificata ad syrupi consistentiam decoquere.

℞. Caputum Papaveris siccorum . . . unciis quatuordecim.

Radici Liquiritiae . . . semunciam.

Aquae bullientis . . . libras octo.

Macerare per noctem, coquendo dimidium consume, cola fortiter exprimendo, adde

Sacchari albi . . . libras quatuor et coquendo syrupum para. (D.)

O. Papaveris unciis sedecim, Liquiritiae unciam unam, Aquae libras octo, duodecim horas macerationis, consumptionem partis dimidiae et Sacchari libras quatuor.

℞. Caputum Papaveris contusorum absque seminibus . . . unciis quatuor.
Aquae fontanae . . . libras octo.
Decoque ad libram trium remanentiam et adde sub finem
Radici Liquiritiae rasae . . . unciis duas.

Cola fortiter exprimendo et liquori adde

Sacchari albi . . . sesquilibram.
Clarifica et ad syrupi consistentiam coque. (A.)

℞. Caputum Papaveris non maturorum cum seminibus . . . unciis duas.

Siliquae dulcis . . . unciis duas cum dimidia.

Aquae fontanae . . . sesquilibram.
Coque leni igne ad unciarum decem liquidi remanentiam, sub finem addendo Liquiritiae recentis minutim concisae . . . sesquinciunciam.

In colatura solve

Sacchari albi . . . unciis sedecim.
Despuma et cola. (Han. Pal. Wir. Sp.)

℞. Caputum, Siliquarum dulcium absque seminibus, singulorum concisorum unciis tres, Liquiritiae unciis duas, coquere cum Aquae communis libris decem ad duarum cum dimidia remanentiam et colaturae addere Sacchari albissimi libras duas.

Syrupus diacodium s. Papaveris crocatum. (Wir.)

℞. Syrupi diacodium simplicis . . . unciam unam.
Crocii pulverati grana quindecim.

Syrupus Papaveris anisatus. (Vm.)

℞. Olei Anisi . . . drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici . . . sesquidrachmam.

Fiat emulsio, cum qua commisce Syrupi Papaveris albi . . . unciis sexaginta quatuor.

Syrupus pectoralis anglicus. (Ca.)

℞. Dactylorum . . . libras duas.
Jujubarum . . . libram unam.
Radici Liquiritiae . . . semilibram.

— Althaeae,

Capilli Veneris Canadensis,

Capitum Papaveris albi, . . . unciis quatuor.

Coque, cola et colaturae adde Sacchari albi . . . libras octo.

Evaporent ad syrupi consistentiam usque.

Potio anodyna, leniens, hypnotica,

gummosa optatet, Julep narcoticum, anodynum s. pectorale. (Gal. Pie. Ra.)

℞. Potionis gummosae uncias quatuor.

Syrupi Diacodii . . . semunciam.
Miscé. (Ra.)

℞. Aquae Cichorii
uncias tres vel quatuor.

Syrupi Diacodii
drachmas quatuor ad sex.

Misce. (Pie.)

℞. Infusi Tiliae,
— bechici,
singulorum uncias duas.

Aquae Florum Aurantiorum
drachmas duas.

Syrupi Diacodii . . . semunciam.

Misce. (Ra.)

℞. Aquae Florum Aurantii
semunciam.

— Lactucae . . . uncias tres.

Syrupi Diacodii drachmas duas.

Misce. (Gal.)

℞. Aquae Florum Aurantii,
— Liliorum,
singulorum sesquiunciam.

Syrupi Diacodii,
— Boraginis,
singulorum semunciam.

Misce. (Pie.)

℞. Aquae Florum Aurantii
unciam unam.

— Melissa . . . uncias tres.

Syrupi Sacchari,
— Diacodii,
singulorum unciam unam.

Misce. (Ra.)

℞. Aquae Rhoeados,
— Farfaeae,
— Nymphaeae,
singulorum uncias duas.

Oculorum Cancrorum praeparatorum
grana viginti.

Syrupi Diacodii . . . drachmas sex.

Misce. (Pie.)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.

Syrupi Diacodii . . . uncias duas.

Misce. (Pie.)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.

Syrupi Diacodii . . . uncias duas.

Misce. (Pie.)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.

Syrupi Diacodii . . . uncias duas.

Misce. (Pie.)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.

Syrupi Diacodii . . . uncias duas.

Misce. (Pie.)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.

Syrupi Diacodii . . . uncias duas.

Misce. (Pie.)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.

Syrupi Diacodii . . . uncias duas.

Misce. (Pie.)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.

Syrupi Diacodii . . . uncias duas.

Misce. (Pie.)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae,
singulorum uncias tres.

ut fiat emulsionis libra una; colaturas adde

Syrupi Diacodii unciam unam.
Miscé bene. (Sa.)

℞. Olei Olivarum cochlearia duo majora;

Vitellum Ovi recentis . . . no. 1.

Syrupi Diacodii semunciam ad unciam unam.

Aquae uncias sex;
Fiat emulso. (Sm.)

P a r i e t a r i a .

Parietaria officinalis, L.; Wandkraut, Glastraut; Parietaire (Gal.); Pellitory of the wall (Ang.); Den a noc, Sklená bylina (B.); Murkurt (D.); Parietaria (His. Lus.); Parietaria, Erba vítroli (I.); Glaskruid (Bel.); Noc i dzien (Pol.); Vaeggaert (Suec.).

Ams. An. Br. Fer. Gal. GalM. Gem. His. Wir. Wür. Be. Br. G. M. Sp. Z.

♀ (Polygamia Monoecia, L.; Urticeae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Hayne V. t. 12. Bull. t. 199. Zorn Ic. pl. t. 121.)

Man wendet das Kraut (herba Parietariae s. Helkines) an; es besteht aus einem runden, rötlichen Stängel mit eiförmigen, gestielten, oben glatten, unten schwach behaarten Blättern.

Gelind harntreibend.

Succus Parietariae. (T.)

Ex herba recentis, contundendo in pulvere redacta.

Decoctum Parietariae. (Ra.)

℞. Foliorum Parietariae
unciam unam.

Aquae libras duas.

Ein schwaches diuretisches, welches man selten allein anwendet.

Aqua Parietariae. (Gal.)

℞. Herbae recentis Parietariae
partes quinquies millenas.

Aquae partes duodecies mille et quingentas.

Destillant decies circiter mille partes; productum infunde

Herbae recentis Parietariae
partibus quinquies millenis.

Aquae partibus decies millenis.

Destillant partes decies millenas. —

Et pro semper repeti potest.

P a r i s .

Paris quadrifolia, L.; Einbeere, Wolfsbeere, Zuchstraube; Parisette (Gal.); Oneberry (Ang.); Ethaer (D.); Ubas de zorro (His.); Wolfsbezie (Bel.); Uva di

volpo (I.); Wronie oko (Pol.); Parizetta (Lus.); Trollbaer (Succ.).

Gen. Wir. Be. M. Sp.

♂ (Octandria Tetragynia, L.; Asparagineae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 10.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Frucht an.

Die Wurzel (radix Paridis s. Solani quadrifolii) ist fleischig, etwas knotig und mit einigen Fasern versehen. Sie hat einen ekelhaften Geruch und Geschmack. Sie erregt, zu dreißig bis fünfzig Gran genommen, Erbrechen. Die Alten verordneten sie gegen Kolik.

Das Kraut besteht aus einem langen, dünnen, glatten, unten blattlosen, oben mit vier eirundspitzigen, wirtelförmig stehenden Blättern besetzten Stängel. Der Geruch ist sehr unangenehm, der Geschmack süßlich. Die Wirkung ist purgirend. Außerdem hat man es als schmerzstillend, schweißtreibend und giftwirdig betrachtet. Es ist besonders bei Manie, Krämpfen, Keuchhusten, Vergiftung mit Krähenaugen zc. angewendet worden.

Die Früchte (Uvae versae s. vulpinae) sind dunkelpurpurrothe oder schwarzbraune, glänzende, kirschgroße Beeren. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen widerlichen Geschmack. In den Magen gebracht bewirken sie wahre Vergiftungszufälle.

Paronychia.

Paronychia argentea, Lmk.; glänzende Anopelblume; Paronique argentée (Gal.); Nevadella (His.).

His.

♂ (Pentandria Monogynia, L.; Paronychieae, A. St. Hil.) Eine Pflanze des südlichen Frankreich's.

Man wendet das blühende Kraut (herba Sanguinariae minoris) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit eirunden, spitzigen, fast glatten Blättern, kürzern ober am Grunde breiten Nebenblättern und kleinen endständigen, von großen Deckblättern geschützten Blüthenköpfen.

Paspalum.

Paspalum Dactylum, Lmk.; fingerförmiges Hirsegras; Pied-de-poule, Paspale (Gal.); Creeping panicgrass (Ang.); Grama (His.); Gevingerd, Bauik (Bel.); Grama digitata (Lus.).

Fer. Gal. Gen. His.

♂ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Schröd. Fl. Germ. I. p. 165. t. 3. f. 9.)

Die Ausläufer, welche man gewöhnlich anwendet, sind fälschlich als Wurzeln betrachtet, sind sehr lang, rahenfederbig, walzig und knotig. Sie enthalten unter einer harten, gelben, glänzenden Oberhaut eine weiße Substanz von mehligem, zuckerartigen Geschmack.

Pastinaca.

Pastinaca sativa, L.; Pastinak; Pannais (Gal.); Garden parsnip (Ang.); Passtenek (B.); Pastinak (D.); Pastinaca (His. J. Lus.); Pinsternakel (Bel.); Pasternak (Pol.); Palsternacka (Succ.). An. B. Fer. Gal. Suec. Wir. Be. Br. M. Sp. Z.

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in ganz Europa gebaute Pflanze. (Blackw. t. 379. Schk., t. 76. Ptenck t. 227. Hayne VII. 76, Zorn Ic. pl. t. 568.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel (radix Pastinacae) ist baumenstark und dicker, fleischig, weißlich oder gelblich. Sie hat einen etwas gewürzhaften und zuckerigen Geschmack.

Der Saame ist rundlich, elliptisch, fast flach, mit einem kleinen häutigen Rand umgeben, gestreift, von etwas gewürzhaftem und zuckerigem Geschmack.

Reizend, ehedem als harntreibend betrachtet.

Perfoliata.

Bupleurum rotundifolium, L.; Dutschewachs; Perce-feuille (Gal.); Thorough wax (Ang.); Giennenvaex (D.); Perfoliata (His.); Doorwas (Bel.); Perforata (I.); Obiezy swiat (Pol.); Perfolhada (Lus.); Gendmvaet (Succ.).

Br. Gal. Wir. M. Sp.

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Hayne VII. 1. Zorn Ic. pl. t. 376.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Perfoliatae) besteht aus großen, eirunden, rundlichen, meist durchwachsenen oder auch bloß umfassenden, geruch- und geschmacklosen Blättern.

Der Saame ist klein, schwarz, hart und oon scharfem, bitterem, gewürzhaftem Geschmack.

Persica.

Persica vulgaris, Cand.; Pfirsichbaum, Pfirsichenbaum; Pêcher (Gal.); Peachtree (Ang.); Khowkh (Ar.); Breskew (B.); Persikketrae (D.); Prisco (His.); Per-

sikboom (Bel.); Persico, Pesco (Fr.); Schufstalu (It.); Broskwina drzewo (Pol.); Pecegueira (Lus.); Persiketræd (Suec.).

A. An. Be. Br. Fer. Gal. Gen. His. Wir. Wür. A. Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.
Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.), welcher ursprünglich in Persien einheimisch ist. (Duham. Arb. fruit. II. t. 1—14; 20—32. Blackw. t. 101. Plenck t. 556. Hayne IV. 38. Zorn Ic. pl. t. 232.)

Man wendet die Blätter, die Blüten und die Saamen an.

Die Blätter (folia Persicorum) sind einfach, lang, lanzettförmig, spitzig und an den Rändern fein gezähnt. Sie haben den Geruch und Geschmack der bitteren Mandeln. Ihre Wirkung ist schwach abführend. Die Blüten sind rötlich oder rosencoth und besitzen dieselbe Eigenschaft, wie die Blätter.

Der Saame ist ein hölziger, sehr harter, auf der Oberfläche rissiger Kern, dessen bittere Mandel ein süßes Del und Hydrocyansäure enthält.

Conserva Florum Persicorum. (Sar. Fi. T.)

R. Florum Persicae recentium contusorum . . . partem unam.
Sacchari ad plumam cocti . . . partes du s.

Commisce bene.

T. Florum uncias sex cum duabus Sacchari in pulpam redigere, hanc per crinium trajectam cum Sacchari albi ad plumam cocti libris quatuor commiscere et evaporatorii ope vel soli exposita ita evaporare ut levis crusta in superficie oriatur, jubet; — *Fi.* Florum libram unam cum Sacchari uncias duabus in pastam redigere et hanc cum Sacchari ad plumam cocti tanta quantitate coquere ut omne saccharum libras tres aequet.

Succus ex Floribus Persicorum. (Sar. Fi.)

R. Florum Persicae recentium a calicibus liberatorum quantum vis.
Adpersos cum Aquae pauxillo in saccum include, exprime fortiter et succum filtra. Si eum servare in animo est, sepone ut subsideat, tunc partem limpidam addito Alcoholis pauxillo sub strato olei in lagenis serva.

Fi. Flores cum parte ponderis quarta Aquae in vase cupreo stanno obducto lenissimo calore calefacere, spatulae lignae ope agitare ut flores molles fiant et prelo subjicere.

Infusum Persicorum s. Florum Persicae. (His. Sar.)

R. Florum Persicae . . . libras duas.

Aquae bullientis . . . libras octo.
Infunde per horas octo, cola leviter exprimendo et operationem novies supra novas flores repete. (Sar.)

R. Florum Persicae libram unam.
Aquae bullientis . . . libras duas.
Infunde per horas octo et cola exprimendo. (Mis.)

Decoctum Foliorum Amygdali Persicae. (Au. Sw.)

R. Foliorum siccatorum Persicae . . . unciam unam.
Aquae . . . libras duas.
Decoque ad sesquibrae colaturae remanentiam. — Bei Blutharnen, Dysurie und Nierenentzündung empfohlen. Gabe, täglich ein Pfund.

Syrupus Foliorum Persicae. (Vm.)

R. Foliorum recentium Persicae . . . quantum vis.
Contunde absque aqua et exprime succum, in cujus bullitione coagulati partibus colaturae; quinque solve Sacchari albi . . . partes novem.

Syrupus Persicorum Florum s. de Amygdali Persicae Floribus s. Amygdali Persicae. (An. Br. Fer. Gal. Gen. Pal. Sar. Wir. Wür. Fi. T. Vm.)

R. Florum recentium Persicae . . . libras quatuor.
Aquae bullientis libras duodecim.
Infunde per horas duodecim super cinere calido, in vase tecto; cola leviter exprimendo; sepone, decantha et adde

Sacchari albi libras septemdecim.
Coque ad syrupi consistentiam. (Gal.)

Br. Pal. et Wir. macerare per horas duodecim jubent Florum libram unam in Aquae bullientis libra una, exprimere deinde et in uncias novem colaturae depuratae Sacchari albi uncias sedecim solvendo syrupum parare; — *Fer. Fi.* Macerare per horas duodecim Florum partes duas in tribus Aquae bullientis et colaturae addere Sacchari partes duas; — *Sa.* Coquere ad consistentiam aptam mixturam e partibus aequalibus Infusi Florum Persicae et Syrupi communis; — *T.* Flores cum Aquae bullientis duplo pondere per horas viginti quatuor macerare, tunc filtrare fortiter exprimendo, et hoc semel vel bis repetere, tunc sepositione et decanatione clarificata cum Sacchari pondere duplo in balneo aquae bulliente commisce vel secund. *Boullay:* Florum libras quatuor cum duodecim Aquae destillare et in parte dimidia, destillatione obtenta in balneo

aque, et in retorta obturata Sacchari libras novem et in decocto in vase residuo, cum expressione filtrato, decantato aequali, sacchari copiam solvare, syrupos commiscere, agitare bene et miti balnei aquae caloniae ope intime commiscere.

Rx. Florum recentium Persicae partes duas.

Contundendo in pastam redige, cui infunde in vase tegendo

Aquae fervidae partes quatuor.

Post refrigerationem cola exprimendo et in colaturae partibus quatuor solve

Sacchari albi partes septem.

Despuma. (Virg.)

Rx. Florum Persicae uncias octo. Gemmarum Persicae uncias duas.

Aquae bullientis uncias sedecim.

Infunde in balneo aquae per horas viginti quatuor, vase tecto; filtra et in colaturae uncias quinque solve

Sacchari albi uncias octo.

Cola. (An.)

Rx. Sacchari albi libras quatuor. Aquae fontanae quantum sufficit.

Coque ad syrapi spissi consistentiam, quem adhuc calidum

Florum recentium Persicae

libris duabus infunde, et per tres dies, vase tecto, macerata, leviter coque et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

Emulsio externa e nucleis Persicae s. leniens. (Virg.)

Rx. Nucleorum Persicae unciam unam. Seminum Cannabidis,

— Papaveris,

singulorum semunciam.

Aquae Melliloti,

— Nymphaeae,

singularum uncias quatuor.

Emulsioni adde

Aquae Vitae camphoratae

semunciam.

Man legt es bei Kopfschmerz mittelst Compressen auf die Stirn und die Schläfe.

Persicaria

Zwei Arten einer Pflanzengattung sind unter diesem Namen in der Medicin gebräuchlich.

1) *Polygonum Persicaria*, L.; gemeiner Rinderrich; Persicaire douce (Gal.); Spotted persicaria (Ang.); Lopegraes (D.); Persicaria monchada (His.); Persenkruid (Bel.); Pessigueira (Lus.); Ræknesva (Suec.).

Gal. His. Sp.

© (Octandria Trigynia, L.; Polygo-

nese, J.) Eine Pflanze Europas. (Hayne V. t. 23, Oed. Fl. Dan. t. 702.)

Man wendet das Kraut (herba Persicariae minoris) an; es besteht aus einem runden, röhrigen, röhlichen, knötigen, ästigen Stängel mit abwechselnden, gestielten, lanzettförmigen Blättern. Der Geschmack ist schwach sauer und etwas salzig. Wurde ehemals für ein Bupdmittel gehalten.

2) *Polygonum Hydropiper*, L.; Bitterrinderrich, Basserpfefferlinderrich; Persicaire poivrée, brûlante, acre, Poivre d'Asieau, Piment brûlant (Gal.).

Gal. Gen. Be. M. Sp.

© Eine Europäische Pflanze. (Blackw. Herb. t. 119. Bull. t. 127. Plenck t. 308. Schk. t. 108. Hayne V. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba Persicariae urentis s. Hydropiperis s. Mercurius terrestris) an; es besteht aus einem glatten, runden, knötigen, ästigen Stängel mit abwechselnden lanzettförmigen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich scharfen, brennenden, pfefferartigen Geschmack.

Tris auf die Haut gelegt wirkt es roth machend.

Species pro infuso diuretico s. diureticae. (Aur.)

Rx. Foliorum Persicariae minoris,

Radicis Junci sylvestris

semunciam.

Foliorum Petroselinii,

Herbae Hyssopi,

Cinnamomi,

Corticis Aurantiorum,

Anisi,

singulorum drachmam unam.

Concisa et contusa misce.

Petasites.

Tussilago Petasites, L.; Pestilenzwurz, Pestwurzmannlein, Reunkrauttröschel; Petasite (Gal.); Butterbur (Ang.); Demesyl Wetsj konske kopyto (H.); Storblandet hestihoc (D.); Petasites, Lombrerera (His.); Poddeblad (Bel.); Petasite (I.); Lipieznik (Pol.); Pestilenzrot (Suec.).

Ba. Br. Gal. His. Li. Wir. Bo. Br. M. Pid. Sp. Z.

2) (Syngonesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, Cass.) Eine im nördlichen Europa an feuchten Orten gemeine Pflanze. (Hayne II. t. 17. 18. Diss. off. Pfl. III. t. 7. Zorn Ic. pl. t. 58.)

Man wendet die Wurzel (radix Petasitidis s. Petastidis majoris s. vulgaris s. rubeantis) an; sie ist ästig, saftig, für

gerschick, außen braun, innen gelb oder roth. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen bitteren, widerlichen Geschmack.

P e t r o l e u m.

Oleum Petrae; Steindl, Bergöl, Pé-trole (*Gal.*); Petrol, Barbados tar (*Ang.*); Nefl (*Ar.*); Muttie ka tail (*Duk.*); Petroleo (*His.*); Mitti tel (*Hin.*); Petroleo, Olio di Sasso, Nafta impura (*L.*); Kesesa no abra (*Jap.*); Minnia tanna (*Mal.*); Oley skalny (*Pol.*); Bhumi tialam (*Sa.*); Bergolja (*Suec.*); Ippa (*Sumat.*); Mun tylum (*Tam.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorG. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Br. C. Fi. G. Pid. Sp. T.

Ein flüssiges Erdharz von oft dicker Consistenz, schwärzlichbrauner, bisweilen rüthlichbrauner Farbe, fast undurchsichtig, leichter als Wasser, salbenartig anzufühlen, sehr leicht entzündlich, unter Entwicklung eines dicken schwarzen Rauchs verbrennend, von sehr starkem Geruch und scharfem Geschmack.

Reizend, krampfstillend, harntreibend, wurmwidrig. — Gabe, zehn bis fünfzehn Tropfen auf Zucker.

Oleum volatile s. Naphtha Petrolei, Petroleum rectificatum. (Bor4. Wür. Fi. Sw.)

℞. Petrolei libras duas.
Aquae libras quatuor.
Destillant blando igne, quamdiu oleum limpidum transit.

Bor4. Petroleum cum Aquae fontanae octuplo destillare jubet, ita ut tertia pars prioris remaneat; — *Fi. Petrolei* partem unam, Aquae communis partes decem.

Reizend, auflösend, besonders äußerlich bei Gelenkschmerzen, Erstickungen und Lähmung.

Lini-mentum Petrolei. (*Sa. Sw.*)

℞. Petrolei,
Alcoholis rectificati,
singulorum unciam unam.
Misce bene. (*Sa. Sw.*)
℞. Essentiae Saponis drachmas octo.
Petrolei sesquidrachmam.
Misce. (*Sa.*)
In Einreibungen gegen Frostbeulen.

Mixtura anthelmintica. (B*. Au.)

℞. Petrolei semunciam.
Tincturae Asae foetidae
drachmas sex.

Misce. — Gabe, vierzig Tropfen, täglich drei Mal. — Von Schwarz gegen Sandwurm empfohlen.

P e u c e d a n u m.

Peucedanum officinale, L.; Saufenschel, Schwefelwurz, Haarstrang; Peucedan, Feneuil de porc, Queue de pourceau (*Gal.*); Common sulphur wort (*Ang.*); Svinekenkel (*D.*); Peucedan (*His. I. Lus.*); Hairstreng (*Bel.*); Wieprzniek (*Pol.*); Svinfinkel (*Suec.*).

Br. Gal. His. Wir. Be. M. Sp. 2 (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze des nördlichen Europa's. (*Gmel, Fl. Sibir. I. t. 41. Hayne VII. t. 4.*)

Man wendet die Wurzel (*radix Peucedani s. Feniculi porcini*) an; sie ist dick, lang, rund, faserig, außen schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen narkotischen Geruch und einen scharfen, bitteren und schleimigen Geschmack.

Reizend, gegen Hysterie wirksam.

Extractum Peucedani. (Sar.)

℞. Radicis Peucedani libram unam,
Vini albi generosi

libras quinque ad sex.
Post tres dies digestionis in arenae balneo cola, fortiter exprimendo, tunc coque residuum cum novi Vini sufficiente quantitate ad dimidii remanentiam; liquores commixti ad extracti consistentiam usque evaporent.

Syrupus de Peucedano. (Sar.)

℞. Extracti Radicis Peucedani,
— — Liquiritiae,
singulorum unciam unam.
— Foliorum Veronicae,
— — Tussilaginis,
singulorum drachmas tres.
Mellis albi colati . . . uncias duas.
Aquae destillatae radice Peucedani quantum sufficit.
Misce igne blandissimo ut fiat syrupus.

Oleum Peucedani aethereum, Aethereolum Peucedani. (Sar.)

℞. Radicis Peucedani
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres,
Destillant; oleum producto supernatans collige.

P h e l l a n d r i u m.

Phellandrium aquaticum, L.; Wasserfenchel, Peersaat, Pfefferbaamen; Phellan-

dre aquatique (*Gal.*): Fike leaved water hemlock (*Ang.*); Vandfennikel (*D.*); Waterkervel (*Bel.*); Felandrio aquatico, Finocch'io aquatico (*I.*): Koper wodny, Kruszykamien ziele (*Pol.*); Staekra (*Succ.*).

A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Han. Hass. HassP. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür.; WW. *Be. Fi. G. M. Sp.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne I. 40. Blackw. t. 570. Plenck t. 210. Bull. t. 147. Oed. Fl. Dan. t. 1154.*)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Phellandrii s. Foeniculi aquatici) besteht aus einem walzigen, röhrligen, gestreiften, ästigen Stängel mit dreifach gefiederten, glatten Blättern, deren Blättchen in lange, schmale, liniensförmige Lappchen getheilt sind.

Der Saame ist eiförmig, länglich, auf einer Seite eben, auf der andern gestreift, von den Kelchresten und den Griffeln getrennt, bräunlich oder grünlichgelb.

Der Geruch ist unangenehm, stark, durchdringend, der Geschmack gewürzhaft und etwas bitter.

Kartotisch, aufregend, harntreibend. — Gabe, vom Pulver der Saamen, zehn bis zwanzig Gran täglich drei Mal.

Pulvis ex Phellandrio aquatico gummatius. (B.)

℞. Seminum Phellandrii scrupulum unum.

Gummi Arabici . drachmas duas.
Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei Scropheln und scrophulöser Schwindsucht.

Pulvis ad catarrhum s. anticatarrhalis. (*Au. Sm.*)

℞. Seminum Phellandrii drachmam unam.

Salep,
Gummi Arabici,
singulorum unciam unam.

Sacchari Lactis . unciam duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel in einem Glase Zuckerwasser, drei oder vier Mal täglich, bei chronischen Catarrhen. (*Sm.*)

Au. Phellandrii grana quinque, Gummi octo, Nitri sex et decem Sacchari — Gabe, dreimal täglich zu wiederholen.

Emulsio ad catarrhum s. anticatarrhalis. (*Vm.*)

℞. Seminum Phellandrii unciam unam.
Gummi Arabici drachmam unam.

Contere, sensim affundendo
Aquaes unciam novem.
Gola, desideant, tum decantha et adde

Syrupi Sacchari . unciam unam.

Tinctura Phellandrii. (B*. *Au.*)

℞. Seminum Phellandrii semunciam.
Alcoholis unciam sex.

Digere per horas viginti quatuor et adde

Vini Muscat dicti . unciam sex.

Digerendo per duos dies continua.

Au. eandem formulam sed absque Vino Muscat.

Gabe, zehn bis sechzig Tropfen, bei Lungenwindsucht. — Von Martius als ein sehr wirksames Mittel betrachtet.

Decoctum pectorale in phthisi. (B.)

℞. Dulcamarae . . . drachmas duas,
Seminum Phellandrii drachmam unam.

Aquaes quantum sufficit

ad decocti unciam octo obtinendas, quarum colaturae adde

Emulsionis gummosae unciam duas,
Oxymellis simplicis unciam unam.

Morgens, auf zwei Mal zu nehmen.

Pitulae in bronchitide lenta. (B.)

℞. Seminum Phellandrii scrupulos tres.
Mercurii dulcis grana quatuor.

Fiant pilulae quindecim. — Gabe, drei Stück alle zwei Stunden bei chronischem Catarrh.

Phoenix.

Phoenix dactylifera, L.; Dattelpalme; Dattier (*Gal.*).

Ba. Br. Fer. Gal. HassP. His. Wir. *Be. Br. G. M. Sp. Z.*

Ein Baum (Dioecia Triandria, L.; Palmae, J.) Ostindiens, des nördlichen Africa's und des südlichen Europa's. (*Blackw. t. 202 Delile Egypt. t. 62. Dict. d. Sc. nat. VII. Lamk. III. t. 893. Fl. méd. III. 148. Bert. Bild. II. 43. f. 2.*)

Man wendet die Früchte, Datteln (Dactyli, Palmulae, Dattes (*Gal.*); Date (*Ang.*); Datto (B.); Dadel (*Bel.*) an. Es sind eiförmig, etwas längliche, gelbliche Steinfrüchte, welche unter einer dünnen, glatten Oberhaut ein saftiges Fleisch und von diesem umhüllt, einen fast holzigen Saamen oder Kern enthalten, welcher auf der einen Seite mit einer Längsfurche bezeichnet ist.

Erweichend, Brustmittel.

Pulpa, Conserva Dactylorum. (*Gal. Fi. T.*)

℞. Dactylorum quantum vis.

Aquae bullientis quantum sufficit.

Coque ut fructus molles reddantur et nucleis semotis, pulpam per crinium trajice, adde aquam decoctionis et totum blando calore ad aptam consistentiam consume.

Fi. ut conservam prunorum, quam vide.

Pasta Dactylorum. (Gal. T.)

℞. Dactylorum a nucleis liberatorum sesquilibram.

In frustula minora concisos coque in Aquae purae . . . libris decem per horam, donec facillime inter digitos conteri possint et cola decoctum. Dissolve

Gummi Senegalensis . . . libras sex in Aquae libris viginti et solutionem cola; misc eam cum altero liquore et adde

Sacchari albi . . . libras quinque. Albuminum in Aquae paxillo dilutorum . . . no. 5.

Coque, despumando et tunc ad tertiam partem consume; cola per linteam et vaporando ad syrupi spissi consistentiam redige, cui adde

Aquae Florum Aurantiorum uncias novem.

Evaporent ad extracti mollis consistentiam et in modulos chalcæos oleo obductos infunde ut balnei vaporis ope siccantur

T. Dactylorum libram unam et loco Aquae florum aurantiorum Tincturae Citri et Aquae Citri, singularum drachmas tres adhibet.

Phosphorus.

Phosphorus; Phosphore (Gal.).

1) Wie er im Handel vorkömmt.
Am. B. Ba. Bel. Bor4. Fem. HassP. Sar. Suec. C.

2) Gewinniget.

B. Bel.

℞. Phosphori venalis . quantum vis.

In saccum e tela confectum in Aquam frigidam immersum infundere, hanc pedentim calefac et simulac phosphorus mollis est factus eum leviter premendo per telam trajice; tunc penitus liqua in Aqua frigida et in tubos vitreos effunde, quos in Aquam puram in fundo lagenae charta nigrâ tectae immerge.

3) Bereitung im Ganzen.

A. An. Ba. Bor. Br. D. Ful. Gal. Han. Hass. O. Pol. Sax. Wir. Wür. Br. Sw. Vm.

A. Gewinnung des Phosphors aus Urin.

Br. Ful. Wir. Wür.

℞. Salis Ammoniaci pulverati

libras duas.

Mini libras quatuor.

Destillent in cucurbita vitrea, serva productum, caput mortuum reponere et hujus libras tres in ollam ferreamingere continentem

Urinae per sex septimanas putrefactae et ad mellis consistentiam inspissatae . . . libras decem.

Carbonis pulverati . . . semilibram.

Agita mixturam, donec in pulverem nigrum, nullum urinae odorem emittentem redacta sit; imple ea tres quadrantes cucurbitae fictilis vernice obductae, et adaptato recipiente aliquanto supra dimidium capacitatis Aqua repleto, destilla, ignem sensim augendo; phosphorum guttatim in aquam destillantem collige. (Br. Wür.)

℞. Salis urinae ex urina ad mellis consistentiam inspissata crystallisatione obtenti . . . partes octo.

Carbonis pulverati . . . partem unam.

Destillent ut antea. (Ful. Wir.) —

Dieses Verfahren wird nicht mehr angewendet.

B. Gewinnung desselben aus Knochen.

A. An. Ba. Bor. D. Fer. Gal. Han. Hass. O. Pal. Sax. Br. Sw. Vm.

℞. Ossium Mammalium ad alborem calcinatorum et pulveratorum partes duodecim.

Dilue in cupa lignea Aquae ea quantitate ut puls spissa obtineatur, cui sensim adde

Acidi sulphurici (66°)

partes decem, baculi ope agitando. Magmati novam Aquam infunde ut fiat puls liquida, quam per horas viginti quatuor depositam cum Aqua bulliente supra telam arcte textam tene, donec liquidum saporis expers transeat; aqua in lebete cupreo evaporatâ praecipitatum lava et aquam lotionis cum priore commisce; tunc toto ad syrupi consistentiam evaporato adde Carbonis pulverati partem quartam et calefac ad ruborem fere in pelve ferrea ita ut perfecte siccetur; hac mixtura retortam arenaceam pro tribus quadrantibus repletam in fornacem lectum gulea instructum colloca; cujus collo vas cupreum est adaptatum in tubum extensum, qui obturaculum subereum penetrans in lagenam vitream ad dimidium fere Aqua repletam immergit; destilla leni igne ita ut retorta post horam denum rubescat; phosphorum qui in recipientem transit collige et sub aqua fervida 45° per pellem rupicaprae cola.

Eine der kräftigsten Heilmittel, ein sehr gefährliches Gift, und ein Aphrodisiacum, wie behauptet wird, welches nur mit der äußersten Vorsicht angewendet werden darf und besser aus der Materia medica, als inneres Arzneimittel wenigstens, ganz ausgeschlossen würde. — Gabe, einen viertel bis einen ganzen Gran täglich.

Phosphorus pulveratus. (Han.)

℞. Phosphori . . . drachmam unam.
In lagenam unciarum trium capacem immisso superfunde

Aquae unciam unam.

Calefac lagenam in Aquam bullientem immergendo. Simulac phosphorus liquefactus est, lagenam fortiter agita. Pulverem filtro impositum deinde sicca.

Emulsio phosphorata. (B*. Au. T.)

℞. Phosphori grana duo ad quatuor.
Olei Amygdalarum dulcium unciam unam.

Digere et dissolve, tunc cum

Amygdalarum dulcium excorticatorum no. 3,

Gummi Arabici semuncia,

Aquae communis unciis tribus vel quatuor,

Syrupi Althaeae emulsionem para. — Gabe, einen halben oder ganzen Eßffel, je nach der Menge des Phosphors.

Linctus Phosphori. (T.)

℞. Phosphori sub Aqua fusi grana duo.

Cum Saccharo, Vitello Ovi et Olei Amygdalarum dulcium modica quantitate looch para. — Wird wie die Emulsion angewendet.

Potio phosphorata. (B*. Au. E.)

℞. Phosphori grana duo.

Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit.

Aquae fontanae semilibram.

Fiat emulsio, cui adde

Syrupi Amygdalarum unciam unam.

Liquoris anodyni Hoffmanni guttas triginta.

Gabe, alle zwei Stunden einen Eßffel.

℞. Essentiae Terebinthinae semidrachmam.

Olei Olivarum drachmas tres.

Phosphori grana duo.

Aquae bullientis quantum sufficit.

Gummi Arabici semunciam.

Aquae aromaticae cujuslibet uncias quatuor.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Misce. (Au.)

℞. Phosphori grannũ unum.
Olei animalis Dippelli drachmam unam.

— essentialis Caryophyllorum scrupulum unum.

Gabe, zwei bis drei Tropfen, Morgens und Abends, bei paralytischer Amaurose, Gesichtschmerz und chronischem Rheumatismus. (Au.)

Alcohol phosphoratus. (Br.)

℞. Alcoholis uncias octo.

Phosphori minutim concisi grana octo.

Contere in mortario vitreo, donec alcoholi saporem suavem perdidit, et decantha.

Aether phosphoratus.

1) Nit aether phosphoricus.

Aether phosphoro-phosphoricus, Phosphorus liquidus. (Sw*. Vm.)

℞. Phosphori partem unam.

Aetheris phosphorici (60°) partes sexaginta.

Agita fortiter ad dissolutionem perfectam usque. (Vm.)

℞. Phosphori grana quatuor.

Olei essentialis Caryophyllorum guttas sedecim.

Aetheris phosphorici semunciam.

Dissolve blando calore, in vase clauso. (Sw*.)

℞. Phosphori scrupulum unum.

Ammonii subcarbonici semiscrupulum.

Contere in mortario cum aethere phosphorico humectato, mixturae in lagenam immisae infunde

Aetheris phosphorici uncias duas et dimidiam.

Agita ad perfectam solutionem usque. (Sw*.)

2) Nit Aether sulphuricus.

Aether sulphuricus phosphoratus, Naphtha Vitrioli phosphorata. (An. B*. Bor4. D. Gal. Han. Au. Br. Ca. Pie. T.)

A. Formel von Boultaz; oder Pelletier.

℞. Aetheris rectificati uncias quatuor.

Phosphori puri grana viginti octo.

Dissolve. (An. Ca.)

Gal. Phosphori drachmas duas cum

dimidia et Aetheris libram unam; —

B* Phosphori grana quatuor et Aetheris

semunciam; — Bor4. Phosphori

grana sex, Aetheris unciam unam; —

Br Phosphori grana octo et Aetheris

uncias octo; — D. et Han. Phosphori

grana sedecim et Aetheris uncias duas;

Au. Phosphori grana duo et Aetheris

drachmas duas; — *T. Phosphori scrupulum unum, Aetheris uncias quatuor.*

B. Formel von Flittner.

℞. Phosphori grana viginti quatuor.
Olei essentialis Caryophyllorum
drachmas tres.

Solutioni adde

Aetheris sulphurici
drachmas viginti et unam.

Misce bene. (B*.)

Pic. Phosphori grana tria, Olei Caryophyllorum guttas duodecim et Aetheris semunciam.

C. Formel von Eoebenstein-Eoebel.

℞. Phosphori grana duo.
Olei Menthae piperitae scrupulum
unum ad semidrachmam.

Solutioni adde

Aetheris sulphurici semunciam.
Misce sedulo. (B*.)

℞. Phosphori grana tria.
Aetheris sulphurici semunciam.
Olei essentialis Valerianae
guttas decem.

Misce bene. (Au.)

Sine Unze reiner Aether löst sechs Gran Phosphor auf.

Gabe, zwei bis vier Tropfen auf Zucker, in vierundzwanzig Stunden und täglich um zwei oder drei Tropfen gestiegen.

Tinctura Salis Tartari phosphorata.
(Vm.)

℞. Tincturae Salis Tartari

quantum vis.

Calefac leviter in balneo arenae et inmitte in frustulis parvis

Phosphori quantum sufficit
donec hic non amplius dissolvatur; se-
pone per aliquot tempus et decantha.

Mixtura Chinae phosphorata, Potio ex-
citans. (Au.)

℞. Aquae Cinnamomi uncias tres.
Extracti Chinae semunciam.

Phosphori in Aethere sulphurico
soluti grana tria.

Syrupi Corticum Aurantium
uncias tres.

Gabe, alle zwei Stunden einen Eßffel.

Linimentum phosphoratum. (Fer. Ca.)

℞. Phosphori concisi grana triginta.
Olei Amygdalarum dulcium

libram unam.

Dissolve leni calore et post refrige-
rationem cola. (Ca.)

Fer. Phosphori grana duodecim et
Olei uncias quatuor.

*Bei rebellischen Rheumatismen, Lähmung
und Atrophie. — Gabe, eine halbe bis
eine Unze auf jede Einreibung.*

Pharmacopoea universalis. II.

Linimentum phosphoratum camphora-
tum. (B. Han. Au. Ca. Vm.)*

℞. Phosphori grana decem.
Camphorae scrupulos duos.
Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.

Dissolve (B*. Han.)

Vm. Phosphori scrupulum unum,
Camphorae scrupulos quatuor et Olei
Amygdalarum dulcium unciam unam;
— Au. Phosphori grana tria, Campho-
rae sex et Olei Amygdalarum dulcium
drachmas duas.

℞. Phosphori grana sex.
Olei Amygdalarum dulcium
unciam unam.

Contere exacte, digere in balneo
aquae et adde

Camphorae,
Ammoniaci liquidi,
singulorum grana decem.

Misce. (Ham. Au.)

℞. Essentiae Terebinthinae
uncias duas.

Camphorae drachmas duas.

Ammonii carbonici pyro-oleosi
drachmam unam.

Saponis medicinalis uncias duas.

Phosphori in Olei Caryophyllorum
guttis duodecim ad quindecim

dissoluti granum unum.

Misce sedulo. (B*. Au.)

Unguentum s. Pomatum phosphoratum.
(Gal. Ca. T.)

℞. Phosphori purissimi partes viginti.
Axungiae Porci partes mille.

Aquae partes centum.

Coque ad dissolutionem phosphori
usque et donec aqua penitus evapora-
ta sit; filtra per chartam griseam et
adde, si vis, Olei essentialis Lavandu-
lae partem unam. (Gal. Ca.)

T. Phosphori grana decem, Axun-
giae uncias viginti, Aquae destillatae
uncias duas et aliquot guttas Olei Spi-
caee vel Bergamottae.

Oleum phosphoricum s. phosphoratum.
(Bor4. T.)

℞. Phosphori in globulos parvos di-
visi et bene siccati
scrupulos quatuor.

Ingere in mortarium porphyreum
cum duplo vel triplo Vitri contusi et
puri vel arenae? lotae et siccatae, in-
funde sensim Olei Olivarium calidi
50 — 60° C. libras duas, tritura per
momenta aliquot, sepone in amplo va-
se, ut subsideat et decantha. — Neu-
ßerlich zu zwei oder drei Scrupel bis eine
halbe Unze, bei chronischen Rheumatismen
eingerieben.

Bor4. Phosphori grana duodecim in phialam immitte, Olei Amygdalarum recenter parati unciam unam continentem, quam in aquam calidam immerge, donec phosphorus liquatus sit. Tum vas agitur, donec phosphorus solutus appareat. Oleum refrigeratum a phosphoro forsan secreto caute decantha.

Oleum phosphoratum. (Au.)

R. Phosphori grana duo.
Olei Hyoscyami infusi semunciam.

Extracti Chamomillae uncias duas.
Aquae Menthae piperitae

Gabe, alle zwei Stunden einen Eßfel.
Oleum phosphoratum aromaticum. (Ma.)
Nach Escot:

R. Phosphori unciam unam.
Olei Olivarum libram unam.
Repositis temperatura communi in loco obscuro per dies quatuordecim Oleum essentialis Bergamottae adde. — Gabe, fünfundzwanzig bis dreißig Tropfen in vierundzwanzig Stunden in einem Trank. (Ma.)

Phytolacca.

Phytolacca decandra, L.; Americanische, gemeine Kermesbeere; Phytolaque à dix étamines, Raisin d'Amérique, Morelle en grappes, Herbe de la laque, Méchoacan du Canada (Gal.); American pokeweed, Garget, American night shade (Ang.); Fitolacca, Herba Camin (His.); Tienmannige lackplant (Bel.); Pianta lacca (I.).

Am. Br. Gal. His. R. Wir. C. M. Sp. 4 (Decandria Digynia, L.; Atriplicaceae, J.) Eine in Nordamerika einheimische, im südlichen Europa gebaute Pflanze. (Blackw. t. 515. Bigel, Am. med. bot. I. t. 3. Zorn 1c pl. t. 164.)
Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Phytolaccae s. Solani racemos) ist dick, fleischig und in mehrere dicke Fasern getheilt.

Das Kraut besteht aus einem walzigen, ästigen Stängel und vier bis fünf Zoll und mehr langen, abwechselnden, glatten, eirunden, lanzettigen, kurzgestielten Blättern. Es hat einen sehr scharfen Geschmack.

Nach Hayward kann die Wurzel, zu einem Scrupel, die Specacuanha sehr gut ersetzen. Das Extract der Wurzel ist äußerlich bei offenem Krebs gerührt worden. Den Fußguß hat man bei Rheumatismen und Hämorrhoiden empfohlen.

Unguentum Radicis Phytolaccae. (B)*

R. Radicis Phytolaccae pulveratae unciam unam ad duas.

Axungiae Porci libram unam.
Misce. — Hayward rühmt diese Salbe bei scabies und hartnäckiger tineä. Sie erregt oft Hitze und Rötze der Haut; man muß alsdann Waschungen anwenden und die Einreibungen weglassen.

Pila marina.

Sphaera marina, Sphaera thalassia, Halogonium rotundum; Seeballen, Meerfugeln; Pelote de mer (Gal.).

Wir. Sp.

Mit diesem Namen bezeichnet man leichte, rundliche, platte oder längliche, geruch- und geschmacklose Massen, in denen man Hirsin, Haare, und oft Ueberreste von Muschelschalen unterscheidet und die man an den Küsten des Oceans und des Baltischen Meers findet.

Man hält sie mit Spielmann für Knäuel von Wurzel der *Zostera marina*, L. 4 (Monoclea Monandria, L.; Arcideae, J.), einer in den genannten Meeren sehr häufigen Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 15.)

Cavola will in der Asche der *Zostera* Tod gefunden haben, woraus sich erklären ließe, wie man diese Seeballen unter die Mittel gegen den Kropf hat zählen können.

Pimpinella.

Unter diesem Namen kommen verschiedene Pflanzen in Anwendung:

1) *Pimpinella Saxifraga, L.*; Pimpinell, Bibernell, Rossbibernelle, Steindibernelle, Hochspeterlein; Boucage à feuilles de pimprenelle (Gal.); Snull barnett saxifrage (Ang.); Bedznik (-); Steenbrekke, Quae-seurt, Bergroed, Pimpinelle (D.); Pimpinella blanca (His.); Kleine Bevernell (Hel.); Pimpinella bianca (I.); Budruzyniec (Pol.); Pimpinella branca (Lus.); Backrot (Succ.).

A. Ams. An. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sar. Sax. Wir. Witr. WW. Be. M. Pid. Sp.

4 (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze (Jacq. Austr. IV. t. 395. Hayne VII. 20. Blackw. t. 472. Plenck t. 221. Dü-s. off. Pfl. X. t. 17.)

Man wendet die Wurzel (radix Pimpinellae albae s. nostratis s. umbelliferae s. hircinae s. Tragoselini) an; sie ist lang, walzig, fast spindelförmig, etwas faserig, ringförmig gestreift; außen gelblich-grau, inwendig weiß. Sie hat einen starken, dockartigen, Niesen erregenden Geruch und einen bitteren, scharfen und brennenden Geschmack.

2) *Pimpinella magna*, L.; schwarze Bibernell, Blauwurzel; Boucage élevé (Gal.).

Gal. Wir. Be. M. Sp.

4 Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Jacq. Austr. IV. t. 396. Blackw. t. 472 Hayne VII t. 21.)

Man wendet die Wurzel (radix Pimpinellae nigrae s. Tragoelini majoris s. Dauci cyanopti) an; sie ist lang, fingerdick, am Ende ästig, außen fast schwarz, innen bläulich. Sie hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch, und einen scharfen, brennenden, aromatischen Geschmack.

Beide Pflanzen haben dieselben Eigenschaften; sie sind reizend, schweißtreibend und schmelzend. — Gabe des Pulvers, zehn bis zwanzig Gran.

3) *Poterium Sanguisorba*, L.; Bibernelle; Pimprenelle commune (Gal.); Smal burnet (Ang.); Pimpinelle (D.); Pimpinella (His. I. Lus.); Pimpernelle (Bel.); Pimpernella (Succ.).

Br. Fer. Gal. His. Wir. Wür. Be. Br. M.

4 (Monoecia Polyandria, L.; Rosaceae, J.) Eine Pflanze des südl. Europa's. (Hayne VIII. t. 23.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Pimpinellae minoris s. hortensis s. rubrae s. italicae) ist dick, langgestreckt, rötlich und in mehrere Faseren getheilt.

Das Kraut besteht aus einem kantigen, wenig ästigen Stängel, welcher besonders unten gefiederte Blätter mit schwach behaarten Stielen trägt, deren Blättchen, eiförmig bis einundzwanzig, rundlich oder eiförmig, glatt und sehr tief gezähnt sind. Der Geruch ist schwach und gewürzhaft, der Geschmack abstringierend und schwach bitter.

4) *Sanguisorba officinalis*, L.; Blutkraut, Blutwurzel, Biesenknopf; Pimpernelle des prés, Sanguisorbe (Gal.); Great burnet (Ang.); Pimpinelle (D.); Pimpinella (His.); Bloed kruid (Bel.); Pimpinella maggiore (I.); Sanguisorba (Lus.); Blodaert (Succ.).

Br. Gal. Wir. M.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 184.)

Man wendet die Wurzel (radix Sanguisorbae s. Pimpinellae italicae) an: sie ist ästig, außen rötlich braungelb, innen gelblichweiß, geruchlos und styptisch.

Ehedem hielt man sie für ein Wundmittel.

Infusum Pimpinellae. (BorC.)

℞. Radicis Pimpinellae albae sesquinoiam.

Aquae bullientis, sesquilibram. Infunde per horae quadrantem in vase tecto et cola.

Extractum Pimpinellae albae. (Bor. Bor4. Pa. Pol. Wir.)

℞. Radicis Pimpinellae albae libram unam. Aquae bullientis, libras sex.

Macera per tres dies, tunc coque leviter, cola exprimendo et liquorem probe inspissa. (Pal.)

℞. Radicis Pimpinellae albae, Alcoholis, singulorum libras duas. Aquae communis libras novem. Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholium destillando extrahere et quod restat, ad extracti consistentiam inspissa. (Pal.)

Bor. et Sax. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae.

℞. Radicis Pimpinellae albae libram unam. Alcoholis libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo; digere, tunc coque parumper residuum cum Aquae libris tribus; clarifica decoctum albuminis ope, liquorem commisce et alcoholium destillatione separato, quod remanet ad extracti consistentiam consume. (Wir.)

Bor4. Pimpinellae libram unam cum Spiritus Vini rect. libris quinque per horas 36 ad 48 digerere, exprimere, filtrare et seponere, residuo infundere Aquae communis fervidae libras decem et per 36 ad 48 horas seponere, exprimere, liquori modico calore ad tertiam partem reducto et refrigerato Spiritum Vini rectificatum admiscere, quandiu inde turbatur, seponere deinde, decantare, Spiritum Vini elicere, et residuum in balneo vaporis ad extracti absinthii spissitudinem evaporare.

Tinctura s. Essentia Pimpinellae albae. (A. B*. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Succ. Wir. Sw.)

℞. Radicis Pimpinellae albae concisae unciis quinque. Spiritus Vini rectificati vel rectificatissimi libras duas.

Post sufficientem extractionem exprime et filtra. (B*. Bor. Bor4. Han. O. Pol.)

A. et Succ. Radicis unciis duas et Alcoholis (0,910) libram unam; — Br. D. Pal. et Wir. Radicis partem unam et quinque Alcoholis; — Sw. Radicis duas cum dimidia et sex Alcoholis; — Ful. Li. et Sax. Radicis unam et quatuor Alcoholis; — HassP. Radicis un-

cias quatuor, Spiritus rectificati libras duas.

Reizend, schweißtreibend, giftwidrig, harntreibend, einschneidend, reinigend und besonders bei catarrhalischen Halsleiden empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen und noch weit mehr.

Tinctura s. Essentia Pimpinellae albae kalica. (Hass. Pid.)

R. Radicis Pimpinellae albae uncias tres.
Kali subcarbonici drachmam unam.
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Post sufficientem digestionem exprime et filtra.

Reizend, schweißtreibend, harntreibend und einschneidend. — Gabe, zwanzig bis sechzig Tropfen.

Tinctura Pimpinellae composita, Mistura resolvens. (Sw.)

R. Tincturae Pimpinellae albae, — Antimonii alcalisatae, singularum uncias quatuor

Digere per aliquot dies, saepius agitando; cola et adde colaturae

Tincturae Succini aetherae uncias duas.

Saponis medicinalis unciam unam. Dissolve.

Reizend, bei chronischen Catarrhen, Nierenentzündung von Steinen, Gelenkrheumatismen, Vobagra und manchen Hautkrankheiten geprüft. — Gabe, von zwanzig Tropfen bis zu einer Drachme, zwei oder drei Mal täglich, in einem passenden Vehikel.

Species pro decocto vulnerario s. vulnerariae. (Pal. Wir. Sp.)

R. Radicis Pimpinellae, — Ari maculati, singularum unciam unam.

Herbae Saniculae, — Pyrolae, — Hederae terrestris, — Veroniceae,

Summitatum Gentaurii minoris, singularum semunciam.

Concisa misce. (Wir.)

R. Herbae Alchemillae, — Agrimoniae, — Bugulae, — Consolidae majoris, — Bupleuri, — Pimpinellae albae, — Plantaginis, — Pulmonariae arboreae, — Virgaureae, — Urticae, singularum unciam unam.

Radicis Consolidae majoris, — Rhapontici, — Tormentillae, singularum libram unam.

Concisa misce. (Pal.)

R. Radicis Inulae, — Consolidae majoris, — Tormentillae, — Vincetoxici, singularum semunciam. — Liquiritiae drachmas sex.

Herbae Alchemillae, — Saniculae, — Plantaginis, — Auriculae muris, — Hyperici, — Agrimoniae, — Pimpinellae, — Bugulae, — Virgaureae,

Florum Bellidis minoris, singularum semunciam.

Seminum Foeniculi drachmas sex.

Concisa et contusa misce. (Wir. Sp.)

P i n u s .

In den Pharmacopöen werden folgende beide Arten dieser Gattung angezeigt:

1) *Pinus Pineae*, L.; Pinienbaum; Pin à pignons (Gal.); Cultivated pinetree (Ang.); Domacy borowice (B.); Spansk syrt (D.); Pino alvar (His); Tamme pynboom (Bel.); Pino sativo (I.); Pinheiro manso (Lus.); Spansk tall (Succ.). Br. Fer. Gal. Wir. Br. G. M. Sp. Z. Ein Baum (Monoclea Monadelphia, L.; Coniferae, J.) des südlichen Europa's. (Nouv. Duh. V t. 72, bis fig. 3. et t. 75. Blackw. t. 189. Plenck t. 679. Dict. d. Sc. nat. Cah. VII.)

Man wendet die Samen, Pinienüsse (nucis s. nuclei Pineae s. Pini s. Pineoli); Pignons doux (Gal.) an; es sind holzige, bald harte und schwer zerbrechliche, bald weiche und leicht zu zerbrechende Knospe, welche eine längliche, platte, an einem Ende dickere, ungefähr einen halben Zoll lange, und mit einem dünnen braunen Fellchen bedeckte Mandel enthalten, welche einen angenehmen Geschmack besitz. Sie kann die süßen Mandeln sehr gut ersetzen.

2) *Pinus sylvestris*, L.; gemeine Kiefer, Kiefer; Pin sauvage (Gal.); Wild pine (Ang.); Lesnj borowice (B.); Furs (D.); Pino (His. I.); Pyn (Bel.); Sosna parowa (Pol.); Pinheiro (Lus.); Tall, Furn (Succ.).

A. An. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Br. G. M. Sp. Z.

Ein Baum, welcher in einem großen Theile, besonders des nördlichen und gebirgigen Europa's gemein ist (Nouv. Duh. V. t. 66. Blackw. t. 190 Plenck t. 677. Schk. t. 380.)

Man wendet die Sprossen oder jungen Triebe (turiones s. strobili s. coni Pini) an, welche im Frühjahr am Ende der Zweige hervorkommen. Sie bestehen gewöhnlich aus fünf bis sechs seitlichen, um die Basis einer dickern, sechs Linien bis einen Zoll langen Endknospe herum sitzenden Knospen, welche mit rötlichen Schuppen bekleidet sind und von Harz strogen. Sie haben einen angenehmen, harzigen Geruch und einen bittern, schwach gewürzhaften Geschmack.

Reizend, antiscorbutisch.

Decoctum Turionum Pini. (B*.)

R. Turionum Pini manipulos tres. Aquae . . . sesquilibrium.

Coque per horae quadrantem in vase tecto; liquori refrigerato adde Vini albi aequalem quantitatem et post horas viginti quatuor exprime. — Gabe, zwei Unzen und mehr.

Emulsio nucleorum Pineae. (Gal.)

R. Nucleorum Pineae, Sacchari albi,

situgulorum unciam unam.

Contunde diu in mortario marmoreo, aquam sensim affundendo, ut fiat pasta mollis, quam dilue in

Aquae fervidae (40° R.) libra una. Cola exprimendo et adde

Aquae Florum Aurantiorum semunciam.

Piper.

Unter diesem Namen kommen in den Pharmacopöen vier verschiedene Pflanzen in Erwähnung:

1) *Piper nigrum*, L.; Pfeffer; Poivre commun (Gal.); Pepper (Ang.); Filfil uswud (Ar.); Czerny pepr (B.); Micha (Ba.); Hu-tseaou (C.); Gammiris (Cy.); Peper (Bel. D.); Kali mirchie (Duk.); Pimienta (His.); Miritch, Galmirch (Hin.); Pepe (I.); Maricha (Ja.); Kaly mirchingay (Mah.); Lada (Mal.); Sahan (Palembang); Filfil siah (Pe.); Pieprz (Pol.); Pimenta (Lus.); Perez (R.); Maricha (Sa.); Peppar (Succ.); Mellaghu (Tam.); Mirialu (Tel.).

A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

Ein Strauch (Diandria Trigynia, L.; Piperaceae, J.) Ostindien's. (Blackw. t. 348. Plenck t. 25. Fl. méd. V. 276.)

Man wendet die Früchte (baccae Piperis s. Piper) an; es sind runde harte Beeren von einem gewürzhaften, beißenden Geruch und einem scharfen, brennenden, beißenden, anhaltenden Geschmack. Weißer Pfeffer, Piper album, Poivre blanc (Gal.), nennt man sie, wenn das äußere Fellchen abgezogen ist, im Gegentheil, schwarzer Pfeffer, Piper nigrum, Poivre noir (Gal.). Im letztern Falle sind sie außen schwarz oder braun und bloß innen weiß.

Ihre Schärfe verdanken sie, nach Derstedt, einem crystallisierbaren eigentümlichen Stoffe, dem Piperin, Piperinum, Pipera, Pipérin (Gal.), welcher mit den Harzen Verwandtschaft hat

2) *Capsicum annuum*, L.; Spanischer Pfeffer; Poivre de Guinée, Poivre d'Espagne, Corail des jardins (Gal.); Guinea pepper (Ang.); Spansk peber (D.); Pimienta de Indias (His.); Jaarlykse spaansche peper (Bel.); Peperone (I.); Pieprz yca (Pol.); Pimentao da India (Lus.); Spansk peppar (Succ.).

Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Galm. Gen. Hass. HassP. Lou. LonN. Pol. RC. Sax. Wir. Wür. Be. Br. C. G. M. Par. Sp.

3) (Pentandria Monogynia, L.; Solanaceae, L.) Eine Pflanze Indiens, von woher sie nach America und Europa verpflanzt worden ist. (Kheede Malab. II. t. 35. Blackw. t. 129. Plenck t. 107. Schk. t. 47.)

Man wendet die Früchte (fructus Piperis indici, Piper indicum s. turcicum s. hispanicum) an; es sind trockne, sehr glatte, längliche, hell- oder gelblichrothe, blasige, zweifächerige Beeren von sehr verschiedener Gestalt, in denen sehr viele platte Saamen enthalten sind. Sie haben keinen Geruch, aber einen sehr bittern, scharfen und brennenden Geschmack.

Ihre Schärfe wird von einem eigentümlichen Alcaloi, dem Capsicin, Capsina, Capsinium, Capsicinum, hergeleitet.

Reizend, jedoch mehr in der Küche, denn als Arzneimittel angewendet.

Kindern gebet die Art gar nicht, sondern führt das Capsicum frutescens (Rumph. Amb. 5. t. 88. fig. 3.), Filfil achmar (Ar.); Tabia (Ba.); Moneschena (Can.); Gasmiris (Cy.); Lal mirchie (Hin.); Lombok (Ja.); Tamhudda mirchingay (Mah.); Lada mira (Mal.); Fullili surkh (Pe); Brahu maricha (Sa.); Mollaghai (Tan.); Merapaka'a (Tel.); ebenfalls aus Ostindien, an. Diese Pflanze hat dieselben Eigenschaften, wie die vorkergehende.

4) *Myrtus Pimenta*, L.; Neue Würze

Samaicanischer Pfeffer, Englisches Gewürz, Aelterleigewürz, Amömein, Reispfeffer, Wunderpfeffer; Poivre de la Jamaïque, Piment des Anglois, Toute-épice (Gal.); Pimenta, allspice (Ang.); Pimienta de Tabasco, Malaguetta (His.); Pepe garofanato (I.); Jamaica pepper (Bel.); Angielski ziele (Pol.); Krydd pepper (Succ.).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. His. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Suec. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.

Ein Baum (icosandria Monogynia, L.; Myrtaee, J.) der Antillen und Ostindien's. (Blackw. t. 353. Pienck t. 375. Desc. Fl. Ant. III. 215.)

Man wendet die Früchte oder Beeren (Piper Jamaicense s. Pimenta s. semen Amomi s. Piper Tabasco) an, welche man vor dem Reifwerden trocknen läßt; sie sind ruznlich, etwas größer als die Körner vom schwarzen Pfeffer, kugelig oder länglich, genabelt und dunkelbraun. Sie haben einen gewürzhaften Geruch und Geschmack wie von Pfeffer, Zimmt und Nelken.

4) Piper longum, L.; langer Pfeffer; Poivre long (Gal.); Pepe lungo officinale (I.).

An. Br. Du. Ed. Fer. GalM. His. Lon. LonN. RC. Wir. Fl. G. M. Sp.

Ein rankender Strauch (Diandria Trigynia, L.; Urt. ceae, J.) Ostindien's. (Blackw. Herb. t. 356. 343. Pienck t. 26.)

Die Frucht (Piper longum) ist eine, einige Zoll lange, walzige, grauliche, außen chagrinartige Kugel von der Dicke einer Federhute, welche innen in mehrere kleine Fächer getheilt ist, deren jedes einen runden Saamen enthält. Der Bruch ist schwärzlich und an den Rändern harzig, innen graulich und saferig; der Geschmack ist scharf brennend und etwas bitter.

Sie enthält, nach Dulong, dieselben Bestandtheile, als der schwarze Pfeffer.

Essentia Piperis, Tinctura Piperis nigri. (Br.)

R. Piperis nigri . . . partem unam.
Alcol's . . . partes sex.
Post sufficientem extractionem filtra.
Reizend.

Tinctura Capsici s. Capsici annui. (Am. B*. Bor. Bor4. Han. Lon. LonN. C. E. Vm)

R. Piperis indicii . . . unciam unam.
Alcoholis (0,930) . . . octarios duos.
Digere per dies quatuordecim et filtra. (Am. Lon. LonN. C. E.)

B*. Capsicii semunciam et Alcoholis libram unam; — Bor. Bor4. et Han. Capsici uncias duas et unam libram Alcoholis; digestionem per triduum

Bor4.; — Vm. Capsici partem unam et Aquae Vitae decem.

Reizend. — Gabe, eine bis drei Drachmen. — Man wendet diese Tinctur bisweilen in Surgelwasser, mit der doppelten Menge Wasser verdünnt, an.

Tinctura Capsici et Cantharidum. (Am. B*. C.)

R. Cantharidum . . . drachmas decem.
Piperis Jamaicae . . . drachmam unam.

Aquae Vitae . . . octarium unum.
Digere per dies decem et filtra

Ein in hohem Grade reizendes Mittel, welches man besonders bei branbigen Uebeln empfohlen hat, und welches man auch innerlich zu zehn Tropfen in Gummaauflösung oder Eiseischabkothung geben könnte.

Essentia stomachica polychresta Gundersheimeri, Tinctura stomachica. (Wir. Sp)

R. Piperis Hispanici . . . unciam unam.

— nigri,
— albi,
— longi.

singulorum drachmas duas.

Liquoris Kali acetici,
Alcoholis ammoniacalis,
singulorum uncias sex.

Digere et filtra (Sp.)

Wir. Cardamomi minoris drachmas decem addit.

Reizend, als aufblösend bei Cachexien und Wasserfuchten gerühmt. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen.

Tinctura stomachica acuta Ernstingii. (B*.)

R. Piperis Hispanici . . . unciam unam.

— nigri,
— albi,
— longi,

Granorum Paradisi,
Cinnamomi;
Zingiberis,
Radiciis Calami,
Polii Cretici,

singulorum semunciam.

Liquoris Kali acetici uncias duas.

Alcoholis . . . uncias viginti.

Digere in loco calido per dies aliquot. — Diese Tinctur unterscheidet sich wenig von der vorhergehenden.

Tinctura Pimentae sulphurica, Tinctura Piperis Jamaicae aetherea. (Sw.)

R. Piperis Jamaicae . . . uncias tres.
Alcoholis . . . uncias quindecim.

Post quatuordecim dies infusionis colla et colaturae sensim adde

Acidi sulphurici uncias quindecim.

Reizend, bei Blennorrhoe und Krank-

heiten von Ntonie des Magens empfohlen.
— Gabe, zehn Tropfen zweimal täglich,
in einem passenden Vehikel.

Acetum Piperis Jamaicensis. (Vm.)

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Aqueae Vitae . . . partes quatuor.
Aceti albi partes octo.
Infunde frigide per septimanam et
filtra.

Acetum Piperis longi spirituosum. (Sw)*

℞. Piperis longi recentis et maturi
uncias duas.

Aceti albi,
Aqueae Vitae,

singulorum uncias duodecim.

Post aliquot dies filtra. — Reizend,
säulnißwidrig, bei bössartiger Bräune in
Gurgelwasser mit Chinablodung, bei Was-
serfucht und Gaderien empfohlen. — Ga-
be, zwei bis drei Drachmen täglich mehr-
mals in irgend einem aromatischen Wasser.

Aqua Piperis nigri. (Vm.)

℞. Piperis nigri contusi partem unam.
Aqueae . . . partes quindecim.
Destillent partes quinque.

Aqua Pimentae s. Piperis Jamaicensis.
(B. Bel. Du. Ed. Lon. LonN. Sw. Vm.)

℞. Piperis Jamaicensis libram unam.
Aqueae . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor destillent
octarii sedecim. (B. Bel. Du Sw)

*Vm. Piperis libram unam et octode-
cim. Aqueae; de-tillent librae sex; —
Lon. LonN. Pimentae libram dimidiam,
Aqueae quantum sufficit; macera per
horas 24, tum destillet conglus.*

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Aqueae . . . quantum sufficit
ad prohibendum empyreuma. Destil-
lent partes decem, producto adde Aqueae
Vitae uncias quinque.

*Aqua Pimentae s. Piperis Jamaicensis
vinosa, Spiritus Pimentae. (Bel. Du.
Ed. Ful. Gen. Lon. LonN. Wür. C.
Sw.)*

℞. Piperis Jamaicensis uncias tres.
Kali subcarbonici drachmas sex.
Vini Rhenani . . . libras tres.

Post aliquot dies destillent librae
duae. (Ful.)

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Vini generosi . . . partes octo.

Macera per duos dies et destilla. (Wür.)

℞. Piperis Jamaicensis
partem dimidiam.

Alcoholis 20° . . . partes octo.
Post sufficientem macerationem de-
stillent spiritus 19° indicans. (Bel.)

℞. Piperis Jamaicensis semilibram.
Aqueae Vitae . . . libras novem.

— purae . . . quantum sufficit
ut empyreuma prohibeatur. Destillent
librae novem. (Ed. C.)

Lon. LonN. Piperis uncias duas,
Aqueae Vitae octarios octo et Aqueae
quantum sufficit; destillent octarii octo;
— Du. Piperis uncias tres, Aqueae Vi-
tae octarios octo et Aqueae quantum
sufficit; destillent octarii octo; — Sw.
Piperis partem unam, Aqueae Vitae
quatuor et tres Aqueae; destillent par-
tes quatuor; — Gen. Piperis unciam
unam, Aqueae Vitae tres et Aqueae suf-
ficientem quantitatem; destillent librae
tres.

Oleum Piperis nigri s. piperinum. (Fi.)

In paratione Piperini obtinetur, vide
Piperinum,

*Oleum Pimentae aetherum; Aethere-
oleum Pimentae s. Piperis Jamaicensis.*
(Am. Br. Du. Ed. Gen. Lon. Pal. Sax.
Suec. Wür. C. T.)

℞. Piperis Jamaicensis quantum vis.
Aqueae . . . quantum sufficit.

Destillent. (Am. Du. Ed. Gen. Lon.
LonN. Suec C)

Sax. Piperis partem unam et quatuor
Aqueae; — T. Piperis partem unam,
Aqueae duplum; destillent dimidia pars
vel duae partes quintae liquidi adhi-
biti et cohobentur, donec quantitas re-
quisita obtenta fuerit.

℞. Piperis Jamaicensis libram unam.
Aqueae . . . libras sedecim.

Salis culinaris . . . uncias duas.
Post quinque ad sex dies destillent.

(Br. Pal.)
℞. Piperis Jamaicensis quantum vis.
Aqueae Piperis Jamaicensis

quantum sufficit.

Macera per horas duodecim, tum
destillent. (Wür.)

Pulvis aromaticus. (RC.)

℞. Seminum Cardamomi,
Radicis Zingiberis,

— Calami,
Piperis longi, vel

— nigri,
singulorum partes aequales.

Pulverata misce. — Bei Verdauungs-
beschwerden zc. — Gabe, zehn Gran bis
ein Scrupel und mehr.

Pulvis febrifugus. (B)*

℞. Piperis Hispanici . . . grana sex.
Baccarum Lauri scrupulos duos.

Fiat pulvis in tres partes dividendus.
— Man nimmt das erste Pulver bei Ein-
tritt der Kälte, das andere den folgenden
Tag um dieselbe Stunde und das dritte
den dritten Tag. — Bergius rühmt es.

Pilulae stimulantcs. (B. E.)*

℞. Piperis Hispanici drachmam unam.

Farinae secalis . grana quinque.
Aquaë . . . quantum sufficit.

Fiant pilulae duodecim. — Gabe,
ein Stück alle zwei Stunden, bei schwar-
zem Erbrechen und gelbem Fieber. (B*.)

℞. Piperis Cayennensis
drachmam unam.

Micae Panis,

Aquaë,

singularum quantum sufficit.

Fiant pilulae decem — Gabe, ein
Stück drei oder vier Mal täglich. (E.)

Boli febrifugi. (B.)

℞. Piperini . . . scrupulum unum.

Micae Panis . . . quantum sufficit.

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück
alle zwei Stunden. — Diese Bissen haben
oft keine Wirkung, wie Bretra anführt.

Trochisci excitantes. (Pie.)

℞. Piperis longi,

Nucis moschatae,

singularum semidrachmam.

Seminum Staphydis agriae,

Radici Pyrethri,

singularum scrupulos duos.

Sinapis,

Origani,

singularum scrupulum unum.

Mellis sufficientem quantitatem.

Gargarisma excitans. (B.)*

℞. Piperis Cayennensis semunciam.

Magnesia subcarbonicae

drachmam unam.

Aquaë bullientis,

Aceti destillati,

singularum uncias octo.

Diese Formel ist von Heady. — Cur-
rie wendete einen Aufguß von einem Gran
in zwei Unzen Wasser an; L'haie die mit
Wasser verdünnte Tinctur des Cayenne-
pfeffers.

*Pulvis ocyticus s. partum accelerans.
(Pie.)*

℞. Seminum Lavandulae

semidrachmam.

— Plantaginis,

— Endiviae,

singularum scrupulos duos.

Piperis . . . scrupulum unum.

Man giebt dieses Pulver in vier Unzen
Endivien- und ebensoviel Geißblattwasser,
um die Niederkunft zu erleichtern; auch
dient es in Einreibungen auf den Kopf,
zur Lötung des Ungeziefers.

*Electuarium stomachicum alterans s.
piperinum. (Sa. Sw.)*

℞. Piperis nigri,

Conservae Aurantiorum,

singularum unciam unam.

Syrupi Corticum Aurantiorum

quantum sufficit.

Misce. (Sa.)

℞. Radicis Calami,

— Galangae,

Piperis nigri,

singularum unciam unam.

Syrupi Corticum Aurantiorum

quantum sufficit.

Misce. (Sw.) — Addi potest Oxydi

Ferri nigri semuncia.

Bei Verdauungsbeschwerden oder gifti-
ger Cardialgie und Windcolik empfohlen.
— Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

*Electuarium s. Opiatum antihæmorrhoi-
dale s. anticachecticum. (Ca. Sw.)*

℞. Radicis Inulae,

Foeniculi,

singularum uncias tres.

Piperis nigri . . . unciam unam.

Sacchari albi,

Mellis, singularum uncias duas.

Misce. — Gabe, eine bis zwei Drach-
men zwei oder drei Mal täglich bei Hæ-
morrhoidalkatheter, Verdauungsbeschwerden
und Darmverschleimung.

*Unguentum Piperis nigri, Epithema ru-
befaciens. (B*. Du. Bo. C. Ca.)*

℞. Piperis nigri pulverati

uncias quatuor.

Axungiae praeparatae

libram unam.

Contere bene. (Du. C.)

℞. Salis culinæ,

Piperis nigri,

singularum libram unam.

Fuliginis cribrati . . . semilibram.

Sinapis pulverati . . . semunciam.

Vitellos Ovorum . . . no. 2

Axungiae Porci . . . libras duas.

Fiat unguentum. (Bo.)

℞. Saponis albi raspati

uncias sex et drachmas duas.

Olibani . . . drachmas quinque.

Piperis nigri,

Salis communis,

singularum drachmas tres.

Alcoholis . . . uncias septem.

Digere ad solutionem saponis usque,
tunc coque per sexagesimas aliquot,
spatulae ope agitando et supra linteum
extende. (B*. Ca.)

Alle diese Salben wirken hauttötend
und mehr oder weniger epipastisch.

*Cataplasma antipleureticum s. rubefa-
ciens. (Gal Bo. Ca. E. Pie.)*

℞. Piperis longi,

Zingiberis, singularum semunciam.

Albuminis Ovi

sufficientem quantitatem.

Misce sedulo. (Bo. Ca. Pie.)

- Rx.** Farinae Hordei leviter tostae uncias quatuor.
 Aceti fortis unciam unam.
 Albumina Ovorum no. 3.
 Aquae quantum sufficit.
 Supra stupas extende et consterne mixturam e
 Pulveris Piperis nigri,
 — Foeniculi,
 singulorum semuncia.
 Sogleich anzumenden. (Gal. Ca.)
Rx. Farinae Sinapis semilibram.
 Piperis nigri,
 Zingiberis,
 singulorum drachmam unam.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit
 ut fiat pasta mollis (E.)
Rx. Pulveris Piperis Cayennensis,
 — Cinnamomi,
 — Caryophyllorum,
 singulorum semunciam.
 Farinae,
 Vini, singulorum quantum sufficit
 ut fiat cataplasma. (E.)

- Emplastrum piperitum s. stimulan.*
Dropax antiparalyticum. (Au.)
Rx. Picis uncias duas.
 Galbani,
 Piperis nigri,
 singulorum drachmas tres.
 Olei Baccarum Lauri
 quantum sufficit.
 Plene empfahl es bei Lähmung.
Infusum Piperis Cayennensis. (E.)
Rx. Piperis Cayennensis
 sesquidrachmam.
 Aquae bullientis
 octarium dimidium.
 Eßfelweise zu nehmen.
Gargarisma piperitum s. excitans. (Au.)
Rx. Piperis Cayennensis semunciam.
 Magnesia subcarbonica
 drachmam unam.
 Aquae bullientis,
 Aceti, singulorum uncias tres.
 Heaßly empfiehl es bei sogenannter
 bösartiger Bräune.

Piperinum. (Pi)

- Rx.** Piperis nigri contusi libras duas.
 Alcoholis 35° libras quinque.
 Immitte piper cum alcoholis libris
 tribus in alembicum cupreum stanno
 obductum, quem post horas duodecim
 sepositionis in balneum aquae immer-
 sum ad ebullitionem usque calefac;
 tunc ab igne remotum et refrigeratum
 cola; residuo reliquas duas alcoholis
 libras infunde, itidem agendo; infusi-
 ones conjunctae filtrentur, tunc duo-
 trientes destillent; residuum in vas vi-

treum infusum, per aliquot dies tectum
 relinquatur, quo facto piperinum cry-
 stallisatum subsidet, et filtrando per
 chartam separetur; crystallis in filtro
 residuis infunde alcoholium purum frigi-
 dumque, post duos dies filtra, denuo
 alcoholium infunde piperino ut album
 obtineatur. Fluida haec cum priori com-
 mixta destillationi in vase vitreo sub-
 jiciantur ad pelliculae densae appari-
 tionem; infunde itidem in vas vitreum,
 ut per aliquot dierum lapsum novum
 piperinum praecipitatur pari modo cum
 alcoholie infundendum, e ductum quod
 obtinuisti intra chartam emporeticam
 sicca; in fluido superstitute oleum acre
 remanet.

Gabe, zwei bis zwölf Gran. — Das
 scharfe Del zuweilen von einem Ecrcupel
 bis zur Drachme.

P i s t a c i a .

Pistacia vera, L.; Pistazienbaum; Pi-
 stachier commun (Gal.); Pistachia tree
 (Ang.); Pistacy, Klokoeka (B.); Pista-
 ceira (His.); Pistache boom (Bel.);
 Pistacchio (I.); Fastuca (Sic.).
 Ba. Br. Fer. Gal. Gen. Wir. Be. Br.
 G. M. Sp. Z.
 Ein Baum (Dioecia Pentandria, L.;
 Tereb. ntheaceae, J.), welcher ursprünglich
 in Äßen einheimisch, aber im südlichen Eu-
 ropa angepflanzt ist. (Lamk. III. t. 311.
 fig. 1. 2. Plenck. t. 708. Dict. d. Sc.
 nat. Cah. 4. Blackw. Herb. t. 461.)

Man wendet die Saamen, Pistacien,
 Syrische Nüssen, Pimpernissen,
 Pistaciae, Pistaches (Gal.), an; sie sind
 eisförmig, länglich, röthlich, äußerlich run-
 zelig und enthalten einen öligen, hellgrün-
 nen, angenehm schmeckenden Kern.

Oleum Pistaciarum. (Gal. Sar.)

- Rx.** Pistaciarum mundatarum
 quantum vis.
 Contunde pistilli lignei ope in mor-
 tario marmoreo; pastam in sacco e
 tela confecto inclusam frigide exprime.

Emulsio pistaciarum. (Gal.)

- Rx.** Pistaciarum,
 Sacchari albi,
 singulorum unciam unam.
 Contunde diu, sensim Aquam affun-
 dendo, dilue pastam in
 Aquae calidae libra una.
 Cola exprimendo et adde
 Aquae Florum Aurantiorum
 semunciam.

P i x l i q u i d a .

Pix liquida nigra, Pissa, Pix Cedria, Ce-

dria, Resina Pini empyreumatica liquida, Terebinthina empyreumatica; Theer, flüssiges Pech; Goudron, Poix liquide (Gal.); Tar (Ang.); Tiore (D.); Teer (Bel.); Fjaera (Suec.)

Am. Ams. B. Bel. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. RC. Sax. Suec. Wir. *Be. C. Fi. G. Par. Sp.*

Eine schwärzlichbraune, zähe, fadenziehende, halbdurchsichtige Flüssigkeit, welche die Consistenz eines dicken Syrups, einen harzigen, brenzlichen Geruch und einen bittern harzigen Geschmack besitzt und den Speichel rosenfarbig braun färbt.

Man erhält sie durch langsame, trockene, unterwärtsgehende Destillation von Holzspänen verschiedener Zapfenbäume.

Es ist ein Gemisch von halbverbranntem Harz, empyreumatischem Del und Essigsäure.

Der Theer ist ein sehr kräftiges Reizmittel, welches mit zu mehreren Arzneimitteln kommt. Man hat ihn selbst allein, in Milch oder Bier, oder in Gestalt von Pillen, bei veralteter und hartnäckiger Krätze nehmen lassen. Die Engländer haben vor Kurzem den Dampf davon bei der Behandlung der Lungenschwindsucht empfohlen. Um ihn in Pillenform zu bringen, setzt man Schierlingspulver hinzu und man erhält so eine Masse, welche man in dreigranige Pillen theilt, von denen der Kranke anfangs nur eine nimmt aber dann täglich steigt, bis er auf vier und zwanzig Stück auf einmal gekommen ist.

Aqua picea s. Picis, Infusum Picis liquidum s. Picis empyreumaticae liquidae, Potio picea. (An. B*. Ba. Br. Du. Ful. Gal. Li. R. Sax. Suec. Wir. C. Ca. Fi. Ra. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

R. Picis liquidae . . . partem unam.
Aquae . . . partes quatuor.

Agita bene mixturam et post sepositionem per horae quadrantem ad duos dies decoantha liquidum supernatans. (Br. Du. Sax. Suec. C. Sa. Sp. Sw. Sy.)

B*. Picis liquidae partem unam et Aquae quinque; — Ba. Picis liquidae partem unam et sex Aquae (formula Berkeleyi); — Ful. Li et Wir. Picis liquidae partem unam et octo Aquae; — Fi. Picis libram unam et Aquae sex; aepositionem per dies quatuor, subinde agitando; — Gal. Picis liquidae quinque et sedecim Aquae; — Ca. et Ra. Picis liquidae partem unam, Aquae quadraginta octo et infusionem per septimanam.

R. Picis liquidae . . . partem unam.
Aquae partes sexaginta. quatuor.

Commisce triturando, vas deinde tectum calori lenissimo expone per diem unum et filtra. (Vm.)

R. Aquae . . . uncias viginti.
Tincturae Picis liquidae
scrupulum unum.

Instilla tincturam, guttas tres vel quatuor singula vice, in aquam, vas semper vivide agitando. (Vm.)

Man Mons führt die Bereitungsgart dieser Tinctur nicht an; es ist jedoch bekannt, daß der Theer in Alcohol aufbdestlich ist. Wahrscheinlich enthält die letztere Formel eine größere Menge empyreumatisches Del, als die vorhergehenden. in denen nur wenig enthalten ist, welches mittelst der Essigsäure sich darin auflöst befindet.

Früher galt dieses Mittel, nach des Bischofs Berkeley Ansicht, für eine Pannacee, heutzutage ist es fast vergessen. Es sollte gegen Scorbut, Blattern, Catarrh, Würmer nützlich, reinigend, alterirend, schweiß- und harntreibend seyn. Es reizt den Magen sehr heftig. — Gabe, für Kinder zwei bis drei Unzen, für Erwachsene ungefähr sechszeben Unzen. — Man kann, um es angenehmer zu machen, Zucker mit einigen Tropfen Muskatnußöl oder selbst Schwefeläther hinzusetzen.

Unguentum Picis liquidae. (Am. DD Du. Ed. Lon. LonN. RC. Suec. C. Sa.)

R. Picis liquidae,
Axungiae Porci praeparatae,
singularem libram unam.
Liquata per linteum cola. (Lon. LonN.)

Du. loco axungiae Sehum vervecinum indicat; — Am. Ed. et C. Ceram flavam adhibent prope ignem liquatam cum pice miscendam.

R. Farinae Secalis . . . libram unam.
Aceti . . . quantum sufficit.
Coque ad pastae consistentiam et adde Resinae Pini,
Picis liquidae,

singularem semilibram.
Stet mixtura super igne continue agitata, donec satis sit spissa. (Suec.)

R. Picis liquidae . . . uncias quatuor.
Butyri saliti rancidi uncias duas.
Kali subcarbonici unciam unam.
Misce triturando. (DD.)

R. Picis liquidae . . . libram unam.
Sulphuris . . . uncias quatuor.
Commisce unum post alterum cum Ceræ flavae fusae . . . uncia una,
Misce bene. (RC. Sa.)

Alle diese Salben sind bei Hautkrankheiten und besonders bei Kopfgrind angewendet worden.

Linimentum farinaceum cum Pice. (Au.)
R. Farinae Secalis . . . partes quatuor.

Gentianae pulveratae

partem unam.

Picis liquidae quantum sufficit.

Bei Scirbus, mit Guajacabkchung innerlich, gerührt.

Emplastrum Picis liquidae. (Han. Sax. Vm.)

R. Cerae flavae . . . partes sex.

Colophonii . . . partes tres.

Liqua et adde

Picis liquidae . . . partem unam.

Cola mixturam et ad perfectam re-
grationem usque agita. (Vm.)

Han. et Sax. Cerae partes octo, Resinae Pini unam et sedecim Picis liquidae.

Pilulae Picis. (Am. B. RC. Sar. C)

R. Picis liquidae . . quantum vis.

Radiciis Inulae quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum sex. (Am. B. C.)

R. Picis liquidae,

Balsami Peruviani,

singulorum semunciam.

Pulveris Liquiritiae unciam unam.

— Iridis Florentinae

drachmas tres.

Fiat massa pilularis. (Sar.)

Gabe, eine halbe Drachme, täglich zwei Mal. Man hat sie bisweilen bei Lungenschwindsucht angewendet.

R. Picis liquidae . . quantum v. s.

Pulveris Liquiritiae quantum satis ut fiat massa in pilulas granorum quinque dividenda.

Gabe, vier, sechs zwei- oder dreimal täglich bei Scorbit und Hautkrankheiten. (RC.)

Plantago.

Wir führen hier unter diesem Namen folgende Pflanzen an:

1) *Plantago Psyllium*, L.; Flohsaame; Herbe aux puces commune (Gal.); Clammy plantain, Fleeseed (Ang.); Chmelik hlessnjk (B.); Psilleurt (D.); Zaratana (His.); Vlookruid (Bel.); Pulicaria (I.); Pulgueira (Lus.); Loppfraegraes (Succ.).

Ams. An. B. Ba. Bor. Br. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. His. O. R. Wir. Br. M. Sp. Z.

© (Tetrandria Monogynia, L.; Plantagineae, L.) Eine Pflanze Aegypten's und des gemäßigten Europa's. (Hayne V. t. 17. Zorn 1c. pl. t. 115.)

Man wendet den Saamen (semen Psyllii s. Pulicariae) an; er ist klein, langgestreckt, dunkelbraun, glänzend, glatt, weich anzufühlen, auf einer Seite eben, auf der

andern gewölbt, geruchlos und von schleimigem, bitterem und scharfem Geschmack. Erweichend.

2) *Plantago Cynops*, L.; strauchartiger Wegerich; Herbe aux puces vivace (Gal.). Ba. Bel. Bor4.

4 Eine Pflanze Aegypten's und des südlichen Europa's. (bull. t. 363. Waldst. et Kit. Pl. Hung. t. 51. Hayne V. t. 16.)

Der Saame kann ganz wie der voriger Art angewandt werden. Erweichend.

3) *Plantago major*, L.; großer Wegerich, Wegtritt; Plantain commun, Grand Plantain (Gal.); Great plantain (Ang.); Vejbred (D.); Llanten major (His.); Groote weghblad (Bel.); Piantaggine maggiore (I.); Kanasch (Pers.); Labka (Pol.); Tanchagem major (Lus.); Popuschnik (R.); Grodblad (Succ.).

Ams. An. B. Bor4 Br. Fer. Gal. Gen. His. Lil. Wir. Be. C. Fi. G. M. Sp.

Eine in Europa überall wachsende Pflanze. (Hayne V. t. 13. Dict. d. Sc. nat. Cah. V. Fl. med. V. 275.)

Man wendet die Wurzel und die Blätter an.

Die Wurzel (radix Plantaginis majoris s. latifoliae, s. Arnoglossi s. Septinerviae) besteht aus einem harten, dicken, fast hölzigen, unten mit walzigen Fasern besetzten Ausläufer.

Die Blätter sind eiförmig, groß, stumpf, ledrig, an den Rändern eingebuchtet, glänzend und fast geruchlos. Sie haben einen krautartigen, etwas bitteren und schwach abstringirenden Geschmack.

4) *Plantago lanceolata*, L.; spitzer Wegerich; Plantain lanceolé, petit Plantain (Gal.); Ribwort (Ang.); Spids vejbred (D.); Smalblaadige weegbree (Ned.); Spets groblad (Succ.).

Fer. Gal. Wir. Sp.

4 Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Hayne V. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Plantaginis lanceolatae s. angustifoliae s. quinquenerviae minoris) ist fästlich und schwach abstringirend.

Das Kraut besteht aus einem Büschel lanzettförmiger, fünfrippiger Blätter.

5) *Plantago media*, L.; mittlerer Wegerich; Plantain moyen (Gal.); Hoary plantain (Ang.); Citrocel prostednj neb ssiroky (B.); Llanten medio (His.); Middelbaare weghree (Bel.); Piantaggine media (I.); Tanchagem mediana (Lus.); Stosskaemper (Succ.).

Per. Gal. Wür. Z.

2. Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Hayne V. t. 14. Oed. Fl. Dan. t. 581.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel ist schwach abstringirend. Das Kraut besteht aus lanzettigen Blättern und hat einen styptischen Geschmack.

Die drei letztern Pflanzen sind schwach abstringirend.

6) *Alisma Plantago, L.*; Froschlöffel, Froschwegerich, Wasserwegerich; Plantain d'eau (Gal.); Great water plantain (Ang.); Vard vegbreed (D.); Llantun aquatica (His.); Groote water wegbree (Ned.); Piantaggine acquatica (I.); Badkawodna (Pol.); Stoeckra (Suec.).

Br.

Eine Pflanze (Hexandria Pologynia, L.; Alismaceae, J.), welche in ganz Europa an den Ufern von Wassern wächst. (Fl. Dan. 561. Plenck t. 292. Schk. t. 102. Zorn Ic. pl. t. 213.)

Man wendete ehemals das Kraut (herba *Plantaginis aquaticae*) an; es besteht aus eirunden, langspizigen nervigen, glatten, ganzen Blättern von einem wässerigen, etwas scharfen Geschmack. Sie bewirken Reizung der Haut; Haller hat sie aber demungeachtet bei Hämorrhoiden empfohlen.

Die knollige Wurzel wurde vor einigen Jahren, in Rußland besonders, gegen die Hundswuth geschrieben. Man wendete das Pulver auf Butterbrod und zwar von einer einzigen großen Wurzel, oder von mehreren, wenn sie klein waren, an. Jedoch ist das Mittel wieder in Vergessenheit gekommen.

Mucilago Psyllii. (Gal. Sar. T.)

℞. *Seminum Psyllii* drachmas duas. *Aquae tepidae* . . . sesquinciunciam.

Digere per horas viginti quatuor super cinere calido, subinde agitando, et per linteum exprimendo cola. (Gal.)

Sar. Macerare per horas duodecim, tunc coquere jubet Sem unam partem unam in decem Aquae et exprimere; — T. ut mucilaginem *Seminum Cydoniorum*.

Conserva Plantaginis. (Wür.)

℞. *Herbae Plantaginis recentis et contusae* . . . partem unam. *Sacchari pulverati* . . . partes duas. Fiat pasta homogenea.

Succus Plantaginis. (Sar. Wür.)

℞. *Herbae recentis Plantaginis* quantum vis.

Contunde in mortario lapideo Aquae

pauillo humectando, exprime fortiter, succum ut subsideat seponere, decantha et in lagenis, cuique librae liquidi *Alcoholis drachmam unam* addendo, serva.

Sar. in balneo aquae clarificare jubet. — Gabe, zwei bis drei Unzen.

Syrupus Plantaginis s. Plantaginis majoris. (His. Wir.)

℞. *Succi expressi Plantaginis, Sacchari albi,* singulorum libras quatuor. *Aquae* . . . quantum sufficit. Clarifica et ad syrupi consistentiam coque. (His.)

℞. *Succi Plantaginis depurati et lenta super igne evaporatione ad dimidium redacti unciis novem. Sacchari albi* . . . unciis sedecim. Fiat syrupus. (Wir.)

Aqua Plantaginis. (Gal. Sar. Fi. T.)

℞. *Herbae recentis Plantaginis* partes quinquies mille. *Aquae partes duodecies mille et quingentas.*

Destillent circiter partes decies mille; infunde productum duplo *Herbae recentis*, adde *Aquae partes mille* et destillando denuo partes decies mille abstrahere. Operationem tertio repetere potes. (Gal.)

Sar. *Herbae partem unam et duas Aquae*; destillent trientes duo; — Fi. *Herbae libram unam, Aquae sedecim*; destillent librae sex; — T. ut *aquam florum Aurantiorum*.

Man setzt dieses Wasser zu auflösenden Augenwassern, es ist aber ganz ohne Wirkung.

Extractum Plantaginis. (Sar. Wir. Wür.)

℞. *Foliorum recentium Plantaginis* quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, *Aquae pauillum* adspargendo; exprime succum et statim in balneo aquae consume. (Wir.)

℞. *Foliorum Plantaginis* libram unam,

Aquae fontanae . . . libras sex. Digere per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam inspissa. (Sar. Wür.)

Fomentatio adstringens. (Sm.)

℞. *Foliorum Plantaginis* manipulos duos.

Petalorum Rosarum rubrarum pugillum unum.

Aquae semisextarios (demi - setiers) quinque.

Deoquo ad octarii remanentiam sub

finem calcem vivam volumine ovi gallinae addendo; ab igne remotum reponere, decantha et adde

Aquae Vitae . . . uncias quatuor.

Aqua Calcis vulneraria s. vulneraria. (Sar.)

℞. Herbae Plantaginis, z

- Saniculae,
- Hyperici,
- Pyroae,

singularum manipulum unum.

Calcis vivae . . . libras duas.

Calcem pulveratam supra herbas concisas conjice et per plures dies macera. Infunde deinde

Aquae purae . . . Ibras decem.

Post decem horas macerationis decantha et infunde denuo

Aquae Plantaginis libras decem.

Macera per horas duodecim et ambos liquores commisce. (Sar.)

Platinum.

Platina; Platina; Or blanc (Gal.).

Han. His.

Ein Metall, welches fast eben so weich als Silber, sehr glänzend sehr streckbar und leicht zu hämmern, sehr zäh, fast unschmelzbar ist und an der Luft sich nicht verändert. Die spezifische Schwere desselben ist 20,98.

Chloruretum s. Murias Platinæ. (B*.)

℞. Platinæ . . . quantum vis.

Aquae regiae . . . quantum sufficit ad solvendum metallum; solutio evaporata crystallationi subjiciatur

Man hat es bei der Behandlung der venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, ein Viertel: bis ein Gran, in Einreibungen auf das Zahnfleisch.

Oxydum Platinæ. (B*.)

℞. Solutionis aquosae Platinæ muraticae . . . quantum vis.

Natri depurati . . . quantum sufficit vel donec nullum amplius oritur praecipitatum, quod lotum siccetur.

Se nach der Gabe, Brechen oder Purgiren erregend.

Plumbum.

Saturnus; Μολυβδος; Blei; Plomb (Gal.); Lead (Ang.); Zohel Anuk (Ar.); Hin-yen (C.); Blye (D.); Schisch (Duk.); Plomo (His.); Sisa (Hin.); Bly (Bel.); Piombo (I.); Tamaetam (Mal.); Surb (Pe.); Olow (Pol.); Chumbo (Lus.); Swinez (R.); Sisaka (Sa.); Bly (Suec.); Etium (Tan.); Schischum (Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. C. Fi. G. Fid. Sp. T.

Ein verbessertes, bläulichweißes, weiches, glänzendes, nicht klingendes Metall, welches sich mit dem Nagel ragen, hämmern, jedoch mehr zu Blech schlagen, als zu Droht ziehen läßt, einige Zähigkeit besitzt, gerieben einen merklichen Geruch verbreitet, bei 322,22°C. schmelzbar ist und sich in einer höheren Temperatur verflüchtigt. Die spec. Schwere ist, nach Briffon, 11,3523.

Sulphuretum Plumbi, Aes ustum. (Ams. Fer. His. Sar. Fi. T.)

℞. Plumbi . . . quantum vis.

Liquato in cochleari ferreo Sulphur pulveratum per cochlearia adde, donec penitus in pulverem nigrum sit conversum, quod porphyrisatum serva. (Ams. His. T.)

Fer. Sar. Fi. T. laminarum Plumbi et Sulphuris in ollam fictilem strata immittere, hanc igni vehementi exponere et tunc residuum lavare et porphyrisare

Der Name Aes ustum, womit Ams. und Sar. dieses Präparat bezeichnen, ist unrichtig, und kommt nur dem Protoxyde zu.

Emplastrum Plumbi nigrum. (His.)

℞. Plumbi sulphurici,

Lithargyri,

singulorum uncias duas.

Cerussae,

Antimonii crudi,

singulorum unciam unam.

Olei Rosarum . . . libras tres.

Cerae albae . . . uncias novem.

Liqua ceram in oleo, adde substantias metallicas bene porphyrisatas, coque parumper et agita massam ad refrigerationem usque.

Chloruretum Plumbi, Murias s. Submurias Plumbi, Oxymurias Plumbi. (Sp. Vm.)

℞. Plumbi subacetatis liquidae

partem unam.

Aquae . . . partes tres.

Mixtis adde Sal commune in sex partibus Aquae dissolutum tandem donec nihil amplius praecipitetur; praecipitatum bene lotum siccata.

Besonders als Schönheitsmittel empfohlen, wobei jedoch Vorsicht nöthig ist.

Lac Plumbi. (Vm.)

℞. Salis communis partem dimidiam.

Disolve in Aquae quam minima quantitate; solutioni adde sensim

Extracti Saturni partem unam.

Praecipitatum collectum et bene lotum misce cum Emulsionis communis partibus duodecim.

Schönheitsmittel.

Protoxydum Plumbi.

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Lithargyrum, Lithargyrium, Lithargyrus, Oxydum Plumbi fustum s. semivitreum s. semivitreum; Bleiglätte; Litharge, Oxide de plomb demi-vitreux (Gal.); Litharge (Ang.); Sael verglued (D.); Murdar sang (Duk. Hin. Pe.); Lithargirio, Almartago (His.); Lootglans (Bel.); Lithargirio, Piombo semivitreo (I.); Gleyta (Pol.); Silfwerglitt (Succ.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorG. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. A. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp.

In kleinen, fett anzufühlenden Blättchen, welche durch Crystallisation des geschmolzenen und langsam erkalteten Protoryds entstehen. Je nachdem die Farbe weiß oder gelb ist, nennt man sie Silberglätte, Lithargyrus; Litharge d'argent (Gal.); oder Goldglätte, Lithargyrus; Litharge d'or (Gal.).

Br. Fi. beschreiben das im Handel zur Bereitung der Bleiglätte angewendete Verfahren.

§ II. Im Ganzen bereitet.

1) Oxydulum Plumbi, Aes ustum, Ozodes Plumbi nigrum, Plumbum ustum, Oxydum Plumbi griseum s. plumbosum, Protoxydum Plumbi, Cinis Plumbi, Suboxydum Plumbi, Cinis Plombi; Blei- asche (B. Bel. Br. Fenn. Ful. Han. HassP. Pal. Sax. Wir. Sp. Z.)

Rx. Plumbi quantum vis. In fusione tene in patina fictili vel ferrea, saepius agitando, et stratum griseum, quo tegitur, quoties apparet, separa; simulac totum metallum in oxydum conversum est, pulvera, cribra, porphyrisa et cum multa Aqua ablue.

Ueber das Aes ustum von Ams. und Sar. f. Sulphuretum Plumbi.

2) Cerussa citrina; gelbes Bleioryd; Oxide jaune de plomb, Massicot, Ceruse jaune (Gal.).

Wir. Fl. i. Pm.

Rx. Cerussae purae . . . quantum vis. In orucibulum Hassiacum, latere tectum immitte, quod ita calefiat ut to-

tum acidum carbonicum expellatur sed ne oxydum liberum liquet; post refrigerationem cum Aqua contere ut fiant trochisci.

Wir. Cerusam citrinam venalem recipere jubet; — Fi. in paratione Lithargyri indicat.

Das gelbe Bleioryd ist eine Mischung von vielem Protoryd und etwas metallischem Blei.

Pulvis erysipelatodes s. ad erysipelas. (Br. HassP. Pal. Wir. Sp.)

Rx. Farinae (triticeae) . . . uncias sex. Aeris usti (Oxyduli Plumbi), Poli rubrae, singulorum uncias duas.

Mastichis, Ol bani, Cerussae,

singulorum unciam unam.

Fiat pulvis subtilissimus.

Injectio saturnina. (Sw.)

Rx. Oxyduli Plumbi . . . grana viginti. Sulphatis Zinci . . . grana sex. Aquae Rosarum . . . uncias quatuor. Von Clarc bei selbst hitziger Gonorrhoe gerühmt.

Deutoxydum Plumbi, Deutoxydum Plumbi rubrum, Oxydum Plumbi rubrum, Minium, Superoxydum plumbosum, Tritoxydum Plumbi, Plumbum oxydatum rubrum; Wennige; Deutoxide de plomb, Oxide rouge de plomb (Gal.); Red lead (Ang.); Isreny (Ar.); Yuentan (C.); Maennie (D.); Sendur (Duk.); Minio (His. I.); Sindur (Hin.); Menie (Bel.); Temamera (Mal.); Minia (Lus.); Sindura (Sa.); Maenja (Succ.); Segapu senduerum, Jum sindurum (Tam.); Yerra sindurum (Tol.)

A. Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. A. Br. C. Fi. Pid. Sp. T.

Ein sehr feines, sehr schweres und rothes Pulver.

Br. Fi. beschreiben das bei der Bereitung der käuflichen Wennige angewendete Verfahren.

Errhinum adstringens. (Pie.)

Rx. Aloës, Myrrhae, singulorum sesquunciam. Calcis vivae . . . drachmam unam. Minii semidrachmam. Aluminis scrupulos quatuor. Corticis Granati, Balaustiorum, singulorum drachmas duas. Olei Myrti,

Aquae Rosarum, singulorum un-
cias duas cum dimidia.
— Plantaginis quantum sufficit.
Gegen Geschwüre in der Nase.

Unguentum r. Ceratum Minii s. Cera-
tum sub. Ceratum. (Fi. Vm.)

℞. Cerae albae . . . partem unam.
Liqua et adde
Olei partes duas.
Mixtis adde
Minii cum Olei pauxillo triti
partem dimidiam.

Fi. Minii uncias sex, Cerae albae
uncias duas et Olei Olivarum libram
unam.

Emplastrum rubrum s. defensivum ru-
brum Wepferi. (Wir.)

℞. Butyri recentis,
Olei Lini, singulorum uncias sex.
Corticis viridis Sambuci
uncias quatuor.

Coque lente ad humidum consumptionem;
cola exprimendo et colaturae
adde

Cerae flavae,
Minii, singulorum uncias sex.
Bei alten Geschwüren und selbst offenem
Krebs, zur Stillung der Schmerzen.

Ceratum rubrum camphoratum. (Br. Pal.
Wir.)

℞. Cerae flavae,
Sevi cervini,
singulorum semilibram.

Liquefiant; massae fere refrigeratae
adde tunc

Minii cum Olei Rosarum
semilibra triti uncias sex.

Adde denique
Camphorae . . . sesquidrachmam.

Unguentum Minii camphoratum. (Wir.
Sp.)

℞. Olei Rosarum cocti sesquilibram.
Lithargyri uncias duas.
Minii uncias tres.
Cerussae sesquiunciam.
Tutiae,
Camphorae,
singulorum drachmas tres.

Cerae albae uncias duas.

Liqua ceram leni igne, adde oleum,
tunc reliqua pulverata, deinde Aceti
destillati uncias tres et tandem cam-
phoram cum Alcohole tritam. (Wir.)

℞. Unguenti Lithargyri
uncias quindecim.

Camphorae scrupulos duos.

Tritura simul et adde
Minii sesquiunciam.

Tutiae drachmas duas.
Misce bene. (Sp.)

Diese Salbe, so wie das vorbergehende
Gerat gelten als austrocknend und schmerz-
stillend. Man hat sie besonders bei Ber-
brennungen empfohlen.

Emplastrum detergens rubrum. (Han.
Pal. Wir. Vm.)

℞. Cerae flavae libras duas.
Resinae Pini unciam unam.
Olei Rosarum uncias quatuor.
Calcis vivae in Aqua Rosarum lot-
tae et tunc siccatae,
Laterum contusorum,
Boli Armenae,
singulorum drachmas decem.

Minii semunciam.

Camphorae in Oleo dissolutae
drachmas duas.

Cerae et resinae in Oleo liquatis ad-
de calcem, lateres, bolum et minium,
tunc massae semirefrigeratae campho-
ram. (Pal. Wir.)

℞. Cerae flavae,
Sevi vervecini,
singulorum uncias sex.

Cetacei semunciam,
Liquatis simul, adde massae semire-
frigeratae

Minii uncias tres.

Cerussae,
Camphorae in Olei unciis tribus

dissolutae, singularum uncias sex.
Misce bene. (Han.)

℞. Minii partes duas.

Cerussae partes quatuor.

Contere et adde
Sevi vervecini partes octo.

Olei Olivarum partes sex.

Cerae flavae partes sedecim.

Commisce et adde
Camphorae cum Olei pauxillo tri-

tae partem unam.

Misce bene. (Vm.)

Emplastrum ad fonticulos, Sparadrap
rubrum. (Pal Vm.)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.

Sebi vervecini partes duas.

Cerae albae partes sex.

Liqua et adde miscendo
Minii cum Sebi pauxillo triti

partem unam.

Fascias e tela confectas in mixtura
fusa humecta. (Vm.)

Pal. Cerae flavae uncias sex, Sebi
cervini duas, Terebinthinae unam cum
dimidia, Olei Liliorum alborum tanti-

dem et Minii uncias quatuor.

Emplastrum resolvens. (Ca. Pie.)

℞. Emplastri diapalmae
uncias quatuor.

Axungiae Poroi,

Cerae albae,
singularum uncias duas.
Liqua et adde
Minii uncias duas.
Emplastrum fundans s. resolvens. (Ca.)
℞. Olei Olivarum libram unam et un-
cias duodecim.
Minii libram unam.
Cerae flavae uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae,
Magnetis pulverati,
singularum sesquiunciam.
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis,
singularum drachmas tres.
Camphorae . . . drachmas duas.

Ceratum s. emplastrum Mercantini s. Mi-
nii gummoso-resinosum. (Fi.)

℞. Minii libram unam.
Olei communis libras tres.
Colophonii unciam unam.
Cerae flavae uncias sex.
Myrrhae,
Olibani,
Galbani,
Mastichis,
Aluminis usti,
singularum drachmas tres.
Camphorae . . . drachmas quinque.

Minio cum camphora leni caloris
ope nutrito massae si colorem obscure
flavum accipit, ceram et colophonium
adde ut solvantur, tunc ab igne remo-
tis, simulac condensari coeperunt, adde
gummi et alumen pulverata et in fine
camphoram in alcoholis pauxillo solu-
tam ut fiant magdaleones etc.

Tritoxydum Plumbi, Superoxydum vel
Peroxydum Plumbi, Oxydum Plumbi
puliceum; Tritoxide, Suroxide ou Per-
oxide de plomb, Oxide puce de plomb.
(Vm.)

℞. Minii partem unam.
Acidi nitrici partes tres.
Acidum cum Aquae aequali ponde-
re dilue et oxydo pulverato infunde,
bene agitando; liquorem calefac, de-
cantha et pulverem lotum sicca.

Unguentum puliceum. (Vm.)

℞. Oxydi pulicei Plumbi
partem unam.
Cerati simplicis . . . partes octo.
Tritura simul in mortario vitreo.

Subproto-carbonas Plumbi, Oxycar-
bonas Plumbi, Oxydum Plumbi carbo-
natum per Acidum acetosum, Oxydum
Plumbi album, Cerussa alba norica s.
Hollandica, Subcarbonas Plumbi, Carbo-
nas Plumbi s. plumbicum s. plumbicus,

Subacetas Plumbi, Subcarbonas Plumbi
s. Protozydi Plumbi, Album Argenti s.
Plumbi, Album de Krems, Creta plum-
bica s. Plumbi, Plumbum spathicum,
Mephitis Plumbi, Album Cerussae, Oxy-
dum Plumbi album; Bleiweiß, Schiefers-
weiß; Sous-proto-carbonate de plomb,
Sous-carbonate de protoxyde de plomb,
Sous carbonate de plomb, Blanc d'ar-
gent ou de plomb, Blanc de Krems,
Craie de plomb, Plomb spathique,
Méphite de plomb, Blanc de céruse,
Oxide de plomb blanc (Gal.); White
lead, white cride of lead, Cerusse (Ang.);
Asfidaj (Ar.); Bleghvidt (D.); Suffidah
(Duk. Pe.); Albayalde (His.); Tootwit
(bel.); Cerussa, Biacca, Bianco di
piombo (I.); Bleywas (Pol.); Blywh'tt,
Kiferwhitt (Suec.); Vullay, Muthu vul-
lay (Tam.); Sibaydu (Tel.).

§. I. Wie man es im Handel findet.

Cerussa; Bleiweiß; Céruse (Gal).
A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer.
Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP.
His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R.
RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Br.
C. Fi. G. Par. Pid. Sp. T.

Ein weißes und sehr schweres Pulver. —
Fi. führt die Bereitungsart des käuflichen
an

Vm. zeigt folgendes Reinigungsverfahren
an:

℞. Cerussae quantum vis.
Iere in mortario porcellaneo, sen-
sim addendo solutionem tenuem Ace-
tatis plumbici. Post aliquot tempus
decantha et aliam solutionem adde et
ita continua, donec aqua defluens per
unam guttam Hydrosulphatis Potassae,
sicut et ea, quae nondum lotioni inser-
vit, praecipitetur. Residuum deinde
multa Aqua lotum in trochiscos forma.

§. II. Im Ganzen bereitet.

Br. Ful. Wir. Br. Pid. T. Vm.
℞. Laminarum Plumbi tenuium
quantum vis.

Numerum certum earum in vase
Acetum Vini bonum continente sus-
pende, quo lente calefacto, evaporet;
crustam albam, qua laminae teguntur
subinde separa, operationem continuando,
donec omnes laminae sint adhibi-
tae. (Br. Pid. T. Vm.)

℞. Acetatis Plumbi neutri
partes octodecim.
Natri subcarbonici dilapsi
partes quinque.
Dissolve sales quemque seorsim in

Aquae excessu et solutiones commisce, fortiter agitando; post subsidentiam decantha, et praecipitatum lotum in trochiscos forma. (Vm.)

Br. Pul. et Vir. Kali subcarbonicum indicant, productum *Magisterium Saturni* nominantes.

Man kann auch einen Strom Kohlensäures Gas durch eine Auflösung des kohlen-säuerlichen Bleis gehen lassen, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Thénard hat dieses Verfahren angezeigt und auch Gleichy befolgt es.

Trochisci Rhazis s. albi s. albi-Rhazis s. carbonati Plumbi camphorati, Pulvis e Plumbo s. Cerussa compositus, Sief album. (Ams. Br. His. Lus. Pal. Sar. Wir. Ca. Pid. Pie. Sp. Sw)

℞. Cerussae . . . drachmas quinque.
Gummi Tragacanthae . . . drachmas tres.

Misce triturando. (Sw.)

Lus. Cerussae partes duas et unam Gummi.

℞. Cerussae . . . sesquiunciam.
Gummi Ammoniaci, . . .
Amyli, singulorum drachmas duas.
Camphorae . . . semidrachmam.

Pulvera seorsim et misce ut fiant cum Aquae sufficiente quantitate trochisci — Adduntur, si requiritur, cuilibet drachmae Opii grana tria. (His.)

℞. Cerussae . . . uncias quinque.
Sarcocollae . . . sesquiunciam.
Gummi Tragacanthae semunciam.

Misce ut fiat pulvis. (Sp.) — Addi potest Opii pars vigesima octava.

℞. Cerussae . . . drachmas sex.
Gummi Arabici, . . .
— Tragacanthae, . . .
singulorum semunciam.

Sarcocollae . . . drachmas tres.

Fiat pulvis. (Br. Wir.) — Addendo pro scrupulo Opii granum dimidium, habes *Sief cum Opio*.

℞. Cerussae cum Aqua Rosarum lotae . . . drachmas decem.
Amyli . . . semunciam.

Gummi Arabici, . . .
— Tragacanthae, . . .
singulorum drachmas duas.

Camphorae Alcoholis pauxilli ope pulveratae . . . semidrachmam.

Fiat pulvis tenerrimus. (Ams.)

℞. Cerussae cum Aqua Rosarum lotae . . . drachmas decem.
Sarcocollae . . . drachmas tres.
Amyli . . . drachmas duas.

Gummi Arabici, . . .
— Tragacanthae, . . .
singulorum drachmam unam.

Opii . . . semidrachmam.

Pharmacopoea universalis. II.

Fiat pulvis. (Pie.)

Ca. loco opii Camphorae semidrachmam.

℞. Cerussae . . . drachmas sex.
Amyli . . . semunciam.
Ichthyocollae . . . drachmas tres.

Fiat pulvis. (Pid.) — Cuique drachmae Opii granum unum vel duo addi possunt.

Dieses Pulver, in Rosenwasser verdünnt, wurde ehebem gegen Augenentzündungen, Verbrennungen und andre von äußern Ursachen herrührende Entzündungen gepriesen.

Pulvis Plumbi compositus. (Sw.)

℞. Pulveris Cerussae unciam unam.
— Corticis Quercus . . .
libram unam.

Misce bene. — Zum Einstreuen auf scrophulöse Geschwüre empfohlen.

Globuli ad erysipelas. (Sp.)

℞. Cerussae, . . .
Cretae, singularum unciam unam.
Boli albae . . . uncias duas.
Aquae Vitae camphoratae . . .
quantum sufficit

ut fiat pasta in globulos redigenda.

Plene bedeckte erysipelatöse Stellen mit Papier, welches mit einer solchen Kugel tüchtig abgerieben war.

Linimentum antiophthalmicum. (Pie.)

℞. Cerussae . . . uncias quatuor.
Amyli . . . drachmas tres.
Gummi Arabici drachmam unam.

Tragacanthae in Aqua Rosarum dissoluti sesquiunciam.

Dieses Liniment unterscheidet sich von einigen der Formeln zum Sief album nur durch seine Flüssigkeit.

Unguentum ad prosopalgiam s. dolorem faciei. (Ra.)

℞. Cerussae . . . unciam unam.
Opii . . . drachmam unam.
Axungiae . . . semunciam.

Balsami tranquilli quantum sufficit.
Von Kouquier empfohlen

Ceratum Cerussae s. de Cerussa, Unguentum album s. album simplex s. Carbonatis plumbici s. Oxydi Plumbi carbonati s. Subcarbonatis Plumbi s. Cerussae, Unguentum album Rhazis s. de Tornamira. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass HassP. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Ca. Fi. Pid. Pie. Sp. Sw. Vm.)

℞. Cerussae pulveratae partem unam.
Axungiae Porci . . .
partem unam cum dimidia.

Misce triturando. (An. Br. D. Ful.

Gal. Hass. HassP. Li. Pal. Suec. Wir. Br. *Fi. Pid. Sp.*)

Sax. Cerussae partes tres et duas Axungiae.

℞. Axungiae Porci . . partes duas.
Sebi vervecini . . partem unam.

Liquatis simul adde

Cerussae pulveratae partes duas.
Tritura bene. (Ba. Bor. Han. O. Pol.)
Fer. Olei Olivarum libras duas, Sebi vervecini libras duas cum dimidia et Cerussae libras duas.

℞. Olei Olivarum . . partes tres.
Cerae albae . . partem unam.

Liquatis adde

Cerussae . . . partem unam.

Tere ad refrigerationem usque. (Ca. *Pic.*)

Lus. et Wür. Olei partes quatuor, Cerae et Cerussae, singularum unam; — Sw. Olei tredecim, Cerae duas cum dimidia et decem Cerussae vel tres Olei, unam Cerae et Cerussae unam cum dimidia; — Vm. terere jubet Cerussae partes duodecim cum Olei pauxillo et mixturae fere refrigeratae addere Cerae albae partes quinque et Olei Olivarum octodecim; — *Fi.* Axungiae libras duas, Cerussae unam, Cerae albae uncias quatuor.

℞. Cerae albae . . . partes tres.
Olei rosati . . partes duodecim.

Liquatis simul adde

Cerussae pulveratae partes quatuor.
Agita ad refrigerationem usque (Sar.)
His. Cerae partes quatuor, Olei rosati octodecim et duodecim Cerussae.

℞. Cerati albi . . . partes sex.
Cerussae pulveratae partem unam.

Commisce. (Am. Du. C.)

Ed. Cerati partes quinque et tres Cerussae.

℞. Unguenti simplicis . . partes tres.
Liqua leni igne et adde

Cerussae pulveratae partem unam.
Continue agta. (Ams.)

Bor4 Cerussae unam cum dimidia.

℞. Unguenti simplicis partes quinque.
Olei Olivarum partem dimidiam.

Blando igne mollefacto adde

Cerussae pulveratae partem unam.
Misce bene. (B. Bel.)

Diese Salbe dient befonders zum Verbinden verbrannter Stellen.

Unguentum album camphoratum. (B. Bel. Bor4. Br. D. Ful. HassP. Li. O.

Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. Br. Ca. *Fi. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Unguenti albi Rhazis . . partes viginti quatuor.
Camphorae cum Olei Amygdalarum dulciorum pauxillo tritae

partem unam.

Misce triturando. (B. Bel. Bor4. Br. HassP. O. Pal. Pol. Sax. Wir. Br.)

Li. Camphorae partem trigesimam; — Sp partem trigesimam secundam; — D. quadagesimam; — Pul. quadagesimam octavam; — Ca. et Sw. sexagesimam sextam; — Sar. et Wür. septuagesimam secundam; — Vm. nonagesimam sextam; — *Fi.* Unguenti Cerussae libram unam, Camphorae scrupulos quatuor.

Unguentum ad ambustiones s. combustiones. (Sw*)

℞. Unguenti albi camphorati,
— Althaeae,
singulorum quantum vis.
Commisce.

Sparadrap album. (Vm.)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Sebi vervecini . . partes duas.
Cerae albae . . . partes sex.

Liquatis admisce

Cerussae cum Sebi pauxillo tritae partem unam.

Fascias e tela confectas in massa liquida humecta.

Sparadrap exsiccans. (Ca. Vm.)

℞. Olei Olivarum . . partem unam.
Medullae bubulae

partem unam cum dimidia.
Cerae flavae . . . partes duas.

Sebi . . . partes tres.
Liquatis simul adde

Pulveris Calaminae partem unam.
— Cerussae

partem unam et dimidiam.

In mixtura fascias e tela confectas humecta. (Vm.)

Ca. Olei uncias sex, Cerae quatuor, Cerussae et Calaminae, singularum unam cum dimidia.

Unguentum ad combustiones. (Pal. Wir.)

℞. Camphorae . . unciam unam.
Olei rosati . . . uncias tres.

Cerussae . . . uncias sex.
Pulveris Olibani . . uncias duas.

Albumina Ovorum . . . no. 7.
Misce triturando in mortario plumbeo. (Pal.)

℞. Corticis medii Sambuci,
— Tiliae,

singulorum sesquunciam.
Succi Plantaginis . . uncias duas.

— Sedi majoris unciam unam.
Olei Lini . . . uncias sex.

Sebi cervini . . . unciam unam.
Coque leni igne ad humidam consumptionem, cola oleum et in mortario plumbeo tere cum

Cerussae cum Aquae Rosarum lotae
uncia una.

Sacchari . . . drachmis duabus.

Olei Ovorum . . . semuncia.

Fiat unguentum. (Wir.)

Unguentum exsiccans. (Sw.)

℞. Olei Olivarum . . . libram unam.

Cerae albae . . . semilibram.

Mixtis et liquatis adde

Calaminae . . . semilibram.

Cerussae . . . uncias novem.

Lithargyri . . . uncias tres.

Misce usque refrixerint.

Unguentum de Liquiritia. (Pal. Wir. Sp.)

℞. Pulpae Radicis Liquiritiae recentis,

Butyri recentis,

singulorum uncias sedecim.

Coque ad consumptionem humidi,

cola exprimendo et colaturae adde

Poinpholicis . . . drachmas sex.

Cerussae . . . uncias tres.

Camphorae cum Olei paxillo tritae

scrupulos duos.

Bei Ercoriationen und aufgesprungenen
Drüsenwarzen.

Unguentum antihaemorrhoidale. (Pal.)

℞. Amyli,

Cerussae,

Lithargyri,

Aeris usti (Oxyduli Plumbi),

Gummi Tragacanthae,

singulorum drachmas sex.

Opii,

Camphorae,

— singulorum scrupulos quatuor.

Albumina Ovorum . . . no. 2.

Mucilaginis Seminum Psyllii,

Olei Rosarum,

— Verbasci,

singulorum semilibram.

Cerae flavae . . . uncias tres.

Liqua ceram in oleis, adde campho-
ram, pulveres et denique albumina.

Unguentum Plumbi compositum. (Sw.)

℞. Cerussae . . . unciam unam.

Lithargyri . . . drachmas duas.

Boli Armenae . . . unciam unam.

Tritura cum

Mellis rosati . . . semuncia.

Axungiae Porci

sufficiente quantitate

ut fiat unguentum.

Diese Salbe, welche lange geheim gehalten wurde, diente zum Verbinden phagedänischer, scrophulöser und krebsartiger Geschwüre, besonders des penis. Die heftigen Schmerzen, welche ihre Anwendung in den ersten Stunden erregt, beweisen hinlänglich, daß sie reizende Eigenschaften besitzt. Man setzt bisweilen zwei Drachmen Eisens-

tritoyrb hinzu, wo sie dann mit dem emplastrum defensivum rubrum, vorzüglich mit dem nach der Formel von His. bereitetem, viel Aehnlichkeit hat.

Aqua ophthalmica (Sa)

℞. Trochiscorum alborum Rhazis
drachmam unam.

Aquae Rosarum uncias quatuor.

Misce bene.

Unguentum adstringens. (Pie.)

℞. Succii Plantaginis,

— Bursae Pastoris,

— Verbasci,

singulorum uncias duas.

Coque leviter et adde

Pulveris Sanguinis Draconis

unciam unam.

— Boli Armenae,

— Terrae sigillatae,

— Radicis Bistortae,

singulorum sesquidrachmam.

Cerussae . . . scrupulos duos.

Subprotosulphas Plumbi.

Man bereitet dieses Salz nie eigens, sondern es bildet sich nebenbei, wenn man Bleiextract mit einem selenhaltigen Wasser verdünnt. Außerdem bildet es die Basis von folgenden Präparaten.

Lac virginale. (Br. Wir.)

℞. Lithargyri pulverati semilibram.

Aceti destillati . . . sesquilibram.

Coque ad tertiae partis liquidi consumptionem et colaturae adde

Aluminis crudi . . . uncias quatuor

dissoluti in

Aquae communis libris duabus.

Liquorem lactescentem exinde prodeuntem serva. — Ein gefährliches Schönheitsmittel.

Protonitras Plumbi.

Dieses Salz ist nur als einer der Bestandtheile des folgenden Präparats angezeigt:

Balsamum Plumbi. (Vm.)

℞. Plumbi . . . partem unam.

Acidi nitrici cum Aqua diluti

quantum sufficit

ad solvendum metallum. Solutionem adhuc calidam, continue agitando, infunde in

Axungiae Porci fusae

partes sedecim.

In modulos chartaceos effusum post refrigerationem in tabellas concide.

Subprotoacetat Plumbi, Acetas Plumbi s. Plumbi liquidus, Acetas superplumbicus aquosus, Aqua Lithargyrii Acetatis, Decoctum saturninum, Liquor

Acetatis Plumbi basicae s. Plumbi acetici basici s. Plumbi Subacetatis s. Subacetatis Lithargyri, Solutio Plumbi in Acido acetoso, Subacetas Plumbi liquidus, Extractum s. Balsamum Saturni, Subacetas Protxydi Plumbi, Acetas Plumbi cum excessu baseos, Acetum Plumbi s. Saturni concentratum s. saturninum s. plumbicum s. Lithargyri; Bleiertract, flüssiges essigsaures Blei; Sous-proto-acétate de plomb, Sous-acétate de protoxide de plomb, Sousacétate de plomb, Acétate de plomb avec excès de base, Acétate de plomb, Vinaigre de plomb, Extrait de Saturne (Gal.). (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. L. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Acetatis Plumbi crystallisati

partes quinque.

Aquae destillatae partes novem.

Dissolve sal in Aqua blandi caloris ope; solutioni adde

Lithargyri pulverati partem unam.

Coque, spatulae ope agitando, donec liquor 30° ar. indicet; refrigeratum cola et in lagena bene clausa serva. (Gal. GalM.)

T. Sacchari Saturni uncias tres, Lithargyri unam et Aquae destillatae vel pluvialis decem; — Sax. Salis partem unam, Aquae partes viginti ad viginti quinque et Lithargyri partem unam cum dimidia coquere simul donec liquor syrupo violarum viridem colorem praebeat et lagena Aquae unciae unius capax liquoris unam unam cum dimidia contineat; — B. et Han. coquere Lithargyri partes quinque et octo Salis in Aquae partibus quadraginta ad viginti quatuor redigendis, ita ut pondus specificum liquidum sit 1,420;

Vm. calefacere simul Lithargyri partes septingentas cum dimidia, Salis octoginta quatuor cum dimidia et Aquae duas cum dimidia, donec liquor 48 vel 28° indicet; — Ba. Coquere Oxidi partem unam et tres Salis in Aquae novem, donec liquor pondus 1,360 vel 1,365 habeat; — Bor4. Plumbi acetici depurati uncias sex cum Lithargyri laevigati unciis tribus exacte miscere et addendo Aquae destillatae uncias viginti et unam in lagenula vitrea, reponere subinde agitando, donec color ruber sedimenti plane evanuerit et tunc filtrare; — RC. Acetatis Plumbi crystallisati semilibram in Aquae destillatae libris duabus solvere jubet.

℞. Lithargyri . . . partem unam.

Aceti . . . partes quatuor.

Digere per horas viginti quatuor in retorta vitrea, subinde agitando, tunc lente per horas tres vel quatuor i. e. donec charta exploratoria rubefacta non amplius coloretur calefac; post refrigerationem liquorem serva, cuius pondus sit 1,250 i. e. Acetum Plumbi, vel ita evapora ut unciae duae drachmaeque duae ad implendum volumen Aquae unciae unius requirantur. (r. Bel. Fer.)

HassP. Lithargyri uncias quatuor cum Aceti Vini libris tribus coquere, donec charta explor. cerulea, Aceto rubefacta a liquore alkali instar afficiatur et sesquilibra circiter supersit; pond. spec. 1,2500 = 34° B; — T. Lithargyri libras duas in Aceti octo per horas duas vel tres, agitando, leni calore digerere, per momenta aliquot coquere, post horas 12 sepositionis decantare et filtrare. In pissando praeparatum hoc et antea dictum ad mellis vel extracti consistentiam, habes *Extractum Saturni*; — Vm. In balneo arenae dissolvere jubet Lithargyri partes viginti unam cum dimidia in Aceti concentrati sex et solutionem ad 29 vel 48° usque evaporare; — Br. coquere Lithargyri libras duas et Aceti boni libras octo cum dimidia in lehete plumbeo ad mellis usque consistentiam; addere deinde Aquae purae libras novem, ebullitionem adhuc per horae quadranteum continuare et ad 27° evaporare; — Br. Dissolvere Lithargyri partem unam in Aceti destillati quatuor et liquorem filtratum servare; — Am. Lon. LonN. et C. coquere simul Lithargyri libras duas et Aceti octarios octo ad liquoris octariorum sex remanentiam; — Du. coquere Lithargyri libram unam in Aceti octariis octo ad sex redigendis; — Li. coquere Lithargyri libram unam in Aceti libris sex, donec et liquoris drachmae decem volumen unciae unius Aquae impleant et uncia una ejusdem liquoris uncias duas Aquae quoad volumen aequet; — Fenn. et Suec. coquere Lithargyri partem unam in Aceti sex, donec liquor 1,14 pondere par sit; — Ains. Digerere Lithargyri partem unam in quatuor Aceti, et solutionem filtrare vel eam vaporando ad mellis consistentiam consumere; — An. Coquere Lithargyri libram unam in octo uncias Aceti, donec solutio 27° indicet; — Fi. Lithargyri uncias novem cum Aceti fortis libris sex ad trium remanentiam evaporare; — Lus. Coquere Lithargyri uncias quatuor in Aceti libris duabus ad unius librae cum dimidia liquo-

ris remanentiam; — Pol Sar. Wir. et Sa. coquere Lithargyri partem unam in Aceti quatuor per horam unam et solutionem filtrare; — Gen. Wür. et Sp. Coquere Lithargyri partem unam in tribus Aceti ad dimidiam partis liquidi consumptionem; — O. Lithargyri partem unam coquere in Aceti quaque ad hujus perfectam usque saturationem et liquorem ita obtentum evaporare ita ut drachmae sex sufficiant ad volumen unciae unius Aquae implendum; — Br. Coquere Lithargyri libram unam in Aceti quatuor ad duarum remanentiam et colaturam ad unciarum novem remanentiam consumere; — His. et Sar. digerere Lithargyri partem unam per aliquot dies in Aceti quatuor et liquorem deinde filtrare; — Ful. Coquere simul Lithargyri partem unam et duas Aceti concentrati.

Sp. praeterea coquere jubet Minii partem unam et Aceti octodecim, donec solutio consistentiam mellis acceperit; — Bor. coquere simul Minii partem unam et novem Aceti destillati et liquorem evaporando ad partem tertiam consumere; — D. coquere Minii partem unam in Aceti quatuor et liquorem ad dimidium solum consumere vel residuum pro quarta parte evaporare.

R. et Sax. Cerussae partem unam et Aceti boni octo coquendo ad dimidium conungere; — Hass. et Pid. Cerussae partem unam et octo Aceti vel per horam unam solum coquere, vel deinde ad mellis consistentiam evaporare; — R. tamen vel Minium vel Cerussam; — Pid. Minium vel Cerussam vel Lithargyrum eligere pro arbitrio permittit.

Pt. Acetum s. Tincturam Saturni e Cerussae uncias octo et Aceti destillati quadraginta absque calore, agitando parare et Extractum Saturni inspissando acetum hoc ad melleam consistentiam.

Um diese zahlreichen Verschiedenheiten zu beurtheilen, muß man sich erinnern, daß bei dem essigsauren Blei dreimal so viel Dryd auf dieselbe Menge Säure kommt, als bei dem neutralen essigsauren Blei.

In Bezug auf die Weisglätte, welche der Mennige und dem Bleiweiß vorzuziehen ist, bemerkt Lhénaerd, daß man sie vorher calciniren müsse, ehe man sie mit dem neutralen essigsauren Blei in Verbindung bringt, um das kohlensaure Blei zu zerstören, welches immer in größerer oder geringerer Menge darin enthalten ist, und welches das Letztere nicht auflösen würde.

Viele Pharmacopöden schreiben flüssiges essigsaures Blei von zwei verschiedenen Graden der Dichtigkeit vor: das am meisten mit Wasser verdünnte führt den Namen Acetum Plumbi s. Lithargyri s. Saturni s. lithargyrites s. saturninum; das stärkere nennt man Extractum Saturni s. Plumbi s. Goulardi, Balsamum Saturni, Acetum Plumbi concentratum. Der Stärkegrad dieses letztern variiert im Allgemeinen zwischen 27 und 30° R. Das des Pariser Codex und der Epitäter muß 30° anzeigen. Da man das Salz kristallisiert erhalten kann, so würde man wohl thun, wenn man diese Auflösung, welche nach ihrem Wesen selbst sehr veränderlich ist, ganz weglassen und sie den Magistrat-formeln einverleibe.

Einige Pharmacopöden (A. ForC.) nennen auch Bleiextract oder Bleiessig die Auflösung des neutralen essigsauren Bleis in Wasser. Dieß ist ein tabelnswerther Mißbrauch oder vielmehr Irrthum.

Die medicinischen Eigenschaften dieses Salzes und die Mittel, mit denen es sich nicht verträgt, sind dieselben, wie bei dem folgenden Salze.

§. I. Präparate, bei denen wässerige Flüssigkeiten das Excipiens des Salzes bilden.

Collyrium plumbatum s. adstringens s. resolvens, Aqua saturnina s. plumbica s. ophthalmica. (Am. Bor. Bor4. Ful. Ham. C. Huf. ParC. Ra. Sw.)

R. Extracti Saturni . semunciam.
Aquae destillatae . libras duas.
Misce. (Bor. Bor4.)

Am. et C. Extracti Saturni scrupulum unum et Aquae semioctarium; — ParC. duas guttas Extracti et Aquae uncias quatuor; — Ra. Extracti guttas decem et Aquae uncias quatuor.

R. Extracti Saturni guttas decem.
Decocti Malvae . uncias duas.
Misce bene. (Ham.)

R. Mucilaginis Cydoniorum .
unciam unam.
Aquae destillatae . uncias tres.
Extracti Saturni guttas duodecim.
Misce. (Ful.)

Huf. Extracti Saturni guttas duas,
Aquae Rosarum unciam unam et Mucilaginis Seminum Cydoniorum semidrachmam.

R. Florum Meliloti semidrachmam.
Aquae . . . libram unam.
Infunde et colaturae adde
Extracti Saturni drachmam unam.
Misce. (Ra.)

R. Extracti Saturni . guttas octo

- Aquae Rosarum unCIAS quatuor.
Misc. (Sw.)
- Collutorium saturninum.* (GalM.)
- ℞. Extracti Saturni partem unam.
Mellis despumati partes viginti.
- Injectio ad leucorrhoeam s. adstringens.*
(Au. Ca Sw. Sy.)
- ℞. Extracti Saturni drachmas duas.
Aceti destillati . . . semilibrum.
Aquae Rosarum . . . sesquilibram.
Bon Young bei Leucorrhoe empfohlen.
(Ca. Sw. Sy.)
- ℞. Extracti Saturni
guttas novem ad octodecim.
Aquae . . . unCIAS novem.
Opii grana duodecim ad viginti
quatuor.
- Bon Girtanner bei sehr schmerzhafter
Gonorrhoe empfohlen. (Au.)
- Injectio sedans s. sedativa.* (Ca. Sw. Sy.)
- ℞. Extracti Opii aquosi
drachmam unam ad tres.
Aquae calidae . . . libram unam.
Solutioni adde
Extracti Saturni
drachmam unam ad tres.
Misc. (C. Sw.)
- Sy. Extracti Opii drachmam unam,
Aquae Rosarum libras duas et Extracti
Saturni guttas sexaginta vel: Opii
drachmas tres, Aquae destillatae unCIAS
duodecim et Extracti Saturni unCIam
unam ad tres.
- Bon Hamilton, besonders bei Gonorrhoe,
gepriesen.
- Collyrium saturninum opiatum.* (Am.
WW. C. E.)
- ℞. Extracti Saturni . . . guttas duas.
Aquae Rosarum . . . unCIam unam.
Extracti Opii aquosi
granum unum.
- Misce. (WW.)
- ℞. Extracti Saturni scrupulum unum.
Aquae . . . octarium dimidium.
Tincturae Opii . . . unCIam unam.
Misc. (Am. C.)
- ℞. Extracti Saturni guttas duodecim.
Vini Opii . . . guttas quadraginta.
Aquae Rosarum . . . unCIAS tres.
Misc. (E.)
- Lotio adstringens, Aqua exsiccans.*
(E. Sa.)
- ℞. Extracti Saturni drachmam unam.
Spiritus Camphorae drachmas tres.
Aquae . . . octarium unum.
Misc. (E.)
- ℞. Aquae Calcis . . . sesquiunciam.
— sclopetariae . . . semunciam.
- Extracti Saturni semidrachmam.
Misc. (Sa.)
- Gargarisma adstringens.* (Ra.)
- ℞. Extracti Saturni semidrachmam.
Decocti Hordei . . . libram unam.
Syrupi Sacchari . . . unCIam unam.
- Cataplasma saturninum s. resolvens.*
(GalM. RC. Ra. Sp. Sy.)
- ℞. Farinarum resolventium
quantum vis.
Aquae vegeto-mineralis
octuplum.
Coque ad consistentiam pultis. (Sp.)
RC. Micae Panis vel Farinae quantum
vis, Solutionis Acetatis Plumbi
fortioris quantum satis.
- ℞. Aquae fervidae . . . libram unam.
Micae Panis . . . quantum sufficit.
Extracti Saturni
unCIam unam ad duas.
- Misce et adde
Axungiae Porci . . . unCIam unam.
Warm anzuwenden (Sy.)
- ℞. Cataplasmatibus emollientibus
unCIAS quatuor.
Extracti Saturni . . . unCIam unam.
Salis Ammoniaci . . . semidrachmam.
Misc. exacte. (Ra.)
- §. II. Präparate, in denen dem Bleextract alkoholische Flüssigkeiten zum
Behuf dienen.
- Gargarisma stypticum.* (Pie.)
- ℞. Extracti Saturni . . . unCIAS duas.
Aluminis . . . unCIam unam.
Aceti . . . vitrum dimidium.
Vini albi . . . octarium unum.
- Aqua Saturni s. saturnina s. Plumbi
acetosi s. Lithargyri composita s. Acetatis
superplumbici s. Goulardi s. vegeto-
s. vegetabili-mineralis Goulardi s.
Subacetatis plumbici, Acetas Plumbi dilu-
tum alcoholisatum, Solutio Subacetatis
s. Acetatis plumbici, Subacetatis Plumbi
dilutus, Liquor Plumbi Subacetatis
dilutus, Tinctura plumbosa, Acetas Plumbi
liquidus cum Alcohole; Goulard's
Bleiwasser.* (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br.
D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han.
Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.
Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wyr. Bo. Br.
C. Fi. ParC. Pie. Ra. Sa. Sp. Sw. T. Vm.)
- ℞. Extracti Saturni (30^o)
partem unam.
Dilue in
Aquae destillatae
partibus quadraginta octo.
Liquori adde
Alcoholis (22^o) partes quatuor.

Serva. (Bor4. Fenn. Gal. GalM. Bo. Fi. ParC. Pie. Sp. T.)

Ams. B. D. Fer Ful. Han. Hass. R. Suec. Br. et Pid. Extracti partem unam, Alcoholis duas et Aquae quadraginta octo; — Lus. Extracti unam, octo Alcoholis et Aquae quadraginta octo; — Vm. Extracti unam, Alcoholis unam et Aquae triginta duas; — Wür. Extracti unam, Alcoholis tantidem et Aquae triginta sex; — HassP. Extracti unam, Aquae communis viginti quatuor et Spiritus Vini rectificati unam; — Du. Lon. LonN. C. Sa. et Sw. Extracti et Alcoholis, singulorum unam et Aquae nonaginta sex (centum viginti octo); — His. Extracti unam, Alcoholis duas et Aquae nonaginta sex; — Br. Extracti unam, Alcoholis duas et Aquae centum viginti octo; — Bel. Extracti sex, Alcoholis sedecim et Aquae centum nonaginta duo; — RC. Extracti scrupulos quatuor, Alcoholis diluti, Acidi acetici diluti vel impuri, singulorum drachmam unam, Aquae destillatae vel fontanae libram unam.
R. Extracti Saturni partem unam.
Aquae destillatae

partes quadraginta octo.
Misce bene. (Han. Li. O. Pol.)

Ra. Extracti partem unam et octo Aquae; — Sax. Extracti unam et duodecim Aquae; — Ba. Extracti unam et Aquae viginti quatuor.

Nimmt man zu diesen Verschiedenheiten in den Verhältnissen der zwei oder drei Bestandtheile dieses Wassers noch die Verschiedenheit des Stärkegrads des Bleiextracts hinzu, so wird man leicht einsehen, wie wenig das Präparat gleichförmig ausfallen müsse. Uebrigens ist es außer Zweifel, daß dem Arzt die Stärke desselben überlassen bleiben muß, welcher sie den Umständen gemäß einrichtet. Nur muß er den Stärkegrad des Bleiextracts, welches er verschreibt, genau kennen, und in diesem Bezug lassen diejenigen Pharmacopöen, welche es gar nicht oder nur sehr flüchtig anführen, eine sehr empfindliche Lücke. Der Alcohol, welcher nach der ursprünglichen Formel Goulard's hinzukommt, ist, wo nicht der bezweckten Wirkung gerade entgegen, doch wenigstens unnütz.

Bereitet man das Goulard'sche Wasser mit gemeinem Wasser, so ist es milchig, weil ein Theil des Salzes sich zerlegt und mit dem kohlensäuerlichen oder schwefelsäuren Blei, welches sich niederschlägt, essigsauren Kalk bildet, welcher in Aufscheidung erhalten wird. Dagegen die Flüssigkeit durch diesen Niederschlag nur wenig, und wenn man sie vor dem Gebrauch tüchtig umschüttelt, nichts an ihrer Kraft verliert,

so muß der Pharmaceut doch wo möglich auch diesen Fehler vermeiden.

Das Goulard'sche Wasser wird zu Bädungen und zum Bestreuen von Breiumschlägen angewendet.

Fomentatio refrigerans, Lotion saturina s. plumbata, Lotion s. Fomentatio resolvens. (Ful. Ham. Ca. Pie. Sw. Sy.)

R. Aquae vegeto-mineralis sesquilibram.
Alcoholis uncias tres.
Misce. (Ham.)

R. Extracti Saturni,
Aquae Vitae,
singulorum unciam unam.
— Rosarum libras tres.
Misce. (Cr. Pie.)

Sw. Extracti drachmas duas ad quatuor, Alcoholis quatuor, et Aquae libras duas; — Sy. Extracti drachmas duas ad quatuor, Alcoholis unciam unam et duas libras Aquae.

Gewiß ist dieses nur eine Abänderung des Goulard'schen Wassers. Man kann nöthigenfalls drei oder vier Drachmen Aqua Vitae camphorata zusetzen.

Ri Extracti Saturni,
Aquae Vitae,
singulorum semunciam.
— Plantaginis libram unam.
Misce. (Pie.)

R. Aquae vegeto-mineralis libras duas.
Alcoholis uncias tres.

Acidi sulphurici unciam unam.
Misce. (Ful.)

Liquor ad pernioles (Sw.)

R. Extracti Saturni partem unam.
Spiritus Rosismarini partes quatuor.

Misce.
Fomentatio resolvens. (Ful.)

R. Salis Ammoniaci semunciam.
Aquae communis uncias duodecim.
Solutioni adde

Alcoholis uncias duas.
Extracti Saturni drachmas duas.

Collyrium saturninum. (Au. Ca.)

R. Extracti Saturni,
Aquae Vitae camphoratae,
singulorum guttas sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae semunciam.

Aquae Plantaginis uncias sex.
Misce. (Ca.)

R. Aquae Goulardi,
— Rosarum,
singularum uncias duas.

Opii grana octo.
Misce. (Au.)

℞. Extracti Saturni drachmas duas.
 Infusi Sambuci . . . uncias sex.
 Aquae Vitae camphoratae
 drachmam unam.

Misce. (Au.)

Aqua roborans. (Ca.)

℞. Extracti Saturni,
 Aquae Vitae camphoratae,
 singulorum drachmas duas.
 Sulphatis Zinci drachmam unam.
 Aquae Chamomillae semilibram.
 Selle empfahl dieses Augenwasser bei
 sogenannter asthenischer Augenentzündung.

Fomentum saturninum cum Opio, Fo-
mentatio adstringens. (Au.)

℞. Aquae . . . uncias decem.
 Extracti Opii . . . grana decem.
 — Saturni . . . semidrachmam.
 Aquae Vitae camphoratae

guttas viginti.

Vogel empfiehlt es bei eingeklemmter
 Brüche.

§. III. Préparate, in denen fette Kör-
 per das Excipiens des Bleiextracts
 bilden.

Cereoli saturnini s. plumbici, Cande-
lae chirurgicae s. resolventes s. miti-
gantes, Cerei medicati, Cereoli commu-
nes s. Acetatis Plumbi. (Bor. Bor4. Br.
Ful. HassP. Pol. R. Sax. Suec. Br. Pid.
Pie. Sp. Sw.)

℞. Cerae flavae . . . libras duas.
 Ligua leni igne et adde

Extracti Saturni . . . unciam unam.
 Misce, continue agitando, massam
 ab igne remotam in cereolos redige.
 (Bor. Br. Ful. Pol R. Sax. Br. Pid. Pie.
 Sp. Sw.)

Bor4. HassP. Cerae flavae uncias sex,
 Aceti plumbicoid drachmas duas.

℞. Cerae flavae . . . libram unam.
 Cetacei . . . drachmas tres.
 Extracti Saturni drachmas duas.
 Cerae et cetaceo fuis extractum
 adde. (Suec.)

Balsamum aniversale s. saturninum,
Butyrum Saturni, Ceratum Saturni s.
Saturni Gouardi s. Lithargyrii s. Plum-
bi Superacetatis s. Plumbi s. Plumbi
compositum s. e Plumbo, Linimentum
plumbatum, Pomatum Saturni, Unguen-
tum Acetatis Plumbi s. Acetatis super-
plumbici s. Lithargyri s. de Lithargyro
s. nutritium s. tripharmacum s. saturni-
nium s. plumbicum s. Subacetatis plumbi-
cici s. Oxydi Plumbi acetatum, Cera-
tum Acetatis plumbici, Sapo antiplagi-
sticus et resolvens, Pomatum s. Ungu-

entum antherpeticum; Bleicrat, Bleifalbe.
 (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4.
 Br. D. DD. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han.
 Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R.
 Sar. Sax. Wir. Wür. WW. Br. Ca. Fi.
 Pid. Pie. Sm. Sp. Sw. Sy. Vm.)

℞. Olei Olivarum . . . partes duas.
 Extracti Saturni . . . partem unam.
 Misce triturando. (Ams.)

His et $\frac{1}{2}$ Olei et Extracti, singulo-
 rum partes aequales; — Ful. Li. et
 Pid. Olei partem unam cum dimidia
 et unam Extracti; — Pie. Olei partes
 octo et unam Extracti.

℞. Axungiae Porci partes quatuor.
 Extracti Saturni partem unam.
 Contere. (Sax.)

℞. Olei Olivarum,
 Axungiae Porci,
 Extracti Saturni,
 singulorum partem unam.

Misce in mortario vitreo, bene tri-
 turando. (Bel.)

℞. Olei Rosarum cocti partem unam.
 Extracti Saturni . . . partes duas.
 Tritura simul. (Wir.)

℞. Lithargyri puri . . . partem unam.
 Aceti . . . partes duas.
 Olei Rosarum cocti partes quatuor.
 Tere lithargyrum in mortario plum-
 beo addendo interdum Acidi pauillum
 interdum Olei parvam copiam, donec
 omnia bene sint commixta. (Br.)

℞. Lithargyri,
 Cerussae, singulorum uncias tres.
 Aceti . . . uncias octo.
 Olei . . . sesquilibram.
 Tritura lithargyrum et cerussam mo-
 do cum Aceti, modo cum Olei pauxillo,
 donec liquida sint penitus consumpta.
 (Sar.)

Wir. Lithargyri partem dimidiam,
 Cerussae unam cum dimidia, Aceti di-
 midiam et unam Olei Rosarum cocti;
 — Pal. Lithargyri duas, Cerussae di-
 midiam, Aceti unam et Olei Rosarum
 duas cum dimidia; — Fi. Olei Oliva-
 rum, Cerussae, singulorum libram unam,
 lente coquere, addere Aceti calidi albi
 libram unam et tunc Cerae albae et
 Emplastri Diachyli simplicis, singulo-
 rum uncias sex. (Ceratum Cerussae ge-
 nannt.)

℞. Lithargyri pulverati libram unam.
 Olei Olivarum . . . libras tres.
 Aceti albi . . . uncias sedecim.
 Coque lithargyrum cum olei libra
 una, addendo sensim Aquam, donec
 massa cerati consistentiam acceperit,
 quod deinde cum oleo quod restat et
 aceto contere. (His.)

Sp. Lithargyri partes sedecim, Olei

octodecim et Aceti tres; — *Sm.* Olei partem unam, Aceti, Lithargyri, singulorum duas, coquendo ad dimidium redigere.

℞. Olei Olivarium . partes quatuor.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liqua et massae refrigerescere coepitae sensim adde, continue agitando,
Extracti Saturni . partem unam.
Misce bene. (O. Br.)

D. Ful. Li. et *Vm.* Extracti partem unam, Cerae duas et sex Olei; — *Wir.* Extracti unam, Cerae unam cum dimidia et quatuor Olei; — *Sy.* Extracti unam, Cerae sex et sedecim Olei; — *Sw.* Extracti unam, Cerae tantidem et tres Olei; — *Sp.* Extracti unam, Cerae sex et Olei viginti quatuor; vel Extracti quatuor, Cerae octo et Olei octodecim; vel Extracti dimidiam, Cerae novem et octo Olei; — *Fenn.* et *Saec.* Extracti et Cerae, singulorum quatuor et novem Olei; — *Hass.* Extracti duas cum dimidia, Cerae quatuor et duodecim Olei; — *R.* Extracti quatuor, Cerae quinque et novem Olei; — *Lus.* et *Br.* Extracti duas cum dimidia, Cerae quatuor et novem Olei; — *Fi.* Olei libras duas, Cerae unam, Aceti (Extracti) Saturni uncias novem.

℞. Axungiae Porci . partem unam.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liqua et mixtis semirefrigeratisque adde

Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (A.)
℞. BorC. Extracti partes duas, Cerae unam et tres Axungiae.

℞. Olei Nucum juglandium . partes duodecim.
Cerae flavae . partes quatuor.
Liqua blando igne et adde sensim
Aquaе fontanae partes duodecim.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce exacte. (D. *Pid.*)

Pol. et *Vm.* Extracti partem unam, Aquaе duas, unam Cerae et quatuor Olei; — *Bor.* Extracti partem unam, Aquaе Rosarum duas, Cerae duas et octo Olei; — *Wir.* Extracti unam, Aquaе viginti quatuor, Cerae unam et quatuor Olei; — *Han.* et *O.* Extracti unam, Aquaе Rosarum quatuor, duas Cerae et octo Olei; — *Han.* Extracti, Aquaе, singulorum duas cum dimidia, Cerae tantidem et octo Olei; — *Sax.* Extracti dimidiam, Aquaе tres cum dimidia, unam Cerae et quatuor Olei; — *HassP.* Olei Olivarium libras duas, Cerae albae uncias sex, Aceti Lithargyri tres, Aquaе Rosarum sex.

℞. Cerae,

Sebi vervacini, . singulorum partes duas.
Olei Olivarium . partem unam.
Liqua blando igne et mixturae paululo refrigeratae adde
Extracti Saturni . partem unam.
Tritura bene simul. (*Pid.*)
℞. Cerati partes centum viginti quinque.

Extracti Saturni . partem unam.
Misce sedulo in mortario (Gal.)
Ca. et *P.e.* Extracti partem unam et Cerati nonaginta sex; — *GalM.* Extracti unam et Cerati viginti quinque; — *B.* et *Ed.* Extracti unam et viginti Cerati; — *Du.* Extracti unam et octodecim Cerati; — *Ba.* Extracti unam et Cerati decem; — *An. DP.* et *Sw.* Extracti unam et Cerati octo; — *WW.* Extracti unam et quatuor Cerati; — *Fer.* Olei Olivarium libras duas, Cerae albae uncias tres et sex Extracti Saturni; — *Bor4.* Unguenti simplicis libras tres, Aceti plumbici uncias tres.

Alle diese unter dem Namen von Cerat, Einiment, Salbe und selbst Pflaster gebräuchlichen Zusammensetzungen sind bloß hinsichtlich des Dichtigkeitsgrads von einander verschieden. Sie eignen sich für beruhigend, lindernnd, auflösend, schmelzend und die Verwundung befördernd. Sehr und vielleicht zu häufig macht man von ihnen in der chirurgischen Praxis Gebrauch, obgleich sie jetzt weniger benutzt werden, als in der Zeit, wo das Verbinden der Wunden fast einzig in der Anwendung von Salben und Pflastern bestand.

Unguentum ad varices ani s. antihæmorrhoidale. (Ham. *Fi. Sw.*)

℞. Unguenti Cetacei . partes octo.
Extracti Saturni . partem unam.
Contere. (*Sw*)

℞. Unguenti Linariæ,
Mucilaginis Seminum Cydoniorum, . singulorum partes duas.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (Ham.)

Unguentum ad combustiones. (Ful.)

℞. Unguenti Plumbi subaceticii . unciam unam.
— Basilioi,
— balsamici,
singulorum drachmam unam.
Misce.

Ceratum exsiccans Kirklandi. (*Ca. Pic.*)

℞. Cretæ præparatæ,
Aceti destillati,
singulorum uncias quatuor.
Cessatâ effervescentiâ adde
Olei Olivarium . uncias quatuor.

Emplastrī simplicis semilibram.
Liqua leni igne et massae semirefrigeratae admisce

Extracti Saturni
uncias quatuordecim.

Misce sedulo.

Unguentum Subacetatis Plumbi opiatum
s. opiatum s. opiaceum. (Ra.)

℞. Extracti Saturni . . . semunciam.
Laudani liquidi Sydenhami
drachmas duas.

Olei albi . . . unciās duas.
Subige bene.

Unguentum Subacetatis Plumbi camphoratum, Ceratum Plumbi compositum, Balsamum Saturni Goulardi, Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Goulardi. (A. Ams. Br. Ful. Lon. LonN. Lus. WÜR. C. Pie. Sp. Sw.)

Præparatur, Unguento simplici fere refrigerato addendo Camphorae cum Olei paxillo tritae partem trigesimam tertiam (Ams.); quinquagesimam quartam (WÜR.); septuagesimam sextam (Ful.); centesimam sexagesimam octavam (Br.); ducentesimam decimam (Sp.); ducentesimam quadragesimam (Pie. Sp.); ducentesimam quadagesimam octavam (Am. Lus. C.); octingentesimam quadragesimam. (Sp.)

Lon. LonN Extracti Saturni fluiduncias duas cum dimidia, Cerae flavae unciās quatuor, Olei Olivarum novem et Camphorae drachmam dimidiam.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (Sm.)

℞. Cerati Saturni,
Unguenti populei,
singulorum unciām unam.
Camphorae pulveratae
drachmas duas.

Iam Verbinden frischer Flechten.

Linimentum antihystericum. (Sm.)

℞. Olei rosati . . . unciās duas.
Unguenti populei
drachmas quatuor.

Camphorae . . . drachmas duas.
Extracti Saturni drachmam unam.

In Einreibungen auf den Unterleib alle Viertelstunden.

Sparadrap s. Pellis Goulardi. (Pie. Sp. Vm.)

℞. Olei Olivarum
uncias quatuordecim.

Cerae flavae
unciās viginti quatuor.

Liquatis adde
Extracti Saturni . . . unciām unam.
Camphorae cum Olei paxillo tritae
semidrachmam.

Mixturae immerge linteam medio-
ris teneritatis et superficiem deinde
laeviga. (Vm.)

Pie. Cerae libras duodecim, Olei tres, Extracti unciās octo et Camphorae drachmas duas; — Sp. Cerae unciās nonaginta sex, Olei viginti octo, Extracti quatuor et Camphorae drachmam unam.

Dieser Sparadrap ist bei atonischen Geschwüren der Beine und bei rheumatischen Schmerzen gerühmt worden.

Unguentum Saturni saponaceum s. Subacetatis Plumbi saponaceum, Unguentum s. Pomatum Goulardi. (Br. Ful. Lus. Fi. Pie.)

℞. Saponis communis unciās octo.
Aquae fontanae . . . octarios duos.
Dissolve blando igne, continue agitando; adde deinde

Extracti Saturni . . . unciās duas.
Camphorae . . . drachmam unam.

Misce bene. (Br. Pie.)

Fi. Saponis Alicantiini sesquilibram, Extracti Saturni Goulardi unciās duas, Camphorae drachmam unam, Aquae libras quinque.

℞. Unguenti nutriti . . . unciās octo.
Saponis albi . . . unciās quatuor.
Coque lente ad consumptionem humidī usque et adde

Camphorae . . . drachmam unam.
Misce bene. (Ful.)

Lus. addere jubet Unguento Subacetatis simplici(Lus.) Saponis raspatis unciās tres.

Diese Salbe soll stärker aufsteigend und schmelzend seyn, als die einfache. Man hat sie besonders bei Anchylose gerühmt.

Cereoli saturnini. (Per. Fi.)

℞. Cerae flavae . . . libram unam.
Extracti Saturni . . . semunciam.

Liquorem cum cera liquata commisce ut fiant cum fasciis linteis in hac mixtura immersis cereoli.

Protoacetas Plumbi, Acetas Plumbi s. Plumbi acidulus siccus, Acetas plumbicum crystallisatum, Acetis Plumbi, Cerussa acetata, Plumbum aceticum s. aceticum orudum s. acetatum, Superacetas Plumbi, Saccharum saturninum s. Saturni, Sal Saturni, Sal Plumbi, Acetas Protoxidi Plumbi, Acetas Plumbi neutrum; Bleizucker, essigsaures Blei, Bleisalz; Protoacétate de plomb, Acétate de protoxide de plomb, Acétate de plomb ou de plomb neutre, Sel de saturne, Sucre de plomb, Sucre de Saturne (Gal.); Sugar of lead (Ang.); Blye-sukker (D.); Loozruiker (Hel.); Zuchero di saturno (I.); Cukior ołowiany, Przyoc-

cian olowin nieczysty (*Lus.*); Blysocker (*Suec.*).

§. I. Wie man ihn im Handel findet.

B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. DD. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. Suec. WW. C. G. Par. *Pid.*

Bevor dieses Salz angewendet wird, muß es gereinigt werden (*Saccharum Saturni depuratum, Plumbum aceticum depuratum, Acetas Plumbi depuratus s. in crystallos concretus etc.*)

R. Acetatis Plumbi . . . partes duas.

Aquae calidae . . . partes tres.

Solutioni ut perfecta sit, adde Acidi acetici concentrati paucillum, liquorem adhuc calidum filtra et in locum frigidum ad crystallisandum reponere. (*Ba.*)

Fenn. Salis partem unam, Aquae quatuor et unam Aceti destillati; — Bor4. Salis partes duodecim, Aquae destillatae calidae quantum sufficit, Aceti destillati partem unam; — Sax. Salis partes tres in totidem Aquae dissolvere, Aceti destillati partem unam addere, mixta coquere, colare et crystallisationi subjicere jubet.

R. Plumbi acetici partem unam (quantum libet).

Aquae calidae partem unam (quantum sufficit).

Dissolve, liquorem per telam trajice, adde Aquae partem unam, calefac, filtra et lentae crystallisationi subijce. (*Bor. Han. Hass. HassP. O. Suec. Sw. Vm.*)

Vm. Sal in Aquae quam minima quantitate solvere et liquori torrentem Gasii acidi carbonici inmittere tam diu jubet, donec nullum amplius provocetur praecipitatum.

§. II. Im Ganzen bereitet.

A. Am. Ams. An. Br. D. Du. Ed. Ful. Gal. Gen. Hass. His. Lon. LonN. Lus. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. Br. C. *Pi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

R. Cerussae . . . quantum vis.

Aceti destillati pondus decuplum.

Digere in vase vitreo, donec acidum sit saturatum; decantha et filtra liquorem, quem crystallisationi subijce; crystalli siccentur. (*Am. Ams. Du. Ed. Gen. Hass. Lon. Lus. Wür. C. Pid. Vm.*)

Modus procedendi fere in omnibus pharmacopoeis idem indicatur, exceptis differentiis inter proportionem plumbi et acidi, parvi momenti; sed Pal. Oxidum Plumbi obtentum calcinatione me-

talli ignis aperti ope; — A. D. et Fer. Minium jubent; — His. et *Vm.* Cerussam vel Lithargyrum; — Ful. *Sp.* et *Sw.* Cerussam vel Minium; — Wir. et *Pi.* Lithargyrum vel Minium; — Br. Gal. et *T.* Lithargyrum sumere praescribunt.

An. Sar. et Br. Subacetatem lente evaporare et deinde in loco frigido crystallisationi subjicere jubent; — LonN. *Plumbi Acetas: Acidi acetici fortioris octarium unum cum Aquae destillatae ferventis sesquioctario miscere et paulatim addendo Plumbi Subcarbonatis libram unam coquere jubet, donec acidum saturetur, tunc per chartam colare, Aquam ad pelliculae apparitionem consumere et seponere ut crystalli fiant, quae super charta bibula exsiccentur.*

Bleizucker wird als adstringend, austrocknend und zertheilend oder zurücktreibend betrachtet und sehr häufig äußerlich zur Zertheilung oder Aufstößung mancher phlegmonöser und erysipelatöser Entzündungen angewendet. Man giebt ihn auch innerlich, um colligative Schweißschwindsüchtiger zu mäßigen, Diarrhöden zu hemmen, endlich auch bei sogenannten passiven Hämorrhagien und in verschiedenen Fällen von chronischem Catarrh.

Kalkwasser, Alkalien und ihre kohlensäuerlichen Verbindungen, Schwefel- und Salzsäure, alkalische Seifen, Aaun, schwefelsaures Eisen, Kupfer und Zink, Barax, Schleimharz und die meisten thierischen Substanzen zerlegen ihn und können daher nicht damit verbunden werden.

A. Präparate, in welchen das Salz im festen Zustande enthalten ist.

Pulvis temperans. (Pie.)

R. Acetatis Plumbi drachmam unam.

Nitri . . . unciam unam.

Fiat pulvis. — Gabe von zwei Scrupeln bis zu einer Drachme in Aufstößung in einem Glase Brunnenwasser, zwei oder drei Mal in der Woche.

Wir. hoc praeparatum sub nomine: Nitrum saturninum sequenti modo indicat:

R. Nitri crudi . . . uncias tres, Acetatis Plumbi . . . uncias duas.

Dissolve in Aquae Rosarum sufficiente quantitate, tunc vaporando ad pul-tem spissam redige et denique blandi caloris ope penitus exsicca. — Dieser Bleisalzperle wurde ehemals äußerlich zu Augen-, Surgetwassern und Einspritzungen in die Harnröhre angewendet.

Pulvis ad phthisin s. antiphthisicus.
(Bo.)

℞. Acetatis Plumbi,
Opii, singulorum grana sex.
Sacchari . . . scrupulum unum.
Misce exacte et in doses duodecim
divide. — Gabe, ein Stück Morgens
und Abends bei colliquativen Schweissen
und Diarrhden Schwindsüchtiger.

Pulvis stypticus. (Ca.)

℞. Dissolutionis Ferri muriatici saturatae . . . uncias quatuor.
Evaporatae ad siccum adde
Acetatis Plumbi pondus aequale.
Evaporationem leni calore ad siccum
usque continua; residuum pulvera et
cribra — Aeußerlich und innerlich bei
Blutflüssen. — Gabe, innerlich, vier bis
zweölf Gran.

Pulvis antipsoricus. (Ra.)

℞. Acetatis Plumbi,
Florum Sulphuris,
singulorum partes duas.
Zinci sulphurici . . . partem unam.
Man verdünnt, nach Chaus sier, eine
starke Pfliste mit einigen Tropfen Del und
reibt es in die Handflächen ein.

Pulvis escharoticus. (Pie.)

℞. Acetatis Plumbi,
Cerussae,
Aluminis,
singulorum drachmam unam.
Soll die Vernarbung atonischer Geschwürs
te befördern.

Pilulae Acetatis Plumbi. (Pie. Ra.)

℞. Acetatis Plumbi,
Pulveris Althaeae,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae triginta sex. — Gabe,
vier bis zwölf Stück täglich, zur Mäßi-
gung der Schweiß Schwindsüchtiger. Ge-
wöhnlich sind acht bis zehn hinreichend.
Man läßt sie zu der Zeit nehmen, wo der
Schweiß beginnt.

Pilulae antiphlogisticae. (Pie.)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana sex.
Camphorae,
Nitri, singulorum . . . grana tria.
Conservae Rosarum
quantum sufficit
ut fiant pilulae sex. — Den Tag über
gegen übermäßige Schweiß Schwindsüchti-
ger und manche Brustentzündungen.

Pilulae stypticae. (E. Ra.)

℞. Acetatis Plumbi grana quatuor.
Opii purificati . . . granum unum.

Extracti Liquiritiae

scrupulum unum.

Fiant pilulae sedecim. — Dum erit
wendet sie gegen chronische colliquative
Diarrhoe zur Verminderung der Stuhlau-
leerungen an (Ra.)

℞. Acetatis Plumbi grana duodecim.
Opii . . . grana sex.
Conservae Rosarum

quantum sufficit

ut fiant pilulae duodecim. — Bei Blut-
speien und andern Blutflüssen von Nutzen.
(E.)

Pilulae Acetatis Plumbi et Ipecacuanhae.
(B+.)

℞. Acetatis Plumbi,
Ipecacuanhae,
singulorum drachmam unam.

Opii . . . grana decem.

Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae quadraginta. — Ha-
cher empfiehlt sie bei sogenannten passiven
Mutterblutflüssen. — Gabe, ein Stück
alle drei Stunden.

B. Präparate, in denen der
Bleizucker mit fetten Körpern
verbunden ist

*Ceratum saturninum s. Saturni s. Goul-
lardi.* (Gen.)

℞. Acetatis Plumbi . . . semunciam.
C-rati Galeni uncias duodecim.
Misce trititando.

*Oleum s. Balsamum Saturni s. Goular-
di.* (Hass. Ca. Pid. Pie. Vm.)

℞. Olei Terebinthinae quantum vis.
Calefac in vase vitreo et per parti-
unculas adde

Acetatis Plumbi pulverati
quantum sufficit

agitando continue, donec nihil amplius
dissolvatur; seponde deinde et liquorem
adhuc calidum decantha (Vm.)

Hass. Ca. Pid. et Pie. Acetatis sicc
uncias quatuor infundere jubent Es-
sentiae Terebinthinae uncias octo et in
digestione relinquere in arena per ho-
ras viginti quatuor.

Reizend, gegen stessende und schmerzhaft
Geschwüre, gegen Brand, jedoch mit Vor-
sicht anzuwenden.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum.
(Pie.)

℞. Trochisoorum alborum Rhazis
semunciam.

Acetatis Plumbi,
Mercurii dulcis,
singulorum drachmam unam.

Axungiae Porci quantum sufficit
ut fiat unguentum.

Unguentum s. Pomatum saturninum.
(Bo)

℞. Acetatis Plumbi . . . unciam unam.
Aceti de tillati . . . uncias octo.
Dissolve, ad siccum evapora; pulvera
et commisce cum
Axungiae Porci . . . uncias duabus.
Extracti Cicutae drachm's duabus.
Nach Barthez schmelzend und auflö-
send.

*Pomatum s. Unguentum antihæmorrhoi-
dale. (Pic.)*

℞. Poinati Limacum unciam unam.
Cerussae,
Laudam liquidi,
singulorum semidrachmam.
Acetatis Plumbi drachmas duas.
Pulveris Radicis Althæeae
quantum sufficit.

*Pomatum s. Unguentum resolvens. (Bo.
Pic. Sm.)*

℞. Acetatis Plumbi drachmas tres.
Camphorae . . . drachmas duas.
Cerae albae . . . unciam unam.
Olei Olivarum . . . uncias quatuor.
Barthez empfahl sie bei scorbutischen
Geschwüren.

*Ceratum Acetatis Plumbi. (D. Lon.
Lon N. C. Sw.)*

℞. Cerae albae . . . uncias duas.
Olei Olivarum . . . semioctarium.
Acetatis Plumbi pulverati
drachmas duas.
Liqua ceram in septem unci's olei,
adde sensim sal cum reliquo oleo tri-
tum et trititando misce. (Lon. Lon N.
C.)

D. Salis sesquiunciam, Olei dno-
decim et Cerae tres; — Sw. Salis drach-
mam unam, Olei uncias octo et Cerae
sesquiunciam.

Unguentum antihæmorrhoidale. (Bo.)

℞. Acetatis Plumbi grana quindècim.
Suberis usti pulverati semunciam.
Butyri recentis . . . uncias duas.
Misce trititando.

Unguentum oculare s. ophthalmicum.
(Sp.)

℞. Acetatis Plumbi scrupulum unum.
Unguenti albi drachmas quinque
Balsami Commendatoris
scrupulos duos.

Commisce bene.

*Ceratum saponaceum s. Pottii. (Ca. Sw.
Vm.)*

℞. Acetatis Plumbi pulverati
partes quatuor.

Saponis albi rasi

partem unam cum dimidia.
Misce intime in mortario marmoreo
in balneo aquae calefacto; aqua eva-
porata adde

Cerae albae . . . partes tres,
antea liquatas cum
Olei Olivarum . . . partibus tribus.
Misce bene trititando. (Vm.)

℞. Lithargyri . . . libram unam.
Aceti . . . libras octo.
Saponis . . . semilibram.
Coque blando igne ad humidi con-
sumptionem usque et adde

Olei Olivarum,
Cerae flavae,
singulorum libram unam.
Conterendo misce. (Ca. Sw.)

Austronend, zum Verbinden von Ge-
schwüren angewendet und hinsichtlich der
Wirkung von der Bleiweißsalbe nicht ver-
schieden.

Sparadrup resolvens. (Pic.)

℞. Cerae virgineae . . . uncias octo.
Olei Olivarum . . . libram unam.

Liquatis adde
Camphorae,
Salis Ammoniaci,
singulorum drachmam unam.
Acetatis Plumbi . . . unciam unam.
Fascias lineas in mixturam immerge.

Unguentum sedans. (Pic.)

℞. Sagapeni,
Gummi Ammoniaci,
singulorum drachmas sex.
Terebintinae,
Resinae Pini,
singularum uncias octo.
Aquae Vitae . . . quantum sufficit.

Solutioni adde
Acetatis Plumbi,
Cerussae, singulorum sesquiunciam.
Olibani . . . drachmas decem.
Euphorbii . . . drachmas tres.
Axungiae Porci . . . libram unam.
Olei Liliorum,
— Lavandulae,
Cerae albae,
singulorum quantum sufficit.

Reizend, ehedem für auflösend gehalten,
heutzutage nicht mehr gebräuchlich.

Emplastrum resolvens. (Bo. Pic.)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Florum Sulphuris . . . semunciam.
Picis albae . . . uncias duas.
Auf venerische Leistenbeulen anzuwenden.
— Man erneuert es alle zwei Tage.

C. Präparate, in denen Flüssig-
keiten das Exsiccans des Bleisul-
fers bilden.

Acetas Plumbi solutus s. liquidus, Aqua cum Saccharo Saturni s. saturnina, Solutio Acetatis Plumbi aquosa, Liqueur Plumbi acetici (A. Ba. BorC. DD. Ham. Li. Ra.)

℞. Acetatis Plumbi . . . partem unam.
Aquae destillatae . . . partes sex
Solutionem filtra. (A.) — A. nennt diese Formel sehr unpassend *Acetum Lithargyri*; — BorC. *Extractum Saturni*: dissolutio partis unius Salis in Aquae tribus; — DD. *Aqua saturnina*: solutio partis unius Salis in Aquae nonaginta sex.

Ba. Salis partem unam et novem Aquae; — Ham. et Li. Salis unam et Aquae quadraginta octo.

Ra. *Injectio resolvens*: Salis partem unam, Aquae viginti quatuor ad quadraginta octo.

Bor4. *Liquorem Plumbi acetici* indicans parationem ejus non indicat; ut reagens.

Solutio Acetatis Plumbi aquosa opiata. (Au.)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana duo.
Tincturae Opii . . . semidrachmam.
Aquae . . . uncias sex.
Gabe, alle drei Stunden ein Pöffel gegen übermäßige Schweisse Schwindsüchtiger.

Tinctura saturnino-martialis s. adstringens. (Au.)

℞. Acetatis Plumbi . . . unciam unam.
Sulphatis Ferri . . . semunciam.
Alcoholis . . . uncias octo.
Gabe, zehn Tropfen für Kinder, zwanzig für Erwachsene; bei Blutflüssen, besonders aus der Nase.

Aqua ophthalmica. (B*. GalM. T.)

℞. Acetatis Plumbi grana quindecim.
Aquae Rosarum . . . uncias sex
GalM. collyrium fere simile indicat.
℞. Acetatis Plumbi . . . drachmas sex.
Zinci sulphurici . . . semiscrupulum.
Aquae Rosarum . . . uncias sex.
Bei hartnäckigen Augenentzündungen einige Tropfen in's Auge zu tröpfeln. (T.)

Lotio antiseptica. (Pie.)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aquae Plantaginis . . . uncias duas.

Collrium resolvens. (Gen. Li. Au. Pie. Ra.)

℞. Acetatis Plumbi semiscrupulum.
Aquae . . . uncias duas.
Dissolve. (Gen.)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana sex.
Infusi Florum Sambuci . . . uncias quatuor.

Solutioni adde
Alcoholis vulnerarii drachmas duas.

Misce bene. (Ra.)

℞. Acetatis Plumbi in Aqua dissoluti partes tres.
Mucilaginis Cydoniorum . . . partem unam.

Misce. (Li.)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Aquae Plantaginis,
— Rosarum,
singularum uncias duas.

Misce. (Pie)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana tria.
Opii . . . grana quatuor.
Seminum Cydoniorum grana sex.
Aquae Rosarum . . . uncias duas vel tres.

Misce. (An.)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana decem.
Aluminis . . . drachmam unam.
Aquae Rosarum . . . uncias quatuor.

Misce. (Au.)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana tria.
Seminum Cydoniorum grana sex.
Aquae Rosarum,
— Foeniculi,
singularum uncias duas.
Laudani liquidi Sydenhami . . . sesquidrachmam.

Misce. (Au.)

Julep s. Julapium leniens. (Pie)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana octo.
Aquae Buglossi,
— Nymphaeae,
singularum uncias tres.
Syrupi Papaveris albi . . . unciam unam.

Gargarisma sedans. (Pie.)

℞. Acetatis Plumbi grana sexaginta.
Opii gummosi . . . grana sex.
Aquae Rosarum . . . uncias octo.
Syrupi Mororum . . . unciam unam.

Collutorium Catechu saturninum s. adstringens. (Au.)

℞. Catechu . . . drachmas tres.
Aquae Calcis . . . uncias duodecim.
Acetatis Plumbi scrupulum unum.
Mellis rosati . . . uncias duas.

Fomentum saturninum; Fomentatio resolvens. (Au.)

℞. Acetatis Plumbi drachmas duas.
Aceti . . . uncias tres.
Aquae . . . uncias viginti quatuor.
Bon Girtanner gegen Phimosi empfohlen.

Gargarisma saturninum s. adstringens. (Au.)

℞. Herbae Salviae . . . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut decocti unciae quatuor obtineantur, quarum colaturae adde

Aluminis . . . drachmam unam.
Aquae saturninae . . . uncias duas.

Bei Mercurialspeichelfluß empfohlen.

Injectio adstringens. (Au.)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana duo.
Aquae . . . unciam unam.

Bei beginnendem Tripper empfohlen.

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Essentiae Terebinthinae . . . unciis quinque.

Solutioni Camphorae pauxillum addatur. — Von Hoffmann ein remedium divinum gegen chronischen Tripper genannt.

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aquae . . . unciis sex.
Liquoris Myrrhae . . . unciis duas.
Tincturae Opii . . . unciam unam.
Bei chronischer Gonorrhoe.

Potio ad tussim convulsivam. (Ca.)

℞. Acetatis Plumbi . . . grana duo ad quatuor.
Aquae Rosarum . . . unciis duas.
Syrupi Violarum . . . drachmas duas.
Von Robert L. Ho m a s alle vier Stunden zu einem Kaffeelöffel voll empfohlen.

Injectio saturnina myrrhata s. cum Myrrha. (B.)*

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aquae destillatae . . . unciis sex.
Solutioni adde
Tincturae Myrrhae aquosae . . . unciis duas.
— thebaicae unciam unam.

Frank rühmte sie bei chronischem Mutterblutfluß. — Hierher gehört auch die *Aqua vulneraria Plenckii (Bo.)*, wozu die Formel folgende ist:

℞. Aquae Calcis . . . libram unam.
Fuliginis ardentis fornacis . . . unciam unam.

Cerussae . . . semunciam.
Coque per semihoram et adde deinde
Olei Myrrhae . . . semunciam.
Wahrscheinlich bildet sich bei dieser Operation etwas brenzlich-essigsaurer Kalk und etwas brenzlich-essigsaurer Blei.

Decoctum ad fungos articulorum s. ad lupias synoviales Heisteri. (Br. Sp.)

℞. Lithargyri . . . unciis sex.
Boli Armenae . . . unciam unam.
Masticis,
Myrrhae, singularum semunciam.
Aceti . . . libras duas.
Coque leni igne per horam dimidiam. — In Lösung angewendet.

Aqua vegeto-mineralis Bellii. (B.)*

℞. Acetatis Plumbi . . . semunciam.
Aceti boni . . . unciis quatuor.
Aquae destillatae . . . libras duas.

Injectio adstringens. (Sá)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Aceti destillati . . . libram unam.
Aquae Rosarum . . . sesquilibram.
Bei Mutterblutflüssen.

Fomentatio leniens s. sedans. (Pie.)

℞. Acetatis Plumbi,
Camphorae, . . . singularum unciis duas.
Oxycrati . . . unciis sex.
Aquae frigidissimae . . . quantum sufficit.

Injectio aluminosa composita. (Sy.)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aluminis . . . semidrachmam.
Sulphatis Zinci grana octodecim.
Aquae destillatae unciis sedecim.
Ein schlechtes Präparat, welches man gegen Tripper empfohlen hat.

Collyrium tengianum. (Pie.)

℞. Aceti Plumbi . . . grana quindecim.
Salis Ammoniaci . . . grana tria.
Aquae Rosarum . . . unciis tres.

Aqua vulneraria camphorata. (Ham. Wür. Pie. Sp.)

℞. Acetatis Plumbi drachmas duas.
— destillatae libram unam.
Alcoholis camphorati unciis duas.
Serva. (Ham.)
℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Camphorae in uncia una Alcoholis dissolutae . . . unciis tres.
Adde sensim, vas agitando,
Aquae fontanae libras quatuor.
Serva. (Wür. Pie. Sp.)

Lac virginalis. (Pie.)

℞. Lithargyri . . . unciam unam.
Cerussae . . . drachmas tres.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Dissolve in
Aceti albi . . . unciis duabus.
Solutioni adde
Aquae Solani,
— Lactucae,
— Nymphaeae, . . . singularum unciis tres.
Post aliquot dies sepositionis filtra.
Zum Waschen des Gesichts, drei oder vier Mal täglich.

Opiatum leniens s. sedans. (Pie.)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Nitri . . . drachmas sex.

Conservae Cynorrhodi uncias duas.
Syrupi Capilli Veneris

quantum sufficit.
Gegen Seilheit bei beiden Geschlechtern gepriesen. — Gabe, eine halbe Drachme Morgens und Abends. Man kann auch Laudanum und Campher hinzusetzen.

Tinctura antiphthistica Gramanni. (B.
Wir.)

℞. Acetatis Plumbi . . . semunciam.
Sulphatis Ferri drachmam unam.
Aceti,
Alcoholis, singulorum uncias duas.
Aquae Rosarum . . . drachmas sex.

Dissolve acetatum in aceto blandi ignis ope; adde sulphatam pulveratum et post solutionem liquori affunde alcohol cum Aqua Rosarum mixtum; stent blando calori seposita.

Von Gramann, Wedel, Bogel und Andern gegen die colliquativen Schweisse und Diarrhöden schmerzhaftiger, auch gegen Tripper und nächtliche Pollutionen empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen. — Mit Recht bemerkt Wir.: „capite tamen ubique, vel nunquam adhibendum esse, censuimus.“

Protogallas Plumbi.

Nie wird dieses Salz eigens bereitet, sondern es bildet, wenigstens sehr wahrscheinlich, die Basis folgender beiden Präparate.

Magma scytodepsicum ex Quercu, Lini-
mentum saturnino-quercicum. (B.
Au.)

℞. Corticis Quercus pulverati
unciam unam.

Aquae fontanae . . . uncias sex.
Decoque ad dim. dii remanentiam; in colaturam instilla

Extracti Saturni circiter
semunciam.

Filtra liquorem et praecipitatum absque siccando sub alcohole serva. — Autenrieth rühmte diese Substanz beim Aufliegen.

Lotio Quercus saturnina s. adstringens.
(Au.)

℞. Decocti Corticis Quercus,
Aquae saturninae,
singulorum uncias sex
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Liquoris Myrrhae . . . uncias duas.
Bei Excoriationen, welche den Brand drohen.

Proto-Oleo Margaras Plumbi.

Dieser Name, unter welchem wir alle Pflaster vereinigten, in welchen eine innige

Verbindung zwischen dem Protoryd des Bleis und den sauren Producten, welche durch die Einwirkung der Grundbestandtheile fester Körper mittelst der Wärme auf einander hervorgehen, stattfindet, ist nicht ganz genau. Denn in der That enthalten die meisten Pflaster, außer ksaurem und fettsaurem noch stearsaures, einige captaures, vielleicht auch buttersaures und einige endlich, schwefel- und essigsaures Blei. Doch schien er uns wegen seiner Kürze und weil doch jene beiden Salze am häufigsten vorhanden sind, passend zu seyn.

Man bereitet die Bleipflaster bald mit Bleiglätte, bald mit Mennige und bald mit Bleiweiß, wesshalb wir sie unter drei verschiedene Abtheilungen gebracht haben; zu irgend einer von ihnen haben wir auch diejenigen gesetzt, welche zwei und selbst drei dieser Zusammensetzungen enthalten. Zweckmäßig scheint es uns zu erinnern, daß, nach Hagen, ein Theil Bleiweiß einen Theil, ein Theil Mennige anderthalb und ein Theil Bleiglätte zwei Theile Del zu seiner Auflösung erfordert. Die Untersuchungen Penry's haben gelehrt, daß 1) in Bezug auf feste Körper die von Natur schleimigen Oele oder die welche es erst geworden sind, sehr schlüpfrige Pflaster geben; daß das Olivenöl vor allen den Vorzug verdient und daß das Schweinesett sich in dieser Hinsicht nur wenig von ihm unterscheidet; 2) in Bezug auf die Dryde, daß die Mennige sich nur langsam und schlecht verbindet; daß das gelbe Bleioryd nur eine lockere Masse liefert; daß die Bleiglätte vor allen am meisten zu der Befertigung von Pflastern paßt und daß endlich die Englische der Hamburger vorzuziehen ist.

§. III. Präparate mit dem Protoryde des Bleis (Bleiglätte).

Emplastrum commune s. diachylum s. Lithargyri s. Lithargyri simplex s. Oxydi Plumbi semivitrei s. Oxydi plumbici s. Plumbi, Emplastrum simplex, Ceratum Oxydi Plumbi semivitreum, Emplastrum Protoxydi Plumbi fusi.

1) Emplastrum diachylum simplex s. Oxydi Plumbi mucilaginosum. (hr. His. Li. Pal. Sar. Wir. Wür. Sp.)

℞. Mucilaginis Foenu graeci,
— Seminum Linii,
— Radicis Althaeae,
singulorum libram unam.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Lithargyri pulverati libras duas.
Coque oleum et oxydum super leni igne, addendo subinde Aquae fontanae

unciam unam ad duas et agita continue; tunc immisis mucilagibus, coquere continua blando igne, donec massa consistentiam requisitam habeat. (Br. Sar. Wir. Wür. Sp.)

Pal. eandem formulam, sed Lithargyri solum sesquilibrium indicat.

℞. Radicis Althaeae,
Seminum Lini,

singulorum semilibram.

Aquae libras octo.

Infunde et tunc coque ad extrahendum mucilaginem et cola exprimendo; deinde

℞. Hujus mucilaginis . libras tres.

Lithargyri pulverati libras duas.

Olei Olivarium . libras quatuor.

Coque oleum una cum lithargyro, mucilaginem pedetentim addendo, ad emplastri consistentiam. (His.)

℞. Emplastri albi cocti,

— emollientis,

singulorum libras duas.

Liqua blandissimo igne et sedulo misce. (Li.)

Dieses Pflaster ist ganz in Vergessenheit gekommen; man hat den Namen desselben aber vermöge eines sehr gewöhnlichen Mißbrauchs dem folgenden beigelegt, obgleich es, was doch sowohl das griechische als das lateinische Beiwort bezeichnet, kein Atom Schleim enthält.

2) *Emplastrum simplex s. diachylon simplex s. Lithargyri simplex s. commune.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Br. C. Ca. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Lithargyri pulverati,

Olei Olivarium,

Axungiae Porci,

singulorum partem unam.

Caesac sensim, spatulae ope agitando; aqua massae infusa coque, continue agitando et pro aqua evaporata novam addendo, donec nullum lithargyri amplius vestigium animadvertatur; tunc ab igne remotum malaxa in aqua frigida. (Gal. GalM. Ca.)

Ams. et B. Axungiae partes duas, Olei et Lithargyri, singulorum tres.

℞. Lithargyri partem unam.

Olei Olivarium partes duas.

Fac ut antea. (A. Am. An. Bel. D. DD. Du. Ed. Fer. R. Br. C. Vm.)

Sw. Lithargyri partem unam et quatuor Olei; — Hass. HassP. Lithargyri quatuor et septem Olei; — Gen. Lithargyri quatuor et Olei duas cum dimidia; — Vm. Lithargyri duas et tres Olei; — Lon. LonN. et Lus. Lithargyri quinque et octo Olei (Aquae octa-
Pharmacopoea universalis. II.

rios duos, qui si coquendo sint consumpti, Aquae fervidae pauillum est adjiciendum LonN.); — Fenn. Lithargyri quatuor et Olei tres; — Ba. Bor. Bor4. Du. Han. O. Sax. et Suec. Lithargyri quinque et novem Olei; —

T. Olei quatuor, Aquae duas et Lithargyri tantidem; — Fi. Olei duas, Lithargyri et Aquae singulorum unam.

℞. Lithargyri partes sex.

Axungiae partes quindecim.

Eodem modo procede ut antea. (Pol. Vm.)

Dieses Pflaster, welches in der chirurgischen Praxis sehr in Gebrauch ist, dient besonders, um Wunden und Geschwüre, deren Oberfläche nicht der Eig einer zu heftigen Entzündung ist, gegen die äußere Luft zu schützen. Auch kommt es zu vielen andern Gebrauchen.

Cereoli exploratorii, Candelae cereae s. saturninae, Specilla cerea. (Li.)

℞. Emplastri simplicis uncias quatuor.

Liquato blando igne adde

Cerae sesquunciam.

Olei Olivarium uncias tres.

In miscellam immerge fascias lineas apte concisas, quas in cereolos forma, (Li. Vm.)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.

Cerae albae partes octo.

Emplastri simplicis partes quatuor.

Fiant cereoli. (Vm.)

Ceratum saturninum. (Vm.)

℞. Emplastri simplicis . partes sex.

Cerae albae partem dimidiam.

Liquata seorsim misce et adde

Olei Olivarium

partes duas cum dimidia.

Emplastrum anodynum s. Sebi anodynum. (His.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.

Cerae albae uncias sex.

Axungiae Porci uncias quatuor.

Sebi hircini uncias duas.

Liqua simul. — Addendo Olei Olivarium uncias quatuor, habes *Ceratum anodynum.*

Emplastrum epuloticum s. Oxydi Plumbi epuloticum. (His.)

℞. Lithargyri,

Olei Olivarium,

Axungiae Porci,

singulorum libras tres.

Coque cum Aquae sufficientia quantitate, continue agitando, donec massa non amplius digitis adhaereat; adde deinde

Cerae albae uncias novem.

Resinae Pini uncias sex.

Coctionem ad emplastri consistentiam continua. — Dieses Pflaster unterscheidet sich kaum von dem einfachen. Mit

unrecht giebt ihm His. den Namen *empl. diapalmae*.

Tela emplastica epulotica, Sparadrapus pallidus s. epuloticus. (His.)

℞. Emplastri epulotici . libras duas.
Cerae flavae . . . semilibram.

Liqua et massam supra fascias lineas extende.

Unguentum ad haemorrhoides s. anti-haemorrhoidale s. ad varices ani. (Sar.)

℞. Radicis Scrophulariae recentis . . . uncias tres.
Foliorum Hyoscyami albi . . . manipulos tres.

Butyri recentis . . . sesquilibram.
Lithargyri . . . uncias duas.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.

Coque lente radicem et folia in butyro ad humidi consumptionem, cola exprimendo, adde lithargyrum, agta bene ad perfectam refrigerationem usque et admisce denique vitellos.

Emplastrum roborans s. adstringens. (C. Sw.)

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Liquatis adde
Pulveris Sanguinis Draconis . . . uncias tres.
— Olibani . . . semilibram.
Misce bene.

Ceratum fuscum, Unguentum fuscum s. Oxydi Plumbi fuscum s. Oxyduli Plumbi semivitrei adustum s. Acetatis Plumbi carbonatum s. matris s. matris Theclae, Emplastrum fuscum s. fuscum Protoxydi Plumbi fusi. (A. An. B*. Ba. Bel. Br. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. His. Li. Sax. Wir. Wür. Br. Sp. Sw. Vm.)

℞. Olei Olivarium partes quingentas.
Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Sebi vervecini, singulorum partes ducentas quinquaginta.

Liqua et adde sensim

Lithargyri

partes ducentas quinquaginta.

Coque donec massa colorem nigrescenti-fuscum acceperit; adde deinde mixturam fuscam e

Cerae flavae

partibus centum nonaginta.

Vicis nigrae partibus octoginta.
Effunde in modulos chartaceos.

(E*. Gal.)

GalM. butyrum omittit, duplicem Axungiae quantitatem adhibendo.

℞. Axungiae Porci,
Butyri recentis,

Sebi vervecini,
singulorum partem unam.

Coque et adde

Lithargyri . . . partem unam.

Coque, continue agitando, donec massa fusca sit reddita; adde deinde Cerae flavae . . . partem unam.

Post refrigerationem serva. (B*. Br. Sax. Sp.)

℞. Axungiae Porci,
Olei Olivarium,
singulorum libras duas.

Butyri recentis,

Cerae flavae,

singulorum libram unam.

Mixta calefac, donec in carbonem verti coeperint et adde

Lithargyri pulverati libram unam, spathulae lignae ope continue agitando, donec massa colorem nigrescenti-fuscum acceperit. (Am. Bel.)

℞. Axungiae Porci,

Butyri recentis,

Cerae flavae,

Sebi vervecini,

singulorum uncias quatuor.

Olei Olivarium . semidrachmam.

Liqua corpora grassa supra lenem ignem, adde lithargyrum, et coque continue agitando, donec emplastrum nigrum sit redditum (Wir. Sw. Vm.)

Wir. Axungiae uncias quatuor, Butyri, Sebi vervecini, Cerae, singulorum tantidem, Olei libram unam et Lithargyri uncias quatuor; — Gen. et His. Olei libram unam, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi hircini et Lithargyri, singulorum semilibram; — Br. Olei uncias quindecim, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi vervecini et Lithargyri, singulorum semilibram; — Li. Olei uncias sex, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi cervini et Lithargyri, singulorum uncias sex.

℞. Axungiae Porci

uncias quatuordecim.

Sebi vervecini,

Cerae flavae,

Lithargyri pulverati,

singulorum uncias quatuor.

Coque, donec mixtura colorem fuscum acceperit. (A.)

℞. Axungiae Porci,

Olei Olivarium,

singulorum uncias sex.

Cerae flavae . . . uncias duas.

Massae liquatae et bullienti sensim adde

Lithargyri pulverati . uncias duas.

Coque, donec unguentum nigrum sit factum. (Ful.)

℞. Emplastri Diachyli simplicis,

Axungiae Porci,
singulorum partes tres.

Cerae flavae . . . partem unam.

Liqua, ignem ad nigrescentiam massae augendo. (Vm.)

℞. **Emplastri Diachyli simplicis**
partes quatuordecim.

Coque, continue agitando, donec colorem fuscum acceperit; adde deinde

Picis nigrae . . . partem dimidiam.

Sebi vervecini . . . partem unam.

Serva. (Ba.)

℞. **Emplastri Norimbergensis**
partes octo.

Olei Olivarum partes quinque.

Calefac, donec mixtura colorem fuscum acceperit. (Han.)

Diese Salbe gilt für erweichend und zeitigend.

Emplastrum Hjerneri s. saponaceo-plumbicum. (Suec.)

℞. **Saponis Potassae duri et rasi**
partes decem.

Olei Olivarum

partes quadraginta quinque.

Liqua saponem in oleo et adde

Pulveris Lithargyri

partes octodecim.

— **Cerussae** . . . partes novem.

Coque, donec massa colorem fuscum acceperit; adde

Terebinthinae communis

partem unam cum dimidia.

Emplastrum diapalmae s. diaphoenicon.
(Br. Pal. Sar. Wir. Pid. Sp. T. Vm.)

℞. **Olei Palmae** . . . partes sex.

— **Olivarum** partes sexaginta sex.

Foliorum tenerorum Quercus

partes octo.

Coque ad humidam consumptionem usque, cola exprimendo et colaturae adde

Lithargyri pulverati

partes quadraginta octo.

Coque ad consistentiam emplastri sensim addendo solutioni aquosae

Vitrioli albi . . . partes quatuor.

Serva. (Sp.)

Br. Sar. et Wir. **Axungiae Porci,**

Olei Olivarum, Foliorum Quercus,

Lithargyri, singulorum partes octo et unam Vitrioli albi in duodecim Aquae dissoluti; — Pal. Axungiae vetustae

partes sex, **Olei Palmae novem vel Olivarum quantum vis, Lithargyri tantidem et Vitrioli albi in Aqua dissoluti unam.**

℞. **Lithargyri** . . . libras duas.

Axungiae . . . libras tres.

Coque, sensim addendo

Aquae, cujus unciae sedecim Alu-

minis drachmam unam in solutione tenent quantum sufficit.

(Pid.)

℞. **Olei Olivarum** . . . partes novem.

Axungiae . . . partes sex.

Lithargyri . . . partes novem.

Zinci sulphurici . . . partem unam.

Fiat emplastrum. (Vm.)

Einfacher ist folgende Formel von Soubeiran:

℞. **Emplastri simplicis**
partes ter mille.

Sulphatis Zinci

partes centum viginti octo.

Liquefac emplastrum, adde sulphatem in Aqua dissolutam et igni modico, continue agitando, relinque, donec

omnis humor evanuerit.

℞. **Emplastri simplicis** . . . libras duas.

Axungiae Porci . . . uncias sex.

Ferri sulphurici cum sufficiente

quantitate Olei Olivarum in pul-

tem redacti . . . uncias duas.

Fiant magdaleones. (T.)

Ein in sehr gelindem Grade abstringirendes Pflaster, welches Sar. et Sp. unrichtig e. diachalciticos nennen, da in letzterem statt des weißen Bitriols rothcalcinirtes Schwefeleisen oder Chalcit enthalten ist.

Sparadrap, Sparadrapus s. Sparadrapum album; Tela Gualthieri. (GalM. Wir. Sp.)

℞. **Emplastri diapalmae,**

— **simplicis,**

— **singulorum libram unam.**

— **albi cocti semilibram.**

Liquatis adde

Pulveris Iridis Florentinae

sesquiunciam.

Massam supra fascias linteas extende. (Wir. Sp.)

℞. **Emplastri simplicis,**

— **Diachyli gummosi,**

— **singulorum partes quindecim.**

Cerae flavae . . . partes quinque.

Terebinthinae . . . partes tres.

Liqua in balneo aquae, tunc supra linteum extende. (GalM.)

Emplastrum confortativum Vigonis s. defensivum rubrum s. Ferri s. Oxydi Plumbi rubrum s. Oxydi Plumbi semivitrei cum Sulphate Ferri calcinato s. Oxydi Ferri rubri s. stuccicum s. roborsans s. stypticum s. siliquarum. (B. Br. Du. Ed. Fer. GalM. His. Pal. Sar. Wir. C. Fi. Sp. T. Vm.)

℞. **Pulveris Lithargyri,**

— **Minii,**

— **Calaminae,**

— **singulorum semilibram.**

Olei Olivarum,
singulorum libram unam.
Coque igne blandissimo, continue
agitando et adde sensim Aquae libram
unam in solutione tenentem.
Vitrioli albi . . . unciam unam.
Emplastro consistentiam requisitam
obtentio adde
Colophonii,
Cerae flavae,
singulorum libram unam.
Terebinthinae,
Olei Baccarum Lauri,
singulorum semilibram.
Gummi Ammoniacy,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhae,
Aloës hepaticae,
Aristolochiae longae,
Sanguinis Draconis,
Haematitis,
singulorum unciam unam.
Miscere bene. (Br. Pal. Wir.)
℞. Lithargyri,
Minii,
Olei Lini,
— Olivarum,
singulorum uncias duodecim.
Coque ad consistentiam emplastri,
Aquam addendo in solutione tenentem
Vitrioli albi . . . uncias quatuor.
Coctione finita adde
Colophonii,
Cerae, singulorum uncias viginti
quatuor.
Terebinthinae . . . uncias duodecim.
Massa colatâ colaturae adde
Pulveris Gummi Ammoniacy,
— Galbani,
— Bdellii,
— Myrrhae,
— Aloës hepaticae,
— Mumiae,
— Radicis Aristolochiae lon-
gae,
— Sanguinis Draconis,
— Haematitis,
singulorum uncias duas.
Olei Baccarum Lauri
uncias duodecim.
Miscere bene. (Sp.)
℞. Mucilaginis Radicis Consolidae ma-
joris . . . libras sex.
Olei Juglandis . . . libras quatuor.
Minii,
Lithargyri,
singulorum libram unam.
Calaminae . . . uncias quatuor.
Sanguinis Draconis,
Colcothar,
Aluminis, singulorum unciam unam.

Radicis Aristolochiae rotundae
sesquiunciam.
Coque minium, lithargyrum et cala-
minam cum oleo, mucilaginem sensim
addendo et reliqua pulverata cum mas-
sa parumper refrigerata commisce.
(Sar.)
℞. Mucilaginis Radicis Althaeae,
— — Consolidae ma-
joris,
Olei Myrrhae,
singulorum libras duas.
Sebi hircini,
Lithargyri praeparati,
singulorum libram unam.
Minii uncias sex.
Terebinthinae,
Mastichis,
Boli Armenae,
singulorum uncias quatuor.
Coque oxyda cum mucilagibus, se-
bo et oleo; adde deinde terebinthi-
nam, bolum et denique mastichem.
(Sar.)
℞. Radicis et Foliorum Consolidae
majoris,
Baccarum Myrti,
Petalarum Rosarum rubrarum,
Summitatum Hyperici,
singulorum uncias quatuor.
Aquae libras novem.
Coque ad tertiae partis usque con-
sumptionem; tunc
℞. Olei Olivarum uncias quatuor.
Sebi hircini libram unam.
Lithargyri libras duas.
Coque ad consistentiam emplastri,
sensim addendo decoctum praemoni-
tum, tunc in massa liqua
Cerae flavae libram unam.
Terebinthinae uncias tres.
Post sufficientem decoctionem em-
plastro semirefrigerato adde mixtu-
ram e
Pulveris Olibani,
— Myrrhae,
— Mastichis,
singulorum uncias duabus.
— Sanguinis Draconis
uncias tribus.
— Boli Armenae
uncias quatuor.
— Minii uncias sex.
Miscere bene. (His.)
℞. Resinae Pini,
Colophonii,
singulorum uncias quatuor.
Cerae flavae, uncias sex.
Massae liquatae et colatae adde
Extracti Siliquarum dulcium ad
mellis consistentiam redacti
libram unam.
Emplastri Minii uncias quatuor.

Ferri subcarbonici porphyrisati
drachmas sex.

Misce bene. (His.)
℞. Lithargyri . . . unciās duodecim.
Olei Olivarum . . . unciās viginti quatuor.

Coque ad consistentiam emplastri,
tunc in massa liqua
Cerae flavae,
Terebinthinae Venetae,
Olibani, singulorum unciās duas.

Liquat's adde
Colcothar . . . unciās tres.

Misce bene. (Sp.)
℞. Cerae flavae,
Resinae Pini,
singulorum partem unam.

Liquatis adde
Emplastri simplicis partes sedecim.
Momento quo refrigescunt adde
Terebinthinae . . . partem unam,
tritae calide cum
Colcothar loti
parte una cum dimidia.

Misce bene. (Vm.)
℞. Emplastri simplicis . . . libras duas.
Resinae Pini . . . semilibram.
Cerae flavae,
Olei Olivarum,
singulorum unciās tres.
Colcothar . . . unciās octo.
Oxydum cum oleo tritum adde reli-
quis leni igne liquefactis. (B.)
Ed. C. et F. Emplastri simplicis
partes viginti quatuor, Resinae Pini
sex, Cerae flavae tres, Olei tantidem
et Oxydi Ferri octo; — T. Diachyli
simplicis unciās sedecim, Olei Oliva-
rum duas, Resinae Pini quatuor, Cerae
flavae duas et Colcothar quinque et
scrupulos octo.

℞. Emplastri simplicis,
— Diachyli gummosi,
Cerae flavae,
Olei Olivarum,
Colcothar,
singulorum partes aequales.

Oxydum cum olei pauxillo porphy-
risa et reliquis substantiis fuis adde.
(GalH.)
℞. Emplastri simplicis . . . libras duas.
Olibani . . . semilibram.

Liquatis adde
Oxydi Ferri rubri . . . unciās tres.
Agitando bene misce. (Du.)

℞. Emplastri simplicis . . . libras duas.
Sebi vervecini . . . unciās sedecim.

Liquatis adde
Colcothar . . . unciās duas.

Misce sedulo. (Fer.)
Emplastrum imperiale s. Siliquarum im-
periale. (His.)
℞. Emplastri Picis nigrae,

Emplastri Minii,
— Opodeldoc (formula His.),
singulorum unciās quatuor.
— Resinae sulphurati,
— defensivi rubri (formula
His.), singulorum unciās duas.
Oxydi Ferri rubri . . . semunciam.
Acetatis Plumbi neutralis,
Camphorae pulveratae,
singulorum drachmas duas.

Liqua emplastra blando igne et mas-
sae antequam refrixerit, adde reliqua
pulverata et mixta.

Dieses Gemisch unterscheidet sich hinsicht-
lich der Wirkung nur wenig von dem
empl. defensiv. rubrum.

Emplastrum Collae ad herniam s.
Opodeldoc s. resolvens Raistingii. (His.
Wir. Bo. Pie.)
℞. Lithargyri . . . libras duas.
Olei Olivarum . . . libras duas cum dimidia.
Cerae flavae . . . libram unam.
Terebinthinae de Chio,
Olei Baccarum Lauri,
singulorum unciās quatuor.
Opopanacis . . . unciās duas cum dimidia.

Bdellii,
Gummi Ammoniaci,
Sarcocollae,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singulorum unciās duas.
Aloës Socotrinae . . . unciām unam.
Radice Aristolochiae unciās duas.
Camphorae . . . unciās tres.

Fiat emplastrum. (Bo. Pie.)
℞. Lithargyri . . . sesquilibram.
Olei Olivarum . . . libras duas.

Coque leni igne, sensim addendo
Aceti,
Aquae fontanae,
singulorum unciās quatuor,
donec massa colorem clare fuscum ob-
tinuerit. Adde
Cerae flavae . . . semilibram.
Terebinthinae . . . unciās quatuor.

Post refrigerationem adde mixturam
in Aceto dissolutam et ad mellis con-
sistentiam redactam e
Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis, singulorum unciā una.

Admisce deinde
Pulveris Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Calaminae,
— Olibani,
— Myrrhae,

Pulveris Mastichis,
singulorum unciam unam.
Olei Baccarum Lauri
sesquunciam.
Agita ad perfectam usque refrigerationem. (Wir.)
℞. Baccarum Myrti contusarum,
Lumbricorum cum Vino otorum,
singulorum uncias sex.
Aquae libras octo.
Decoque ad dimidium remanentiam;
tunc
℞. Hujus decocti libras tres.
Olei Olivarum libras duas.
Lithargyri libram unam.
Coque ad consumptionem humidi usque
et ad emplastri consistentiam; adde
deinde mixturam liquatam et colatam e
Cerae flavae libra una.
Picis nigrae,
Resinae Pini,
Colophonii,
singulorum uncias novem.
Adde deinde mixturam in Aceto dis-
solutam et ad mellis consistentiam in-
spissatam e
Galbani,
Gummi Ammoniaci,
singulorum uncias quatuor.
Emplastro semirefrigerato admisce
sensim mixturam e
Pulveris Myrrhae,
— Olibani,
— Mastichis,
— Sanguinis Hirci,
— Collae,
— Radicis Aristolochiae rotun-
dae,
— — — longae,
— — — Consolidae majoris,
— — — minoris,
— Gallarum,
— Boli Armenae,
— Gypsi,
— Mumiae,
singulorum uncias tribus.
Misce bene. (His.)
Diese unförmliche Mischung, mit welcher
einige der Formeln des empl. defens. ru-
brum Ähnlichkeit haben, wurde als schmel-
zend, auflösend, die Vernarbung befördernd
und adstringierend betrachtet.
Unguentum Apostolorum s. dodecaphar-
macum s. viride. (Br. Pal. Wir. Pte.
Sp.)
℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
singularum uncias duas.
Aristolochiae longae,
Olibani,
Bdellii,
Myrrhae,

Galbani, singulorum setunciam.
Opopanax,
Aeruginis,
singulorum drachmas duas.
Lithargyri unciam unam.
Olei Olivarum libras tres.
Coque oleum cum lithargyro super
igne blando, infundendo sensim Aceti
albi uncias duas; adde deinde ceram
liquatam cum resina, tunc massä paul-
lo refrigeratä, terebinthinam et deni-
que reliquas substantias pulveratas et
mixtas. (Br. Wir. Sp.)
℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae albae,
Gummi Ammoniaci, singulorum
drachmas quatuordecim.
Aristolochiae longae,
Olibani,
Bdellii, singulorum drachmas sex.
Galbani,
Myrrhae,
singulorum drachmas quatuor.
Opopanax,
Aeruginis,
singulorum drachmas duas.
Lithargyri drachmas novem.
Olei Olivarum libras tres.
Fac ut supra. (Pal.)
Pte. Terebinthinae, Gummi Ammo-
niaci, Resinae Pini, singulorum drach-
mas decem, Cerae flavae uncias duas
cum dimidia, Lithargyri drachmas no-
vem, Aristolochiae rotundae, Olibani,
Bdellii, singulorum unciam unam, Myr-
rrhae, Galbani, singulorum semunciam,
Opopanax, Aeruginis, singulorum
drachmas duas et Olei Olivarum ses-
quilibram.
Diese Salbe, jetzt mit Recht verges-
sen, galt ehemals für austrocknend, brandstillend
und die Vernarbung befördernd.
Emplastrum divinum. (Wir. Sp. Vm.)
℞. Aeruginis partem unam.
Emplastri simplicis
partes triginta sex.
Massam tam diu igni superimpo-
sitam tene, donec rubescat; adde de-
inde
Emplastri Diachyli gummosi
partes sex.
Resinae Pini partes duas.
Myrrhae
partem unam cum dimidia.
Misce bene. (Vm.)
℞. Lithargyri uncias sedecim.
Olei Olivarum uncias triginta duas.
Aeruginis unciam unam.
Coque et adde
Cerae flavae uncias octo.
Pulveris Galbani,
— Myrrhae,

Pulveris Bdellii,
singulorum uncias duas,
— Gummi Ammoniaci uncias tres.
— Olibani,
— Opopanacis,
— Mastichis,
— Radicis Aristolochiae rotun-
dae, singulorum unciam unam.
— Magnetis sesquiunciam.
Misce bene. (*Sp.*)
R. Lithargyri sesquilibram.
Olei Olivarum libras tres.
Emplastro adde
Cerae flavae uncias octo.
Pulveris Magnetis semilibram.
— Gummi Ammoniaci,
— Galbani,
— Opopanacis,
— Bdellii,
singulorum uncias tres.
— Myrrhae,
— Olibani,
— Mastichis,
— Aeringinis,
— Aristolochiae rotundae,
singulorum sesquiunciam.
Terebinthinae uncias quatuor.
Misce sedulo. (*Wir.*)
Emplastrum Ranarum simplex s. de
Ranis sine Mercurio s. Vigonis sine
Mercurio. (*His. Pal. Wir. Sp.*)
R. Olei Chamomillae,
— Anethi,
— Liliæ albæ,
singulorum uncias duas.
Adipis vitulinae semilibram.
Ranas no. 6.
Lumbricorum lotorum
libras tres cum dimidia.
Decocti Radicis Ebuli,
— — Inulae,
singulorum uncias duas.
Coque ad humidam disparitionem et
tunc (coque) colaturam cum
Lithargyri libra una.
Massae emplasticae adde
Pulveris Euphorbii
drachmas quinque.
— Olibani drachmas decem.
— Schoenanthi,
— Stoechadis,
— Matricariae,
singulorum semunciam.
Terebinthinae clarae uncias duas.
Styracis liquidæ sesquiunciam.
Adipis viperinae
uncias duas cum dimidia.
Olei Lavandulae uncias duas.
— Lini sesquiunciam.
Misce bene. (*Pal.*)
R. Ranas viventes no. 10.

Lumbricorum viventium
uncias quatuor.
Herbae Schoenanthi,
Stoechadis Arabicae,
Matricariae,
singulorum semunciam.
Radicis Inulae,
— Ebuli,
singulorum uncias tres.
Vini albi libras duas.
Aceti boni sesquilibram.
Coque lente ad dimidii usque rema-
nantiam, cola et colaturae sensim adde
massam emplasticae liquatam de
Olei Olivarum,
Lithargyri pulverati,
singulorum libra una.
Emplastrum ab igne removendo adde
Olei Baccarum Lauri,
Terebinthinae,
Cerae flavae,
singulorum uncias duas.
Pulveris Olibani drachmas sex.
— Euphorbii drachmas quinque.
— Styracis liquidæ,
— Croci, singulorum semunciam.
Misce bene. (*Wir. Sp.*)
R. Ranas viventes no. 80.
Radicis recentis Ebuli,
— — Bardanae,
singulorum sesquilibram.
Aceti libras tres.
Aquae libras novem
Macera per dies duos, coque deinde
ad dimidii consumptionem et cola;
tunc
R. Colaturae libras quinque.
Olei Olivarum libras novem.
Coque ad humidam consumptionem,
ab igne remove et adde
Axungiae Porci libras tres.
Lithargyri pulverati libras sex.
Decocti praemoniti
quantum sufficit.
Coque, donec massa digitis adhaerere
ces: avertit; adde deinde
Cerae flavae libras tres.
Terebinthinae uncias duas.
Massae fere refrigeratae adde
Pulveris Euphorbii unciam unam.
Misce sedulo. (*E.*)
Dieses so berühmte Pflaster kennt man
heutzutage fast nur noch dem Namen nach.
Es ist noch complicirter als das alte Dia-
dylonpflaster, unterscheidet sich aber von
demselben nur durch eine etwas stärker rei-
zende Wirkung.
Emplastrum Oxydi Plumbi diabota-
num s. resolutivum s. diabotanium Blon-
delli. (*His. Sar. Wir. Sp.*)
R. Radicis et Herbae recentis Bardanae,

Radices et Herbae recentis Chamaepityos;

—	—	—	Valerianae,
—	—	—	Angelicae,
—	—	—	Inulae,
—	—	—	Aristolochi-
—	—	—	ae rotundae,
—	—	—	Raphaniru-
—	—	—	sticani,
—	—	—	Elaterii,
—	—	—	Scrophula-
—	—	—	riae,
—	—	—	Panis por-
—	—	—	cini,
—	—	—	Chelidonii
—	—	—	minoris,

singulorum libras quatuor.

Succi Cicutae,	
— Hormini,	
— Chelidonii majoris,	

singulorum libras quatuor.

Lithargyri praeparati

libras duas cum dimidia.

Olei Olivarum . libras quatuor.

Cerae flavae,

Terebinthinae,

Colophonii,

Tacamahacae,

Sulphuris,

singulorum libram unam.

Asphalti,

Olibani,

Mastichis,

Myrrhae, singulorum uncias sex.

Euphorbii,

Camphorae,

singulorum sesquiunciam.

Olei essentialis Caryophyllorum

semunciam.

Contunde herbas et radices mundatas, infunde succos, et per duos dies macera, tunc ad dimidii consumptionem coque; cola exprimendo, colaturam cum oleo et lithargyro, continue agitando, ad aptam consistentiam coque, adde ceram, colophonium et terebinthinam, tunc tacamahacam, mastichem et euphorbium, denique post refrigerationem emplastri, reliquas substantias pulveratas et cum oleo caryophyllorum tritas. (Sar.)

℞. Lithargyri pulverati libras duas.

Olei Olivarum . libras quatuor.

Aceti boni . . quantum sufficit.

Coque ad consistentiam emplastri, sub finem addendo mixturam liquatam e

Succi inspissati Cicutae,

— — Chelidonii majoris,

— — Elaterii,

singulorum unciis duabus.

Extracti Radicis Inulae,

— — Valerianae,

singulorum semuncia.

Coque denuo per aliquot momenta et adde tunc mixturam fusam et colatam e

Cerae flavae,
Picis nigrae,
Terebinthinae,
singulorum semilibra.

Styracis liquidae . uncias tribus.

Massae fere refrigeratae admisce

Pulveris Gummi Ammoniaci,

— Galbani,

singulorum uncias tres.

— Olibani . . uncias duas.

— Mastichis,

— Tacamahacae,

singulorum unciam unam.

— Baccarum Lauri,

— Radicis Iridis,

— Hellebori nigri,

— Seminum Cumini,

singulorum drachmas sex.

Olei Olivarum . . uncias tres.

Camphorae in hoc oleo dissolutae

semunciam.

Misce bene. (E.)

℞. Herbae et radices recentium Bar-

danae,

— Petasitidis,

— Calendulae,

— Chamaepi-

tyos,

— Ievistici,

— Valerianae,

— Angelicae,

— Cicutae,

— Inulae,

— Armoraciae,

— Elaterii,

— Scrophula-

riae,

— Sedi mino-

ris,

— Chelidonii

majoris,

— Chelidonii

minoris,

— Gratiolae,

singulorum uncias tres.

Aquae . . libras viginti.

Coque ad dimidii remanentiam, cola exprimendo et adde colaturae

Succi Cicutae,

— Chelidonii majoris,

— Hormini,

singulorum libras duas.

— Sedi minoris semilibram.

Consumae ad extracti mollioris usque consistentiam; tunc

℞. Hujus extracti . . semilibram.

Galbani,

Gummi Ammoniaci,

Opopanaci,

Sagapeni,

singulorum uncias quatuor (duas).

in Aceto scillitico dissoluta et ad extracti consistentiam evaporata; tunc

℞. Lithargyri pulverati libram unam.
 Olei Lumbri corum,
 — Catellorum,
 — Meliloti,
 — Mucilaginis,
 singulorum uncias quatuor.
 Aquae fontanae . . . uncias decem.
 Coque ad consistentiam emplastri, cui adde sensim extractum cum gummatibus mixtum et

Florum Sulphuris
 uncias septem cum dimidia.

Pulveris Radicis Iridis Florentinae,
 — — Panis porcini,
 — — Ranunculi tuberosi,
 — — Coronae imperialis,
 — — Serpentariae,
 — — Hellebori albi,
 singulorum drachmas tres.
 — — Sigilli Salomonis,
 — — Ari,
 singulorum semunciam.
 — — Aristolochiae longae,
 — — — rotundae,
 — — Clematidis,
 singulorum drachmam unam.

Baccarum Lauri drachmas duas.
 Seminum Angelicae,

— Nasturtii,
 singulorum drachmas tres.

— Cumini . . . sesquiunciam.
 Fimi columbini . . . semunciam.

Pulveris Asphalti,
 — Olibani,

— Mastichis,
 singulorum uncias quatuor.

— Tacamahacae uncias sex.
 — Bdellii,
 — Myrrhae,

singulorum sesquiunciam.

Adde deinde sensim mixturam liquatam e

Cerae flavae,
 Resinae Pini, singularum semilibram.

Adjice denique
 Styracis liquidae . . . uncias sex.

Camphorae in Olei essentialis Caryophyllorum semuncia solutae
 drachmas sex.

Olei lateritii drachmas decem.
 Serva. (Wir. Sp.)

Dieses ungeheuer von Zusammensetzung, welches seinen Namen der großen Menge Pflanzen, welche mit dazukommen, verdankt und ehedem dem empl. Vigonis gleichgeachtet, ja ihm von Manchen noch vorgezogen wurde, galt als schmelzend und auflösend, ist aber heutzutage vielleicht höchstens noch in Spanien in Gebrauch.

§. II. Mit dem Deutoryb des Bleis (Mennige) bereitet.

Unguentum magistrale s. de Minio s. Oxydi Plumbi rubrum. (His.)

℞. Minii uncias quinque.
 Cerussae,
 Lithargyri,

singulorum sesquiunciam.

Olei Rosarum . . . sesquilibram.
 Coque parumper, continue agitando et adde

Cerae albae . . . uncias quatuor.
 Agita ad perfectam refrigerationem usque.

Emplastrum resolvens opiaceum. (Bo.)

℞. Olei Lini libras duas.
 Minii,
 Cerussae,
 Cerae flavae,

singulorum uncias octo.

Terebinthinae . . . uncias tres.
 Opii pulverati . . . unciam unam.

Bei anfangenden schreibsen Geschwülsten.
 — Man legt täglich ein neues auf.

Emplastrum Oxydi Plumbi rubri camphoratum, Emplastrum s. Ceratum Noribergense s. Noricum s. tripharmacum s. Minii adustum s. Minii camphoratum s. Matris. (B*. Bor4. Br. D. Gal. Han. HassP. Sar. Sax. Wir. Ca. Fi. Sp. Vm.)

℞. Minii pulverati . . . uncias octo.
 Olei Olivarum . . . libram unam.

Coque, continue agitando, donec massa coloris fuscii prodeat, cui semirefrigeratae adde

Cerae flavae . . . sesquiunciam
 et post hujus liquationem

Camphorae cum Olei paxillo tritae
 drachmas duas.

Misce bene. (Han.)

HassP. Picis solidae unciam dimidiam addit; — Bor4. Olei uncias sedecim, Cerae quatuor et Camphoram in Spiritu Vini rectificatissimo solutam, caeterum ut Han.; — Sp. Minii uncias duodecim, Olei Rosarum viginti quatuor, Cerae tres et Camphorae drachmas duas; — Vm. Minii uncias sedecim, Olei Olivarum viginti quatuor, Cerae tres et Camphorae drachmas tres; — Ca. Olei Olivarum libram unam, uncias tres et drachmam unam, Minii uncias quatuor et drachmas tres, Cerae libram unam et Camphorae drachmas sex; — Gal. Olei partes sexcentas, Minii trecentas, Cerae quingentas et Camphorae viginti quatuor; — Hae duae supremo loco nominatae pharmacopoeae inter coctionem oleo

et oxydo certam aquae quantitatem addere jubent; — *Fi. Minii* uncias quinque cum Aquae communis uncis sex et Olei Olivarum decem ad eam consistentiam coquere ut massa digitis non amplius adhaereat et tunc addere Cerae flavae uncias octo, Camphorae drachmas tres et adhuc Minii unciam unam.

Rx. Minii libram unam.
Olei Napi libras duas.
 Coque, continue agitando, donec emplastrum colorem fuscum acquisiverit et adde

Camphorae cum Alchhole tritae drachmas duas.

Misce bene. (B*. Sax.) — Diese Formel ist von Trommsdorff.

Rx. Minii uncias octo.
Aceti uncias quatuor.
Olei Rosarum libram unam.
 Coque ad consistentiam emplastri mollis et adde

Cerae flavae sesquiunciam.
 Camphorae drachmas duas.

Misce sedulo. (Sar. Wir.)

D. Minii libram unam, Aceti semilibram, Olei libras duas, Cerae sesquiunciam et Camphorae drachmas duas; — B*. et Br. Minii, Aceti, singulorum libram unam, Olei duas, et Camphorae sesquiunciam absque cera.

Dieses Pflaster wird als lindernd und schügend betrachtet. Man wendet es besonders an, um die Vernarbung nicht sehr ausgebreiteter Geschwüre zu beschleunigen und Theile, auf welche durch langes Liegen im Bette Druck gewirkt hat, vor der Reizung zu bewahren.

Emplastrum camphoratum Stahl. (Sp.)

Rx. Olei Olivarum uncias duodecim.
Minii uncias octo.
 Coque ad consistentiam requisitam et adde massae refrigeratae

Camphorae in Olei pauxillo dissolutae uncias duas.

Dieses Pflaster ist einfacher, als das vorige und ihm vorzuziehen.

Emplastrum Porri. (Bo.)

Rx. Minii libras duas.
Olei Olivarum libras quatuor.
Succi Porri libras sex.

Coque ad consistentiam requisitam et adde

Cerae flavae libram unam.
 Saponis albi libras duas.
 Agita ad refrigerationem usque.

Emplastrum anglo-saxonicum. (B*.)

Rx. Cerae albae,
Minii, singulorum libram unam.

Pulveris Succini,
 — *Camphorae,*
 — *Aluminis usti,*
 singulorum drachmas duas.

Olei Olivarum libram unam.
 Coque oleum, donec colorem fusciorum acquisiverit, adde deinde minium, coquendo continua, et simulac massa consistentiam emplastri acquisiverit, adde succinum et post refrigerationem, camphoram et alumen.

Zum Verbinden überziehender Geschwüre gerühmt.

Emplastrum mammillare. (Pal.)

Rx. Emplastrum Minii,
 — *Mucilaginis,*
Pulveris Minii,
 — *Lithargyri,*
 singulorum semunciam.

Olei Liliorum,
 — *Ovorum,*
 — *Elaterii,*
 — *Sesami,*

Butyri recentis,
Cetacei, singulorum unciam unam.
Camphorae semunciam.

Auflösend, gegen Anschwellungen der Brust bei Stillenden und um das Aufspringen der Brustwarzen zu verhüten.

Emplastrum de Doyen. (Ca.)

Rx. Minii,
Olei Hyperici,
 singulorum libram unam.
Resinae Pini uncias quatuor.
Olbani uncias duas.
Saponis albi semunciam.

Emplastrum antiarthriticum. (Wir.)

Rx. Olei Seminum Hyoscyami,
 — — *Papaveris,*
 — — *Lni,*
 singulorum uncias quatuor.
Minii libram unam.
Aquae Sambuci semilibrum.
 Coque lente ad consistentiam emplastri et adde

Saponis Veneti uncias tres.
Cerae flavae uncias duas.

Erst wenn auf schmerzhafteste und von Krämpfen ergriffene Theile zu legen empfohlen.

Emplastrum miraculosum. (Wir.)

Rx. Minii,
Lithargyri, singulorum semilibram.
Cerussae libras duas.
Olei Olivarum libras tres.
 Coque leni igne et adde
Saponis Veneti raspati
 uncias quatuor.

Massae ad emplastri aliquanto duri consistentiam redactae adde

Pulveris Baccarum Lauri
semunciam.

— Camphorae unciam unam.

Es wurde ehemals, wie auch der Name anzeigt, als ein vortreffliches Mittel gegen alle Geschwüre und selbst frische Wunden betrachtet. Es unterscheidet sich nicht bedeutend von dem folgenden.

Emplastrum saponaceum de Barbette.
(Br. His. Pal. Wir.)

℞. Minii,
Cerussae,
singulorum uncias quatuor.

Olei Rosarum . . . libram unam.
Coque, continue agitando et Aquae fontanae uncias aliquot affundendo, ad emplastri consistentiam; massae deindeingere

Saponis Veneti rasi uncias quatuor et his solutis

Camphorae cum Alcholo tritae
semunciam.

Misce. (Br. Pal. Wir.)

His. Miscere jubet Minii uncias duodecim et sex Cerussae cum Olei unci's triginta duabus, addere Saponis in Aquae sufficiente quantitate dissoluti uncias tres, miscellam subigendo in linimenti formam redigere, coquere blando igne, continue agitando et subinde Aquae paxillum affundendo, humidum deinde omne consumere, addere Ceræ sesquunciam et semirefrigeratis adjicere Camphorae unciam unam.

Die Alten hielten es für schmelzend, auflösend, schmerzstillend und Kindern auf den Bauch gelegt für gelind abführend.

Emplastrum balsamicum. (B*.)

℞. Olei Olivarum . . . libras tres.
Saponis Veneti,
Minii,
Cerussae,
singulorum libram unam.

Castorei sesquunciam.
Camphorae uncias tres.

Dieses anfangs geheime Pflaster, für dessen Mittheilung Catharina II. 30,000 Rubel bezahlte, wurde bei Migräne, Blindheit, Taubheit, Rheumatismus, Zahnschmerz, Kopf, Lähmung, Anschwellung der Brüste, Geschwürs und in einer Menge anderer Krankheiten empfohlen, doch verdient es keine solche Anpreisung.

§. III. Mit kohlen-sauerlichem Blei (Bleiweiß) bereitet.

Emplastrum Cerussae s. album coctum
s. Subcarbonatis Plumbi s. griseum coctum. (B*. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D.

Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. Fi. Sm. Sp. Sw. T.)

℞. Cerussae porphyrisatae

partes quatuor.
Olei Olivarum . . . partes tres.
Coque continue agitando et subinde Aquam calidam affundendo, donec Cerussa sit liquata. (Sp.)

Ba. Li. et Sax. Cerussae partes duas et unam Olei; — Vm. Cerussae et Olei singulorum unam; — HassP. Olei libras quatuor cum dimidia, Cerussae octo; — Pol. Cerussae novem et sex Axungiae Porci.

℞. Cerussae porphyrisatae

partem unam.
Olei Olivarum partes duodecim.
Coque, continue agitando et Aquam pedetentim addendo ad consistentiam emplastri et adde

Cerae albae . . . partes tres.
Post refrigerationem serva. (Sw*.)

B*. Bor. Han. et O. Cerussae partes octo, Ceræ unam et Olei quatuor cum dimidia; — Wür. Cerussae octo, Ceræ quatuor et unam Olei; — Br. Pal. et Wir. Cerussae octo, Ceræ unam et sex Olei; — D. Cerussae octo, Ceræ unam et quatuor Olei; — Sar. Cerussae quatuor, Ceræ unam et quatuor Olei; — Ful. Cerussae duodecim, Ceræ unam et decem Olei; — Vm. Cerussae quatuor, Ceræ unam et Olei sex.

℞. Cerussae partem unam.

Lithargyri partes duas.
Olei Olivarum . . . partes quatuor.
Coque cum Aquae sufficiente quantitate et adde

Cerae albae liquatae partem unam.
Misce bene. (Vm.)

Bor4. Lithargyri libram unam, Olei Olivarum quatuor cum dimidia, coque instillando sensim modicam Aquae communis calidae copiam, et post solutionem lithargyri adde Cerussae pulveratae libras septem; coque Aquam addendo, donec fiat emplastrum; — Fi. T. Olei, Cerussae, singulorum libram unam, Emplastri Diachyli simplicis, Ceræ albae, singulorum uncias sex, Aceti albi libram unam.

℞. Unguenti simplicis partes quinque.

Olei Olivarum partem dimidiam.
Leni igne mollefactis adde

Cerussae pulveratae partem unam et agita ad refrigerationem usque. (Bel.)
Dieses Pflaster wird als austrocknend und lindernnd betrachtet.

Emplastrum de Spermate Ranarum. (Pal. Wir. Sp.)

℞. Spermatis Ranarum,

Olei Olivarum,
singulorum libras tres.
Cerussae libras quatuor cum dimidia.
Cerae albae . . . libram unam.
Aluminis . . . uncias quatuor.
Terebinthinae . . drachmas duas.
Camphorae . . . unciam unam.
Fiat emplastrum. (Pal.)
℞. Olei Spermatis Ranarum,
Cerussae,
singulorum libras quinque.
Coque ad cerussae solutionem usque,
Aquam et Acetum sensim addendo, ne
massa urat; ab igne remotae adde
Aluminis crudi uncias quinque.
Camphorae cum Alcoholo trituratione
unciam unam.

Misce bene trititando. (Wir.)
Sp. Olei Spermatis Ranarum partes
sexaginta, Cerussae octodecim, Aluminis
sex et duas Camphorae.

Dieses Pflaster unterscheidet sich von dem
vorhergehenden hinsichtlich der Wirkung,
welche eben so wenig kräftig ist, nur wenig;
auch ist es mit Recht ganz in Bergeseisen-
heit gekommen.

Emplastrum Plumbi Subcarbonatis (Ce-
russae) compositum. (Am. C.)

℞. Cerussae . . . libram unam.
Olei Olivarum . . octarios duos.
Cerae flavae . . . uncias quatuor,
Emplastri Diachyli simplicis
sesquilibram.

Iridis pulveratae uncias novem.
Coque oleum et plumbum in Aquae
pauillo, continue agitando ad perfe-
ctam usque mixtionem; adde ceram et
emplastrum et his liquatis, bene agi-
tando, pulverem.

Ceratium Cerussae compositum. (Am. C.)

℞. Emplastri Cerussae compositi
partes quinque.
Olei Olivarum . . . partem unam.
Liqua emplastrum et adde oleum,
agitando donec massa refrigerit.

Unguentum Bicour. (Ca.)

℞. Olei rosati . . uncias duodecim.
Cerae albae . . . uncias octo.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Lithargyri . . . uncias duas.
Adde in fine coctionis
Balsami Peruviani liquidi

semunciam.
Bei schmerzlosen Geschwülsten empfohlen.

Emplastrum benedictum s. Carbonatis
Plumbi ustum. (His. Pal.)

℞. Olei Olivarum . . . sesquilibram.
Radici Calami . . . unciam unam.
— Iridis,

Radici Althaeae,
singularum drachmas sex.
Oleo coquere incipienti adde radices
mundatas et concisas, coque, donec li-
quidum nigrescat et deinde ab igne
remoto adde
Cerussae semunciam.
Tutiae praeparatae drachmas sex.
Coque denuo ad emplastri consisten-
tiam usque et adde
Cerae flavae semunciam.
Balsami Peruviani nigri
sesquidrachmam.

Misce bene. (Pal.)

His. Olei libras tres, Radici Althaeae,
Calami, singularum uncias duas, Radi-
cis Iridis tres, sex Cerussae et Lithar-
gyri tres absque tutia, Cerae flavae
uncias quatuor et Balsami semunciam.

P o c g e r e b a .

Cortex Pocgereba; Pocgerebarinde;
Pocgereba (Gal.).

Br.

Eine Americanische Rinde in gerollten
Stücken von der Dicke einer Gänsefeder
bis zu der eines Fingers, hart, herb, fest,
gerade oder krumm, äußerlich runzig und
dunkelbraun, innen braun, geruchlos,
von schwachem adstringirendem Geschmack.

P o d o p h y l l u m .

Podophyllum peltatum, Willd.; May-
appel; Podophylle (Gal.); May apple
(Ang.).

Am. C.

♀ (Polyandria Polygynia, L.; Podo-
phyllaceae, J.) Eine Pflanze Nordameri-
ca's. (Bigel. Am. Med. Bot. 11. t. 23.)

Man wendet die fingsbreite Wurzel an.
— Sie ist, zu zwanzig Gran gegeben, ein
vortreffliches Purgirmittel.

Extractum Podophylli.

℞. Radici Podophylli libram unam.
Alcoholis . . . octarios quatuor.
Aquaë octarios decem.
Macera radicem per dies quatuor in
alchhole, tunc in Aqua ad octariorum
duorum remanentiam coque; tinctu-
ras seorsim evaporatas commisce et
lente ad spissitudinem requisitam redige.

P o l a n i s i a .

Polanisia dodecandra, Cand.; Bastard-
senf; Mosambé dodecandro (Gal.);
Bastard mustard (Ang.).

C.

© (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cap-

parideae, J.) Eine Pflanze Ostindien's. (Bart. Flore of N. Amer. t. 1. XXII.)

Die Wurzel wird für wurmwidrig gehalten.

P o l y g a l a .

Die Pharmacopöden zeigen drei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Polygala amara*, L.; bittere Kreuzwurz, Kreuzblumentraut, Mitäblume; *Polygala amer* (Gal.); Milkwort (Ang.); *Vstawae*, *Zezhulka*, *Mudatka* (B.); *Korsblomster* (D.); *Poligala lechera* (His.); *Kruisbloem* (Bel.); *Poligala* (I.); *Wyczka* (Pol.); *Poligala leitera* (Lus.); *Jungfrumariaelin* (Suec.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. Wür. Br. Fi. G. M. Sp. Z.

2) (*Diadelphia Octandria*, L.; *Polygaleae*, J.) Eine Europäische Pflanze. (Jacq. Flor. Austr. V. t. 413. Plenck t. 548. Dict. d. Sc. nat. Cah. XIV. Düss. off. Pfl. XII. t. 11.)

Man wendet die Wurzel (*radix Polygalae amarae*) an; sie ist hart, fast holzig, faserig, außen gelblich, innen weißlich und geruchlos. Sie hat einen bitteren und zugleich süßlichen Geschmack.

Man nimmt gewöhnlich, wegen der Kleinheit der Wurzeln, die ganze Pflanze; selten aber trifft man sie im Handel, wo man statt ihrer häufig die *Polygala vulgaris* verkauft.

Bitter, tonisch, brustlindernd, ehemals besonders gegen Lungenentzündung empfohlen. — Gabe des Pulvers, eine halbe Drachme.

2) *Polygala vulgaris*, L.; Kreuzblume; *Polygala commun* (Gal.). Ams. Gal. Wir. Wür. Fi. G. M.

2) Eine Europäische Pflanze. (Jacq. Fl. Aust. V. 413.)

Die Wurzel und das Kraut (*radix et herba Polygalae vulgaris* s. *Ambarvalis*), welche man gewöhnlich zugleich sammelt, sind weniger wirksam, als die der *P. amara*, wie man behauptet, obgleich diese nur eine Varietät derselben zu seyn scheint und in allen ihren Theilen um die Hälfte kleiner ist.

3) *Polygala Senega*, L.; Klapperschlangenzurzel, Senegaurzel; *Polygala de Virginie*, *Senega*, *Seneka* (Gal.); *Rattle snake root* (Ang.); *Indiczka Wirginiansky* (Pol.).

Ams. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4.

Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Sp.

2) Eine Pflanze Nordamerica's. (Linne' Amoen. Acad. 2. p. 139. t. 2. Plenck t. 549. Berl. Jahrb. X. t. 5. Bigel. Am. Med. Bot. III. t. 30. Woodville Med. Bot. III. t. 93. Düss. off. Pfl. XII. t. 12.)

Man wendet die Wurzel (*radix Senegae* s. *Senekae* s. *Polygalae americanae*) an; sie ist gebreht, knotig, ästig und hat eine grauliche harzige Rinde, unter welcher ein weißliches Parenchym liegt. Der Geruch ist schwach und widerlich, der Geschmack anfangs süß, dann scharf und bitter und sie bewirkt Speichelfluss.

Sie enthält, nach Peschier, drei eigenthümliche Stoffe, *Polygalin* oder *Senegin* (Gehlen), *Solufin* und *Polygalinsäure*.

Reizend, harntreibend, eröffnend, in hoher Gabe Brechen und Purgiren erregend. — Gabe des Pulvers, von zehn Gran bis zu einer halben Drachme.

4) *Polygala rubella*, Willd. Am. C.

Species bechicae. (Han.)

R. Radicis Polygalae semunciam.
Florum Arnicae drachmas duas.
Concisa misce.

Pulvis resolvens antiphlogisticus s. *aperitivus*. (Ful.)

R. Radicis Polygalae Virginicae,
Nitri, singulorum drachmam unam.
Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pilulae resolventes. (B*.)

R. Radicis Polygalae Virginicae
quantum vis.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück. — Wendt rühmt diese Pillen zur Zertheilung des hypopyou.

Potio pectoralis amara. (Ra.)

R. Radicis Polygalae drachmas duas.
Syrupi Sacchari . . . uncias duas.
Aqua uncias quatuor.

Electuarium Polygalae amarae s. *pectorale*. (Au.)

R. Pulveris Radicis Polygalae amarae
semunciam.

Mellis quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel täglich, bei chronischen Reizen der Bronchien.

Extractum Polygalae amarae. (HassP. Wür.)

℞. Radicis Polygalae amarae
quantum vis.

Coque in Aquae sufficiente quantitate per horam unam, cola exprimendo, seponē et decantha liquorem, tunc ad mellis spissi consistentiam consume.

HassP. ut extractum cardui benedicti. (I. p. 418.)

Extractum radicis Senegae s. Polygalae Virginicae. (Bor. Bor4. Ful. HassP. Sax.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae
libram unam.

Aquae Vitae libras sex.

Digere leni calore per dies aliquot, filtra tincturam et ad mellis consistentiam eam consume, sedimentum coque cum Aquae libris tribus, exprime et itidem consume, extracta tum commisce et vaporando inspissare continua. (Ful.)

HassP. ut extractum colombo. (I. p. 561.)

℞. Radicis Senegae . . . partes duas.

Alcoholis partes tres.

Aquae communis . . . partes novem.

Digere per horas viginti quatuor; lente vaporando alcoholē elice et quod restat ad extracti consistentiam consume. (Bor. Sax.)

Bor4. ut extractum Aconiti (I. p. 61.)

Gabe, sechs bis funfzehn Gran.

Tinctura s. Essentia Senegae. (Han. Vm.)

℞. Radicis Senegae . . . partem unam.

Aquae Vitae partes sex.

Infunde frigide per plures dies. (Vm.)
Han. Radicis uncias quinque et Alcoholis libras duas.

Gabe, dreißig Tropfen täglich mehrmals.

Infusum Polygalae amarae. (Ra.)

℞. Radicis Polygalae amarae
semunciam.

Aquae bullientis . . . libras duas.

Infunde et cola. — Tonisch, bei der Behandlung bössartiger Fieber als Trank empfohlen.

Decoctum Polygalae amarae. (B*. Ful. His. RC. Fi.)

℞. Polygalae amarae unciam unam.

Aquae quantum sufficit

ut coquendo librae duae colaturae obtineantur. (His.)

B*. Polygalae amarae uncias duas et Aquae libras tres ad dimidium redigendas; — *Fi.* Polygalae amarae vel vulgaris drachmas duas ad unciam unam coquere in Aquae sesquilibra ad tertiae partis remanentiam.

℞. Polygalae amarae sesquunciam.

Aquae uncias octodecim.

Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde

Oxymellis simplicis uncias duas.

Misce. (Ful.)

RC. Polygalae semunciam, Aquae sesquilibram ad libram coquere et colaturae, si placet, addere Radicis Scillae praeparatae scrupulum unum, Mellis semunciam.

Bei Lungen-schwindsucht gepriesen. — Gabe, vier bis sechs Unzen täglich mehrmals.

Decoctum Senegae s. Polygalae Senegae s. Polygalae Virginicae. (Am. B*. Ed. Ful. Gen. Lon. LonN. Wür. WW. Br. C. E. Fi. Sa. Sw. T.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae
unciam unam.

Aquae libras (octarios Lou. LonN.)
duas.

Decoquē ad dimidii remanentiam. (Am. Ed. Lon. LonN. Wür. WW. Br. C.)

B*. Radicis uncias tres et Aquae libras duas, ad tertiam partem redigendas; — Ful. et Gen. Radicis unciam unam et Aquae sesquilibram ad libram unam redigendam; — T. Senegae drachmam unam cum Aquae libra una in vase tecto per sexagesimas aliquot coquere jubet; — *Fi.* Senegae semidrachmam cum Aquae libra una ad octo unciarum remanentiam.

℞. Radicis Polygalae Virginicae
unciam unam.

Aquae libras duas.

Coquē ad libram unam, cola et colaturae adde

Syrupi simplicis unciam unam.

Misce bene. (Sa. Sw.)

℞. Polygalae Virginicae
unciam unam.

Liquiritiae semunciam.

Aquae sesquioctarium.

Coquendo ad octarii remanentiam consume. (E.)

Reizend, bei catarrhalischen Lungenaffectionen, bei Gliederreissen und Wassersuchten empfohlen. — Gabe, zwei Unzen täglich zweimal: bisweilen stündlich eine halbe Unze, bis Stühle erfolgen.

Syrupus Senegae s. Polygalae Virginicae. (Am. B*. Bor. Bor4. Fenn. Han. HassP. Pol. Suec. C. Fi. T. Vm.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae
unciam unam.

Aquae bullientis . . . sesquilibram.

Coquē ad unciarum decem colaturae remanentiam; adde

Sacchari albi . . . sesquilibram.

Fiat syrupus. (B*. Bor. Bor*. Feun. Han. HassP. Pol. Suec.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae . . . partes unam.

Aquae . . . partes duodecim.
Infunde leni calore, in vase tecto, per horas aliquot, cola leviter exprimendo et adde

Sacchari albi . . . partes octodecim.

Fiat syrupus. (Vm.)

℞. Senegae uncias tres cum Aquae bullientis libra una infundere per horas duodecim, filtrare et cum Sacchari libris duabus in balneo aquae syrupum parare.

℞. Radicis Polygalae Virginicae . . . uncias quatuor.

Aquae . . . octarium unum.
Coque ad dimidii consumptionem usque; liquido decanthato adde

Sacchari . . . libram unam

Fiat syrupus. (Am. C.)

℞. Radicis Senegae . . . unciam unam.

Alcoholis 22° . . . uncias octo.
Digere per triduum, filtra per chartam, destillando liquidi dimidium elice et residuum cum

Sacchari ad plumam cocti . . . libris duabus

leni calore ad aptam consistentiam coque. (Fi.)

Syrupus Senegae cum Liquiritia. (Au.)

℞. Elixir Succu Liquiritiae . . . drachmam unam.

Syrupi Polygalae Virginicae . . . unciam unam.

Gabe, stündlich einen Kaffeelöffel voll.

Syrupus Senegae moschatus. (Au.)

℞. Syrupus Polygalae Virginicae . . . uncias tres.

Gummi Ammoniaci cum Mucilage Gummi Arabici triti . . . scrupulum unum.

Moschi . . . grana decem.

Elixir Succu Liquiritiae . . . guttas quindecim ad viginti.

Gabe, stündlich ein Löffel.

Decoctum pectorale. (Ham. B. Ra.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae, Lichenis Islandici, . . . singulorum semunciam.

Aquae fontanae . . . uncias sedecim.

Coque leni igne ad colaturae unciam decem remanentiam, tunc adde Mellis glycyrrhizati unciam unam.

Misce. (Ham.)
℞. Radicis Polygalae amarae . . . uncias tres.

Herbae Farfarae, — Veronicae, singularum unciam unam.

Aquae . . . libras tres.
Coquendo partem tertiam consume. (Ra.)

Gabe, drei oder vier Unzen, mehrmals täglich. — Man versüßt es mit Zucker oder mit Honig.

Decoctum diureticum. (Ham.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae concisae . . . semunciam.

Scillae concisae scrupulum unum.

Aquae fontanae uncias duodecim.

Parte tertia coquendo consumpta, cola et adde

Spiritus Nitri dulcis drachmas duas.

Tincturae thebaicae scrupulos duos.

Mellis glycyrrhizati unciam unam.

Decoctum emmenagogum. (E.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae . . . unciam unam.

Corticis Aurantiorum . . . drachmas duas.

Aquae . . . octarium unum.

Decoque radicem cum aqua ita ut hujus pars tertia consumatur, adde corticem et post aliquot tempus cola.

Gabe, vier Unzen täglich bei Amenorrhöe.

Decoctum pectorale corroborans, Haustus pectoralis incitans, Potio pectoralis. (Au. B.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae . . . drachmas duas.

Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde

Camphorae cum Mucilage Gummi Arabici tritae . . . drachmam unam.

Misce sedulo. (B.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae . . . drachmas duas.

Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur, quarum colaturae adde

Oxymellis scillitici unciam unam.

Misce bene. (B.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae . . . drachmas duas.

Decocti Chinae bullientis . . . quantum sufficit

ut infusionis unciae septem obtineantur; colaturae adde

Camphorae cum Mucilage Gummi Arabici tritae semidrachmam.

Aetheris sulphurici guttas triginta.

Syrupi Corticum Aurantiorum, — Althaeae, . . . singulorum unciam unam.

Misce exacte. (B.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae . . . semidrachmam ad drachmam unam.

Radici Liquiritiae drachmas duas.
Aquaе bullientis . unciās tres.

Infunde et colaturae adde
Elixir paregorici drachmam unam.
Syrupi Althaeae . . semunciam.

Misce sedulo. (Au.)

Essfelweise.

Polypodium.

Polypodium vulgare, L.; Engelfüßfü-
pfeliarn, Engelfüß, Süßfarn, Äpfel-
farn; Polypode commun (Gal.); Com-
mon polypody (Ang.); Oslady (B.);
Engelsoed (D.); Polipodio (I.); Engel-
zoet (Bel.); Felce quercina o quercia,
Filicola, Polipodio officinale (I.); Pa-
prolka (Pol.); Stensoeta (Suéc.).

A. Ams. An. Ba. Bor. Br. D. Fer.
Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His.
Li. O. Pol. R. Sax. Suéc. Wir. Wür.
Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

♀ (Cryptogamia, L.; Filices, J.)
Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl.
méd. V. 278. Bert. Bild. X. 38. fig. 2.)

Man wendet den Ausläufer, uneigentlich
Wurzel (radix Polypodii s. Filiculae
dulcis) genannt, an; sie ist hart, dick,
holzig, mit vielen rötlichen häutigen Schup-
pen bebedt und mit schwärzlichen Fasern
versehen. Sie ist fast geruchlos, hat aber
einen anfangs süßlichen, dann bitteren, wi-
bertlichen und schwach abstringirenden Ge-
schmack.

Sie enthält, nach Bucholz, zuckerarti-
gen Stoff, Schleimharz, Harz, Del und
Sagmehl.

Schwach abstringirend, besonders bei ca-
tarhaliſchen Krankheiten, auch gegen Wür-
mer; sie macht die Basis des Herrens-
schwands Mittelſ gegen den Band-
wurm aus. — Gabe des Pulvers, eine
bis zwei Drachmen.

Polytrichum.

Polytrichum commune, L.; goldener
Wibberthon, Süßwibberthon, Süßden-
haarmoos; Polytric commun, Perce-
mousse (Gal.); Great golden maiden-
hair (Ang.); Guldhaar (D.); Golden
weiderhood (Bel.); Biaerninossa (Suéc.).
Br. Gal. Wir. Be. G. M. Sp.

♀ (Cryptogamia, L.; Musci, J.) Eine
in ganz Europa gemeine Pflanze. (Zorn
Ic. pl. t. 415.)

Man wendet das Kraut (herba Adian-
thi aurei s. Polytrichi aurei s. Muscus
capillaceus major) an, welches aus einem
einfachen, wuchernden Stängel mit linien-
lanzettförmigen, gezähnelten Blättern be-

steht und weder Geruch noch Geschmack be-
sitzt.

Sehr schwach abstringirend.

Pomum.

Malus communis, Cand.; Äpfelbaum;
Pommier (Gal.); Appletree (Ang.);
Missenske gablko (B.); Aehletrae (D.);
Manzano (His.); Appelboom (Bel.); Ma-
lo (I.); Jablon (Lus.); Mareiro (Lus.);
Appeltraed (Suéc.).

Am. Ba. Bor. Bor4. Br. Ful. Gal.
Han. HassP. His. O. Pol. Sax. Suéc.
Wir. Be. hr. M. Sp. Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia,
L.; Rosaceae, J.), welcher in ganz Eu-
ropa verbreitet ist. (Blackw. Herb. t. 141.
178. Schk. t. 133. Plenck. t. 394. Hayne
IV. t. 46. Düss. off. Pfl. III. t. 1.)

Seine zahlreichen, durch die Cultur ent-
standenen Varietäten geben sehr verschie-
dene Früchte, Äpfel (Poma, Poma aci-
dula), unter denen jedoch bloß die Renet-
und die Borstorfser Äpfel; Poma
renetia et Borstorfiana; Reinette, Pome-
de Borstorf (Gal.) angewendet wer-
den.

*Pulpa Pomorum dulcium s. Melimelo-
rum*. (RC)

℞. Pomorum dulcium quantum vis.
Coque ex Aqua et per filtrum expri-
me. — Zum Umschlag auf entzündete
Augen.

Succus Pomorum. (Ful. Gal. His. Sar.
T.)

℞. Pomorum renetiorum quantum vis.
In pulpam rasis, semina separa, ex-
prime inter duo strata straminis seca-
lini concisi et cum Aqua tepida loti;
succum postquam subsedit, cola et in
lagenis sub olei strato serva.

Lagenae etiam vapori sulphuris uren-
tis exponi vel libris duabus succi, Sul-
phureti Calcis grana quindecim addi
possunt.

Syrupus Pomorum redolentium. (Fer.
His, Fi.)

℞. Syrupi Pomorum libram unam.
Sacchari albi pulverati libras duas.
Solve lenis caloris vel balnei aquae
ope. (His.)

Fer. Fi. vel dissolvere Sacchari libras
tres in Succu quatuor vel (Fer.) coque-
re quadrantibus Pomorum ab epidermite
et seminibus liberatos in Syrupo Sac-
chari.

*Potus ex Pomis s. Pomorum, Decoctum
Pomorum*. (B*. Au.)

℞. Pomorum Renetiorum
unciās decem.

Aqua fontanae

libras duas cum dimidia.

Coque per horam in vase tecto et cola. — Dieser Krank, welcher schon an sich sehr angenehm ist, wird es durch Zusatz von Zucker noch mehr. Man kann, wenn die Indication es erfordert oder erlaubt, entweder eine Drachme Muscatpulver oder eine halbe Drachme gepulverten Zimmt oder endlich drei Unzen Rheinwein zusetzen. Im letztern Falle dient der Krank nur als Vehikel des Reizmittels, im erstern, um dem Kranken das Wassertrinken angenehm zu machen, da die geringe Reizwirkung desselben fast gar nicht in Anschlag zu bringen ist.

Populus.

Man findet drei Arten dieser Gattung in den Pharmacopoen angezeigt:

1) *Populus balsamifera*, L.; Balsamspice; Peuplier baumier (*Gal.*); Balsamtrees (*Ang.*); Balsam popelier (*Bel.*).

Gal. GalM. Li. Sax. B. G. M. Pid.

Ein Baum (Dioecia Octandria, L.; Amentaceae, J.), welcher in Nordamerica und Sibirien wächst. (*Cat. Car. I. p. 34. t. 34. Plenck t. 714.*)

Die Knospen, welche man anwendet, sind sehr groß, eirund, länglich, spizig mit geschindelt über einander liegenden, festen, länglichen, hohlen Schuppen. Ihre Oberfläche ist mit einem harzigen, klaren, goldgelben Safte von gewürzhaftem Geruch und brennendem und etwas bitterem Geschmack überzogen.

2) *Populus nigra*, L.; Pappel; Peuplier noir. Peuplier franc (*Gal.*); Poplar (*Ang.*); Topol (*B.*); Poppel (*D.*); Chopo (*His. Lus.*); Popeliner (*Bel.*); Pioppo o Fioppo (*I.*); Topola czarna (*Pal.*); Asp (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Br. D. Du. Fer. Gal. GalM. Gen. Hau. HassP. His. Sax. Suec. Wir. Br. Fl. G. M. Sp. Z.

Ein Baum, welcher in ganz Europa wächst. (*Blackw. t. 248. Zorn Ic. pl. t. 577.*)

Man wendet die Knospen (oculi s. gemmae Populi, recentes et siccatae), Pappelknospen, Pappelknospse, an; sie sind rundlich, länglich, spizig, gelblichbraun, mit Schuppen von verschiedener Größe, welche über einander liegen, und eine glänzende, mit einem klebrigen, goldgelben, durchsichtigen Safte überzogene Oberfläche haben. Sie haben einen durchbringenden, balsamischen, sehr angenehmen Geruch und einen bittern, brennenden und gewürzhaften Geschmack.

3) *Populus tremula*, L.; Bitterpappel, gemeine Espe; Tremble (*Gal.*); Trembling poplar tree (*Ang.*).

Pharmacopoea universalis. II.

Suec.

Ein Europäischer Baum. (*Nouv. Duh. II. t. 887.*)

Man wendet die Ausläufer der Wurzel an, welche abstringirende Kräfte besigen.

Tinctura s. Essentia Populi s. oculorum Populi. (Li. Vm.)

R. Gemmarum Populi recentium partem unam.

Alcoholis . . . partes sex.
Infunde frigide et liquorem filtratum serva. (Vm.)

Li. Gemmarum partem unam et duas Alcoholis.

Essentia Populi vulneraria. (Wir.)

R. Gemmarum Populi recentium semilibram.

Alcoholis concentrati sesquilibram.
Post aliquot dies digestionis cola exprimendo, filtra et colaturae adde Essentiae Florum Hyperici semilibram.

Digere per aliquot temporis spatium, tunc destillando Alcoholis dimidium elice et quod remanet serva.

Reizend, äußerlich bei atonischen Geschwüren, innerlich bei Tripper, weißem Fluß, Diarrhöe und Lungenentzündung empfohlen. — Gabe, dreißig bis fünfzig Tropfen und mehr. — Diese Essenz hat viel Aehnlichkeit mit der tinct. alcoholioa hyperici compos.

Unguentum populeum. (Fer. Li. Br.)

R. Gemmarum Populi balsamiferae siccarum . . . semilibram.

Butyri recentis . . . libram unam.

Coque lente ad humidum usque consumptionem et cola exprimendo. (Li)

Br. contundere jubet Gemmarum siccarum uncias octo, addere Axungiae liquatae libras duas, tenere in balneo aquae per horas tres in fusione et deinde decanthare; — Fer. digerere per dies septem Gemmarum recentium libras duas in Axungiae libr's quatuor contritas.

Diese Salbe ist die einzige, welche den Namen ung. populeum verbient.

Portulaca.

Portulaca oleracea, L.; Portulak; Pourprier commun (*Gal.*); Purslane (*Ang.*); Portulak (*D. Suec.*); Berdola-ga (*His.*); Porselein (*Bel.*); Porcellana (*I.*); Kurza noga (*Pol.*); Beldroega (*Lus.*).

Ams. Br. Gal. His. Wir. Be. G. M. Sp.

⊙ (Dodecandria Monogynia, L.; Por-

tulaceae, J.) Eine in Europa gebaute Pflanze. (Blackw. t. 287. Schk. t. 130. Plenc. t. 361. Zorn Ic. pl. t. 489.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Portulacae) besteht aus einem rundlichen, glatten, glänzenden, saftigen Stängel und länglichen, keilförmigen, fleischigen, glatten, buntelgrünen Blättern. Der Geschmack desselben ist wässrig und etwas gewürzhaft.

Der Saame ist sehr klein, nierförmig, gekrümmt, etwas runzelig, schwarz und geschmacklos.

Man zählet ihn zu den sogenannten vier kleinern kalten Saamen. Das Kraut, welches mehr in der Küche als in der Heilkunst gebraucht wird, soll in großer Menge auf einmal genossen, purgiren.

Conserva Portulacae. (Vm.)

℞. Foliorum Portulacae partem unam.

Sacchari albi . . . partes duas.

Contunde folia, adde saccharum et lente calefac.

Aqua Portulacae. (Gal. Pal.)

℞. Herbae Portulacae partes quinque.

Aquae partes duodecim cum dimidia.

Destillent decem circiter partes; productum infunde Herbae partibus decem, adde Aquae partes decem et destillando denuo partes decem abstrahe. Operationem tertia vice repetere potes. (Gal.)

Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillet pars una cum dimidia.

Potassium.

Ein in der Medicin ungetrübliches Metall, dessen zahlreiche Zusammensetzungen aber zu sehr mannichfaltigen Zwecken benutzt werden.

Protoxydum Potassii, Potassa caustica s. pura, Kali vegetabile purum s. causticum; caustisches Kali; Protoxide de Potassium, Potasse caustique (Gal.).

§. I. Im flüssigen Zustande

Deutoxydum Potassii liquidum, Aqua Potassae s. Potassae purae s. Kali puri, Lixivia caustica, Potassa pura liquida, Liquor Potassae s. Kali caustici s. Potassae causticae, Lixivium causticum s. Potassae purae magistrale s. saponariorum s. causticum vegetabile; Augentwasser; Solution de Potasse ou de potasse caustique, Potasse liquide, Liqueur des savonniers (Gal.). (Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn.

Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RG. Sax. Suec. C. Fi. Fid. Sw. Vm.)

℞. Calcis vivae . . . uncias octo.

Infunde

Aquae uncias viginti.

Effervescentia cessata adde statim

Kali subcarbonici . . . uncias sex, dissolutas in Aquae unciis octo. Misce bene totum, tege ad refrigerationem perfectam usque, infunde in infundibulum vitreum, cujus orificium telae panniculo oclusum est, quod prodit in vase subposito recipiens, et simulac nihil amplius profluit, aliquot uncias Aquae in infundibulum effundens, quod repetendum est, donec liquidi librae tres prodierint, ad quod dies duo ad tres requiruntur. (Ed. Fer. Gen. C. Sw.)

Es giebt von diesem Verfahren fast eben so viel, jedoch meist geringe Verschiedenheiten als Pharmacopöden

Du. Calcis vivae uncias octo humecta cum Aquae bullientis octariis duabus ad extinctionem usque, admisce tunc Kali subcarbonici uncias sex; massam refrigeratam in infundibulum effunde, cujus collum linteo obstructum est et destillando lixivii octarios tres abstrahe, cujus pondus specificum sit 1,100; — Gal. Subcarbonatis partes duas et unam Calcis cum Aquae communis duodecim solvendo et coquendo in lixivium redige, cola liquorem, inspissa, donec 36° areom. indicet, tunc sepositum ut subsideat decantha; densitas ejus erit 1,334. — Parari potest etiam ex parte una Potassae purae fusae ac duabus Aquae destillatae; — Ams. Bel. Aquae calidae uncias quatuor infunde in Calcis vivae novem, post extinctionem adde Subcarbonatis uncias sex, immitte omnia in infundibulum, cum gossypio obturatum, adde, quum nihil amplius transit, Aquam bullientem, ut lixiviae librae tres obtineantur; — Lon. LonN. Dissolve Potassae libram nnam in Aquae octariis duobus, Calcissemilibrae infunde Aquae octarios sex, misce liquores calidos, eponne in vase tecto et post refrigerationem cola: octarius unus uncias sedecim pondere aequat; — R. Exstingue sensim Calcis uncias quatuor in Aquae fervidae pauxillo, adde Aquae fervidae uncias octodecim et tunc Cinerum arenaceorum uncias tres, agita fortiter et post refrigerationem adde Aquae quantum sufficit ut lixivii unciae octodecim obtineantur; — Sax. Dissolve Kali subcarbonicum in Aquae pondere sex-

tuplo, calefac deinde et Calcem pedentim adde, subinde videndo, num lixivium in acidum aliquod instillatum effervescentiam provocet et statim calcem addere desinendo, hoc si fieri desierit; cola per pannum exprimendo; lava residuum cum Aquae calidae pauxillo, exprime denuo, post subidentiam decantha et inspissa, donec liquor 36° areom. indicet; — Li. Calcis libras quatuor extingue cum Aquae bullientis sufficiente quantitate, adde deinde Subcarbonatis uncias sedecim in Aquae libris novem dissolutas, seponere per horas viginti quatuor; liquorem vicissim Calcis et Acidi sulphurici ope, experimento subijce et si a nullo eorum turbatur, filtra in infundibulum, gossypio instructum et si requiritur, vaporati subijce, donec in vase, Aquae destillatae librae unius capaci, unciae sedecim contineantur; — Ful. Calcis uncias sex extingue cum Aquae sufficiente quantitate, adde Subcarbonatis uncias tres in Aquae sesquilibra dissolutas, post aliquot tempus filtra in infundibulum, gossypio instructum et liquori prodeunti adde Aquae quantum sufficit ut pondus ejus sesquilibram impleat.

℞. Kali subcarbonici . partes duas.
Calcis partes tres.

Misce et adde

Aquae pluvialis partes sedecim.

Coque per semihoram, saepius agitando; cola per linteam dupliciter plicatum, sub fluem parumper exprimendo; massam residuam abluere cum

Aquae partibus quatuor.

Evaporet utrumque liquidum commixtum ad octo partium remanentiam; seponere in lagenam magnam bene obturata, liquidum clarum decantha et in parvas lagunculas distribue. (B.)

Hass. et Pid. infundere jubent Aquae fontanae libras sex in unam Calcis vivae, addere, simulac haec est extincta, Cinerum clavellatorum semilibram, coquere, donec liquor corrodatur et plumam aserinam immixtam dissolvat et diluere deinde Aquae sufficiente quantitate, tunc filtrare; — Bor. Fenn. Han. O. Pol. RC. Suec. et Vm. Subcarbonatis libras duas solvere in Aquae libris decem (viginti), solutioni sensim addere Calcis pulveratae libras tres, coquere per horae quadrantem, spatulae ope agitando, seponere per tempus aliquot, colare et vaporando consumere, donec liquor pondus specificum 1,337 acquisiverit; — HassP. Cinerum clavellatorum libras duas, Aquae sedecim, Calcis vivae sesquilibram vel libras

duas in pulverem dilapsas, coquere per semihoram etc.; — Bor4. Kali carbonici e cin. clavell. libras duas cum dimidia, Aquae fervidae duplum, successively ingerere Calcaria ustae pulveratae libras tres, coquere etc. Pond. spec. = 1,330 — 1,340; — Ba. Dissolvere Subcarbonatis depurati partem unam in Aquae communis decem, coquere liquorem et addere, continue agitando, Calcis purae trientes duos; post horae quadrantem bullitionis per linteam colare, residuum cum Aquae communis partibus quinque coquere, lixivium ambo commiscere, per horas viginti quatuor seponere, liquorem deinde decanthare et evaporare donec pondus specificum sit 1,35.

B. proponit, dissolvere Potassae prope ignem fusae partem unam in Aquae destillatae duabus. — *Legeteres Berghren giebt ein schnelleres und in Betreff der Qualität vorzüglicheres Product.*

§. II. Im festen Zustande.

Alkali causticum, Causticum alcalinum s. commune s. commune fortius s. potentiale s. salinum, Cauterium potentiale, Kali causticum siccum et fusum, Hydras kalicum s. Potassae purae fusae, Lapis causticus s. causticus chirurgorum s. infernalis alcalinus s. septicus, Potassa fusa s. pura s. caustica s. caustica fusa, Ruptorium commune, Hydras Protoxydi Potassii, Hydras kalicus et kalicus fusus; Kalkali, Kalkstein; Potasse fondue, Pierre à cautere, Hydrate de protoxide de potassium (Gal.). (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Han. Hass. HassP. His. L. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sar. Sax. Wir. Wüir. Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Calcis vivae partes tres.

Infunde Aquae quantum satis ad extinctionem et adde

Kali subcarbonici purificati

partem unam.

Dilue totum cum multa Aqua, agita bene baculi ope, filtra, ad siccum consume, tunc massam fusam in modulos ferreos adipe obductos vel supra marmor calidum effunde et post refrigerationem in frusta dirumpe. (Wüir.)

Hic, digerere et pulsare simul jubet Calcis vivae libras duas, Kali subcarbonici unam et sedecim Aquae, filtrare deinde, liquorem ad siccum usque evaporare, residuum fundere in crucibulo et supra lapidem calidum effundere.

℞. Kali subcarbonici . partes duas.

Calcis grossiuscule pulveratae

partem unam,

Aquae communis partes duodecim.

Coque per semihoram, cola, ad siccum consume, residuum in crucibulo liqua et supra marmor calidum effunde. (Gal. GalM.)

Br. Coque simul Subcarbonatis libram unam, Calcis tres et sedecim Aquae per horae quadrantem, evapora ad siccum et residuum fustum supra lapidem laevem oleo obductum effunde; — T. Salis Tartari libras tres in Aquae duodecim solvere ignis ope, addere Calcis duas in Aquae decem extinctae et per horae quadrantem coquere, filtrare et in lagenis hermetice clausis reponere, donec fluidum transparens sit, decanthare deinde, vaporando ad extracti consistentiam consumere, fundere etc.; — A. Dissolve Subcarbonatis libram unam in Aquae bullientis decem et, continue agitando, addensim Calcis vivae pulveratae libras duas; coque per horam unam et diutius, tunc sepone, decantha, consume in tantum, donec massa tranquille olei instar fluat et in modulos vel supra laminam ferream effunde; — Sar. Coque Cinerum sarmentorum calcinatorum libras quatuor et Calcis vivae duas cum Aquae communis decuplo ad dimidii remanentiam, cola et ad siccum consume; residuum in crucibulo fustum supra lapidem calidum oleo obductum effunde; — Sp. Coque per horas aliquot Subcarbonatis partem unam, Calcis vivae quatuor et Aquae pondus v. c. majus; filtra, ad siccum evapora et residuum leni calore fustum in modulos effunde.

R. Potassae causticae crystallisatae quantum vis.

Ingere partitum in crucibulum argenteum; aqua crystallisationis perdita ex omnibus aequale fuis et tranquillis, in modulum ferreum calefactum effunde. (Vm.)

R. Lixivii saponariorum quantum vis.

Consume in tantum, donec gutta supra lapidem frigidum dejecta, statim concresecat (*siccum*); massam deinde in crucibulum ingere, calefac, donec olei instar fluat et illam in modulos voluminis plumae anserinae effunde (*fusum*). (Am. B. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Han. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. Pid. Sw.)

Ams. Ba. Bel. et Gal. lixivium ad siccum evaporare et tunc fundere jubent.

Vm. modulos, in quos alkali fustum ingeritur, oleo non obducere suadet.

Pharmaceutae aliquot potassam gut-

tatim supra lapidem oleo obductum effundere jubent. (Br.)

§. III. Im Zustande vollkommener Reinheit.

Potassa per Alcholem. (Gal. T.)

R. Potassae liquidae quantum vis. Ad siccum consumptam in Alchole (40°) dissolve et deinde hujus partem unam destillando abstrahere; residuo in pelvi argentea evaporato, cochlearis ope pelliculam nigrescentem, qua liquor tegitur, separa, quod remanet, supra laminam argenteam effunde et post refrigerationem in frusta dirumpe.

T. Lapidis caustici uncias octo in vase cylindrico librarum trium capaci Alcoholicis 40° B. infundere et mixta saepius agitare, tunc per horas aliquot seponere, quo facto mixtura tria praebit strata, e quorum superiore liquorem alcoholicum siphonis ope separa, ad consistentiam oleosam evapora et adhuc calidum supra laminam porphyream oleo illitam effunde, refrigeratum frange et serve.

Das Product ist reines Potassiumoxydhydrat, der Aetzstein dagegen enthält kalische, schwefel- und salzsaure Salze zc.

Die reine Potassche ist im concentrirten Zustande ätzend und reizend, mit vielem Wasser verdünnt, stark reizend. Man hat sie in dieser Gestalt als säuretilgendes, harntreibendes und besonders steinerstörendes Mittel zu 10 bis 15 Tropfen in einem Behüfel angewendet.

Fest und geschmolzen dient sie als Aetzmittel.

Potassa caustica, Potassa cum Calce, Causticum commune mitius. (Am. Du. Ed. GalH. Gen. Lon. LonN. O. Sp.)

R. Liquoris saponariorum octarios tres.

Decoque ad octarii remanentiam et adde

Calcis extinctae libram unam.

Misce exacte. (Lon. LonN.)

An. Du. Ed. G. et C. liquorem saponariorum ad tertiam partem evaporare et addere deinde Calcis vivae quantum satis ad obtinendam pastam solidam; — Sp. dissolvere Potassae causticae partem unam in Aquae tribus, addere deinde Calcis vivae quantum satis ut liquorem totum consumat et pastam proferat.

Henry (GalH.) kali caustico vulgari antequam effundatur, Calcis vivae pulveratae pauxillum addere jubet, quo prohibetur, ne humiditas aëris tam cito absorbeat.

uncias quatuor, Nitri octo et duodecim Alcoholis.

℞. Antimonii crudi . . . semilibram.
Kali subcarbonici . . . libram unam.

Mixturam in crucibulo fusam in scorias flavescentes redige, contunde deinde in mortario ferreo calefacto et pulveri infunde

Alcoholis libras tres.
Post tres dies cola. (Br. Pal. Sar. Wir. Wür. Sp. Sw.)

℞. Antimonii crudi . . . unciis sex.
Liquatis in crucibulo adde

Nitri siccati . . . sesquiunciam.
Igne per horae quadrantem alito, massam pulveratam coque cum

Nitri fixi unciis octo
in Aquae libris duabus dissoluti ad syrupi consistentiam usque et magmati infunde

Alcoholis libram unam.
Post sufficientem digestionem decantha. (Br.)

℞. Reguli Antimonii medicinalis adhuc calidi et pulverati

uncias quatuor.
Infunde lixivium praeparatum e

Kali subcarbonici . . . unciis sex.
Aquae communis . . . unciis octo.

Coque ad pulvis consistentiam et adde Alcoholis concentrati unciis decem.

Digere calore blandissimo, saepius agitando, donec liquor colorem nigrescenti-rubrum acquisiverit. (Ful.)

℞. Kali subcarbonici . . . unciis sex.
Calcina fortiter in crucibulo et contuso adhuc calido infunde

Alcoholis concentrati

uncias duodecim.

Digere e balneo arenae, donec liquor ruber sit redditus. (Br. Ful. Pal. Sar. Wir. Wür. Sw.)

Sp. calcinare jubet Salis Tartari unciis octo cum tribus Calcis vivae per horam unam et residuum digerere cum Alcoholis concentrati unciis viginti quatuor; — Wir. calcinare fortiter Salis Tartari unciis sex cum Pulveris Carbonum sesquiuncia et residuum digerere cum Alcoholis libra una.

℞. Potassae causticæ partem unam.
Alcoholis concentrati partes octo.

Digere in balneo arenae per dies aliquot. (B. Bor. Han. O. Pol. Sax. Vm.)

Bor4. HassP. Kali caustici sicci recenter parati unciis quatuor cum Spiritus Vini alcoholisati libris duabus calefacti agitare et digerere.

Man braucht dieses Präparat heutzutage nur wenig: es gilt als reizend, eröffnend, harn- und schweißtreibend. — Gabe, zwanzig bis sechzig Tropfen.

Mixtura toxico-nerotica Stahliani. (B*. Br. Ful. Pal. Sax. Wir. Sp.)

℞. Tincturae Antimonii acris

uncias duas.
Spiritus Cornu Cervi rectificati

unciam unam.
Misce sedulo. — Reizend, eröffnend, aufsteigend, schmelzend, nervenstärkend, krampfstillend; schweiß- und harntreibend. — Gabe, dreißig bis fünfzig Tropfen.

Tinctura salina. (Sar.)

℞. Potassae purificatae unciis sex.
Corticis recentis Aurantiorum,

Radicis Gentianae pulveratae,
singularum sesquiunciam.

Aquae destillatae . . . sesquilibram.
Post dies quatuor digestionis adde

Alcoholis rectificati unciis octo.
Digere denuo per horas viginti quatuor et filtra. — Gabe, eine bis zwei

Drachmen.

Mixtura resolvens spirituosa. (Ful.)

℞. Tincturae Antimonii nigrae

unciam unam.
— Pimpinellae albae

drachmas sex.
— Succini . . . drachmas tres.

Saponis Alicantini rasi

drachmas duas.

Misce et dissolve. — Diese Mischung, welche sehr gut statt der Dippel'schen Seife gebraucht werden kann, gilt als reizend, tonisch, balsamisch, schmelzend, krampfstillend, nervenstärkend, harn- und schweißtreibend. — Gabe, vierzig bis siebenzig Tropfen.

Sapo chemicus Dippel. (Wir.)

℞. Kali subcarbonici libram unam.
Antimonii crudi . . . semilibram.

Limaturae Cupri . . . unciis tres.

Mixta et liquata contunde, antequam sint refrigerata, adde Olei Juniperi vel Terebinthinae unciis novem, ut fiat puls; infunde deinde Alcoholis concentrati quantum sufficit ut digitorum aliquot crassitiem tegatur; digere per plures dies et liquidum coloratum decantha; digestionem his terve cum novo Alcholle repete; tincturas misce, destillando spiritus partem unam abstrahere et reliquo Saponem Venetum cum Balsami Peruviani pauxillo adde.

Ein sehr unrichtiges Präparat, welches Dippel äußerlich als aufsteigend und schmerzstillend, bei Podagra und Frostbeulen empfahl.

Protoxysulphuretum Potassii, Sulphuretum Protoxydi Potassii, Sulphuretum Potassae s. Lixiviae s. Kalii cum

Sulphate kalico s. kalicum, Hepar Sulphuris s. Sulphuris salinum s. Sulphuris vulgare, Kali sulphuratum; Schwefelleber, Schwefelkali; Protoxysulfure de potassium, Sulfure de protoxide de potassium, Sulfure de potasse, Foie de soufre (Gal.). (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wüf. Br. C. Fi. Sw. T. Vm.)

§. I. Im festen Zustande.

℞. Sulphuris sublimati partem unam.
Kali subcarbonici . partes duas.
Liqua simul in retorta (crucibulo), igne gradatim aucto (massam homogeneam in laminam ferream aut in mortarium ferreum) et post refrigerationem vase dirupto, contentum statim in lagenamingere et serva. (A. B. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. Wir. Wür. C. Sw. T.)

Bor4. et HassP. Kali sulphuratum e Sulphure depurato et Kali carbonico e Tartaro; *Kali sulphuratum pro balneo e Sulphure citrino et Kali carbonico e Cinerib. clav. parare jubent.*

Es ist wichtig, die Masse so lange zu erhizen, bis sie ruhig wie Wasser fließt; denn sobald sie aufschwilt, enthält sie Kohlen säure. Auch müssen die Flaschen, in welchen man sie aufbewahrt, vorher erwärmt werden, um die Luft und Feuchtigkeit herauszuziehen

Vm. terere simul jubet Subcarbonatis pulverati partes sex cum dimidia et tres Florum Sulphuris et mixturam in crucibulo liquesaceré; — Ba. Subcarbonatis partes quatuor et tres Sulphuris; — Du. Fer. Li. Sax. Suec. RC. Br. et Fi. singulorum partes aequales. — Die letzteren Verhältnisse, welche auch Bauquet in hat, geben eine Mischung von schwefelsaurem und Schwefelkali mit einem Ueberschuß von Schwefel.

Béral Potassae partes quindecim et Sulphuris quadraginta; — hat das Unangenehme, daß es wegen des darin enthaltenen Schwefeleisens beim Baden die Haut grün färbt.

Henry Subcarbonatis Potassae e combustione Tartari partes duas et unam Sulphuris in baculis pulverati in retortam pro tribus trientibus inde repleendam immittere, vas supra balneum arenae collocare et igne primum blando deinde sensim aucto massam liquesaceré.

℞. Sulphuris in baculis partem unam et tres quadrantes.
Potassae causticae fusae partes quinque cum dimidia.
Misce simul et in retorta super balneo arenae liqua. (Vm.)

Ban Mon s nennt dieses Präparat *Sulphuretum simplex Potassae*, ein Name, den man auch dem Sulfüre giebt, welches durch Zerlegung des Sulphats mittelst Kohle bei hoher Temperatur entsteht. In Betreff der Bereitung seines *Supersulphuretum Potassii* zeigt er zu dessen Gewinnung folgende Formel an:

℞. Sulphuris in baculis partes quinque et dimidiam.
Potassae causticae fusae partes tres.

Liqua in retorta vitrea super balneo arenae gradatim calefacto.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Aqua Sulphureti Kali s. Potassii. (Du. C.)
℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Potassae causticae liquidae uncias novem.

Coque per sexagesimas decem et filtra. Pond. spec. est 1,120.

Reizend, erregend und anspornend, in hoher Gabe giftig, in vielen Fällen Auswurf und Ausdünstung befördernd, äußerlich austrocknend. Man hat es gegen Asthma und Croup angewendet, jedoch ohne sonderlichen Nutzen, bei alten Catarrhen, chronischen Rheumatismen, Sicht, Krebs, Flechten, Krätze, Kopfgrind und einer Menge anderer Krankheiten des Hautgewebes. Auch hat man es als Gegengift gegen Arsenik und Blei benugt. — Gabe, fünf bis fünfzehn oder zwanzig Gran.

Säuren und säuerliche, metallische oder erdige Salze dürfen nicht damit verbunden werden, da sie es zerlegen würden.

Pulvis ad s. contra pyalismum s. salivationem. (Bo. Sm.)

℞. Sulphureti Potassii scrupulos quatuor.
Cremoris Tartari drachmas quatuor.

Divide in partes viginti quatuor. — *Sahnemann* empfahl dieses Pulver gegen Mercurialspeichelfluß. Der Kranke nimmt drei Stück, Morgens, Mittags und Abends, in einem haben oder ganzen Giasse Zuckerswasser. Ungeachtet aller Lobeserhebungen, welche man diesem Pulver gemacht hat, ist es, wie alle andere Ableitungsmittel, oft sehr unwirksam.

Pilulae Carbonum kalinae. (Au.)

℞. Sulphureti Potassii drachmam unam.

Extracti Cardui benedicti,
Carbonis pulverati,
singulorum grana (drachmas?) duo.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, fünfzehn bis zwanzig Stück täglich
viermal, bei Lungen(schwind)sucht.

Sapo sulphurato-ceratus s. antisialago-
gus Singeri. (Ba.)

℞. Sulphureti Potassii partem unam.
Aeque bullientis . . . partes duas.
Dissolve et adde

Cerae flavae . . . partem unam.
Consume, agitando continue, donec
massa non amplius digitis adhaereat;
tunc in modulos chartaceos effusam
refrigesce.

Linimentum saponato-hydrosulphu-
ratum, Unguentum s. Pomatum de Ja-
delot. (B*. Gal. Au. Ca. Fi.)

℞. Sulphureti Potassii . . . uncias sex.
Diem antea in Aeque ponderis ter-
tia parte solutum tritura cum solutio-
ne e

Saponis albi rasi . . . libris duabus
in Olei Papaveris libris quatuor et adde
Olei essentialis Thymi

drachmas duas.
Bei Krätze empfohlen. — Gabe, eine
Unze auf die Einreibung. (B*. Au. Ca.)

℞. Saponis communis
partes quinquaginta.

Liqua in balneo aquae in vase vitro
et adde

Olei Papaveris
partes viginti quinque.

Commisce triturationis ope intime et
adde deinde

Sulphureti Potassii pulverati
partes decem.

Tritis bene, adde
Olei Papaveris

partes septuaginta quinque.
Misce sedulo. (Gal.)

Ra. Sulphureti uncias sex, Aeque
duas, Saponis libras duas et Olei Oli-
varum tantidem.

Henry (GalH.) Saponem in Aeque
parva quantitate mollescere, evapora-
re in balneo aquae, addere deinde
Oleum per portiunculas, mixturam
agitare, semper in aquae balneo, do-
nec bene sit homogenea, infundere il-
lam deinde in patinam vernice obdu-
ctam et cum ea, pistilli lignei ope
continue agitando, Sulphuretum sensim
commiscere.

Mit diesem Präparat hat das *Pomatum*
sulphuro-alcalinum *Libert's* Kechnlich-
keit, welches ebenfalls bei der Behandlung
der Krätze angewendet und aus zwei
Theilen Schwefelblumen, einem Theil ge-

reinigter Potasche und acht Theile Schmeer
bereitet wird. (Ra.)

Sulphuretum Potassae martiale. (Fer.)

℞. Kali subcarbonic,
Sulphuris,

singulorum unciam unam.
Aethiopsis martialis drachmas duas.
Liquata in crucibulo supra laminam
marmoream effunde et post refrigera-
tionem in frusta frange. — In drei-
oder viergranigen Pillen oder zu einem
Scrupel in zehn Unzen Wasser, löffelweise
genommen.

Emplastrum resolvens et anticancrosum.
(Bo.)

℞. Sulphureti Potassii,
Pulveris Cicutae,
singulorum drachmas duas.
Camphorae pulveratae,
Terebinthinae,
singulorum drachmas quatuor.
Saponis albi . . . semidrachmam.
Cerae flavae . . . unciam unam.
Emplastri simplicis uncias quatuor.
Zur Auflösung lymphatischer Drüsenge-
schwülste empfohlen.

Solutio Hepatis Sulphuris. (Ham.)

℞. Kali sulphurati . . . semunciam.
Aeque destillatae . . . uncias tres.
Solutionem filtra.

Aqua Kali sulphurati, Potio sulphurosa.
(Au.)

℞. Kali sulphurati drachmam unam.
Aeque . . . libram unam.
Sacchari . . . drachmam unam.
Als Gegengift bei Arsenitvergiftung em-
pfohlen.

Potio ad s. contra herpetem. (Ca.)

℞. Sulphureti Potassii
grana quadraginta.
Aeque . . . libram unam.
Solutionem filtra.

Balneum sulphuratum. (B. Ra.)

℞. Sulphureti Potassii uncias duas.
Aeque communis quantum sufficit
pro balneo, circiter libris centum.

Balneum sulphuratum et gelatinosum
Dupuytrenii. (Ra.)

℞. Sulphureti Potassii uncias quatuor.
Aeque communis libras ducentas.
Solutioni infunde
Collae flamandicae albae
libras duas

dissolutas in
Aeque bullientis . . . libris decem.

Balneum resolvens. (Sm.)
℞. Sulphureti Potassii unciam unam.

Salis marini . . . uncias duas.
Sodae . . . drachmas quatuor.
Foliorum Salviae
manipulum unum ad duos.

Coque omnia per horas viginti quatuor in

Aquae communis . octariis sex.

In Waschungen, Douchen oder Bähungen bei spina ventosa oder Scropheln. Ist Eintäuchen möglich, so muß dieß eine halbe Stunde lang dauern und drei oder viermal täglich wiederholt werden.

Syrupus de Sulphureto Potassae s. Sulphuris s. Kali sulphurati, Arcanum bechicum Willisii, Syrupus Hepatis Sulphuris s. bechicus. (B*. Gal. Wir. Au. Br*. Ca. T.)

℞. Sulphureti Potassae semunciam.
Aquae Hyssopi vel Foeniculi semilibram.

Sacchari albi uncias quindecim.

Dissolve sulphuretum frigide et saccharum in balneo aquae solve. (Gal.)

Br*. Sulphureti drachmas duas, Aquae Foeniculi uncias octo et Sacchari uncias quindecim; — T. Sulphureti semunciam, reliqua ut B*; — Ca. Sulphureti drachmas duas, Aquae Foeniculi semilibram et Sacchari libram unam.

℞. Sulphureti Potassae semunciam.
Aquae fontanae,
— Foeniculi, singularum uncias quatuor cum dimidia.

Solutioni adde
Sacchari albi . uncias sedecim.

Coque ad syrupi consistentiam et cola. (B*. Wir. Au.)

Willis digerere jubebat Sulphureti uncias duas in Vini Hispanici libris tribus per horas viginti quatuor, liquorem filtrare et in illo solvere Sacchari libras duas. (Ca.)

Boullay et Planche formulam sequentem proposuerunt:

℞. Sodae purae cum Alchhole paratae . . . drachmam unam.
Aquae destillatae drachmas quinque.

Calefac et adde Sulphuris puri tantum quod dissolvi potest; liquidi unciam unam cum Syrupi communis uncis triginta et una commisce et mixturam in lagena bene obturata agita.

Von Chauffier bei catarrhalischen Lungenaffectionen und Croup empfohlen. Besördert die Schleimsecretionen, bewirkt bisweilen Erbrechen oder Stühle und begünstigt die Ausdünstung. — Gabe, einen Kaffeelöffel für Kinder, einen oder zwei Löffel für alte Personen.

Solutio Sulphureti Potassae alcoholica.
(Vm.)

℞. Sulphureti Potassae siccati
quantum vis,
Alcoholis . . . quantum sufficit.

Dissolve hlandi caloris ope, liquorem post refrigerationem filtra et in lagena in collum inversa serva.

Vm. hoc praeparatum iterum sub nomine *Tinctura Sulphuris* (Teinture de soufre) indicat et parare jubet dissolvendo Sulphureti Potassae partem unam in Aquae Vitae duodecim. Eadem ipsa Tinctura Sulphuris etiam a Sar. et Sp. — Sar. Sulphuris uncias duas cum Subcarbonatis uncia una liquare et productum contusum cum Alcoholis libra una digerere jubet; — Sp. eodem modo procedit sed productum per dies aliquot cum Alcoholis uncis octo digerere jubet. — Ehedem wurde diese Tinctur gegen Krätze empfohlen. — Gabe, sechzig Tropfen.

Boli in pyalismo mercuriali s. contra salivationem. (B.)

℞. Sulphureti Potassae grana tria.
Roob Sambuci quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Subprotocarbonas Potassii, Subcarbonas Protoxydi Potassii, Subcarbonas Potassii.

§. I. Im festen Zustande.

A. unrein.

Carbonas Potassae venale s. impurum s. alcalinus s. kalicus crudus, Cineres clavellati, Carbonas Lixiviae alcalinus, Alkali vegetabile aëratum, Hypercarbonas Potassae venale, Kali carbonicum s. carbonicum crudum s. subcarbonicum crudum s. carbonicum impurum, Alkali fixum vegetabile impurum, Potassa impura s. venalis, Subcarbonas Potassae impurus s. crudus s. kalicum impurum; käufliches; unreines, kohlenfaures Kali. rohe Pottasche; Potasse, Potasse du commerce (Gal.). (Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. C. Fi. Par. Pid. Sp. T.)

Dieß ist ein Gemisch von kohlenstoffreichem, schwefel- und salzsaurem Kali, Kalk und Magnesia, Kieselerde, Eisenoxyd und bisweilen von Braunsteinoxyd in sehr verschiedenen Verhältnissen.

B. Rein.

1) Reinigen der künftigen Pottasche.

Kali praeparatum s. carbonicum, Lixivia purificata, Cineres clavellati depurati, Sal cinerum clavellatorum depuratum, Subcarbonas kalicum depuratum, Alkali Lignorum depuratum, Carbonas superpotassicus purus s. depuratus; gereinigte Pottasche, kohlen-saures Kali; Potasse préparée, purifiée (Gal.). (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. GalM. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. R. Sax. Suec. Wür. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Potassae venalis pulveratae, Aquae frigidae,

singularum partes aequales.

Misce, subinde agitando, se pone deinde per dies septem aëri exposita, cola, et in vase ferreo, continue agitando, ad siccum consume. (An. Bel. Du. Ful. Han. Hass. Li. R. Sax. Pid. Sp.)

℞. Potassae venalis . . . partem unam. Aquae bullientis . . . partes tres.

Coque per horae quadrantem, liquorem adhuc calidum decantha, et se pone per horas viginti quatuor in patina ut sales subsideant; cola, ad dimidium consume, ad locum frigidum reponere et ad siccum usque deinde consume. (Ba. Bor.)

Bor4. Kali carbonici crudi partem unam cum Aquae ferventis duabus ad cuticulam evaporare, per aliquot dies seponere, liquorem a crystallis decanthare et ad siccum evaporare, Aquae destillatae frigidae aequali quantitate solvere, solutionem filtrare et leni calore ad siccum evaporare; — HassP. Salis et Aquae partes aequales macerare donec dilapsa sint, liquorem ad cuticulam evaporare etc. ut antea; — Fi. T. Salis partem unam, Aquae quatuor, caeterum ut HassP.; — Lon. LonN. Potassae libras tres in Aquae ferventia octarii tribus cum dimidio liquare, colare, lente consumere ut liquor spissescat, dein igne subducto assidue agitare, donec sal in granula abeat.

℞. Potassae venalis . . . partem unam.

Calcina fortiter in crucibulo ferreo et infunde deinde per tres dies in

Aquae . . . partes tres subinde agitando. Decantha, lava residuum, donec aqua colores vegetabiles coeruleos non amplius virides reddat, liquores commixtos ad pelliculae apparitionem consume, per aliquot dies se pone, decantha, sales alienos separa et reliqua vaporando ad siccum redige. (Ams. Bel. GalM. Lon. Wür.)

Ed. C. et Sw. Aquae et Salis partes aequales; — Fenn. et Sw. Potassae

partem unam et Aquae unam cum dimidia.

℞. Potassae venalis,

Aquae frigidae,

singularum partem unam.

Stent, subinde agitata, per horas viginti quatuor; filtra deinde et ad siccum consume; residuum, usque rubroalbum coloretur, calefac in crucibulo, dissolve deinde in Aquae parte una cum dimidia, filtra liquorem et eo lente refrigerato, altero die crystallos formatas separa et sicca. (Vm.)

Wenn man nach Vm. die künftige Pottasche dadurch reinigt, daß man die Aufschwemmung bis zum Salzhäutchen abdampft, um den crystallisirbaren Salzen ihr Wasser zu entziehen, so kann man so viel von diesen sogenannten fremdbartigen Salzen trennen, daß am Ende kein Alkali übrig bleibt. Bei Besorgung des eben beschriebenen Verfahrens hat derselbe die Crystallisationsfähigkeit des kohlen-sauren Kali erkannt.

Unter dem Namen Gallatocarbonas Potassae, Gallato-carbonate de potasse hat man ein Präparat beschrieben, welches für ein neutrales kohlen-saures oder doppelt kohlen-saures Salz ausgegeben wird, in der That aber nur ein kohlen-sauerliches Salz ist; die Formel dazu ist folgende:

℞. Subcarbonatis Potassae quantum vis.

Dissolve in Aquae quam minima potest quantitate, filtra liquorem et tannini ope in pastam siccam redige, quae in crucibulo per horam dimidiam fortiter ad ruborem usque candeat; post refrigerationem massam in Aqua dissolve et liquorem filtratum ad siccum consume. (Sw*. Vm.)

2) Bereitung des Salzes durch Verbrennen des Weinstein.

Sal Tartari, Cineres clavellati, Alkali Tartari, Carbonas Potassae purissimus, Alkali vegetabile aëratum, Kali carbonicum s. Carbonas kalicus e Tartaro, Kali subcarbonicum purissimum; Weinstein-salz; Sel de tartre, Cendres clavellées (Gal.). (A. Ams. Ba. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Sp. T. Vm.)

℞. Crystallorum Tartari quantum vis.

Ad ruborem usque calefac in crucibulo argenteo, donec fumus non amplius evolvitur, residuum grossiuscule pulveratum in illo ipso crucibulo, saepius agitando, per horas duas torrefice, coque deinde cum Aquae duplo pondere per horae quadrantem; decantha liquorem clarificatum, quam operationem ter e serie repetes, filtra lixivium commixta, ad siccum in pelvi argentea

consume, sub finem saepius agitando, et denique ad rubrum usque calefac massam penitus refrigeratam in lagena bene obturata servando. (Du.)

Ba. Fenn. et Sax. Crystallus Tartariti dem praescribunt; omnes reliquae pharmacopoeae indicant vel Tartarum crudum vel Residuum e destillatione tartari et priorem in crucibulo vel aheni ferreo vel denique inter prunas in charta involutum ad alburnum calcinari jubent et donec nullum fumum amplius emittat; — HassP. itidem ad alburnum et donec sine flamma seu fumo candeat urere, residuum adhuc calidum, pulveratum in Aquae bullientis sextuplo solvere, filtrare, per horas 24 seponere et ad siccum consumere jubet.

GalH. melius procedi dicit miscendo Tartarum cum quarta parte Carbonis vegetabilis pulverati et mixta in parva crucibula inter strata carbonum disposita ingerendo.

3) Bereitung des Salzes durch Einäschern des Salpeters mit Kohle:

Nitrum fixum. (Gal Sar. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Nitri puri . . . quantum vis.
Liqua in crucibulo, in illud injiciendo per vices Carbonem grossiuscule pulveratum, donec flamma non amplius appareat; residuum deinde calcina per horae quadrantem, dissolve in Aqua et filtratum liquorem ad siccum consume.

GalH. calcinare fortiter jubet ut remaneat hyponitris, saepius in producto occurrens.

4) Bereitung des Salzes durch Einäschern des Salpeters und des Weinstein.

Nitrum per Tartarum fixum. (Fer. Gal. Fi. T. Vm.)

℞. Nitri puri,
Cremoris Tartari,

singulorum partes aequales.
Ingere mixta in mortarium ferreum, accende carbonem ardentem appropinquando, dissolve residuum in Aquae sufficiente quantitate et liquorem colatum ad siccum consume. (Fer. Gal. Fi.)

T. Cremoris Tartari crudi partes duas et unam Nitri in crucibulo per aliquot tempus igni exponere, agitare, deinde in laminam marmoream effundere et post refrigerationem cum Aqua bulliente tractare etc.; — Vm. Tartari partem unam et duas Nitri. — Diese Formel ist der des Codex gall. vorzuziehen, welche ein mit Salpeter gemischtes Salz giebt.

Man muß übrigens das Gemisch in ei-

nen kaum gerötheten Schmelzkegel werfen, die Masse sogleich nach dem Einäschern auslaugen und die Flüssigkeit bis zur Trocktheit abdampfen. Bewirkte man, statt so zu verfahren, die Einäschern bei hoher Hitze so daß das kohlenfuerliche Kali in einen Zustand teigiger Schmelzung gebracht würde, so erhielt man letzteres, nach Guibourts interessanter Bemerkung mit blausaurem Kali gemischt.

5) Bereitung des Salzes durch doppelte Zersetzung:

℞. Carbonatis Barytae

uncias duodecim.

Sulphatis Potassae

uncias quindecim.

Pulveratis infunde

Aquae bullientis

uncias viginti quatuor.

Mixta agita bene, post refrigerationem liquorem filtra et ad siccum redige. (Sw*)

6) Bereitung des Salzes durch Verbrennen von Pflanzen:

Sal Tachenianus, Sal lixiviale Tachenii. (Br. Ful. Gal. His. Pal. Sar. Wir. Wür. Sp. T.)

℞. Herbae siccae Absinthii

quantum vis.

Ingere in ollam ferream tectam igni modico superponendam, ita ut lente uratur et magnam fumi copiam sed minime flammam emittens in carbonem redigatur; tunc operculo semoto carbonem torre, continue cum baculo agitando; coque cinerem cum Aquae pondere sextuplo, cola liquorem bullientem et ad siccum consume.

Auf dieselbe Weise wie dieses *Sal Absinthii* bereitet man das

Sal Cardui benedicti. (His. Sar.)

Sal Centaurii minoris. (A. Gal. Sar.)

Sal Ligni Juniperi. (Sar.)

Sal Ononidis. (Sar.)

Sal Tamarisci. (Sar.)

Sal Stipitum Fabarum. (Sar.)

Das in diesen Pflanzen erhaltene Kali führt den Namen der Pflanze, von welcher es gewonnen ist; jedoch ist es darun immer dasselbe.

Ful. coquere jubet Carbonem productum e combustione Absinthii sicci unius librae cum Potassae purificatae uncias duodecim in Aquae sufficiente quantitate dissolutis, decoctumque ad siccum evaporare. — Ein sauerliches Verfahren.

Man darf das kohlenfuerliche Kali nicht mit Mineralsauren, mit Borax, mit salzsaurem und essigsaurem Ammoniak, mit Alaun, schwefelsaurer Bittererde, Kalk, Kalkwasser und nicht mit Metallsalzen verbinden.

*Sapo vegetabilis, Pulvis gummosus al-
calinus. (Gal.)*

℞. Subcarbonatis Potassae crystalli-
sati . . . partes quatuor.
Gummi Arabici pulverati
partes triginta duas.
Tritura simul per longum tempus.
Pulvis anticolicus Camerarii. (Wir.)

℞. Salis Absinthii,
— Chamomillae,
singulorum drachmas tres.
Crystalli rupestris praeparatae
semunciam.
Cornu Cervi praeparati
drachmas sex.

Rasurae Eboris . . . uncias duas.
Fiat pulvis tenerrimus. — *Came-
rarius* rühmte dieses Pulver bei Krank-
heiten von Säure in den ersten Wegen. —
Gabe, ein bis zwei Scrupel für Erwachse-
ne, ein halber Scrupel für Kinder.

Pulvis digestivus. (Pal.)

℞. Salis Absinthii drachmas decem.
Cremoris Tartari . drachmas sex.
Kali sulphurici,
Diagrydii sulphurati, singulorum
scrupulos duos et grana
quinque.

Elaeosacchari Citri unciam unam.
Fiat pulvis. — Bei Unterleibsversto-
rungen empfohlen. — Gabe, von einem
Scrupel bis zu einer Drachme.

*Liquor Salis Tartari s. Kali carboni-
ci s. Kali subcarbonici, Liquamen Salis
Tartari, Hypocarbonas Potassae liqui-
dum, Lixivium Tartari s. Alcali vege-
tabilis, Aqua Kali, Alcahest Glauberi,
Carbonas Lixiviae alcalinus solutus s.
Potassae alcalescens liquidus, Solutio
aqua a Subcarbonatis Potassae; süßsüßes
Weinsteinsalz, kohlensäuerliche Kalisüßsig-
keit; Solution aqueuse de sous-carbo-
nate de potasse, Liqueur de sel de tar-
tre (Gal.).*

1) Von selbst entstanden. *Oleum
Tartari per deliquium, Sal Tartari per
se liquidus. (Br. Du. Hass. Pal. RC. Sar.
Wir. Wür. Fi. Pid. Sp. Sw. T.).* Ob-
tinetur seponendo Subcarbonatem crys-
tallisatum ad locum humidum ita ut
deliquescat et liquorem filtraudo.

2) Besonders bereitet. Da der
Sättigungsgrad dieser Flüssigkeit unendlich
verschieden ist, wie man leicht einsehen wird,
so hat man vorgeschlagen, sie mittelst be-
stimmter Verhältnisse des Salzes und des
Wassers zu bereiten, nämlich:

His. Salis partem unam, et Aequae di-
midiam; — Am. An. Lon. LonN. et C. Sa-
lis et Aequae partes aequales; — Sw. Vm.
Salis unam et Aequae unam cum dimi-

dia; — A. Ba. Bor. Bor4. D. Fern.
HassP. Li. O. Pol. Sax. Suec. Salis
unam et duas Aequae (Pond. spec.
1,325 — 1,335 Bor4.; 1,300 = 40° Ar. B.
HassP.); — Lus. R. RC. Salis unam et
tres Aequae; — Wir. Salis unam et
quatuor vel quinque Aequae; — Ful.
Salis unam et Aequae quantitatem suffi-
cientem.

Diese Auflösung wird äußerlich als Schön-
heitsmittel angewendet; innerlich als abfor-
bitend, reizend, einschneidend, reinigend und
hantreibend.

Solutio lithontripica. (B. Au.)*

℞. Kali subcarbonici drachmas novem-
decim et grana duodecim.
Aequae communis uncias quindecim.

Dissolve. — Gabe, einen bis zwei Scrupel
täglich drei Mal, (B*.)

Au Subcarbonatis drachmas tres,
Aequae libras duas; solve. — Täglich
zu trinken.

Lotio antirachitica Bonhomme. (Pie.)

℞. Kali subcarbonici calcinati
semunciam ad unciam unam.
Aequae purae . . libram unam.
Dissolve.

Pediluvium alcalinum. (Ra.)

℞. Kali subcarbonici . uncias octo.
Aequae communis calidissimae
quantum sufficit
pro pediluvio. — Reizend, ableitend.

Tisana alcalina Mascagni. (Sm.)

℞. Kali subcarbonici drachmas duas.
Aequae communis . . libras duas.
Dissolve. — In vier und zwanzig
Stunden zu kleinen Bissen, jeben mit ei-
nem Aufseßel syrupus gummi Arabici,
althaeae oder pulmonis vitulini versüßt.
Mascagni empfiehlt ihn bei chronischer
Pneumonie.

Potio lithontripica. (E.)

℞. Kali subcarbonici drachmas duas.
Aequae Calcis . . octarios duos.
Gabe, alle zwei Stunden ein Glas in
Milch.

*Lixivium juniperinum s. cum Junipero.
(Sa.)*

℞. Cinerum Ligni juniperini
uncias tres.
Aequae communis . . libras duas.
Digere per horas duodecim inter ci-
neres calidos et filtra.

Auf dieselbe Weise bereitet man das
*Lixivium Absinthii, Genistae und Tama-
risoi.*

Tisana antidiysenterica. (Sm.)

℞. Cinerum Sarmontorum Vitis vini-
ferae . . . drachmas quatuor.
Aquae communis sextarios (setiers)
tres cum dimidio.

Coctione partem tertiam consume. —
In vier und zwanzig Stunden zu trinken.
— Man vermischt diesen Trank mit einer
gleichen Menge Wasser.

Collutorium alcalinum. (Galm.)

℞. Kali subcarbonici . partem unam.
Mellis despumati . partes viginti.
Tritura simul in mortario vitreo.

Syrupus alcalinus. (Gen.)

℞. Kali subcarbonici . drachmas tres.
Syrupi Sacchari . . . uncias sex.
Dissolve.

Lotio ad s. contra pernioles. (B.)*

℞. Kali subcarbonici unciam unam.
Aquae Rosarum . libram unam.
Solutionem filtra. — Brugnatelet
empfehl't keinen in diese Flüssigkeit ge-
taucht auf die Frostbeulen zu legen.

Potio ad strumam s. antistrumosa. (Sm.)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Ipecacuanhae,
Mercurii dulcis,
singulorum sesquidrachmam.
Aquae . . . octarium unum.
Decoque ad dimidii remanentiam. —
Gabe, zwei Eßlöffel in einer Pinte Tisane,
den Tag über.

Potio absorbens. (Au. E.)

℞. Magnesia subcarbonicae
drachmam unam.
Aquae uncias quinque cum dimidia.
Tincturae Cinnamomi
drachmas tres.
Subcarbonatis Potassae liquidi
drachmam unam.
Gabe, zwei ober drei Eßlöffel nach der
Mahlzeit. (Au.)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Sacchari albi,
singulorum drachmam unam.
Tincturae Lavandulae compositae
drachmas duas.
— Opii . guttas quatuor.
Aquae Menthae uncias quatuor.
Gabe, alle Stunden ober zwei Stunden
einen Eßlöffel.

Potio antispasmodica. (Au.)

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae . . . uncias quatuor.
Gabe, alle zwei Stunden einen Eßlöffel,
indem man in den Zwischenräumen zehn
Tropfen laudanum giebt. — Bei Con-
vulsionen, zugleich mit Nystiren von zwei

Scrupel kali subcarbonicum in einem
Schamillenaufguss und Epithemen in einer
Auflösung einer Unze Kali causticum in
zwei Pfund Wasser von Deutschen Aerzten
mit Nutzen angewendet.

*Aqua kalino-aetherea, Potio antiasth-
matica. (Au.)*

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae Menthae piperitae
uncias quatuor.
Liquoris Hoffmanni scrupulos duos.
Syrupi Sacchari . . . semunciam.
Gabe, ein Eßlöffel, bei Asthma.

Mixtura s. Potio saponacea. (Au.)

℞. Liquoris Kali subcarbonici
semunciam.
Olei Amygdalarum dulcium
sesquiunciam.
Aquae uncias decem.
Syrupi emulsivi . . . unciam unam.
Eßlöffelweise alle halbe Stunden, bei Arse-
nitbergiftungen.

Potio expectorans. (E.)

℞. Subcarbonatis Potassae
scrupulum unum.
Coccionellae . . . semiscrupulum.
Sacchari . . . drachmam unam.
Aquae uncias quatuor.
Gabe, ein Kaffeelöffel voll alle zwei ober
drei Stunden, beim Reuchhusten.

*Decoctum Carbonatis Potassae Absin-
thii s. febrifugum, Febrifugum sal-
sum. (His.)*

℞. Salis Absinthii drachmam unam.
Mellis electi . . . uncias quatuor.
Aquae libras duas.
Coque, despuma bene et cola.

Mixtura alcalina. (Sm.)

℞. Vitellos Ovorum recentium no. 4.
Tere, sensim affundendo,
Aquae bullitis
octarium unum (chopine).
Emulsioni adde
Olei Tartari per deliquium guttas
decem ad scrupulum unum.
Eßlöffelweise alle Viertelstunden und selbst
öfter. — Man hat es bei Sublimatver-
giftung empfohlen.

Potio pellens s. antilactea. (Sm.)

℞. Subcarbonatis Potassae
scrupulum unum.
Aquae Liliorum . . . uncias sex.
— Florum Aurantiorum
unciam unam.
Syrupi Althaeae . . . uncias tres.
Eßlöffelweise in vier und zwanzig Stun-
den zu verbrauchen, indem man die Brüste

mit einer starken Aufschüßung von Seife in einer Abkochung der Rohnköpfe bährt.

Potio antiscorbutica. (B.)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
 Aquae Cochleariae . . . uncias sex.
 — Florum Aurantiorum semunciam.
 Syrupi Erysimi . . . unciam unam.
Potio diuretica. (Sm. Sw.)

℞. Salis Genistae grana viginti quatuor.
 Succo Cerefolii deparati cochlearia viginti quatuor.
 — Millepedum . . . no. 100.
 Misce bene. (Sm.)

℞. Subcarbonatis Potassae grana decem.
 Oxymellis scillitici sesquidrachmam.
 Tincturae Lavandulae compositae semidrachmam.
 Aquae Cinnamomi drachmas sex.
 Misce. (Sw.)

Linimentum alcalinum. (Wür. Sp.)

℞. Subcarbonatis Potassae liquidi uncias duas.
 Olei Olivarum . . . uncias quatuor.
 Vitellos Ovorum . . . no. 2.
 Misce sedulo. — *Plenc empfaht es bei Schrunden.*

Julapium leniens s. sedans. (Pie.)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
 Aquae Florum Tiliae,
 — Rosarum, singularum uncias quatuor.
 Solutioni adde
 Syrupi Corticum Aurantiorum unciam unam.

Auf drei oder vier Mal in vier und zwanzig Stunden, in einem passenden Behälter.

Tisana diuretica. (Ra.)

℞. Gummi Arabici drachmas quinque.
 Saponis medicinalis semidrachmam.
 Subcarbonatis Potassae sesquidrachmam.

Nitratis Potassae grana viginti quatuor.
 Infusi Juniperi . . . libras duas.
 Von Kécamiér in verschiedenen Fällen von Wassersucht nützlich befunden.

Lac infantum. (Pie.)

℞. Subcarbonatis Sodae scrupulum unum.
 Aquae Florum Tiliae uncias duas.

Aquae Cerasorum nigrorum,
 Olei Amygdalarum dulcium,
 singularum unciam unam.
 Vitellos Ovorum recentium no. 3.
 Mucilaginis Gummi Arabici drachmam unam.

Emulsio ad s. contra lumbaginem. (Ca.)
 ℞. Subcarbonatis Potassae semidrachmam.

Aquae communis uncias decem.
 Solutioni adde
 Vitelli Ovorum . . . quantum satis.
 Olei Amygdalarum dulcium sesquunciam.
 Syrupi Althaeae . . . uncias duas.
 Glasweise alle halbe Stunden.

Potio purgans et febrifuga. (Ca.)

℞. Subcarbonatis Potassae scrupulum unum.
 Olei Ricini . . . uncias duas.
 Tritura in mortario vitreo et adde
 Syrupi Capilli Veneris semunciam.
 Aquae Menthae piperitae uncias tres.

Auf zwei Mal im Zwischenraum einer halben Stunde.

Fomentatio resolvens. (Ca.)

℞. Subcarbonatis Potassae,
 Saponis Massiliensis, singularum unciam unam.
 Aquae Sambuci . . . libras duas.
 Solutioni filtratae adde
 Salis Ammoniaci drachmas duas.

Unguentum s. Pomatum antipsoricum. (E.)

℞. Subcarbonatis Potassae semunciam.
 Aquae Rosarum,
 Cinnabaris, singularum unciam unam.
 Olei essentialis Bergamottae semunciam.

Florum Sulphuris,
 — Axungiae, singularum uncias novem.
 Misce triturando.

Tinctura antiarthritica. (Br.)

℞. Lumbricorum terrestrium cum Oleo Tartari per deliquium in pulpani redactorum unciam unam.
 Radicis Aristolochiae rotundae,
 — Juniperi, singularum semunciam.
 Extracti Chamaepityos drachmas tres.

Castorei,
 Croci,
 Subcarbonatis Potassae, singularum drachmas duas.
 Spiritus Cochleariae uncias duodecim.

Post sufficientem infusionem cola exprimendo.

Collyrium rubrum. (Bo.)

℞. Subcarbonatis Potassae grana viginti quinque.
Camphorae . . . grana decem.
Aquae Chelidonii majoris . . . uncias duas.

Digere per horas viginti quatuor ex arena, filtra deinde liquorem et adde Tincturae Aloës . . . guttas viginti quatuor.

Gegen Hornhautflecken empfohlen. — Man tröpfelt einige Tropfen davon in's Auge.

Julapium stomachicum, Mixtura Carbonatis Potassae Absinthii stomachica. (His.)

℞. Salis Absinthii scrupulos quatuor.
Aquae Corticis Citri,
— Menthae,
— Absinthii,
singulorum uncias quatuor.
— Cinnamomi . . . uncias duas.

Solutioni adde
Tincturae Ligni Aloës . . . drachmas duas.
Syrupi Corticis Citri . . . unciam unam.

Reizend. — Köstliche zu nehmen.

Tinctura antisiphilitica Besnardi. (B*, Au. Bo. Sw*. Vm.)

℞. Opii . . . partes duas.
Aquae Cinnamomi vinosae . . . partes viginti.

Maceratis adde
Gummi Arabici . . . partes duas.
Subcarbonatis Ammoniaci . . . partem unam.

— Potassae partes quatuor.
Post unum diem blandi caloris ope digestionem filtra. (Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Aquae Cinnamomi simplicis,
singulorum libram unam.
Opii . . . uncias duas.
Aquae Cinnamomi vinosae . . . uncias quatuor.

Stent in digestionem per septimanas tres, saepius agitata, in balneo aquae, tum colaturae adde

Gummi Arabici . . . uncias duas.
Subcarbonatis Ammoniaci . . . unciam unam.

Aquae Cinnamomi . . . uncias sex.
Post aliquot dies filtra. (B*. Bo.)

℞. Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Opii,
Gummi Arabici,
singulorum semunciam.
Triturata simul dissolve in

Aquae Chamomillae unciis sex.
Adde deinde

Subcarbonatis Ammoniaci,
Aquae Vitae,
singulorum drachmas duas.

Digere in balneo aquae et post refrigerationem filtra. (Sw*.)

Au. Subcarbonatis Potassae semunciam, Aquae Cinnamomi uncias quatuor, Opii grana duo et Subcarbonatis Ammoniaci drachmam unam.

Gabe, ein halber bis zwei und vier Scrupel in Gersten- oder Zuckersasser.

Tinctura antisiphilitica Talbotii. (Au.)

℞. Subcarbonatis Potassae uncias duas.
Aquae Melissae . . . uncias tres cum dimidia.

Extracti Opii,
— Chelidonii,
singulorum scrupulum unum.

Post horas viginti quatuor digestionis adde

Ammoniaci caustici drachmas duas.
Diese Tinctur, welche in der letzten Zeit von Eichhelmer gerührt wurde, hat viel Ähnlichkeit mit der vorigen.

Potio incisiva. (Bo.)

℞. Subcarbonatis Potassae . . . scrupulum unum.
Coccionellae . . . semidrachmam.

Aquae Hyssopi . . . uncias quatuor.
Syrupi Capiti Papaveris,
— Tolutani,
singulorum semunciam.

— Ipecacuanhae,
Aquae Florum Aurantium,
singulorum unciam unam.

Tritura simul coccionellam et sal, infunde aquam hyssopi fervidam; post refrigerationem filtra et adde reliqua.

— Gabe, alle zwei Stunden einen Kaffee- oder Suppenlöffel, je nach dem Alter der Kinder, bei'm Kruchhusten.

Remedium antidiabeticum de Redfearn. (Au.)

℞. Chinae rubrae . . . unciam unam.
Aluminis calcinati drachmas tres.
Subcarbonatis Potassae . . . drachmas duas.

Petrolei . . . quantum sufficit ut fiat electuarium. — Gabe, einer Nußkatnuß groß, täglich dreimal. Zu gleicher Zeit nimmt man den Tag über eine Auflösung von drei Drachmen sulphuretum potassae in sechszehn Unzen Kaltwasser und vier Pflzen, zu welchen die Formel folgende ist:

℞. Sulphatis Sodae drachmam unam.
Saponis medicinalis . . . scrupulos quatuor.

Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiant pilulae triginta.

Unguentum Bardenii s. antipsoricum. (B.)

℞. Subcarbonatis Potassae unciam unam.
Florum Sulphuris uncias duas.
Axungiae Porci uncias quatuor.
Zu vier Einreibungen den Tag über.

Protocarbonas Potassii, Carbonas Protocoxidi Potassii, Carbonas Potassae, Sal Tartari perfecte saturatum, Kali carbonicum neutrale, Carbonas Potassae completum, Kali carbonicum acidulum, Carbonas Potassae neutrum, Deutocarbonas Potassii, Alkali vegetabile crystallisatum s. perfecte saturatum, Bicarbonas Potassae; gesättigt kohlensaures Kali; Protocarbonate de potassium, Carbonate de protoxide de potassium, Carbonate de potasse, Bicarbonate de potasse (Gal.). (An. B. Ba. Bel. Bor4. D. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. HassP. Lon. LonN. Pol. Suec. C. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassae partes duas.
Aeque communis partes tres.
Post dissolutionem liquorem filtra et in eum immitte torrentem Gas Acid carbonici. Post horas viginti quatuor (tres dies Bor4.) vaporata ad crystallisandum reponere. (An. B. Ba. Bel. Bor4. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. Pol. Suec. C.)

℞. Subcarbonatis Potassae libram unam.
— Ammoniaci uncias tres.

Aeque communis octarium unum.
Potassae in aqua solutae ammoniacum adde, mixturam per horas tres temperaturae 130° F. (180° C) balnei arenae expone, donec ammoniacum perfecte sit expulsus; tunc liquorem sepositum crystallisationi subjice. (GalH. Lon. Fi.)

Dieses ist das Verfahren Berthollet's.
℞. Potassae per Alcoholem quantum vis.

Aeque destillatae pondus triplum.
Immitte torrentem Acidi carbonici in liquorem, donec perfecte sit saturatus, tunc evaporatum blandi caloris ope ad crystallisandum reponere. (Sw.)

GalH. ut pulchrae crystalli obtineantur suadet, liquorem magna Acidi carbonici copia saturatum, in quo jam est formata ad trientes duos consumere et illum deinde per dies duos seponere; — Fi. Carbonatem Potassae liquidum (Oleum Tartari) adhuc torrentem gas immittere jubet ut supra; — LonN. Liqueoris Potassae

Subcarbonatis congio torrentem gas transmittere ad plenam saturationem et vaporare, cavendo ne calor gradum 120 excedat; — T. praeter hunc agendi modum suadet Sal in vasis fictilibus vitreatis emanationibus musti uvarum vel aliorum fluidorum fermentantium exponere.

. Gal. tubum in solutionem immergi vult; — An. B. Ba. Bel. et Vm. ad ejus superficiem paene attingere jubent.

HassP. ut Sal Sodae perfecte saturatum s. Protocarbonatem Sodae.

Aqua Carbonatis Potassae acidula s. Supercarbonatis Potassae s. aërata alcalina s. cum Carbonate Potassae acidula s. Oxycarbonatis aciduli Potassae s. Falconeri s. Supercarbonatis kalici, Aqua lithontripica, Potio alcalina, Aquae mephiticae alcalina; kohlensaures Wasser; Eau méphitique alcaline, Potion alcaline (Gal.). (Am. Bor. D. Ed. Fenn. GalH. His. Pol. Suec. Br. C. Fi. Sw. Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassae puri unciam unam.
Aeque libras decem.

Sale in aqua dissoluto, torrentem Gas acid carbonici per liquorem transmittite. (Am. Ed. Fenn. Br. C. Sw.)

Fi. Carbonatis neutri drachmam unam, Aeque destillatae libram unam.

℞. Subcarbonatis Potassae partes duas.
Aeque communis partes tres.
In lagenam octariorum trium capacem Acido carbonico repletam immitte et per longum tempus agita. (Bor. GalH. Pol.)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
Aeque Acido carbonico saturatae libram unam.

Dissolve et in lagena bene obturata serva. (D.)

Suec. Salis uncias tres et Aeque cum Gase saturatae libras quinquaginta sex.
℞. Subcarbonatis Potassae partem unam.

Aeque partes centum viginti.
Satura solutionem numero desideratae atmosphaerarum Gas Acid carbonici. (Vm.)

℞. Carbonatis neutralis Potassae uncias tres.

Aeque uncias duodecim.
Dissolve et filtra. (Sw*.)

℞. Carbonatis neutralis Potassae partem unam.
Aeque cum Acido carbonico saturatae partes centum viginti.
Dissolve. (Vm.)

His. Carbonatis neutralis drachmas tres et Aquae gase impraegnatae libras duas.

Reizend, als Digestiv und steingerstörend betrachtet, in lechterer Hinsicht jetzt einen von der Mode abhängigen Ruf genießend. Auch hat man es bei sogenannten lymphatischen Krankheiten gerühmt. — Gabe, zwölf Unzen täglich, womit man allmählig steigen kann. — Bisweilen setzt man etwas Branntwein zu.

Potio lithontripica. (E.)

℞. Carbonatis neutralis Potassae grana decem ad quindecim. Aquae Seltersianae unciis sex. Drei oder vier Mal täglich zu trinken.

Protocarbonas Potassii et Ammoniaci, Carbonas Protoxydi Potassii et Ammoniaci s. Potassae et Ammoniaci. (Sw.)

℞. Subcarbonatis Potassae crystallisati partes quatuor. — Ammoniaci crystallisati partem unam.

Trituratis simul et commixtis infunde Aquae frigidae quantum requiritur ad dissolutionem. Filtra, liquori torrentem Acidi carbonici immitte ut saturetur; calefac parumper ut sal quod subsederat redissolvatur et crystallisationi subijce.

Bei Harnruhr, Verbaunngsbeschwerden und besonders bei Harnsteinen empfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme in einer halben Unze Wachholder- oder Münzenwasser, täglich vier Mal.

Hypophosphis Potassae. (Vm.)

℞. Tincturae Salis Tartari quantum vis. Phosphori granulati quantum sufficit ut frigide saturetur. Decantha et serva.

Immtere potes etiam in lagenam smiri obductam Phosphorum granulatam cum Potassa liquida concentrata et addere Alcoholium rectificatum, per aliquot dies seponere et deinde decantare.

Protosulphas Potassii, Alkali vegetabile vitriolatum, Arcanum duplicatum Mynsichti, Kali sulphuricum s. vitriolatum s. sulphuricum depuratum, Lixivia vitriolata, Nitrum vitriolatum Schroederi, Panacea duplicata, Sal de duabus s. polychrestum Glaseri s. Lemery s. sapientiae s. polychrestum parisiensis s. Tartari sulphuratum, Specificum Paracelsi, Spiritus Vitrioli coagulatum Mynsichti, Sulphas Potassae, Tartarus vitriolatus, Nitrum fixum Schroederi, Sulphas Protoxydi Potassii, Vitriolum Po-

tassae, Panacea Holsteniana, Potassa sulphurica s. vitriolata; Schwefelsaures Kali, vitriolischer Weinstein; Protosulfate de potassium, Nitre fixe de Schroeder, Panacée du Holstein, Potasse sulfatée ou vitriolée, Sel de duobus ou polychreste de Glaser, Sel de la sagesse, Sulfate de potasse, Sulfate de protoxyde de potassium, Tartre vitriolé, Vitriol de potasse (Gal.).

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Ba. Bel. Bor4. Ed. GalM. Hass. HassP. His. Li. Sax. C. Par.

§. II. Reinigung des künstlichen Salzes.

Kali sulphuricum depuratum.

B. Ba. Bel. Bor4. Hass. HassP. Li. Sax.

℞. Sulphatis Potassae venalis partem unam.

Aquae communis partes octo. Dissolve, liquori instilla solutionem Nitrosam Subcarbonatis Potassae, donec non amplius turbetur; filtra, evapora ad cuticulae tenuis apparitionem et crystallisationi subijce. (B. Bel. Hass. Sax.)

HassP. Salis partem unam, Aquae sex, coquendo solvere, addere liquorem Cinerum clavellatorum quantum requiritur vel ad saturationem acidi praeponderantis vel ad terrarum metallo-rumque praecipitationem; — Li. Aquae duplum pondus adhibet; — Ba. dissolvere jubet Salis partem unam in Aquae bullientis quinque et liquorem ad locum frigidum reponere ut in crystallis abeat; — Bor4. Sal bene crystallisatum et abissimum Aqua communi frigida abluere et siccare.

§. III. Im Ganzen bereitet.

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fen. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sar. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Sp. T. Vm.

℞. Subcarbonatis Potassae partem unam.

Aquae communis partes duodecim. Dissolve et liquori adde sensim

Acidi sulphurici (20°) quantum sufficit ad saturationem alcali; cola ad cuticulae apparitionem usque, vapora et lente refrigefac. (Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. His. Li. Lus. Pal. R. Sar. Wir. Wür. Br. Fi. Pid. T.)

R.C. Acidi sulphurici Aquae sextuplo pondere diluti quantum libet in ampulum vas vitreum infunde et instilla solutionem Subcarbonatis Potassae purissimi in Aquae sextuplo pondere ad saturandum acidum usque, finita effervescentia liquorem filtra et ad crystallisandum sepone.

R. Sulphatis Ferri . . . partes duas.
 Aquae bullientis . . . partes octo.
 Dissolve. Recipe
 Subcarbonatis Potassae
 quantum sufficit.

Dissolve in
 Aquae . . . partibus quinque.
 Liqueores ambos commisce ut perfecte saturantur, filtra deinde, praecipitatum bene ablue, aquas lotionum liquori filtrato admisce, evapora ad cuticulae usque apparitionem et crystallisationi subjice. (Br. Pal. Wir. Sp.)

R. Nitri depurati,
 Sulphatis Ferri ad alborem calcinati, singulorum partes aequales.

Immitte in crucibulum pro dimidio replendum; calcina aëri exposita, donec fumi nihil amplius prodeat; dissolve residuum in Aqua bulliente, ad siccum evapora, productum denuo calcina per plures horas, tunc in Aqua dissolutum et filtratum vaporationi subjice ut in crystallos abeat. (Sar. T.)

R. Residui ex distillatione Nitri cum
 Acido sulphurico quantum vis
 (libras duas Lon. LonN.).

Coque in
 Aquae sufficiente quantitate (con-
 gios duos).

Acidum cum excessu Subcarbonatis Potassae satura; evapora ad cuticulam, filtra et crystallisationi subjice. (B. Bor. Bor4. D. Du. Fer. Ful. Han. Lon. LonN. O Pol. RC. Suec. Br. C. Sp. T. Vm.)

A. Ed. et Gal. Subcarbonatem Calcis pro saturando Acidi excessu indicant. — Ein Verfahren, welches ein we- niger reichliches Product liefert.

Sar. solutionem ad tertiae partis consumptionem usque evaporare, filtrare deinde et ad siccum consumere; calcinare, igne fortissimo, per plures horas, in Aqua dissolvere, filtrare, ad siccum evaporare, denuo calcinare, productum in Aqua dissolvere, liquorem filtratum ad dimidium consumere et in loco frigido crystallisationi subjicere.

Fenn. excessum Acidi ignis ope expellere jubet.

Nach Chevallier und Sbt enthält das auf diese Weise erhaltene Salz bis- weilen etwas Salpeter.

R. Nitri depurati . . . partes duas.
 Florum Sulphuris partem unam.

Ingere mixta per portuiculas in ollam ferream rubro candentem. Flamma extincta massam prope ignem retine per horas duas, ollam totam ad ruborem usque calefaciens; quod post refrigerationem remanet, pulvera, dissolve in Aqua bulliente, cola ad cuticulam, evapora et in locum frigidum ad crystallisandum reponere. (Sar.)

Ams. B. Br. Ed. Wir. Wür. C. et Sp. Nitri et Sulphuris partes aequales; — Ed. productum deflagrationis post refrigerationem absque tractando cum aqua servare jubet.

Li. loco nitri Subcarbonatem Potassae et ejus cum Sulphure partes aequales adhibere jubet.

Das Product scheint eine Mischung von schwefelsaurem und schwefligsaurem Kali zu seyn. Gewiß ist, nach Duncan, daß es keinen freien Schwefel enthält, so daß der Name Sulphas Potassae cum Sulphure, welcher ihm von Ed. gegeben wird, unpassend scheint.

R. Urinae Hominis bonae valetudinis
 quantum vis.

Frigore expose ita ut ad dimidium congelet; reliquum filtra, in patinam effunde, crystallos sponte concretas ablue et siccatas serva. (Wür.)

Dieses nannte man ehemals *Sal natrium*, *Sal fusibile*, *Sal microcosmicum urinae*; es ist ein Gemisch von phosphorsaurem Natron und Ammoniak und von schwefelsaurem Kali und Natrum, in welchem das erstere dieser Salze, nach Berzelius, zu 2,94, das zweite zu 1,65, das dritte zu 4,45, das vierte zu 1,50, das fünfte zu 3,71 und das sechste zu 3,16 auf 100 enthalten ist. Um es vollkommen farblos und rein zu erhalten, muß man es anfangs durch Alcohol behandeln, dann in Wasser auflösen und die Flüssigkeit crystallisiren lassen.

Reizend, eröffnend und purgirend. — Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme als alterirendes und von einer bis sechs Drachmen als Purgirmittel.

Es darf weder mit Salz-, Salpeters- und Hydrochloresäure, noch mit salzsaurem Kali, und ebenfowenig mit Mercurialsalzen und salpetersaurem Silber verbunden werden.

Pulvis digestivus. (Li. Wir. Sv.)

R. Sulphatis Potassae partes duas.
 Concharum praeparatarum
 partem unam.

Misce bene. (Wir.)

R. Sulphatis Potassae partes duas.
 Pulveris Radicis Ari
 partem unam.

Misce triturando. (Li.)

℞. Sulphatis Potassae partes octo.
 Citratis Calcis . partes quatuor.
 Pulveris Radicis Ari
 partem unam.

Misoe. (Sw.)

Die Gabe ist im Allgemeinen eine halbe Drachme.

Pulvis digestus cum Rheo s. compositus. (DD.)

℞. Sulphatis Potassae partes quatuor.
 Pulveris Rhei . . . partem unam.
 Tritura simul. — Gabe, eine halbe Drachme. — Man kann statt des schwefelsauren Kali schwefelsaures Natron oder schwefelsaure Magnesia nehmen.

Pulvis antiphlogisticus. (Huf.)

℞. Sulphatis Potassae,
 Nitri,
 Salis Seignett',
 singulorum partes aequales.

Pulvis aperiens et resolvens. (Bo.)

℞. Sulphatis Potassae,
 Tartari martialis solubilis,
 singulorum drachmas duas,
 Salis Genistae drachmam unam.
 Nitratis Potassae semidrachmam.
 Millepedum . . grana triginta.

Misce sedulo. — Grimaudt empfahl es bei Verstopfungen der Unterleibseingeweide, bei Debem, Infiltration und Unterdrückung oder Verminderung der Urinabsonderung. — Gabe, fünfzehn oder zwanzig Gran, Abends bei'm Schlafengehen.

Tabellae desalterantes. (Pie.)

℞. Sulphatis Potassae drachmas tres.
 Sacchari . . . libram unam.
 Olei essentialis Citri guttas octo.
 Gummi Tragacanthae

quantum sufficit
 ut fiant tabellae duarum ad sex linearum crassitudine.

Dhne Zweifel ist diese Formel unrichtig, da sie Weinstein- oder Citronensäure enthalten müßte, wenn sie ihren Namen als Limonadepulver rechtfertigen sollte. Jedensfalls kann man sie unter dieser Form beibehalten. Die Tafelchen wirken reizend und alterirend. — Gabe, eine halbe Unze und mehr in einem Glase Wasser.

Conserva spagyrica. (Wir. Sp.)

℞. Salis Absinthii . . uncias duas.
 — Melissae,
 — Urticae,
 singulorum unciam unam.
 Tartari vitriolati . semunciam.
 Arcani duplicati . uncias duas.
 Fiat pulvis, cui infunde
 Spiritus Sulphuris per campanam.
 drachmas duas.

Post effervescentiam adde

Conservae Rosarum rubrarum,
 — Dianthi,
 singularum libram unam,

Misce bene. (Wir.)

℞. Salis Absinthii uncias tres et drachmas sex.

Pulveris Cinnamomi
 drachmas duas.

— Macidis,
 — Caryophyllorum,
 — Zingiberis,
 singulorum drachmam unam.
 — Sulphatis Potassae unciam
 unam et drachmas sex.

— Sacchari albi uncias octo.
 Conservae Rosarum rubrarum
 uncias sedecim.

— Dianthi uncias octo.

Acidi sulphurici drachmas duas,
 Olei essentialis Anisi,

— Citri,
 singulorum drachmam unam,

— Foeniculi
 semidrachmam.

— Cinnamomi
 scrupulum unum.

— Menthae
 guttas quatuor.

Misce sedulo. — Ein schlechtes Präparat, welches man ehemals als auflösend und als ein nütliches Auflösungsmittel bei Verstopfungen des Unterleibs, Gelbfucht, hartnäckigen viertägigen Wechselstiebern, Mangel der Menstruation betrachtete. — Gabe, von einer Drachme bis zu einer halben Unze.

Fel Vitri, Recrementa Vitri, Sal Vitri,
Anatron. (Br. Wir. Sp.)

Im weißen, leichten und schwammigen Massen. — Es ist ein Gemisch aus salzsaurem Kali oder Natron, welches sich während des Schmelzens des Glases trennt und auf der Oberfläche der glasigen Masse schwimmt.

Ehemal wendete man es als einschneidendes und Abführmittel an.

Solutio Sulphatis Potassae aquosa. (Ba)

℞. Sulphatis Potassae partem unam.
 Aquae destillatae
 partes novemdecim.

Dissolve. — Bei'm Verordnen dieses Salzes im flüssigen Zustande muß man sich erinnern, daß, nach Gay-Lussac, 100 Theile Wasser bei 12° 72 C. 10 $\frac{1}{100}$, bei 101°, 50 C. 26 $\frac{33}{100}$ desselben auflösen.

Liquor Tartari vitriolati (HassP.):
 Solutio Tartari vitriolati scrupuli unius
 in Aquae destillatae drachmis sex. —
 Ut reagens.

Potio laxativa. (Sa.)

℞. Sulphatis Potassae drachmas sex.
Aquaе Melissae . unciās quatuor.

Emulsio refrigerans. (Sa.)

℞. Sulphatis Potassae
drachmam unam.
Dissolve in emulsionis e
Seminum Malvae unciās tribus.
Aquaе Hordei quantitate sufficiente
paratae sesquilibra. Adde deinde
Syrupi Althaeae . sesquiunciam.
Glasweise.

Mixtura acida. (Sa.)

℞. Sulphatis Potassae semunciam.
Nitratis Potassae drachmam unam.
Aquaе fontanae . unciās decem.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis unciām unam.
Aceti sesquiunciam.

Mixtura vinosa. (Sa.)

℞. Sulphatis Potassae semidrachmam.
Decocti Hordei . . . libras duas.
Solutioni adde
Roob Ribium,
Vini, singulorum sesquiunciam.
Aceti unciām unam.
Syrupi Rubi Idaeī unciās duas.

Potio resolvens. (B.)

℞. Sulphatis Potassae drachmas tres.
Infusi Rhei . . . unciās sex.
Allmätig zu nehmen bei Milchversehung
gen und Milchknoten.

*Subprotosulphas Potassii, Potassae
Supersulphas, Supersulphas Potassae,
Sulphas acidus Potassae, Bisulphas Po-
tassae s. kalicus, Kali sulphuricum aci-
dum; saures Schwefelsaures Kali; Subpro-
tosulfate de potassium, Subsulfate ou
Sulfate de potasse, Bisulfate de potasse
(Gal.). (Bor4. Fer. Lon. LonN. Suec.
E. Par. Sw*. T. Vm.)*

℞. Salis e destillatione Nitri cum Acido
sulphurico residui libras duas.
Aquaе bullientis octarios quatuor
Dissolve, filtra, coctione ad dimidium
redige et ad crystallisandum sepone.
(Lon. LonN. E Vm.)

T. Obtinetur e residuo destillationis
Acidi nitrici et nitrosi, trititando et
solvendo in Aquaе pondere quintuplo
vel sextuplo.

℞. Acidi sulphurici,
Aquaе, singulorum partes septem.
Subcarbonatis Potassae
partes quatuor.

Misce et liquorem vaporando consu-
me. (Sw*.)

℞. Acidi sulphurici . partes decem.

Subcarbonatis Potassae

partes sex cum dimidia.

Acido Aquaе duplo diluto, mixturae
adhuc calenti, simulac ob effervescentiam
feri potest sal admisce; filtrata
tunc leviter evaporent et ad crystalli-
sandum seponantur. (Vm.)

℞. Sulphatis Potassae pulveratae
partes octo cum dimidia.

Acidi sulphurici partes quinque.
Sicca propoignem, ad ruborem levem
calefac, dissolve in Aquaе bullientis
parte una cum dimidia, filtra et crys-
tallisationi subjice. (Vm.)

Fer. Sulphatis unciās duas et tres
Acidi.

℞. Sulphatis Potassae partes octo.
Acidi tartarici

partes septem cum dimidia.

Contere, lava cum Aquaе tepidae
pauillo, filtra liquorem et parumper
evaporatum ad crystallisandum sepone.
(Vm.)

℞. Sulphatis Potassae . partes duas.
Acidi sulphurici partem unam.

Aquaе communis . partes tres.

Misce, ad siccum consume et pulve-
ra. (Bor4. Suec.)

Purgirend, säulnißwidrig; man will es
mit Vortheil bei gastrischen und adynami-
schen Krankheiten angewendet haben; bis-
weilen seht man es zu der Abkochung der
China.

*Potus sulphurico-salinus, Tisana sul-
phurico-salina. (Sw*.)*

℞. Supersulphatis Potassae
drachmas sex.

Aquaе libras sex.

Dissolve et solutioni adde

Aquaе Vitae,

Syrupi Violarum,

singulorum sesquiunciam.

Reizend, gelind laxirend und für säulniß-
widrig gehalten; man verordnet den Trank
bei galligen und adynamischen Fiebern,
Blutbrechen und Mutterblutfluß. — Sa-
be, glasweise mehr oder minder oft.

*Protosulphas Potassii et Ammoniaci,
Sulphas Potassae et Ammoniaci. (Vm.)*

℞. Supersulphatis Potassae quantum vis.
Aquaе fervidae duplum pondus.

In solutionem infunde

Ammoniaci liquidi quantum sufficit
ut acidum cum excessu saturetur et
ad crystallisandum sepone.

*Protosulphas Potassii et Magnesii, Sul-
phas Potassae et Magnesiaе. (Vm.)*

℞. Sulphatis Potassae
partes tres cum dimidia.

Sulphatis Magnesiaе partes decem.

Misce, solve in Aquaе fervidae suf-
ficiente quantitate, filtra liquorem et
ad crystallisandum sepone.

℞. Sulphatis Magnesiæ partes decem.

Subcarbonatis Potassæ calcinati partes tres cum dimidia.

Tritura, sensim addendo

Aquæ tepidæ quantum sufficit ad solutionem salium. Ebulliant aliquoties, tunc filtra et ad crystallisandum sepone.

℞. Supersulphatis Potassæ

partem unam.

Aquæ partes octodecim.

Satura calide solutionem cum

Magnesiæ sufficiente quantitate.

Filtra et crystallisationi subijce.

℞. Sulphatis Magnesiæ partem unam.

Aquæ partes duas.

Solutioni sensim infunde aliam solutionem saturatam Potassæ causticæ, donec nihil amplius præcipitetur; sepone, decantha, præcipitatum cum Aquæ frigidæ paulillo ablue, dissolve in Aquæ bullientis pondere octuplo et liquorem ad crystallisandum sepone.

Protohyposulphitis Potassii, Hyposulphitis Potassæ, Sulphitis sulphuratus Potassæ. (Vm.)

℞. Sulphitis Potassæ

partes septem cum dimidia.

Potassæ causticæ fusæ

partes quinque cum dimidia.

Sulphuris pulverati

partem unam cum dimidia.

Liqua sal in Aquæ tepidæ quantum fieri potest minima quantitate, adde potassam, deinde sulphur, calefac per horam dimidiam in vase tecto, filtra et crystallisationi subijce.

℞. Sulphureti Potassæ,

Sulphitis Potassæ,

singulorum partes aequales.

Contere per aliquot tempus, dissolve deinde mixturam in Aquæ quantum minima quantitate, filtra et ad crystallisandum reponere.

℞. Hydrosulphatis Potassæ

quantum vis.

Dissolve in Aqua et torrentem Gas acidum sulphurosum in liquorem immitte, donec nihil ejus amplius absorbeatur, calefac leviter, filtra et ad crystallisandum sepone.

Potes etiam transmittere Gas acidum hydrosulphuricum in solutionem Sulphitis Potassæ, calefacere deinde liquorem, filtrare et crystallisationi subijcere.

Man kann dieses Salz statt des Sulphitis sulphuratum sodæ benugen.

Protosulphitis Potassii, Sulphitis Potassæ. (Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassæ,

Aquæ, singulorum partem unam.

Dissolve et filtra, cum Gase acido sulphuroso saturata, calefac deinde in balneo aquæ tepido et liquorem ad crystallisandum sepone.

Protonitras Potassii, Nitras Protoxydi Potassii, Nitras Potassæ, Nitrum, Sal Nitri, Kali nitricum, Nitras kalicum s. kalicus s. Lixiviae; salpeterfaures Kali, Salpeter; Protonitrate de potassium, Nitrate de potasse, Nitre, Sel de nitre, Salpêtre (Gal.).

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Nitrum crudum s. venale; roher Salpeter; Nitre cru (Gal.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Br. C. Fi. Par. Pid. Sp. T.

§. II. Reinigung des käuflichen Salpeters.

Nitrum s. Kali nitricum depuratum s. purificatum s. purum, Nitras Potassæ s. kalicus depuratus s. purus; gereinigter Salpeter; Nitre depuré ou purifié (Gal.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. Fi. Par. Pid. Sm. Sp. T. Vm.)

℞. Nitri venalis partes duas.

Aquæ bullientis partem unam.

Dissolve sal in aqua, cola liquorem et crystallisationi subijce. (Ams. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. His. Li. Lus. O. Pal. R. Wir. Wür. Br. Par. Pid. Sp. T.)

RC. Nitrum venale in aquæ sextuplo solvere, filtrare et evaporare, donec guttae lapidi frigido inspersæ coagulentur, tunc in loco temperato crystallisationi subijcere, residuum evaporatum item in crystallos cogere etc.; — Fenn. et Suec. liquare jubent sal leni ignis ope, in crucibulo, massam albam post refrigerationem pulverare, dissolvere in Aquæ pondere quadruplo, colare liquorem et ad cuticulam evaporatam celeriter refrigerare, continue agitando, crystallos exortas cum Aquæ paulillo abluere et siccare; — An. Be. Bel. Bor. Bor4. HassP. et Pol. dissolvere Sal in Aquæ bullientis sufficiente quantitate (duplo), liquori instillare solutionem Subcarbonatis Potassæ, donec non amplius turbetur, tunc illum seponere, filtrare et evaporatum ad crystallisandum reponere; — Hass. Sax. et Sw. eandem genendi rationem præ-

scribunt sed praeterea liquorem filtratum cum Carbone coquere; — *Fi. Nitri* venalis libras quatuor, Aquae bullientis octo, Olei Tartari quantum sufficit, Carbonis uncias octo, caeteram ut antea; — *Han.* instillare ei Nitratum Argenti, donec non amplius turbetur.

Vm. coquere Nitrum cum Aquae bullientis quarta ponderis parte, liquorem decanthare, addere Aquae frigidae partem quartam, totum ad refrigerationem perfectam usque subige, decanthare, sal crystallisato Aquae frigidae pauxillum immittere, eum in infundibulos ingerere et in illis frigide abluere primo pluries cum eadem ipsa solutione saturata Nitratis depurati tunc cum solutione nondum adhibita; crystallos exstillatas deinde in Aquae bullientis partibus quinque dissolvere, liquorem calidum filtrare et ad crystallisandum seponere.

Nitrum purissimum (HassP.) praeparatur solvendo Nitri depurati partem unam in Aquae destillatae partibus octo, liquori filtrato tam diu liquorem Barytae nitricae diluorem instillando, quam praecipitatum oritur et iterum filtrato liquorem Argenti nitrici diluorem sensim affundendo, donec Acidum Salis secretum sit; residueat fluidum, a sedimento defundatur et filtratum, si opus est, cum guttulis aliquot Salis Tartari puri a Baryta vel Argento omnino liberatum limpidum evaporare fac et in crystallos coge, quas sicca; — ut reagens.

§. III. Wiedererzeugter Salpeter.

Nitrum regeneratum.

Br.

R. Acidi nitrici . . . quantum vis.
Instilla paulatim
Solutionis Subcarbonatis Potassae quantum sufficit
vel donec effervescentia desierit; filtra liquorem et ad cuticulam usque evaporatum crystallisationi subijce.

§. IV. Salpeter mit fremden Substanzen getränkt.

Nitrum papaveratum (Pal), Nitrum in Infusione Papaveris dissolutum et in crystallos concretum; *Nitrum rosatum* (Wir), in Infusione saturata Rosarum rubrarum dissolutum et in crystallos concretum.

§. V. Salpeter mit schwefelsaurem Kali vermischt.

Nitras Potassae cum Sulphure fusus,

Nitrum tabulatum, Sal s. Lapis Prunellae, Crystallum s. Crystallum minerale, Crystallus mineralis; Prunellensalz; Sel ou Pierre de prunelle, Cristal minéral (Gal).

Ams. An. Br. Gal. His. Pal. Sar. Wir. Fi. Sp. T. Vm.)

R. Nitri libras duas cum dimidia.
Liquatis in crucibulo adde pedetentim

Florum Sulphuris . . . semunciam.
Deflagratione finita et vase parumper refrigerato massam liquatam in pelvim immitte inter manus agitatum ita ut sal parietibus ejus tenuis et uniformis strati instar adhaereat, quod post refrigerationem separatam in frusta dirumpe. (His.)

An. Nitri libras duas et Sulphuris semunciam; — *Sar.* Nitri libram unam et Sulphuris drachmas duas; — *Ams.* Sulphuris partem unam et Nitri viginti; — *Gal.* Sulphuris partem unam et Nitri centum viginti octo; — *Fi. T.* et *Vm.* Sulphuris partem unam et Nitri viginti quatuor; — *Br. Pal. et Wir.* Sulphuris partem unam et Nitri viginti quatuor; — Caeterum agendi modus ubique aequalis.

Reizend, in hohen Gaben purgirend, jedoch unter die kühnsten oder vielmehr entzündungswidrigen Mittel gestellt, ohne Zweifel wegren her durch die Reizung der ersten Wege bewirkten Ableitung, und für ein ganz besonders harttreibendes Mittel gehalten. Man hat es bei Wasserfuchten, Blutflüssen, Flechten, Zipper angewendet. — Gabe, gewöhnlich jeden Gran bis eine halbe Drachme; neuere Practiker sind aber weit höher gestiegen, ein Beweis, daß der Salpeter nicht so giftig wirkt, als Fodéré und Orfila behauptet haben.

Schwefelsäure, schwefelsaures Natrum und Bittererbe, Maaun und schwefelsaure Metalloxyde dürfen nicht damit verbunden werden, da sie Zersetzung bewirken.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Salpeters nicht merklich durch fremde Substanzen verändert ist.

Nitrum perlatum. (Wir.)

R. Nitri purificati uncias quatuor.
Matris Perlarum praeparatae . . . semunciam.

Misce bene. — Ehedem verordnete man dieses Pulver von fünf Gran bis zu einem Scrupel bei bössartigen Fiebern und man schrieb gewöhnlich dem ganz wirkungslosen Zusatz des Salpeters die Hauptwirkung zu.

Hierher gehört auch der Pulvis nitrosus (Au): Nitri et Testarum Ovorum

praeparatorum, singulorum partes aequales.

Pulvis Iridis cum Nitro s. anticatharhalis. (Au.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
 unciam unam.
 Nitri drachmam unam.
 Cetacei drachmas duas.
 Sacchari unciam unam.
 Gabe, ein Kaffeelöffel bei Catarrhalbeschwerden.

Pulvis aperitivus. (Gen. Sw)*

℞. Nitri unciam unam.
 Pulveris Gummi Arabici
 sesquiunciam.
 — Radicis Liquiritiae,
 — Althaeae,
 singulorum uncias tres.

Harntreibend, erweichend, in dem höchsten Stadium der Harnröhrenentzündung empfohlen. — Gabe, anderthalb bis zwei Drachmen, drei Mal täglich, in Wasser. (Sw*)

℞. Nitri drachmas tres.
 Magnesia semunciam.
 Divide in partes duodecim. (Gen.)

Pulvis Nitratis Potassae compositus. (RC.)

℞. Nitratis Potassae,
 Sacchari albi,
 singulorum semunciam.
 Gummi Arabici unciam unam.
 Mische ut fiat pulvis. — Gabe, eine bis anderthalb Drachmen.

Pilulae aperitivae. (Sw. Vm.)*

℞. Nitri drachmas sex
 Pulveris Gummi Arabici
 drachmas tres.
 — Radicis Liquiritiae,
 — Althaeae,
 singulorum uncias tres.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit
 ut fiant pilulae granorum quinque. (Sw*)

℞. Nitri partem unam cum dimidia.
 Concharum praeparatarum
 partem unam.
 Pulveris Gummi Arabici
 partes duas.
 — Radicis Liquiritiae,
 — Althaeae,
 singulorum partes quatuor.

Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Vm.)
 Harntreibend, erweichend, schmerzstillend, bei Harnröhrenentzündung und Dysurie empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück, täglich drei Mal. — Auffallend ist es, daß Van Mons in seiner Ausgabe des Oedictaur die Kupferstaaten nur dann

zusetzt, wenn die Gonorrhoe durch den Gebrauch des Biers erzeugt worden ist.

Trochisci de Nitro s. Nitratis Potassae. (Ed. Wür. C. Sp.)

℞. Nitri purificati partem unam.
 Sacchari partes tres.
 Contere et pulveri adde
 Mucilaginis Gummi Tragacanthae
 quantum sufficit
 ut fiat massa in trochiscos dividenda. (Ed. Wür.)

Sp. Nitri partem unam, Sacchari sex, unam Succu Citri et Mucilaginis quantum sufficit.

Electuarium temperans. (Gen. Ham)

℞. Nitri purificati drachmas duas.
 Conservae Rosarum,
 Oxy mellis simplicis,
 singulorum uncias duas.

Misce. (Ham.)

Gen. Nitri semunciam et Conservae Rosarum uncias quatuor absque oxymelle.

Tisana nitrata. (Pie.)

℞. Nitri semidrachmam.
 Tisanae communis libras quatuor.
 Dissolve sal in tisana. — Glasweise.

Potio diuretica. (Sm.)

℞. Nitri semidrachmam.
 Succu Cerefolii
 cochlearia viginti quatuor.
 Dissolve. — Eßlöffelweise.

Potio febrifuga. (B)*

℞. Nitri unciam unam.
 Succu Baccarum Oxycocci
 libram unam.

Dissolve. — Gegen Wechselfieber. — Man giebt davon täglich eine Unze bis ein halbes Pfund. — Statt des succu oxycocci kann man auch den succus rubi oder myrtilli nehmen.

Mixtura nitrosa. (BorC.)

℞. Nitri drachmas duas.
 Aquae purae uncias octo.
 Syrupi Sacchari unciam unam.
 Mische.

Gargarisma commune. (Ful. Li.)

℞. Nitri drachmam unam.
 Aquae communis uncias octo.
 Solutioni adde
 Syrupi Aceti unciam unam.
 Kühlend, reizend, auflösend.

Mixtura e Kali nitrico s. nitrata s. refrigerans s. sedativo-refrigerans. (WW. Sa. Sm)

℞. Nitri drachmam unam.
 Aquae communis uncias octo.

Solutioni adde

Oxymellis simplicis unciam unam.
Alle Stunden zwei Eßlöffel. (VV.)

℞. Nitri semunciam.
Aquae purae uncias sex.

Solutioni adde

Aceti,
Syrupi Aceti Rubi Idaei,
singulorum unciam unam.

Man giebt alle zwei Stunden einen oder zwei Eßlöffel. (Sm.)

℞. Nitri drachmam unam.
Aquae Florum Sambuci

uncias octo.
Syrupi Mororum sesquiunciam.
Gabe, alle Stunden zwei Eßlöffel. (Sar.)

Linctus s. Looch refrigerans. (Sa.)

℞. Nitri semidrachmam.
Syrupi Rubi Idaei unciam unam
— Ribium uncias tres.

Misce bene.

Injectio lithonriptica. (Bo.)

℞. Nitri uncias duas.
Acidi nitrici drachmas duas.
Collae Flamandicae unciam unam.
Aquae libram unam.

Dieses Einspritzungsmittel wurde zur Auflösung von Steinen, welche aus phosphorfaurem und sauerstoffsaurem Kalk bestehen, vorgeschlagen.

Potion aperitiva. (Ra.)

℞. Nitri scrupulum unum.
Decocti Quinque Radicum
uncias quinque.
Syrupi Quinque Radicum
uncias duas.

Loco syrui Oxymel et, si necesse est, Spiritus Mindereri semuncia addi potest. — Wird bei Wassersuchten empfohlen.

Potion nitrosa, Potion nitrée (Ra.)
Nitri grana octodecim, Decocti Graminis uncias quatuor et Syrui Quinque Radicum unciam unam. — Paßt wie die vorige zur Bethätigung der Urinabsonderung.

Potion temperans. (Sm.)

℞. Nitri grana quindecim.
Aquae Lactuae uncias sex.
Solutioni adde
Aquae Florum Aurantium
drachmas duas.
Syrupi Nymphaeae uncias duas.
Auf zwei oder drei Mal während der Nacht, im Anfang hitziger Krankheiten.

Julapium refrigerans. (Pie.)

℞. Nitri semidrachmam.
Infusi Capilli Veneris
uncias quinque.

Solutioni adde

Succi Aurantium uncias duas.
Syrupi Granati unciam unam.

Auf vier Mal.

Gargarisma refrigerans s. nitrosum. (Fi. Sa. Sm.)

℞. Nitri drachmas sex.
Decocti Hordei libram unam.

Solutioni adde

Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce. (Sm.)

Sa. Mellis rosati uncias tres loco oxymellis; — Fi. Nitri scrupulum unum, Aquae communis libram unam, Aceti semunciam, Mellis rosati unciam unam.

Potion antiphlogistica. (Ham.)

℞. Nitri drachmas tres,
Decocti Radicis Althaeae

uncias octo.
Oxymellis simplicis uncias duas.
Eßfelweise.

Tisana antiphlogistica. (Au. Ca. E.)

℞. Hordei mundati uncias duodecim.
Aquae libras tres.
Coque donec hordei semina sint disrupta, tunc decocto adde

Nitri sesquidrachmam.
Syrupi Aceti uncias duas.
Alle Stunden eine kleine Tasse, bei entzündlichen Fiebern (Ca.)

Au. Decocti Hordei libras duas, Nitri drachmam unam et Oxymellis unciam unam; — E. Decocti Hordei octarium unum, Nitri drachmas duas et Succi Citri unciam unam ad duas.

Potion diuretica. (Ca.)

℞. Nitri semunciam.
Decocti Hordei
octarium (chopine) unum.
Olei Amygdalarum dulcium
uncias quatuor.

Syrupi Althaeae uncias sex.
Tassenweise alle vier Stunden, bei Dysurie und Strangurie.

Decoctum stomachicum resolvens, Tisana stomachica resolvens. (B.)

℞. Decocti amari libram unam.
Extracti Taraxaci drachmam unam.
Nitri sesquidrachmam.
Allmählig zu nehmen, bei Anschwellungen der Unterleibseingeweide mit träger Verdauung.

℞. Decocti amari libram unam,
Nitri drachmas duas.
Den Tag über zu nehmen.

Clymsa s. Enema refrigerans. (Au. Sa.)

℞. Nitri semidrachmam.
Decocti Seminum Lini
uncias quinque.

- Solutioni adde**
 Olei Lini recentis,
 Oxy mellis simplicis,
 singularorum unciam unam.
Misce. (Sa.)
- R. Decocti Hordei . . .** uncias decem.
Nitri drachmam unam.
Mellis unciam unam.
Misce. (Au.)
- R. Seri Lactis . . .** uncias quatuor.
Nitri drachmam unam.
 Oxy mellis simplicis unciam unam.
Misce. (Au.)
- Emulsio nitrosa, (GalM. Au. B. Sa.)**
R. Nitri scrupulum unum,
 Dissolve in unciis sex emulsionis
 praeparatae cum
 Amygdalarum dulcium excortica-
 tarum drachmis sex.
 Seminum Papaveris albi
 drachma una.
 Aquae Tiliae quantitate sufficiente.
Solutioni adde
 Syrupi Succi Citri unciam unam.
 Stündlich, Löffelweise. (Sa.)
- R. Amygdalarum dulcium excortica-
 tarum** semunciam.
 Aquae libram unam.
 Nitri semunciam.
 Syrupi Althaeae unciam unam.
 Fiat emulsio. (Au.)
- R. Emulsionis gummosae**
 libram unam.
 Nitri drachmam unam.
 Mellis despumati unciam unam.
Misce. (B.)
 GalM. Emulsioni simplici Nitri par-
 tes decimas tres addere jubet.
- Emulsio Barthezii. (Bo.)**
R. Nitri grana decem.
 Dissolve in emulsionem praeparata cum
 Seminum frigidorum majorum
 semuncia.
 Decocti drachmarum duarum Chi-
 nae unciis octo.
- Solutioni adde**
 Syrupi Capilli Veneris
 unciam unam.
 Auf zwei Mal, bei Blutspien und an-
 dern Brustbeschwerden.
- Tisana vinosa. (Pie.)**
R. Nitri semidrachmam.
 Aquae communis . . . libras duas.
Solutioni adde
 Vini albi vel rubri uncias quinque.
 Ein Reizmittel für den Darmcanal, glas-
 weise zu nehmen.
- Potio refrigerans. (Sa.)**
R. Nitri,

- Sacchari albi,**
 singulorum scrupulos duos.
Aquae alexiteriae simplicis
 uncias duas.
Essentiae Piperis Jamaicae
 drachmas duas.
 Dieser Trank ist keineswegs kühlend,
 sondern vielmehr stark reizend.
- Potio leniens s. sedans et diuretica. (Pie.)**
R. Nitri grana viginti.
 Aquae destillatae Parietariae,
 — — Petroselini,
 — — corticis Fabarum
 singularum unciam unam.
Acidi nitrici alcoholisati
 scrupulum unum.
 Syrupi Limonum unciam unam.
 Auf einmal zu nehmen. — Man wie-
 derholt es alle vier Stunden, wenn die
 Schmerzen nicht weichen, indem man nö-
 thigenfalls eine Unze Syrupus Papaveris
 albi zusetzt.
- Julapium leniens et purgans. (Pie.)**
R. Nitri drachmas tres.
 Aquae Lactuae,
 — Rosarum,
 — Portulacae,
 — Rhoeados,
 singularum uncias tres.
Solutioni adde
 Syrupi Violarum,
 — Granati,
 singulorum sesquiunciam.
 Auf drei Mal den Tag über.
- Julapium temperans. (Sm.)**
R. Nitri grana duodecim.
 Aquae Lactuae,
 — Portulacae,
 singularum uncias quatuor.
Solutioni adde
 Syrupi Violarum . . . uncias duas.
 — Limonum unciam unam.
 Aquae Florum Aurantiorum
 semunciam.
 Auf zwei oder drei Mal, während der
 Nacht zu nehmen.
- B. Präparate, in denen die Wir-
 kung des Salpeters mehr oder
 weniger durch fremde Substanzen
 verändert ist.**
- 1) Durch Campher.
Pulvis nitroso-camphoratus. (Sy.)
R. Nitri grana decem.
 Camphorae grana quatuor ad octo.
 Gummi Arabici scrupulum unum.
 Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.
- R. Nitri,**
 Sacchari,
 singulorum grana quindecim.

Camphorae grana duo ad quatuor.
Ebenso angewendet wie das vorige.

Pulvis temperans camphoratus. (D. DD.)

℞. Pulveris refrigerantis
partes octodecim.
Camphorae pulveratae
partem unam.

Misce sedulo.

Pulvis alexipharmacus. (Wir.)

℞. Nitri crudi sesquiunciam.
Oculorum Cancrici Acido citrico, saturatorum unciam unam.
Boli Armenae sesquiunciam.
Camphorae drachmam unam.
Pulverata misce. — Gabe, einen bis zwei Scrupel.

Aqua diuretica camphorata. (Ca.)

℞. Nitri uncias duas.
Camphorae cum Alcoholis pauxillo tritae drachmam unam.
Trituratis simul adde pedetentim
Aquae octarium (chopine) unum.
Eßlöfweise.

℞. Nitri uncias quatuor.
Aquae Parietariae libras duas.
Solutioni adde
Acidi aceticum uncias quatuor.
Alcoholis semlibram.
Camphorae drachmas sex.
Agitata diu filtra. — Gogleich eßlöfweise zu nehmen.

Emulsio refrigerans. (Sm.)

℞. Nitri grana decem.
Liqua in emulsione refrigerata, praeparata triturando in mortario
Seminum Cannabis

pugillum unum
et pastae sensim infundendo

Aquae bullientis
octarium (chopine) unum.

Solutioni adde
Camphorae in Aethere dissolutae
grana sex.

Syrupi Nymphaeae uncias duas.
Abends zu vier Gläsern, stündlich, bei gonorrhoea chordata.

Tisana emulsiva camphorata s. cum Camphora. (Sm.)

℞. Nitri scrupulum unum.
Camphorae grana octo.
Seminum Melonum uncias duas.
Fiat emulsio cum
Aquae fontanae

sufficiente quantitate.

Colaturae (librarum duarum) adde
Sacchari uncias duas.

Alle zwei Stunden ein Glas mit Zusatz einiger Tropfen Citronensaft.

Mixtura diuretica et refrigerans. (Pie.)

℞. Nitri grana quinquaginta.

Camphorae grana quadraginta.
Mellis Narbonnensis unciam unam.
Tere diu et adde
Aquae sufficientem quantitatem.
In der ersten Periode der Harnröhrenentzündung empfohlen.

Mixtura nitrato-camphorica. (Sw*.)

℞. Nitri sesquidrachmam.
Sacchari albi drachmas tres.
Olei Camphorae semidrachmam
ad drachmam unam.

Commisce exacte, tunc tritura cum
Mellis albi sesquiuncia.
Aquae Salviae uncias decem.
Reizend, für krampfstillend und schweißtreibend gehalten und bei exanthematischen Fiebern, besonders aber gegen Seitenstechen empfohlen. — Gabe, einen oder zwei Eßlöfel alle zwei Stunden.

2) Durch Eisen.

Pulvis diureticus martialis. (Ham.)

℞. Pulveris diuretici quantum vis.
Limaturae Ferri porphyrisatae
scrupulos quatuor.
Divide in partes octo.

3) Durch salzsaures Ammoniak.

Pulvis refrigerans. (Sw*.)

℞. Nitri partes duas.
Salis Ammoniaci partem unam.
Misce terendo. — Man wendet es, in eine Blase gethan und mit Wasser getränkt oder mit zerstoßenem Eis vermischt, in kühlen Umschlägen auf die Oberfläche des Rückens, besonders in Fällen von eingeklemmten Brüchen an.

Fomentatio s. Fovis refrigerans s. frigidus s. frigida Schmuckeri s. Richteri, Mixtura frigorifica s. antiphlogistica. (B*. Ful. Han. HassP. Au. B. Br. Ca. Fi. Pie. Sp. Sw.)

℞. Nitri uncias octo.
Salis Ammoniaci uncias quatuor.
Aquae libras viginti.
Solutioni adde

Aceti libras duas.
Misce bene. (Ca. Sw.)

B*. Nitri, Salis Ammoniaci, singulorum libram unam, Aquae uncias sexcentas quadraginta et Aceti nonaginta sex; — Pie. Nitri libram unam, Salis Ammoniaci uncias octo, Aquae libras duodecim et Aceti libras quatuor;

Sp. Nitri semunciam, Salis Ammoniaci uncias duas, Aquae centum viginti, et Aceti duodecim; — Br Nitri uncias duas, Salis Ammoniaci unam et Aquae fontanae cum Acido acetico acidulatae libras duas; — Han. Salis Ammoniaci, Nitri, singulorum unciam unam,

Aquae et Aceti, singulorum sedecim; — HassP. Salis Ammoniaci, Nitri, singulorum partem unam, Aceti partes quatuor, Aquae quadraginta octo; — Ful. Nitri uncias duas, Salis Ammoniaci unam, Aceti semilibram et Aquae libras sex; — Au. Nitri uncias quatuor, Salis Ammoniaci duas, Aceti libram unam et Aquae octo; — B. Nitri drachmas tres, Salis Ammoniaci duas, Aceti libram unam et Aquae quatuor; — Fi. Nitri, Salis Ammoniaci, singulorum unciam dimidiam, Aquae uncias novem, Aceti fortis uncias tres; — vel: Nitri semunciam, Salis Ammoniaci drachmas duas, Aquae libras duas, Aceti uncias duas (Foment. Richteri).

Diese Flüssigkeit ist besonders bei Duetzungen und Austretzungen von Blut zc. von Nutzen. Man trinkt vier- oder sechsfach zusammengesetzte Weinwand damit und legt sie kalt auf; die Ueberschläge müssen alle Stunden erneuert werden.

Tinctura antigonorrhoeica s. contra gonorrhoeam. (Pie.)

℞. Nitri uncias duas.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Aquae octarium unum.
Dissolve blando calore et adde
Camphorae drachmas duas.
Alcoholis sufficientem quantitatem.
Macerentur ad refrigerationem producti usque et filtrentur. — Gabe, ein Eßfel, in einem Glase Wasser.

4) Durch Opium.

Boli contra tussim. (Pie. Sm.)

℞. Nitri purificati grana duodecim.
Pilularum de Cynoglosso grana quatuor.
Conservae Rosarum rubrarum scrupulos duos.
Fiant boli duo. — Jeden Abend alle zwei oder drei Stunden.

Potio antinephretica. (Fer.)

℞. Caputum Papaveris uncias sex.
Aquae libras tres.
Decoctum ad unciarum octo remanentiam et adde colaturae
Nitri unciam unam.
Gabe, eine bis zwei Drachmen täglich in acht Unzen Reinsaamen- oder Eibischabkochung.

5) Durch Meerzwiebel.

Pulvis diureticus. (Pie. Sw.)

℞. Nitri calcinati partes octo.
Radici Vincetoxici partes sex.
Scillae siccatae partem unam.
Misce bene. (Pie. Sw.)
Sw. praeterea: Nitri grana quindecim,

Scillae et Piperis Jamaicaensis, singulorum decem.

℞. Nitri,

Cremoris Tartari,

singulorum scrupulos quatuor.

Pulveris Scillae grana octo.

— Zingiberis grana sedecim.

Misce et divide in partes octo. (Ham.)
Bei Wassersuchten, besonders Bauchwassersucht, Asthma und chronischen Blasenkrankheiten, als harn- und schweißstreibendes Mittel. — Die erste Formel ist von Van Helmont. Man giebt das Pulver zu zehn bis zwanzig Gran, zwei, drei oder vier Mal täglich.

Mixtura diuretica. (Fi. Sw.)

℞. Nitri drachmas duas.

Aquae uncias octo.

Solutioni adde

Pulveris Radicis Scillae

semidrachmam.

Oxymellis scillitici unciam unam.

Fi. loco pulveris scillae Extracti Scillae scrupulum unum.

Bei Wassersuchten und Brustbeschwerden von sogenannter Verschleimung gepriesen. — Gabe, zwei bis drei Eßfel drei Mal täglich.

Decoctum resolvens et diureticum, Tisana resolvens et diuretica. (B.)

℞. Decocti Graminis libram unam.

Extracti Trifolii,

Nitri, singulorum drachmam unam.

Oxymellis scillitici unciam unam.

Allmählig zu nehmen, bei Verstopfungen der Leber und der Milz.

Potus antiphlogisticus diureticus, Tisana diuretica. (B.)

℞. Decocti Radicis Asparagi

libras duas.

Nitri drachmas duas.

Oxymellis scillitici semunciam.

Allmählig zu nehmen.

6) Durch säuerliche oder Neutrafsalze.

Mixtura refrigerans. (Au. Sw.)

℞. Nitri,

Cremoris Tartari,

singulorum drachmas duas.

Aquae uncias octo.

Solutioni adde

Syrupi Aceti Rubi Idaei

unciam unam.

Alle zwei Stunden einen Eßlößl. (Sw.)

℞. Nitri,

Cremoris Tartari,

singulorum drachmas tres.

Aquae uncias sex.

Succi Citri,

Syrupi Limonum,
singulorum unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden einen Eßffel.
(Au.)

Mixtura salina simplex. (Sa.)

℞. Nitri,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas sex.
Aquae Foeniculi uncias quinque.
Solutioni adde
Aetheris sulphurici
drachmam unam.
Syrupi Capiti Papaveris
uncias duas.
Ebenso wie das vorige angewendet.

Potus antiphlogisticus et diureticus,
Tisana refrigerans et diuretica. (B.)

℞. Decocti Graminis . . . libras duas.
Cremoris Tartari . . . unciam unam.
Nitri drachmas tres.
Sacchari unciam unam.
Den Tag über allmählig zu trinken.

Tabellae de tribus, Saccharum nitratum. (Sa.)

℞. Nitri purificati . . . unciam unam.
Cremoris Tartari . . . semunciam.
Sacchari albi . . . libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit

ut fiant tabellae.

Pulvis temperans diureticus s. temperans albus s. nitrosus s. Nitri tartaricus. (Fenn. Ham. Li. B.)

℞. Nitri drachmas tres.
Cremoris Tartari . . . semunciam.
Divide in partes octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Nitri partem unam.
Cremoris Tartari . . . partes tres.
Misce bene. (Ham)

Li. Saliium, singulorum partes aequales.

℞. Nitri purificati,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Sacchari albi uncias tres.
Pulverata seorsim commisce (Fenn.).
— Gabe, eine halbe Drachme für Erwachse-
lene.

Pulvis Nitri tartaricus. (Succ.)

℞. Nitri depurati . . . partes decem.
Acidi tartarici bene siccati
partes duas.
Subcarbonatis Magnesia
partem unam.
Sacchari albi . . . partes triginta.
Tritura acidum cum magnesia, tunc
cum saccharo et denique cum nitro.
Mixtura refrigerans. (Sw.)
℞. Nitri drachmas tres.

Acidi tartarici scrupulum unum.
Sacchari albi unciam unam.
Aquae uncias octo.
Dissolve. — Interdum adduntur Olei
Amygdalarum dulcium uncia una vel
duae. — Stündlich, Eßfelweise.

Pulvis temperans Bouillon - Lagrange.
(Ca.)

℞. Nitri libras tres.
Tartari

libras quatuor cum dimidia.

Acidi borici libram unam.

Pulverata per cribrum setaceum tenerimum
cribra. — Temperirend, sarrirind, bei
Hautkrankheiten, manchen Catarrhalbe-
schwerden und reuteulo urinae empfohlen.
— Gabe, eine halbe Drachme in einer
Pinte Wasser, wozu man zwei und eine
halbe oder vier Drachmen zerfallenes Glau-
berfals setzt, und wovon man Morgens ein
Glas voll trinkt.

Pulvis Nitri oxalicus s. nitrosus s. temperans Rosensteinii. (B. Succ. Vm.)

℞. Nitri depurati . . . sesquunciam.
Salis Acetosellae . . . semunciam.

Tabellarum Citri

uncias septem cum dimidia.

Pulverata misce. (B.°)

℞. Nitri uncias tres.

Salis Acetosellae . . . unciam unam.

Sacchari albi . . . uncias decem.

Pulverata seorsim misce. (Succ.)

Vm. Acetosellae Salis unciam unam,
Nitri duas et tres Sacchari.

Pulvis diaphoreticus. (E.)

℞. Nitri drachmam unam.

Tartari stibiatii . . . granum unum.

Mercurii dulcis grana sex.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück
alle zwei Stunden in Syrup.

Trochisci refrigerantes s. temperantes.
(Ful. Sp.)

℞. Pulveris Nitri . . . drachmas sex.

— Salis Acetosellae

drachmas duas.

— Sacchari albi . . . uncias sex.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae

quantum sufficit

ut fiat massa trochiscorum. (Ful.)

Sp. Nitri unciam unam, Salis Aceto-
sellae drachmas quatuor, Sacchari un-
cias sex, Essentiae Citri semiscrupulum
et Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Gabe, eine bis vier Drachmen.

Pulvis febrifugus salinus. (Vm.)

℞. Nitri . . . partes duas cum dimidia.

Subcarbonatis Potassae

partem unam cum dimidia.

Cremeris Tartari . partes duas.
Sulphatis Potassae . partes tres.
Nucis moschatae partem unam.
Pulverata sedulo misce.

Pulvis temperans. (Bor. BorC. Bor4.
Han. HassP. O. R. Vm.)

℞. Nitri,
Sulphatis Potassae
singulorum partes aequales.
Pulverata misce.

Pulvis temperans Unzeri. (Br. *Pid. Sp.*)

℞. Nitri depurati,
Sulphatis Potassae,
singulorum unciam unam.
Pulveris diatrageanthae
drachmas duas.

Misce bene. (*Pid.*)

℞. Nitri,
Sulphatis Potassae,
Subcarbonatis Magnesia,
singulorum partes aequales.

Misce ut fiat pulvis. (Br.)

Sp. eandem formulam sed loco magnesiae Oculos Cancrorum.

7) Durck Schwefel.

Pulvis pyricus s. pyricus de Struensee.
(B.)

℞. Nitri partes sex.
Sulphuris,
Carbonis,
singulorum partem unam.

Pulverata misce. — Heilmittel bei Bisswunden wüthender Thiere. — Ein schlechtes Mittel, da es nur oberflächlich wirkt.

Protochloras Potassii, Chloras Protoxydi Potassii, Chloras Potassii, Murias Potassae hyperoxygenatum s. oxygenatum, Alkali vegetabile salito-dephlogisticatum, Chloruretum Potassae oxydatum, Haloidum oxygenatum, Oxygenochloruretum Potassii, Potassae Euchloras, Kali muriaticum oxygenatum s. oxymuriaticum s. chloricum, Chloras kalicus; oxydirt salzsaurer Kali; Protochlorate de potassium, Chlorate de protoxide de potassium, Chlorate de potasse, Muriate suroxigéné de potasse (Gal.). (B*. Bor4. Fer. Gal. Br. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Salis communis,
Acidi sulphurici,
singulorum partes quinque.
Potassae causticae fusae
partes quinque cum dimidia.
Oxydi Mangani
partes octo cum dimidia.

Potassae Aquam adde, donec liquidum non supra 30° B. indicet, filtra, in vitrum cylindricum, longum et arctum

infunde, in liquorem trans mitte torrentem Chlori reliquas tres substantias commiscendo producti; lamellas quae subsident, collige et cum Aquae frigidae pauxillo ablue. (B*. Fer. Gal. Br. Sw. T. Vm.)

Fi. Salis marini libras duas, Oxydi Mangani, Acidi sulphurici, singulorum libram unam, Potassae causticae fusae unciam unam, Aquae purae libras quatuor; — GalH. et Sw. Subcarbonatem praescribunt; GalH. liquidum 20° B. et redissolutionem lamellarum in Aqua bulliente indicat.

Bor4. Kali oxymuriaticum venale indicat, quod depuratur solvendo in Aquae destillatae fervidae partibus tribus, filtrando et ad crystallisationem reponendo.

Reizend, bei Scorbut, Flechten, chronischer Leberentzündung und venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, fünfzehn bis dreißig Gran.

Solutio Muriatis Potassae oxygenati, Liquor ad ulcera atonica, Solutio Chloratis Potassae. (B*. Sw. Sy.)

℞. Chloratis Potassae

drachmam unam.

Aquae destillatae uncias duodecim.
Dissolve. — Man trinkt mit dieser Flüssigkeit Charpieplumasscaur oder trägt sie mittelst eines Pinsels auf schmerzlose Geschwüre, um das Leben der Gewebe zu bethätigen.

Aqua alcalina oxymuriatica. (B*. Du.)

℞. Salis communis decrepitati

libras duas.

Oxydi Mangani . libram unam.

Aquae,

Acidi sulphurici,

singulorum libras duas.

Commisce sal et oxydum, immitte in retortam et infunde aquam, adde deinde sensim acidum et trans mitte torrentem Gasis evoluti e liquore praeparato cum Subcarbonatis Potassae uncias quatuor et Aquae uncias viginti novem. Liquidum saturatum pendet 1,087.

Potus oxygenatus, Tisana oxygenata.
(Sw.)

℞. Solutionis Chloratis Potassae

libras duas.

Aquae purae . . libras quatuor.

Commisce. — Reizend, in Fällen allgemeiner Affectionen gepriesen. — Gabe, ein bis zwei Pfund täglich.

Protohydrochloras Potassii, Hydrochloras Protoxydi Potassii, Hydrochloras s. Murias Potassae, Sal digestivum

s. febrifugum s. febrifugus etc. Sylvii, Spiritus Salis marini coagulatus, Chloruretum Potassii; hydrochlorisauris Kali, Eplivus Digestivus; Protohydrochlorate de potassium, Hydrochlorate ou Muriate de potasse, Sal digestif ou febrifuge de Sylvius (Gal.). (B*. Ba. Br. Gal. His. Sar. Wir. Fi. Sp. T. Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassae

quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit
ad dissolutionem; liquori filtrato in
funde

Acidi hydrochlorici

quantum sufficit
ad saturandam potassam. Evaporet li-
quidum, donec 30° indicet et seposi-
tum crystallisationi subjiciatur. (Ba.
Gal. His. Wir. T.)

Fi. Salis Tartari quantum vis; infun-
datur Acidum muriaticum per vices, do-
nec effervescentia cessaverit; filtra et
ad cuticulam usque consume.

℞. Salis communis

partes quinque cum dimidia.

Subcarbonatis Potassae calcinati

partes sex cum dimidia.

Aquae . . . partes sedecim.

Coque, filtra et ad crystallisandum
reponere, liquorem calidum servando, do-
nec non amplius crystallos demittat.
(Vm.)

B*. Sar. Fi. Sp. et T. Residuum e
praeparatione Subcarbonatis Ammonia-
ci elegi voluit; — Br. et Wir. Sal
commune per Sal Tartari in Aqua dis-
solutum decomponi et crystallisationi
subjici voluit.

Potest etiam, secundum Chevallier et
Idt, Sulphas vel Supertartras Potassae
dissolvi in Aqua destillata et liquori
infundi Hydrochloras Calcis liquidus,
donec non amplius oriatur praecipita-
tum. (T.)

Dieses Salz führt, crystallisirt, den Na-
men Chloruretum Potassii.

Reizend, schmelzend, einschneidend, gegen
vier- und dreitägige Fieber als schweiß-
und harntreibendes Mittel gepriesen. —
Gabe, ein bis zwei Scrupel in vier Mal
so viel Wasser.

Hydrosulphas Potassae. (Vm.)

℞. Potassae causticae calcinatae

partem unam.

Aquae . . . partes sex.

Post solutionem immitte torrentem
Gasis acidi hydrosulphurici in liquo-
rem, qui post subsidentiam clarefactus
servetur.

Protoacetas Potassii, Acetas Prot-
oxydi Potassii, Acetas Potassae, Ace-

tis s. Acetas Potassae s. Lixiviae s.
kalicum s. kalicus, Alkali Tartari
Aceto saturatum, Alkali vegetabile
cum Aceto, Arcanum Tartari, Kali ace-
tatum s. aceticum, Lixivia acetata, Ma-
gisterium Tartari purgans, Oxytariarius,
Sal diureticus, Tartarus acetosus, Terra
foliata Tartari; Weinfleinblättererde, es-
sigsaurer Kali; Protoacétate de potas-
sium, Acétate de protoxide de potas-
sium, Acétate de potasse, Terre foliée
de tartre (Gal.). (A. Am. Ams. An. B.
Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du.
Ed. Fenn. Fer. Ful. G. Gal. Li. Gen.
Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon.
LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax.
Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Pid. Sp.
Sw. T. Vm.)

1) Im festen Zustande.

℞. Subcarbonatis Potassae sicci et pul-
verati . . . libram unam.

Aceti fortis libras duas vel tres.
Calefac sal in capsula vitrea et adde
sensim acetum; cessata effervescentia
destillent in balneo aquae ad siccum;
residuo adde novum acetum et iterum
destillando ad siccum redige; continua
ita, donec acetum immutatum transeat;
sicca deinde sal blando calore, dissolve
in Alcoholis triplo et tunc, filtratus
liquor destillet in balneo aquae; resi-
duum siccum serva. (Pal. Sar.)

℞. Subcarbonatis Potassae

partem unam.

Dissolve in Aquae parva quantitate
et solutioni adde

Aceti destillati . . . libras octo.

Coque ad syrupi parumper spissi con-
sistentiam, adde novum acetum ita ut
perfecte saturetur, sicca lente, conti-
nue agitando, liqua residuum in Aqua
destillata et liquorem filtratum lente
consume. (Ams. An. Wür. Br.)

℞. Subcarbonatis Potassae

quantum vis.

Aceti . . . quantum sufficit.

Infunde sensim acidum salis et per
plures dies digere, saepius agitando
et anaturatio perfecta sit videndo; tunc
lente ad siccum evaporatis, sal in
Aqua pura dissolve et liquorem ad
siccum usque consume. (B. Bel. Bor.
Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gen.
Han. His. Lon. LonN. Lus. O. Pol.
R. Suec. Wir. C. Fi. Pid. Sp. Sw.)

℞. Subcarbonatis Potassae

quantum vis.

Immitte sensim in

Aceti destillati

sufficientem quantitatem

ita ut perfecte dissolvatur. Cola li-
quorem et in capsula argentea consu-
me ad quartae (tertia Bor4. HassP.)

circiter partis remanentiam, tunc refrigerationeponè ut subsideat et decanthato sensim adde Acetum; evaporat deinde ad siccum. (Gal. Bor4. HassP. T.)

Loni. Potassae sesquilibram, Acidi acetici congiuum; parte dimidia consumta instilla Acidum quod ad plenam saturationem sufficit; iterum ad dimidium evaporèt etc.; — LonN. Potassae libram unam, Acidi acetici fortioris octarios duos, Aquae destillatae fermentis octarios duos, primum ad cessationem effervescentiae, deinde ad cuticulam evaporare jubet; — *Vm.* hunc ipsum agendi modum indicans acidum leviter calefacere jubet, antequam sal immittatur et liquorem statim caloris vividioris ope et sub continua agitatione ad siccum redigere.

Proposuerunt quidam ad obtinendum majorem salis alborum, liquorem per filtrum e carbonibus compositum transmittere (T.), vel illum frigide cum carbone animalì tractare, vel cum pulvere Carbonum vegetabilium praeparatorum coquere (Bor4. HassP.), vel sal pluries dissolvere et vaporationibus successivis subjicere.

R. Acetatis Calcis desiccati partes septem cum dimidia, Subcarbonatis Potassae desiccati partes undecim et tres quadrantes.

Misce terendo et adde Aquae bullentis quantum exacte ad acetatem productum dissolvendum requiritur, quod per plures vices est infundendum, cola exprimendo et statim sicca ut supra. (*Vm.*)

R. Sulphatis Potassae pulverati partes octo cum quadrante, Acetatis Barytae crystallisati partes tredecim.

Commisce, adde Aquam et ut antea age. (*Vm.*)

Vm. praeterea Tartratem Potassae et Acetatem Calcis, singulorum partes aequales et in Aqua ad saturationem dissolutas vicissim commiscere ita: ut alter alterum decomponat; fit hoc infundendo Tartratem in Acetatem, colando cum expressione, residuum abluendo et liquores commixtos evaporando.

T. Acetatem Plumbi liquidi per Solutionem Carbonatis vel Sulphatis Potassae decomponere, mixta igni exponendo ad bullitionem usque, filtrare et liquido infundere guttas aliquot Sulphatis vel Carbonatis Potassae et ad siccum usque evaporare.

2) Im flüssigen Zustande.

Acetas Potassae liquidus s. aquosus,

Liquor Terrae foliatae s. Tartari vegetabilis s. Kali acetici s. digestivus Boerhaavii s. Alkali acetici nigri s. Terrae foliatae Tartari s. Salis Alkali vegetabilis acetati, Salsilago Oxytartari, Acetas Lixiviae solutus, Mixtura salina pauperum; Blätterweinsteinerbeständigkeit, flüssiges essigsaures Kali; Acétate de potasse liquide, Liqueur de terre foliée de tartre (Gal.). (A. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Fenn. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. *Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

R. Subcarbonatis Potassae

quantum vis.

Acidi acetici concentrati quantum sufficit ad saturandum sal i. e. partes circiter duas; infunde sensim salic acidum, mixturam tubi vitrei ope agitando. Liqueur filtratus pendeat 1,230 ad 1,235. (Ba.)

R. Subcarbonatis Potassae

uncias duodecim.

Aceti . . . quantum sufficit ut perfecte saturetur. Mixta stent in digestionem per aliquot dies, subinde agitata; adde acetum si requiritur, vaporando ad unciarum octoginta octo remanentiam (R.), vel ita consume ut liquor 7^o indicet (Bel.).

Von dieser Formel giebt es zahlreiche Verschleidenheiten: Hass. Misce Subcarbonatis libram unam et Aceti communis quantum satis ad sal neutralisandum, consume deinde ad librarum trium remanentiam et filtrata serva; — A. Subcarbonatem cum Aceto destillato (pond. 1 005), tunc totum ad librarum trium remanentiam consume, ita ut liquoris pondus sit 1,200; — Fer. GalF. GalH. Subcarbonatem cum Aceto satura et Aquae fontanae sufficientem quantitatem adde ut totum pondus sit sesquilibra; — BorC. DD. Ful. Sp. *Vm.* In Aceto albo 6^o Subcarbonatis dissolve quantum potest; liquorem filtra et serva; — Ham. Subcarbonatis unciam unam satura cum Aceti quantitate necessaria et ad unciarum sex remanentiam consume; — GalM. Commisce Subcarbonatis partem unam et Acidi 13^o sedecim, calefac ad perfectam saturationem et serva.

R. Acetatis Potassae partem unam, Aquae destillatae . . partes duas. Dissolve. (Ams. Bor. Bor4. Br. D. HassP. O. Pol. R. Sax. *Fi. Sw. T.*)

Bor4. Pond. sp. = 1,140 — 1,150.

Hass. et *Pid.* Sal voluit in aëre libro deliquescere et liquorem filtrari.

R. Subcarbonatis Potassae

drachmas duas.

Aceti quantum sufficit
ad saturandum sal. Liquori adde
Aquae communis

uncias duas ad quatuor.

Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce bene. (B*.)

Rx. Subcarbonatis Potassae
libram unam.

Infunde per portiones

Aceti quantitatem sufficientem
ut saturetur. Liquorem post tres dies
filtratum consume balnei arenae ope
ad librarum trium remanentiam et
adde

Alcoholis uncias duas.
Serva in lagena obturata. (Li.)

Das essigsäure Kali ist ein Reizmittel,
welches, je nach den Gaben oder den Um-
ständen als auflösend, eröffnend, harntrei-
bend und abführend wirkt. Man wendet
es bei Wassersucht, Gelbsucht und Verstop-
fungen der Unterleibeingeweide an. —
Die Gabe ist von einem Scrupel bis zur
Drachme und mehr. Das Flüssige betref-
fend, so giebt man es gewöhnlich zu vier-
zig bis achtzig Tropfen in einem passenden
Behälter.

Mineralsäuren, Tamarindenabkochung,
Quecksilbersublimat, salpetersaures Silber,
schwefelsaures Natrium und Bittererde, salz-
saures Ammoniak und Cremor tart. dür-
fen nicht damit verbunden werden.

A. Präparate, in denen die Wir-
kung des Salzes nicht oder wenig-
stens nicht merklich durch fremde
Substanzen verändert ist.

Bolus antilactosus s. lac pellens. (Sm.)

Rx. Acetatis Potassae scrupulum unum.
Conservae Florum Calendulae

quantum sufficit.

Misce sedulo. — Morgens vier und
zwanzig Tage lang zu nehmen um die
Milch aus den angeschwollenen Brüsten zu
entfernen; man trinkt dann einen Napf voll
Quenbel- und Selleriabkochung mit frischer
Butter verfest. Nöthigenfalls kann man
Abends noch einen Bissen nehmen.

Potio diuretica. (Ra. Sa. Sm.)

Rx. Acetatis Potassae semidrachmam.
Succi Cerefolii uncias duodecim.

Solutioni adde

Syrupi Quinque Radicum aperien-
tium uncias duas. (Sm.)

Rx. Acetatis Potassae drachmas duas.
Infusi Tiliae uncias quatuor.

Solutioni adde

Aquae Cinnamomi
drachmam unam.

Syrupi Aceti unciam unam.
Misce bene. (Ra.)

Rx. Oculorum Cancrorum praeparato-
rum drachmas tres.

Aceti sesquiunciam.
Cessata effervescentia liquorem dilue
cum

Aquae fontanae uncias octo.

Solve in eo deinde

Acetatis Potassae drachmam uniam
et adde denique

Syrupi Foeniculi unciam unam.

Misce sedulo. (Sa.)

Essigweise. — In der letztern Formel
hängt die harntreibende Wirkung vornehm-
lich von dem essigsäuren Kalt ab.

Potio aperiens s. aperitiva. (Sm.)

Rx. Acetatis Potassae drachmas duas.
Infusi Chamomillae uncias sex.

Aquae Cinnamomi hordeatae
uncias duas.

Extracti Millefolii

drachmas quatuor.

Gabe, ein Eßlöffel dreimal täglich. Man
trinkt dann einen Bouillon von vier Unzen
Hammelfleischbrühe mit einer Handvoll Ci-
chorien-, Pustlattig- und Brunnentresselblät-
tern.

Mixtura ad icterum s. antiicterica. (Ca)

Rx. Acetatis Potassae,

Extracti Taraxaci liquidi,
singulorum semunciam.

— Cicutae liquidi
grana decem ad viginti.

Aquae Foeniculi uncias sex.
Syrupi Quinque Radicum

unciam unam.

Gabe, zwei Eßlöffel alle vier Stunden.

Tisana aperiens s. aperitiva. (Sm.)

Rx. Acetatis Potassae semidrachmam,
Nitri scrupulum unum.

Succi Boraginis uncias duas.
Solutioni adde

Seri Lactis clarificati

octarium unum.

Desboys von Rochefort verordnete die-
sen Trank, den Tag über, aber größtent-
heils Morgens nüchtern zu nehmen.

Potio temperans, Mixtura salina. (Hass.
Suec. Sa.)

Rx. Subcarbonatis Potassae

drachmas tres.

Aceti uncias novem
vel quantum satis ad saturationem.

Adde

Aquae fluvialis libram unam.
Syrupi Sacchari uncias duas.

Misce et filtra. (Suec.)

Hass. Subcarbonatem cum Aceto sa-
turare, liquoris uncias quatuor vel
quinque cum Aquae destillatae aequali
quantitate diluere et addere Syrupi apti
alicujus unciam unam; praeterea: Sa-

lis Tartari quantum vis, Aceti Vini quantum sufficit ad saturationem (loco *Potionis Riverii*) (HassP.); — Sa. in lagenam immittere Aceti uncias novem, Aquae libram unam et Sacchari uncias duas, tunc addere Subcarbonatis Potassae drachmas tres et bene obturatam in loco frigido servare.

Gabe, zwei Eßlöffel alle zwei oder drei Stunden.

Conserva resolvens et aperiens. (Bo.)

℞. Terrae foliatae Tartari semunciam.
Sulphatis Sodae drachmam unam.
Succi Nasturtii,
— Fumariae,
— Mercurialis,
Succi Taraxaci,
singulorum uncias duas,
Sacchari . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Eßlöffel voll, drei oder vier Mal täglich.

Electuarium ad scrophulas s. antiscrophulosum. (Sm.)

℞. Acetatis Potassae drachmas sex.
Conservae Cochleariae uncias duas.
Extracti Graminis,
— Taraxaci,
singulorum unciam unam.
Syrupi Cichorii compositi
quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel viermal täglich in einem Glase einer schwachen Hopfenabkochung.

Potus diureticus simplex, Tisana diuretica. (Au. B.)

℞. Decocti Graminis libram unam.
Liquoris Terrae foliatae Tartari
uncias duas.

Allmählig zu nehmen.

Potio diuretica. (Au.)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
Aceti . . . quantum sufficit
ad saturandum alcali. Adde
Aquae . . . uncias quatuor.
Syrupi Limonum . . . semunciam.

Allmählig zu nehmen.

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
Aceti . . . quantum sufficit
ad saturationem alcali. Adde
Aquae . . . uncias quatuor.
Syrupi Rubi Idaei . . . uncias duas.

Allmählig zu nehmen.

℞. Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
Aceti aromatici quantum sufficit
ad saturandum. Adde
Aquae Cinnamomi unciam unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.

Pharmacopoea universalis. II.

Gabe, alle Stunden einen Eßlöffel.

Decoctum resolvens et diureticum, Tisana resolvens et diuretica. (B.)

℞. Decocti Graminis . . . libras duas.
Liquoris Terrae foliatae Tartari
uncias duas.

Allmählig zu nehmen, bei Wasserfucht.

℞. Decocti amari . . . libram unam.
Tincturae Rhei aquosae
uncias quatuor.
Terrae foliatae Tartari
drachmas duas.

Bei Anschwellungen der Unterleibsgebeide.

℞. Infusi Corticis Aurantiorum
libram unam.
Terrae foliatae Tartari
drachmas duas.

Sacchari . . . unciam unam.

Bei sogenannten asthenischen Entzündungen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des essigsauren Kali mehr oder weniger durch fremde Substanzen verändert ist.

1) Durch Alcohol.

Hierher gehört außer den folgenden Potzeln auch der liquor terrae foliatae tartari nach Li.

Potio diuretica. (Ra.)

℞. Acetatis Potassae unciam unam.
Vini albi . . . libram unam.

Bei sogenannten passiven Wasserfuchten, d. h. wenn kein Zeichen einer heftigen Reizung des Darmcanals bemerkt wird, empfohlen.

Liquor Terrae foliatae Tartari spirituosus. (Br. Pal. Wir.)

℞. Acetatis Potassae bene siccati
uncias duas.
Alcoholis concentrati uncias octo.
Stent in digestionem per dies aliquot tunc filtratur. — Ehedem als ein vortreffliches Mittel bei Hypochondrie, Dobagra, viertägigem Fieber und allen durch Stockungen entstandenen Krankheiten gepriesen. — Gabe, dreißig bis sechzig Tropfen.

Solutio lithonriptica della Lena. (B*)

℞. Acetatis Potassae liquidi
uncias duas cum dimidia.
Subcarbonatis Potassae
unciam unam.

Aquae destillatae uncias quatuor.
Alcoholis . . . uncias duas.
Stent in digestionem ad perfectam salis solutionem usque.

Man kann von dieser Flüssigkeit geben bis dreißig Tropfen in einem schicklichen Behälter geben.

Essentia dulcis. (Wir. Ca.)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Aquaë sesquunciam.
Coque in capsula porcellanea, donec
massa tota colorem nigrum acceperit
et refrigeratae infunde

Alcoholis (30°) uncias duodecim.
Dissolve, subinde agitando, et filtra.
(Ca.)

Wir. dissolvere massam jubet in
prioribus liquidi tribus destillando si-
mul Aquaë Vitae libras quatuor, Alu-
minis uncias quatuor et unam libram
Aquaë obtentis.

Reizend, stärkend, eröffnend, balsamisch
und harntreibend. — Gabe, dreißig bis
sechzig Tropfen in einem passenden Tranke
für Erwachsene; drei oder vier bis zwölf
für Kinder.

2) Durc̄ Spiessglanz.

*Liquor Kali acetici cum Rheo, Mixtura
desobstruens.* (Au. Pid.)

℞. Subcarbonatis Potassae
drachmam unam.

Aceti quantum sufficit
ad saturandum perfecte alcali. Solu-
tioni adde

Tincturae Rhei aquosae
unciam unam.

Vini antimonialis Huxhami
drachmam unam.

*Electuarium antiscrophulosum s. ad
scrophulas.* (Bo.)

℞. Acetatis Potassae,
Pulveris Spongiae ustae,
singulorum drachmas duas.

— Mercurii dulcis
grana duodecim.

— Sulphureti Antimonii
sesquidrachmam.

— Jalapae grana sedecim.

Florum Sulphuris drachmam unam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Von Baumé bei scrophulösen Anschwel-
lungen der Lymphdrüsen empfohlen. —
Gabe, zwölf bis vierundzwanzig Gran zwei
Mal täglich.

3) Durc̄ Aether.

Mixtura salina. (DD.)

℞. Acetatis Potassae liquidi
uncias duodecim.

Aetheris sulphurici
drachmam unam.

Infusi Menthae piperitae
uncias sex.

✓ Commisce bene.

Liquor resolvens. (Sa.)

℞. Liquoris Terrae foliatae Tartari
uncias quatuor.

Extracti Centaurii minoris
drachmas duas.

Aetheris sulphurici guttas viginti.

Syrupi Kermetis . . . uncias duas.

Misce sedulo.

4) Durc̄ China.

Mixtura resolvens. (Bo. Pic.)

℞. Acetatis Potassae grana decem.

Extracti Chinae . . . grana tria.

— Cicutae . . . grana duo.

Infusi Foliorum Jaceae uncias tres.

Von Baumé bei Drüsenverstopfungen
empfohlen. — Eßfelweise drei oder vier
Mal täglich.

Electuarium febrifugum et aperiens.
(Bo.)

℞. Acetatis Potassae liquidi
uncias duas.

Extracti Chinae . drachmas duas.

— Cascariillae
drachmam unam.

Elixir Proprietatis unciam unam.

Gaub rühmte es bei Wechselstiebern mit
Verstopfung oder Wassersucht. — Gabe,
dreißig Tropfen in einem Eßffel Wasser alle
zwei Stunden an den freien Tagen.

5) Durc̄ Meerzwiebel.

Liquor scilliticus. (Ham.)

℞. Subcarbonatis Potassae
quantum sufficit

ad saturandum perfecte
Aceti scillitici . . . unciam unam.

Essentia scillitica Keupii. (Br. Ca.)

℞. Subcarbonatis Potassae semunciam.

Aceti scillitici cum Aceto destilla-
to praeparati uncias duodecim.

Coque ad mellis consistentiam et
adde

Alcoholis (36°) . . . uncias sex.

Digere per aliquot dies et decantha.

— Bei Asthma und Wassersucht empfohlen.
Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen in ei-
nem passenden Vehikel.

*Haustus diureticus s. Potio diuretica
Milmanni.* (B*.)

℞. Subcarbonatis Potassae
grana quindecim.

Aceti destillati quantum sufficit

ad solvendum alcali. Liquori adde

Aquaë communis . . . semunciam.

— Menthae crispae
unciam unam.

— Piperis Jamaicaensis,
Aceti scillitici,
singulorum drachmam unam.

Syrupi Sacchari drachmas duas.
Gabe, eine halbe bis eine Drachme alle
sechs Stunden, bei Wassersucht.

Mixtura resolvens. (Sa.)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Oxymellis scillitici . unciās duas.
Aqueae Foeniculi,
— Petroselini,
— Juniperi,
singularum unciās sex.

℞. Liquoris Terrae foliatae Tartari
semunciam.
Extracti Inulæ drachmas duas.
Oxymellis scillitici unciām unam.
Aqueae Hyssopi . . . unciās sex.
Potio diuretica et leniens s. sedans.
(Pie.)

℞. Acetatis Potassae,
Oxymellis scillitici,
singulorum drachmam unam.
Aqueae Tiliae . unciās quatuor.
Laudani liquidi Sydenhami
guttas quindecim.
Syrupi Quinque Radicum aperien-
tium . . . unciām unam.
Eßfelweise.

Elixir resolvens. (Ca)

℞. Subcarbonatis Potassae purificati
unciās duas
Aceti scillitici quantum sufficit
ad saturationem. Adde
Aqueae destillatae Chamomillae
libras quatuor.
Tincturae Antimonii Jacobi,
— Martis aperientis,
singularum unciām unam
Extracti Fumariae,
— Trifolii,
— Millefolii,
— Cardui benedicti,
singulorum semunciam.

Filtera liquorem. — Alle zwei Stun-
den einen kleinen Eßfel, als Reizmittel für
den Nahrungscanal. — Man empfiehlt
dieses Elixir bei Wasserfucht.

Hyper- s. Superprotooxalas Potassii,
Superoxalas Protoxydi Potassii, Super-
oxalas s. Binoxalas Potassae, Bioxalas
kalicus cum Aqua, Oxalas acidulum Po-
tassae s. Potassae acidulus s. basicus
s. acidum s. acidus, Superoxalas kali-
cum, Hyperoxalas Potassae, Acetosellae
Sal, Sal Acetosellae, Oxalium, Kali oxali-
cum acidulum, Oxalas subpotassicus;
saures sauerklee-saures Kali, Sauerklee-salz;
Surprotooxalate de potassium, Suroxa-
late de protoxide de potassium, Sur-
oxalate ou Binoxalate de potasse, Oxa-
late acide ou acidule de potasse, Sel
d'oseille (Gal.).

§. I. Wie es im Handel vorkommt.
An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Fenn.
Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. Suec. C.
T.

T. führt die Bereitungsart an, welche mit

der im folgenden §. angegebenen ziemlich
übereinstimmt.

§. II. Besonders bereitet.

Br. Fer. Ful. Pal. Sar. Wir. Wür.
Br. Fi. Pid. Sp. Vm.

℞. Foliorum recentium Acetosellae
quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo cum
pistillo ligneo, exprime succum preli
ope, calefac in balneo aquae et adde
albumen subactum ut clarescat; evapo-
ret deinde in balneo aquae et in loco
frigido crystallisationi subjiciatur. (Br.
Fer. Ful. Pal. Sar. Wir. Wür. Br. Pid.
Sp. Vm.)

Fi. per se clarificare, filtrare, levis
bullitionis ope ad syrupi consistentiam
redigere et in lagenis ad crystallisan-
dum seponere.

℞. Acidi oxalici . partes duodecim.
Subcarbonatis Potassae calcinati
partes sex cum dimidia.

Misce et dissolve in Aqueae quantum
minima potest quantitate; filtra et in
crystallo; redige. (Vm.)

Fi. Acidi crystallisati partes quatuor,
Salis Tartari unam et Aqueae destilla-
tae quantum sufficit.

Entzündungswidrig, fählend, abstringi-
rend, aber wenig in Gebrauch.

Quadroxalas Potassae (T): Sal Ace-
tosellae cum Acidi oxalici quantitate
sua ipsius aequali conjungendo bulli-
tionis ambarum substantiarum in Aqueae
destillatae sufficiente quantitate ope
paratur. — Ist weniger löslich, kann
aber eben so angewendet werden.

Oxalas neutrum Potassae, Kali oxali-
cum purum. (HassP. T.)

Paratur saturatione liquoris Acidi
oxalici calefacti cum liquore Salis Tar-
tari purissimi vel saturando acidum
kali oxalici cum Potassa — ut reagens.

Pulvis Oxalatis Potassae. (B)*

℞. Salis Acetosellae scrupulos duos.
Elaeosacchari Citri
unciās duas cum dimidia.

Commisce bene.
Trochisci temperantes. (Wir. Pid.)

℞. Salis Acetosellae drachmas duas.
Sacchari albi . . . unciās octo.

Olei Citri . . . guttas decem.
Pulverata cum

Mucilaginis Gummi Tragacanthae
sufficiente quantitate

in massam redige in trochiscos divi-
dendam.

Protocitras Potassii, Citras Protoxy-
di Potassii, Citras Potassae s. kalicam
s. kalinum, Kali citratum, Sal Absinthii
citratum; citronsaures Kali; Protocitra-
te de potassium, Citrate de protoxide

de potassium, Citrate de potasse (*Gal.*).
(Ba. Bor. Han. O. Br. Sw. T. Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassae crystallisati
quantum vis.

Succi Citri recens expressi
quantum sufficit

ad saturationem. Infunde pedetentim
succum et subinde liquorem reagen-
tium ope de saturationis gradu inda-
gando; sepone per horas viginti qua-
tuor, filtra et ad siccum consume.

*Citras Potassae aquosus, Mixtura sa-
lina s. salina simplex, Solutio Citratis
kalici.* (B*. Fenn. Lus. Suec. Au. Br.
Sw.)

℞. Subcarbonatis Potassae
drachmas tres.

Succi Citri semilibram,
vel quantum ad saturationem kali suf-
ficit. Adde

Aquae fontanae
sufficientem quantitatem

ut libra una liquidi impleatur et
Syrupi Sacchari unciam unam.

Misce bene. (B*. Fenn. Lus. Suec.
Br.)

℞. Subcarbonatis Potassae
drachmam unam.

Succi Citri uncias tres.
Solutioni adde

Aquae Cinnamomi uncias sex.
Sacchari albi semunciam.

Misce. (*Sw.*)
Gabe, alle fünf oder sechs Stunden drei
Eßlöffel.

Mixtura salina composita s. Macbridii.
(Lus.)

℞. Succi Citri unciam unam.
Subcarbonatis Potassae

quantum sufficit
ad saturandum acidum. Adde

Aquae Menthae uncias septem.
Tartari sibiati granum unum.

Syrupi Sacchari semunciam.
Misce.

Mixtura tonica. (E.)

℞. Succi Citri sesquunciam.
Subcarbonatis Potassae

drachmam unam.
Tincturae Chinae unciam unam.

Aquae Cinnamomi uncias tres.
Gabe, alle zwei Stunden ein Eßlöffel.

*Prototartras Potassii, Deutotartras
Potassii, Tartras Protoxydi Potassii,*

*Tartras neutrum Potassae, Alkali vege-
tabile tartarissatum s. fixum tartarisa-
tum, Kali tartaricum s. tartarissatum,*

*Lixivia tartarissata, Sal vegetabile, Sal
panchrestum s. diureticum vegetabile,*

Tartaras tartarissatus s. solubilis, Tar-

tras kalinus. s. Lixiviae s. Potassae;

weinsteinsaures Kali, Weinstein Kali, tarta-

risirter Weistein; Prototartrate de po-

tassium, Tartrate de protoxide de potas-

sium, Tartrate de potasse, Tartrate

neutre de potasse, Tartre tartarise,

Tartre soluble, Sel végétal (Gal.). (A.

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4.

Br. D. Du. Ed. Fenn. Per. Ful. Gal.

Gen. Hass. HassP. His:Li. Lon. LonN. Lus.

O. Pal. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür.

C. Fi. Par. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

1) Im festen Zustande.

℞. Subcarbonatis Potassae
quantum vis.

Aquae ferventis quantum sufficit
(sextuplum vel octuplum)

ad solutionem. Liquori bullienti adde

Cremoris Tartari quantum sufficit

ad saturandum perfectae acidi excessum.

Post refrigerationem filtra et ad cuti-
culam evaporata in crystallos coge.

Bor. Bor4. Kali carbonici quantum
vis, Aquae fervidae octuplum, Tartarum

depuratum adde, donec effervescentia
cesset et ad saturationem, massam

ad siccum inspissatam solve in
Aquae destillatae frigidae partibus de-

cem et per horas 36 sepone, liquorem
filtratum et ad siccum evaporatum ser-

va; — HassP. per horas viginti qua-
tuor seponere; — Per. Ful. Li. Sar.

Wür. Sp. et Vm. a reliquis non diffe-
runt, quam quod Solutionem Subcar-

bonatis ei Supertartratis addant.

2) Im flüssigen Zustande. Li-

quor sp'eticus ex Tartaro.

℞. Tartari albi crudi,
Nitri crystallisati,

singulorum libram unam.

Post detonationem mixturae in cru-
cibulo, residuum dissolve in

Aquae bullientis libris tribus.
Cola et colaturae adde

Tartari albi pulverati libram unam.
Digere per dies septem et decantha.
(Pal. Wir. Sp.)

Reizend, harntreibend, schmelzend, abfüh-

rend. — Gabe, von einem Scrupel bis

zur Drachme, als alterirendes, etwa eine

Unze als abführendes Mittel.

Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure,

Kalkwasser, salzsaurer Kalk, schwefelsaures

Katronum und vegetabilische Säuren dürfen,

weil sie Zersetzung bewirken, nie damit

verbunden werden.

Pulvis leniens antihypochondriacus

Kleinii, Solamen hypochondriacorum,

Pulvis digestivus Kleinii. (B*. Ham. Sm.)

℞. Tartratis Potassae,

Rhei,

Corticis Aurantiorum,
singulorum partes aequales.

Fiat pulvis. (B*. Ham.)

℞. Tartratis Potassae drachmas duas.
Pulveris Rhei,

— Corticis Aurantiorum,
singulorum drachmam unam.

Olei Cajeput scrupulum unum.

Misce et divide in partes viginti qua-
tuor. (Sm.)

Von Klein und Baldinger vielleicht
zu sehr gerühmt; es bewirkt bisweilen ge-
lindes Purgiren. — Gabe, zwei oder drei
Stück alle zwei Tage, jedes in einer Tasse
Zuckerwasser.

Pulvis incidens s. resolvens. (Sa.)

℞. Tartatis Potassae,
Salis Ammoniaci,
Subcarbonatis Magnesiae,
singulorum semunciam.

Radicis Ari . . . drachmas duas.
Nügen wie das vorige.

*Liquor Tartari tartarisati, Solutio
Tartari solubilis, Solutio Tartari solu-
bilis aquosa, Limonada Cremoris Tar-
tari solubilis. (BorC. Br. Ra.)*

℞. Tartratis Potassae . . . semunciam.
Aquae bullientis . . . libras duas.

Liqua sal in aqua. (Ra.)

BorC. Salis unciam unam, Aquae
duodecim et Mellis in solutione dis-
solvendi semunciam.

Expirend, glasweise zu nehmen.

℞. Salis libram unam et Aquae tant-
idem, ad usum servandum.

Fomentatio excitans s. incitans. (Ra.)

℞. Cremoris Tartari solubilis
unciam unam.

Aquae . . . libram unam.

Dissolve. — Zum Auswaschen oder
Bähen atonischer langwieriger Geschwüre.

Purgans Grantii. (Sm.)

℞. Tartratis Potassae
drachmas sex ad octo.

Infusi Cichorii . . . uncias viginti.

In solutione solve

Mannae in lacrymis uncias duas.

Zwei Wochen lang, täglich oder einen
Tag um den andern, zu vier Gläsern des
Morgens zu nehmen; während das Mittel
wirkt, trinkt man Kalbsfleischbrühe. —
Wurde besonders bei Hypochondrie und chro-
nischen Leberkrankheiten gerühmt.

Potio laxans. (Ca.)

℞. Tartratis Potassae . . . semunciam.
Infusi Foliorum Cichorii

libras duas.

Solutioni adde
Mellis depurati quantum sufficit.

Gelind abführend; in vier und zwanzig
Stunden zu mehreren Gläsern.

*Potio ad arabilem s. resolvens Mutze-
lii, (B*. Ful. Sm.)*

℞. Tartratis Potassae,
Mellis albi,
singulorum semunciam.

Dissolve in

Aquae fontanae . . . uncias octo.
Stündlich einen oder zwei Täßel; bei
Melancholie und Manie sehr gerühmt. (B*.
Ful.)

℞. Tartratis Potassae unciam unam.
Mellis Narbonensis

uncias quatuor.

Misce exacte, aliquot guttas Essen-
tiae Anisi addendo. — Kaffeelöffelweise,
indem man ein Glas helle Motten und ein
Napf Kalbsbouillon nachtrinkt. (Sm.
nach Baldinger.)

℞. Tartratis Potassae . . . semunciam.
Extracti Gentianae,

— Centaurii minoris,
singulorum drachmas duas.

Aquae . . . semilibram.
Stündlich zu halben Unzen bei Leberver-
stopfungen. (Ca.)

℞. Tartratis Potassae . . . semunciam.
Extracti Centaurii minoris

drachmas duas.

Aquae . . . uncias octo.
Auf gleiche Art zu nehmen. (Sw.)

Emulsio salina. (Suec.)

℞. Tartratis Potassae drachmas tres.
Mellis boni . . . sesquiunciam.

Aquae fontanae . . . libram unam.

Dissolve et solutionem in mortario
marmoreo tritura cum

Amygdalarum dulcium exortica-
turum . . . uncia una.

Emulsionem cola. — Sehr gelindes
Abführmittel, glasweise zu nehmen.

*Potio purgans infantum s. pro infan-
tibus. (Ham.)*

℞. Tartratis Potassae drachmas duas.
Infusi laxantis,

Aquae fontanae,
singulorum unciam unam.

Mellis glyzyrrhizati semunciam.

Potio purgans. (Bo.)

℞. Tartratis Potassae
drachmas quatuor.

Jalapae pulveratae . . . grana octo.
Cerevisiae . . . vitra duo.

Infunde per horas viginti quatuor,
filtra et adde

Aetheris sulphurici guttas viginti.
Auf zwei Mal Morgens, drei Stunden
auseinander, mit Kräuterbouillon zu neh-
men.

Solutio Tartari solubilis alcoholica. (Pid.)

℞. Tartratis Potassae uncias quatuor.
 Aquae destillatae . uncias octo.
 Solutioni adde
 Alcoholis . . . drachmas duas.
 Filtra et serva. — Kommt zu Potio-
 nen, Mixturen und Zifanen. — Gabe,
 eine bis drei Unzen.

Liquor salinus. (Li.)

℞. Tartratis Potassae libram unam.
 Salis Ammoniaci . uncias duas.
 Corticis Aurantiorum
 unciam unam.
 Aquae destillatae . libras tres.
 Digere blando calore per dies qua-
 tuor, saepius agitando, et filtra.

*Elizir amarum s. aperiens s. resolvens.
(Br. Ful. Ham.)*

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
 Extracti Trifolii unciam unam.
 Dissolve in
 Aquae Menthae piperitae
 uncii octo.
 Serva. (Ham.)

℞. Tartratis Potassae,
 Extracti Taraxaci,
 singulorum semunciam.

Dissolve in
 Infusi Rhei . . . unciiis tribus.
 Solutioni adde
 Aquae Menthae piperitae
 uncias tres.

Misce bene. (Ham.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
 Extracti Gentianae unciam unam.
 Dissolve in
 Aquae destillatae . . . unciiis sex.
 Solutioni adde
 Aquae Menthae piperitae
 uncias duas.

Misce bene. (Ful.)

℞. Tartratis Potassae . uncias duas.
 Aquae . . . uncias duodecim.
 In solutione dissolve
 Extracti Trifolii,
 — Cardui benedicti,
 — Centaurii minoris,
 singulorum unciam unam.

Liquori adde

Aquae Cinnamomi simplicis
 uncias duas.

Misce bene. (Br.)

Mixtura resolvens roborans. (Sa.)

℞. Tartratis Potassae drachmas tres.
 Extracti Fumariae,
 — Trifolii,
 singulorum sesquidrachmam.
 Aquo Cardui benedicti uncias sex.
 — Menthae piperitae,
 Syrupi balsamici,
 singulorum sesquunciam.

Reizend, schmelzend und eröffnend. —
 Eßfelweise.

Mixtura desobstruens s. resolvens. (Sw.)

℞. Tartratis Potassae,
 Mellis, singulorum semunciam.
 Aquae Cinnamomi uncias octo.
 Aetheris alcoholisati
 drachmam unam.

Reizender als die Potio ad atrabilem
 (p. 405.), unter denselben Umständen ge-
 braucht. — Gabe, anfangs alle zwei Stun-
 den, dann nur drei Mal täglich eine halbe
 Unze.

*Superprototartaras Potassii, Hyperpro-
 totartaras Potassii, Super- s. Hypertar-
 taras Protoxydi Potassii, Hypertartaras
 s. Supertartaras Potassae, Bitartaras Pot-
 assae, Tartaras acidus s. acidulus Potas-
 sae, Tartaras superpotassicus s. subpo-
 tassicus, Supertartaras kalicum; saures
 weinsteinsaures Kali; Surprototartarate
 de potassium, Surtartarate de protoxyde
 de potassium, Surtartarate de potasse,
 Bitartarate de potasse, Tartarate acide
 ou acidule de potasse. (Gal.)*

§. I. Wie man es im Handel findet.

1) *Urcin. Tartarus s. Tartarum,
 Tartarus crudus s. impurus, Bitartaras
 kalicus cum Aqua crudus, Sal essentialis
 Tartari; roher Weinstein; Tartre cru,
 Sel essential de tartre (Gal.)*

A. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. BorG.
 Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful.
 Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP.
 His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R.
 RC. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. C.
 Fi. M. Par. Pid. Sp.

Eine Salzkruste, welche sich an der In-
 nenwand von Fässern ansetzt, in denen
 Wein enthalten ist, und welche aus einer
 Zusammenhäufung vieler crystallischen Blätt-
 chen besteht. Sie ist, je nach der Farbe
 des Weins, aus welchem sie sich absetzt,
 entweder weiß oder roth und besteht aus
 saurem weinsteinsaurem Kali mit einer ge-
 wissen Menge weinsteinsaurem Kalk und
 einem färbenden Stoffe.

2) *Gereinigt. Crystalli Tartari,
 Cremor Tartari, Tartarus crystallisatus,
 Tartarus depuratus, Bitartaras kalicus
 cum Aqua depuratus; gereinigter crys-
 tallisirter Weinstein, Weinstein crystals,
 saures weinsteinsaures Kali; Tartre cristallisé,
 Crème de tartre (Gal.)*

Diese verschiedenen Namen werden dem
 folgenden Salze beigelegt, welches sich crys-
 tallisirt in vierkantigen Prismen oder in
 Pulvergestalt darstellt. (A. Am. An. B.
 Ba. DD. Ed. GalM. HassP. Li. Lon.
 Sax. Suec. C. Fi. T.)

HassP. Fi. T. führen das zu Montpellier- und in Venedig gewöhnliche Reinigungsverfahren an. Nach ersterem löst man den zerriebenen Weinstein in kochendem Wasser, gießt die Flüssigkeit klar ab, die nach dem Erkalten sich niederschlagenden Crystalle werden wieder mit siedendem Wasser aufgelöst und zu 100 Pfund derselben 4—6 Pfund kalkfreie Thonerde gesetzt und bis zur Bildung einer starken Salzkruste abgedampft. Die nach dem Erkalten sich bildenden Crystalle werden an der Sonne getrocknet. — In Venedig setzt man den durch Auflösen des Weinstein in warmem Wasser beim Erkalten sich an die Wände des Gefäßes ansetzenden und wieder aufgelösten Crystallen Eiweiß und kleine Portionen Asche zu, kocht dann und schäumt die Flüssigkeit ab, welches man 14 bis 15 Mal wiederholt, bis die Flüssigkeit ganz farblos und die Crystalle sehr weiß erscheinen. Da aber mit der Asche Potasche verbunden ist, so hat ersteres Verfahren den Vorzug.

§. II. Reinigung des künftigen Weinsteinrahms.

B. Bel. Bor. Bor4. Br. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Lus. O. Pol. Sar. Wir. Wür. Br. Pid. Sp. Sw. Vm.

℞. Cremoris Tartari quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit
ad dissolutionem salis. Cola liquorem,
albuminis ope clarifica, despuma et per
pannum colatum in crystallos coque.
(Gal. Br.)

B. Bel. Br. Hass. Lus. Sar. Wir. Wür.
Pid. Sp. et Vm. eundem agendi modum
sed absque clarificatione albuminis ope
indicant.

Bor. Bor4. Han. HassP. O. et Pal.
substantias heterogeneas separare, cum
Aqua frigida abluere, siccare et pul-
verare jubent.

℞. Tartari crudi . . . libras decem.
Argillae purae . . . libram unam.
Aquae . . . libras octodecim.
Coque per horas duas, cola liquorem
adhuc calidum, sepone ad locum frigidum
ut in crystallos concreseat, quas
cum Aqua frigida ablutas et in Aqua
dissolutas crystallisationi subijce. (His.
Sw.)

℞. Tartari albi cum Aqua fervida ab-
luti et pulverati partem unam.
Aquae . . . partes viginti.
Bulliendo dissolve, tunc denuo coque
ad: cuticulae spissae apparitionem us-
que, quae separetur, liquorem continue
calefaciendo et ita perge, donec cuti-
cula formari cessaverit. (Wür.)

Dieses Verfahren ist das einzige, dessen
Erzeugniß den Namen cremor tartari
verdient.

Das Salz ist kühlend, harntreibend und
abführend. — Gabe, von einer Drachme
bis zu zwei Unzen in acht Unzen bis zwei
Pfund Wasser.

Pulvis hepaticus ruber. (Wir. Sp.)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Ligni Santali rubri,
Petalarum Rosarum rubrarum,
singulorum semunciam.
Acidij sulphurici tenuis

drachmas duas.
Contere petala, acidum aspergendo;
adde deinde lignum et sal. — Kühlend.
— Gabe, zwei Scrupel bis eine Drachme.

Mistura Kali tartarici s. tartarica. (Au.)

℞. Cremoris Tartari,
Extracti Marrubii albi,
singulorum drachmas duas.
Aquae Melissae . . . uncias tres.
Auf zwei Mal, Morgens und Abends,
bei Hämorrhoiden mit Verstopfung.

Electuarium Cremoris Tartari. (B*. Sm.)

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Roob Prunorum . . . uncias duas.
Lindernb. — Gabe, alle zwei Stunden
ein halber Eßlöffel.

Oxymel tartarosum. (Sw.)

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Mellis despumati . . . partes duas.
Misce bene. — Bei sogenannten gas-
tigen Fiebern und Wasseruchten empfohlen.

*Pulvis dentifricius s. Tartari composi-
tus.* (Bor. Br. D. Fenn. Fer. Han. O.
Pal. Pol. Sar. Suec. Wir. Ca. Fi. T. Vm.)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Pulveris Radicis Iridis Florentinae
uncias duas.

— Myrrhae,
— Sanguinis Draconis,
singulorum unciam unam.
Olei Caryophyllorum
guttas quadraginta.

Misce bene. (Bor. D. Han. O.)

℞. Cremoris Tartari,
Radicis Ratanhiaae,
singulorum quantum vis.
— Iridis pulveratae
quantum sufficit

ad praebendum suavem odorem. (Fer.
Fi. T.)

℞. Ratanhiaae . . . uncias sex.
Ossis Sepiae . . . uncias decem.
Cremoris Tartari,
Radicis Iridis,
singulorum drachmas quatuor.
Misce. (Fer.)

℞. **Cremeris Tartari unciæ quatuor.**
Radicis Iridis Florentinae
 unciæ duas.
Mastichis,
Myrrhae,
 Catechu, singulorum unciam unam.
Olei Caryophyllorum
 guttas quadraginta.
 Fiat pulvis subtilissimus. (Pol.)

℞. **Cremeris Tartari**
 partes viginti quatuor.
Radicis Iridis Florentinae,
Myrrhae,
 Kino, singulorum partes octo.
 Coccionellae cum aliquot guttis Suc-
 ci Citri trituratee partem unam.
 Fiat pulvis, cujus unciis singulis gut-
 tas quatuor **Olei Caryophyllorum** adde.
 (Fenn. Suec.)

℞. **Cremeris Tartari**
 partes triginta sex.
Ossis Sepiæ porphyrisati,
Boli Armenae præparatae,
Corallii rubri præparati, singulo-
 rum partes viginti quatuor.
Sanguinis Draconis
 partes duodecim.
Cinnamomi . . . partes sex.
Coccionellae . . . partes tres.
Caryophyllorum partem unam.
 Fiat pulvis subtilissimus. (Ful.)

℞. **Ossis Sepiæ præparati,**
Radicis Iridis Florentinae,
 singulorum unciam unam.
Sanguinis Draconis,
Cremeris Tartari,
 singulorum semunciam.
Mastichis . . . drachmas duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
 Misce ut fiat pulvis. (Sar.)

℞. **Cretae,**
 Laccae, singularum partes sedecim.
Cremeris Tartari
 partes quadraginta octo.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
 singulorum partem unam.
 Contere. (Vm.)

℞. **Cornu Cervi usti** . . unciæ tres.
Ossis Sepiæ . . . unciæ duas.
Cremeris Tartari
 unciam dimidiam.
Radicis Iridis Florentinae,
Laccae, singularum unciam unam.
Caryophyllorum drachmam unam.
 Misce fiat pulvis tenerrimus. (Fi. T.)

℞. **Cremeris Tartari,**
Radicis Iridis Florentinae,
 singulorum sesquunciam.
Ossis Sepiæ calcin. et porphyr.
 unciæ tres.
Laccae . . quantum satis. (T.)

℞. **Laccae in granis,**

Ossis Sepiæ,
Radicis Iridis Florentinae,
 singulorum unciam unam.
Cremeris Tartari drachmas sex.
Caryophyllorum,
Myrrhae,
Mastichis,
 singulorum drachmas duas.
 Fiat pulvis. (Br. Pal. Wir.)

℞. **Corallii rubri porphyrisati,**
Ossis Sepiæ porphyrisati,
Boli Armenae,
 singulorum drachmas sex.
Cremeris Tartari drachmas novem.
Sanguinis Draconis drachmas tres.
Cinnamomi . . sesquidrachmam.
Coccionellae . unciam unam et
 scrupulum unum.
Caryophyllorum . grana viginti.
 Misce bene. (Ca.)

Electuarium dentifricium s. gingivale.
 (Br. Han.)

℞. **Pulveris Cremeris Tartari subti-**
 lissimi,
 — **Pumicis tenerrimi,**
 singulorum unciæ sex.
 — **Myrrhae tenerrimi,**
 — **Oculorum Cancrorum ten.,**
 — **Iridis Florentinae,**
 singulorum unciæ duas.
 — **Coccionellae tenerrimi**
 drachmas sex.
Mellis rosati . . . libras tres.
Olei Caryophyllorum
 drachmam unam.
 Misce sedulo. (Han.)

℞. **Cremeris Tartari sesquidrachmam.**
Coccionellae . . drachmam unam.
Essentiae Myrrhae saturatissimæ
 et destillatione ad dimidium red-
 actæ . . . unciæ tres.
Mellis rosati . . . unciæ quatuor.
Tincturae Laccae unciam unam.
 Misce triturando, digere per horas
 viginti quatuor et colaturæ adhuc ca-
 lidæ adde
Olei essentialis Cinnamomi
 guttas septem.

Serva. (Br.)

*Pulvis ophthalmicus s. Tartari argil-
 latus s. ad maculas corneae s. ophthal-
 micus Baldingeri.* (Ful. Hass. R. Succ.
 Wir. Vm.)

℞. **Cremeris Tartari,**
Sacchari albi,
 singulorum semunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
 Fiat pulvis tenerrimus. (Hass.)

℞. **Cremeris Tartari,**
Boli Armenae,
Sacchari albi,
 singulorum partes aequales.

Pulverata per linteum duplicatum trajice. (Ful. R. Suec. Wür. Vm.)

Trochisci de Cremore Tartari. (Wir.)

℞. Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Sacchari albi uncias sex.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit
ut fiat pasta homogenea. — Bei Fiebern, um den Durst zu stillen.

Manna tabulata s. tartarisata. (Sp.)

℞. Cremoris Tartari semunciam.
Mannae uncias quatuor.
Aquae uncias decem.
Coque ad consistentiam requisitam et in tabellae forma. — Ein angenehmes Laxirmittel.

Pulvis temperans s. refrigerans s. laxans et temperans Tronchini. (D. DD. Hass. Sm.)

℞. Cremoris Tartari uncias tres.
Nitri drachmas tres.
Sacchari pulverati uncias quatuor.
Misce exacte. (Sm.)
Hass. Cremoris libram unam, Nitri uncias tres absque Saccharo; — DD. Cremoris uncias duas, Nitri et Sacchari, singulorum semunciam; — D. Cremoris uncias tres, Nitri et Elaeosacchari Citri, singulorum semunciam.
Gabe, eine bis zwei Drachmen, Morgens, in einem Glase abgekühlten Mollen.

Electuarium lenitivum s. refrigerans.
(A. Sm.)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Nitri semunciam.
Sacchari albi drachmas decem.
Syrupi Limonum quantum sufficit.
Petrenschwand verordnete diese Laxmerge zu einem Kaffeelöffel alle zwei Stunden, des Morgens, indem er ein Glas Mollen nachtrinken ließ. (Sm.)
℞. Pulpae Prunorum libras tres.
Roob Sumbuci libram unam.
Cremoris Tartari semilibram.
Mellis despumati quantum sufficit ut fiat electuarium. (A.)

Pulvis ecoproticus. (Ful.)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Subcarbonatis Magnesiaë,
Florum Sulphuris,
singulorum semunciam.
Nitri drachmas duas.
Einschnelbend, harntreibend, schmelzend, abführend. — Gabe, eine bis drei Drachmen.

Pulvis ephracticus. (Ca.)

℞. Cremoris Tartari,
Magnesiaë purae;

Florum Sulphuris,
Rhei electae,
Florum Chamomillae,
Elaeosacchari Foeniculi,
singulorum semunciam.

Von Gelle bei Verstopfungen der Unterleibeingeweide empfohlen. — Gabe, ein Eßfel den Tag über mehrmals.

Pulvis Supertartratis Potassae et Stalagmitidis cambogioidis. (RC.)

℞. Cremoris Tartari semunciam.
Gummi Guttae grana duo.
Pulveris aromatici grana decem vel
— Zingiberis scrupulum unum.
Purgirend, harntreibend, bei Haut- und Bauchwassersucht. — Früh eine halbe bis eine Unze in einem wässrigen Trank.

Pulvis salinus s. Tartari compositus.
(Wür. WW.)

℞. Cremoris Tartari semunciam.
Salis polychrestii drachmas duas.
Misce. (Wür.)
℞. Cremoris Tartari
drachmas quinque.
Sulphatis Potassae drachmas tres.
Tartari stibiati granum unum.
Misce et divide in partes octo. (WW.)

Pulvis digestivus. (T.)

℞. Cremoris Tartari,
Tartari vitriolati,
singulorum partes aequales.
Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze und mehr.

Pulvis Frankii. (Fi. T.)

℞. Cremoris Tartari drachmam unam.
Tartari stibiati granum unum.
Ein oder mehrere Male in 24 Stunden.

Electuarium purgans. (Sa.)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Salis de Seignette semunciam.
Mannae electae drachmas sex.
Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Syrupi Rosarum solventis
quantum sufficit
ut fiat electuarium spurium. —

Solutio Tartari depurati s. Cremoris Tartari, Decoctum crystallorum Tartari.
(Han.)

℞. Cremoris Tartari drachmas tres.
Aquae destillatae fervidae
uncias triginta duas.

Solutioni adde

Syrupi Rubi Idaei uncias duas.
Abführend, harntreibend, kühlend. — Gabe, täglich zwei Pfund.

Tisana Cremoris Tartari (B*): Cremoris Tartari semunciam, Aquae bullientis libram unam, Syrupi Rubi Idaei unciam unam.

Decoctum Tartari citratum (Sax.):
Cremoris Tartari partem unam, Aquae
partes viginti, decoque ad quindecim
et adde Succu Citri partem dimidiam.

Potio hydragoga. (His. Sw.)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae purae . . . uncias quinque.
Drei, vier, fünf oder sechs Mal täglich.
— Man hat diese Potton bei Bauch- und
Hautwassersucht empfohlen. (Sw.)
His. Cremoris Tartari unciam unam,
Aquae octarios duos.

Tisana Milmanni.

℞. Cremoris Tartari . . . semunciam.
Aquae Hordei . . . libras duas.
Solutioni adde
Aquae Vitae . . .
unciam unam ad duas.
Bei Wassersucht empfohlen.

Potio diuretica. (Sw.)

℞. Cremoris Tartari
semunciam ad sesquunciam.
Decocti Hordei quantum sufficit.
Dissolve. — Eßfelweise den Tag über.

Tisana Cremoris Tartari. (B*.)

℞. Cremoris Tartari,
Uvarum passarum contusarum,
singulorum uncias duas.
Aquae fontanae bullientis . . .
libras quatuor.

Post horas aliquot infusionis coque
parumper et cola. — Glasweise zu neh-
men.

Tisana imperialis. (B*.)

℞. Cremoris Tartari . . . semunciam.
Corticis Aurantiorum uncias tres.
Aquae bullientis . . . octarios tres.
Post sufficientem infusionem cola.

Mixtura purgans acidula. (Sm.)

℞. Cremoris Tartari,
Sacchari pulverati,
singulorum drachmas quatuor.
Syrupi Ribium . . . uncias tres.
Essentiae Anisi . . . guttam unam.
Von Stoll in galligen Fiebern empfoh-
len. — Morgens nüchtern auf vier Mal
mit Limonade oder Kalbfleischbrühe.

Tisana febrifuga et laxans. (Bo.)

℞. Cremoris Tartari . . . semilibram.
Infusi concentrati Chamomillae
octarium unum.
Dissolve. — In hartnäckigen Wechsel-
fiebern gerühmt.

Potio purgans. (B. Pic.)

℞. Cremoris Tartari drachmam unam.
Syrupi Limonum,

Syrupi Cichorii,

singulorum unciam unam.
Infusi Chamomillae uncias duas.
Misc. (Pic.)

℞. Pulpae Tamarindorum

unciam unam.
Aquae uncias octo.
Cremoris Tartari unciam unam.
Auf zwei Mal zu nehmen. (B.)

℞. Pulpae Tamarindorum

unciam unam.
Aquae uncias octo.
Mannae,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Auf zwei Mal. (B.)

Mixtura laxans. (Sm.)

℞. Cremoris Tartari

drachmas quatuor.
Sulphatis Potassae drachmas duas.
Aquae Lactuae . . . uncias sex.
Solutioni adde
Syrupi Mororum . . . uncias duas.
Gabe, ein Eßlöffel voll drei oder vier
Mal täglich.

Potio tartarica composita. (Sw*.)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Aquae bullientis . . . libras tres.
Post refrigerationem decantha et adde
Tartari stibiati . . . semigranum.

Liquor aperitivus s. salinus laxativus,
Aqua laxativa. (Sp.)

℞. Salis Epsomensis,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Sulphatis Potassae . . . semunciam.
Aquae bullientis . . . uncias decem.
Solutionem filtra.

Vinum Genistae Sydenhami s. diure-
ticum Sydenhami s. lixiviale. (B*., Bo.
Pic.)

℞. Cinerum Genistae uncias duas.
Vini albi octarium unum.
Post infusionem viginti quatuor ho-
rarum filtra. (Bo. Pic.)

B*. Cinerum libram unam, Foliorum
Absinthii semidrachmam et Vini Rhe-
nani libras duas.
Gabe, vier Unzen drei Mal täglich, bei
Wassersucht.

Vinum hydragogum. (Sa.)

℞. Vini Rhenani . . . libram unam.
Subcarbonatis Potassae semunciam.
Cessata effervescentia adde
Syrupi Spinae cervinae
sesquunciam.

Glasweise zu trinken.

Vinum Juniperi alcalisatum. (Wür.)
℞. Subcarbonatis Potassae semunciam.

Baccarum Juniperi unciam unam.
Vini albi

libras duas cum dimidia.
Post horas duodecim infusionis cola.

Vinum excitans. (Wür.)

℞. Salis Tacheni,
Vini generosi,
singulorum semunciam.

Dissolve et adde
Oxymellis colchitici uncias duas.
Aetheris sulphurici
scrupulum unum.

Vinum diureticum anglicum. (Ca.)

℞. Subcarbonatis Potassae
sesquidrachmam.

Scillae siccatae,
Rhei pulveratae,
Baccarum Juniperi,
singulorum drachmam unam.
Radici Zedoariae drachmas duas.
Cinnamomi pulverati
drachmas tres.

Vini albi . . . octarium unum.
Post sufficientem macerationem filtra. — Gabe, drei oder vier Gläser täglich, bei Wasserzucht.

Super- s. Hyperprotartaras Potassii boraxatus s. cum Borate Sodae, Tartarus boraxatus, Cremor Tartari solubilis. (Ba. Bel. Bor. Bor4. Ful. Gal. Han. HassP. Pol. R. Sax. Sueo. Wir. Fi. Sw*. T. Vm.)

℞. Boracis . . . partem unam.
Aquaes . . . partes decem.
Dissolve coquendo et adde
Cremoris Tartari . partes tres,
i. e. quantum dissolvitur; sepone, filtra et ad siccum consume. (Ba. Bel. Bor Bor4. Han. HassP. Sax. Suec. Wir. Sw*.)

Ful. Cremoris partes quatuor et unam Boracis; — Fi. Cremoris libram unam, Boracis uncias duas, Aquae libras octo solvere, filtrare et ad mellis consistentiam consumere etc. — T. Cremoris unciam sex, Aquae libras octo, Boracis unciam unam.

℞. Cremoris Tartari . partes tres.
Boracis . . . partem unam.
Pulverata misce. (Pal.)

R. Boracis partem unam et quatuor Tartari; — Vm. Boracis novem et Tartari novem cum dimidia.

℞. Cremoris Tartari
partes ducentas et decem.
Acidi borici . . partes triginta.
Aquaes destillatae partes viginti.
Acidum et aquam supra ignem impone, et ad solutioni simulac calefactae sensim tartarum agitando; evaporata ad siccum pulvera. (Gal.)

Vm. seorsim pulverare et tunc commiscere jubet Cremoris Tartari partes octo et unam Acidi boracici.

Soubeiran dissolvere prope ignem nudum Cremoris Tartari partes quatuor et unam Acidi boracici in Aquae viginti quatuor, filtrare, leni calore ad siccum consumere et pulverare. (GalH.)
San Mons hat ein Mittel angegeben, um den Cremor Tartari auflöslicher zu machen, welches von allen übrigen verschieden ist, nämlich:

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Aquaes . . . partes octodecim.
Dissolve coquendo in vase clauso, adde sensim Acidum tartaricum, donec guttae aliquot liquoris in corpus frigidum effusae non amplius cremorem tartari demittant; filtra deinde et ad siccum consume.

Limonada laxans. (Pic.)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Boracis . . . drachmas tres.
Sacchari pulverati uncias duas.
In drei Gläsern Wasser halbstündlich.

Potio tartaro-boracica, Aqua salina, Fundans Lassone. (GalM. Ham. Bo.)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Boracis . . . drachmas tres.
Aquaes bullientis . libram unam.
Dissolve. (Ham.)

Bo. Salfum cuiusque drachmam unam et Aquaes libram unam.

℞. Cremoris Tartari partes viginti.
Boracis . . . partes quinque.
Mellis despumati partes sexaginta.
Aquaes . . . quantum sufficit
ad implendum liquoris octarium unum; tritura sales, infunde aquam pro parvis portionculis et solutioni mel adde. (GalM.)

Gelind abführend und mit Vortheil statt der aqua tamarindorum anzuwenden; glasweise zu nehmen. — Man muß bei jedesmaligem Gebrauche die Flasche schützen.

Potio diuretica. (B*. Au.)

℞. Tartari boraxati
drachmas quatuor ad sex.
Aquaes Juniperi,
— Petroselini,
singularum uncias tres.

Solutioni adde
Aetheris nitrici drachmas duas.
Syrupi Capiti Papaveris.
unciam nnam.

Gabe, alle zwei Stunden zwei Edffel.
℞. Tartari boraxati . . semunciam.
Roob Ebuli . . . uncias duas.
Aquaes Juniperi . . . uncias tres.

Syrupi Spinae cervinae,
— Violarum,
singulorum semunciam.
Eßfetweise. (Au.)

Pilulae hydragogae s. e Tartaro boraxato. (Au.)

℞. Extracti Trifolii . uncias duas.
Tartari boraxati sesquidrachmam.
Radici Polygalae Virginicae
drachmas duas.

— Colchici sesquidrachmam.
Misce fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, sechs bis zwölf Stück, alle zwei Stunden.

Prototartaras Potassii et Sodii, Tartras Protoxydi Potassii et Sodii, Tartras Potassae et Sodae, Sal polychrestum solubile s. polychrestus Seignetti s. Seignetti s. Rupellense s. Rupellensis, Alkali minerale tartarizatum, Soda tartarizata, Natrum tartarizatum s. tartaricum, Tartarus natronatus, Tartarus kalico-natricus s. kalico-natricus cum Aqua s. Potassae sodicus s. Sodae et Kali; natrumhaltiger, natronreicher Weinstein, Seignettesalz; Prototartarat de potassium et de sodium, Tartrate de protoxide de potassium et de sodium, Tartrate de potasse et de soude, Sel de Seignette, Sel polychreste soluble (Gal.). (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Lon. LonN. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. C. Pi. Pid. Sp. T. Vm.)

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis (uncias viginti Lon. LonN.)

- Aquae bullientis quantum sufficit (octarios decem Lon. LonN.)

ad dissolutionem salis; liquori adde
Cremoris Tartari quantum sufficit (libras duas Lon. LonN.)

vel quantum ejus solvi potest; consume ad 33° ar. et ad crystallisandum seponere. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gen. Han. Hass. His. Lon. LonN. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. C. Pi. Vm.)

℞. T. Subcarbonatis libram unam, Aquae libras tres, Cremoris quantum sufficit; — HassP. Salis Sodae depurati libras duas, Aquae bullientis libras octo, Cremoris tres, et denique Salis Sodae unciam unam; — Bor4. Aquae sextuplum et Cremoris tantum ut natrum fere neutralisetur; crystalli, si opacae apparent, in Aquae frigidae partibus tribus solve etc.; — Gal. Sp. et Vm. Subcarbonatem in solutionem Cremoris Tartari infundere jubent.

Secundum GalH. lixivium hujus praeparati fere totum e Tartrate Sodae con-

stat, e quo Sal Seignetti separatur, addendo Tartratis Potassae certam quantitatem.

℞. Tartratis Potassae partes undecim cum dimidia.

Subcarbonatis Sodae sicci partes duas cum dimidia.

Aquae . partes viginti quatuor.

Subsidere fac pro momento, decantha et in crystallos coque. (Vm.)

℞. Cremoris Tartari . libras duas.

Aquae . quantum sufficit ad solutionem salis, quam bullientem Potassae ope neutralisa et adde

Salis communis uncias quinque et drachmas duas.

Solutione refrigerata et Hydrochlorate Potassae in fundum demisso, consume liquorem, ut in crystallos abeat. (Vm.)

℞. Tartratis Potassae partes undecim cum dimidia.

Sulphatis Sodae partes tres et quatuor partes quintas.

Aquae tepidae partes viginti quatuor.

Calefac, liquoris Sodae causticae pauxillum immitte, filtra et in crystallos redige. (Vm.)

Reizend, harntreibend, abführend. — Gabe, von zwei Drachmen bis eine Unze auf die Pinte Wasser.

Pulvis de Fordyce. (Sm.)

℞. Tartratis Potassae et Sodae grana decem.

Rhei . . grana tria ad septem.
Misce. — Bei Verstopfung der Kinder. — Man giebt es vierzehn Tage hintereinander alle Morgen, in einem passenden Befehl.

Mixtura resolvens. (Sm.)

℞. Tartratis Potassae et Sodae semunciam.

Sulphatis Potassae drachmas duas.

Infusi Foliorum Cichorii libram unam.

Solutioni adde Oxymellis scillitici uncias quatuor.

Von Boerhaave bei Unterleibsstockungen empfohlen. — Gabe, vier Eßlöffel Morgens im Zwischenraume einer Stunde.

Serum Lactis Van Swietenii. (Sm.)

℞. Radicis et Foliorum Taraxaci, Herbae Fumariae, Foliorum Nasturtii,

— Cerefolii, singulorum manipulum unum.

Concisa coque per quinque vel sex minima cum

Seri Lactis clarificati

octario uno (chopine).

Cola fortiter exprimendo et colaturae adde

Trartratis Potassae et Sodae drachmam unam ad duas.

Mellis Narbounensis drachmas sex.

Alle Morgen nüchtern, einen Monat lang, in vier Gläsern, in Zwischenräumen einer Stunde bei Unterleibsstockungen nach Wechseln oder alten hypochondrischen Beschwerden.

Prototartras Potassii et Ammoniaci, Tartras Protoxydi Potassii et Ammoniaci, Tartras Potassae et Ammoniaci, Tartras kalico-ammonicus, Ammonium tartaricum, Tartarus ammoniacus s. ammoniacalis s. solubilis ammoniacalis, Sal ammoniacum tartareum, Alkali volatile tartarisatum; ammoniakhaltiger ausföhllicher Weinstein, Weinsteinammoniat; Protatartrate de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de protoxide de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de potasse et d'ammoniaque, Tartre soluble ammoniacal (Gal).

§. I. Im festen Zustande.

B*. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. Wir. Sw*. Vm.

R. Cremoris Tartari quantum vis. Aquae bullientis quantum sufficit ad solutionem salis; liquori sensim adde

Subcarbonatis Ammoniaci liquidi quantum sufficit ad saturandum acidi excessum; filtra et leni igne ad siccum consume.

HassP. Cremoris quantum libet, Aquae fervidae quadruplum pondus, Spiritus Salis Ammoniaci aquosi quantitatem aliquanto praeponderantem, sepone loco frigido per 24 horas, filtra et ad cuticulam consumtis denuo adde Spiritus Salis Ammoniaci aquosi partem, ut tartarus, qui sub evaporatione secesserit, resolvatur, liquorem in vas murrinum calefactum effunde et ad crystallisandum per aliquot dies loco frigido sepone etc.; — Hass. Li. et Sax. Ammoniacum causticum indicant; — Han. et Vm. in crystallos, quae tunc pulverentur, redigi volunt; — B*. antequam in crystallos redigatur liquor, addere Liquoris ammoniacalis paucillum, ut crystalli tartari, quae forte inter evaporationem subsederunt, redissolvantur.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Liquor Tartari solubilis.

Li.

R. Subcarbonatis Ammoniaci liquidi uncias sex.

Adde sensim

Cremoris Tartari quantum sufficit ad perfecte saturandum ita, ut omnis effervescentia cesset; sepone per dies aliquot et filtra.

Keizend, harntreibend und gelind abführend, in heftigen Fiebern, Wasserfuchten und Stockungen in den Organen des Unterleibs, jedoch selten angewendet. — Gabe, eine Drachme täglich mehrmals.

Protoleomargaras Potassii.

Unter diesem Namen vereinigen wir alle eigentlich sogenannten Seifen, selbst die mit mineralischer Basis, weil sie unter therapeutischem Gesichtspunct betrachtet, so zu sagen keinen Unterschied zeigen, ausgenommen den, welcher durch die Verschiedenheit ihrer Zusammensetzung und die davon abhängigen physischen Eigenschaften bebingt wird.

§. I. Im Handel vorkommende Seifen.

1) *Sapo Alicantinus s. Aloniensis s. Hispanicus albus, Sapo albus s. durus; Spanische, weiße Seife; Savon d'Alcante (Gal).*

Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Gal. GalM. Gen. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. RC. Sax. Succ. Wir. WW. Be. Br. M. Sa. Sp.

Man bereitet sie aus Baumöl und Natron. Sie ist weiß, hart und gleichartig.

2) *Sapo Venetus; Venezianische Seife; Savon de Venise (Gal).*

Bel. Br. Fenn. Fer. HassP. Pol. Succ. Pid.

Wie die vorhergehende bereitet; sie ist auch hart, aber marmorirt.

3) *Sapo domesticus s. nostras; gewöhnliche, gemeine Seife; Savon domestique (Gal).*

A. Ba. Bor. BorC. Bor4. DD. Fer. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Pal. R. RC. Sax. WW. M. Par.

Wie die vorhergehenden bereitet, mit blauen Athern, welche von Schwefeleisen und Natrium herrühren, die in dem Natron enthalten sind.

4) *Sapo mollis s. niger s. viridis s. kalicus s. piccus; schwarze, weiche, grüne Seife; Savon noir (Gal).*

DD. Ed. Hass. Lon. LonN. RC. Succ. C. Par. Pid.

Aus Del und Pottasche bereitet.

5) *Sapo Wologdensis; Wologder Seife; Savon de Wologd (Gal).*

Fenn. R. RC.

Aus Salz und Pottasche, zu Wologda und anderwärts bereitet.

§. II. Pharmaceutische Seifen.

A. *Sapo medicinalis s. medicatus s. amygdalinus s. albus.*

A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han. HassP. His. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. Ca. Fi. Sw. T. Vm.

R. Subcarbonatis Sodae,

Calcis vivae,

singulorum libras quatuor.

Aquae libras viginti.

Coque, trajice per linteum, liquorem consume donec unciae octo requirantur ad implendum vitrum, aquae unciarum sex capax et adde refrigerato

Olei Olivarum duplum.

Coque continue agitando, donec massa homogena et spissa formetur, quam in modulos effusam sicca. (A. An. B. Ba. Bel. Bor. Fenn. Fer. GalM. Han. His. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wür. Br. Sw.)

Gal. Lixivii caustici (36°) partes centum, Olei Amygdalarum dulcium ducentas et decem; — T. Lixivii partes 54 et Olei Olivarum vel Sevi 100; — Vm. Lixivii partem unam et Olei Amygdalarum dulcium duas cum quadrante; — Ca. Lixivii libras duas, Olei Amygdalarum dulcium libras quatuor et uncias tres; — Bor4. HassP. Fi. Liquoris Natri caustici recenter parati, Olei Olivarum Provincialis recentissimi duplum.

Br. Sar. Wir. Wür. T. et Vm. formulam fere similem indicant, sed loco Sodae Potassam causticam adhibent.

Fi T. Saponem Alicantinum vel Venetum balnei aquae ope in Alcoholis diluti pondere nonduplo solvere, sedimentum subsidere, alcoholium destillando elicere et vaporantino consumere jubent.

B. *Sapo cacaoinus; Cacaoeife;* Sapon de cacao (Gal.). (B. Fer. Han. Li. Sp. T. Vm.)

R. Lixivii Sodae . . . partem unam.

Butyri Cacao liquati partes duas.

Coque, donec perfecte sint commixta.

T. Liquori ita condensato, ut corpori frigido immisus coagulet, solutionem Salis communis concentratam infundere jubet, ut sapo melius a liquore separaretur, qui tunc in balneo aquae fundatur.

Sapo Medullae bovinae s. animalis s. Wologdensis. (Gal. Ca. Sw. T. Vm.)

R. Medullae bovinae praeparatae partes quingentas.

Potassae causticae liquidiae partes ducentas et quinquaginta.

Liqua leni igne, continue spatulae

ope agitando, donec mixtura complete in aqua sit solubilis; solve deinde in Aquae bullientis partibus bis mille. Solutioni adde

Salis communis

partes centum octoginta

dissolutas in

Aquae destillatae partibus mille.

Refrigerata trajice per linteum, exprimendo, et sicca. (Gal. Ca. Fi.)

Sw. Lixivii saponariorum partes duas et Medullae bovinae quatuor cum dimidia; — Vm. Sodae causticae unam cum dimidia et duas Medullae; — T. Solutionis Potassae causticae 36° ar. B. uncias sex, Medullae libram unam, Aquae destillatae vel pluvialis libras quatuor, Solutionis filtratae et saturatae Kali muriatici uncias quatuor.

Alle diese Seifen sind mehr oder weniger reizend; man hat sie als schmelzend, harttreibend und steinauflösend gepriesen. Mit Borthell wendet man sie an bei Vergiftung durch Säuren. Außerlich wirken sie auflösend oder zeitigend. — Gabe, von zehn Gran bis eine Drachme zwei oder drei Mal täglich.

T. Saponem de toilette indicat, praeparatum cum Potassa caustica et Axungia praeparata vel Butyro vaccino.

Sapo animalis aromaticus. (Ca. Vm.)

R. Olei Nucis moschatae expressi

partem unam.

Medullae bovinae partes quinque.

Liquatis admisce

Sodae causticae liquidiae

partes septem

sensim addendo et continue agitando ad perfectam conjunctionem usque. (Vm.)

Ca. Medullae partes septem, Olei Nucis moschatae unam, Cetacei tantidem et Lixivii Sodae caustici quantum sufficit.

Ceratum exploratorium (pour le toucher). (GalH.)

R. Olei Olivarum partes sex mille.

Cetacei,

Cerae albae, singulorum partes

quadringentas.

Liqua, per linteum trajice et adde sensim, continue agitando,

Sodae causticae partes quadringentas octoginta.

Man darf dieses Cerat erst einige Zeit nach seiner Bereitung anwenden, damit es nicht mehr alkalisch ist.

Pulvis cosmeticus. (B*.)

R. Saponis Hispanici uncias duodecim.

Subcarbonatis Potassae uncias duas.

Radix Iridis Florentinae uncias tres.
Hippocastani pulveris libras duas.
Olei essentialis Lavandulae,
 — — **Bergamottae**, sin-
 gulorum guttas quadraginta.
 — — **Citri** guttas triginta.
 — — **Caryophyllorum**
 guttas decem.
Sacchari semunciam.
 Fiat pulvis.
 ℞. **Saponis Hispanici** uncias duodecim.
Subcarbonatis Sodae sequiunciam.
Radix Iridis Florentinae
 unciam unam.
Cardamomi minoris
 drachmam unam.
Olei essentialis Lavandulae,
 — — **Bergamottae**,
 — — singulorum guttas triginta.
 — — **Citri** guttas viginti.
 — — **Cinnamomi**
 guttas tres.
Sacchari semunciam.
 Fiat pulvis.
Sapo cosmeticus. (Bor4.)
 ℞. **Saponis Hispanici** uncias tres.
Radix Iridis Florentinae
 unciam unam.
Olei Lavandulae semidrachmam.
 — **Bergamottae**
 scrupulum unum.
Aquae Rosarum quantum sufficit
 ut fiat globulus.
Sapo aromaticus pro balneis. (Bor4.)
 ℞. **Saponis Hispanici** uncias quatuor.
Amyli uncias duas.
Radix Iridis Florentinae
 unciam unam.
Balsami Peruviani s. Indici
 guttas septem.
Olei Bergamottae,
 — **Corticis Citri**,
 — **Lavandulae**,
 singulorum scrupulum unum.
 Miscentur.
Boli saponacei. (Sa. Sw.)
 ℞. **Saponis medicinalis** scrupulos duos.
Olei essentialis Carvi
 guttas duas ad tres.
Syrupi balsamici quantum sufficit.
Interdum adduntur Extracti Aloës
 grana quatuor vel **Rhei** grana septem.
 — **Purgirend.**
Boli lithonriptici. (Sp.)
 ℞. **Saponis Alicantini** uncias octo.
Testarum Ovorum calcinatarum,
Fructuum Cynosbati tostorum,
 singulorum unciam unam.
Salis Tertari drachmam unam.
Aquae Vitae quantum sufficit.
 Fiat boli sexaginta.

Pilulae saponaceae s. resolventes s. solventes del Porati. (B*. Gal. GalM. Ham. Fi. Huf. Sm. Sp. Sw. T. Vm.)
 ℞. **Saponis medicinalis** semilibram.
Radix Althaeae unciam unam.
Nitri drachmas duas.
Olei Amygdalarum dulcium
 quantum sufficit.
 Fiat massa pilularis. (Gal. GalM.)
 GalH. loco olei facillime rancidita-
 tem accipientis Syrupum Sacchari ad-
 hibet.
 ℞. **Saponis medicinalis** drachmas duas.
Rhei,
Myrrhae, singulorum drachmam
 unam.
 Fiant pilulae granorum quatuor. (Sw.)
 ℞. **Saponis albi** unciam unam.
Extracti Juniperi,
Pulveris Gentianae, singulorum
 drachmas quatuor.
 Fiant pilulae quatuor granorum. (Sm.)
 ℞. **Saponis Veneti**,
Galbani,
Extracti Chelidonii,
 singulorum drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae
 quantum sufficit.
 Fiant pilulae granorum duorum.
 (Ham.)
 ℞. **Saponis medicinalis**
 sesquidrachmam.
Gummi Ammoniaci
 drachmam unam.
Extracti Graninis
 scrupulos quatuor.
 Fiant pilulae grani unius. (B*.)
 B*. et Huf. **Saponis**, **Gummi Ammo-
 niaci** et **Extracti Chelidonii**, singulo-
 rum partes aequales, ut fiant pilulae
 granorum duorum; — **T. Saponis Ve-
 neti** uncias tres, **Gummi Ammoniaci**
 tantidem, digerere in **Alcoholis diluti**
 24° Ar. B. quantum satis ad submer-
 gendum; mollefactae et homogeneae
 massae adde **Pulveris Rhei subtilissimi**
 uncias tres; — **Fi. T. Saponis**, **Gummi**
Ammoniaci, singulorum partes quatuor,
Rhei, **Radix Jalapae**, singulorum
 partem unam.
 ℞. **Saponis officinalis** unciam unam.
Gummi Ammoniaci,
Extracti Centaurii minoris,
 singulorum semunciam.
Olei Succini guttas decem.
 Fiat massa pilularis. (Sp.)
 ℞. **Acetatis Potassae**,
Gummi Ammoniaci,
Pilularum Rufi,
 singulorum partem unam.
Saponis albi partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
 ut fiat massa. (Vm.)

Pilulae Allii sativi, (R.C.)

℞. Radicis Allii,
Saponis Alicantini,
singulorum semunciam.
Pulveris Liquiritiae quantum satis
ut fiat massa, e cuius singulis drach-
mis catapotia duodecim formentur. —
Gabe, ein biß zwei Scrupel.

Suppositorium ad alvum sollicitandum
s. *laxans*. (B*. Pal. Sp.)

℞. Saponis uncias duas.
Salis culinaris unciam unam.
Mellis inspissati quantum sufficit.
Fiant coni diversae magnitudinis. —
Vor der Anwendung muß man sie mit Wermuthöl bestreichen.

Cataplasma saponaceum s. resolvens s. maturans s. pus maturans. (B*. Ful. GalH. R.C. Ra. Sp.)

℞. Micae Panis uncias octo.
Saponis Veneti unciam unam.
Lacis vaccini libram unam.
Coque simul. (B*. Ful. GalH.)

℞. Farinae Hordei uncias octo.
Sacchari albi uncias quatuor.
Aeque quantum sufficit
ut fiat cataplasma. (Ra.)

Sp. Cataplasmatiss, Micae Panis un-
cias sedecim et Saponis rasi duas.

℞. Farinae secalitiae partes duas.
Saponis nigri,
Radicis Cepae tostae,
Mellis, singulorum partem unam.
Fiat cataplasma (R.C.)

Mel Saponis. (B*.)

℞. Saponis communis,
Mellis, singulorum uncias quatuor.
Salis Tartari semunciam.
Aeque Fumariae drachmas duas.
Sur Auflösung schmerzloser Geschwülste
empfohlen.

Linctus saponatus s. saponaceus, *Loech*
saponaceum s. saponatum, (Ful. Li. Wir.
Wür. Ca. Sa. Sp. Sw.)

℞. Saponis partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium
partes octo.

Syrupi Mannae partes duodecim.
Misce triturando. (Li.)

Wür. Saponis partes tres, Olei sede-
cim et Syrupi Mannae viginti quatuor.

℞. Saponis partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium
partes octo.

Syrupi Capilli Veneris
partes duodecim.

Misce triturando. (Wir. Sp.)
Sa. Saponis partem unam, Olei se-
decim et Syrupi Capilli Veneris viginti
quatuor.

℞. Saponis partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium

Syrupi Rhei partes viginti quatuor.
Contere. (Ful.)

℞. Saponis partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium
partes octo.

Syrupi Limonum
partem unam cum dimidia.
Misce triturando. (Ca.)

℞. Saponis partes quatuor.
Olei Amygdalarum dulcium
partes octodecim.

Syrupi Papaveris
partes quadraginta octo.
Contere. (Sw.)

Unguentum s. Pomatum saponaceum.
(Ra.)

℞. Saponis albi libram unam.
Aeque sesquilibram.
Mollefacto in aqua saponis, trajice
per cribrum. — Gegen Krätze angewen-
det.

Sapo aromaticus. (B*.)

℞. Solutionis Saponis aquosae con-
centratae uncias sex.
Olei essentialis Bergamotiae,
— — Lavandulae,
— — Rorismarini,
singulorum drachmas duas.

Mit nervenstärkend und tonisch in Bä-
tern angewendet.

Clyster communis. (R.C.)

℞. Saponis drachmas duas.
Decocti Hordei, vel

— Avenae, vel
— Radicis Althaeae, vel

Infusi seminum Lini, vel
— Florum Chamomillae, vel

Aeque tepidae libram unam.
Olei Lini unciam unam.
Misce.

Clysmma s. Enema resolvens. (B. Sp.)

℞. Foliorum Malvae
manipulum unum.

Aeque uncias sedecim.
Decoque ad unciarum duodecim re-
manentiam et in colatura solve

Saponis Veneti drachmas duas.
Misce. (Sp.)

℞. Decocti Hordei uncias sex.
Saponis Veneti drachmam unam.

Mellis drachmas sex.
Dissolve. (B.)

Fomentatio laxans et antispasmodica.
(Bo.)

℞. Florum Chamomillae

Florum Melliloti,
singulorum manipulum unum.
Baccarum Lauri,
Carvi, singulorum unciam unam.
Lactis . . . quantum sufficit
ut post horae quadrantem decoctionis li-
brae tres obtineantur, quarum colatu-
rae adde
Saponis Veneti . . . sesquiunciam.
Croci . . . drachmas duas.

Fomentum Saponis compositum. (RC.)

℞. Acetatis Ammoniae liquidi
uncias quatuor.
Solutionis Saponis (Alcohol. saponat.)
uncias duas.
Misc. — Reizend, aufsteigend.

Fomentum Saponis ammoniatum. (RC.)

℞. Solutionis Saponis,
Acetatis Ammoniae liquidi,
singulorum unciam unam.
Ammoniae liquidae . . . semunciam.
Misc. — Wie das vorige, aber stärker.

Potio saponacea. (B*. Ca. Ra.)

℞. Saponis medicinalis drachmas tres.
Aeuae . . . uncias quatuor.
Syrupi Althaeae . . . unciam unam.
Magnesiae . . . drachmam unam.
Gegen Vergiftung durch Mineralsäuren
empfohlen. (Ca.)

℞. Saponis . . . drachmas sex.
Infusi Melissaee . . . uncias quatuor.
Syrupi Capilli Veneris
unciam unam.

Auf drei oder vier Mal in einigen Fäl-
len von Meteorismus des Unterleibs. (Ra.)

℞. Saponis . . . drachmas duas.
Pulveris Margaritarum
drachmam unam.
— Oculorum Cancri
sesquidrachmam.

Syrupi Althaeae . . . semunciam.
Aeuae Menthae,
— Corticis Citri,
— Foeniculi,
singulorum uncias duas.

Eßfelweise. — Bórhaave wendete es
bei Kindern gegen Säure in den ersten Be-
gen an. (B*.)

Alcohol saponatum, Spiritus saponatus, Tinctura s. Solutio Saponis, Solutio Saponis alcoholica, Lotio alcoholica saponacea, Fomentatio saponacea, Linimentum saponaceum. (Ba. BorC. Fer. Pul. GalM. RC. Ra.)

℞. Saponis venalis . . . partem unam.
Alcoholis (0,900) . . . partes quatuor.
Dissolve et filtra. (Ba.)
RC. Saponis partem unam, Alcoholis sex.

Pharmacopoea universalis. II.

℞. Saponis Alicantini rasi
libram unam.

Alcoholis . . . libras tres.
Aeuae destillatae . . . libram unam.
Solutionem filtra. (BorC.)
GalM. Alcoholis (28°) partes tres,
Saponis unam; — Ra. Alcoholis (26°)
libram unam, Saponis uncias quatuor;
— Ra. Alcoholis libram unam et Sa-
ponis uncias duas; — Ra. Alcoholis
libram unam et Saponis semunciam;—
Alcoholis libras duas, Aeuae tantidem
et Saponis uncias decem.

℞. Saponis Alicantini rasi uncias octo.
Subcarbonatis Potassae purificati
uncias quatuor.

Dissolve sal in Aeuae uncias sedecim,
adde saponem et ad mellis consisten-
tiam decoque; massae deinde infunde
Alcoholis rectificati uncias sedecim.
Post septimanam digestionis filtra.
(Ful.)

Diese Auflösung, deren Stärkegrad nach
den Umständen natürlich verschieden seyn
muß, ist ein Auflösungsmittel, welches man
mit Nutzen bei Berührungen, nachdem die
Entzündung aufgehört hat, anwenden kann.
Eugol wendete es mit Nutzen in der Be-
handlung der Krätze an.

Fomentatio antiphlogistica. (Hass. Pid.)

℞. Saponis Veneti . . . uncias tres.
Aeuae Calcis . . . libras duas.

Solutioni adde
Alcoholis . . . uncias quinque.
Trochiscorum alborum Rhazis
semunciam.

Auflösend.

Spiritus Saponis s. saponatus s. saponaceus s. resolvens; Tinctura Saponis, Solutio Saponis alcoholica aromatisata, Linimentum saponaceum. (A. An. B. B*. Bor. Bor4. Han. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Ra. Sp. Vm.)

℞. Saponis albi . . . partem unam.
Spiritus Lavandulae . . . partes octo.
Dissolve et filtra. (Vm.)

℞. Saponis albi . . . partem unam.
Alcoholis . . . partes tres.
Aeuae Rosarum . . . partem dimidiam
(unam Bor. Han. etc.)

Solutionem filtra. (B*. Bor. Bor4.
Han. HassP. O. Sax.)

Pol. Alcoholis partes tres cum dimi-
dia.

℞. Saponis albi . . . uncias sex.
Subcarbonatis Potassae
drachmam unam.

Alcoholis (0,910) . . . sesquilibram.
Aeuae Lavandulae . . . semilibram.
Solutionem filtra. (A.)

Sp. Terere jubet Saponis Veneti un-
cias quatuor cum Subcarbonatis Po-

tassae duabus et magma digerere in mixtura ex Alcoholis unciis duodecim et Essentiae Bergamottae semidrachma; — An. dissolvere Saponis uncias quatuor in Aquae Vitae viginti quatuor, et solutioni addere Spiritus Lavandulae et Spiritus Rorismarini, singulorum uncias duas.

℞. Saponis Alicantini rasi
uncias quatuor.

Subcarbonatis Potassae purificati
uncias duas.

Coque in Aquae libra una ad consistentiam magmatici spissi, cui infunde Spiritus Lavandulae

uncias sedecim.

Digere blando igne per dies quatuor et filtra. (R.)

℞. Saponis uncias octo, Subcarbonatis libram unam et Spiritus Rorismarini uncias sedecim.

℞. Olei albi uncias duas.

Saponis drachmas duas.

Alcoholis vulnerarii libram unam.

Solutionem filtra. (Ra.)

Xuftösend, bei chronischen, schmerzlosen Geschwülsten, rheumatischen Schmerzen und Contracturen der Gelenke angewendet.

Balneum emolliens et antisepticum. (Bo.)

℞. Foliorum Rutae,

— Scordii,

— Malvae,

singulorum uncias duas.

Aquae quantum sufficit
ut decocti, librae duae obtineantur.

Colaturae adde

Saponis Veneti drachmam unam

dissolutam in

Alcoholis drachmis sex.

Linimentum saponaceum s. Saponis, Balsamum saponaceum s. Saponis compositum, Alcohol Camphorae saponaceum, Aqua Vitae saponacea, Solutio Saponis alcoholica camphorata. (B*. His. Lus. Sp. Vm.)

℞. Saponis albi uncias tres.

Alcoholis uncias sedecim.

Solutioni adde

Camphorae unciam unam.

Filtera. (Lus.)

His. Saponis uncias duas, Camphorae drachmas sex et unam libram Alcoholis; — Sp. Saponis unciam unam et Aquae Vitae camphoratae sedecim; — B*. Saponis quantitatem arbitrariam, Aquae calidae et Alcoholis camphorati, singulorum unciam unam.

℞. Aquae Vitae camphoratae

partes sedecim.

Saponis albi partem unam.

Macera ad perfectam solutionem usque et filtra. (Vm.)

Linimentum saponatum Kaempferi. (Ca. Pid.)

℞. Saponis Veneti concisi

unciam unam.

Infunde

Alcoholis uncias quatuor.

Alcholem accende et baculi ope agita, donec urere cessaverit. Liquori refrigerato adde

Camphorae scrupulos duos.

Solutionem filtra. — Xuftösend.

Balsamum saponaceum s. Saponis, Linimentum Saponis s. saponaceum s. Saponis compositum s. Saponis camphoratum, Solutio Saponis alcoholico-aromatica et camphorata, Linimentum saponato-camphoratum. (Am. An. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Lon. LonN. Suec. Wir. C. Fi. Sp. Sw. Vm.)

℞. Saponis Alicantini albi

uncias decem.

Alcoholis libras quatuor.

Dissolve blando calore et adde

Camphorae uncias duas.

Olei essentialis Rorismarini,

— Origani,

singulorum semunciam.

Solutionem filtra. (D. Sp.)

℞. Saponis Alicantini uncias quatuor.

Camphorae uncias duas.

Olei essentialis Rorismarini

semunciam.

Alcoholis libras duas.

Digere saponem in alchole per dies aliquot, filtra, adde camphoram et oleum. (Ed. C.)

Am. et C. Saponis uncias duodecim, Camphorae duas, Olei Rorismarini tantidem et Alcoholis octarios octo; — Ful. Saponis uncias quinque, Camphorae duas, Olei Rorismarini semunciam et duas libras Alcoholis.

℞. Saponis albi rasi uncias tres.

Camphorae rasae scrupulos duos.

Salis Ammoniaci semunciam.

Aquae communis quantum satis.

Saponi in aqua bullienti soluto adde salem et camphoram. (Fi.)

℞. Saponis duri uncias duas.

Spiritus Turionum Pini

libram unam.

Solutioni adde

Camphorae semunciam

et si requiritur

Olei essentialis Rorismarini

drachmam unam.

Filtera. (Suec.)

℞. Saponis albi rasi uncias duas.

Spiritus Millefolii compositi

libram unam.

Solutioni adde
 Camphorae semunciam.
 Serva. (Fenn.)

℞. Saponis medicinalis uncias tres.
 Spiritus Rorismarini
 libram unam (octarium).

Solutioni adde
 Camphorae unciam unam.
 Liquorem filtra. (Du. Lon. LouN. Sw. Vm.)

Wir. Saponis uncias sex, Spiritus Rorismarini libras duas et Camphorae semunciam; — An. Saponis uncias tres, Spiritus Rorismarini libram unam et Camphorae unciam unam.

Kußlöschb.

Balsamum anodynum, Linimentum Saponis cum Opio s. anodynum s. opiatum, Solutio Saponis alcoholica camphorata et opiacea. (Am. Ed. Gal. Lus. Suec. Bo. Ca)

℞. Saponis albi uncias tres.
 Opii drachmas sex.
 Alcoholis uncias sedecim.

Solutioni adde
 Camphorae unciam unam.
 Serva. (Lus.)

Bo. et Ca. Alcoholis sesquilibram, Saponis uncias quinque, Opii unciam unam, Olei Rorismarini semunciam et Camphorae drachmas tres; — Ed. Alcoholis libras duas, Saponis uncias quatuor, Opii unciam unam, Olei Rorismarini semunciam et Camphorae drachmas duas.

Am. addere jubet Solutioni Saponis alcoholicae aromaticae et camphoratae Opii unciam unam.

℞. Saponis albi uncias duas.
 Opii semunciam.
 Spiritus Turionum Pini
 libram unam.

Solutioni adde
 Camphorae semunciam.
 Außerlich bei chronischen Schmerzen; innerlich bei sogenannter nervöser Kolik. — Gabe, fünfzehn bis zwanzig Tropfen in einem halben Glase Melissen- oder Lindenblüthenaufguß.

Balsamum anodynum. (Gal.)

℞. Saponis amygdalini semunciam.
 Tincturae Opii alcoholicae
 unciam unam.

Tere solutionem cum
 Olei Amygdalarum dulcium
 unciis duabus.

Linimentum aethericum s. aceticum s. Saponis aethericum, Sapo Aetheris aceticus s. aceticus aethericus, Solutio Saponis aetherea. (GalH. Bo. Ca. Pie. Sw*. Vm.)

℞. Saponis Medullae partem unam,

Aetheris aceticus partes quinque,
 Dissolve in vase clauso balnei aquae tepidi ope et liquorem decantha. (Vm.)
 Vm. praeterea Saponis partem unam cum dimidia et unam Aetheris aceticus; — Bo. Saponis unam et duas Aetheris; — GalH. Saponis tres et sedecim Aetheris; — Ca. et Pie. Saponis unam et octo Aetheris; — Sw*. Saponis tres et duas Aetheris.

In Einreibungen bei chronischen rheumatischen Schmerzen.

Falsamum aceticum camphoratum. (GalH. Bo. Ca. Pie.)

℞. Saponis animalis,
 Camphorae,
 singulorum drachmam unam.
 Essentiae Thymi guttas decem.
 Dissolve balnei aquae ope et adde
 Aetheris aceticus unciam unam.
 Filtra. (Bo. Ca. Pie.)

GalH. Dissolvere jubet Saponis drachmam unam et Camphorae tantidem in Aetheris aceticus unciis duabus et solutioni addere Essentiae Terebinthinae guttas decem.

In Einreibungen bei Rheumatismen, giftigem Hüftweh und giftigen Schmerzen.

Balsamum antiarthriticum. (Ca.)

℞. Spiritus Lavandulae uncias quatuor.
 Saponis animalis aromatici,
 Aetheris aceticus,
 singulorum unciam unam.
 Camphorae drachmas duas.
 Olei essentialis Menthae piperitae,
 — — Cinnamomi,
 — — Lavandulae,
 — — Nucis moschatae,
 — — Caryophyllorum,
 — — Sassafras,
 singulorum guttas quindecim.

Ebenso gebraucht wie das vorige.

Linimentum aethericum. (Sa.)

℞. Saponis mollis,
 Alcoholis rectificati,
 singulorum unciam unam.
Solutioni adde
 Camphorae semunciam
 dissolutam in
 Aetheris sulphurici uncia una.

Unguentum saponaceum s. Saponis, Oleum Saponis, Linimentum saponaceum camphoratum. (Ham. Ca. Sw. Vm.)

℞. Saponis albi partem unam.
 Olei Oliviarum partes quinque.
 Tere saponem in mortario, dissolve in oleo et liquorem post sepositionem decantha. (Vm.)

℞. Camphorae drachmas duas.
 Olei Oliviarum unciis duas.

Solutioni adde
 Saponis Veneti . . . unciam unam.
 Misce exacte. (Ham.)
 ℞. Saponis nigri . . . semunciam.
 Camphorae . . . drachmas duas.
 Balsami Arcaei . . . unciam unam.
 Misce. (Ca. Sw.)
 Bei Rheumatischen empfohlen.

Linimentum antipleureticum s. Saponis.
 (Wir. E. Sp.)

℞. Saponis Veneti . . . uncias duas.
 Olei Lauri . . . unciam unam.
 — Lumbricorum terrestrium,
 singulorum unciam unam.

Solutioni adde
 Ammoniaci liquidi drachmas duas.
 Misce. (Wir.)

℞. Saponis Veneti . . . uncias duas.
 Olei Lauri . . . unciam unam.
 Liqua leni calore et post refrigerationem adde

Balsami tranquilli unciam unam.
 Ammoniaci liquidi drachmas duas.
 Misce. (Sp.)

℞. Linimenti Saponis uncias duas.
 Olei Lauri . . . unciam unam.
 Tincturae Opii . . . semunciam.
 Misce. (E.)

Unguentum paralyticum s. contra paralytin. (B*. Br. Wür. Sp.)

℞. Saponis Veneti . . . uncias sex.
 Olei Juniperi . . . unciam unam.
 Seminum Erucae drachmas sex.
 Misce triturando.

Balsamum Succini. (Vm.)

℞. Olei fusci et spissi Succini partem unam.
 Saponis Alicantini . . . partes duas.
 Liqua.

Unguentum s. Pomatum resolvens. (Sm.)

℞. Olei Olivarum,
 Aquae Calcis,
 Saponis albi rasi,
 Albuminis,
 singulorum uncias duas.

Subige bene.

Emplastrum Cumini saponaceum. (Sa.)

℞. Saponis duri,
 Ceræ flavæ,
 singulorum unciam unam.
 Emplastri Cumini . . . uncias tres.
 Misce exacte.

Emplastrum de Sapone s. Saponis s. saponatum s. saponaceum s. mammillare, Ceratum Saponis. (Am. An. Du. Ed. Gal. GalM. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Sar. Suec. C. Ca. Vm.)

℞. Cerussæ,

Minii, singulorum libram unam.
 Olei Olivarum . . . libras tres.
 Saponis . . . uncias octo.
 Coque, agitando continue et sensim
 Aquam addendo, ad emplastri usque
 consistentiam. (Sar.)

℞. Saponis albi . . . uncias octo.
 Ceræ flavæ . . . uncias decem.
 Lithargyri . . . libram unam.
 Olei Olivarum octarium unum.
 Aceti . . . octarios octo.
 Coque lithargyrum cum aceto, adde
 saponem, tunc ceram et oleum. (Am.
 C.)

℞. Emplastri diachyli partes ducentas.
 Pulveris Minii
 — Cerussæ
 partes quinquaginta,
 partes viginti quinque.

Ceræ albæ partes nonaginta sex.
 Aquæ . . . quantum sufficit.
 Coque, continue agitando et adde,
 ab igne removendo, aqua rejecta

Saponis albi rasi
 partes centum viginti quinque.
 Coque igne exiguo. (Gal. Ca.)

℞. Emplastri diachyli simplicis
 libras duas.
 Ceræ albæ . . . uncias tres.
 Liquefactis leni igne adde
 Saponis albi . . . semilibram.
 Fiat emplastrum. (An.)

Jerome lique simul jubet Emplastri
 diachyli libram unam et Ceræ albæ
 unciam unam, tunc massæ refrigeratæ
 addere pro partiunculis Saponis
 medicinalis teneris uncias tres; —
 GalM. Diachyli partes octo, Ceræ
 flavæ duas et quatuor Saponis.

℞. Emplastri diachyli simplicis
 partes octo.
 Saponis . . . partem unam.

Misce simul. (Suec.)
 Du. et Lon. Emplastri partes duas
 et unam Saponis; — Lus. Emplastri
 unam et tres Saponis; — Lon. LonN.
 C. Emplastri sex et unam Saponis.

℞. Emplastri diachyli simplicis
 partes quatuor.
 — — gummosi
 partes duas.

Liquatis adde
 Saponis duri . . . partem unam.
 Coque parumper. (Ed.)

℞. Emplastri diachyli gummosi
 partes decem.
 Olei Olivarum partem dimidiam.
 Ceræ albæ . . . partem unam.
 Saponis albi . . . partes quatuor.

Liqua simul. (Vm.)
 ℞. Emplastri diachyli gummosi
 partes duas.

Saponis Alicantini partem unam.

Liqua, continue agitanda. (Li.)

Emplastrum saponatum s. Saponis camphoratum s. resolvens cum Saponi et Camphora. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. B. Br. Fi. Fid. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Olei Rosarum uncias duodecim.
Minii,
Cerussae, singulorum uncias sex.

Coque fortiter et adde

Saponis rasi . . . uncias quatuor.

Agita ad refrigerationem fere usque et adde

Camphorae cum Olei paxillo tritae semunciam.

Misce. (Sp.)

℞. Emplastri diachyli simplicis

libras tres.

Cerae flavae semilibram.

Saponis uncias tres.

Liquatis adde

Camphorae (in Olei Olivarum Provincialis paxillo solutae) semunciam.

Misce bene. (B. Bel. Bor. Bor4. D.

Ham. O. Pol.)

HassP. Emplastri communis sesquilibram, Cerae flavae uncias quatuor, Saponis Alicantini uncias quatuor et Camphorae in Oleo Olivarum solutae semunciam; — An. addere jubet singulis uncias Emplastri Saponis simplicis Camphorae grana decem; — Li. partem vigesimam quartam; — GalM. vigesimam quintam et quinquagesimam pro arbitrio; — Vm. quadragesimam octavam; — Sax. Camphorae partem unam, Saponis duas, Cerae quatuor et Emplastri diachyli simplicis viginti quatuor.

℞. Emplastri diachyli simplicis

sesquilibram.

Liqua leni igne et adde continue sub agitatione

Saponis Hispanici pulverati uncias quatuor.

Camphorae cum Olei paxillo tritae semunciam.

Misce bene. (Hass. Fid.)

Ams. Emplastri libras tres, Saponis semilibram et Camphorae drachmas sex; — R. Emplastri libras tres, Saponis semilibram et Camphorae unciam unam; — Ful. Emplastri uncias duas, Saponis unam et Camphorae drachmam unam; — Br. Emplastri uncias sex, unam Saponis et pro libra quaque Camphorae drachmam unam; — Sw. Emplastri libram unam, Saponis unciam unam et Camphorae drachmam unam;

— Gal. T. Emplastri libram unam, Saponis uncias quinque et Camphorae unciam unam; — B. Emplastri semilibram, Saponis uncias quatuor et Camphorae semunciam; — Fi. Emplastri libras tres, Saponis uncias octo, Camphorae, Lithargyri laevigati, singulorum sesquunciam.

℞. Cerae flavae,

Resinae Pini,

singularum partes quatuor.

Liquatis adde

Saponis pulverati partes quatuor.

Massae semirefrigeratae denuo adde

Camphorae cum Olei copia aequali tritae . . . partem nonagesimam.

Misce bene. (Ba.)

Emplastrum balsamicum. (Sw.)

℞. Emplastri diachyli libras quinque.

Liquatis adde

Saponis albi . . . libram unam.

Camphorae uncias tres.

Castorei cum Alchhole triti sesquunciam.

Misce exacte.

Oleum Saponis. (Br. Ful. His. Pal. Sar. Wir.)

℞. Saponis rasi . . . partem unam.

Arenae lotae . . . partes tres.

Destillent ex arena in retorta, tunc oleum supra cinerem sarmentorum rectificetur. (Br. Ful. Pal. Sar. Wir)

His, destillare jubet Saponis partem unam cum una Laterum contusorum et oleum his terve redestillare ut limpiddis mum obtineatur.

Reizend, eheben zur Auflösung von Ecthymosen, Stillung von Krämpfen und Zahnschmerzen und zur Austrocknung übel aussehender Geschwüre.

Potentilla.

Von dieser Gattung kommen in den Pharmacopöen zwei Arten vor:

1) *Potentilla Anserina*, L.; Gänsekraut, Gänsefuß, Fingerkraut, Silberkraut; Anserine vulgaire, Argentine (Gal.); Silverwood (Ang.)

Br. Gal. Wir. Be. M. Sp.

2) *Icosandria Polygynia*, L.; Rosaceae, L.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Bull. t. 157. Blackw. t. 6. Plenck t. 415. Hayne IV. t. 31. Zorn Ic. pl. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Anserinae s. Argentinae s. Argentarioe) ist faserig und schwärzlich. Sie hat einen süßlichen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem sehr dünnen Stängel mit gesiederten Blättern, deren gezähnte Blättchen unten glänzend silberweiß behaart sind. Es ist geruchlos. Der Geschmack ist herb und etwas styptisch.

Ein sehr schwaches abstringirendes Mittel.

2) *Potentilla reptans*, L.; Fünffingerkraut, Fünffblatt, Sandblatt; Quintefeulle (*Gal.*); Cinquoil leav'd grass (*Ang.*); Fempfingerert (*D.*); Cinco en rama (*His. Lus.*); Vyfvingerkruid (*Bel.*); Cinquefoglio, Pentafillo officinale, Cinque dita della Madonna (*I.*); Pieciornik (*Pol.*); Femfingerært (*Succ.*).

Ams. Br. Fer. Gal. His. Wir. Fi. Sp.

¶ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn Ic. pl. t. 302.*)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (*radix Potentillae s. Pentaphylli s. Quinquifolii majoris*) ist walzig, außen schwärzlichbraun, inwendig weißlich und von schwach styptischem Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem fadenförmigen Stängel und gestielten, fünfzeiligen Blättern mit stumpfen, sägezahnigen, hellgrünen Blättchen. Es hat einen etwas bitteren und abstringirenden Geschmack.

Primula.

Primula officinalis, L.; Schlüsselblume; Primvere officinale (*Gal.*); Cowslips (*Ang.*); Oxedrif (*D.*); *Primula veris* (*His.*); Sleutelbloem (*Bel.*); Primavera (*I.*); Bakwiza (*Pol.*); Primovera (*Lus.*); Oxelaegg (*Succ.*).

Ams. Br. Gal. Gen. His. Wir. Wür. Be. M Sp.

¶ (*Pentandria Monogynia*, L.; *Primulaceae*, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Hayne III. t. 84. Bert. Bild. X. 48. fig. 1. Dict. d. Sc. nat. cah. 4. Fl. méd. V. 284.*)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Blüten an.

Die Wurzel (*radix Primulae veris s. paralyseos s. Verbasculi pratensis*) ist ein dicker etwas röthlicher Ausläufer, welcher mit langen, weichen, fleischigen Fasern besetzt ist. Sie hat einen angenehmen, anisartigen Geruch und einen schwach abstringirenden, etwas bitteren Geschmack.

Das Kraut besteht aus eituden, gestreckten, runzligen, dicken, stumpfen, behaarten, gezähnten, unten etwas weißlichen Blättern. Sie haben fast keinen Geruch und einen rein krautartigen Geschmack.

Die Blütenkronen, welche man bloß allein nimmt, sind einblättrig, walzig, fünftheilig, gelb und haben einen angenehmen Geruch und einen süßen Geschmack.

Conserva Primulae veris. (Pal. Wir.)

℞. *Florum Primulae veris*

Sacchari albi partem unam.
Conture. partes duas.

Aqua paralyseos s. Primulae veris. (Pal.)

℞. *Florum Primulae veris*

Aquae partem unam.
Destillet pars una cum dimidia. partes tres.

Syrupus Florum paralyseos s. Primulae veris. (Pal. Wir.)

℞. *Florum recentium Primulae veris*

Libras tres cum dimidia.
Aquae fontanae bullientis libras quatuor.

Infunde per horas viginti quatuor, exprime et in uncias octodecim colaturae solve

Sacchari albi uncias triginta duas.

Acetum Primulae veris. (Wür.)

℞. *Radici Primulae veris* leviter siccatae et contusae sesquiunciam.

Aceti boni libram unam.

Macera per dies quatuordecim, saepius agitando, exprime leviter et adde Alcohol's unam unam.
Post aliquot dies decantha.

Oxymel Primulae veris. (Wür.)

℞. *Aceti Primulae veris* partem unam.

Mellis albi partes duas.
Coque lente ad syrupi consistentiam.

Prinos.

Prinos verticillatus, L.; wirtelförmiges Prinos; Prinos, Apalachine à fenilles de prunier (*Gal.*); Deciduous winterberry, black ader (*Ang.*).

Am. C.

Ein Strauch (*Hexandria Monogynia*, L.; *Rhamnaceae*, J.) des nördlichen Amerikas. (*Duh. I. t. 23*)

Man wendet die Rinde an, welche bitter und etwas scharf ist.

Prunella.

Prunella vulgaris, L.; gemeine Brunelle, Gottheit, Braunheil, Selbstheil; Prunelle (*Gal.*); Selfheel (*Ang.*); Czernoklowek, Swalnjk menssj (*B.*); Prunelle (*D.*); Brunela (*His.*); Bruinella (*Bel.*); Zywokest modry (*Pol.*); Prunella (*Lus.*).

Br. Gal. His. Wir. Wür. Be. M. Sp. Z.

¶ (*Didynamia Gymnospermia*, L.; *Labiatae*, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw. t. 24. Plench t.*

492. *Hayne* VI. t. 10. *Zorn* Ic. pl. t. 156.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Prunellae s. Brunellae s. Consolidae minoris*) an; es besteht aus einem vierkantigen, wenig ästigen Stängel mit gestielten, länglich eirunden, etwas sägezahnigen Blättern und in gedrängten Wirteln beisammenstehenden, eine endständige Aehre bildenden Blättern. Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas bitter und schleimig.

Es wurde ehemals als Wundmittel betrachtet.

Succus Prunellae. (Wür.)

℞. *Herbae recentis Prunellae*

quantum vis.

Contunde in mortario ligneo, Aquae paxillo humectando, exprime fortiter, succum sepositum decantha et in lagenis serva, singulis libris liquoris Alcoholis drachmam unam addendo.

Syrupus Prunellae. (Wir.)

℞. *Succi Prunellae depurati et lenta evaporatione super igne ad dimidium redacti . uncias novem.*

Solve in eo

Sacchari albi . uncias sedecim.

P R U N U S.

In den Pharmacopöen werden zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Prunus domestica*, L.; Pflaumenbaum; Prunier domestique (*Gal.*)

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. His. Li. Lon. LonN. Lu. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. WW. *He. Er. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

Ein Baum (*Icosandria Monogynia*, L.; *Rosaceae*, L.), welchen man in allen Obstgärten antrifft. (*Blackw.* L. 305. *Plenck* t. 379. *Hayne* IV. t. 43. *Düss.* off. Pf. V. t. 9. *Bert.* Bild. V. 74. fig. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 498.)

Man wendet die Frucht (*Prunus*; Pflaume; *Prune* (*Gal.*); Plum (*Ang.*); Sswestka, *Sejwa* (H.); Blom (*D.*); Girnelo (*His.*); Pruin (*Bel.*); Prugno (*I.*); Sliwina (*Pol.*); Ameixa (*Lus.*); Plum (*uec.*)] an. Sie ist hinsichtlich der Größe, Gestalt und Farbe unendlich verschieden. Sie hat einen süßen, meist zugleich etwas sauren Geschmack. Im Ofen oder an der Sonne getrocknet, nimmt man sie gebäckt oder geweihte Pflaumen (*Pruneaux*), wozu man gewöhnlich die Damascener Pflaumen wählt. Das rohe Muß (*Pulpa Prunorum cruda*) wird von Bor4. angezeigt.

2) *Prunus spinosa*, L.; Stechdorn, Schlehenbaum; Prunier sauvage (*Gal.*); Slaetorn, Kreygebaertorn (*D.*).

A. Ams. Ba. D. Fer. Ful. Gal. His. Li. R. Sax. Wir. *Be. M. Sp.*

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* IV. t. 44. *Düss.* off. Pf. IV. t. 17. *Zorn* Ic. pl. t. 4.)

Man wendet die Rinde, die Blüthen und die Frucht an.

Die Rinde (*cortex Acaciae nostratis s. vulgaris s. Germanicae s. Pruneoli sylvestris*) ist graubraun. Sie hat einen bitteren und abstringirenden Geschmack.

Die Blüthen sind weiß, haben einen angenehmen Geruch, welcher sich durch Trocknen nicht ganz verliert und einen bitteren, etwas styptischen Geschmack.

Die Früchte, Prunellen, Schlehen (*Prunelles*) genannt, sind rundliche, schwarze, mit einem blauen Reif bedeckte Steinfrüchte, welche unter einem grünlichgelben Fleische einen glatten rundlichen Kern enthalten. Der Geschmack ist herbe und abstringirend, wird aber durch Gefrieren süß. Die im Kern enthaltene Mandel hat den Geschmack der bitteren Mandeln.

Die ganze Pflanze ist abstringirend. Der verdickte Saft ihrer Früchte liefert den Acacienast (*Acacia nostras*). Die Blüthen sind ein purgirendes Hausmittel zu einer halben Unze im frischen Zustande oder zu zwei Drachmen getrocknet auf sechs Unzen Wasser.

Pulpa Prunorum s. Prunorum depurata. (An. Ba. Bor. Bor4. D. Han. His. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wür. *Fi. Pid. Su. T. Vm.*)

℞. *Prunorum . . . quantum vis.*

In Aqua bullientis mollefactis, liquidum decantha, nucleos separa et per crinium trajice, cum cochleari ligneo prinendo; pulpam exime et in olla tecta serva. (*Li. T. Vm.*)

Gal. et Lus. miscere jubent pulpam cum Aqua decocti et totum blando calore sufficienter consumere.

℞. *Prunorum bonorum partem unam. Aquae communis . . . partes duas.*

Coque ad mollitiem fructuum usque et nucleis separatis pulpam per cribrum trajectam consume, Sacchari partem sextam addendo. (Ba. Bor. Han. O. Pol. RC. Sax. *Sm.*)

His. Lus. et *Pid.* Sacchari partem unam et duas Pulpae; — An. D. R. et Wür. Sacchari unam et Pulpae tres; — Bor4. *Pulpa Prunorum cruda addita Aquae communis sufficiente quantitate per cribrum setaceum trajecta evaporat ad extracti spissioris consistentiam; singulis libris admisceantur Sacchari albi pulverati librae duae.*

Ein mildes Abführmittel.

Decoctum purgans antiphlogisticum laxans. (B. Sp.)

℞. Prunorum . . . uncias 13.

Contunde cum nucleis et adde

Aquae . . . libras tres.

Tertia parte coquendo consumpta colaturae infunde

Syrupi Sacchari . . . unciam unam.

℞. zwei Mal zu nehmen. (B.)

℞. Prunorum . . . uncias quatuor.

Aquae octarios duos cum dimidio.

Coquendo partem quintam consume, sub finem addendo

Liquiritiae . . . drachmas quatuor.

Post refrigerationem cola. (Sp.)

Conserva Prunorum. (Sar. Br. Fi. T.)

℞. Prunorum . . . quantum vis.

Digere cum Aqua, igne lenissimo, donec mollescant, pulpam per cribrum setaceum trajice, adde Sacchari partes tres et sufficienter consume, continue agitando. (Sar.)

℞. Prunorum libras septem in pulpam redactarum, Sacchari albi tres; —

Br. Terere jubet Pruna cum Sacchari pulverati duplo et inde pastam homogeneam formare; — T. Pulpae Prunorum libras quatuor, Syrupi desocti Prunorum ad plumam inspissati libras sex lente ad spissitudinem requisitam consumere jubet.

Conserva Prunorum leniens. (Fi. T.)

Obtinetur in decocto ad conservam simplicem adhibito Sennae drachmas sex digerendo et huic infusum pulpae addendo. Prunorum libras septem; Infusi Sennae, Sacchari, singulorum libras tres.

Acacia nostras, Roob Prunorum sylvestrium s. Fructuum Acaciae Germanicae. (A. Sar.)

℞. Fructuum Acaciae Germanicae fere maturorum . . . quantum vis.

Contunde, exprime succum et statim in balneo aquae, continue cum spatula agitando, ad electuarii consistentiam consume.

Aqua Florum Acaciae. (Ful. Li. Pal. Sax. Wür. Sm.)

℞. Florum siccatorum Acaciae Germanicae . . . partes duas.

Aquae . . . quantum sufficit.

Destillent partes viginti. (Sm.)

Pal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — Li. et Wür. Florum partem unam et Aquae sex; — Sax. Florum partem unam et octo Aquae; destillet dimidia pars.

℞. Florum siccatorum Acaciae . . . libras tres.

In sacco inclusos in cucurbita suspende continente

Aquae . . . libras decem.

Destillet sesquilibra absque coctione. (Ful.)

Syrupus Acaciarum s. Florum Acaciarum. (Pal. Wir.)

℞. Florum recentium Acaciae Germanicae,

Aquae bullientis,

singulorum libras duas.

Digere per noctem in vase tecto; colaturae uncias novemdecim adde

Sacchari albi uncias triginta duas.

Coque et cola syrupum. (Wir.)

Pal. infundere jubet Florum libras duas in Aquae bullientis quatuor per horas duodecim, liquidum deinde infundere Florum novorum libris duabus, operationem tertia vice repetere et cum colatura suprema et Sacchari albi libris quatuor syrupum parare.

Erreißend, wurmtreibend, gegen Nierenentzündung. — Gabe, von einer bis zu drei Drachmen für Kinder; von sechs Drachmen bis eine Unze für Erwachsene.

P t a r m i c a .

Achillea Ptarmica, L.; Deutscher Bertram, wilde Bertramwurzel, Gumpfgarbe, Niesekraut, Bertramachillenkraut; Ptarmique, Herbe à éternuer (Gal.); Common sneeze wort (Ang.); Hvid regnfau (D); Ptarmica (His. Lus.); Tysk bertram, Vild bertram (Bel.); Erba da sternutare (I.); Richawiec ziele (Pol.); Nysgraess (Succ.)

Bor. Br. D. Gal. Gen. Han. Li. Pol. R. Sax. Wir. Wür. Be. G. M. Sp.

4 (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, Cass.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 672. Tenck t. 633. Zorn Ic. pl. t. 342.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Ptarmicae) ist lang, walzig, etwas gegliedert, faserpulpenbild, an den Knoten behaart, außer graulichgelb, inwendig weißlich, von kaum merklichem Geruch und einem anfangs schwachen, dann scharfen Geschmack

Das Kraut besteht aus lanzettförmigen, spitzen, fein gedöhnten, glatten Blättern. Der Geschmack desselben ist scharf und brennend.

Reizend, bei Zahnschmerz empfohlen. Die Stufen werden es gegen Blutharnen und Mutterblutfluß an.

P t e r i s .

Pteris aquilina, L.; Fügelfarn, Adlersfaumfarn, Farnkrautweiblein; Pteride, Fougère femelle (Gal.); Common-brake (Ang.)

Ful. R. Wir. Wür. M.

¶ (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Sie in ganz Europa wachsende Pflanze. (Bull. Herb. t. 207. Bert. Bild. X. 38. fig. 1.) Man wendet den Zustäuffer, uneigentlich Wurzel (radix Pteridis aquilinae) genannt, an; sie ist fingersdick, lang, außen schwarz, innen gelb. Schräg durchschnitten zeigen sich auf der Durchschnittsfläche zwei sich kreuzende schwärzliche Linien, welche ein undeutliches Bild eines Ableser mit zwei Köpfen geben. Sie hat einen sehr starken Geruch und einen anfangs schleimigen, dann etwas bitteren, widerlichen und schwach styptischen Geschmack.

Wurmwürdig. — Gabe, für Kinder dreifig Gran, für Erwachsene drei Drachmen.

Pulegium.

Mentha Pulegium, L.; *Yoley*, *Yolet*, *Poleimünze*; *Pouliot* (Gal.); *Penny royal mint* (Ang.); *Poley* (Bel. D.); *Poleg* (B.); *Poleo* (His.); *Puleggio* (I.); *Poly* (Pol.); *Poejo* (Lus.); *Puleja* (Succ.). Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Br. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. R. RC. Sax. Wir. Wür. Be. Br. C. G. M. Pid. Sp. Z.

¶ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 490)

Man wendet das Kraut (herba Pulegii) an; es besteht aus einem fast walrigen, behaarten, sehr ästigen Stängel mit eirunden, stumpfen, ganz klein gezähnten Blättern, und hat einen starken, durchdringenden, nicht sehr angenehmen Geruch und einen etwas brennenden, hintennach kühlenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

Oleum Pulegii aethereum, *Aethereoleum Pulegii*. (Am. Br. Du. Han. Lon. LonN. Pal. Sar. Wir. Wür. C. T.)

℞. Herbae florescentis Pulegii quantum vis.

Aquae communis quantum sufficit.

Destillando elicited oleum supernatans collige. (Am. Du. Han. Lon. LonN. C.)

T. Herbae quantum vis, Aquae bullientis pondus quadruplum, destillet liquidi pars dimidia.

℞. Herbae florescentis Pulegii partes viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.

Salis culinaris partes tres.

Post tres dies destillatio fiat. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae florescentis Pulegii quantum vis.

Aquae Pulegii . quantum sufficit. Destillent. (Wür.)

Aqua Pulegii. (A. Ams. Ed. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. Lon. LonN. Pal. Sar. Sax. Wür. Pid. Sp. Vm.)

℞. Herbae florescentis Pulegii partes duas.

Aquae . . . quantum sufficit.

Destillent partes quatuordecim (Ham.)

RC. Destillent, partes decem; —

Ams. et Sw. Herbae partem unam et

Aquae sufficientem quantitatem; destil-

lent partes decem; — Pal. Herbae par-

tem unam et quatuor Aquae; destil-

lent partes duae; — Wür. Herbae

unam et sex Aquae; — Hass. et Pid.

Herbae unam et octo Aquae; destillent

partes quatuor; — A. Herbae partem

unam et duodecim Aquae; destillent

partes quatuor; — Sax. Herbae par-

tem unam et quindecim Aquae; destil-

lent trientes duo; — Gen. Herbae li-

bram unam et Aquae quantum satis ad

prohibendum empyreuma; destillent li-

brae sex; — Fer. Herbae libras qua-

tuor et Aquae sedecim; destillent li-

brae octo; — Lon. Pulegii sesquili-

bram, Aquae quantum satis, destillet

congius; — LonN. Pulegii exsiccati

semilibram vel Olei Pulegii pondere

drachmas tres, Aquae quantum ad pro-

hibendum empyreuma sufficit; destillet

congius.

℞. Herbae recentis Pulegii partem unam.

Aquae . . . partes quatuor.

Destillet dimidia pars et nova supra

novam herbam destillatio instituat.

(Sar.)

℞. Herbae recentis Pulegii partes tres.

In sacco inclusam in medio cucurbitae

suspende continentis

Aquae . . . partes duodecim

ita ut saccus ad aquam non attingat;

destillent partes sex. (Ful.)

℞. Herbae recentis Pulegii

libram unam.

Aquae purae . . . quantum sufficit

ut empyreuma prohibeatur. Destillent

librae decem, quibus adde Aquae Vi-

tae uncias quinque. (Ed.)

Vm. Herbae recentis partes decem,

Aquae Vitae partem dimidiam et Aquae

centum sexaginta; destillent partes qua-

draginta.

Spiritus Pulegii. (Lon. LonN. Sar. C.

Sm.)

℞. Herbae recentis Pulegii

partem unam.

Aquae Vitae . . . partes tres.

— purae . . . partes sex.

Destillent partes duae cum dimidia.

(Vm.)

Lon. et C. Herbae sesquilibrium, Aquae Vitae octarios octo, et Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent partes octo; — LonN. Olei Pulegii pondere scrupulos septem, Spiritus rectificati octarios quatuor cum dimidio, Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; lento igne destillet congius.

℞. Herbae recentis Pulegii

partem unam.

Alcoholis . . . partes quatuor.

Post horas viginti quatuor digestio- nis destillent in balneo aquae fere ad siccum; macera et productum cum nova herba novae destillationi subijce. (Sar.)

Pulmonaria.

Pulmonaria officinalis, L.; Lungen- kraut; Grande pulmonaire (Gal.); Com- mon longwort (Ang.); Spettet lon- geurt (D.); Pulmonaria (His. Lus.); Gewoon lungekruid (Bel.); Polmona- ria, Sinfisto macchiato (I.); Placonik (Pol.); Meduniza (R.); Lungaert (Succ.); Koiwiek (Ta.).

Ams. An. Br. Fer. Gal. His. Wir. Be. nr. Fi. G. M. Sp.

2. (Pentandria Monogynia, L.; Bo- raginaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Blackw. t. 367. Plenck t. 73. Hayne II. t. 44. Pl. méd. V. 286)

Man wendet das Kraut (herba Pulmo- nariae maculosae s. Symphyti maculo- si) an; es besteht aus eirunden, gestielten, kurz fleischbehaarten, weißgefleckten Wurzel- blättern und abwechselnden, stehenden, län- gern, schmälern, ganzen Stängelblättern. Es hat fast gar keinen Geruch. Der Ge- schmack ist krautartig, schleimig und etwas adstringirend.

Ehedem rühmte man es sehr bei Lungen- catarrh. Heutzutage ist es fast außer Ge- brauch.

Succus Pulmonariae. (Gal. Fi. T.)

℞. Foliorum Pulmonariae. mundato rum . . . partes sedecim.

Contunde in mortario marmoreo, sensim addendo

Aquae communis partem unam.

Exprime succum, qui postquam sub- sedit, frigide per chartam emporeti- cam filtretur.

P u m e x.

Lapis Pumicis, L.; Bimstein, Bims- stein; Pierre Ponce (Gal.); Pumice stone (Ang.); Piedra poncez (His.); Pui- msteen (Bel.); Pietra pomice (I.); Zazel kamienna (Pol.).

Br. Gal. Han. His. Wir. Wür. Fi. Sp.

Ein vulcanischer, weißlichgrauer oder gelblicher, sehr poröser, leichter, brüchiger, faseriger, in der Richtung der Kanten glänzender selbst seidenglänzender Stein mit körnigem und ungleichem Bruch, welcher trocken anzufühlen, leichter als Wasser und zu einem weißen Glase schmelzbar ist.

Er kommt zu verschiedenen Zahnpulvern.

Pulvis densifricius albus. (Br. Sp.)

℞. Pumicis . . . uncias duas.

Ossis Sepiae . . . unciam unam.

Cremoris Tartari,

Radici Iridis Florentinae,

singulorum semunciam.

Olei essentialis Caryophyllorum

guttas quatuor.

Fiat pulvis tenerrimus.

P u n i c a.

Punica Granatum, L.; Granatbaum; Grenadier, Balaustier (Gal.); Pome- granate-tree (Ang.); Ranua, Roman (Ar.); Pomapran, Granatowé gabliko (B.); Delunghedie (Cy.); Anar (Hin. Pe.); Balaustries (His.); Rodia (Graec. mod.); Granatboom (Bel.); Granato, Pomo Granato, Melogranato, Balausto (I.); Gangsalan (Ja.); Dalimb (Mah.); Dalema, Daima (Mal.); Drzewo granatowe (Pol.); Romeira (Lus.); Granat- oschnoe derewo (R.); Dadima (Sa.); Darim (Succ.); Magilam palam (Tam.); Dadima pundu (Tel.); Nar (Tu.).

Ams. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. Ma. Par. Sp. Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, J.) des südlichen Europa's. (Blackw. t. 97. Schk. t. 131. b. Plenck t. 376. Düss. off. Pfl. t. 9. Zorn Ic. pl. t. 270.)

Man wendet die Wurzelrinde, die Blü- then und die Früchte an.

Die Wurzelrinde ist außen gelblichgrau, innen graulichgelb oder schwach röthlich, geruchlos und von schwach styptischem und bitterlichem Geschmack. Das Pulver ist grünlichgelb. Es ist unlängst als ein un- trüglisches Mittel zur Austreibung des Bandwurms gepriesen worden.

Die Blüten (flores Balaustiorum, Balaustia) sind halbkugelig, schön roth, fast geruchlos und von etwas styptischem Ge- schmack. Sie sind adstringirend, aber weni- ger als die Rinde der Frucht.

Die Früchte, Granaten (Mala Pun- ca); Grenades (Gal.), sind rundliche, von

den Kelchabschnitten gekrönte und durch eine Querscheidewand in zwei vielfächerige Höhlen getheilte Beeren; diese Fächer enthalten edige, mit einem breiigen Umschlage versehene Saamen. Das äußere Fellchen (Malucorium, Malicorium) ist graulich-gelb oder röthlich, dick, hart und ledrig. Es hat einen abstringirenden Geschmack. Man hat es in allen Fällen angewendet, wo man auf die lebenden Gewebe abstringirend wirken wollte.

Abstringirend; man darf keine Eisenfäule damit verbinden. Lehmann empfahl die Rinde der Frucht gegen Wechselfieber, zu sechs bis zwölf Stück von zwei bis sechs Scrupel, während der Apoplexie.

Species Decocti pro gargarismate adstringente s. astringentes pro gargarismate. (B*. Gal. GalM. Han. Pal. Fi. Pid.)

℞. Radicis Bistortae,
Florum Granati,
— Malvae arboreae,
singulorum uncias duas.

Concisa misce. (Han.)

℞. Herbae Plantaginis,
— Prunellae,
singulorum uncias quatuor.
— Salviae . . . uncias duas.
Florum Rosarum rubrarum,
— Ligustri,
— Balaustiorum,
singulorum unciam unam.

Concisa misce. (Pal. Wir.)

Br. eandem formulam sed absque ligustro; — Fi. Plantaginis, Consolidae minoris, singulorum uncias quinque, Salviae, uncias tres, Florum Rosarum, Balaustiorum, singulorum unciam unam. (½ Unze auf 1 Pfund schwaches Decoct.)

℞. Radicis Bistortae,
Herbae Agrimoniae,
— Pervincae,
Florum Malvae arboreae,
— Balaustiorum,
singulorum uncias duas.

Concisa misce. (Pid)

℞. Corticis Granati,
Radicis Bistortae,
— Tormentillae,
singulorum partes aequales.
Concisa misce. (Gal. GalM.)

Species pro fotu ad haemorrhoidum fluxum immodicum. (Pal)

℞. Herbae Millefolii,
— Plantaginis,
— Verbasci,
Florum Sambuci,
singulorum manipulos quatuor.
Corticis Granati unciam unam.

Succus Granatorum. (Gal. His. Fi. Sw. T.)

℞. Fructuum Granatorum acidorum
quantum vis.

Cortice externo separato reliquum transverse concide, tritura spatulae lignae ope ut semina separentur, contunde deinde in mortario porphyreo, exprime vel in sacco vel inter duo strata straminis secalitii concisi et cum aqua tepida abluti; succum sepositum et decanthatum in lagenis sub olei strato serva.

Syrupus Granatorum s. de Granatis.
(Gal. His. Pal. Sar. Wir. T.)

℞. Succu Granatorum depurati et filtrati libras duas.

Sacchari albi
libras tres cum dimidia.

Solve lenis caloris ope. (Gal.)

His. et Lus. Succu partem unam et duas Sacchari; — Wir. Succu uncias decem et sedecim Sacchari ut fiat coquendo syrupus; — T. Succu libras quatuor, Sacchari septem; — Sar. Syrupi communis quantum necesse est ut fiat levis evaporationis in balneo aquae ope syrupus.

Vinum Granati. (Fi.)

℞. Seminum maturorum
quantum vis.

Contunde leviter in mortario marmoreo, sepone, donec odorem vinosum emittant, exprime succum et filtratum per chartam serva in parvis vasis vitreis a strato olei obtectum.

Decoctum Corticis Radicis Granati. (B*. GalF. E. Ma. T.)

℞. Corticis Radicis Granati
uncias duas.

Aquae libras duas.

Partem partem coquendo consume. — Gegen Bandwurm. — Gabe, zwei Unzen alle halbe Stunden. — Vier Gaben sind gewöhnlich zur Austreibung des Wurms hinreichend.

T. Corticis drachmas decem, Aquae fontanae uncias viginti, macerare per horas viginti quatuor, deinde ad dimidium decoquere et tunc adhuc per horas circiter duodecim in infusione se relinquere, suprino decanthare. — Für Erwachsene die ganze Portion auf dreimal in einer Stunde. — Ist bricht der Kranke die erste Portion wieder aus; es ist gut, wenn man Tags vorher ein Abführmittel giebt. (D. A. Roiti Nuova Giorn. de Letterati No. XXV. Fisa 1826.)

Decoctum Corticis Granati, Tisana adstringens. (GalM.)

℞. Corticis Granati unciam unam.

Aquae . . . quantum sufficit
ut unciae duae colaturae obtineantur.
Coque per horae quadrantem et adde
Liquiritiae rasae drachmas duas.
Abstringend.

Fomentatio adstringens. (Ra.)

℞. Corticis Granati,
Radici Bistortae,
singulorum uncias duas.
Vini rubri . . . libram unam.
Coque et colaturae adde
Salis Ammoniaci drachmas duas.

Clysmas s. Enema adstringens. (His.)

℞. Corticis Granati unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit
ut colaturae librae duae obtineantur.

Gargarisma adstringens. (Ca.)

℞. Infusi Agrimoniae,
— Nucum Cypressi,
— Corticis Granati,
— Florum Sambuci,
singulorum uncias quatuor.
Mellis rosati,
Syrupi Mororum,
singulorum drachmas tres.
Acidi sulphurici . guttas viginti.

Decoctum Corticis Granati Rehmanni. (B.)*

℞. Corticis Granati . uncias duas.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae fontanae . . . libras duas.
Decoque ad dimidium et librae cui-
que decocti adde
Extracti Trifolii semidrachmam.
Aetheris sulphurici alcoholisati
drachmam unam.

Abstringend. — Gabe, eine halbe Tasse
alle anderthalb Stunden.

Pyrethrum.

Anthemis Pyrethrum, L.; Speichel-
wur, Bertram; Pyrethre salivaire (*Gal.*);
Pellitory of Spain (*Ang.*); Bertram
(*D. Succ.*); Akur kurha (*Ar.*); Peltram
(*B.*); Pelitre (*His.*); Radice di Santa
Apolonia, Piretro (*I.*); Piretro (*Lus.*);
Zebne ziele (*Pol.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4.
Br. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass.
HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.
Pal. R. Sax. Succ. Wir. Wuir. WW. Be.
Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

4 (Syngenesia Polygamia Superflua,
L.; Syanthereae, Cass.) Eine Europäi-
sche Pflanze. (*Blacko.* t. 209. *Plenck* t.
621. *Lam.* Ill. t. 683. fig. 4. *Düss.* off.
Pl. X. t. 6. Fl. méd. V. 287.)

Die Wurzel (radix Pyrethri officinalis
s. salivalis s. Dentariae) ist lang, dick,

spindelförmig, fleischig, wenigstens fingerdick,
außen rau und braungelb, inwendig weiß,
mit Fibern besetzt und fast geruchlos. Sie
hat einen beißenden, scharfen und etwas
sauern Geschmack, welcher ein anhaltendes
Gefühl von Hitze hinterläßt.

Sie enthält, nach Gauthier, ein stich-
tiges und ein fettes Öl, einen gelbfarben-
den Stoff, Emetin, Schleimharz.

Reizend, die Speichelabsonderung bethätig-
end und fast nur in Surgetwasser und als
Raumittel angewendet. — Gabe des Pul-
vers, von zehn Gran bis zu einer Drachme.

Species resolventes. (Pid.)

℞. Radicis Pyrethri . uncias duas
Herbae Salviae . . . semilibram.
Seminum Sinapis . uncias tres.
Concisa misce. — Zu Surgetwasser.

Pulvis sternutatorius. (Pie.)

℞. Radicis Pyrethri,
Seminum Staphydis agrariae,
Zingiberis,
singulorum drachmam unam.
Piperis longi . semidrachmam.

Bolus excitans. (B.)*

℞. Radicis Pyrethri semidrachmam.
Syrupi Corticum Aurantiorum
quantum sufficit.

Abends zu nehmen.

Pilulae Pyrethri s. incitantes. (Au.)

℞. Pulveris Radicis Pyrethri
drachmam unam.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.
Fiant pilulae triginta. — Gabe, sechs
Stück alle vier Stunden, bei Wechselstiebern
und Lähmungen.

Pilulae excitantes. (B.)*

℞. Radicis Pyrethri drachmam unam.
Olei essentialis Menthae piperitae
guttas quinque.
Conservae Cochleariae
quantum sufficit.
Fiant pilulae octodecim. — Gabe,
zwei bis drei Stück täglich.

Trochisci excitantes. (Ca)

℞. Infusi Pyrethri alcoholici
unciam unam.
Sacchari pulverati uncias decem.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiant pilulae centum quinquaginta.
— Gabe, vier bis neun Stück täglich, bei
chronischen Brustbeschwerden.

Masticacium excitans. (E.)

℞. Radicis Pyrethri,
Mastichis,
singulorum drachmam unam.

Fiat massa in duas partes aequales dividenda.

Electuarium excitans.

℞. Radicis Pyrethri drachmas duas.
Mellis . . . quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel alle drei Stunden.

Unguentum contra pediculos. (B.)*

℞. Pulveris Radicis Pyrethri,
— Seminum Sinapis,
— — Petroselini
singulorum uncias duas.
Axungiae Porci . . . uncias quatuor.
Olei essentialis Anisi . . . uncias triginta duas.
drachmas duas.

Emplastrum Pyrethri. (B Ca.)*

℞. Cerae flavae . . . uncias tres.
Terebinthinae . . . unciam unam et
drachmas duas cum dimidia.

Liqua leni igne et adde

Sagapeni,
Galbani,
Gummi Ammoniaci,
singulorum unciam unam.
Semirefrigeratis adde
Pulveris Radicis Pyrethri,
— Seminum Sinapis,
singulorum unciam unam.

Auflösend, schmelzend.

Gargarisma sialagogum. (Pic.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas tres.
— Liquiritiae sesquidrachmam.
Foliorum Salviae,
— Majoranae.
— Hyssopi,
singulorum semimanipulum.
— Stoechadis pugillum unum.
Aquae . . . quantum sufficit.
Decoque ad librae unius remanentiam.

Gargarisma excitans. (Ca.)

℞. Aquae Salviae . . . uncias octo.
Spiritus Cochleariae . . . uncias sex.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Radicis Pyrethri sesquidrachmam.
Post horas duodecim infusionis cola
et adde colaturae
Mellis semunciam.

Collutorium sialagogum. (Sw.)

℞. Radicis Pyrethri unciam unam.
Aquae bullientis . . . libram unam.
Post horam unam cola et colaturae
adde
Aceti uncias tres.
Salis Ammoniaci drachmas tres.

Gargarisma antidontalgicum (Pic.)

℞. Radicis Pyrethri . . . semunciam.

Radicis Tormentillae drachmas tres.
Aceti rubri . . . octarium unum.
Coque et ab igne removendo adde
Opium,
Camphorae,
singulorum drachmam unam.
Seminum Hyoscyami . . . drachmas tres.
Post horam unam infusionis filtra.
Collutorium antidontalgicum. (Ca. Pic. Sp.)

℞. Salis Ammoniaci drachmam unam.
Radicis Pyrethri drachmas duas.
Extracti Opium grana duo.
Aceti,
Aquae Lavandulae,
singulorum uncias duas.
Stent in digestionem calida per aliquot horas et tunc coentur. — Wird gegen Zahnschmerz von Weinfraß und Rheumatismus gerühmt; man nimmt einen Löffel davon in den Mund.

Collutorium excitans. (E.)

℞. Radicis Pyrethri . . . semunciam.
Aceti drachmas sex.
Opium gummosi grana tria.
Digere per horam unam super arena.
— Man faßt einen Löffel davon in den Mund.

Tinctura odontalgica s. antidontalgica, Elixir antidontalgicum. (B Br. His. Wir. Bo. Ca. Sw.)*

℞. Radicis Pyrethri unciam unam.
Spiritus Rosmarini semilibram.
Post sufficientem digestionem filtra.
(Ca.)

℞. Radicis Pyrethri . . . uncias duas.
Spiritus Lavandulae libram unam.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Digere ex arena per horas viginti quatuor et filtra. (Bo.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas sex.
Rasurae Ligni Guajaci . . . uncias duas.
— — Sassafras unciam unam.

Foliorum Nicotianae . . . drachmas tres.
Summitatum Thymi,

— Origani,
singulorum drachmas duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Camphorae,
Opium, singulorum semidrachmam.
Alcoholis libras tres.
Post horas duodecim macerationis cola. (His.)

Sw. Pyrethri drachmas sex, Guajaci unciam unam, Sassafras tantidem, Nicotianae drachmas tres, Serpylli, Ori-

gani, singulorum drachmas duas, Camphorae semidrachmam, Opii scrupulum unum et Alcoholis libras duas.

℞. Radicis Pyrethri,
Seminum Hyoscyami,
singulorum drachmas duas,
Rasurae Guajaci . uncias duas.
Corticis Sassafras . semunciam,
Caryophyllorum,
Piperis longi,
singulorum drachmam unam.

Camphorae,
Opii, singulorum semidrachmam.
Santali rubri . drachmas duas.
Alcoholis . . uncias quindecim.
Post sufficientem digestionem filtra.
(Br. Wir.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.
Alcoholis . . . libram unam.
Post decem dies infusionis colaturae adde

Camphorae . . . unciam unam.
Olei Rorismarini . . . semunciam.
Tincturae Opii . . . drachmas duas.
Misc. (B*. secundum Oxley.)

℞. Radicis Pyrethri,
Nucis moschatae,
singulorum unciam unam.
Caryophyllorum,
Ligni Guajaci,
singulorum semunciam.

Alcoholis (26°) . . . libras tres.
Post sufficientem digestionem cola
exprimendo et colaturae adde
Olei essentialis Rorismarini

guttas decem.
— — Bergamottae
guttas quatuor.

Reizend, bei Zahnkrankheiten und Zungenlähmung empfohlen. — Man wendet sie etwas erwärmt als Mundwasser an, oder trinkt auch Baumwolle damit und bringt sie in den hohlen Zahn.

Tinctura Pyrethri aetherea. (Au.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.
Aetheris sulphurici . . . libram unam.
Post dies decem digestionis cola et colaturae adde

Camphorae . . . unciam unam.
Olei Rorismarini . . . semunciam.

Tincturae Opii drachmas duas.
Ebenso gebraucht wie die vorige.

Spiritus Pyrethri. (GalF.)
℞. Radicis Pyrethri . . . libram unam.
Alcoholis (35°) . . . libras quinque.
Aquae . . . libram unam.
Maceratis per dies duos librae quinque destillent.

Spiritus Pyrethri compositus. (GalH.)
℞. Spiritus Pyrethri
octarium (litre) unum.
Cinnamomi teneris
scrupulos quatuor.

Vanillae,
Coriandri,
Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.

Macidis,
Coccionellae,
Crocii,
Salis Ammoniaci,
singulorum grana octodecim.
Aquae Florum Aurantiorum
semunciam.

Olei essentialis Anisi,
— — Citri,
singulorum guttas octodecim.
— — Lavandulae,
— — Thymi,
Tincturae Ambrae,
singulorum guttas novem.

Post dies quatuordecim macerationis filtra.

Pyrola.

Pyrola rotundifolia, L.; Waldmangold, rundblättriges Wintergrün; *Pyrola à feuilles rondes* (Gal.); *Viutergroen* (D.).

Br. Gal. His. Li. Sax. Wir. Be. M. Sp.

♀ (Decandria Digynia, L.; Ericineae, J.) Eine Nordeuropäische Pflanze. (Blackw. t. 594. Plenck t. 335. Hayne IV. t. 21. Oed. Fl. Dan. t. 110.)

Man wendet das Kraut (herba *Pyrolae*) an; es besteht aus einem Büschel runder, grüner, ledriger, langgestielter Wurzelblätter. Es hat keinen Geruch, aber einen bitter und etwas styptischen Geschmack.

Q.

Quassia.

Quassia amara, L.; Quassienholz, Amerikanisches Bitterholz; Quassie, Bois de Surinam (Gal.); Legno del Surinam (I.); Drzewo kwasya (Pol.).

Am. Ams. An. Br. Ba. Bel. Bor. Bor4.

Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R.R.C. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Fi.

Ein Baum (Decandria Monogynia, L.; Simarubeae, J.) Surinam's. (Hayne

IX. 14. Lam. III. gen. t. 849. fig. 1. Plenck t. 333. Curt. Bot. Mag. t. 497. Düss. off. Pfl. XIII. t. 1. Desc. Fl. Ant. I. 5.)

Man wendet das Holz des Stammes und besonders der Wurzel an, welches mit seiner Rinde bekleidet, in Stücken von verschiedenen Länge und Dicke, bisweilen kaum kleinen Fingers, bisweilen aber armsdick, von einem oder mehreren Fuß Länge, welche walzenförmig, glatt, oder der Länge nach gespalten, meist gerabe, selten krumm, bisweilen knotig und ästig sind, zu uns kommt Die Rinde ist gelblichgrau, nicht sehr dick, glatt anzufühlen und hängt nur wenig am Holze. Letzteres ist gelblichweiß, leicht und innerlich von zartem Gewebe. Sie hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich bitteren Geschmack.

Ihre Bitterkeit verbannt sie einem eigenthümlichen Stoffe, dem Quassin (Quassina).

Man leitet dieses Holz auch von Quassia excelsa, Sw., einem Baume Jamaica's (Comm. Hort. I. p. 149. t. 942. Hayne IX. t. 16.) ab.

Bitter, tonisch, magenstärkend, bei Verdauungsbeschwerden, Diarrhoe und Blutflüssen gebraucht. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Extractum Quassiae s. Ligni Quassiae (aquosum). (Am. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pol. R. Sax. Wür. C. Fi. Pid. T.)

R. Rasurae Ligni Quassiae
libram unam.

Aquae frigidae . . . libras decem.
Macerata per duos dies, subinde agitando, cola, repone ut desideat, liquorem cola et leni igne consume. (Pol.)

R. Ligni Quassiae raspati
quantum vis.

Coque in Aquae sufficiente quantitate per horam unam, cola exprimendo, liquorem post subsidentiam decantha et vaporando ad mellis spissitudinem redige. (Wür.)

Lus. Ligni libram unam et sex Aquae.

R. Rasurae Ligni Quassiae
libram unam.

Aquae fontanae . . . libras sex.
Digere per dies quatuor in loco frigido, tunc coque parumper; cola exprimendo et ad extracti consistentiam consume. (Br.)

Am. Hass. C. et Pid. coquere jubent Ligni libram unam in Aquae octo ad dimidii remanentiam.

R. Rasurae Ligni Quassiae

libram unam.

Aquae bullientis . . . libras octo.
Digere per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola; residuum coquatur per horae quadrantem cum Aquae novae libris quatuor et coletur; liquores commixti post subsidentiam decanthati evaporent. (Am.)

Ams. Bor. D. Han. O. i ol. R. et Sax. plures e serie coquere jubent Ligni partem unam cum Aquae decem et colaturas commixtas (sub finem Spiritus Vini rectificati aliquantulum addendo Bor.) consumere; — Bor4 Ligni libram unam cum Aquae sedecim ad dimidii remanentiam, residuum itidem cum Aquae sedecim ad octo decoquere et sic pergere quamdiu opus fuerit, liquores commixtos post subsidentiam decanthatos ad quatuor librarum remanentiam et has in balneo vaporis ad extracti Absinthii consistentiam inspissare; — Fi. Ligni libram unam primum per dimidiam horam cum duodecim, deinde cum sex Aquae decoquere, decocta commixta ad sesquialbrae remanentiam et post refrigerationem filtrata in balneo aquae ad extracti consistentiam consumere; — HassP. ut extractum Colombo; — T. Ligni partem unam cum Aquae duodecim per horam dimidiam coquere, colare cum expressione, decoctionem cum nova Aqua repetere etc.; — Ba. coquere Ligni partem unam primum cum quinque deinde cum decem Aquae partibus et liquores commiscere.

Gabe, zehen bis fünfzehn Gran.

Extractum Quassiae s. Ligni Quassiae alcoholicum. (Ful. Li.)

R. Ligni Quassiae . . . libram unam.
Aquae Vitae . . . libras sex.

Post aliquot dies digestionis leni calore, exprime, filtra et ad mellis consistentiam consume; sedimentum coque cum Aquae libris tribus, exprime, filtra et itidem evapora; liquores syrapi formam praeseferentes commixti ad extracti consistentiam evaporent. (Ful.)

Li. digerere jubet Ligni semilibram primo in Alcoholis libris sex per dies duos, tunc per horas viginti quatuor cum Aquae bullientis libris novem et tincturas commixtas consumere.

Pilulae tonicae. (Au. E.)

R. Extracti Quassiae drachmam unam.
Pulveris Gentianae
quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti. — *Gabe, ein Stück täglich drei oder vier Mal. (E.)*

Au. Extracti drachmas duas et Pulveris Zingiberis quantum satis ut fiant pilulae granorum duorum. — *Gabe, zehn Stück auf ein Mal.*

Elixir cum Aqua Calcariae ustae s. antacidum. (Au.)

℞. Extracti Quassiae drachmam unam.
Aquae Calcariae . . . uncias octo.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

Infusum Quassiae s. Quassiae excelsae. (Am. B. Ed. Lon. LonN. Lus. RC. C. E. Fi. Sw. T.)*

℞. Ligni Quassiae rasi semidrachmam.
Aquae bullientis . . . uncias octo.
Digere per horas duas et cola. (Am. Ed. C.)

℞. Ligni drachmas quatuor et Aquae libram unam; — B*. Lonr. et LonN. Ligni scrupulum unum et Aquae semioctarium, — RC. Sw. Ligni drachmas duas et Aquae libram unam; — Lus. Ligni drachmas tres et Aquae libram unam; — Fi. T. Ligni drachmam unam, Aquae libram unam.

℞. Ligni Quassiae,
Serpentariae Virginicae,
Corticis Aurantiorum,
singulorum semunciam.

Aquae bullientis . . . octarios duos.

Infunde, et cola. (E.)

Bitter. — Gabe, eine bis zwei Unzen mehrmals täglich.

Infusum Quassiae cum Sulphate Zinci. (Am. C.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae drachmam unam.
Sulphatis Zinci . . . grana octo.
Aquae frigidae . . . semioctarium.
Macerare per horas duas et cola.

Hustus stomachicus, Potio stomachica. (B.)

℞. Radicis Colombo drachmam unam.
Ligni Quassiae sesquidrachmam.
Aquae . . . quantum sufficit
ut infusi unciae octo obtineantur. Colaturae adde

Elixir stomachici Whytti drachmas duas.

Mündlig zu nehmen.

Decoctum Ligni Quassiae. (Ful. Ham.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae unciam unam.
Aquae fontanae . . . libras duas.
Coquendo ad sesquibrae remanentiam consume. (Han.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae sesquiunciam.

Aquae libras quatuor.
Ad libras tres coctione redige, sub finem addendo

Florum Chamomillae sesquiunciam.
Subsideant tunc decantha. (Ful.) — *Gabe, alle zwei oder drei Stunden ein Eßlöfel.*

Decoctum Quassiae s. Ligni Quassiae compositum, Decoctum amarum. (Wür.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae unciam unam.
Florum Chamomillae siccatorum sesquiunciam.

Subcarbonatis Potassae drachmas duas.
Aquae fontanae libras quatuor.
Parte quarta coctione consumpta, cola.

Tinctura Quassiae vinosa. (Han.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae uncias quatuor.
Vini Malacensis . . . libras duas.
Post sufficientem digestionem filtra. — *Bitter, tonisch. — Gabe, drei Drachmen bis eine halbe Unze, täglich zwei Mal.*

Tinctura Quassiae s. Ligni Quassiae s. Quassiae excelsae (alcoholica). (Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Gen. Han. HasP. O. Sax. C. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae unciam unam.
Alcoholis (0,980) . . . octarios duos.
Digere per duos dies et filtra. (Am. Du. C.)

Ed. Ligni unciam unam et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — B. et Bel. Ligni partem unam et Alcoholis (15°) sex; — Ams. Ligni partem unam et Alcoholis (0,917) sex; — Fi. Ligni unam et Alcoholis (30°) sex; — Sw. Ligni uncias duas et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — Vm. Ligni partem unam et Aquae Vitae sex; — Han. et O. Ligni uncias quinque et Alcoholis libras duas; — D. Ligni partem unam et quinque Alcoholis; — Sax. Ligni unam et decem Alcoholis; — HassP. ut tincturam Colombo; — T. Ligni uncias quatuor cum Alcoholis 25° B. libris duabus per octo dies digerere.

℞. Ligni Quassiae . . . unciam unam.
Alcoholis (20°) . . . uncias quatuor.
Digere per dies quatuor in balneo aquae tepido, cola et residuo infunde Alcoholis (20°) . . . uncias duas.
Post duos dies cola et colaturas mixtas filtra. (An.)

℞. Rasurae Ligni Quassiae uncias duas.
Corticis Aurantiorum unciam unam.

Cardamomi minoris semunciam.
Aque Vitae . . . libras duas.
Post dies quatuor maceratis cola.
(Gen.)

Q U E R C U S.

In den Pharmacopöen werden fünf Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Quercus alba*, L.; weiße Eiche; Chêne blanc (Gal.); White oak (Ang.)
Am. C.

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Amentaceae, J.) der Vereinigten Staaten. (Mich. Arb. Amer. II. t. 1.)

Die Rinde, welche man anwendet, ist abstringirend.

2) *Quercus tinctoria*, L.; Quercitroneneiche; Färbereiche; Chêne quercitron (Gal.); Querce oak (Ang.).
Am C. G.

Ein Baum der Vereinigten Staaten. (Mich. Arb. Amer. II. t. 22.)

Man wendet die Rinde an, welche stark abstringirend ist.

3) *Quercus robur*, L.; Eiche; Chêne Rouvre (Gal.); Oak (Ang.); Uuh (B.); Eeg (D.); Majup'hal (Hin. Sa.); Eik (Bel.); Querce, Quercia (I.); Kora de-bowa (Lus.); Ek (Succ.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

Ein großer Baum, welcher in ganz Europa wächst. (Hayne VI. 35. 36. Blackw. t. 487. Plenck. t. 670. Nouv. Duh. VII. 57. Bert. Bild. V. 68. fig. 2.)

Man wendet die Rinde und die Früchte an.

Die Rinde der jungen Zweige (cortex Quercus s. quercinus) ist glatt, außen aschgrau, inwendig roth. Sie hat einen eigenthümlichen Geruch und einen bitteren und sehr abstringirenden Geschmack.

Die Früchte (Glandes s. Nuclei Quercus), Eichen; Glands (Gal.); Zoladz (Pol.) sind eiförmig oder eiförmig, länglich, geruchlos und haben einen herben, bitteren Geschmack. Ihre Becher (Cupulae s. Calyculi Glandium Quercus) bestehen aus graulichem, dicht dachziegelförmig auf einander liegenden Schuppen.

B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ham. Han. Hass. Q. Pöl. Sax. Succ. Würt. Be. M.

Quercus pedunculata, Willd.

Ba. Bor4. HassP. LonN.

4) *Quercus Ilex*, L.; Steineiche; Chêne Yeuse (Gal.).

His.

Pharmacopöa universalis. II.

Ein Baum des südlichen Europa's und des nördlichen Africa's. (Zorn Ic. pl. t. 618.)

Die Eichen, welche man anwendet, sind bisweilen süß und essbar, länglich und unten von Becherchen bedeckt, welche aus sehr kleinen, dicht dachziegelartig auf einander liegenden und sitzigen Schuppen bestehen.

Die Eichenrinden, besonders die von der gemeinen Eiche, enthalten viel Gärstoff mit einer extractivstoffigen Substanz. Sie besitzen eine sehr stark abstringirende Kraft, so daß man sie nicht in hoher Gabe anwenden kann, ohne die Verdauungswege zu reizen, ja ohne eine allgemeine Reaction zu bewirken. Man hat sie statt der China vorgeschlagen, allein sie hat als Fiebermittel, eine weit geringere Wirkung. — Gabe des Pulvers, von einer Drachme bis zu einer Unze. Die Eichen dienen, wenn sie süß sind, als Nahrungsmittel; die andern hat man, geröstet, als ein nützlichel Reizmittel bei Drüsenkrankheiten, besonders Scropheln, empfohlen.

5) *Quercus suber*, L.; Korkeiche; Liege (Gal.); Corktree (Ang.); Korketrae (D.); Alcorhoque (His.); Korkboom (Bel.); Saverio (I.); Saveriro (Lus.); Korktraed (Succ.).

Gal. Succ. Wir. Be. G. M. Sp.

Ein Baum des südlichen und westlichen Europa's. (Blackw. t. 193. Plenck t. 671. Bert. Bild. I. 66. fig. 1. Nouv. Duh. VII. 45.)

Man wendet die Rinde und die Früchte an.

Die Rinde (cortex Suberi s. Suberi) ist biegsam, leicht, rißig, schwammig, elastisch und von röthlichgelber Farbe.

Nach Sydenham besitzt sie als vorzügliches Agens einen eigenthümlichen Stoff, Suberin (Suberina), Subérine (Gal.). Ehedem wendete man sie innerlich als Abstringens an.

Die Eichen haben im Allgemeinen einen süßen und angenehmen Geschmack.

Pulvis Quercus compositus, *Pulvis Corticis Quercus et Anthemidis nobilis*, (BorC. RC. Au.)

R. Corticis Quercus scrupulum unum.

Radic. s. Calami,
— Gentianae,
singularum grana quinque.

Fiat pulvis. (BorC. Au.)

R. Corticis Quercus grana quinque.
— Aurantiorum,

Olibani, singularum grana decem
Fiat pulvis. (Au.)

R. Pulveris Corticis Quercus,
— Florum Anthemidis nobilis,

singularum scrupulum unum (RC.)

Cataplasma antisepticum s. cum Corticis cinnae, (GalM. Lk.)

R. Pulveris Corticis Quercus, . . .

Pulveris Salicis fragilis,
singulorum partem unam.

Aceti camphorati . . . partes sex.
Misce. (L.)

R. Farinae Hordei,
— secal tiae,

Corticis Quercus pulverati,
singulorum partes aequales.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque ad consistentiam requisitam.
(GalM.) — Massae refrigeratae ad-
dendo Camphorae partem quinquage-
simam vel vigesimam quintam habes
*Cataplasma antisepticum s. c. Concinno
et Camphora s. cum Camphora.* (GalM.)

Suppositorium roborans. (Ca.)

R. Corticis Quercus,
Radicis Tormentillae,

singulorum partem unam.
Mellis . . . partes duas

Extractum Corticis Quercus. (BorC. Du.
Br.)

R. Corticis Quercus libram unam.
Aquae purae . . . libras octo.

Coquendo dimidia parte consumpta
cola exprimendo, et colaturam blando
igne ad consistentiam pilularem con-
sume. (Du.)

R. Corticis Quercus partem unam.
Aquae . . . partes sex.

Coque per horas duas et per cri-
brum trapice; residuo cum nova Aqua
cocto, liquores commixti sufficienter
evaporent. (Br.)

R. Corticis Quercus pulverati
libram unam

Aquae bullientis libras duodecim.
Digere, saepius agitando, per horas
viginti quatuor, tunc liquorem leviter
ad consumptionem tertiae partis usque
consume; post refrigerationem filtra
et in balneo aquae ad extracti consi-
stentiam usque inspissa. (BorC.)

Tinctura Corticis Quercus. (A.)

**R. Corticis Quercus grossiuscule pul-
verati** . . . uncias duas.

Alcoholis (0,910) . . . libram unam.
Digere ad sufficientem extractionem
usque et filtra. — Abstringend.

Decoctum Quercus s. Quercus Roboris
s. Corticis Quercus. (B. BorC. Ed.
Lon. LonN. Ri. T.)

R. Corticis Quercus . . . unciam unam.
Aquae communis . . . octarios duos.

Decoque ad uniam octarii remanen-
tiam et cola. (B. Lon LonN.)

(Ed. Ri. Corticis unciam unam, Aquae
libras duas cum dimidia et reductione
ad unciarum sedecim (ad dimi-
dium, Fi.) remanentiam; — BorC.

**Corticis uncias duas, Aquae uncias se-
decim et decoctionem ad unciarum
duodecim remanentiam; — T. Corticis
uncias tres cum Aquae libris quatuor
ad dimidii remanentiam decoquere.**

Abstringend, tonisch, feberwibrig, bei
Wechselfiebern empfohlen. — Gabe, alle
drei Stunden eine Tasse.

Decoctum Corticis Suberi. (Bo. Pie.)

R. Suberi raspati . . . scrupulos duos.
Aquae . . . octarios duos.

Decoque ad dimidii remanentiam,
(Pie.)

**Bo. addere jubet Syrupi Capilli Ve-
neris uncias duas.**

Gabe, acht Unzen, drei Mal täglich, acht
oder zehn Tage lang. Man . . . syrupus
Nymphaeae zusetzen und die Wirkung
durch ein Klystir von einer starken Ablo-
sung der Korkeichenrinde oder von Peter-
silie, jeden Morgen gegeben, unterstützen.

*Fomentatio cum Concinno s. Corticis
Quercus.* (GalM.)

R. Corticis Quercus . . . unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut coquendo octarius unus colaturae
obteneatur.

Injectio adstringens. (Sw.)

R. Corticis vel Foliorum Quercus
unciam unam ad duas.

Aquae . . . sesquilibram.

Decoque ad libras unius colaturae
remanentiam. — Zu Einspritzungen in
die Harnröhre, drei oder vier Mal täglich,
bei rebellischem chronischem Tripper. —
Man kann diese Einspritzung auch mit et-
ner halben Unze Galläpfelpulver bereiten.

*Fomentatio adstringens, Fomentum quer-
cinum.* (Au. Ra.)

R. Corticis Quercus . . . semunciam.
Aquae . . . libras tres.

Decoque ad dimidii remanentiam et
adde

Florum Chamomillae unciam unam.

Post horam dimidiam infusionis co-
laturae adde

Aceti . . . uncias quatuor.

Misce. (Au.)

R. Summitatum Millefolii
unciam unam.

Radicis Caryophyllatae,

Corticis Quercus,

singulorum semunciam.

Aquae Calcariae
uncias viginti quatuor.

Decoque ad unciarum duodecim co-
laturam et adde

Alcoholis . . . uncias tres.

Misce. (Au.)

℞. Radicis Quinquefolii majoris
unciam unam.
Corticis Quercus pulverati,
Rosarum rubrarum,
singulorum drachmas sex.
Aquae libram unam.
Post sufficientem coctionem cola.
(Ra.)

Lac adstringens. (Sa.)

℞. Corticis Quercus,
— Granati,
Radicis Tormentillae,
singulorum drachmas duas.
Aquae fontanae,
Lactis vaccini,
singulorum libram unam.
Coque ad dimidii remanentiam, in
fine addendo
Cinnamomi pulverati
drachmas duas.

Decoctum Corticis Quercus cum Alumine s. Quercus aluminosum, Fofus s. Fomentatio adsringens. (DD, RC, Sa, Sw.)

℞. Corticis Quercus . . . uncias duas.
Aquae purae uncias triginta sex.
Coque ad unciarum octodecim liquidi
remanentiam; cola fortiter exprimen-
do et adde
Aluminis crudi pulverati
drachmas tres.

Dissolve. (DD.)

℞. Corticis drachmam unam, Aquae
fontanae libram unam, ad uncias octo
decocto adde Aluminis drachmam unam,
Syrupi simplicis semunciam. — Gabe,
eine Unze drei oder vier Mal täglich, mehr
oder weniger, seltener oder häufiger, je nach
der Wirkung und den Umständen. Ohne
Syrup, äußerlich in Bähung und Gurgel-
wasser.

℞. Corticis Quercus . . . libram unam.
Balaustiorum . . . uncias quatuor.
Aquae fontanae . . . libra, sex.
Decoque ad dimidii remanentiam et
colaturae adde

Aluminis drachmas sex.

Dissolve. (Sa)

℞. Corticis Quercus semilibram,
Balaustiorum vel Corticis Granati un-
cias tres, Aquae libras sex, reductio-
nem ad tres, et Aluminis drachmas sex.

Decoctum Corticis Quercus cum Aceto, Fofus antisepticus, Fomentatio anti-septica. (DD, Ful, Ham.)

℞. Corticis Quercus unciam unam.
Herbae Absinthii . . . uncias duas.
Aquae purae uncias triginta sex.
Coque ad unciarum viginti liquidi
remanentiam; cola fortiter exprimen-
do et colaturae adde

Aceti uncias quatuor.
Misce bene. (DD.)

℞. Corticis Quercus . . . uncias duas.
Aceti uncias triginta sex.
Coque, sub finem addendo
Herbae Rutae,
— Scordii,
singularum drachmas tres.
Salis Ammoniaci . . . semunciam.
Cola. (Ful.)

℞. Corticis Quercus unciam unam,
Aceti libras duas, Rutae manipulum
unum, Scordii tantidem et in colatu-
rae sesquilibra solvere Salis Ammonia-
ci semunciam.

Gargarisma antisepticum. (RC.)

℞. Decocti Quercus aluminosi (RC.)
libram unam.

Aceti,
Tincturae Myrrhae,
singulorum unciam unam.

Misce. — Interdum loco aceti Acidi sulphurici vel muriatici guttae quindecim.

Cerevisia quercina s. adstringens. (Sw*, Vm.)

℞. Glandium Quercus partem unam.
Cerevisiae fortis partes sedecim.
Infunde in balneo aquae tepido per
plures dies et cola.

Emulsio adstringens. (Bo.)

℞. Glandium Quercus excorticatarum,
Amygdalarum dulcium,
singulorum no. 6.
Infusi Verbasci uncias sex.
Syrupi Hederae terrestris
unciam unam.

Bei Harnruhr empfohlen. — Abends
bei Schlafengehen zu nehmen.

Opiatum adstringens. (Bo.)

℞. Conservae Cynorrhodon uncias sex.
Glandium Quercus pulveratarum
uncias tres.

Corallii rubri praeparati,
Catechu, singulorum sesquiunciam,
Cinnamomi drachmas tres,
Syrupi Rosarum rubrarum
quantum sufficit.

Bei Diarrhöe und chronischer Ruhr. —
Gabe, eine Drachme alle vier Stunden.

Glandes s. Nuces Quercus s. quernae tostae. (Ba, HassP, Li, Sax.)

℞. Glandium Quercus quantum vis.
Cupulis et cortice separatis concide
nucleos in partes quatuor, sicca prope
ignem cribro impositos et tunc in pel-
vi ferrea torre, agitando continue, do-
nec frusta brunnea et fragilia reddita
sint; post refrigerationem molae ope
in pulverem redige.

Infusum Glandium Quercus tostarum.
(B*, Fi.)

℞. Glandium Quercus tostarum
semunciam.
Aquae bullientis uncias sex ad octo.

Infunde et cola. — Bitter, bei Gerüstfeverstopfungen und Atrophie gepriesen. — Man kann den Aufguss angenehmer machen, wenn man eine Drachme Chocolate zusetzt.

Coffea Glandium. (Au.)

℞. Glandium Quercus tostarum
drachmas sex.
Coffeae ustae . . . drachmas duas.
Aquae sufficientem quantitatem.

Post brevem ebullitionem cola. — Dieser Trank mit Milch und Zucker gemischt, wird bei Scropheln und Rhachitis für nützlich gehalten. — Gabe, zwei oder drei Tassen täglich.

R.

Radix Lopeziana.

Racine de Jean Lopez (Gal.)
Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Gal.
Wir. A. M. Sp.

Diese Wurzel kommt in sehr großen holzigen Stücken vor, deren Holz gelblichweiß, herb, geadert, geruchlos und sehr bitter ist. Die Rinde besteht aus einer innern röthlichen, bitter und styptisch schmeckenden und einer äußern körnigen, pulverartigen, hellgelben Schicht, welche letztere wahrscheinlich von irgenb einem Cryptogam herrührt.

Man kennt die Pflanze, von welcher diese Wurzel kommt, nicht genau. Sie wird aus Africa gebracht. Manche halten *Morus indica* dafür. Fer. leitet sie, aus einem sonderbaren Irrthum, von *Lopezia racemosa, Cav.*, aus Mexico ab.

Reizend, tonisch, bei chronischer Diarrhöe angewendet.

Gabe des Pulvers, sechs bis zwanzig Gran, drei oder vier Mal täglich.

Syrupus adstringens. (Sm.)

℞. Radicis Lopezianae minutim concisae . . . unciam unam.
Aquae bullientis sesquioctarium.

Digere inter cineres calidos per horas quadraginta octo, coque deinde blando igne ad remanentiam liquoris octarii (chopine) unius, in quo colato solve

Sacchari albi . . . libram unam.
Semel vel bis ebulliant. — Gabe, täglich wenigstens sechs Löffel.

Electuarium adstringens. (Sm.)

℞. Radicis Lopezianae drachmas duas.
Conservae Rosarum rubrarum,
— Cynorrhodon,
singularum uncias duas.

Syrupi Gummi quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Tinctura adstringens. (Sm.)

℞. Radicis Lopezianae
sesquidrachmam.
Alcoholis uncias duas cum dimidia.

Post sufficientem digestionem filtra.
— Gabe, ein Kaffeelöffel täglich drei Mal in einem passenden Behälter.

Ranunculus.

In den Pharmacopöen werden mehrere Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Ranunculus acris, L.*; scharfer Hahnenfuß; *Renoncule acre (Gal.)*; Upricht crowfoot (*Bel.*).

Br. Gal. His. G. M. Sp.

2) (*Polyandria Polygynia, L.*; *Ranunculaceae, J.*) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Orfila méd. lég. t. 3. Bull. t. 109. Plenck t. 458. Fl. méd. VI. 294.*)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (*herba Ranunculi s. Ranunculi acris s. pratensis*) besteht aus zweierlei Blättern, von denen die untern in drei vielspaltige Lappen getheilt, die obern liniensförmig sind.

Die Blüthen sind gelb.

3) *Ranunculus aquatilis, L.*; Wasserhahnenfuß, Wasserhähnlein; *Renoncule aquatique (Gal.)*.

His.

4) Eine Europäische Pflanze. (*Oed. Fk. Dan. t. 376*)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut besteht aus theils in haarbünne Lappchen getheilten, theils ganzen und schildförmigen Blättern. Es hat einen scharfen Geschmack.

Die Blüthen sind weiß.

5) *Ranunculus bulbosus, L.*; knolliger Hahnenfuß; *Renoncule bulbeuse (Gal.)*; *Bulbous crowfoot (Ang.)*; Knollartige Ranonkel (*Bel.*); *Solvifrar (Succ.)*.

Gal. G. M.

6) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Bull. t. 27. Plenck t. 457. Bigel. Am. med. Bot. III. 1. t. 47. Oed. Fl. Dan. t. 351.*)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an. Die Wurzel (bulbi Ranunculi bulbosi) ist einfach, rundlich, knollig, weiß.

Das Kraut besteht aus einem aufrechten Stängel und zusammengefügten Blättern.

Die ganze Pflanze hat eine außerordentlich scharfe.

4) *Ranunculus sceleratus*, L.; giftiger Hahnenfuß, Froschpeppich, Feigblatternpeppich; Renoncule des marais (Gal.); Marsh crowfoot, Sharpshane wood (Ang.); Puggespeber (D.); Ranonculo mulvado (His.); Water haanevoet (bel.).
Gal. C. G. M.

⊙ Eine in Europa an sumpfigen Orten gemeine Pflanze. (Blackw. Herb. t. 259. Plenck t. 456. Bull. t. 47. Vert. Bild. IV. 7. fig. 1.)

Man wendet das Kraut (herba Ranunculi palustris s. aquatici) an; es besteht aus einem glatten, hohlen und sehr ästigen Stängel und theils gestielten, rundlichen, glatten, zur Hälfte in drei eingeschnittene oder gekerbte Lappen gespaltenen, unbehaarten, blaugrünen, theils in längere, schmälere, liniensförmige, gesingerte oder handförmige Lappen gespaltenen Blättern.

Eins der heftigsten reizenden und scharfen Gifte. Einige Schriftsteller halten diese Pflanze für die herba Sardoia des Galenus, durch deren Gebrauch das sardosische Fieber entsteht.

5) *Ranunculus Flammula*, L.; kleiner Sumpfhahnenfuß; Petite Douve (Gal.); Lisser spearwort (Ang.); Liden guul hanefod (D.); Kleen egelkolen (Bel.); Aelt graes (Succ.).
Gal. G. M.

⊙ Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Bull. t. 15. Plenck t. 459. Zorn Ic. pl. t. 326.)

Man wendet das Kraut (herba Flammulae) an; es besteht aus einem glatten Stängel mit ganzen und ganzrandigen, eirundlanzettförmigen, gestielten Blättern. Es besitzt einen außerordentlich scharfen und brennenden Geschmack.

Reizend; die schwedischen Landleute wendeten es als Pflaster gegen Wechselfieber an.

Raphanus.

In den Pharmacopöen werden zwei Pflanzen dieses Namens angeführt:

1) *Raphanus sativus*, L.; Rettig, Rattich, Reddiz; Raifort cultivé, Radis noir (Gal.); Radish (Ang.); Reddiske (D.); Rabano (His.); Tamme radys (Bel.); Rafano (I.); Rabao (Lus.); Raettika (Succ.).

Ams. Br. D. Fer. Gal. His. Pal. Wir. Wür. Be. G. M. Pid. Sp.

⊙ et 2) (*Tetradynamia Siliquosa*, L.;

Cruciferae, J.) Eine Pflanze, welche ursprünglich in China einheimisch seyn soll, aber überall gebaut wird. (Lam. III. t. 566. Blackw. t. 81. Plenck. t. 518. Fl. méd. VI. 292.)

Die Wurzel (*radix Raphani nigri s. hortensis*) ist dick, kreisrund, außen schwarz, innen weiß, ihr Fleisch ist fest und saftig. Sie hat einen starken, eigenthümlichen Geruch und einen sehr scharfen, besonders in der Schaale deutlichen Geschmack.

Die Rabischen und Rüben sind Varietäten dieser Art und durch die Cultur entstanden.

2) *Cochlearia Armoracia*, L.; Meerrettig, Meerrettigscharbochheit, Meerkrän; Raifort sauvage, Cran (Gal.); Broad horse radish (Ang.); Kren (B.); Peberrod (D.); Rabano, Marvisro (His.); Meerradys (Bel.); Armorraccio, Peperello hobrasso, Barba forte, Gren (I.); Chrzan (Pol.); Rabao rusticano (Lus.); Chren (R.); Pepparrot (ucc.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. C. Fi. G. M. Par. Sa. Sp. Z.

⊙ (*Tetradynamia Siliquosa*, L.; Cruciferae J.) Eine in verschiedenen Gegenden Europa's wachsende Pflanze. (Blackw. t. 415. Schk. t. 181. Plenck t. 513. Hayne V. t. 29. Dürs. off. Pl. XIII. t. 21. Zorn Ic. pl. t. 457.)

Die Wurzel (*radix Armoraciae s. Raphani rusticani s. rustici s. marini*) ist gestreckt, walzenförmig, dick, außen gelb, innen weiß und faserig. Sie hat einen sehr durchdringenden Geruch und einen scharfen, beißenden, bitteren Geschmack.

Sie enthält Sagmehl und ein flüchtiges Del, dessen vorzüglicher Bestandtheil der Schwefel zu seyn scheint.

Kräftig reizend, magenstärkend, antiscorbutisch. — Gabe des Saftes, eine halbe Drachme in Milch oder Wein.

Pediluvium ex Armoracia s. irritans. (Au.)

℞. Aquae fervidae libras quatuor.
Radices Armoraciae tritae

uncias duas ad quatuor.
Schlegel empfiehlt es zur Wiederherstellung des unterdrückten Fußschweißes.

Species contra scorbutum s. antiscorbuticae. (Pal.)

℞. Herbae Cochleariae,
— Nasturtii aquaticoi,
— Beccabungae,
— Marrubii albi,
— Fumariae,
— Trifolii,

singularum semunciam.

Radicis Armoraciae semilibram.
 — Polypodii,
 — Sarsaparillae,
 singularum uncias tres.
 Seminum Anisi . drachmas sex.
 Concisa et contusa misce.

Succus Armoraciae compositus s. diureticus. (B*. Suec.)

℞. Succis Armoraciae uncias quatuor.
 Oxymell s. scillitici unciam unam.
 Misce. (B*.)

℞. Succis Armoraciae unciam unam.
 Spiritus Frumenti . uncias sex.
 Aceti uncias duas.
 Misce. (Suec.)
 Gabe, zwei Eßfel.

Potio ad catarrhum s. anticatarrhalis.
 (Pie. Sm.)

℞. Succis Raparum coctarum expressi,
 Aquae communis,
 singularum uncias octo.
 Mellis albi uncias duas.
 Den Tag über, Kaffeetassenweise.

Mel Armoraciae. (B*. Suec. Vm.)

℞. Succis Armoraciae uncias tres.
 Mellis albi libram unam.
 Misce frigide. (Suec.)

Vm. Succis partem unam et quatuor
 Mellis; — B* secundum dispensato-
 rium pauperum Pragense, Succis par-
 tem unam et duas Mellis, leni igne
 ad aptam consistentiam inspissanda.

Aqua Armoraciae. (GalH. Fi. T.)

℞. Radicis Armoraciae recentis
 partem unam.
 Aquae purae partes quinque.
 Destillent partes duae.

Aqua diuretica. (Sar. Ca. Pie.)

℞. Radicis Armoraciae,
 — Petroselini,
 — Saxifragae,
 singularum libram unam.
 Baccarum Juniperi uncias sex.
 Succis Limonum,
 Aquae Ononidis,
 singularum libras tres.

Post horas viginti quatuor macera-
 tionis destillent in balneo aquae. (Sar.)

℞. Succis Porri,
 — Ceparum,
 — Armoraciae,
 singularum libras duas.
 — Parietariae,
 — Citri,
 singularum semilibram.

Post trium dierum digestionem de-
 stillent lente. (Ca. Pie.)

Gabe, eine Unze Morgens und Abends.

Spiritus Raphani rusticani s. Armoraciae. (Hass. Sar.)

℞. Radicis Armoraciae recentis,
 Succis Armoraciae,
 Aquae communis,
 singularum libras sex.
 Alcoholis libras duas.
 Destillet dimidia pars; producto adde
 Radicis Armoraciae recentis
 libras tres.

Destillent in balneo aquae. (Sar.)

℞. Radicis Armoraciae,
 Aquae communis,
 singularum partes sex.
 Alcoholis partes quatuor.
 Destillent partes duae. (Hass.)

Spiritus Armoraciae compositus. (B*.)
 Ful. Lon. LonN.)

℞. Radicis Armoraciae libras tres.
 Alcoholis libras quatuor.
 Destillent librae quatuor in balneo
 aquae; adde
 Aquae Piperis Jamaicaensis
 libras octo.

Misce bene. (Ful.)

℞. Radicis Armoraciae,
 Corticis sicci Aurantiorum,
 singularum libram unam.
 Nucis moschatae semunciam.
 Aquae Vitae octarios octo.
 — communis quantum sufficit
 ad prohibendum empyreuma. Macera-
 tis per horas viginti quatuor destillent
 lente octarii octo. (B*. Lon. LonN.)
 Eßfelweise zu nehmen.

Tisana ad scorbutum s. antiscorbutica.
 (ParC)

℞. Spiritus Armoraciae compositi
 unciam unam.
 Infusi Cichorii octarium unum.
 Misce.

Cerevisia Armoraciae s. antiscorbutica.
 (Ca. Huf. Vm.)

℞. Armoraciae uncias quinque.
 Cerevisiae libras duas.
 Infunde per horas viginti quatuor et
 colaturae adde

Syrupi Sacchari unciam unam.

Misce bene. (Huf.)

℞. Cerevisiae recentis
 octarios sedecim.

Immerge, inter fermentandum, sac-
 cum linteum continentem

Betonicae,

Salviae,

Agrimoniae,

Cochleariae,

Absinthii poutici,

singularum manipulum unum.

Radicis Inulae,

Radicis Armoraciae,
singularum uncias quatuor.
Post duos vel tres dies. (Ca.)

R. Fructus Aurantiorum . . . no. 3.
Succum expressum infunde in
Cerevisiae fortis
partes sexaginta quatuor.
In mixtura frigide macera
Foliorum recentium Cochleariae,
— — Nasturtii,
— — Salviae,
singularum partem unam.
Seminum Sinapis,
Radicis Armoraciae,
singularum partem dimidiam.
Post aliquot dies cola leviter expri-
mendo. (Vm.)
Gabe, zwei oder drei Gläser täglich, bei
Scorbut und Nieren-, Blasen- und Leber-
Krankheiten.

**Cerevisia antiscorbutica s. Turionum
Pini.** (RC. Ca.)

R. Cerevisiae . . . libras quatuor.
Radicis Armoraciae uncias duas.
Foliorum Cochleariae
sesquiunciam.
Turionum Pini . . . unciam unam.
Post sufficientem infusionem exprime.
Gabe, zwei bis vier Unzen täglich. (Ca.)

R. Radicis Armoraciae,
Seminum Sinapis nigrae contuso-
rum,
Extracti Turionum Pini,
singularum libras duas.
Syrupi Molassis libras quatuor.
Cerevisiae tenuis, vel
Infusi Malti Hordei, vel
Decocti ejusdem libras centum et
viginthi.
Digere leniter per dies quatuor vel
sex ut fiat fermentatio et cola. — Ga-
be, ein halbes bis ein Pfund täglich, bei
Scorbut und Lähmung; bisweilen läßt man
Zeit ein Pfund kohlensaures Kali darin
einweichen, wodurch es besonders harntrei-
bend und bei Wasserucht nützlich wird. (RC.)

Acetum Cochleariae Armoraciae. (Sw.)

R. Radicis Armoraciae unciam unam.
Aceti . . . libram unam.
Post septem dies macerat onis filtra.
— Besonders als Schönheitsmittel gegen
Sommerprossen, auch gegen scorbutische
Mundgeschwüre.

Aqua emetica. (Pic.)

R. Juglandium viridum,
Radicis Armoraciae,
singularum libras duas.
Aceti . . . libras tres.
Digere leni calore per dies quinque
vel sex et deinde cola. — Gabe, eine
halbe bis drei Unzen

Tinctura Raphani composita. (B*. GalM.)

R. Radicis recentis Raphani
uncias duas.
Corticis sicci Aurantiorum
unciam unam.
Spiritus Cochleariae libras quatuor.
Digere per dies aliquot et cola ex-
primendo. — Reizend, bei Scorbut em-
pfohlen. — Gabe, ein Eßffel.

Gargarisma antiscorbuticum. (Ra.)

R. Infusi amari
Tincturae Raphani
Mellis Rosarum
semunciam.
uncias duas.

Vinum Armoraciae. (Suec.)

R. Radicis Armoraciae semilibram.
Vini albi libras octo.
Digere per dies quatuor et cola. —
Reizend, gegen Scorbut.

Vinum Cochleariae compositum. (B*.
GalM. Sw.)

R. Radicis Armoraciae unciam unam.
Cinnamom,
Seminum Sinapis nigrae,
singularum sesquiunciam.
Vini albi libras duas cum dimidia.
Macera per tres dies, vas saepius
agitando, tunc liquidi partem lumpydam
decantha. (Sw.)

R. Tincturae Armoraciae compositae
unciam unam.
Vini albi octarium (litre) unum.
Misce. (B*. GalM.)

Reizend; bei Scorbut, Unordnungen in
den Verdauungsfunktionen von Schwäche
des Magens und Lähmung empfohlen —
Gabe, fünf bis sechs Eßlöffel zwei Mal
täglich. Nothigensfalls kann man ihn in
Wasser geben.

Vinum antiscorbuticum. (Gal. Sar. Sp.
Vm.)

R. Radicis Armoraciae partes tres.
Seminum Sinapis
partem unam cum dimidia.
Herbae Nasturtii aquatici,
— Cochleariae,
— Beccabungae,
singularum partem unam.
Spiritus Cochleariae
partem unam cum dimidia.
Vini Rhenani partes nonaginta sex.
Infunde per dies septem, exprime
leviter et filtra. (Vm.)

R. Radicis Armoraciae recentis
unciam unam.
Foliorum recentium Cochleariae,
— — Nasturtii aquatici,
— — Trifolii,
Seminum Sinapis,
singularum semunciam.

Salis Ammoniaci drachmas duas.
 Vini albi libras duas.
 Digere per horas triginta sex, subinde agitando; cola paullo exprimendo et adde colaturae

Alcoholis Cochleariae semunciam.
 Misce. (Gal.)

℞. Radicis recentis Armoraciae
 uncias duodecim.

— — Bardanae
 uncias quinque.

Foliorum recentium Cochleariae,

— — Nasturtii,

— — Beccabungae,

— — Fumariae,

Seminum Sinapis,
 singulorum uncias sex.

Salis Ammoniaci uncias tres.

Vini albi
 uncias trecentas octoginta.

Post septem dies infusionis exprime fortiter et filtra. (Sp.)

℞. Radicis recentis Armoraciae
 uncias quatuor.

Foliorum recentium Cochleariae,

— — Trifolii, singulorum manipulos duos.

— — Salviae
 manipulum unum.

Vini albi libras sex.

Digere, blando calore, per horas viginti quatuor et cola. (Sa.)

Gabe, ein Eißrglaß voll und mehr.

Vinum diureticum. (Sa.)

℞. Radicis Armoraciae,
 — Iridis Florentinae,

singulorum uncias sex.

Vini albi quantum sufficit
 ut post semihoram infusionis colaturae
 librae duae obtineantur, quibus adde

Syrupi Foeniculi,
 — Juniperi,

singulorum uncias duas.

Syrupus antiscorbuticus s. antiscorbuticus compositus s. Cochleariae officinalis compositus s. de Armoracia compositus. (An. Bel. Gal. Sp. Sw. Vm.)

℞. Cinnamomi contusi partem unam.
 Foliorum recentium contusorum

Cochleariae,

— — — Beccabungae,

— — — Nasturtii,
 singulorum partes triginta.

Seminum Sinapis contusorum
 partes triginta quinque.

Radicis recentis Armoraciae
 partes quadraginta quinque.

Succi Aurantiorum
 partes nonaginta.

Vini rubri
 partes ducentas sexaginta.

Infunde, blando calore, per horas viginti quatuor; post refrigerationem cola exprimendo; in colatura blandi caloris ope solve

Sacchari albi

partes quadringentas octoginta.

Cola syrupum per pannum. (Vm.)

℞. Foliorum recentium concisorum
 Cochleariae,

— — — Trifolii,

— — — Nasturtii,

Radicis Armoraciae,

Pomorum Aurantiorum amarorum
 concisorum libram unam.

Cinnamomi contusi sesquiunciam.
 Vini albi generosi libras quatuor.

Macera per duos dies in cucurbita stannea, galea sua tecta et bene lutata. Destillet deinde in balneo aquae liquoris libra una. cum quo et

Sacchari albi libris duabus

in balneo aquae, vase tecto, syrupum para. Quod in cucurbita remanet, cola absque expressione; liquorem post subsidiantiam decantha et coque ad syrupi consistantiam cum

Sacchari albi libris duabus.

Clarifica et nonnisi tepidum cum

praecedente commisce. (Gal.)

℞. Herbae recentis Cochleariae,
 — — Lepidii,

— — Nasturtii,
 singularum libras quinque.

Radicis Armoraciae libras decem.

Cinnamomi pulverati uncias sex.

Pomorum Aurantiorum amarorum
 cum cortice concisorum

libram unam.

Alcoholis (20°) libras duas.

Aquae destillatae libras octo.

In alembicum immissis, destillent lente liquoris librae quinque, cum quibus et

Sacchari albi libris decem

fiat in balneo aquae syrupus. Exprime fortiter, quod in cucurbita remanet.

Liquori prodeunti adde

Sacchari albi libras decem.

Clarifica, coque lente ad syrupi consistantiam et post refrigerationem syrupum cum praecedente commisce. (An. Bel.)

Sw. loco mixturae alcoholis et aquae

Vini albi libras decem praescribit et liquori expresso residui addere jubet

Aquae libras decem et viginti Sacchari, ut syrupus secundus obtineatur.

℞. Succi non depurati Cochleariae,

— — — Beccabungae,

— — — Nasturtii,

— — — Radicis Armoraciae, singulorum uncias duodecim.

Succi non depurati Pomorum Aurantiorum amarorum uncias viginti.

Corticum recentium Fructuum Aurantiorum amarorum unciam unam.

Digere frigide in vase tecto, subinde agitando, per horas circiter duodecim, filtra et liquori adde

Sacchari albi duplum.

Post solutionem adde denuo

Spiritus Cochleariae,
Aquae Cinnamomi,
singulorum unciam unam.

Post subsidentiam decantha. (Sp.)

Syrupus purificans amarum. (Ca.)

℞. Vini albi libras sedecim.

Foliorum Cochleariae libras tres.

— Trifolii,

Radiciis recentis Armoraciae,

singulorum libras duas.

— — Gentianae,

libram unam.

Macera per dies aliquot; tunc recipe

Hujus Vini libram unam.

Sacchari

libram et uncias duodecim.

Liqua blando igne, adde hujus syrupi singulis libris alius syrupi cum Spiritu Cochleariae parati unciam unam.

Infusum Armoraciae. (R.C.)

℞. Armoraciae unciam unam.

Aquae bullientis libram unam.

Post horam unam infusionis cola.

Infusum Armoraciae s. Armoraciae compositum s. Seminum Sinapis s. Raphani. (Am. B. Gen. Lon. LonN. Wür. C.)

℞. Radiciis Armoraciae,

Seminum Sinapis,

singulorum unciam unam.

Aquae bullientis octarium unum.

Macera per duas horas in vase leviter tecto et adde

Spiritus Cochleariae compositi

unciam unam.

Misce bene. (B*. Lon. LonN.)

Am. et C. eandem formulam sed spiritum cochleariae omittentes.

℞. Radiciis Armoraciae,

Seminum Sinapis,

Conservae Cochleariae,

singulorum unciam unam.

Aquae bullientis libras duas.

Infunde per horas viginti quatuor in vase tecto et cola. (B*. Wür.)

℞. Radiciis Armoraciae,

Seminum Sinapis,

singulorum unciam unam.

Camellae albae drachmas tres.

Aquae bullientis sesquilibram.
Infunde per duas horas et colaturae adde

Aquae Anisi uncias duas.
Misce. (Gen.)

Keitend, bei Escorbut, Eähmung, Wasserflechten und Bechselfiebern empfohlen. — Gabe, eine bis drei Unzen.

Syrupus Armoraciae s. Raphani rusticani. (B*. Ful. Li. Suec. Wir. Fi.)

℞. Succi Armoraciae recenter expressi quantum vis.

Sacchari albi quantum sufficit ut fiat syrupus. (Suec.)

Ful. et Li. Succi et Sacchari, singulorum partes aequales.

℞. Radiciis Raphani sativi rasae,
Aquae, singulorum partes aequales.

Contere bene, exprime succum et partibus novem hujus adde

Sacchari albi partes septem.

Liqua in vase clauso. (Vm.)

Cullen infuso e drachma una Radiciis Armoraciae rasae in Aquae fervidae uncias duabus colaturae addere jubebat

Sacchari duplum. (B*); — *Fi. Armoraciae* uncias duas cum Aquae bullientis octo per horas quatuor infundere

et addere Sacchari albi libram unam.

Gabe, von einer bis zu drei Drachmen.

Infusum paralyticum s. ad paralyisin.

(Sa. Sw.)

℞. Radiciis Armoraciae,

Seminum Sinapis,

singulorum sesquiunciam.

Aquae bullientis libras duas.

Macera per horas duas et colaturae adde

Alcoholis uncias duas.

Misce. — Keitend, bei Eähmung gepriesen. — Gabe, vier Unzen, zwei Mal täglich.

Infusum antihydropicum s. ad hydropicos. (Sa. Sw.)

℞. Infusi amari,

— ad paralyisin,

singulorum libram unam.

Misce. — Gabe, vier Unzen täglich zwei Mal.

Decoctum s. Apozema antiscorbuticum.

(Gal. Bo. Ca. Sp.)

℞. Radiciis Armoraciae uncias duas.

Aquae uncias octoginta.

Coque per horae quadrantem et adde

Herbae Beccabungae,

— Nasturtii,

— Cochleariae,

— Acetosae

singulorum manipulos duos.

Coque parumper, cola et adde

Aceti uncia quatuor.
 Miscæ bene. (Sp.)
 R. Radicis Raphani,
 — Parellae,
 — Trifolii,
 singularium semunciam.
 Nasturtii aquatici,
 Cochleariae,
 Beccabungae,
 singularium pugillum unum.
 Aquae quantum sufficit
 ut decocti vitra tria obtineantur. Co-
 laturae adde
 Syrupi antiscorbutici Portali abs-
 que Sublimato unciam unam.
 Miscæ. (Bo.)
 R. Radicis Patientiae,
 — Bardanae,
 singularium unciam unam.
 Aquae libras quatuor.
 Coque per viginti sexagesimas et
 adde
 Radicis Armoraciae unciam unam.
 Foliorum Cochleariae,
 — Trifolii,
 — Nasturtii,
 singularium Ranzhas sex.
 Post sexagesimas decem infusionis
 cola. (Gal. Ca.)
 Bei hartnäckigen Flechten, Scabur und
 Krankheiten, welche im lymphatischen Sy-
 stem ihren Sitz haben, empfohlen. — Gabe,
 täglich mehrere Gläser.
 Apozema diureticum. (Pie. Sm.)
 R. Radicis Armoraciae
 drachmas duas ad quatuor.
 Baccarum Juniperi contusorum
 pugillum dimidium.
 Marrubii albi pugillum magnum.
 Aquae bullentis vitra tria magna.
 Stent in infusione inter cineres cali-
 das per horam et post refrigerationem
 colentur.
 Auf drei Mal, Morgens nüchtern; zu
 jeder Gabe setzt man einen Eßlöffel einer
 Mischung von vier Unzen Syrupus scilli-
 ticus mit vier Unzen Syrupus Polygalae
 Virginicae cum Vino albo paratus.

R a t a n h i a .

Krameria triandra, Ruiz et Pav, drei-
 männige Kramerie; Ratanhia (Gal.); Raiz
 para los dientes (His.).

B. Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. HassP.
 His. Sax. C. Fi. Par.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Poly-
 galeae, J.) Eine Südamerikanische Pflanz-
 je. (Fl. Peruv. t. I. p. 61. Ic. 93. 94.
 Berl. Jahrb. XI. t. I. Hayne VIII. t.
 13.)

Man wendet die Wurzel (radix Ratan-

hiae s. Ratanhiae s. Ratanhae) an; sie
 ist holzig, hart und rundlich und besteht
 aus einer dicken Rinde mit etwas unregelmäßiger
 Oberfläche, von schwärzlichrother
 Farbe und bitterem abstringirendem Ge-
 schmack und einem sehr derben, weißlichen
 oder schwach gelblichen, geruch- und ge-
 schmacklosen Holze.

Desfrier hat eine eigenthümliche Säure
 (Acidum kramericum) darin entdeckt.

Bor4. HassP. haben das Extractum
 Ratanhae venale.

Sie darf nicht mit Gallerte, Eisensalzen
 und Mineralsäuren verbunden werden.

Ein sehr kräftig abstringirendes Mittel,
 welches bei alten Schleimflüssen und sogenan-
 nten passiven Blutflüssen häufig ge-
 braucht wird.

Extractum Ratanhiae. (B. Bor4. Fer.
 Gal. HassP. His. Sax. Fi. T. Vin.)

R. Corticis Ratanhiae partem unam.
 Aquae purae partes octo.

Maccera per horas viginti quatuor,
 tunc coque per horae quadrantem et
 cola fortiter exprimendo; residuum
 coquatur cum Aquae partibus quatuor,
 liquores commixti post horas viginti
 quatuor sepositionis ad aptam consisten-
 tiam evaporent. (B. Fer. Sax.)

Bor4. Ratanhiae libram unam cum
 Aquae sedecim et residuum cum eadem
 Aquae quantitate utrumque ad
 dimidium decoquere, decoctionem quo-
 ties opus fuerit, repetere et liquores com-
 mixtis, subsidendo et decanthando de-
 puratos ad librarum quatuor remanen-
 tiam et balneo vaporis ope ad extracti
 absinthii spissitudinem consumere; —
 HassP. ut extractum Colombo, Ligni
 campechiensis etc.

R. Corticis Ratanhiae pulverati
 libram unam.

Aquae libras duodecim.
 Infunde per dies duos in balneo aquae
 vel levis caloris ope, saepius agitando;
 infusionem repete cum nova Aqua, donec
 nullum amplius accipiat saporem; liquores
 commixti et filtrati primum ignis ope,
 deinde in balneo aquae ad siccum evaporent.
 (His.)

Fi. Ratanhiae uncias quatuor cum
 Aquae communis libris quatuor calide
 per horas tres infundere, fortiter ex-
 primendo colare, decanthare liquidum
 et cum albumine clarificatum in balneo
 aquae ad extracti consistentiam
 consumere.

R. Corticis Ratanhiae pulverati
 quantum vis.

Abunde cum Aqua humectatum mac-
 cera per horas viginti quatuor, adde
 deinde Aquae frigidae pondus massae

toti aequale, coque per sexagesimas quindecim vel viginti, liquorem bullientem per pannum laneum (Flanell) cola, residuo infunde Aquae bullientis pondus duplum, coque denuo per horae quadrantem. cola et colaturas mixtas, postquam per momentum subsederunt, decantha et continue coquendo consume. (Vm.)

℞. Tincturae Ratanhiae alcoholicae bene saturatae . . . quantum vis.

Destillet quarta pars in balneo aquae, residuum leni calore ad extracti sicci consistentiam evaporet. (Gal.)

☞ *Abstrahung* Gran bis eine halbe Unze.

T. Extractum siccum cum Radice et Alchhole diluto solo vel etiam cum Aqua et deinde cum Alchhole parare jubet. — Radicis libras tres cum Aquae sufficiente quantitate decoquere novam Aquam addendo pro evaporata etc. et inspissare balnei vaporis vel solis ope ad siccum.

Decoctum Radicis Ratanhiae. (B*.Fer.Fi.)

℞. Radicis Ratanhiae . . . semunciam. Aquae fontanae . . . libras duas.

Coquendo ad colaturae semilbrae remanentiam consume. (B*.)

Fer. Fi. eandem formulam sed colaturae addere jubent Aceti drachmas duas et quatuor Sacchari.

Abstrahung. — Gabe, von einem Eßfel bis zu einem halben Glase.

Tinctura Ratanhiae aquosa. (Fer.)

℞. Extracti sicci Ratanhiae drachmas quinque.

Herbae Lepidii . . . unciis quatuor cum dimidia.

Aquae . . . unciis novem.

Macerare per dies tres et cola.

Tinctura Ratanhiae acetosa s. cum Aceto. (Fer.)

℞. Extracti sicci Ratanhiae drachmam unam.

Sulphatis Sodae . . . unciam unam.

Aquae . . . unciis sex.

Solutioni adde Aceti . . . drachmam unam.

Tinctura Ratanhiae, Alcohol cum Ratanhia acetatus. (B*.Fer.HassP.Fi.T.Vm.)

℞. Corticis Radicis Ratanhiae pulverati . . . unciis tres.

Alcoholis . . . libras duas.

Post septem dies digestionis, blando calore, cola. (B*.)

Vm. Ratanhia partem unam et sex Aquae Vitae; — HassP. Spiritum Vini rectificatum, caeterum ut Vm.

℞. Extracti Ratanhiae drachmas quatuor.

Alcoholis (24°) unciis quatuor. Aceti destillati . . . unciis octo.

Digere per tres dies et filtra. (Fer. Fi. T.)

Abstrahung. — Gabe, breisig bis achtzig Tropfen.

Tinctura Ratanhiae composita. (B*.Fer.)

℞. Radicis Ratanhiae pulveratae unciis tres.

Corticis Aurantiorum unciis duas. Serpentariae Virginicae . . . semunciam.

Croci . . . drachmam unam. Alcoholis . . . libras duas.

Digere per dies duodecim et cola. — Abstrahung. — Gabe, sechzig bis achtzig Tropfen.

Tinctura Ratanhiae saccharata. (Bor4.)

℞. Radicis Ratanhiae unciis quatuor. Sacchari tosti . . . unciis duas.

Aquae destillatae unciis quatuor. Spiritus Vini Gallici . . . unciis sedecim.

Digere per aliquot dies, exprime et filtra.

Gargarisma adstringens. (Fer.)

℞. Extracti Ratanhiae drachmas quatuor.

Aquae . . . unciis viginti. Solutioni adde Aceti . . . unciis quatuor.

Unguentum adstringens. (Fer.)

℞. Extracti Ratanhiae, Olibani, . . . unciis quatuor.

Galbani . . . unciis duas. Unguenti defensivi rubri . . . unciis sex.

Terebinthinae unciis duas cum dimidia.

Olei Olivarum . . . unciis duas. Auf Brüche anzuwenden.

Pilulae adstringentes. (Fer.)

℞. Extracti Ratanhiae drachmam unam.

Aquae . . . quantum sufficit ad molle reddendum. Fiant pilulae decem ad duodecim.

Electuarium adstringens. (Fer.)

℞. Pulveris Ratanhiae unciam unam. — Zingiberis drachmam unam.

Syrupi Corticis Aurantiorum quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll, bei Fiebern und Anfällen von Epilepsie.

Boli adstringentes. (Ca.)

℞. Pulveris Extracti Ratanhiae sesquiscrupulum.

Pulveris Aluminis grana decem.
 Conservae Cynorrhodi drachmam unam.
 Syrupi adstringentis quantum sufficit.
 Fiant boli viginti. — Sabe, zwei
 Stück alle drei oder vier Stunden.

Potio adstringens. (Fer. B. Ca. Ra.)
 R. Extracti Ratanhiaae drachmam unam.
 Aquae Rosarum uncias quatuor.
 Syrupi Chinae . unciam unam.
 Misce. (Ra.)

R. Extracti Ratanhiaae semidrachmam.
 Aluminis . . . grana decem.
 Infusi Rosarum uncias quinque.
 Syrupi Rosarum,
 — Catechu,
 singulorum unciam unam.
 Aquae Rabelii guttas quindecim.
 Misce. (Ca.)

R. Tincturae Ratanhiaae compositae,
 Pulveris Ratanhiaae,
 singulorum drachmas sex.
 Aquae uncias sex.
 Misce. (Fer.)

R. Infusi Rosarum unciam unam.
 Acidi sulphurici Aqua diluti
 guttas quadraginta.
 Extracti Ratanhiaae drachmas duas.
 Syrupi Mororum drachmas sex.
 Misce. (B.)

Esselweise. — Der erste Kranke wird
 besonders bei Mutterblutfluss, der vorliegt
 bei Fiebern und Anfällen von Epilepsie em-
 pfohlen.

Resina elastica.

Resina Cayennensis, Gummi elasticum,
 Cahuchu; Caoutchouc, Kaoutsof, Federharz,
 elastisches Harz; Caoutchouc, Gomme
 elastique, Résine elastique, Résine de
 Cayenne (Gal.); Elastick harpix (D.);
 Kautschuk (Succ.).

D. Fer. Gal. Sax. Suec. Wir. Be. Br. G.
 M. Pid. Sp.

In dicken, leberartigen, dichten, stark fe-
 dernden, braunen oder rothbraunen, geruch-
 und geschmacklosen Stücken.

Diese Substanz, welche sich von den ei-
 gentlichen Harzen dadurch unterscheidet,
 daß Jodt einen ihrer Bestandtheile bildet,
 ist in vielen Pflanzen und Pflanzenproduc-
 ten vorhanden; besonders aber liefert es
 der coagulierte Saft von Siphonia Cahu-
 chu, Schreb., einem Baume (Monoecia
 Monadelphica, L.; Euphorbiaceae, J.)
 Brasiliens und Guianas. (Fl. méd. II.
 93. Lam. III. t. 790. Plenck t. 692.
 Berl. Jahrb. VIII.)

Emplastrum e Resina elastica. (Ca. Sw.)
 R. Resinae elasticae uncias quatuor.

Essentiae Terebinthinae libram unam.

Digere, modico calore, per dies sep-
 tem, in vase clauso, tunc blando igne
 coque; post subsidentiam decantha et
 adde

Olei Olivarum,
 Ceræ albae,
 singulorum uncias duas.
 Coque lente ad evaporationem essen-
 tiaae usque et massam refrigeratam ser-
 va. — Zur Bereitung von Pflaster-
 streifen.

Rhamnus.

In den Pharmacopöen kommen zwei Ar-
 ten dieser Gattung in Erwähnung:

1) *Rhamnus Frangula*, L.; Faulbaum;
 Bourgène (Gal.); Blackaldertree (Ang.);
 Taerstræe (D.); Arraclan (His.); Vuil-
 boom (Bel.); Frangula (I.); Kruszyna
 (Pol.); Frangulina (Lus.); Brakvoed
 (Succ.).

Gal. GalM. Gen. Wir. Wür. Be. M.
 Sa. Sp.

Ein Strauch (Pentandria Monogynia,
 L.; Rhamnaceae, J.) des nördlichen Euro-
 pas. (Hayne V. t. 44. Düss. off. Pfl. VI.
 t. 21. Nouv. Duh. III. t. 15.)

Man wendet die Rinde (cortex Fran-
 gulae s. Alni nigrae bacciferae) an,
 welche dunkelgrün und weispunctirt ist.
 Unter der Oberhaut ist sie gelb und nach
 dem Trockenwerden braunroth. Sie hat
 keinen Geruch, aber einen etwas bitteren
 Geschmack.

Sie wirkt laxirend. — Die Beeren be-
 sitzen dieselbe Eigenschaft.

2) *Rhamnus catharticus*, L.; gemei-
 ner Kreuzdorn, Färberbeere; Nerprun pur-
 gatif (Gal.); Purging buckthorn (Ang.);
 Psy gahody, Rzeszellak (S.); Korsbaer,
 Vrietorn (D.); Ramno cartartico (His.);
 Purgeerende wegedoorn (Bel.); Spino
 cervino (I.); Szaklak kzewia (Pol.);
 Espinha cervina (Lus.); Getappel, Saff-
 graent (Succ.).

A. Am. Anis. An. Bel. Bor4. Br. D.
 Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han.
 His. Li. Lon. LonN. Lus. Sax. Suec.
 Wir. Bo. C. G. M. Sa. Sp. Z.

Ein Strauch, welcher in ganz Europa
 wächst. (Blackw. t. 135. Plenck t. 140.
 Hayne V. t. 43. Düss. off. Pfl. III. t.
 10. Nouv. Duh. III. t. 10.)

Man wendet die Früchte (baccæ Rham-
 ni s. Spinae cervinae s. domesticæ) an;
 es sind erbsengroße, runde, glänzende, schwarz-
 liche Beeren mit vier Saamen in der Mitte
 eines saftigen Fleisches. Sie haben einen
 unangenehmen Geruch und einen bitteren,
 widerlichen, scharfen Geschmack.

Sie enthalten, nach Vogel, einen ei-

genthämlichen, färbenden Stoff, Rhamnin (Rhamnium).

Ein sehr kräftiges Purgirmittel, welches man bei Wassersucht sehr gerühmt hat.

Succus Rhamni cathartici s. Spinae cervinae s. Baccarum Spinae cervinae. (Gal. Sar. T.)

℞. Baccarum Spinae cervinae maturarum . . . quantum vis.

Contere inter manus, seminibus pariendo; massam per tres vel quatuor dies fermentationi subijce, cola exprimendo et succum in lagena sub strato olei serva.

Gabe, zwei bis vier Drachmen.

Roob Spinae cervinae. (A. Gal. Wür. T.)

℞. Baccarum Spinae cervinae maturarum . . . quantum vis.

Contere, granis parcendo, massam per (duos vel) tres dies sepono, donec fermentationis initium animadvertatur; exprime fortiter, tunc succum per pannum colatum et post tres vel quatuor horas decanthatum blando calore ad extracti consistentiam inspissa. (Gal.)

℞. Succu Baccarum Spinae cervinae . . . libram unam.

Coque ad mellis consistentiam, sub finem uncias duas Sacchari addendo. (Wür.)

A. Sacchari partem unam et novem Succu; — T. Succum balnei aquae vel vaporis ope ad syrupi consistentiam inspissare et cuique librae Sacchari uncias tres addendo, ad mellis consistentiam consumere.

Gabe, von einem Escrupel bis anderthalb Drachmen.

Syrupus Rhamni s. Rhamni cathartici s. domesticus s. de Spina cervina. (Am. Ams. An. Bel. Bor4. Br. Gal. GalM. Gen. Han. Li. Lon. LonN. Lus. Pal. Sar. Wir. Wür. C. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Succu clarificati Baccarum Spinae cervinae,

Sacchari albi, . . . singulorum partes aequales.

Fiat lento igne syrupus. (Gal. T.)

Am. An. Lus. et C. Succu partes quatuor et duas Sacchari; — Wür. Succu sex et quatuor Sacchari; — Ams. et Bel. Succu uncias sedecim et Sacchari libras duas cum dimidia; — GalM. Succu partes tres et quatuor Sacchari; — Sw. Succu libras septem cum dimidia et Sacchari libras tres cum dimidia; — Gen. Succu libras sex et Sacchari tres; — Li. Succu partem unam et Sacchari unam cum dimidia; — Bor4. Succu uncias viginti, Sacchari libras tres.

Sw. si necesse est, addere jubet Tincturae Piperis Jamaicaensis alcoholicae libram unam.

℞. Succu Baccarum Spinae cervinae depurati . . . octarium unum.

Zingiberis concisae,
Pimentae pulveratae,
singulorum semunciam.

Macera blando calore per horas quatuor et filtra; tunc Succu depurati octarios alios tres coquendo ad dimidium consume, liquores commisce et adde

Sacchari libras tres cum dimidia. Fiat syrupus. (Lon. LonN. T.)

℞. Baccarum Spinae cervinae maturarum . . . libras sedecim.

Exprime succum, redimento Aquae bullientis tantum ut obtegatur infunde, macera per horas viginti quatuor et cola exprimendo; liquorem cum succo commisce et adde

Sacchari albi . . . libras octo.

Clarifica albuminis ope et ad syrupi consistentiam usque consume, cui refrigerato adde

Olei Cinnamomi,
— Caryophyllorum,
— Macidis, singulorum cum Saccharo tritorum scrupulum unum.

Misce bene. (Vm.)

℞. Succu depurati Spinae cervinae . . . uncias viginti.

Sacchari albi uncias triginta duas.

Coque ad consistentiam requisitam et sub finem adde in nodulo inclusa

Anisi,
Mastichis,
singulorum drachmas tres.

Zingiberis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,

singulorum sesquidrachmam.

Serva. (Br. Han; Wir. Sp.)

Pal. Succu libram unam, Sacchari duas et Aromatum, singulorum drachmam unam; — Sar. Succu et Sacchari, singulorum partes aequales, Anisi et Mastichis, singulorum drachmas duas et Zingiberis, Cinnamomi et Caryophyllorum, singulorum drachmam unam.

Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Potio purgans. (ParC.)

℞. Decocti Prunorum . . . uncias quatuor.

Syrupi Spinae cervinae . . . unciam unam.

Misce.

R h a p o n t i c u m .

Rheum Rhaponticum, L.; Pontischer Rhabarber; Rhapontic (Gal.); Pontic

rhubarb (*Ang.*); Reupontykum, Zemez-luc wetsj (*B.*); Rapontico (*His. Lus.*); Rhapontic (*Bel.*); Rapontico, Rheaturco Rabarbaro dei Monaci (*I.*)

Br. Fer. GalM. His. Wir. Wür. *Be. Br. Fl. G. M. Sp. Z.*

4) (*Enneandria Trigynia*, L.; *Polygonaceae*, J.) Eine im südlichen Rußland einheimische, in südlichen Ländern Europa's gebaute Pflanze. (*Fl. méd. VI. 296.*)

Man wendet die Wurzel (*radix Rhapontici veri s. Rhabarbari Rhapontici*) an; sie kommt unter zwei verschiedenen Formen vor; die eine der Varietäten ist faulsdick oder minder, von holzigem Ansehen, äußerlich röthlichgrau, auf dem Querschnitte roth und weiß marmorirt, in sehr dichten, strahlig von der Mitte nach dem Umkreise laufenden Streifen; sie hat einen sehr abstringirenden und schleimigen Geschmack, kracht nicht unter den Zähnen und färbt den Speichel gelb; der Geschmack ist dem der Rhabarber ähnlich, aber unangenehmer; das Pulver ist gelb mit röthlichem Anstrich. Die andre ist drei oder vier Zoll lang, zwei oder drei dick, von weniger holzigem Ansehen, reiner blaßgelb oder weniger röthlich; der Bruch strahlig, der Geschmack abstringirend und schleimig, der Geruch dem der Rhabarber ähnlich, auch sie kracht nicht unter den Zähnen.

Sie enthält nach Henry weit mehr Sagmehl und weniger Keesauren Kalt als die Rhabarber, aber mehr rothfärbenden Stoff. Hornemann hat darin eine eigenthümliche Substanz, das *Rhaponticin* (*Rhaponticinum*) gefunden.

Tomisch, larierend.

Extractum Rhapontici. (*GalM.*)

R. Radicis Rhapontici siccatae partem unam.

Aquae frigidae partes quatuor.
Infunde per horas viginti quatuor, cola deinde, leviter exprimendo, infunde residuum

Aquae frigidae partibus duabus
et cola. Liquores commixti in balneo aquae ad extracti consistentiam evaporantur.

R h e u m .

Rhabarbarum; Rhabarber; Rhubarbe (*Gal.*); Rhubarb (*Ang.*); Rhabarber (*Bel. D. Succ.*); Rawend (*Ar.*); Rabarbara (*B.*); Tay huam, Hay-hoang (*C.*); Ta-hoam (*Co.*); Rewund chini (*Duk.*); Ruiharbo (*His. Lus.*); Reywan ch nie (*Hin.*); Rabarbaro (*I.*); Schara modo (*Ma.*); Réyward (*Pe.*); Korzen rabarbarowy (*Pol.*); Variatu kalung (*Tam.*); Dschum-za (*Th.*).

Die Pharmacopöen bezeichnen mit diesem

Namen vorzüglich folgende beide Substanzen:

A. *Rheum s. Rhabarbarum officinale.*
A. Am. Ams. An. B. Ea. Bel. Bor. BorC. Borå. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.

Man unterscheidet mehrere Arten derselben:

1) *Rhabarbarum s. Rheum verum s. Indicum s. Sinense s. Chinense s. Danicum*; Indische, Chinesische, Dänische Rhabarber; Rhubarbe de Chine ou des Indes (*Gal.*), in rundlichen, außen schmutzig gelben Stücken von einem berben Gewebe, ziegelrother Marmorzeichnung, matt ziegelrother Farbe und bitterem Geschmack. Sie kracht unter den Zähnen und färbt den Speichel orangegeb. Das Pulver hat eine zwischen Gelb und Orangegeb die Mitte haltende Färbung. Sie kommt aus China über Canton zur See.

2) *Rhabarbarum Tataricum s. Moscoviticum s. Russicum*; Russische, Tatarische Rhabarber; Rhubarbe de Moscovie, de Tartarie ou de Bucharie (*Gal.*), in etwas platten, unregelmäßigen, eckigen, großblättrigen, außen rein gelben Stücken, von minderer Dichtigkeit als die vorige mit rothen und weißen, sehr deutlichen und sehr unregelmäßigen Aern durchzogen. Sie hat einen sehr merkwürdigen Geruch und einen bitteren, abstringirenden Geschmack. Sie färbt den Speichel stark safrangelb und kracht unter den Zähnen. Das Pulver ist reiner gelb als das der vorigen. Diese wird am meisten geschätzt, obgleich die Chinesische, wenn sie von guter Beschaffenheit ist ebenfalls gesucht wird. Sie kommt ebenfalls aus China, aber aus Kiachta durch Sibirien.

Nach Guibourt kommen beide Spielarten von Rheum palmatum, L. (*Blackw. t. 600 Plenck. t. 322 Fl. méd. VI. 297. Bert. Bild. I. 73.*), welche in der Gegend von Kian-Sin und Chan-Sin in der Chinesischen Tartarei wächst. Pflaff verwirft diesen Ursprung zwar nicht, zieht ihn aber in Zweifel.

Man findet im Handel noch eine andre Sorte:

3) *Rhabarbarum Britannicum s. Gallicum s. nostras*; Europäische Rhabarber; Rhubarbe d'Europe (*Gal.*), welche von Rheum undulatum, compactum und selbst palmatum kommt, welche Pflanzen in verschiedenen Gegenden Europa's, in Deutschland, Frankreich und England gebaut werden. Diese unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden sowohl in phy-

flücker als chemischer Hinstich und zeigt im Allgemeinen, einige geringe Verschiedenheiten abgerechnet, die Merkmale der zweiten Varietät des Rhabarbers.

Die Morgenländische Rhabarber enthält, nach Penn, einen eigenthümlichen färbenden Stoff, das Rhabarbarin (Rhabarbarinum); Rhabarbarine oder Capnopicrite, ein fettes Oel, sauern, äpfelsauren Kalk, Schleimharz; Sagoehel, kesssauren Kalk, welcher den dritten Theil des Gewichtes beträgt zc. Letzteres Salz bewirkt, daß sie unter den Zähnen fracht. Hornemann betrachtet das Rhabarbarin als einen unreinen Stoff; er schreibt der Rhabarber einen andern eigenthümlichen Stoff, das Rheumin (Rheuminium); Rheuminie (Gal.), zu, welcher mit den Säuren verwandt, aber demungeachtet von der Rhabarbersäure (Acidum rheumaticum), Acide rheumique (Gal.), welche Pen-der-son annimmt; deren Existenz aber nicht erwiesen ist, sich sehr unterscheidet. Auch hat man darin einen zuckerartigen Stoff erkannt, dessen Vorhandenseyn auch durch Weisner bestätigt wird.

B. Rheum s. Rhabarbarum spurium; Mönchs- oder Alpenampfer; Rhabarber des moines, fausse Rhabarber (Gal.); Bastard monks rhabarber (Ang.); Skrepp (D.); Romaza (His.); Spitzbladdige pättich, (Bel.); Romice (I.); Szazaw kobyli (Pol.); Babaca menor (Lus.); Haestysrae (Succ.).

Bel. Br. Gal. M. Sp.

Dies ist die Wurzel von Rumex alpinus, L. ♀ oder ♂ (Hexandria Trigynia, L.); Polygonaceae, J.), einer auf den Alpen wachsenden Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 261.)

Diese Wurzel (radix Hippolapathi s. Rhabarbari monachorum) ist sehr dick, holzig, faserig, außen roth, innen gelb. Sie hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern, herben und widerlichen Geschmack.

Die Rhabarber ist tonisch oder purgirend, je nach der Gabe; tonisch zu fünf bis zehn, purgirend zu achtzehn bis vier und zwanzig und mehr Gran.

§. I. Präparate, welche die Rhabarber in Substanz enthalten.

Rhabarbarum tostum (His. Pal. Sar. Fi.)

R. Rhei pulverati . . . quantum vis. In pelvim ferream amplam et planam immissum ignis moderati calori exponere, continue cum spathula agitando, donec colorem fuscum acquisiverit; tunc refrigeratum serva.

Species Diatribith cum Rhabarbaro. (Pal. Wir. Vm.)

R. Radicis Rhei, Turbith, singulorum uncias duas. Hermodactylorum unciam unam. Diagyridi (sulphurati cum semibus Tiglii triti), Cremoris Tartari, Seminum Violarum, singulorum semunciam.

Fiat pulvis, cui adde Olei Cinnamomi guttas decem. Serva. (Pal. Wir.)

R. Cinnamomi . . . partem unam. Zingiberis, Seminum Anisi, singulorum partes tres.

Scammonii . . . partes quatuor. Hermodactylorum, Radicis Turbith, singulorum partes octo. — Rhei . . . partes decem.

Fiat pulvis. (Vm.) Purgirend, wurmtreibend. — Gabe, einen bis zwei Scrupel.

Pulvis absorbens. (E.)

R. Chelaram Cancrorum praeparatum . . . drachmam unam. Rhei . . . scrupulos duos. Divide in partes quatuor. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich.

Pulvis excitans. (E.)

R. Rhei, Ipecacuanhae, singulorum drachmam unam. Mit Erfolg auf schmerzlose Geschwüre angewendet.

Pulvis Rhei cum Tartaro s. Tritate Potassae, Pulvis catharticus s. Rhei, compositus s. lenitivus s. lenitivus tartarisatus. (DD. Ful. Han. Sm. Sy.)

R. Rhei, Cremoris Tartari, singulorum semunciam. Fiat pulvis. (DD.) — Gabe, ein Scrupel

Sy. Rhei, grana viginti et Tartari decem pro dosi; — Sm. Rhei et Tartari solubilis, singulorum partes aequales.

R. Pulveris Rhei, Cremoris Tartari, Corticis Aurantiorum, singulorum unciam unam.

Misce. (Han.) Ful. Rhei drachmas duas, Tartari tartarisati semunciam et Corticis Aurantiorum scrupulos quatuor.

Gabe, von einer halben bis zu ganzen Drachme.

Pulvis Rhei compositus s. Rhei et

Sulphatis Potassae s. antihæcticus s. purgans. (BorC. Sa. Sp.)

℞. Rhei grana sex.
Sulphatis Potassae grana duodecim.
Fiat pulvis. (Sp.)

BorC. Rhei partem unam et tres Sulphatis.

℞. Rhei semidrachmam.
Sulphatis Potassae grana decem.
Scammonei grana octo.
Olei essentialis Foeniculi
guttam unam.

Fiat pulvis. (Sa.)

Pulvis puerorum epilepticus cum Rheo s. catharticus absorbens s. laxans s. infantum cum Rheo s. Magnesiae compositus s. Rhei salinus s. Rhei cum Magnesiae s. digestivus s. e Rheo. (B*. Br. D. DD. Fer. Gen. Li. Suec. & Sa. Sw.)

℞. Rhei partem unam.
Magnesiae albae partes tres.

Fiat pulvis. (Sa. Sw.)

Suec. Rhei et Magnesiae, singulorum partes aequales; — Gen. Rhei partem unam et quatuor Magnesiae; — Fer. Rhei unam et octo Subcarbonatis Magnesiae.

℞. Rhei scrupulum unum.
Magnesiae calcinatae

semidrachmam.
Olei Cinnamomi guttam unam.

In Syrup zu nehmen. (E.)

℞. Rhei semunciam.
Magnesiae albae,
Foeniculi,

Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. (Suec.)

Br. Rhei unciam unam, Magnesiae tantidem, Foeniculi drachmas duas et Sacchari semunciam.

℞. Rhei,
Magnesiae albae,
Elaeosacchari Foeniculi,

singulorum partes aequales.

Fiat pulvis. (D. DD.) — Gabe, ein Scrupel.

℞. Rhei semunciam.
Visci querni,

Radici Liquiritiae,
singulorum drachmas sex.

Magnesiae albae
uncias duas cum dimidia.

Fiat pulvis. (B*. Li.) — Gabe, ein Scrupel bis halbe Drachme.

Pulvis ad tormina infantum s. Rhei saponaceus. (Au. Sp.)

℞. Rhei semidrachmam.
Saponis officinalis drachmam unam.
Oculorum Cancrorum semunciam.

Anisi,
Cumini,

singulorum scrupulum unum.

Croci grana quatuor.

Sacchari albi drachmas tres.

Misce. (Sp.)

℞. Pulveris Saponis medicinalis
grana decem ad viginti.

— Magnesiae subarboricæ,

— Sacchari,

— Rhei,

singulorum semidrachmam.

Misce. (Au.)

Boli e Rheo. (GalM. Sa. Sw.)

℞. Rhei pulverati semidrachmam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Misce. (Sa. Sw.) — Adduntur si necesse est, Mercurii dulcis grana quinque vel Jalapae grana decem.

℞. Rhei pulverati partem unam.

Sulphatis Sodae partes duas.

Fiat cum Aquae pauxillo bolus.

(GalM.)

Bolus ad diarrhoeam s. e Rheo sedativus s. adstringens. (Sa. Sw.)

℞. Rhei grana quindecim.

Diascordii semidrachmam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiat bolus. (Sa.)

℞. Rhei grana duodecim.

Pulveris aromatici : grana tria.

Tincturae sedativae guttas viginti.

Syrupi Corticum Aurantium

quantum sufficit.

Misce. (Sw.)

Boll resolventes et purgantes. (B.)

℞. Rhei drachmam unam.

Saponis Veneti sesquidrachmam.

Roob Sambuci quantum sufficit

ut fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Pilulae Rhei. (Li. RC. Sa.)

℞. Rhei pulverati quantum vis.

Infusi Rhei quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum duorum. —

Gabe, fünf bis funfzehn Stück.

℞. Pulveris Rhei semunciam,

Aloës drachmas tres.

Myrrhae drachmas duas.

Olei Menthae guttas quindecim.

Syrupi Zingiberis quantum satis

ut fiat massa. — Gabe, funfzehn bis funfzehn Stück.

Grän, täglich zweimal, mit lauwarmen Wasser oder Chamillenthee, bei Verdauungsbeschwerden etc. Sind den pilulae Aloës compositae sehr ähnlich. (RC.)

Pilulae resolventes s. resolventes cum Rheo s. e Rheo cum Nitro acético s. ephracticæ. (BorC. Li. WW. & Sw.)

℞. Pulveris Rhei,

- Acetatis Sodae,
Fellis Tauri inspissati,
singulorum drachmas duas.
Gummi Arabici semidrachmam.
Fiant pilulae granorum duorum.
(BorC. WW.)
℞. Rhei pulverati sesquidrachmam.
Saponis Veneti drachmas quatuor.
Essentiae Terebinthinae
quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quinque.
(Sm.)
℞. Fellis Tauri inspissati,
Gummi Ammoniaci pulverati,
Rhei pulverati,
singulorum unciam unam.
Fiant pilulae granorum duorum. (Li.)
℞. Rhei . . . drachmam unam.
Saponis albi . . . grana decem.
Aquaes . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe,
vier Stük auf einmal. (E.)
℞. Rhei . . . sesquidrachmam.
Sulphatis Ferri semidrachmam.
Saponis albi . . . scrupulos duos.
Aquaes . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quadraginta. (E.)
Pilulae amarac. (Vm.)
℞. Extracti Gentianae,
Saponis albi,
singulorum partem unam.
Rhei partem unam cum dimidia.
Tere in mortario ut fiat massa pilu-
laris.
*Pilulae rhabarbarinae antacidae s. ab-
sorbentes. (Sw.)*
℞. Rhei,
Magnesia calcinatae,
singulorum drachmas duas.
Extracti Gentianae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quinque.
*Pilulae roborantes ad blennorrhoeam s.
stimulantes. (Sa. Sy.)*
℞. Rhei pulverati drachmam unam.
Terebinthinae coctae
drachmas duas.
Fiant pilulae triginta sex. (Sa.)
℞. Rhei,
Gummi Arabici,
singulorum unciam unam.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (Sy.)
Electuarium stomachicum. (Sw.)
℞. Rhei pulverati sesquidrachmam.
Pulveris Ari,
— aromatici,
singulorum drachmam unam.
Oxydi Ferri nigri scrupulum unum.
Conservae Corticis Aurantiorum
uncias duas.

Pharmacopoea universalis. II.

Syrupi Corticum Aurantiorum

quantum sufficit.

Gabe, einer Muscatnuß groß, täglich
zwei Mal.*Electuarium ad dysenteriam s. antidy-
sentericum. (Ca.)*

- ℞. Confectionis japonicae uncias duas.
Balsami Locatelli unciam unam.
Rhei pulverati . . . semunciam.
Syrupi Althaeae quantum sufficit.
Gabe, wie bei'm vorigen.

*Conditum purgativum, Pulvicula sapo-
nacea. (Sa. Sm. Sp.)*

- ℞. Sulphatis Potassae
drachmam unam.
Cremoris Tartari . . . semunciam.
Rhei . . . sesquidrachmam.
Pulpae Tamarindorum uncias duas.
Misce. (Sa.) — Gabe, ein Kaffeelöffel
voll.

- ℞. Saponis officinalis semidrachmam.
Aquaes Menthae drachmas tres.
Solutioni adde
Vitelli Ovorum drachmam unam.
Magnesia albae scrupulos duos.
Rhei . . . scrupulum unum.
Syrupi Althaeae,

— Chamomillae,
singulorum drachmas duas.
Misce. (Sp.) — Gegen Kolik bei Kin-
dern empfohlen.

- ℞. Rhei,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas duas.
Pulpae Prunorum . . . uncias octo.
Syrupi Cydoniorum

quantum sufficit.
Misce. (Sm.) — Gabe, vier Kaffeelöf-
fel täglich.

*Passulae anthelminticae s. vermifugae.
(Par)*

- ℞. Passularum minorum semilibram.
Rhei in nodulo inclusi semunciam.
Helminthochortos in nodulo
unciam unam.

Aquaes Portulaccae uncias quatuor.
In furnum immitte, pane exinde re-
moto et vas ibi relinque, donec passu-
lae intumuerint et molles factae sint.

*Tabellae de Rheo s. Diarrhodon cum
Rhabarbaro. (Gal. Sar. Fi.)*

- ℞. Rhei pulverati . . . semunciam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
cum Aqua Cinnamomi paratae
quantum sufficit.

Fiant tabellae granorum duodecim.
(Gal.)

Fi. Rhei pulverati semunciam, Sac-
chari albi pulverati uncias quatuor,
Mucilaginis Tragacanthae cum Aqua

Cinnamemi parati quantum sufficit, ut fiant tabellae no. 192, quarum quaeque rhei sesquigrammum continet.

℞. Pulveris Diarrhodon,
— Rhei,
— Sacchari albi
singulorum sesquiunciam.
libram unam.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant tabellae. (Sar.)

℞. Pulveris Rhei,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmas duas.
Corticis recentis Aurantiorum
semidrachmam.

Sacchari in Aqua Florum Auran-
tiorum dissoluti uncias quatuor.

Fiant tabellae. (Br.)

*Haustus catharticus pro infantibus, Po-
tio purgans. (Pie. Sw.)*

℞. Rhei grana duodecim.
Aquae Cichorii uncias tres.

Syrupi Cichorii unciam unam.
Eßfelweise für ein Kind von neun bis
zehn Jahren. (Pie.)

℞. Rhei grana sex ad octo.
Calcariae subcarbonicae
grana decem.

Aquae purae drachmas tres.
— Cinnamomi drachmas duas.

Syrupi Sacchari drachmam unam.
Wie das vorhergehende zu nehmen. (Sw.)

Potio purgans et vermifuga. (Pie.)

℞. Cinnabaris grana decem.
Resinae Guajaci,
— Jalapae,
singularum grana quinque.

Rhei drachmam unam.
Antimonii diaphoretici
grana quindecim.

Syrupi Cichorii compositi
drachmas sex.

Aquae Cichorii uncias duas.

*Mixtura amara s. amara cum Rheo.
(Sw.)*

℞. Sulphatis Potassae semunciam.
Rhei,
Extracti Gentianae,
singulorum drachmas duas.

Aquae Menthae piperitae
uncias octo.

Eßfelweise zu nehmen.

§. II. Präparate, welche den wirksamen Bestandtheil des Rhabarbers ohne das zu seinem Ausziehen angewendete Weisfel enthalten.

*Extractum Rhei s. Rhabarbari (aquo-
sum). (Ams. Ba. Bor. Bor4. Br D. Fer.*

*Gal. Gen. Han. HassP. His. Li. O. Pal.
Sar. Suec. Wir. Fi. T. Vm.)*

℞. Rhei in frusta minora concisi
quantum vis.

Aquae frigidae quantum sufficit ut paululum obtegatur; post horas viginti quatuor adde Aquae triplum pondus et cola absque expressione; residuo infunde Aquae pondus aequale, cola leviter exprimendo; colaturae commixtae et albuminis ope clarificatae ad extracti spissi consistentiam evaporent. (Vm.)

Ba. macerare jubet binis vicibus, qualibet per horas viginti quatuor, Rhei partem unam in Aquae frigidae quinque.

℞. Rhei electi libram unam.
Aquae fontanae libras sex.

Macera in loco calido per horas quatuor, tunc coque parumper, cola exprimendo et ad consistentiam requisitam consume. (Br. Fer. His. Pal. Wir.)

Fi. Calide infundere jubet Rhei uncias quatuor in Aquae communis libris quatuor et fortiter premendo colare, fluidum decanthare et albuminis ope clarificatum in balneo aquae ad extracti consistentiam consumere; — T.

Rhei libram unam, Aquae ferridae octo, infusionem per horas 24 etc.

℞. Rhei concisi libram unam.
Aquae bullientis libras sedecim.

Digere per horas viginti quatuor, tunc seponere et cola; residuo infunde Aquae bullientis libras octo et post horas viginti quatuor iterum cola, quo facto liquores commixti sufficienter evaporent. (Ams. Sar.)

Bor4. Rhei quantum vis, Aquae ferridae decuplum, seponere per horas 36 et liquorem exprimendo separa; residuum iterum infunde Aquae ferridae quintuplo et post refrigerationem exprime; liquores primo leni igne ad tertiam partem tum in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem evaporent; — HassP. Rhei libram unam, Aquae ferridae sex, macerationem per 24 horas, et residuo infundere Aquae ferridae libras quatuor et ad siccum consumere

℞. Rhei electi partem unam.
Aquae bullientis partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola cum expressione; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et iidem coletur; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti spissitudinem evaporent. (Bor. D. Han. Li. O.)

Suec. ternas vel quatuordecim ebullitiones succedentes, quamlibet cum Aquae partibus tribus instigare jubet.

℞. Rhei libram unam.
 Aquae frigidae . . . libras quatuor.
 Macera per horas viginti quatuor,
 subinde agitando et cola; novā Aquā
 rhei infusā macera itidem et tunc levi
 cum expressione cola; liquores com-
 mixti et iterum colati in balneo aquae
 sufficienter evaporent. (Gal.)

℞. Rhei electi libras duas.
 Aquae frigidae libras duodecim.
 Macera per horas viginti quatuor,
 subinde agitando et cola; residuum
 maceretur in Aquae novae frigidae li-
 bris octo et coletur; liquoribus ambo-
 bus commixtis et in balneo aquae ad
 consistentiam syrupi evaporatis, lineas
 circiter duas liquidi patinis infunde, et
 in furno vel balneo aquae ad siccum
 consumptis, squamulas separa. (Gal.)
 Dieß ist das *Sal essentielle Rhei s.*
Rhabarbari.

Gabe, fünfzehn bis zwanzig Gran.

Extractum Rhei s. Rhabarbari alcoholicum. (Ful. Lon. LonN. Lus. Pol. Sax. Wür. C.)

℞. Rhei concisi,
 Alcoholis, singulorum libras duas.
 Aquae communis libras novem.
 Digere per horas duodecim, cola ex-
 primendo, destillando alcoholē separa
 et residuum ad consistentiam extracti
 consume. (Pol)

Ful. et Wür. Rhei libram unam, Al-
 coholis tantidem, octo Aquae et tres
 dies digestionis; — Sax. Rhei partes
 duas, Alcoholis tres, novem Aquae et
 digestionis horas viginti quatuor; —
 Lon. LonN. et C. Rhei libram unam,
 Alcoholis (0,980) octarium unum,
 Aquae octariorum septem et maceratio-
 nem per quadriduum.

℞. Rhei pulverati . . . libram unam.
 Alcoholis libras quatuor.
 Post dies quatuor digestionis decan-
 tha, residuum cum Aquae libris decem
 ad duas redigendis coque; cola
 decoctum et consume; tincturam ad
 mellis consistentiam destillando red-
 actam cum residuo decocti commisce
 et tunc totum, continue agitando, ad
 aptam consistentiam consume. (Lus.)
 Gabe, wie bei'm vorigen.

*Extractum Rhei compositum s. catho-
 licum s. panchymagogum s. unico. phar-
 macum.* (B*. Bor4. HassP. O. Pal.
 Pol. Sax. Pid.)

℞. Extracti Rhei uncias tres.
 — Aloës unciam unam.
 Mollefactos in Alchhole balnei aquae
 ope ad massae pilularis consistentiam
 consume. (Pol.)

℞. Extracti Rhei uncias tres.
 — Aloës unciam unam.
 Misce (in Aquae destillatae sufficiente
 quantitate soluta Bor4. HassP.) et adde
 Saponis jalappini in Alchcoholis suf-
 ficiente quantitate dissoluti
 unciam unam.
 Evaporent in balneo aquae ad aptam
 consistentiam. (B*. Bor4. HassP. O.
 Sax.)

D. Extracti Rhei uncias duas, Ex-
 tracti Aloës drachmas quinque et Sa-
 ponis jalappini in Alchhole dissoluti
 unciam unam.

℞. Extracti Rhei uncias duas.
 — Aloës aquosi semunciam.
 — Hellebori nigri drachmam
 unam et grana triginta sex.
 Misce in mortario calefacto cum
 Resinae Jalapae pulveratae drach-
 mas duabus et granis viginti
 quatuor.

Serva ad usum. (Pid.)

℞. Rhei unciam unam.
 Senonium Carthami exorticatorem
 uncias quatuor.
 Polypodii querni uncias duas.
 Zingiberis albi drachmas duas.
 Foliorum Sennae,
 Turbith, singulorum uncias duas
 cum dimidia.
 Agarici albi drachmas sex.
 Scammonii drachmas decem.
 Mannae electae
 uncias duas cum dimidia.

Infunde per plures vices agaricum,
 scammonium et turbith in Aquae libris
 duabus ita ut penitus extrahantur;
 quod restat macera in Aquae bullien-
 tis libris tribus et coque deinde ad
 tertiae partis consumptionem, sub finem
 addendo residuum prioris extractionis
 spirituosae; cola exprimendo, mannam
 in colatura solve, solutionem clarifica-
 tam cum extracto spirituoso commisce,
 alcoholē lenis caloris ope expelle et
 quod restat ad extracti mollis consi-
 stentiam consume. (Pal.)

Purgirend. — Die Gabe des letztern
 ist von einem Erupel bis zur halben
 Drachme, ohne Nanna, von einer Drachme
 bis zu vier Erupel mit Nanna.

§. III. Präparate, welche den wirksa-
 men Bestandtheil des Rhabarbers
 mit dem zu seinem Ausziehen an-
 gewendeten Behülf zugleich ent-
 halten.

A. Auszug durch Wasser.

*Infusum Rhei s. Rhabarbari, Tinctu-
 ra Rhei aquosa, Anima Rhei.* (A. B*

Ba. Ed. Gen. Ham. Lon. LonN. Lus.
Wür. B. Br. C. Fi. ParC. Ra. T.)

R. Rhei concisi drachmam unam.
Aquaе bullientis

octarium dimidium.

Macera per horas duas et cola. (B*.
Lon. LonN. ParC.)

Ba. Rhei partem unam et duodecim
Aquaе; — A. Rhei semunciam et Aquaе
semilibram; — Br. Rhei uncias tres
et Aquaе libras duas cum dimidia; —
Ra. Rhei unam unam et Aquaе li-
bras duas; — Ham. Rhei unam unam
et Aquaе sufficientem quantitatem ut
colaturae uncias octo obtineantur; —
Fi. Rhei drachmas duas, Aquaе bul-
lientis uncias sex et horas duodecim
infusionis vel ebullitionem unam cum
Aquaе unciis sex cum dimidia; — B.
Rhei drachmas tres et Aquaе uncias
sex; — T. Rhei drachmam unam,
Aquaе uncias duas.

R. Rhei contusi . . . semunciam.
Aquaе bullientis . . . uncias octo.

Macera per horas duodecim, in vase
tecto, et adde

Aquaе Cinnamomi vinosae
unciam unam.

Cola. (Ed. Lus. C.)

Wür. Rhei drachmas tres, Aquaе se-
milibrum et Aquaе Cinnamomi vinosae
drachmas sex.

R. Rhei pulverati . . . unciam unam.
Aquaе Menthae piperitae
uncias duodecim.

Digere blando calore et cola. (Gen.)
Tonisch und schwach purgirend, bei eini-
gen chronischen Krankheiten und in der
Reconvalescenz; nach heftigen Krankheiten,
in denen die Verdauungswege nicht vorzüg-
lich afficirt waren.

Infusum Rhei amarum, Decoctum
amaro - aromaticum laxativum, Potio
tonica. (Am. B.)

R. Decocti amari . . . libram unam.
Infusi Rhei . . . uncias quatuor.
Aquaе Menthae piperitae
unciam unam.

Allmätig zu nehmen. (B.)

R. Rhei . . . drachmas tres.
Corticis Aurantiorum

semidrachmam.
Aquaе Menthae piperitae
uncias quatuor.

In colatura dissolve

Extracti Centaurii minoris
drachmas duas.

Den Tag über zu nehmen. (Au.)

Hustus incitans resolvens, Potio exci-
tans et resolvens. (B.)

R. Rhei . . . drachmam unam.

Decocti Chinae . . . uncias octo.
Infunde et adde colaturae

Camphorae cum Mucilagine Gum-
mi Arabici tritae semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas triginta.
Syrupi Corticum Aurantiorum
unciam unam.

Gabe, zwei Essel alle zwei Stunden.

Infusio laxativa sedans, Potio laxans
et sedans. (B.)

R. Infusi Rhei . . . uncias sex.
Syrupi Acetatis Morphinae
unciam unam.

Zuf zwei Mal zu nehmen, bei reizbaren
Subjecten.

R. Infusi Rhei . . . uncias sex.
Aquaе Menthae piperitae
unciam unam.

Liquoris Hoffmanni
scrupulum unum.

Zuf vier Mal zu nehmen.

” Potio resolvens et laxans. (B.)

R. Infusi Rhei . . . uncias octo.
Subcarbonatis Potassae
drachmas tres.

Syrupi Cichorii compositi
unciam unam.

Zuf zwei oder drei Mal zu nehmen.

Decoctum Rhabarbari, Anima Rhabar-
bari. (His.)

R. Rhei contusi . . . drachmas duas.
Aquaе . . . uncias octo.
Coque leviter et cola. — Zuf ein-
mal zu nehmen.

Syrupus Rhei s. Rhei palmati s. de
Rheo s. de Rhabarbaro. (Am. An. B.
Ba. Eel. Fenn. Hass. Lus. Suec. C. Sw.
Vm.)

R. Infusi Rhei . . . partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Fiat syrupus. (Fenn. Hass. Lus. Suec.)

R. Rhei minutim concisi

partem unam.
Aquaе bullientis partes duodecim.
Infunde per horas duodecim calore
30 ad 40° et parti uni colaturae adde
Sacchari albi . . . partes duas.
Fiat syrupus. (Am. Ba. C.)

R. Rhei concisi . . . partem unam.
Aquaе . . . partes octo.
Infunde et infusionem in Aquaе ae-
quali quantitate repete; colaturis tunc
commixtis adde

Sacchari albi partes quatuordecim.
Albuminis ope clarificata ad syrupi
consistentiam coque. (Sw. Vm.)

R. Rhei concisi . . . uncias octo.
Aquaе . . . libras quatuor.
Infunde per horas viginti quatuor,

cola et colaturae sepositione depuratae adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Massae residuae adde

Aquae . . . libras quatuor.

Infunde, calore sensim ad bullitionem usque aucto, cola exprimendo et colaturae adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Clarifica, ad consistentiam aptam consume et syrupum semirefrigeratum cum praecedente commisce. (An.)

℞. Rhei concisi . . . uncias tres.

Aquae bullientis . . . libras duas.

Macera per horas duodecim, tunc leviter coque, cola exprimendo, filtra et subsidendo et decanthando depurato adde

Sacchari albi . . . libras duas.

Fiat leni calore syrupus. (B. Bel.)

Syrupus cum Rheo s. Rhabarbaro s. Rhei aromaticus. (Am. Gal. Pol. C. Fl.)

℞. Rhei uncias tres.

Cinnamomi . . . drachmas sex.

Aquae bullientis . . . libras duas.

Digere per noctem; altero mane cola, colaturae uncias viginti adde

Sacchari albi . . . libras tres.

Fiat syrupus. (Pol.)

℞. Rhei pulverati drachmas decem.

Seminum Coriandri,

• — Foeniculi,
singulorum semidrachmam.

Aquae
uncias duodecim cum dimidia.

Immitte in lagenam ad collum aquae replendam et in balneum aquae immergendam, quo facto per sexagesimas viginti, balneo tunc gradatim refrigerato, lagenam exime et post horas viginti quatuor liquido decanthato et colato adde

Sacchari albi
uncias viginti quinque.

Solve in balneo aquae. (Gal.)

Fi. Aquae uncias quatuordecim, Sacchari libras duas, caeterum ut antea.

℞. Rhei . . . drachmas quinque.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,
singulorum semunciam.

Nuces moschatas . . . no. 2.

Aquae . . . octarium unum.

Digere, ad dimidium consume et adde

Sacchari . . . libram unam.

Alcoholis diluti
octarium dimidium.

Coque parumper. (Am. C.)

Syrupus de Rheo s. de Cichorio compositus. (A. Am. Ams. Br. Gal. Gen.)

Han. His. Pal. Sar. Wir. Wür. Bo. Fi. Pid. T.)

℞. Herbae recentis Cichorii

uncias quatuor.

Aquae . . . libras quatuor.

Coque ad consumptionem partis tertiae usque, sub finem addendo

Rhei electi minutim concisi

uncias quatuor.

Cola exprimendo et adde colaturae

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Clarificata ad consistentiam syrupi coque. (His.)

℞. Herbae et Radicis Cichorii recentium uncias duas.

Aquae purae . . . libras tres.

Decoque ad tertiae partis consumptionem et adde

Rhei concisi . . . uncias tres.

Digere per horas duodecim et post levem coctionem cola; colaturae sepositione depuratae adde

Sacchari albi . . . libras tres.

Fiat coquendo syrupus. (Ams.)

℞. Succis depuratis Cichorii libras duas.

Rhei electi concisi uncias duas.

Digere per noctem inter cineres calidos; altero mane exprime; residuum digere iterum cum

Aquae bullientis . . . libris duabus.

Post brevem coctionem cola exprimendo; liquoribus commixtis adde

Syrupi communis . . . libras tres.

Fiat syrupus. (Sa.)

℞. Radicis Cichorii . . . uncias sex.

Foliorum Cichorii uncias novem.

— Fumariae,

— Scolopendrii,

singulorum uncias tres.

Baccarum Alkekengi uncias duas.

Aquae communis

libras quatuordecim.

Decoque ad duodecim librarum liquidi remanentiam, cola et colaturae adde

Sacchari albi . . . libras quinque.

Clarifica et lenti igne ad syrupi spissi consistentiam consume. Praeterea

℞. Rhei cutisi . . . uncias sex.

Santalii citrini,

Cinnamomi,

singulorum semunciam.

Aquae communis . . . libras octo.

Infunde per horas viginti quatuor in vase clauso et cola levi cum expressione. Liquor cum syrupo antea praeparato commixtus semel ebulliat, tunc syrupum adhuc calidum nodulo immitte continenti

Cinnamomi,

Santalii citrini,

singulorum semunciam.

Post horas sex infusionis decantha.
(Gal.)

Bosson coquere suadet Folia et Herbas per horae quadrantem, tunc per horas duas infundere in Aquae libris decem, colare, decanthare et cum Sacchari libris quinque syrupum ad 25° coctum parare; praeterea parare infusionem cum Rheo, Aromatibus, Aquae libris tribus et Subcarbonatis Potassae drachmis duabus, absque expressione colare, liquorem cum syrupo commiscere, denuo si requiritur coquere et mixturam bullientem Santalo et Cinnamomo immittere. (GalF.)

℞. Radicis Cichorii,

— Taraxaci,

singularum uncias quatuor.

Aquae fontanae quantum sufficit ut coctione librae tres obtineantur; tunc

℞. Rhei concisi . . . uncias sex.
Aquae bullientis . . . libras tres.

Macera per horas viginti quatuor, exprime, colaturam cum decocto praecedente commisce et totum coque cum Sacchari albi . . . libris sex.

Syrupum bullientem immitte

Ligni Santali citrini,

Cinnamomi, singulorum semunciae.

Post refrigerationem exprime et per pannum cola. (Gen.)

℞. Radicis Rusci,

— Asparagi,

singularum uncias tres.

Foliorum Cichorii,

— Pimpinellae,

— Capilli Veneris,

— Agrimoniae,

— Cerefolii,

singulorum manipulum unum.

Aquae . . . libras tres.

Coque et sub finem in decocto infunde

Sennae mundatae . . . uncias tres.

Rhei contusi . . . unciam unam.

Radicis Turbith,

Hermodyctorum,

singulorum drachmas sex.

Florum Calendulae,

— Tamarisci,

— Sambuci,

singulorum manipulum dimidium.

Cola et adde

Sacchari albi . . . sesquibram.

Fiat syrupus. (B.)

℞. Herbae Cichorii . . . unciam unam.

Radicis Cichorii . . . uncias tres.

Rhei . . . uncias quatuor.

Subcarbonatis Potassae

semidrachmam.

Aquae fontanae . . . libras octo.

Coque ad librarum sex liquidi rema-

nantiam; exprimendo fortissime cola et colaturae adde

Sacchari albi . . . libras sex.

Clarifica et ad consistentiam syrupi coquendo consume. (A. Fi. T.)

℞. Radicis Cichorii

uncias duas cum dimidia.

Aquae fontanae . . . sesquibram.

Coque ad librae unius liquidi remanentiam et adde

Rhabarbari minutim concisi

unciam unam,

Subcarbonatis Potassae

grana viginti.

Coque lente et cola leviter exprimendo; adde

℞. Sacchari albi . . . uncias sedecim.

Clarifica, cola et adde

Aquae Cinnamomi spirituosae

unciam unam.

Misce bene. (Br. Han. Pal. Wir.)

℞. Radicis Cichorii . . . uncias tres.

Aquae fontanae . . . libras tres.

Coque ad tertiae partis remanentiam et adde

Rhei minutim concisi

uncias duas.

Subcarbonatis Potassae

semidrachmam.

Stent in digestionem per horas aliquot in loco calido, tunc semel vel bis ebulliant et cum expressione colentur; colaturae adde

Sacchari clarificati

uncias triginta duas.

Cola syrupum. (Wür.)

Pid. eandem praebens formulam addit Aquae Cinnamomi spirituosae uncias duas.

Sp. Radicis Cichorii uncias duas cum dimidia, Aquae uncias octodecim, coquendo ad duodecim redigendas, Rhei unciam unam, Subcarbonatis scrupulum unum et Sacchari uncias viginti duas.

Tinctura Rhei s. Rhabarbari s. Rhei etc aquosa, Anima Rhei, Infusum Rhei s. Rhei alcalisatum s. aquosum s. cum Subcarbonate Potassae, Tinctura aquosa Rhei alcalina. (A. Ams. An. E*. Ba. Bor. Bor4. Br. D. DD. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. RC. Sax. Wir. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Infusi Rhei simplicis

partes undecim.

Subcarbonatis Potassae

partem unam.

Dissolve. (Ba)

℞. Rhei concisi . . . partes tres.

Aquae communis

partes quinquaginta.

Caesac, donec liquor bullire incipit, tunc ab igne remoto adde

Subcarbonatis Potassae.

partem unam.

Post refrigerationem cola. (Vm.)

℞. Rhei semunciam.

Subcarbonatis Potassae

drachmam unam.

Aquae purae uncias sex.

Infunde calore gradatim aucto per horas duas, ita ut liquor semel ebulliat, cola, sepone et decantha.

D. Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas duas et Aquae bullientis uncias decem, ebulliant semel; — Ful. Rhei unciam unam, Subcarbonatis scrupulos quatuor, Aquae uncias octo et viginti quatuor horas digestionis; —

T. Rhei unciam unam, Aquae bullientis uncias octo, Salis Tartari drachmam unam, et digestionem inter cineres calidos per horas viginti quatuor.

℞. Rhei drachmas duas.

Subcarbonatis Potassae

semidrachmam.

Aquae quantum sufficit ut colaturae unciae quatuor obtineantur. Liquori, postquam semel ebulliverit, adde

Syrupi Sacchari unciam unam.

Misce bene. (Sw.)

℞. Rhei partes duas.

Aquae bullientis partes sedecim.

Post horas duas digestionis cola leviter exprimendo et adde

Subcarbonatis Potassae

partem dimidiam.

Alcoholis partem unam.

Misce bene. (Li.)

RC. Rhei sesquunciam, Subcarbonatis Potassae sesquidrachmam, Aquae fervidae libram unam, macerationem per horas duodecim et colaturae unciarum decem addere Alcoholis diluti unciam unam; — Sw. Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas tres, Aquae bullientis uncias duodecim, viginti quatuor horas macerationis et Alcoholis Cinnamomi uncias quatuor; — Ams. Rhei unciam unam, Aquae bullientis uncias sex, sex horas digestionis, Aquae Cinnamomi uncias quatuor et Subcarbonatis drachmas duas; — B*. Bor. Han. O. et Sax. Rhei sesquunciam, Subcarbonatis drachmas tres, Aquae uncias duodecim, duodecim horas macerationis et Aquae Cinnamomi vinosae uncias duas; — Bor4. Aquae fervidae uncias octodecim, liquorem refrigeratum colare et colaturae decanthatae uncias decem, Aquae Cinnamomi vinosae uncias duas admiscere; — HassP. Aquae bullientis uncias quindecim, caeterum ut Bor. etc.; — Fi. Rhei sesquunciam, Subcarbonatis drach-

mas tres, Aquae libram unam, digestionem per horas viginti quatuor et Tincturae Cinnamomi uncias duas; — DD. Rhei semunciam, Subcarbonatis drachmam unam, Aquae bullientis uncias quatuor, duodecim horas digestionis et Aquae Foeniculi unciam unam; — Wir. Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas duas, Aquae Cichorii, Aquae Cinnamomi cum Buglosso, singularum uncias sex, et viginti quatuor horas digestionis; — Pal Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas duas, Aquae Cichorii uncias sedecim et viginti quatuor horas digestionis; — Br. Rhei unciam unam, Subcarbonatis sesquidrachmam, Aquae purae uncias tres et Aquae Cinnamomi tantidem.

Tonisch, auch absorbirend und gegen Selbstsucht, Hypochondrie und Säure in den ersten Wegen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine Unze, zwei oder drei Mal täglich.

Infusum Rhei salinum s. boraxatum, Tinctura aquosa Rhei salina. (B*. GalF. Hass. Pal. Wür. Ca. Pid. Sp.)

℞. Rhei contusi unciam unam.

Aquae destillatae uncias novem.

Acetatis Potassae drachmam unam.

Post horas viginti quatuor infusionis filtra. (Ca.)

℞. Aceti uncias novem.

Subcarbonatis Potassae

quantum sufficit

ad saturandum acidum. In solutione digere per horas duodecim

Rhei concisi unciam unam.

Filtera. (Sp.)

℞. Rhei semunciam.

Tartari tartarisati drachmas duas.

Aquae bullientis semilibram.

Stent in digestionem per horas viginti quatuor et filtrentur. (Pid.)

Wür. eandem formulam, addendo autem Cocconellae semiscrupulum; — Hass. Tartarum tartarisatum vel boraxatum recipere pro arbitrio.

℞. Rhei sesquunciam.

Boracis pulverati drachmas duas.

Aquae bullientis libram unam.

Macera per horas duodecim et colaturae uncias decem adde

Aquae Cinnamomi vinosae

uncias duas.

Misce. (B*. GalF. Pol.)

Gabe, ein oder zwei Eßel, drei oder vier Mal täglich.

Decoctum aperiens. (Br.)

℞. Radicis Rhei,

— Rubiae,

singularum drachmas tres.

Subcarbonatis Potassae

drachmas duas.

Aquae fontanae . . . libras octo.
 Coque per horam unam, cola et adde
 Decocti Zingiberis . . . uncias tres.
Elixir viscerale Rosensteinii, (B*)
 ℞. Rhei concisi . . . uncias octo.
 Subcarbonatis Potassae uncias tres.
 Aquae Cinnamomi
 . . . uncias quadraginta octo.
 Stent in digestionem per dies quatuordecim loco frigido et in lagena bene obturata, sub hujus postremae frequenti agitatione; adde deinde
 Corticis receptis Aurantiiorum
 . . . uncias duas.

Cardamomi minoris,
 Seminum Foeniculi,
 . . . singulorum semunciam.
 Digere, saepius agitando, per dies septem et exprime; residuo infunde
 Decocti Radicis Cichorii
 . . . uncias sex.

Agita, cola exprimendo, commisce colaturam cum priore et in mixtura solve

Sacchari . . . uncias viginti quatuor.
Konisch, stärkend. — Gabe, ein halber bis ganzer Eßffel.

Syrupus Rhei alcalisatus. (Bor. Bor4. D. Fer. Ful. Han. HassP. Li. O. R. Wir. Sw.)

℞. Tincturae aquosae Rhei alcalinae
 . . . libram unam.

Sacchari albi . . . libras duas.
 Coque ad consistentiam syrapi. (Ful.)
 Li. Tincturae aquosae alcalinae uncias decem et Sacchari uncias sedecim.

℞. Rhei . . . uncias quatuor.
 Subcarbonatis Potassae
 . . . drachmas duas.

Aquae bullientis . . . libras duas.
 Coque blando igne, cola exprimendo et adde pro unciis viginti colaturae
 Sacchari albi . . . libras tres.

Fiat syrupus. (D.)
 ℞. Rhei . . . uncias tres.
 Subcarbonatis Potassae

. . . drachmas duas.
 Aquae bullientis . . . libras duas.
 Digere per horas duodecim et pro unciis viginti colaturae adde

Sacchari albi . . . libras tres.
 Fiat syrupus. (O.)
 R. Rhei uncias duas, Salis sesquidrachmam, Aquae uncias octodecim et Sacchari libras duas.

℞. Rhei . . . uncias tres.
 Cinnamomi . . . drachmas tres:
 Subcarbonatis Potassae
 . . . drachmas duas.

Aquae bullientis . . . libras duas.
 Digere per horas duodecim, cola et colaturae unciarum viginti adde
 Sacchari albi . . . libras tres.

Fiat syrupus. (Sw.)

Bor. Bor4. et Han. Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae) drachmas sex; — HassP. Rhei sesquiunciam, Cassiae cinnamomeae drachmas tres, Salis Tartari unam, Aquae fervidae uncias tredecim, digestionem per noctem et liquoris expressi unciis decem addere Sacchari albi uncias octodecim.

℞. Rhei . . . uncias duas.
 Subcarbonatis Potassae
 . . . drachmam unam.

Succi bullientis Cichorii libras tres.
 Post horas duodecim macerationis cola exprimendo et colaturae adde
 Sacchari . . . libras duas.

Liqua. (Fer.)
 ℞. Rhei,
 Foliorum Sennae,
 . . . singulorum sesquiunciam.

Cinnamomi . . . sesquidrachmam.
 Salis Tartari . . . scrupulos duos.
 Zingiberis . . . semidrachmam.
 Aquae Cichorii . . . uncias decem.
 — Rosarum uncias quatuor.

Digere per tres dies, loco calido, tunc ebulliant semel; exprime, albuminis ope clarifica et colaturae unciis novem adde

Sacchari albi . . . uncias sedecim.
 Fiat syrupus. (Wir.)

Potio cum Manna et Rheo. (GalM. Ra.)

℞. Rhei . . . semunciam.
 Aquae . . . uncias quatuor.
 Coque per aliquot sexagesimas, tunc in colatura dissolve

Mannae . . . uncias duas.
Potio purgans. (Pie.)

℞. Rhei,
 Subcarbonatis Potassae,
 . . . singulorum drachmam unam.

Decocti Parietariae
 . . . quantum sufficit.

Coque et in colaturae uncia una dissolve

Mannae . . . uncias duas.
 Cola et adde

Syrupi Rhei compositi
 . . . unciam unam.

Potio purgans et topica. (Pie.)

℞. Mirobalanorum citrinarum
 . . . drachmas duas.

Rasurae Santali cirini
 . . . drachmam unam.

Rhei contusi . . . semidrachmam.

Mannae . . . uncias duas.
 Aquae bullientis quantum sufficit.

Colaturae adde
 Confectionis hyacinthinae
 . . . drachmam unam.

Mixtura carminativa. (Sm.)

℞. Tincturae Rhei aquosae
 . . . uncias sex.

Liquoris anodyni mineralis
drachmam unam.
Gabe, ein Eßfel drei oder vier Mal täg-
lich.

Tinctura aperiens. (Ham.)
℞. Infusi Rhei aquosi,
Liquoris Terrae foliatae Tartari,
singulorum semunciam.
Vini Antimonii Huxhami
drachmam unam.
B. *Xuzzug durch Wein.*
Tinctura Rhei s. Rhabarbári vinosa,
Vinum Rhei s. Rhei palmati aromati-
cum s. compositum, Elixir Rhei dulce
s. compositum. (Am. An. B. Bel. Ed.
Fenn. Gen. Lus. O. Suec. C. Ca. Vm.)
℞. Rhei uncias duas.
Cinnamomi . . . drachmam unam.
Vini albi sesquilibram.
Macerata per octo dies et cola. (Lus.)
℞. Rhei partes octo.
Anisi stellati . . . partem unam.
Vini Malacensis
partes nonaginta sex.
Digere frigide per octo dies, cola
leviter exprimendo et filtra. (Vm.)
℞. Rhei uncias duas.
Cardamomi minoris
drachmam unam.
Alcoholis (25°) . . . uncias duas.
Vini albi Hispanici libram unam.
Post octo dies macerationis cola.
(Bel.)
℞. Rhei uncias duas.
Cardamomi minoris
drachmas duas.
Vini Hispanici . . . libram unam.
Digere per dies quatuor et cola ex-
primendo. (Fenn. Suec.)
℞. Rhei,
Alcoholis (0, 935),
singulorum uncias duas.
Canellae albae drachmam unam.
Vini albi Hispanici
uncias quindecim.
Post dies septem filtra. (Am. B. Ed.
C. Ca.)
Ams. eandem formulam sed Alcho-
lem 0,931.
℞. Rhei uncias duas.
Corticis Aurantiorum mundati
semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Vini albi libras duas.
Alcoholis uncias duas.
Post aliquot dies macerationis cola.
(B*. O.)
℞. Rhei unciam unam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Crocii drachmam unam.
Vini Hispanici . . . uncias octo.
Digere per dies sex, cola et residuo
infunde

Vini Hispanici . . . uncias quatuor.
Post horas viginti quatuor digestio-
nis cola et colaturas ambas commisce.
(An.)
Gen. Rhei uncias duas, Cardamomi
semunciam, Croci drachmas duas et
Vini Hispanici libras duas.
Reizend, gelind abführend, besonders bei
Hypochondrie, Hysterie, Scrofula und Drü-
senverstopfung gerühmt. — Gabe, ein bis
zwei Eßfel für Erwachsene; dreißig bis
sechzig Tropfen für Kinder.
Vinum Rhei s. Rhabarbari amarum,
Elixir Rhei damarum. (D. Fenn. Suec.
Vm.)
℞. Rhei uncias duas.
Radiciis Gentianae drachmas sex.
Cardamomi minoris semunciam.
Vini albi libras duas.
Digere blando calore et filtra. (D.)
℞. Rhei unciam unam.
Radiciis Gentianae drachmas duas.
Canellae albae drachmam unam.
Vini Hispanici . . . libram unam.
Digere per tres dies et cola ex-
primendo. (Fenn. Suec.)
℞. Cinnamomi . . . partem unam.
Vini Maderani
partes nonaginta sex.
Infunde frigide per duos dies et adde
Rhei partes octo.
Post octo dies adde
Radiciis Gentianae partem unam.
Post aliquot dies cola leviter ex-
primendo et filtra. (Vm.)
Reizend, tonisch. — Gebrauch und Ga-
be wie bei'm vorigen.
Tinctura Rhei vinosa s. Darelii s.
dulcis. (B*. Ba. Bor. Bor4. Br. Han.
Hass. HassP. Pol. Sax. Suec. Pie. Vm.)
℞. Rhei partes octo.
Corticis Aurantiorum amarorum
partes duas.
Cardamomi minoris partem unam.
Radiciis Inulae . . partes quatuor.
Vini Maderani
partes centum viginti octo.
Macerata frigide per plures dies, cola
leviter exprimendo et filtra. (Vm.)
℞. Rhei concisi . . . uncias duas.
Corticis Aurantiorum mundati
semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Vini Malacensis . . libras duas.
Digere, blando calore, per dies qua-
tuor, cola exprimendo et adde
Extracti Inulae . . . semunciam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Serva. (Ba. Bor. Pol. Sax.)
Bor4. extractum Inulae omittit.
℞. Rhei pulverati . . . uncias duas.
Passularum minorum unciam unam.
Corticis Citri,

Radicis Liquiritiae,
singulorum semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Vini Hispanici (Portoensis)
libras duas.

Post duos (tres HassP.) dies digestionis cola exprimendo et colaturae adde

Extracti Inulae . . . semunciam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Sera. (B*. Br. Han. Hass. HassP. Pic.)

R. Rhei sesquiunciam.
Cardamomi minoris semunciam.
Uvarum passarum enucleatarum
uncias tres.

Vini Hispanici . . . sesquilibram.
Madera per dies quatuor in loco calido, cola exprimendo et adde

Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Extracti Inulae . . . semunciam.
Macidis . . . semidrachmam.
Subcarbonatis Potassae
drachmam unam.

Sera. (Suac.)

Eigenschaften und Gebrauch, wie bei der vorhergehenden Tinctur. Auch hat man sie gegen Würmer empfohlen, allein man nimmt dann statt des Weins gutes Hydromel und setzt nach einer viertägigen Digestion statt des Mantextracts zu der Colatur zwei Unzen Extractum Tanacetii.

C. Auszug durch Alcohol.

Alcohol cum Rheo, Tinctura Rhei s. Rhabarbari alcoholica. (A. Ams. Br. Fi. T.)

R. Rhei electi et concisi
unciam unam.
Alcoholis libram unam.

Macera per diem unum et filtra.
(Br.)

Ams. Rhei partem unam, Alcoholis (0,907) octo et octo dies extractionis; — A. Rhei uncias duas et Alcoholis (0,910) libram unam; — T. Rhei uncias quatuor, Alcoholis 25° B. libras tres et digestionem per sex vel octo dies; — Fi. Rhei uncias duas, Alcoholis 25° libram unam et digestionem per dies octo.

Reizend, purgirend, bei Diarrhöe, Colik, Krankheiten von Schwäche der Därme und Verstopfungen der Unterleibsgegend. Man giebt sie mit einem passenden Behälter. In chemischer Hinsicht dient sie zur Prüfung auf Alkalien, wodurch sie roth gefärbt wird.

Tinctura Rhei spiritiosa s. dulcis s. Rhabarbari s. Rhei alcoholica aromatica, Elixir Rhabarbari, Elixir dulce Rhei. (Am. Du. Ed. Ful. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. C. Ca. Pid. Sw. T. Vm.)

R. Rhei concisi . . . partem unam.
Aque Vitae,

— Menthae piperitae,
singulorum partes sex.
Digere frigide per plures dies, exprime leviter et filtra. (Vm.)

R. Rhei uncias duas.
Cardamomi minoris semunciam.
Aque Vitae sesquilibram.
Post septem dies macerationis cola.
(Lus.)

Am. Ed. C. Ca. et Sw. Rhei uncias tres; — Ful. et Li. Rhei uncias duas, Cardamomi semunciam et Aque Vitae uncias duodecim.

R. Rhei uncias duas.
Cardamomi . . . drachmas duas.
Aque Cinnamomi spirituosae
libram unam.

Stent in infusione per tres dies (T.); — addendo syrupi ponderis partem dimidiam, habes Elixir dulce Rhei.

R. Rhei concisi uncias duas.
Cardamomi minoris semunciam.
Crocii drachmas duas.
Alcoholis (0,930) octarios duos.

Macera blando calore per dies quatuordecim et filtra. (Lon. LonN.)
Du. septem dies digestionis.

R. Rhei uncias duas.
Cardamomi minoris semunciam.
Spiritus Vini Gallici libras duas.

Digere per tres dies (septimanam HassP.), filtra et colaturae adde
Sacchari albi contusi

uncias quatuor.
Stent in digestionem ad sacchari solutionem usque. (Hass. HassP. Pid.)

Diese Formel giebt die Tinctura Rhei spiritiosa dulcis, mit welcher Aehnlichkeit hat die

Tinctura Rhei composita. (Am. Lon. LonN. C.)

R. Rhei uncias duas.
Radicis Liquiritiae semunciam.
— Zingiberis,

Crocii, singulorum drachmas duas.
Alcoholis (0,930) octarium unum.
Aque uncias duodecim.

Macera blando calore per dies quatuordecim et filtra.

Am. et C. digerere per dies decem jubent Rhei uncias duas, Liquiritiae, Anisi, singulorum unciam unam et Sacchari uncias duas in Aque Vitae octariis duobus cum dimidio.

Reizmittel, welches man besonders als blähungstreibend, und um die Verdauungsfunktion zu bethätigen empfohlen hat. — Gabe, eine halbe bis eine Unze in einem schicklichen Behälter.

Tinctura Rhei amara s. Rhabarbari

composita s. Rhei et Gentianae. (Am. Br. Ed. Ham. Han. R.G. Wir. C. Vm.)

℞. Rhei concisi . . . uncias duas.
Gentianae . . . semunciam.
Alcoholis (0,985)

libras duas cum dimidia.

Post septem dies digestionis filtra.
(Am. Ed. C.)

℞. Rhei palmati . . . unciam unam.
Gentianae . . . drachmas duas.
Zingiberis . . . drachmam unam.
Alcoholis diluti uncias quindecim.

Digere per septimanam et per char-
tam cola. (RC.)

℞. Tincturae Rhei . . . sesquilibram.
— Gentianae compositae
semilibram.

Misce. (Lus.)

℞. Rhei . . . uncias duas.
Gentianae . . . unciam unam.
Corticis Aurantiorum semunciam.
Alcoholis . . . libras duas.

Digere per horas quadraginta octo
et filtra. (Ham.)

℞. Rhei . . . partes octo.
Gentianae

partem unam cum dimidia.

Serpentariae Virginicae

partem unam.

Aquae Vitae

partes quadraginta octo.

Infunde frigide per plures dies, cola
exprimendo et filtra. (Vm.)

Br. Digerere jubet per tres dies Rhei
unciam unam, Gentianae sesquidrach-
mam, Serpentariae drachmam unam et
Coccionellae scrupulum unum in Aquae
Vitae libra una.

℞. Rhei . . . unciam unam
Gentianae . . . sesquidrachmam.
Serpentariae Virginicae
drachmam unam.

Aquae Vitae,

Vini albi, singulorum semilibram.

Digere et filtra. (Han. Wir.)

℞. Rhei . . . unciam unam.
Radicis Gentianae drachmas tres.
Corticis Winteri drachmam unam.
Aquae Vitae . . . uncias sedecim.

Infunde frigide per plures dies, cola
leviter exprimendo et filtra. (Vm.)

Reizend, ebendem bei galligen Krankheiten,
Fiebern und Ruhr empfohlen. — Gabe,
funfzig bis achtzig Tropfen.

Rhododendrum.

Rhododendrum Chrysanthum, L.; Si-
birische Schneerose; Rosage à fleurs blan-
ches (Gal.); Yellow flowered rhododen-
dron (Ang.); Roze sybirgyskie (Pol.).

Bor. Bor4. Ed. Fer. Han. HassP.
Pol. R. R.C. Sax. Wir. Wür. C. M. Fi.

Ein Halbstrauch (Decandria Monogy-
nia, L.; Rhodoraceae, J.), welcher auf
den Alpen und in Siberien wächst. (Pall.
Fl. Ross. 1. t. 30.)

Man wendet die Stängel und Blätter
(Stipites) an: die Zweige sind gänsefederbich,
lang, bräunlich, die Blätter länglich, oben
rauh, unten glatt und kurzgestielt.

Reizend, narcotisch, schweiß- und harn-
treibend.

Conserva Rhododendri Chrysanthi. (Sw.)

℞. Foliorum recentium Rhododendri
Chrysanthi . . . partem unam.

Sacchari albi . . . partes duas.

Contere ut fiat pasta homogenea.

Pulvis antiarthriticus. (Ca.)

℞. Pulveris Liquiritiae drachmas duas.

— Rhododendri Chrysanthi

grana decem.

Misce et fiant doses decem. — Man
gibt Morgens und Abends ein Pulver und
steigt damit täglich, bis ein reichlicher
Schweiß ausbricht.

Infusum Rhododendri Chrysanthi. (B*.)

(Au.)

℞. Foliorum Rhododendri Chrysanthi
drachmas duas adsemunciam.

Aquae fontanae . . . uncias decem.

Digere in vase tecto per horas vi-
ginti quatuor et cola. (B*.)

℞. Foliorum Rhododendri Chrysanthi
semunciam.

Aquae bullientis . . . uncias octo.

Infunde et colaturae adde

Tincturae aromaticae

drachmas duas.

Misce. (Au.)

Von Koelpin bei chronischem Rheuma-
tismus empfohlen. — Gabe, eine halbe
Drachme, zwei oder drei Mal täglich.

Decoctum Rhododendri Chrysanthi.

(RC.)

℞. Herbae Rhododendri Chrysanthi
siccatae . . . drachmas duas.

Aquae fervidae . . . libram unam.

Digere leni calore per horas duode-
cim et cola. — Gabe, zwei Unzen alle
zwei Stunden.

Tinctura Rhododendri Chrysanthi. (B*.)

℞. Foliorum Rhododendri Chrysanthi
uncias duas.

Spiritus Vini Gallici,

Vini Hispanici,

singulorum semilibram.

Digere per dies quatuordecim. —
Reizend, etwas narcotisch und für harntrei-
bend gehalten. — Gabe, fünf Edffel in

einem Aufguß des Rückstands der Tinctur
mit Einem Pfund Wasser.

R h u s .

Von dieser Pflanzengattung werden be-

sonders drei Arten in den Pharmacopöden angezeigt:

1) *Rhus Cotinus*, L.; Perückensumach, Benußsumach; Fustet (*Gal.*); Coccigria (*Ang.*).

A. Fer.

Ein Baum (Pentandria Digynia, L.; Terebinthaceae, J.) des südlichen Europa's. (*Jacq. Fl. Austr. t. 210.*)

Man wendet die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (Cortex Cotini) ist außen glatt und weißlich.

Die Blätter sind verkehrt eiförmig, ganz, und auf beiden Seiten glatt. Sie haben einen styptischen, balsamischen und harzigen Geschmack.

Abstringirend, tonisch.

2) *Rhus Coriaria*, L.; Sumach, Gärberbaum; Sumac des corroyeurs (*Gal.*); Coriar's sumach (*Ang.*); Tumtum tum (*Ar.*); Zumague (*His.*); Sumack (*Bel.*); Sommaco (*I.*); Sumak (*Pe.*); Sumagro (*Lus.*).

Br. Fer. *Gal. His. Wir. Wür. A. Be. Br. G. M. Sp.*

Ein großer Strauch des südlichen Europa's. (*Blackw. t. 486. Plenck t. 232. Zorn Ic. pl. t. 510.*)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Sumac) sind gefiedert und bestehen aus fünfzehn bis siebenzehn eiförmigen, sitzenden, oben behaarten, am Rande stumpf gezähnten Blättern von einem sehr abstringirenden Geschmack.

Die Beeren sind schön roth, von der Größe einer Linse und von abstringirendem saurem Geschmack.

Ein wenig gebrauchtes abstringirendes Mittel.

3) *Rhus Toxicodendrum et radicans*, L.; Giftbaum, Giftsumach, Wurzelsumach; Sumac vénéneux (*Gal.*); Common upright sumach, Poison oak (*Ang.*); Vergiftboom (*Bel.*); Sommaco radicante (*I.*).

Am. An. Ba. Bel. Ed. Fer. *Gal. HassP. Lon. Sax. Br. C. Fi. G. Par.*

Ein Bäumchen Nordamerica's. (*Hayne IX. 1. Plenck t. 235 236. Schk. t. 82. Bigel. Am. Med. Bot. III. t. 42. Düss. off. Pf. III. t. 19. 20. Dill. Elth. 389. t. 291. fig. 375. Bert. Bild. III. 97. f. 1.*)

Man wendet die Blätter (folia Rhois s. Rhois Toxicodendri s. radicans) an; sie sind dreizählig, die Blättchen gestielt, eckig gezähnt oder ganz und sitzig. Sie haben eine solche Schärfe, daß die bloße Berührung und selbst wenn man sagt, die Ausbünstungen die Haut heftig reizen.

Reizend, giftig, bei Flecken und Lähmung empfohlen.

Succus Toxicodendri. (T.)

Ut succus cichorii paratur.

Extractum Rhois radicans et Toxicodendri. (An. B* *Bel. Gal. Han. HassP. Sax. Fi. Sw*. T. Vm.*)

R. Foliorum recentium Rhois Toxicodendri . . . quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo, Aquae paxillum adspargendo, et exprime succum, qui statim, continue, sub finem spatulae lignae ope agitatus evaporet. (B* *Gal. Han. Fi.*)

HassP. T. Faeculam antea a succo separatam post hujus evaporationem ad syrupi spissitudinem addere et totum in balneo aquae ad massae pilularis mollioris consistentiam redigere; — T. cum succo ad mellis et tunc ad pilularum consistentiam evaporato commiscere jubet pulveris foliorum quantum sufficit.

R. Foliorum recentium Rhois Toxicodendri . . . quantum vis.

Contunde celeriter in mortario marmoreo, Aquae dimidium pondus addendo, cola succum exprimendo, seponere per temporis momentum, decantha supra cribrum setaceum et continue agitando ad extracti consistentiam inspisa. (Vm.)

R. Foliorum recentium Rhois Toxicodendri,

Aquae frigidae,

singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim et adde

Aquae bullientis . . . duplum

pondus totius massae; post refrigerationem cola, albuminis ope clarifica, igni impone et liquorem, simulac spissescere coepit per pannum trajice, qui tunc continue agitatus sufficienter evaporet. (An. Vm.)

R. Foliorum Rhois Toxicodendri . . . libras duas.

Aquae bullientis . . . libras decem.

Digere in vase tecto per horas viginti quatuor, tunc per unam coque; post refrigerationem decantha, exprime deinde folia, liquores commisce et sepositione depuratos ad aptam spissitudinem consume. (Bel.)

Sw* coquere jubet binis vicibus sequentibus Foliorum siccorum partem unam in Aquae decem; per cribrum setaceum trajicere et colaturam consumere; — Sax. Coquere Foliorum siccorum partem unam in Aquae triginta ad quindecim remanentiam, per cribrum trajicere et colaturam inspissare.

T. praeterea succum filtratum in laminas fictiles lineae crassitiem effusum, vaporis vel solis ope siccare jubet

Gabe, eine halbe Drachme vier Mal täg-

lich bis auf sechs Drachmen und selbst eine Unze gestiegen, in Zuckerwasser. Man hat es bis zu mehreren Unzen täglich gegeben.

Mixtura Extracti Rhois radicans, Potio excitans. (B.)

R. Extracti Rhois radicans
drachmam unam.
Aquae unciam unam.

Gabe, zehn Tropfen, allmählig bis auf einen Kaffeelöffel gestiegen, täglich zwei Mal, bei Lähmung der Extremitäten.

Pilulae Toxicodendri. (Fer. B*. Sw*. Vm.)

R. Chlorureti Barii partem unam.
Extracti Rhois Toxicodendri partes sex.

Foliorum Rhois Toxicodendri pulveratorum quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. — Gabe, drei Stück zwei oder drei Mal täglich, bei Flechten. (Sw*. Vm.)

R. Foliorum Rhois Toxicodendri granum unum.
Pulveris Liquiritiae scrupulum unum.

Roob Sambuci quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor. — Den Tag über zu nehmen, bei Lähmungen nach Schlagfluß. (Fer. B.)

Tinctura Rhois radicans. (Sax. Huf.)

R. Succi Rhois radicans recentis expressi,
Alcoholis concentrati, singulorum partem unam.

Infunde frigide per plures dies et filtra. (Sax.)

Huf. Foliorum Rhois uncias duas,
Alcoholis libram unam et tres dies infusionis.

R i b e s .

Man findet von dieser Pflanzengattung besonders folgende drei Arten in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Ribes nigrum*, L.; schwarze Johannisbeere, Gichtbeere; Cassis, Grosseillier noir (Gal.); Common black currant (Ang.); Rybes neb wjno, Jana cerne (B.); Sapllaer (D.); Swarte winbaer (Succ.).

Ams. B. Bel. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Gen. Hass. Li. R. Sax. Suec. Wir. Be. Br. G. M. Fid. Sp. Z.

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Grossulariae, J.) aus dem Norden beider Continente. (Blackw. t. 285. Plenck t. 147. Hayne III. 26. Zorn Ic pl. I. 305.)

Die Früchte, welche man anwendet, sind kugelige, schwarze Trauben bildende Beeren und mehr gewürzhaft als sauer.

2) *Ribes rubrum*, L.; rothe Johannisbeere; Grosseillier rouge (Gal.); Red currant (Ang.); Rybes, Neb wjno sjana cerwene (B.); Raede ribs (D.); Agracejo encarnada (His.); Rotheaalbezie (Bel.); Uva de prati (I.); Porzeczkie (Pol.); Smorodina krasnaja (Lus.); Raeda winbaer (Succ.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Ham. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Be. Br. Fi. G. M. Fid. Sp. Z.

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (Hayne III. 25. Blackw. t. 285. Plenck t. 146. Düss. off. Pfl. II. t. 11. Fl. méd. IV. 189. Bert. Bild. V. 78. f. 1.)

Man wendet die Früchte (baccae Ribesiorum s. Ribium rubrorum) an; es sind kleine, kugelige, sehr saftige Beeren, von rother oder gelblichweißer Farbe, ohne Geruch und suerlichen und zuckerartigen Geschmack, welche Trauben bilden.

3) *Ribes Grossularia et Uva crispa*, L.; Stachelbeere; Grosseillier à maquerreau (Gal.); Gooseberry (Ang.); Stikkebbaer (D.); Grosseller (His.); Kruisbezie (Bel.); Grispignolo (I.); Agrest (Pol.); Groselheira espin (Lus.); Steckelbaer (Succ.).

Fer. Gal. His. Be. Br. G.

Ein Strauch des nördlichen Europa's, (Blackw. Herb. t. 277. Bert. Bild. V. 78. f. 2.)

Die Früchte, welche man anwendet, sind kugelige oder eiförmige, grünliche oder röthliche Beeren von der Größe einer Haselnuß, vor der Reife von saurem und abstringirendem, bann sadem und zuckerartigem Geschmack.

Conserva Foliorum Ribium nigrorum. (Vm.)

R. Foliorum Ribium nigrorum et in pulpam tenellam redactorum partem unam.

Sacchari albi partes duas.

Contere et calefac in balneo aquae in vase clauso, donec saccharum solutum sit.

Succus Ribesiorum nigrorum. (Ful. F.)

R. Baccarum Ribium nigrorum maturarum quantum vis.

Contunde in mortario lapideo vel inter manus tere, massam per aliquot dies in cavam sepone, exprime fortiter, succum sepone, per pannum cola et in lagenis longicollibus serva.

Roob s. *Gelatina Ribesiorum nigrorum.* (Ams. B. Bel. Li. R. Sax. Sw.)

R. Baccarum Ribium nigrorum bene maturarum quantum vis.

Coque cum Aquae pauillo in vase stanneo obtecto, continue agitando, donec baccae rumpantur; cola per cri-

brum, residuum fortiter exprime et singulis libris succi semilibram Sacchari addendo, ad aptam consistentiam consume, bene despumando. (Ams.)

B. et Bel. Sacchari partes quatuor pro decem Succis; — Sax. Sacchari unam, Succis octo; — R. Sacchari unam et sex Succis; — Li. et Sw. Sacchari unam et quatuor Succis.

Bei Braune gerührt. — Man sezt es zu Gurgelwässern.

Syrupus Ribis nigri s. Ribesiae nigrae s. Ribium nigrorum. (Penn. Suec. C. Sw*.)

R. Succis Ribium nigrorum depurati . . . libram unam.

Sacchari albi . . . libras duas.

Fiat leni calore syrupus. (Penn. Suec.)

C. Succis octarium unum et libras duas Sacchari.

R. Residui Succis expressi Ribium nigrorum . . . quantum vis.

Aquae bullientis pondus aequale cum parte dimidia.

Post horas viginti quatuor digestionis liquori adde

Sacchari albi . . . partes aequales.

Clarifica et ad syrupi consistentiam coque. (Sw*.)

Spiritus Ribium nigrorum. (Vm.)

R. Baccarum Ribium nigrorum . . . partes duas.

Contere, Aqua tepida submersas, fermentationi subijce et tunc adde

Foliorum recentium Ribis nigri partem quartam.

Aquae Vitae

partem unam cum dimidia communis partes duodecim.

Destillando tres partes abstrahe.

Succus Ribium. (Ful. Gal. Hass. His. Sar. Sax. Fid. Vm.)

R. Baccarum Ribium enucleatarum . . . quantum vis.

Inter manus contritas in cavam seponere, donec liquor clarus supernatet, succum expressum per aliquot dies adhuc ad locum frigidum seponere et colaturam in lagenis longicollibus a strato olei obtectam servare. (Ful. Gal. His. Sar. Sax. T.)

R. Ribium rubrorum . . . quantum vis.

In pelvi cuprea contritas baccas per cribrum trajice, succum sepositione depuratum per pannum cola, colaturae adde Sacchari partem sedecimam; ebulliant semel, tunc in lagenas infunde ad collum solum replendas, in quorum vacuum filum sulphure obductum urens ingeratur. (Vm.)

Hass. et Pid. Sacchari partem quartam addunt.

Roob Ribium s. Ribesiorum, Gelatina Ribium. (Ams. An. B. Bel. Br. Ful. Gal. Hass. His. R. Sar. Sax. Wir. Wür. Fi. Pid. Sw. T. Vm.)

R. Baccarum Ribium rubrorum maturarum . . . quantum vis.

Coque cum Aquae paxillo in vase stanneo continue agitando, donec rum-pantur; residuum per cribrum trajice et fortiter exprime; succi partibus decem adde Sacchari quatuor et sub continua agitatione ad mellis consistentiam consume. (B. Bel.)

Ams. Sacchari partem unam, et quinque Succis; — An. Br. Ful. Hass. Wir. Wür. Pid. et Sw. Sacchari unam et quatuor Succis; — R. Sacchari unam et sex Succis; — Sax. Sacchari unam et sedecim Succis; — T. ut roob aerasorum.

R. Sacchari clarificati et fortissime cocti . . . libras duas.

Succi Ribium, Aquae, singulorum libram unam.

Coque ad consistentiam gelatinae et cola. (His.)

R. Succis Ribium recenter expressi . . . quantum vis.

Cola et coque, modico igne ad mellis consistentiam. (Gal. Sar.)

R. Baccarum Ribium maturarum . . . libras quindecim.

Sacchari albi . . . libras duodecim, Coque blando igne, saepius agitando, ad evaporationem quartae fere partis humidi usque, cola liquorem adhuc calidum et ad locum frigidum seponere, ut in gelatina mconrescat. (Wir. Fi.)

Vm. addere jubet octariis singulis Succis expressi Sacchari libras duas et ad consistentiam gelatinae evaporare.

Sauer, kühlend, besonders angewendet, um Eisen annehmlicher zu machen.

Syrupus Ribium s. Ribesiorum s. Ribis rubri s. de Ribesii. (Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pal. Pol. Wir. Wür. C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.)

R. Succis Ribium depurati et filtrati . . . libras duas.

Sacchari albi . . . libras tres cum dimidia.

Liqua blandi caloris ope. (Gal.)

Br. D. Ful. Pal. Wir. Wür. Succis uncias decem et Sacchari uncias sedecim; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. Succis uncias viginti, Sacchari libras tres; — Hass. Pid. Succis uncias decem, Sacchari tredecim et dimidiam; — Fi. Succis libram unam, Sacchari duas; — Sw. Succis uncias sedecim,

Sacchari uncias viginti octo; — Bel. Succii uncias sedecim, Sacchari libras duas cum dimidia; — His. Succii libras duas et uncias duas, Sacchari libras quatuor; — Ba. Succii partem unam, Sacchari duas; — Vm. Succii partes duas, Sacchari partes tres cum dimidia; — Li. Succii partes tres, Sacchari quatuor; — Fer. C. Succii et Sacchari partes aequales; — T. ut syrupum limonum.

℞. Baccarum Ribium rubrorum libras centum.

Enucleatas in pelvim immitte, calefac agitando, donec nuclei sint disrupti, infunde supra cribrum e crinibus textum in pulpam converte et succo obtento adde

Succi Cerasorum acidorum libras quinque.

Mixturam in cavam frigidam sepone, coagulum stupae e virgulis salicinis flexae opie divide, cola et cuique librae succi obtenti Sacchari uncias viginti octo adde.

Potus acidus, Tisana acidula. (Au.)

℞. Syrupi Ribium,
— Rubi Idaei,
— Berberum,
singulorum unciam unam.
Aeque bullientis . . libras duas.

Ricinus.

Ricinus communis, L.; Wunderbaum; Ricin commun (Gal.); Palma Christi (Ang.); Skocei wettsj (B.); Purgerkorn (D.); Ricino (His.); Ricino, Capuzia, Fagiolo di Roma, Mirasole, Palma Cristi, Zecca (I.); Wonderboom (Bel.); Mamona (Pol.); Eranda (Sa.); Undertraed (Succ.); Vullak unay (Tam.); Amidum (Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wuir. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Sp. Z.

© (Monoecia Monadelphia, L.; Euphorbiaceae, J.) Ein im südlichen Europa und nördlichen Africa wachsender Baum. (Blackw. t. 148. Plenck t. 690, Schk. t. 312. Dict. d. Sc. nat. cah. XI. Fl. méd. VI. 298. Bert. Bild. VII. 87. f. 1.)

Man wendet den Saamen (semen Ricini) an; er ist eiförmig länglich und auf beiden Seiten platt. Er enthält unter einer dünnen, glänzenden, bräunlichen, grau und weiß marmorirten Schale, an welcher der gelbliche Nabel hervorsteht, einen weißen, öligen Kern.

Oleum Ricini s. Palmae Christi.

1) Wie man es im Handel findet.

Bor. Bor4. D. Du. Ed. Hass. HassP. Lon. LonN. O. Pol. Sa.

2) Besonders bereitet.

A. Am. Ams. An. B. Bel. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. His. Li. Lon. Lus. R. Sax. Suec. Wuir. Br. C. Fi. Sw. T. Vm. ℞. Seminum Ricini maturorum et a tegmine germinaeque liberatorum quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo pistilli lignei ope; pastam in panno et tela arctioris texturae inclusam sensim exprime et oleum caloris balnei aquae ope filtra.

Figuiet semina cum Spiritu venali contundero, pastam prelo submittere, ex oleo profluenti alcoholis elicere trientes duos et residuum distillationis coquere, donec omnis humor evanuerit. (GalH.)

Ein schlechtes Verfahren.

GalH. T. torrere jubent semina in olla ferrea, post refrigerationem contundero, pastam cum Aquae certa quantitate diluere et totum, continue agitando, super igne ad bullitionem usque tenere, semovere deinde omnem materiam tumidam oleo supernatantem, seorsim calefacere, ut aqua evaporet et oleo separato, illam per manicam trajicere, seponere et decanthare.

Das Ricinusöl ist oft scharf, welches bald von dem Schälchen bald vom Keim herrührt. Pecanu und Bossu haben aus dem Del bei der Destillation zwei Säuren gezogen, Ricinus- und Delricinusäure (Acidum ricinicum und oleo-ricinicum), welche sich mit einer dritten, der Stearocinsäure (A. stearo-ricinicum) auf Einwirkung der Alkalien bilden; die beiden ersten finden sich im alten Oele und von ihnen rührt die Schärfe desselben her.

Frisch ist das Ricinusöl ein mildes Abführmittel und wird oft als Wurmmittel angewendet. — Gabe, zwei Drachmen bis drei Unzen oder einen Eßlöffel stündlich, bis der erwartete Erfolg eingetreten ist.

Emulsio pignus. (Gal. Au. B. Ca. E. Pic. Sm. Vm.)

℞. Olei Ricini . . . unciam unam
Cum Vitello Ovi et Amygdala una amara contritum solve in

Decocti Carnis . . . uncias tribus.
Sogleich zu nehmen. (B.)

℞. Olei Ricini,
Emulsionis Amygdalarum amararum,
Decocti Carnis,

singulorum uncias duas.
Eßfelweise zu nehmen. (B.)

℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
— Amygdalarum dulcium sesquiunciam.

- Emulsionis gummosae . . . uncias quatuor.
 Mündlig zu nehmen. (B.)
- ℞. Ricini . . . uncias tres.
 Mucilaginis Gummi Arabici . . . drachmas duas.
 Aquae Menthae . . . uncias octo.
 Gabe, alle halbe Stunden zwei Eßfel.
 (Au.)
- ℞. Olei Ricini . . . unciam unam.
 Gummi Arabici . . . drachmam unam.
 Syrupi Althaeae . . . semunciam.
 Aquae Florum Sambuci . . . sesquiunciam.
 Aetheris nitrici . . . drachmam unam.
 Laudani Sydenhami . . . scrupulum unum.
 Gabe, alle Stunden einen Eßfel.
- ℞. Olei Ricini . . . sesquiunciam.
 Gummi Arabici . . . drachmas duas.
 Sacchari albi . . . drachmam unam.
 Aquae Menthae . . . uncias quatuor.
 Tincturae Opii guttas quadraginta ad quinquaginta.
 Gabe, alle Stunden einen Eßlöffel. (E.)
- ℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
 Vitellum Ovi . . . no. 1.
 Syrupi Althaeae . . . uncias duas.
 Aquae . . . uncias decem.
 Gabe, alle halbe Stunden zwei Eßfel (Au.)
- ℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
 Sacchari albi . . . semunciam.
 Vitellum Ovi . . . no. 1.
 Aquae Rosarum . . . uncias decem.
 Gabe, zwei Eßfel alle halbe Stunden.
 (Au.)
- ℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
 Vitellum Ovi . . . no. 1.
 Syrupi Althaeae . . . unciam unam.
 Contere, sensim addendo
 Aquae purae . . . uncias octo.
 — Cinnamomi hordeatae . . . drachmas duas.
 Miscere bene. (Sm.)
- Gal. Olei unciam unam, Vitelli Ovi partem dimidiam, Aquae purae uncias duas, Aquae Florum Aurantiorum et Syrupi Sacchari, singulorum semunciam; — Ca. Olei unciam unam, Aquae purae uncias duas, Vitelli Ovi quantum sufficit, Syrupi Cichorii compositi et Aquae Florum Aurantiorum, singulorum semunciam; — Vm. Olei partes duas, Vitelli Ovi unam, Syrupi Sacchari, Aquae Florum Aurantiorum, singulorum unam et Aquae purae quatuor.
- ℞. Olei Ricini . . . unciam unam.
 Vitellum Ovi . . . no. 1.
 Aquae Hyssopi . . . uncias octo.
 Magnesia albae,
 Mannae,
 singularum drachmas duas.
 Fiat emulsio. (Pie.)

Haustus catharticus oleosus, Potio purgans, Mixtura laxans. (Au. B. Bo. ParC. Ra. Sw.)

- ℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
 Syrupi Limonum . . . unciam unam.
 Miscere. (Ra.)
 Ra. praeterea Olei et Syrupi Cichorii partes aequales; — Bo. Olei et Syrupi Florum Persicae partes aequales.
- ℞. Olei Ricini unciam unam ad duas.
 Syrupi Sacchari . . . unciam unam.
 Gummi Arabici . . . drachmas duas.
 Aquae purae . . . uncias quatuor.
 Fiat potio. (Ra.)
- ℞. Olei Ricini unciam unam ad duas.
 Syrupi tartarici . . . unciam unam.
 Aquae Cichorii . . . uncias duas.
 Miscere. (Ra.)
- Ra. etiam Olei, Syrupi Rhamni, singulorum uncias duas, Aquae Menthae unciam unam; — vel Olei, Syrupi Cichorii, singulorum uncias duas, Aquae Menthae drachmas duas; — vel Olei drachmas sex, Oxymellis scillitici semunciam et Syrupi Rhamni unciam unam.
- ℞. Olei Ricini . . . unciam unam.
 Aquae Vitae,
 Sacchari, singulorum semunciam.
 Miscere. (Sw.)
- ℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
 Decocti Carnis . . . uncias tres.
 Auf einmal zu nehmen. (B.)
- ℞. Olei Ricini . . . unciam unam.
 Decocti Carnis cum Herbis . . . uncias quatuor.
 Miscere. (Sp.)
- ℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
 Saponis medicinalis . . . semunciam.
 Syrupi Corticum Aurantium . . . uncias tres.
 Gabe, alle halbe Stunden einen Eßfel.
 (Au.)
- ℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
 Subcarbonatis Potassae . . . drachmam unam.
 Mellis . . . unciam unam.
 Aquae Tiliae . . . uncias decem.
 Gabe, zwei Eßfel alle zwei Stunden.
 (Au.)
- Potio anthelmintica oleoso - aromatica.* (B.)
- ℞. Olei Ricini,
 Aquae Menthae piperitae,
 singulorum uncias duas,
 Auf einmal zu nehmen.
- Clysmo emolliens anthelminticum, Ene-ma vermifugum.* (B.)
- ℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
 Decocti Seminis Lini . . . uncias quatuor.

Robinia.

Robinia Pseudo-Acacia, L.; Unächter Acaciendbaum; Robinier, Faux Acacia (Gal.); False Acacia (Ang.).

Gal.

Ein Baum (*Diadelphia Decandria, L.*; *Leguminosae, L.*), welcher in America einheimisch und in Europa angepflanzt ist. (Nouv. Duh. II. t. 16.)

Die Rinde wirkt purgirend und brechen- erregend.

Rosa.

Fünf Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Rosa Centifolia, L.*; Centifollenerose; Rosier à cent feuilles (Gal.); Hundred leav'd rose (Ang.); Ruze cewena (B.); Fyld rose, raed rose (D.); Rosa de Alexandria (His.); Damask rozen (Bel.); Roze cent'jfoliie (Pol.); Rosa (R.); Rosor (Succ.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wür. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

Ein Strauch (*Icosandria Polygynia, L.*; *Rosaceae, J.*), welcher in allen Europäischen Gärten cultivirt wird. (Zorn Ic. pl. t. 600.)

Man wendet die Blüten (fiores Rosarum incarnatarum s. pallidarum, petala Rosae Centifoliae) an; sie haben eirunde, ganze, blaßrosenrothe Blätter von sehr angenehmem Geruch, welcher sich beim Trocknen fast ganz verliert; der Geschmack ist etwas bitter, scharf und styptisch.

2) *Rosa moschata, Ait.*; Moschusrose; Rose musquée (Gal.).

Gal.

Ein in Nordafrika einheimischer Strauch. Die Blüten dienen, nach Willdeñow, zur Bereitung der Rosenessenz.

3) *Rosa alba, L.*; weiße Rose; Rose blanche (Gal.).

Br. Gal. Wir. Be. M. Sp. Z.

Ein in ganz Europa verbreiteter Strauch. (Oed. Fl. Dan. t. 1215.)

Die Blüten (fiores Rosae albae) haben einen angenehmen Geruch und einen etwas bitteren, styptischen Geschmack.

4) *Rosa gallica, L.*; Essigrose, Provinzrose, Damascenerrose; Rose rouge, Rose de Provins (Gal.); Red rose (Ang.); Edikerose (D.); Rosa rubra, Rosa castellana (His.); Fransche rosen (Bel.); Roza damascens-
Pharmacopoea universalis. II.

kie (Pol.); Rosa vermelha (Lus.); Raetikeroser (Succ.).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Sp.

Ein Strauch des südlichen Europa's. (Blackw. Herb. t. 82. Plenck t. 402. Düss. off. Pfl. IX. t. 21.)

Man wendet die Blüten (fiores Rosae rubrae, petala Rosae gallicae) an, wenn sie noch nicht ausgebreitet und von den Nägeln getrennt sind.

5) *Rosa canina, L.*; Hundrose; Hahnbuttenstrauch, Hagebutten; Rosier sauvage, Églantier (Gal.); Dogrose (Ang.); Ssypek, Plana ruze (B.); Hybentorn (D.); Rosa silvestre (His.); Hondsrose (Bel.); Rosa selvetica, Cinerodon, Cinosbator, Grattaculo, Paterlenga (I.); Roza pulna (Pol.); Rosa brava (Lus.); Niupon (Succ.).

Ams. An. Br. D. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. His. Lon. LonN. Wir. Be. Br. C. Fi. Pid. Sp. Z.

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (Blackw. t. 8. Plenck t. 401. Zorn Ic. pl. t. 529.)

Man wendet die Blüten, die Früchte und die Saamen an.

Die Blüten (fiores Rosae sylvestris s. rubrae vulgaris) haben rosenrothe oder fast weiße Blätter von einem süßen und angenehmen Geruch; sie süßen gelind ab.

Die Frucht, Hagebutte, Hahnbutte (fructus Cynosbati, Cynorrhodon) Grattaculo (Gal.) ist eine eirunde, glatte, scharlachrothe Beere, welche man, nachdem man die Saamen und die ihnen anhängenden Borsten herausgenommen, trocknet, oder aus denen man auch das breite Fleisch auspreßt (pulpa baccarum Cynosbati expressa). Der Geschmack ist etwas styptisch. Man hält sie für harntreibend und krampfstillend; doch ist es wohl eher ein abstringirendes und sehr kräftig reizendes Mittel, dessen Mißbrauch Husten, Erbrechen und Tenesmus verursacht.

Die Saamen (semina Cynosbati) sind länglich, eckig, hart und behaart. Man wendet sie heutzutage nicht mehr an.

Alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger abstringirend und tonisch.

Succus Rosarum pallidarum. (Gal. His. Sar.)

R. Petalorum Rosarum pallidarum mundatorum quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo vel ligneo et cola fortiter exprimendo; succum filtratum in lagenis a strato olei obtectum serva. (Gal. His.)

Sar. Flores in saccum inclusos sub

Aquam bullientem, demergere, saccum tam diu suspensum tenere quam aqua viridescens profluat, et simulac haec rubra prodit, exprimere.

Conserva s. Confectio Rosae s. Rosarum. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Ca. Fi. Pid. Sw. T. Vm.)

℞. Petalorum Rosarum recentium et mundatorum partem unam.

Contunde in mortario lapideo pistilli lignei ope; pulpaesensim adde

Sacchari pulverati partes duas.

Fiat massa homogenea. (An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Ham. Hass. HassP. His. O. Pal. Pol. R. Sax. Wir. Wür. Br. Sw. T. Vm.)

Ant. Ams. Du. Ed. Li. Lon. LonN. C. Rosarum partem unam et tres Sacchari; — GalM. et Suec. Rosarum et Sacchari partes aequales.

℞. Petalorum Rosarum recentium partes quindecim.

Sacchari pulverati partes triginta.

Contere, pulpam per cribrum e cribnis confectum trajice et adde

Sacchari albi ad electuarii consistentiam cocti et parumper refrigerati partes centum viginti.

Misce sedulo. (Gal.)

℞. Petalorum uncias sex, Sacchari duas et colaturae addere Sacchari ad plumam cocti libras quatuor; in evaporatorio vel soli exposita ad crustae apparitionem evaporare.

℞. Petalorum Rosarum recentium libram unam.

Contunde in mortario vitreo, sensim addendo

Syrupi Sacchari spississimi libras duas.

Humidum blando igne ad aptam consistentiam usque consume. (His.)

℞. Rosarum rubrarum mundatarum libram unam.

In saccum inclusas per aliquot tempus sub Aquam bullientem demerge, saccum tandiu suspensum tene, donec aqua rubra profluere coeperit, exprime tunc fortiter, contunde faeces in mortario et coque cum Sacchari clarificato libris tribus, succum expressum sensim addendo, ad consistentiam conservae. (Sar. Fi.)

℞. Petalorum Rosarum siccatorum pulveratorum partes nonaginta. Aquae Rosarum quantum sufficit ut massa pulpaeformis obtineatur. Macera per horas sex, saepius agitando, adde Sacchari in Aqua Rosarum

soluti et ad crystallisationis punctum cocti partes mille et sedulo in mortario rmoreo pistilli lignei ope commisce. (Gal.)

GalM. Aquam communem, sex horas digestionis blando calore et mixtionem pulpaes cum Sacchari quantitate aequali; — Lus. Pulveris uncias tres, Aquae Rosarum uncias octo, horas sex infusionis et Sacchari albi sesquilibram; — Ca. Pulveris uncias sex, Aquae Rosarum sufficientem quantitatem et Sacchari semilibram; — Fer. Fi. T. Pulveris uncias tres, Aquae Rosarum octo et Sacchari libras duas.

℞. Pulveris Petalorum Rosarum uncias tres.

Aquae Rosarum uncias octo.

Post aliquot dies macerationis adde Sacchari albi sesquilibram

antea cum Aquae sufficiente quantitate ad syrupum spissum redacti et misce exacte. (Gen.)

Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Conserva Rosarum virioliata. (Br. Sar. Wir. T.)

℞. Conservae Rosarum libram unam. Acidi sulphurici drachmam unam.

Misce bene. (Br. Sar.)

Wir. Acidi sulphurici duplum; — T. Spiritus Vitrioli guttas decem pro uncia una.

Conserva Rosarum mercuriata s. anthelmintica. (Fi.)

℞. Conservae Rosarum rubrarum recentium sesquiunciam.

Mercurii purissimi unciam dimidiam.

Agita ad extinctionem mercurii. — Gabe, für Kinder eine halbe, bis ganze, für Erwachsene zwei Drachmen und nach Erforderniß mehr.

Tabellae rosatae s. Manus Christi.

Conserva Rosarum sicca, Saccharum rosatum. (Br. Pal. Sar. Wir. Sp. T.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum siccorum unciam unam.

Sacchari ad congelationis punctum cocti uncias sedecim.

Misce bene, ut fiant tabellae. (Wir. Sp.)

Br. Pulveri Rosarum antea adspersere jubet Acidi sulphurici guttas duodecim; — Pal. Pulveris drachmas sex et Sacchari cocti uncias quatuor.

℞. Rosarum stecarum unciam unam.

Sacchari albi ad consistentiam tabulati cocti sesquilibram.

Succi Citri drachmas duas.

Rosis pulveratis adspere succum Citri et totum cum saccharo bulliente commisce; fiant tabellae. (Sar.)

℞. Sacchari albi libram unam.

Aquae Rosarum quantum sufficit.

Coque ad aptam consistentiam, ut fiat tabellae. (Pal.)

Addendo sub finem Margaritarum praeparatarum semunciam, Saccharum perlatum obtinebis.

T. ut rotulas Menthae piperitae. Tabellae diarrhodon. (Sar.)

℞. Pulveris diarrhodon sesquunciam. Sacchari albi . . . librum unam. Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit

ut fiant tabellae.

Pulpa Cynorrhodontis. (Gal. T.)

℞. Fructuum Cynosbati nondum penitus maturorum partes sedecim.

Umbilico et pediculo rescisis et seminibus separatis reliquum macera per tres vel quatuor dies in Vini albi partibus duabus ad mollitiem completam usque, contunde deinde pistilli lignei ope in mortario maxoreo et pulpam per cribrum setaceum arctioris texturae trajice.

Conserva s. Confectio s. Roob Cynosbati s. Rosae gallicae s. Fructus Rosae caninae, (B*. Ed. Ful. Gal. Gen. Lon. LonN. Lus. Pal. Sar. Wir. Fi. Sp. T. Vm.)

℞. Pulpae Cynorrhodontis, Sacchari albi, singulorum libras tres.

Evaporent blando igne ad aptam usque consistentiam. (Gen. Sw)

Ful. et Pal. Pulpae libras duas et unam Sacchari; — Wir. Pulpae libras tres et duas Sacchari; — Lus. et Vm. Pulpae partem unam et duas Sacchari; — B*. Ed. et Sar. Pulpae partem unam et tres Sacchari; — Lon. LonN. Pulpae libram unam et Sacchari uncias viginti; — Gal. Fi. T. Pulpae partem unam et Sacchari ad consistentiam electuarii cocti (Syrupi ad pennam cocti) unam cum dimidia.

Schwach abstringend, harntreibend, frampffillend, magenstärkend. — Gabe, vier bis zwölf Drachmen.

Electuarium adstringens Fulleri, Conserva Rosarum rubrarum adstringens. (His. B. Bo. Pie. Sm.)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias duas. semunciam.

Diascordii . . . drachmas duas. Sanguinis Draconis sesquidrachmam.

Balaustiorum semidrachmam.

Olei Nucis moschatae, — Cinnamomi, singulorum guttas duas.

Syrupi Rosarum rubrarum unciam unam.

Misce. (His.)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias quatuor.

Nitri . . . drachmas unam.

Syrupi Diacodii unciam unam.

Aquae Florum Aurantiorum drachmas duas.

Misce. (Bo. Pie. Sm.)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias quatuor.

Syrupi Balsami Tolutani unciam unam.

Misce. (B.)

℞. Conservae Cynorrhodon uncias quatuor.

Syrupi Grausti drachmas duas.

— Papaveris albi unciam unam.

Nitri . . . scrupulos duos.

Misce. (Sm.)

Bei Blutspucken. — Gabe, einen Kaffeelöffel alle zwei oder drei Stunden.

Electuarium traumaticum. (Br.)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias duas.

Balsami Locatelli unciam unam.

Syrupi balsamici . . . semunciam.

Misce.

Linctus communis, Mixtura adstringens. (Sa. Sm.)

℞. Olei Olivarum uncias duas cum dimidia.

Conservae Cynorrhodon semunciam.

Syrupi Papaveris unciam unam.

Misce. (Sd.)

℞. Conservae Rosarum rubrarum uncias duas.

— Rosismarini, — Inulae, Syrupi Succini, singulorum unciam unam.

Misce. exacte. (Sm.)

Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich drei Mal.

Bei betäubeter Leberthor.

Tisana adstringens. (Bo. Pie. Sm.)

℞. Florum Verbasci manipulum unum.

Aquas . . . octarium unum.

Coquendo dimidium consume abim colatura solve

Conservae Rosarum rubrarum unciam unam.

Bon Fouquet gegen Ruhr empfohlen.

Infusum s. Mucharum s. Brodium Rosarum. (Fer. Hass. His. Li. Sar. Wir. Fi. Fid.)

℞. Petalorum recentium Rosarum libras duas.

Aquae Bullentia . . . libras octo.

Digere per dies octo, cola leviter.

exprimendo, colaturam aequali novorum Florum quantitati infunde, operationem tertia vice repete et liquorem denique in lagena longicollis a strato olei obtectum serva. (Sar.)

℞. Petalorum Rosarum recentium, Aquae bullientis, singulorum libras octodecim.

Post horas viginti quatuor macerationis cola, et liquorem in lagena a strato olei obtectum serva. (Wir.)

His. Rosarum libram unam, Aquae duas et octo dies infusionis; — Hass. et *Pid.* Rosarum rubrarum libram unam, Aquae octarium unum et aliquot dies infusionis; — *Li.* Florum et Aquae partes aequales et tres dies digestionis; — *Fer. Ki.* Florum et Aquae partes aequales et duodecim horas digestionis.

Dieser Aufguss dient besonders zur Bereitung des Rosensyrups und des Rosenhonigs.

Infusum Rosae acidulum s. compositum s. adstringens. (Am. B*. Du. Ed. Gen. His. Lon. LonN. Suec. Rr. C. Ra.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum siccatorum semunciam.

Aquae bullientis octarios duos cum dimidio.

Acidi sulphurici Aqua diluti drachmas tres.

Macerat per semihoram, cola et adde Sacchari albi sesquiunciam.

Liqua. (Am. B*. Lon. LonN. Suec. C.)

Ed. Rosarum unciam unam, Aquae libras duas cum dimidia, Acidi semunciam, quatuor horas digestionis et Sacchari unciam unam; — Du. Rosarum semunciam, Aquae libras tres, Acidi drachmas tres, horam dimidiam infusionis et Sacchari sesquiunciam; — *Br.* Rosarum unciam unam, Aquae libras quinque, Acidi sulphurici drachmam unam, infusionis horas viginti quatuor et Sacchari uncias duas; — *His.* Rosarum semunciam, Aquae libras tres, horae quadrantem infusionis, Acidi scrupulum unum et absque saccharo; — *Ra.* Rosarum semunciam, Aquae libram unam, Sacchari sesquiunciam et Acidi semidrachmam; — *Gen.* Rosarum semunciam, Aquae libras duas cum dimidia, Acidi scrupulum unum, et Sacchari sesquiunciam.

Schwach adstringirend, säuerlich. — Dieser Aufguss, welcher selten allein verordnet wird, dient besonders, um wässerigen Getränken Farbe und einen säuerlichen Geschmack zu geben. Auch wendet man ihn

als Beihilf verschiedenes Arzneimittel an; man setzt ihn ebenfalls zu Sargelwasser, doch verordnet man ihn auch bisweilen in passiven, d. h. von keiner Reizung herrührenden Blutflüssen.

Infusum (Thé) haemastaticum. (Pic.)

℞. Florum Rosarum siccatorum semunciam.

Aceti albi cochlearia tria majora.

Sacchari unciam unam.

Aquae bullientis libras duas.

Post duas horas infusionis cola. — *Tassenweise den Tag über. — Gegen Diarrhoe und Blutflüsse.*

Infusum adstringens. (Bo.)

℞. Rosarum rubrarum, Quinque Myrobalanorum contnsorum, singulorum semunciam.

Aquae communis libram unam.

Digere inter cineres calidos, cola et colaturae adde

Syrupi Granati semunciam;

Abstringirend, bei Diarrhoe und Blutflüssen empfohlen. — Auf drei oder vier Mal den Tag über zu nehmen.

Syrupus Rosarum rubrarum s. Rosae Gallicae s. e Rosis siccis, Rhodosaccharum. (Ams. An. Bel. Ed. Gal. His. Wir. C. Ki. T. Vm.)

℞. Succo Rosarum rubrarum depurati libras duas,

Sacchari albi libras quatuor.

Aquae quantum sufficit.

Coque ad consistentiam syrupi. (His.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum recentium libras quatuor.

Aquae bullientis libras octo.

Infunde per horas duodecim in vase tecto; exprime leviter, seponi per horas aliquot, decantha et liquori adde

Sacchari albi duplum.

Fiat balnei aquae ope syrupus. (Gal.)

Wir. Rosarum siccarum semilibram, Aquae bullientis sesquilibram, viginti horas macerationis et pro uncias novem colaturae Sacchari uncias sedecim; — An. et Bel. Florum libram unam, Aquae tres, horas duodecim digestionis et quatuor libras Sacchari.

℞. Petalorum Rosarum rubrarum recentium partem unam.

Aquae frigidae partes tres.

. bullientis partes septem.

Infunde per horas sex, trajice per cribrum absque diu continuata expressione et adde

Sacchari albi partes quatuor.

Clarifica, ut fiat syrupus. (Vm.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum siccorum partem unam.

Aquae bullientis partes novem.
Macera per horas duodecim, coque deinde parumper, cola et colaturae adde

Sacchari albi . . . partes decem.

Fiat coquendo syrupus. (Ed. C.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum siccatorum . . . uncias octo.

Aquae bullientis

libras quinque cum dimidia.

Digere per horas duodecim, coquendo dimidium consume, cola exprimendo, seponendo depura et ita inspissa, ut addendo

Sacchari puri . . . uncias sedecim syrupus absque coctione paretur. (Ams.)

T. ut syrupum florum Persicae.

Syrupus Rosae s. de Rosis pallidis s. Rosarum pallidarum s. rosatus simplex s. Rosarium solutivarum s. rosatus solutivus. (Ams. An. Ed. Fer. Gal. Gen. His. Lon. LonN. Sar. Wir. C. Fi. T. Vm)

℞. Succu Rosarum pallidarum expressi, Sacchari albi,

singulorum partes aequales.

Coque, blando igne, ad consistentiam syrupi. (Gal.)

Sar. loco sacchari Syrupum communem.

℞. Petalorum Rosarum pallidarum recentium . . . partem unam.

Aquae bullientis

partes quatuordecim.

Macera per horas duodecim, cola et colaturae adde

Sacchari albi . . . partes tres ut fiat coquendo syrupus. (Ed. C.)

His. Petalorum partes tres, Aquae bullientis sex; horas duodecim infusionis et Sacchari partes duas; — Fer. Petalorum partem unam, Aquae bullientis octo, infusionis horas viginti quatuor et Sacchari partes sex; — Fi. Rosarum pallidarum uncias sex, Aquae bullientis libras quatuor, digestionem inter cineres calidos per horas duodecim et post colationem; adjectis albuminibus duobus et Sacchari libris tribus, coctionem ad syrupi spissitudinem.

℞. Petalorum Rosarum pallidarum recentium . . . partem unam.

Contundendo in pastam redige et infunde

Aquae fervidae

partes duas cum dimidio.

Post horas duodecim macerationis cola leviter exprimendo, et colaturae adde

Sacchari albi . . . pondus aequale.

Clarifica et ad syrupi consistentiam inspissa. (Vm.)

℞. Petalorum Rosarum pallidarum recentium . . . libras duodecim.

Contunde in mortario marmoreo, tunc infunde per horas duodecim in

Aquae . . . libris quatuor.

Liquori expresso adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Clarifica et coque blando calore ad consistentiam syrupi. Singulis libris syrupi adde libram unam syrupi frigidipraeparati cum

Aquae Rosarum pallidarum . . . drachmis decem.

Sacchari albi . . . uncias duabus. Misc bene. (An.)

℞. Sacchari puri . . . libras duas, Aquae fontanae quantum sufficit.

Coque ad consistentiam syrupi, quem bullientem infunde

Petalorum recentium Rosarum pallidarum . . . libris duabus.

Post tres dies macerationis coque leviter et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

℞. Petalorum recentium Rosarum pallidarum . . . libram unam.

Aquae bullientis libras quatuor. Macera per horas duodecim, tunc coquendo dimidium consume, continue agitando; cola cum expressione et colaturae sepositione depuratae adde

Sacchari puri . . . libras duas.

Coque ad consistentiam requisitam. (Ams.)

℞. Petalorum siccorum Rosarum pallidarum . . . uncias septem.

Aquae fervidae betarjos quatuor.

Macera per horas duodecim, redige vaporatione in balneo aquae ad remanentiam liquidi octariorum duorum cum dimidio, adde deinde

Sacchari puri . . . libras sex.

Liqua in balneo aquae. (Lon. LonN.)

Fi. Rosarum pallidarum libras sex et Aquae communis duodecim in alembicum ingerere, destillando libras quatuor aquae odorosae abstrahere; quod in alembico remanet fortiter exprimere et hoc fluidum sepositione depuratum cum Sacchari libris duabus et dimidia ad syrupi consistentiam coquere; — T. ut syrupum florum Persicae.

℞. Petalorum Rosarum pallidarum . . . libras quatuor.

Aquae bullientis . . . libras octo.

Infunde per horas viginti quatuor, tunc cola fortiter exprimendo; colaturam digere supra novam quantitatem Rosarum, operationem tertia vice repetere et supremi liquoris uncias novem adde

Sacchari albi . . . uncias sedecim ut fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

Dies ist der *Syrupus Rosarum solutus*. Der *Syrupus Rosarum simplex* wird mit demselben dreifachen Aufguss, aber bloß mit zwei und dreißig Unzen Zucker auf anderthalb Pfund Flüssigkeit bereitet.

Syrupus Rosarum solutus cum Senna s. de Senña rosaceus s. Rosarum compositus (Ams. Ba. Wür.)

R. Petalorum recentium Rosarum palidarum libram unam.

Aquae bullientis libras sex.

Macera per horas duodecim, tunc coque ad libram quatuor remanentiam, cola exprimendo et macera in liquore per horas duas.

Foliorum Sennae mundatorum uncias octo.

Cola exprimendo. Liquori sepositione depurato adde

Sacchari puri libras duas.

1. Coque ad consistentiam syrupi. Post refrigerationem adde

Olei essentialis Anisi,

— Foeniculi,

— singulorum guttas quinque.

Wir. infundere jubet Sennae unciae una libras duas infusi Rosarum palidarum et post aliquot horas digestionis colaturae addere duplum Sacchari puri ad parandum syrupum; — Ba. infundere per semihoram Petalorum partem unam et duas Sennae in Aquae fervidae octingenta octo et cuique parti colaturae addere Sacchari partes duas,

Mel rosatum s. rosaceum s. de Rosis s. Rosae Gallicae, Rhodomel, Mellis Rosarum. (A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. L. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Ei. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Petalorum siccorum Rosarum rubrarum partes unam.

Aquae bullientis libras sex.

Macera per horas duodecim, tunc coque blando igne, cola exprimendo, sepono, decantha et adde

Mellis despumati libras quatuor.

Evaporent lente ad syrupi consistentiam. (B.)

An. et GalM. Rosarum siccorum partem unam, Aquae quatuor, horas duodecim digestionis et Mellis partes sex;

Br. et Wir. Rosarum recentium partes sex, Aquae tantidem, digestionis horas viginti et Mellis partes sex; —

Pal. Rosarum recentium partes novem, Aquae duodecim, reductionem ad quinque colaturae et Mellis quatuor; —

Han. O. Pol. et Sw. Rosarum siccorum partes octo, Aquae quatuor, duodecim horas digestionis et Mellis par-

tes octo; — Ed. Rosarum siccorum partem unam, Aquae duodecim, horas sex digestionis et Mellis partes sedecim; —

Fenn. Lus. et Suec. Rosarum siccorum partem dimidium, Aquae tres, horas duodecim digestionis et Mellis partes sex; —

Bor. Rosarum siccorum partes quatuor, Aquae octo, horas duodecim digestionis et Mellis partes octo;

— Bor. Hass. Rosarum incarnatarum uncias octo, Aquae libras quatuor, digestionem per noctem et Mellis despumati libras octo; —

T. Petalorum uncias sedecim, Aquae Rosarum libras octo, duodecim horas infusionis et Mellis libras octo; —

Ba. Rosarum siccorum partem unam, Aquae octo, horas tres digestionis et Mellis duplum colaturae; —

A. et R. Rosarum siccorum partes tres, Aquae duodecim, tres horas digestionis et Mellis partes viginti quatuor; —

Br. Rosarum siccorum partem unam, Aquae quatuor, horas sex digestionis et Mellis partes quinque; —

Sp. Rosarum partes sex, Aquae tantidem, viginti quatuor, horas digestionis et Mellis octo partes; —

Sax. Rosarum siccorum partem unam, Aquae sex, duodecim horas digestionis Mellis, colaturae, pondus duplum; —

De. Ilon. LonN. et C. Rosarum uncias quatuor, Aquae octarios tres, horas sex digestionis et Mellis libras quinque; —

Gen. Rosarum siccorum uncias tres, Aquae libras duas, aliquot horas digestionis et Mellis libras duas cum dimidia; —

Ams. Rosarum siccorum uncias octo, Aquae libras sex, horas duodecim macerationis et Mellis despumati libras duas.

R. Petalorum Rosarum rubrarum partem unam.

Aquae partes octo.

Infunde binis vobis, singula absque expressione cribranda; tum colatura albumen unum vel duo subige, ebulliant et per pannum colentur; adde

Sacchari albi partem unam.

Mellis albi partes quinque.

Evaporent ad syrupi consistentiam (Vm.)

R. Petalorum siccorum Rosarum rubrarum partem unam.

Decocti Calicum Rosarum a petalis separatorum partes quatuor.

Infunde per horas duas, cola absque expressione et colaturae adde

Mellis electi partes sex.

Albuminis ope clarificata ad syrupi consistentiam evaporant (Gal.)

GalM. eundem agendi modum sed loco decocti calicum Aquam adhibet

Durch letzteres Verfahren kommt eine große Menge Gerbestoff und Galläpfeldure in das Product. Henry bemerkt aber, daß das zum Abdahren angezeigte Geweiß nothwendig, einen Theil des wirksamen Stoffes, durch seine Verbindung mit einem großen Theile des Gerbestoffs, vernichten müsse.

R. Succi depurati vel Infusi saturati Rosarum rubrarum

partem dimidiatam.
Mellis crudi . . . partem unam.
Commisce bene. (Hass.)

Id. ad syrumpi consistentiam coque-
re jubet Infusi Rosarum saturati un-
cias novem et Mellis despumati libram
unam; — His. Succi depurati Rosarum
et Mellis communis, singulorum partes
aequales; — Sar. Succi depurati par-
tem unam et Mellis despumati partes
duas; — Li. Infusi partem unam et
quatuor Mellis; — Wür. Infusi unam
et duas Mellis; — Per. Infusi et Mel-
lis, singulorum partes aequales.

R. Aquae Rosarum . . . unciam unam.
Mellis despumati uncias quatuor.
Misce. (D. Fer. Ful.)

Die Verschiedenheiten in der Bereitung
sind von keiner besondern Wichtigkeit, da
man sich dieses Honigs nur fast äußerlich
bedient. Er ist abstringirend und wird dar-
her in dieser Eigenschaft zu Surgetwässern,
Collutorien, Einspritzungen angewendet.

Mel rosatum solutivum. (Sar. Wir. Fi.)

R. Mellis boni . . . libras duas.
Succi Rosarum pallidarum
libras tres.

Coque, despuma, et lente ad consi-
stentiam requisitam consume. (Wir.)

Sar. Mellis et Succi depurati partes
aequales; — Fi. Infusi Rosarum, Mel-
lis despumati, singulorum partes ae-
quales ad aptam consistentiam redige-
re jubet.

Selten innerlich, zuweilen zu Klystiren. —
Gabe, von anderthalb bis zwei Unzen.

Gargaria commune s. detergens.
(GalM. Gen. Ra. Sm. Sp.)

R. Infusi Rosarum aciduli semilibram.
Mellis rosat. . . unciam unam.

Misce. (Gen.)

R. Mellis rosati . . . partes quindecim;
Decocti Hordei . . . partes centum

Misce bene. (GalM.)

Ra. Mellis rosati unciam unam et
Decocti Hordei libram unam.

R. Foliorum Agrimoniae
namipulum unum.

— Salviae pugillum unum.

Aquae . . . semisextarios tres.

Coque per horas quadrantem et co-
laturae adde

Mellis rosati . . . uncias duas.

Misce bene. (Sm.)

R. Hordei integri . . . unciam unam.

Aquae . . . uncias triginta duas.

Decoque ad dimidii remanentiam et
adde

Foliorum Agrimoniae,

— Rubi,

singulorum pugillos duos.

Cola et in colatura solve

Nitri . . . drachnam unam.

Mellis rosati . . . unciam unam.

Misce bene. (Sp.)

Collutorium detergens s. adstringens.

(B.)

R. Mellis rosati . . . unciam unam.

Decocti Hordei . . . libram unam.

Tincturae Laccae guttas viginti.

Misce.

R. Mellis rosati . . . unciam unam.

Spiritus Cochleariae,

Liquoris Hoffmanni,

singulorum guttas triginta.

Decocti Hordei libras duas.

Misce.

R. Mellis rosati . . . unciam unam.

Decocti Hordei . . . libram unam.

Liquoris Hoffmanni guttas triginta.

Misce.

Tinctura Rosarum. (Vm.)

R. Petalorum recentium Rosarum

Provincialium . . . partem unam.

Aquae Vitae . . . partes quatuor.

Macerata frigide per dies duos, cola
exprimendo et filtra.

Acetum Rosae s. Rosarum. (Bor. Bor4.

Br. D. Fer. Han. HassP. His. Lus.

O. Pal. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir.

Wür. Fi. T. Vm.)

R. Petalorum Rosarum rubrarum

partem unam.

Aceti rubri . . . partes sedecim.

Macerata per horas quatuordecim in
vase tecto, subinde agitanda, cola et
filtra.

Sar. Rosarum partem unam, Aceti
quatuor, sex dies macerationis et infu-
sionem semel vel bis repetitam supra

novas Flores, ita ut acetum magis sa-
turatum obtineatur; — Bor. D. Fer.

Han. O. Pol. Sax. et Vm. Rosarum
partem unam, octo Aceti et dies de-
cem frigidae macerationis; — Bor4.

Rosarum rubrarum uncias tres, Aceti
ferventis quatuordecim sufficit, ut post ho-
ram colata sesquialteram acetum praee-
beant; — Wür. Rosarum partem unam,
Aceti novem, et tres septimanas ma-
cerationis solis calore; — Suec. Fi. T.

Rosarum partem unam, Aceti duode-
cim et quatuor (sex Fi. octo) ad de-

cem) dies macerationis; — Br. Pal. et Wir. Rosarum partem unam et Aceti sex.

R. Petalorum siccorum Rosarum rubrarum ab unguibus separatorum libram unam.

Aceti albi libras octo.
Macera per aliquot dies soli exposita vel aliquot horas in balneo aquae; cola exprimendo et adde.

Aquae Vitae uncias duas.
Misce (His.)

Lus. infundere jubet per dies sex Rosarum libram unam in libris sex Aceti, parumper coquere, et addere Alcoholis semilibram; — HassP. Rosarum unciam unam, Aceti Vini duodecim, macerationem frigidam per septimanam et Spiritus Vini rectificati unciam unam.

Acetum Rosarum compositum. (Sw*. Vm.)

R. Florum siccatorum Rosarum rubrarum

partem unam cum dimidia.
Florum siccatorum Rhois

partem unam.
Vini Cydoniorum partes quatuor.

Aceti rubri partes decem.
Macera frigide per dies decem, cola leviter exprimendo et filtra. (Vm.)

Sw*. Rosarum partem unam, Rhois unam, Aceti duodecim et infusionem blandi caloris ope.

Abstrahend, säutnißwidrig, äußerlich bei Blutflüssen und Erythemen.

Oleum Rosarum s. rosatum. (Br. Gal. His. Sar. Wir. Fi. T.)

R. Rosarum recentium partem unam cum dimidia.

Olei Olivarum partes tres.

Digere per dies duos in balneo aquae, exprime post refrigerationem et operationem semel adhuc repete. (Sar.)

Fi. Rosarum libram unam, Olei quatuor, macera per duos dies, coque per horae quadrantem, exprime et oleum decantha; — T. ut oleum iridis.

R. Rosarum contusarum partes quatuor.

Olei Olivarum partes quinque.

Post octo dierum soli expositionem coque ad consumptionem humiditatis et cola cum expressione. (Br. His. Wir.)

R. Rosarum contusarum partem unam.

Olei Olivarum partes quatuor.

Per tres dies soli exposita cola exprimendo et operationem his repete, suprema vice illam per tres menses producendo.

Gegen Großbeulen gerührt.

Oleum Rosarum aetherum, Aetheroleum Rosarum. (Bor4. Gal. Sar. T.)

R. Petalorum repositum Rosarum

partes quinque.
Aquae partes septem.
Destillant. (Gal.)

Sar. Rosarum partes viginti quinque, Aquae septuaginta quinque et tres SaHS. Bor4. Oleum venale; — T. ut oleum florum aurantiorum.

Aqua Rosae s. Rosarum. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. D. Du. Ed. Penn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.)

R. Petalorum recentium Rosarum partes tres.

Aquae quantum sufficit.
ad prohibendum empyreuma. Destil-
lent partes octo. (Fer. Hass. Bid.)

Lus. Florum partes sex et Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent partes octo; — Fenn. et Suec. Florum partes tres, Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent partes sex; — Gen.

Florum partes quatuor, Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent partes sex; — Ams. B. et Bel. Florum partem unam et

Aquae quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillent partes decem; — Du. Florum libras sex et Aquae sufficientem quantitatem; destillent octarii octo; — Han. O. et Pol. Florum partem unam et Aquae quantum sufficit; destillent partes quinque; — Fi.

Rosarum libras tres, Aquae libras quindecim, post duodecim horarum digestionem destillent librae sex; — Am. Lon. et LonN. Florum libras octo et Aquae satis; destillent octarii octo; — An. Florum partem unam et quinque

Aquae; destillent partes quatuor; — Br. Florum partes tres et Aquae quindecim; destillent partes octo; — Sar. et Wür. Florum partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae; — Gal.

Florum partem unam et Aquae quatuor; destillet una pars; — R. Florum partes decem et Aquae quadraginta; destillent partes quindecim; — Ba.

Florum partem unam et novem Aquae; destillent partes tres; — Sax. Florum partem unam et decem Aquae; destillent partes quatuor; — Pal. et Wir.

Florum partem unam et Aquae tres; destillet dimidia pars; — Bor4. Florum Rosarum incarnatarum recentium libras quatuor, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti; — HassP. Rosarum pallidarum libras sex, caeterum

ut Bor4.; — IC. Rosarum Centifo-

liarum libras duas, Aquae quantum satis; destillent librae decem.

℞. Petalorum recentium Rosarum partes tres.
Aquae . . . partes duodecim.

Floribus in saccae tela confecto et in medio cucurbitae, ita ut aquam non attingat, inclusis destillent absque bullitione partes sex. (Ful. Li.)

℞. Petalorum recentium Rosarum partes quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit.
Salis culinarius . . . partem unam.

Destillent partes viginti. (Sw.)

A. Florum sale conditorum partem unam et octo Aquae; destillent partes tres; — D. Florum salitorum partem unam et sex Aquae; destillent partes tres; — Bor4. Florum sale conditorum libras sex, Aquae quantum sufficit; destillent librae viginti; — HassP. Florum salitorum libras septem, caeterum ut Bor4.; — T. Rosarum gallicarum vel albarum quantum placet, Aquae salitae (Aquae partes 100, Salis marini 5) pondus duplum; destillet dimidia pars.

℞. Petalorum recentium Rosarum partes decem.
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— purae partes centum sexaginta.

Destillent partes quadraginta. (Vm.)

℞. Petalorum recentium Rosarum libram unam.
Aquae . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; macera per duos dies; destillent librae decem, tunc producto adde

Aquae Vitae . . . uncias quinque.

Misce bene. (Ed. C.)

☞ Gabe, eine bis zwei Unzen.

Spiritus Rosarum. (Bor4. Br. Pal. Sax. Wir. T.)

℞. Rosarum recentium partes duas.
Alcoholis,
Aquae, singulorum partem unam.
Destillet una pars. (Sax.)

℞. Petalorum Rosarum libram unam.
Vini albi . . . libras decem.
Alcoholis . . . sesquibram.

Destillet dimidia pars, productum novis Floribus infunde et destillet de novo dimidia pars. (Br. Wir.)

℞. Petalorum Rosarum pallidarum libras duodecim.

Sacchari albi . . . libras duas.

Fermenti . . . aemilibram.

Aquae tepidae . . . libras triginta.

Fermentationi tamdiu subijce, donec odor vinosus non amplius evolvatur; destillent deinde et productum rectificetur. (Pal. Wir.)

℞. Olei Rosarum . . . scrupulum unum.
Spiritus Vini Gallici fortioris . . . uncias sex.

Mixta filitrentur. (Bor4.)

T. Rosarum rubrarum librae decem macerant et solvant in balneo aquae calidae Alcoholis 35° B. libris quinque, donec tres quadrantes circiter obtentae sint.

☞ Herzstärkend, Nervenmittel, heutzutage nicht mehr gebraucht und auch ehemals häufiger äußerlich als innerlich.

Tinctura Florum Rosarum s. Rosarum acidula. (Bor. Bor4. Br. Han. O, Pol. Sax. Wir. Vm.)

℞. Petalorum Rosarum pallidarum semunciam.

Acidi sulphurici drachmam unam.

Aquae Rosarum uncias quatuor.

Digere per horas viginti quatuor, cola exprimendo et filtra. (Wir.)

Bor. Bor4. Han. O. et Sax. Petalorum sesquunciam, Acidi semunciam. Aquae bullientis uncias duodecim et duodecim horas macerationis; — Pol. Petalorum, Acidi, singulorum drachmam unam, Aquae unciam unam et tres horas macerationis.

☞ Kühlend, kindernd. — Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Julapium rosatum s. Rosarum s. regium, Syrupus regius s. alexandrinus. (Br. Hass. Pal. Wir. Pid. Sp.)

℞. Aquae Rosarum . . . uncias viginti.
Sacchari albi

libras duas cum dimidia.

Ebulliant semel et colentur. (Pal. Wir. Sp.)

Br. Aquae uncias sedecim et Sacchari libras duas cum dimidia; — Hass. et Pid. Aquae uncias novem et Sacchari sedecim.

Collyrium adstringens. (Ra.)

℞. Aquae Rosarum,
Infusi Melliloti,
singulorum uncias quatuor.

Misce.

Mixtura detergens. (Sm.)

℞. Aquae Rosarum . . . uncias tres.
Cremoris Lactis,

Albuminis,

Syrupi Violarum,

singulorum unciam unam.

☞ Von Boerhaave bei Schwämmchen und Geschwulst des Zahnfleisches in Gestalt von Collutorien.

Unguentum rosatum s. Rosarum s. pomadinum s. refrigerans s. Aquae Rosae. (Am. B*, Bor. Bor4. Br. Fann.

Res. Pul. Gal. Han. Mass. Hass. Hs. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Axungiae Porci . . . quantum vis.
Adde, continue cum pistillo ligneo agitando,

Aquae Rosarum quantum sufficit vel tantum, donec axungia alborem niveum acceperit. (Sax. Suec.)

Fenn. et Lus. Axungiae partes octo et Aquae Rosarum unam.

R. Axungiae Porci . . . unciis triginta duas.

Guttatim instilla Aquae Rosarum unciis quatuor.

Quando mixtura alborem sufficientem accepit, adde Oleum essentielle ali quod, ut forte illud Lavandulae. (R.)

Br. Wir. et Wür. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae libram unam et Olei Ligni Rhodii guttas duodecim; —

Sp. Axungiae in Aqua Rosarum lotae unciis duodecim et Olei Ligni Rhodii guttas sedecim; — Sw. Axungiae in Aqua Rosarum lotae libram unam et Olei Ligni Rhodii drachmam unam.

R. Axungiae Porci . . . libras duas. Sebi ovilli . . . unciis tres.

Liquata simul infunde in Aquam Rosarum, agita bene et refrigerata sicca. Libris singulis addere potes Olei Ligni Rhodii drachmam unam. (Br.)

Am. et C. liquare jubent Cetaei semunciam et Ceræ albae drachmam unam in Olei Amygdalarum dulcium unciis duabus, addere Aquae Rosarum unciis duas et ad refrigerationem usque agitare.)

R. Axungiae Porci in Aqua Rosarum lotae . . . unciis octo.

Ceræ albae . . . unciis duas. Liqua lente et post refrigerationem sensim adde

Aquae Rosarum . . . unciis tres. Olei essentialis Citri . . . drachmam unam.

Misce bene. (Bor. Han. Pal.)

Bor. Aquae Rosarum unciis duas absque oleo; — Vm. liquare jubet Ceræ albae partes unam, addere Axungiae partes quatuor et sensim addere Aquae Rosarum sesquunciam; — Ful. Terere Axungiae unciis triginta duas cum Aquae Rosarum unciis quatuor, liquare deinde axungiam prope ignem, ab aqua separare et terere cum Olei essentialis Citri guttis sexaginta; — Li. Conterere Axungiae libram unam et Aquae Rosarum, Aquae Florum Aurantiorum, singularum duas, axungiam liquare, ab aqua separare et terere cum Olei Bergamottae guttis viginti qua-

tuor et Olei Lavandulae guttis quindecim.

R. Axungiae Porci . . . libram unam. Aquae Rosarum, . . . Florum Aurantiorum, . . . singularum unciis duas.

Olei essentialis Citri . . . guttas viginti quatuor.

— Lavandulae . . . guttas quindecim.

— Caryophyllorum . . . guttas duodecim.

Misce. (Hass. O. Pid.)

Sw. Axungiae libram unam, Aquae Florum Aurantiorum semunciam, Aquae Rosarum unciis tres, Oleorum Citri, Lavandulae et Caryophyllorum, singularum guttas duodecim.

R. Axungiae Porci . . . unciis decem. Ceræ albae . . . unciis duas.

Liqua et adde Aquae Rosarum . . . unciis tres.

— Florum Aurantiorum . . . unciam unam.

Seponere per horas viginti quatuor, decantha aquam et axungiam tritura cum

Olei essentialis Lavandulae, . . . Citri, . . . singularum semidrachma.

Misce bene. (Br.)

Hass. Axungiae Porci libram unam, Ceræ albae unciis tres, Aquae Florum Naphae, Aquae Rosarum, singularum unciis duas, Olei de Cedro guttas viginti quatuor, Olei Bergamotte, Lavandulae, singularum guttas duodecim.

R. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae unciis duodecim.

Adde sensim, continue terendo, Aquae Rosarum . . . unciis tres.

— Florum Aurantiorum, . . . Spiritus Rosarum, . . . singularum semunciam.

Olei essentialis Lavandulae . . . semidrachmam.

— Ligni Rhodii, . . . Citri, . . . singularum guttas sedecim.

Misce bene. (Sp.)

R. Olei Rosarum infusi, libram unam. Ceræ albae . . . unciis tres.

Liquata simul et mixta in Aqua lava et subige, donec alba sint, reddita. (Wir.)

Sar. Olei rosati sesquilibram et Ceræ unciis sex.

R. Axungiae Porci . . . libras tres. Storacis Calamita, . . . Benzoes, . . . Iridis Florentinae, . . . singularum unciam unam.

Fructus Citri, . . .

Fructus Aurantium, singulorum no. 2.
 Poma Renetia no. 4.
 Coque ad consumptionem humidi et adde
 Olei essentialis Cinnamomi,
 Caryophyllorum, singulorum guttas viginti quinque.
 Subige totum cum Spiritu Rosarum per fermentationem (Pal.).
 R. Caryophyllorum drachmas duas.
 Cinnamomi,
 Benzoës,
 Storacis Calamita, singulorum drachmas tres.
 Macidis scrupulos duos.
 Lavandulae,
 Ligni Aloës,
 Rhodii, singulorum drachmam unam.
 Sassafras semidrachmam.
 Iridis Florentinae unciam unam.
 Aquae Rosarum semilibram.
 Axungiae Porci libram unam.
 Rulpae Pomorum Benetianae uncias sex.
 Sebi hircini uncias quatuor.
 Coque lente, digere deinde per tres dies; coque iterum ad omnis aquae consumptionem; colaturam cum Aqua Rosarum subige, donec albescat et adde
 Olei Ligni Rhodii guttas viginti.
 Misce bene. (B^t.)
 Dose. Formel. *Inguentum pomadinum*, ist von Gartheuser.
 R. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae, Rosarum pallidarum contusarum, singularum partes aequales.
 Sepone per dies duos, tunc axungiam liqua et in ea macera Rosarum aequalem copiam per duos dies, filtra, faeces exprime, liquefac deinde in balneo aquae et sepone. (Gal. T.)
 Br. liquare simul jubet Axungiae libras duas et Sebi uncias tres, addere Rosarum rubrarum contusarum uncias duas et Alcanthae semunciam, colare et lente, spatulae ope agitando refrigeracere; — Sar. Digerere per tres dies in balneo Aquae Rosarum rubrarum et pallidarum, singularum libras duas in Axungiae sex, exprimere, addere Ceracae uncias sex, liquare inter cineres calidos et seponere, ut refrigerent.
 R. Axungiae Porci libras duodecim.
 Petalorum Rosarum pallidarum libras sex.
 Post tres dies macerationis coque ad humidi consumptionem et cola exprimendo. (His)
 Pal. et Wir. coquere jubent Axungiae libram unam cum Rosarum uncias quatuor ad humidi usque consum-

ptionem, colare exprimendo et addere Essentiae Rosarum grana tria; — R. Axungiae libras viginti, Petalorum recentium Rosarum libras quindecim, Aquae Rosarum libras septem; mixta sepona, per dies quatuor in balneum aquae immerge, coque per horas duas, exprime etc.

R. Axungiae Porci libras novem.
 Sebi ovilli libram unam.
 Petalorum recentium Rosarum libras novem.
 Digere petala per unum diem in utroque adipe et cola exprimendo. (Per.)

Species de Hyacintho. (Br. Pal. Wir.)

R. Hyacinthi praeparati,
 Bos Armenae,
 Terrae Lemniae,
 Corallii rubri praeparati, singulorum sesquidrachmam.
 Margaritarum orientalium praeparatarum,
 Smaragdi praeparati, singulorum drachmam unam.
 Cornu Cervi philosophice praeparati,
 Rasurae Eboris praeparati,
 Ossis Cordis Cervi praeparati,
 Radicis Fraxinellae,
 Tormentillae,
 Santali albi,
 Serrulati,
 rubri,
 Petalorum Rosarum rubrarum,
 Grayorum Kermes,
 Seminum Acetosae,
 Cetri,
 Portulacae,
 Croci,
 Myrrhae, singulorum scrupulos quatuor.
 Completae nominantur, si addis
 Ambrac griseae,
 Moschi, singulorum scrupulos quatuor.
 Fiat pulvis. — Schwach abstringent.
 — Gabe, ein halber bis ein ganzer Scrupel.
 Pulvis contra abortum. (Pal. Wir.)
 R. Granorum Kermes semunciam.
 Ligni Santali rubri,
 Petalorum Rosarum rubrarum,
 Corallii rubri praeparati,
 Rasurae Eboris, singulorum drachmas tres.
 Maastichis,
 Nucis moschatae, singulorum drachmam unam.
 Sacchari pondus omnium aequale. (Wir.)
 Pal. Kermetis drachmam unam, San-

tali rubri semidrachmam, Caryophyl-
lorum scrupulum unum, Nucis moscha-
tae scrupulos duos, Radicis Tormentil-
liae semidrachmam, Margaritarum,
Corallii rubri, Corallii albi, singulo-
rum scrupulum unum et Sacchari drach-
mas tres.

Sabe, eine Drachme. — Reizend und
habet eher Abortus befördernd, als verhü-
fend.

Pulvis cephalicus ruber. (Vm.)

℞. Pulveris Rosarum rubrarum,
uncias sex.
— Acidi tartarici semunciam.
Iridis Florentinae
uncias sex.

Misce et massam cum Aqua Rosa-
rum humecta.

Pulvis nasalis odoratus. (Pal.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum
drachmas sex.

Florum Calcitrapae,
— Calendulae,
— Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.

Iridis Florentinae drachmas duas.

Majoranae,

Serpylli,

Thymi,

singulorum scrupulum unum.

Pulveratis adde

Olei essentialis Ligni Rhodii
guttas quatuor.

— — Caryophyllorum
guttas sex.

Pulvis s. Species Diarrhodon. (Pal. Sar.
Wir.)

℞. Petalorum Rosarum rubrarum
uncias duas.

Santali albi,

— rubri,

singulorum semunciam.

Radicis Liquiritiae,

Seminum Anisi,

singulorum drachmas duas.

— Basilici,

Cinnamomi,

Nardi Indicae,

Rhei,

Croci,

Rasurae Eboris,

Cornu Cervi philosophice praepa-
rati,

Mastichis,

Matris Perlarum praeparatae,

singulorum drachmam unam.

Fiat pulvis. (Pal. Wir.)

℞. Rosarum rubrarum uncias duas.

Santali citrini unciam unam.

Cardamomi minoris,

Cannamomi,

Croci,

Mastichis,

Nardi Indicae,

Foeniculi,

singulorum drachmam unam.

Fiat pulvis. (Sar.)

Magensfärfend. — *Sabe*, von einer
halben Drachme bis zwei Scrupel.

Pulvis pro epithemate cordis et pulsuum.
(Pal. Wir. Sp.)

℞. Herbae Rorismarini,

— Majoranae,

— Melissaе,

Florum Cheiri,

— Caryophyllorum rubrorum,
singulorum semunciam.

— Lavandulae,

— Rosarum,

singulorum drachmas sex.

Macidis,

Nucis moschatae,

Ligni Aloës,

— Rhodii,

Cinnamomi,

singulorum drachmas sex.

Corticis Citri,

— Aurantiarum,

singulorum drachmas tres.

Concisa et contusa misce. (Wir.)

Sp. pulverem parare jubet.

℞. Florum Buglossi,

— Boraginis,

— Melissaе, singulorum mani-
pulum dimidium.

Santali albi,

— rubri,

— citrini,

Petalorum Rosarum rubrarum,
singulorum drachmas duas.

Corticis Citri,

Seminum Acetosae,

Ligni Aloës,

Caryophyllorum,

singulorum sesquidrachmam.

Doronici,

Radicis Behen rubri,

— albi,

Succini,

singulorum scrupulos quatuor.

Fiat pulvis. (Pal.)

Species pro Decocto ad gangraenam.
(Pal. Wir. Vm.)

℞. Foliorum Marrubii,

— Pulegii,

— Rutae,

— Rorismarini,

— Salviae,

— Scordii,

singulorum partem unam.

Florum Chamomillae vulgaris,

— Rosarum rubrarum,

Florum Sambuci,
singulorum partes duas.
— Althaeae . . . partes sex.
Seminum Foeni graeci partes octo.
— Lini partes viginti quatuor.
Concisa et contusa misce. (Vm.)
R. Herbae Millefolii,
— Absinthii,
singulorum drachmas sex.
— Scordii,
— Salviae,
— Hyssopi,
— Rutae,
Florum Sambuci,
— Hyperici,
singulorum semunciam.
— Rosarum . . . unciam unam.
Myrrhae . . . drachmas sex.
Aloës,
Asae foetidae,
singulorum semunciam.
Lithargyri . . . uncias sex.
Concisa et contusa misce. (Pal. Wir.)
Man löst es in fünf Pfund Kaltwasser
und zwei Pfund Essig kochen und wendet
die Abkochung, mittelst Flanel, warm an.
Auch kann man vier bis sechs Unzen Kam-
pherspiritus zusetzen. — Deutzutage zieht
man bei heißem Brand erweichende Mittel
mit Recht vor.

Rosmarinus.

Rosmarinus officinalis, L.; Rosmarin;
Romarin officinal (Gal.); Rosemary
(Ang.); Rosmarin (D. Suec.); Hasal-
ban achsir (Ar.); Rosmaryn (B. Bel.
Pol.); Yong tsao (C.); Tay-duong-choi
(Co.); Romera (His.); Ramerino, Ros-
marino (I.); Alecrim (Lus.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful.
Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP.
His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R.
Sax. Suec. Wir. Wür. A. Be. Br. C.
Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

† (Diandria Monogymia, L.; Labia-
tae, J.) Eine im südlichen Europa wach-
sende Pflanze. (Blackw. t. 159. Plenck t.
18. Hayne VI. t. 25. Fl. méd. VI. 200.)

Man wendet das blühende Kraut (herba
et flores Anthos s. Rorismarini s. Ro-
rismarini hortensis) an; es besteht aus
dünnen, langen, aschgrauen Zweigen mit
stehenden, entgegengesetzten, etwas harten,
schmalen, linienförmigen, oben grünen, un-
ten weißlichen, an den Rändern eingeroll-
ten Blättern und blaßblauen, kleine bus-
chige, achselständige, gegenüberstehende
Trauben bildenden Blüten. Es hat einen
sehr durchdringenden, angenehmen Geruch
und einen gewürzhaften, kampherartigen,
etwas scharfen Geschmack.

Innerlich reizend, äußerlich auflösend.
Gabe des Pulvers, von achtzehn Gran
bis zwei Scrupel.

Conserva Anthos s. Rorismarini. (Ams.,
B. Bel. Sar. Wir. Ca. T.)

R. Florum Anthos contusarum
partem unam.
Sacchari albi . . . partes tres.
Misce. (Ams.)

B. Bel. et Wir. Florum partem unam
et Sacchari albi duas; — Sar. Flo-
rum partem unam et Sacchari ad plu-
mam cocti tres; — Ca. Florum pul-
vatorum partem unam, Sacchari qua-
tuor et Aquae quantum sufficit; — T.
ut conservam rosarum.

Pulvis aromaticus. (Ra.)

R. Pulveris Rorismarini,
— Salviae,
— Thyui,
singulorum uncias quatuor.

Salis Ammoniaci,

Camphorae,

singulorum grana viginti.

Von Dupuytren äußerlich bei Brand
oder Hospitalfäulniß, statt der China.

Species aromatae. (Ful.)

R. Radicis Iridis Florentinae,
— Zedoariae,
Herbae Melissaе,
— Rorismarini,
— Serpylli,
Florum Lavandulae,
singulorum drachmas sex.

Garyophylorum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
singulorum drachmas duas.

Auflösend, nervenstärkend, stärkend, zu
Kräutersäften.

Species dianthos. (Wir.)

R. Radicis Liquiritiae drachmas sex.
— Zingiberis,
— Zedoariae,
— Galangae,

Ligni Aloës,
Cinnamomi,
Caryophylorum,
Cardamomi minoris,

Macidis,
Nucis moschatae,
Nardi Indicae,
singulorum scrupulos quatuor.

Florum Rorismarini unciam unam.
— Rosarum,
— Violarum,
singulorum drachmas sex.

Seminum Anisi,
— Foeniculi,
singulorum scrupulos quatuor.

Fiat pulvis. — Gabe, von einer halben bis einer ganzen Drachme. Gegen Kopfschmerz, magenstärkend, Blähungtreibend.

Extractum Rorismarini. (Wür.)

R. Summitatum florescentium Rorismarini,
Alcoholis, singulorum libram unam.
Aqueae communis libras octo.
Digere blando calore, per tres dies, cola exprimendo, seponere et decantha liquorem, alcoholem destillando elice et residuum ad aptam consistentiam consume.

Infusum Rorismarini. (GalM.)

R. Summitatum florescentium Rorismarini,
Liquiritiae rasae, singularum drachmas duas cum dimidia.
Aqueae bullientis quantum sufficit ut librae duae colaturae obtineantur.

— Gabe, eine bis zwei Unzen
Mel Rorismarini s. anthosatum. (Ful. Pal. Sar. Wir. Sp.)

R. Florum recentium Rorismarini
uncias octo.

Aqueae fontanae uncias quatuor.
Mellis despumati calidi libras duas.
Digere per dies decem ad duodecim in loco calido, tunc in balneo aquae coque et cola exprimendo. (Pal. Wir.)

Sar. digerere jubet, tunc coquere in balneo aquae Mellis libras quatuor et Florum duas; — Sp. digerere per dies aliquot Herbae Rorismarini siccatae uncias octo in Mellis despumati uncias viginti quatuor; — Ful. Commiscere Infusi Rorismarini partem unam et Mellis despumati quatuor.

Reizend, gegen Kopfschmerz, Kolik, bei Blähungen und auf den Uterus wirksam. — Man kann es auch zu Klystiren setzen.

Balneum aromaticum. (Ca.)

R. Rorismarini,
Thymi,
Salviae,
Origani,
Menthae, singulorum semilibram.
Aqueae quantum sufficit.

Decocto adde

Essentiae Saponis uncias quatuor.
Salis Ammoniaci uncias duas.
Acetum Rorismarini. (Gal. T.)

R. Florum Rorismarini partem unam.
Aceti albi partes sedecim.
Macerare per dies quatuordecim in vase tecto, subinde agitando, cola et filtra.

T. Florum uncias sex, Aceti libras sex, decem dierum digestionem etc.

Acetum s. Acidum aceticum aromaticum s. odoratum. (Bor. D. Ed. Fer. GalP. Han. HassP. Lus. O. Pal. Succ. Wir. C. Huf. Sp. T.)

R. Summitatum Rorismarini,
Foliorum Salviae,
singulorum unciam unam.
Florum Lavandulae sesquidramm.
Caryophyllorum semidrachmam.
Aceti libras duas.

Macerare per dies septem et filtra. (Ed. C.)

GalP. Lus. Suec. et Sw. Rorismarini, Salviae, singulorum uncias quatuor, Lavandulae uncias duas, Caryophyllorum drachmas duas et Aceti libras octo.

R. Herbae Absinthii;
— Rorismarini,
— Salviae,
— Menthae piperitae,
singularum uncias duas.

Cinnamomi semunciam.

Caryophyllorum,

Nucis moschatae,

singulorum drachmas duas.

Aceti libras octo.

Digerere super arena tepida, cola exprimendo et filtra. (D. O.)

R. Radicis Zedoariae,
Caryophyllorum,
singulorum semunciam.

Herbae Absinthii,

— Rorismarini,

— Salviae,

— Menthae piperitae,

singularum uncias duas,

Aceti libras octo.

Post sufficientem macerationem cola exprimendo et colaturae adde

Spiritus Rorismarini
uncias quatuor.

Misce bene. (Bor. Han. HassP. Pol. Huf.)

R. Radicis Cyperti rotundi,
— Galangae minoris,
— Zedoariae,
singularum semunciam.

Herbae Rorismarini,

— Salviae,

Florum Lavandulae,

— Convallariae majalis,

— Rosarum,
singulorum drachmas tres.

Ligni Rhodii,

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Corticis recentis Citri,

singulorum drachmas duas.

Aceti libras duas.

Post tres dies digestionis filtra. (Wir. Sp.)

R. Radicis Zedoariae,
— Galangae,

— Convallariae majalis,
singularum semunciam.

Herbae Rorismarini,

Herbae Rutae,
Mari,
Florum Lavandulae,
singulorum drachmas duas.
Corticis recentis Citri,
Caryophyllorum,
Cubebanum,
Cardamomi minoris,
singulorum semunciam.
Aceti . . . unciis quadraginta.
— Convallariae,
Caryophyllorum rubrorum,
singulorum unciis duas.
Macera et cola. (Sp.)
℞. Summitatum Rorismarini,
— Absinthii,
— Salviae,
— Rutae,
singularum sesquunciam.
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
singulorum drachmas duas.
Aceti libras sex.
Post octo dies infusionis exprime et
colaturae adde
Camphorae . . . unciam unam.
Addi possunt Allii drachmae duae. (Fer.)
T. Summitatum Absinthii Romani et
Pontici, Rorismarini, Salviae, Menthae
piperitae, Rutae, Florum Lavandulae,
singulorum unciis duas, Allii, Calami,
Gianamomi, Nucis moschatae, Caryo-
phyllorum, singulorum drachmas duas.
Aceti rubri fortioris libras octo, dies
quindecim macerationis et Camphorae
in Spiritu Vini 36° B. salutae semun-
ciam.
Das nach den beiden letzten Formeln be-
reitete Präparat hat noch mehr Ähnlich-
keit mit dem Bierwürbereifig als die vor-
hergehenden.
Essentia Rorismarini. (Br.)
℞. Summitatum florescentium Rori-
smarini sesquunciam.
Spiritus Rorismarini unciis sex.
Post sufficientem digestionem expri-
me et filtra. — *Reisend.*
Fomentum aromaticum. (Au.)
℞. Herbae Rorismarini semunciam.
Vini rubri,
Aquaе, singulorum unciis tres.
Infundae et exprime.
Oleum Rorismarini (infusum). (His.)
℞. Florum Rorismarini partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.
Post tres vel quatuor dies digestionis
coque ad consumptionem humiditatis
et exprime.
Oleum essenziale Rorismarini s. An-
thos aethereum, Aethereoleum Anthos s.
Rorismarini. (A. Am. Am. An. B. Ba.
Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer.

Kul. Gal. Gen. Han. Li. Lon. Lond.
O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wür.
Br. C. Sw. T.)
℞. Florum Rorismarini quantum via
Aquaе . . . quantum requiritur.
Destillent. (Am. Ams. B. Bel. Du.
Ed. Fer. Gen. Lon. Lond. R. Suec. Br. C.)
Au. Florum partes tres et decem
Aquaе; — Gal. Florum quinque et
septem Aquaе; — Ful. et Li. Florum
unam et tres Aquaе; — Sw. Florum
unam et Aquaе quatuor; — D. Florum
unam et sex Aquaе; — Bor. Han. O.
Pol. et Sax. Florum unam et octo
Aquaе; — Ba. Florum unam et novem
Aquaе; — A. Florum unam et duode-
cim Aquaе; — T. Florum unam et
Aquaе bullientis duas.
℞. Herbae florescentis Rorismarini
partes viginti quinque.
Aquaе partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies macerationis destillent.
(Br. Pal. Sar.)
℞. Herbae Rorismarini quantum vis.
Aquaе destillatae Rorismarini
quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)
Bor4. HassP. Oleum venale pond.
spec. = 905. Bor4. = 0,865. HassP.
Gabe, zwei bis fünf Tropfen.
Balsamum apoplecticum s. aromaticum
s. cephalicum Saxonicum s. nervinum
s. Scherzeri s. stomachicum, Linimentum
aromaticum stimulans, Unguentum
aromaticum s. nervinum, Linimentum
stomachicum. (B*. Br. D. Fenn. Ful.
Gal. Han. Hass. Li. Pal. Sax. Suec.
Wir. Wür. Ca. Pid. Sp. Sw. Vm.)
1) Mit Perubalsam.
℞. Olei Nucis moschatae expressi
unciis unam.
— essentialis Rorismarini,
— Caryophyllorum,
— singulorum drachmam unam.
— essentialis Succini
semidrachmam.
Balsami Peruviani drachmam unam.
Misc. triturando. (Li.)
I. id. Olei Nucis moschatae unciam
unam, Olei Caryophyllorum, Lavandulae,
singulorum drachmam unam, Olei
Succini scrupulum unum et Balsami
sesquidrachmam; — Sax. Olei Nucis
moschatae unciam unam, Olei Caryo-
phyllorum, Rorismarini, singulorum
drachmam unam, Olei Succini scrupu-
lum unum et Balsami sesquidrachmam;
— Hass. Olei Nucis moschatae unciam
unam, Olei Caryophyllorum, Menthae
piperitae, singulorum drachmam unam,
Olei Succini scrupulum unum et Bal-
sami sesquidrachmam; — Vm. Olei

Nucis moschatae uncias tres, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, Succini, singulorum semunciam et Balsami drachmas duas; — *Sw.* Olei Nucis moschatae drachmas tres, Olei Caryophyllorum, Succini, singulorum scrupulum unum et Balsami sesquidrachmam, vel: Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, singulorum drachmam unam, Olei Succini scrupulum unum et Balsami sesquidrachmam; — *D.* Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, Rorismarini, singulorum semidrachmam, Olei Succini semiscrupulum et Balsami drachmam unam.

R. Olei Nucis moschatae partes tres.
— essentialis Caryophyllorum,
— — Benzoes,
Balsami Peruviani,
singulorum partem unam.

Misce bene. (*B.*)

R. Olei Nucis moschatae
unciam unam.
— essentialis Absinthii,
— — Corticis Aurantiorum,
— — Caryophyllorum,
— — Macidis,
— — Menthae,
singulorum semidrachmam.
Balsami Peruviani
drachmam unam.

Misce. (*Pal. Wir.*)

Hab. eandem formulam sed omisso oleo corticis aurantiorum.

R. Olei Nucis moschatae
unciam unam.

— essentialis Rorismarini,
— — Lavandulae,
— — Caryophyllorum,
singulorum semidrachmam.
— — Succini,

Moschi cum Alchhole triti,
singulorum semiscrupulum.

Balsami Peruviani
drachmam unam.

Misce. (*Br.*)

R. Olei Nucis moschatae
uncias tres cum dimidia.

— Jasmini,
— Cinnamomi,
— Ligni Rhodii,
singulorum sesquidrachmam.
— Lavandulae,
— Majoranae,
— Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
— Rutae,
— Succini,
singulorum scrupulum unum.

Moschi,

Ambrae griseae,
singulorum grana sedecim.

Zibethi semiscrupulum.

Balsami Peruviani scrupulos duos.

Eboris usti nigri quantum sufficit.

Misce. (*Wir. Sp.*)

Pal. Olei Nucis moschatae unciam unam, Olei Rorismarini, Caryophyllorum, Cinnamomi, singulorum scrupulum unum, Olei Lavandulae, Ligni Rhodii, Majoranae, Rutae, Succini, singulorum semiscrupulum, Balsami sesquidrachmam et Fuliginis Succini quantum sufficit.

R. Olei Palmae,
— Nucis moschatae,
Medullae cervinae,
— Cruris bovini,
singulorum uncias quatuor.
Adipis Hominis,
— Melis,
— Viperae,
singulorum unciam unam.

Liqua leni calore et adde

Olei essentialis Lavandulae,
— — Menthae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
— — Thymi,
— — Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.

Camphorae drachmas duas.

Balsami Peruviani unciam unam.

Misce. (*Sp.*)

R. Medullae bubulae,
Olei Nucis moschatae,
singulorum uncias quatuor.

Liquata in lagenam amplo ostio munitam immitte et adde

Olei essentialis Rorismarini
drachmas duas.
— — Caryophyllorum,

Camphorae,
singulorum drachmam unam.

Balsami Peruviani in Alchhole (36°)
semuncia dissoluta drachmas duas.

Liqua omnia in balneo aquae. (*Gal. Ca.*)

T. Camphorae drachmas duas, Balsami in Alchhole sufficiente quantitate soluti semunciam, caeterum ut antea.

S.) Dine Perubalsam.

R. Olei Nucis moschatae
unciam unam.
Cerae flavae drachmas duas.

Liqua lente et adde

Olei essentialis Caryophyllorum,
— — Lavandulae,
singulorum drachmas duas.
— — Succini
semiscrupulum.

Misce. (*Fenn. Suec.*)

R. Sebi ovilli libras duas.
Olei Chamomillae cocti,

Olei Majoranae cocti,
singulorum uncias quatuordecim.
Liqua et adde ab igne removendo
Olei essentialis Rorismarini
uncias duas.

Misce bene. (Wür.)

℞. Olei Nucis moschatae
unciam unam.

- Succini,
- Caryophyllorum,
singulorum semidrachmam.
- Lavandulae,
- Juniperi,
singulorum drachmam unam.

Misce frigide. (Ful.)

℞. Olei Nucis moschatae
partes centum viginti.

- Lavandulae,
- Succini,
singulorum partes quatuor.
- Rorismarini . . . partes sex.
- Majoranae,
- Menthae piperitae,
singulorum partes tres.
- Macidis . . . partes duas.

Contere. (B*.)

Ca. Olei Nucis moschatae drachmas
triginta tres, Oleorum Lavandulae,
Succini, singulorum sesquidrachmam,
Oleorum Origani, Salviae, Majoranae,
Rorismarini, singulorum drachmam
unam, Oleorum Rutae, Macidis, Men-
thae, singulorum scrupulos duos; —
Sp. Olei Nucis moschatae sesquiun-
ciam, Oleorum Majoranae, Lavandulae,
Rorismarini, Succini, Serpylli, singulo-
rum drachmas duas, Oleorum Rutae,
Pulegii, Melissae, Menthae, Cardamo-
mi, singulorum scrupulum unum; —
Br. Olei Nucis moschatae uncias duas
cum dimidia, Oleorum Corticis Auran-
tiorum, Caryophyllorum, Macidis, sin-
gulorum drachmam unam, Oleorum
Rorismarini, Lavandulae, Absinthii, Cu-
mini, Anethi, singulorum semidrach-
mam, Olei Rosarum parvam quantita-
tem et Ceræ albae semunciam; —
Wir. Oleorum Lavandulae, Succini,
singulorum scrupulum unum, Oleorum
Pulegii, Majoranae, Salviae, Rorisma-
rini, Saturejae, singulorum grana quin-
decim, Oleorum Rutae, Macidis, sin-
gulorum semiscrupulum, Oleorum Men-
thae, Origani, singulorum grana duo-
decim et Olei Nucis moschatae un-
ciam unam.

℞. Olei Nucis moschatae
unciam unam.

- Succini . . . semidrachmam.
- Rosarum,
- Cinnamomi,
singulorum scrupulum unum.
- Lavandulae,

Pharmacopoea universalis. II.

Olei Majoranae,
singulorum grana quindecim.
— Rutae,
— Benzoës,
singulorum semiscrupulum.

— Caryophyllorum,
— Corticum Citri,
singulorum grana quatuor.

Ambrae griseae sesquidrachmam.
Zibethi . . . scrupulos quatuor.
Moschi . . . drachmam unam.

Misce bene. (Sw.)

Alle diese Präparate, welche, ungeachtet
der verschiedenen Namen, mit denen man
sie bezeichnet, sehr viel Aehnlichkeit mit
einander haben, unterscheiden sich von dem
Hoffmann'schen Balsam wesentlich nur
dadurch, daß kein Alcohol dazu kommt.
Man wendet sie besonders äußerlich in Ein-
reibungen auf den Unterleib, bei Windco-
llix, hartnäckiger Diarrhoe und Leibschnei-
den der Kinder; auf die Schläfe bei Kopf-
schmerz; in die Hände, welche man dann
vor die Augen hält, gegen Gesichtsschwä-
che und Trübseitigkeit, und auf die Glied-
er bei schwächlichen Kindern, an. Zuwei-
len läßt man auch bei Verbauungsbeschwer-
den einige Tropfen auf Zucker nehmen.

Balsamum vitae Hoffmanni s. ad mo-
dum Hoffmanni, Mixtura oleoso-balsa-
mica s. succinea, Liquor balsamico-aro-
maticus, Tinctura Succini aromatica.
(B*. Bor. Bor4. Br. D. HassP. O. Sax.
Suec. Wir. Au. Bo. Ca. Sp. Sw. Vm.)

℞. Olei Rorismarini . . . semunciam.
— Succini rectificati
drachmas duas.

Alcoholis . . . libram una
Misce. (Bor.)

℞. Florum siccatorum Lavandulae,
Foliorum siccatorum Majoranae,
— — Rutae,
singulorum unciam unam.

Corticis recentis Citri semunciam.
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Macidis,

singulorum drachmas tres.
Aquae Vitae uncias triginta duas.
Aquae unguis sexaginta quatuor.
Destillando liquidi uncias octodecim
elice et in producto solve
Balsami Peruviani
sesquidrachmam.

Olei Succini rectificati
semidrachmam.

Serva. (Vm.)

℞. Olei essentialis Lavandulae,
— — Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Macidis,
— — Cinnamomi,

Olei essentialis Citri, singulorum scrupulum unum.

— — Rutae guttas decem.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Alcoholis concentrati

uncias decem.

Digere frigide et per gossypium filtra. (B*. Bor. O.)

Borā. omnium horum oleorum, addito illo Florum Aurantiū, singulorum scrupulum unum, Balsami drachmam unam et Spiritus Vini Gallici fortioris quantum antea. Pond. sp. = 0,850 — 0,860; — HassP. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cassiae cinnamomeae, de Cedro, singulorum scrupulum unum, Oleorum Rutae et Succini rectificati, singulorum guttas decem, Balsami semidrachmam, Spiritus rectificatissimi uncias decem; — Sax. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, Citri, singulorum partem unam, Oleorum Rutae, Succini rectificati, singulorum partem dimidiam, Balsami Peruviani partem unam cum dimidia, Alcoholis concentrati partes ducentas quadraginta et dies quatuor frigidae infusionis; — D. Oleorum Lavandulae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, singulorum scrupulum unum, Olei Succini rectificati guttas decem, Balsami Peruviani semidrachmam, Alcoholis concentrati uncias decem et Radicis Alcaennae parvam quantitatem ad colorandam tincturam; — Bo. Oleorum Cinnamomi, Lavandulae, Caryophyllorum, Citri, Rosmarini, Succini, singulorum guttas decem, Balsami Peruviani liquidi guttas viginti et Spiritus Vini rectificati uncias duas.

R. Balsami Peruviani,

Olei essentialis Lavandulae,

— — Majoranae,

— — Caryophyllorum,

— — Citri,

— — Macidis,

— — Cinnamomi,

— — Rutae,

— — Succini,

Ambrae griseae, singulorum scrupulum unum.

Misce bene et dissolve in

Alcoholis concentrati uncias decem.

Serva. (Br. Wir.)

Au. Balsami Peruviani grana quindecim, Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Serpylli, Rutae et Succini, singulorum guttas decem et Alcoholis uncias quinque; — Sp. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Cubeborum, Cardamomi, Cinnamomi et Citri, singulorum

scrupulum unum, Olei Macidis scrupulos duos, Oleorum Rutae, Succini, Balsami Peruviani et Ambrae griseae, singulorum semisrupulum, Alcoholis uncias viginti; — Ca. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi et Citri, singulorum scrupulum unum, Oleorum Rutae et Succini, Ambrae griseae, singulorum semisrupulum, Alcoholis uncias quinque; — B*. et Huf. Oleorum Lavandulae, Rosmarini, Bergamottae, Juniperi et Terebinthinae, singulorum semidrachmam, Alcoholis uncias decem; — Sw. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, Citri, Rutae et Succini, singulorum guttas decem; Balsami Peruviani semidrachmam, Alcoholis uncias decem et denique si necesse est, Ambrae griseae grana quindecim et decem Moschi; — Li. Oleorum Rosmarini, Majoranae, Caryophyllorum, Cinnamomi, Rutae et Citri, singulorum scrupulum unum, Olei Succini semisrupulum, Balsami Peruviani semidrachmam; Ambrae grana decem, Moschi grana quindecim, Alcoholis uncias decem et quatuor dies frigidae digestionis.

R. Olei Succini rectificati

partem unam.

Balsami Peruviani partes tres.

Aquae Lavandulae,

— Colonjensis,

singulorum partes centum viginti.

Dissolve et post aliquot dies filtra.

(Vm.)

R. Olei essentialis Caryophyllorum,

— Cinnamomi,

— Lavandulae,

— Nucis moschatae,

singulorum scrupulum unum.

Tincturae Succini uncias quatuor.

Misce. (Succ.)

Reizend, nervenstärkend, Kopf- und Magenmittel. — Gabe, zehn bis zwanzig Tropfen. — Man wendet es auch äußerlich in Einreibungen an.

Es enthalten zwar nicht alle Formeln zu diesem Präparat Rosmarinöl, doch scheint es wegen seiner Ähnlichkeit mit den vorhergehenden hierher zu gehören.

Balsamum ophthalmicum. (Ac.)

R. Balsami Vitae Hoffmanni

unciam unam.

Ammoniaci liquidi

drachmam unam.

Olei essentialis Chamomillae

guttas viginti.

Alcoholis concentrati semunciam.

Von Ebbenstein, Ebbel bei Gschätz-

schwäche in Wafungen auf die Stirn, die Augenlider und die Wangen empfohlen.

Unguentum Rosmarini compositum.
(Bor.C.)

℞. Cerae flavae . . . unciam unam.
Akungias Porci . . . uncias tres.
Liqua et mixtis semirefrigeratisque adde

Olei essentialis Rosmarini,
Ammonii subcarbonici,
singulorum semunciam.

Misce bene.

Unguentum aromaticum. (Au.)

℞. Unguenti Rosmarini compositi
uncias duas.

Olei essentialis Lavandulae,
— Cajeput,
— Menthae,
— Chamomillae,
singulorum scrupulum unum.

Bei asthenischen und nervösen Uebeln, so wie bei Schwindungen von Nutzen.

Aqua Anthis. (A. Ams. B. Bel. Wür.)

℞. Herbae florecentis Rosmarini
partem unam.

Aquae . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor infusionis destillant partes decem. (Ams. B. Bel.)

Wür. Herbae partem unam et sex Aquae; — A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillant partes quatuor.

Spiritus s. Aqua spirituosa Anthis s. Rosmarini. (A. Ams. An. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fi. Sp. Sw. T.)

℞. Herbae florecentis Rosmarini
partem unam.

Alcoholis (20°) . . . partes quatuor.

Post sufficientem digestionem destillet spiritus 20° indicans. (Ams. An.)

Ful. Gen. et Li. Florum partem unam et sex Alcoholis; destillant partes quatuor; — Sp. Florum partem unam et tres Alcoholis; — Du. Florum partem unam cum dimidia et octo partes Alcoholis; destillant partes quinque; — Ed. Florum partes duas et Alcoholis octo; destillant partes septem; — Br. Pal. et Wir. Florum partem unam et quatuor Alcoholis; — Lus. Florum partes duas cum dimidia et decem Alcoholis; destillant partes quinque; — Fer. Florum partem unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillant partes sex

℞. Florum siccorum Rosmarini
partem unam.

Alcoholis . . . partes quatuor.
Post horas viginti quatuor digestionis destillant in balneo aquae fere ad siccum, productum novis floribus infunde et iterum destillationi subijce. (Sar.)

D. Florum libram unam, Aquae Vitae libras sex; mixtis destillando trientes duos abstrahe et productum cum novorum Florum semilibra novae destillationi subijce; — Wür. Florum sesquilibram cum Alcoholis libris decem destillationi et productum novae destillationi supra Florum uncias tres subijcere.

℞. Florum Rosmarini partem unam.
Alcoholis (0,910)

partes quatuor cum dimidia.

Aquae . . . partes sex.

Post horas viginti quatuor destillant partes quatuor (0,918). (A.)

Am. Lon. et C. Florum libras duas, Aquae Vitae octarios octo et Aquae quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent octarii octo; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pal. et Sax. Florum partem unam, Alcoholis quatuor et Aquae quantum sufficit; Pond. sp. = 0,8852 = 22° B. HassP.; — Br. Florum libram unam et uncias duas et Aquae Vitae libras octo; destillant tres quadrantes; — Suec. Florum partem unam, quatuor Alcoholis et Aquae duas; destillant partes duas; — Fenn. Florum partem unam, Aquae et Alcoholis, singulorum duas; destillant partes duas; — His. Florum partem unam et duas Aquae Vitae; destillet una pars; — Fi. T. Summitatum florecentium uncias octodecim, Alcoholis 28° B. libras octo, Aquae duas; post macerationem duodecim horarum destillant in balneo aquae librae sex (octo); rectificari potest productum ad quinque vel sex librarum remanentiam, (*Aqua Reginae Hungariae.*)

℞. Florum Rosmarini
partes duodecim.

Alcoholis . . . partes sex.

Aquae . . . partes duas.

Destillent lente partes sex, productum infunde

Florum recentium Rosmarini
partibus duodecim

Aquae . . . partibus duabus.

Destillent partes sex. (Sw.)

℞. Herbae florecentis Rosmarini
partes duodecim.

Alcoholis (22°) partes triginta sex.

Aquae destillatae Rosmarini
partes duodecim.

Post quatuor dies destillent partes triginta. (Gal.)

R. Rorismarini semilibram, Aquae Rorismarini libram unam et Alcoholis libras quatuor; destillent librae tres.

R. Olei Rorismarini pondere unciam unam.

Spiritus rectificati congiun-
 Aquae quantum satis
 ad prohibendum empyreuma; destillet
 lento igne congius. (LonN.)

Aqua Hungarica s. Reginae Hungaricae s. Anthos composita, Alcohol Anthos s. Rorismarini compositus, Spiritus aromanticus. (Br. D. Fer. Han. Wir. Sw. Vm.)

R. Florum Rorismarini libram unam.
 — Lavandulae uncias quatuor.

Aquae Vitae libras sex.

Post duodecim horas digestionis destillent librae tres. (D.)

R. Florum Rorismarini partes tres.
 — Lavandulae partem unam.

Aquae Vitae partes sex.

— purae partes duodecim.

Destillent tres quadrantes. (Sw.)

Vm. Lavandulae partem unam, Rorismarini tres, Aquae Vitae duodecim et Aquae quadraginta; destillent partes octodecim.

R. Herbae Rorismarini cum floribus,
 — Serpylli,

— Thymi,
 singularum partem unam.

Aquae Vitae partes viginti quatuor.
 — purae

partes quadraginta octo.

Destillent partes viginti. (Vm.)

R. Herbae florescentis Rorismarini
 libras quatuor.

— Salviae uncias sex.

Zingiberis uncias duas.

Aquae Vitae libras duodecim.

— purae libras duas.

Destillent librae undecim. (Br. Han. Wir.)

Vm. Zingiberis partem unam, Salviae tres, Rorismarini viginti quatuor, Aquae Vitae nonaginta et Aquae centum octoginta; destillent partes sexaginta sex.

R. Herbae Rorismarini libras duas.

— Salviae uncias tres.

— Thymi uncias sex.

Alcoholis (34°) libras sedecim.

Macera per dies duos, tunc destillent in balneo aquae, et productum nova destillatione rectificetur. (Fer.)

Spiritus carminativus, Alcohol Helenii compositum. (His.)

R. Radicis Helenii,
 — Carlinae,

singularum unciam unam.

Summitatum Rorismarini,
 Majoranae,
 singularum uncias quatuor.

Baccarum Lauri,
 Foeniculi,

Garvi,

Anisi, singularum unciam unam.

Piperis Jamaicaensis,

Cinnamomi,
 singularum semunciam.

Corticis recentis Aurantiorum

drachmas tres.

Aquae Vitae libras tres.

Digere per dies duos in vase tecto, tunc destillent in balneo aquae.

Aqua apoplectica. (Pal. Wir. Sp.)

R. Herbae florescentis Salviae
 uncias octo.

— Majoranae,

— Serpylli,

singularum unciam unam.

Florum Liliorum Convallium

uncias tres.

— Lavandulae,

— Rorismarini,

singularum uncias duas.

Cinnamomi sesquiunciam.

Cubebarum semunciam.

Caryophyllorum drachmas tres.

Macidis drachmas duas.

Vini albi libras duodecim.

Post tres dies macerationis destillet dimidia pars. (Wir.)

R. Radicis Galami,

— Iridis Florentinae,

— Aristolochiae rotundae,

singularum sesquiunciam.

Herbae Majoranae,

— Chamaepityos,

— Rorismarini,

Florum Primulae Veris, singularum
 manipulum unum.

Seminum Sileris montani,

— Foeniculi,

singularum sesquidrachmam.

Cubebarum,

Nucis moschatae,

Caryophyllorum,

singularum drachmas tres.

Cinnamomi,

Ligni Aloës,

singularum drachmas duas.

Piperis longi,

Sagapeni,

Opopanax,

Myrrhae,

Sandaracae,
 singularum sesquidrachmam.

Aquae Florum Primulae Veris,

— Tiliae,

Aquae Salviae,
singularum uncias octodecim.
Post septem dies infusionis destillent.
(Sp.)

R. Florum recentium Lilliorum Con-
vallium,
— — Lavandulae,
— — Primulae Veris,
— — Tiliae,
— — Betonicae,
— — Caryophyllorum ru-
brorum,
singularum unciam unam.

Herbae Rosmarini,
— Majoranae,
— Basilici,
— Salviae,
— Serpylli,
— Mari,
singulorum sesquunciam.

Cinnamomi . . . uncias duas.
Caryophyllorum . . . drachmas sex.
Nucis moschatae unciam unam
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Zedoariae,
Santali citrini,
singulorum semunciam.

Alcoholis,
Vini generosi,
singulorum libras quinque.

Macera herbas et flores in alcohole,
aromata in vino, misce liquores, destil-
lationi lentae subijce, prius productum
clarum et limpidum ad usum internum
et secundum, album et oleaginosum,
ad usum externum serva. (Pal. Wir.)

Gabe, von zwei Drachmen bis eine Unze,
bei Windcolik. Äußerlich in Einreibungen
oder Räucherungen.

R u b i a.

Rubia tinctoria, L.; Krapp, Krapp-
wurzel, Färberröthe; Garance (Gal.);
Red matter (Ang.); Marena (B.); Krap
(D. Bel.); Granza rubia (His.); Rob-
bia (I.); Marzana (Pol.); Ruida (Lus.);
Krapp (Succ.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal.
Gen. Ham. Han. Hass. P. His. Li.
Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Wir.
Wür WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid.
Sp. Z.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Ru-
biaceae, J.) Eine in Europa angebaute
Pflanze. (Fl. méd. IV. 177, *Blachw.* t.
326. *Schk.* t. 23. *Plenck* t. 57. *Düss.*
off. Pfl. VII. t. 18. *Bert.* Bild. I. 71.
fig. 2.)

Man wendet die Wurzel (radix Rubiae

tinctoriae s. sativae s. majoris) an; sie
ist lang, ästig, sätligert, walzig, gänsefe-
derdicke, und roth, besonders außen. Sie
hat einen schwachen Geruch und einen bit-
terlichen, schwach styptischen Geschmack.

Sie enthält viel Färbestoff, Galläpfel-
säure, Salmehel, Sauerleesäure und einen
eigenthümlichen Färbestoff, von Collin
und Robiquet Alizarine (Izarinum)
genannt. Döbereiner hatte schon frü-
her einen dergleichen Stoff, Erythroba-
nin (Erythrodaninum) besonders darge-
stellt.

In Ostindien gebraucht man statt dieser
Art die Rubia Manjista, *Rozb.* (Fuh (Ar.);
Well madatta (Cy.); Menjithe (Hin.);
Puutvayr (Mal.); Runas (Pe.); Man-
jisohtha (Sa.); Manjitthe (Tam.); Man-
destie (Tel.), eine in Nepaul und Tibet
wachsende Pflanze.

Abstringirend, besonders durch die Eigen-
schaft, die Knochen der damit genährten
Thiere zu färben, berühmt. Man hat sie
bei Nephritis empfohlen. — Gabe des Pul-
vers, eine halbe bis eine Drachme.

Species resolventes. (Huf.)

R. Radicis Rubiae,
— Graminis,
— Taraxac,
— Saponariae,
Herbae Fumariae,
Summitatum Millefolii,
singulorum partes aequales.

Extractum Rubiae tinctoriae aquosum.
(Fer. T.)

R. Radicis Rubiae . . . libram unam.
Aquae libras tres.

Coque, cola exprimendo, colaturam
albuminis ope clarifica et sufficienter
consume.

T. Radicis libram unam, Aquae bul-
lientis octo, post horas viginti quatuor
infusionis cola, leviter exprimendo, fil-
tra et ad extracti consistentiam con-
sume.

Extractum Rubiae tinctoriae alcoholi-
cum. (Br. Han.)

R. Radicis Rubiae . . . partes duas.
Alcoholis partes tres.
Aquae partes novem.

Digere in vase tecto, cola exprimendo,
alcoholem lenta evaporatione extrahere
et reliqua ad extracti consistentiam
inspissa. (Han.)

Br. Alcoholis ope penitus extrahe-
re, tincturas commixtas filtrare, alco-
holem distillatione separare et quod
reliquum est ad extracti consistentiam
consumere.

Pulvis ad s. contra rachitidem s. anti-rachiticus. (Sm.)

℞. Rubiae pulveratae drachmas duas.
Concharum praeparatarum
drachmas quatuor.
Fiant doses octodecim. — Gabe, zwei
oder drei Stück täglich in Zuckerwasser,
bei einem jungen Kinde.

Pulvis Rubiae compositus. (Wür.)

℞. Rubiae semunciam.
Myrrhae,
Boracis,
singulorum drachmam unam.

Decoctum Rubiae tinctoriae. (Sw.)

℞. Radicis Rubiae . . . unciam unam.
Macidis drachmas duas.
Coquendo partem tertiam consume
et colaturae adde

Tincturae aromaticae
drachmas duas.

Syrupi Acidi citrici unciās duas.
Abstringend, bei Selbstucht, Bleichucht,
Amenorrhoe und chronischen Catarrhalbe-
schwerden empfohlen. — Gabe, drei Unzen
drei oder vier Mal täglich.

Tisana antiscrophulosa. (Ca. Sm.)

℞. Radicis Rubiae . . . semunciam.
Lupuli manipulum unum.
Foliorum Juglandis . . . no. 8
Aquae semisextarios (demi-setiers)
tres.

Coquendo ad octarii (chopine) unius
remanentiam consume et colaturae re-
frigeratae adde

Tincturae Martis tartarisatae coch-
lear minus (Kaffeelöffel).

Gabe, zwei Gläser, Morgens und Abends.

Tisana tonica et antiherpetica. (Pie.)

℞. Radicis Rubiae . . . unciam unam.
Florum Arnicae,
Stipitum Dulcamarae,
singulorum semunciam.
Aquae vitra sex.
Coque et adde
Foliorum Cochleariae semunciam.

*Decoctum Carnis aperiens s. aperitivum.
(Bo. Ca. Pie. Sm.)*

℞. Garnis e collo vervecis
unciās quatuor.
Radicis Saponariae semidrachmam.
— Rubiae . . . drachmas duas.
Foliorum Cichorii amari
manipulum unum.

Aquae sesquioctarium
Coquendo tertiam partem consume.
Auf vier Mal, Morgens nüchtern, bei
Anschwellungen der Unterleibsorgane.
Zur ersten Zasse setzt man einen Scrupel

essigsaures Kali, dessen Gabe man allmählig
verstärkt.

Tisana antiicterica. (B^t.)

℞. Radicis Rubiae,
— Curcumae,
singularum unciam unam.
— Chelidonii majoris,
Summitatum Centaurii minoris,
singulorum manipulum unum.
Aquae fontanae,
Vini Rhenani,
singulorum libras duas.

Coque et colaturae adde

Syrupi Quinque Radicum aperien-
tium unciās duas.
Von Sydenham gegen Selbstucht ge-
rühmt; er ließ Morgens und Abends ein
halbes Pfund davon nehmen.

Potio antirachitica. (B^t. Sm.)

℞. Radicis Rubiae siccatae semunciam.
Tartari solubilis drachmas duas.
Aquae fontanae
unciās sexaginta quatuor.

Coque blando igne per horam unam,
cola et adde

Mellis despumati . . . unciās duas.
Bei Rachitis empfohlen. — Levret
ließ davon Kindern täglich acht Unzen ne-
men. — Von der frischen Wurzel nimmt
man das Doppelte.

*Decoctum Rubiae compositum (alcali-
num). (Wür.)*

℞. Radicis Rubiae,
— Rhei,
singularum drachmas tres.
Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae fontanae
libras tres cum dimidia.

Coque per horam unam et colaturae
adde

Syrupi Zingiberis
unciās duas cum dimidia.

Apozema tonicum. (Bo.)

℞. Radicis Rubiae,
— Ononidis,
singularum semunciam.
Foliorum Marrubii,
— Matricariae,
— Artemisiae,
— Rorismarini, singulorum
manipulum dimidium.
Seminum Petroselini
pugillum unum.

Croci,
Cinnamomi,
singulorum scrupulum unum.

Aquae quantum sufficit
ut octo unciās colaturae obtineantur,
cui adde
Syrupi Marrubii unciam unam.

Tartari martialis solubilis
semidrachmam.

Bei Menstruationsbeschwerden, Bleichsucht, weißem Fluß und Blutflüssen nach Unterdrückung irgend eines habituellen Ausflusses.

Vinum adstringens. (Au.)

R. Radicis Rubiae . . . unciam unam.

— Tormentillae,
Fructuum Aurantii viridium,
singulorum semunciam.

Cascarillae . . . drachmas sex.

Extracti Ligni Campechensis
drachmas tres.

Vini libras duas.

Post sufficientem digestionem cola.
— Gabe, alle drei Stunden eine halbe bis ganze Unze.

R u b u s.

Sechs Arten dieser Gattung werden in den Pharmacopoen angeführt:

1) Rubus chamaemorus, L.; Ruffbeere; Ronce de montagne (Gal.); Mountain bramble (Ang.); Multhebaer, Myrebaer, Laamanak, Latoch (D.); Aalher blaadige bramboos (Bel.); Moruszka (Pol.).

D. Pol. R. Be. M.

2) Icosandria Polygynia, L.; Rosaeeae, J.) Eine im nördlichen Europa wachsende Pflanze. (Linn. Pl. Lapp. t. 5. f. 1. Plenck t. 410.)

Man wendet die Früchte (fructus s. baccae Chamaemori) an; es sind geruchlos, unreif etwas sauer, nachher schmeckende Beeren.

2) Rubus fruticosus, L.; Strauchartige Himbeere, Brombeere, Kragbeere, gemeiner Brombeerstrauch; Ronce noire (Gal.); Common bramble (Ang.); Brambaer (D.); Zarca (His.); Bramen, Brumeln (Bel.); Rovo volgare, More di razza o di rogo, Rogo di Macchia (I.); Jezyny (Pol.); Sylva (Lus.); Brombaer (Succ.).

An. Bor4. Br. Gal. His. Wir. Br. Fi. sp.

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (Hayne III. t. 12. Lam. Encycl. meth. t. 441. Bert. Bild. IV. 18 fig. 2.)

Man wendet die Früchte (baccae Rubi nigri s. fruticosi s. Mori rubri) an; es sind geruchlose Beeren von angenehmem Geschmack.

3) Rubus arcticus, L.; norbische Himbeere; Ronce septentrionale (Gal.); Dvarfbramble (Ang.); Akerbaer (Succ.).
Br. R. Succ. Be. M.

Ein Strauch des nördlichen Europa's. (Linn. Pl. Lapp. t. 5. fig. 2. Plenck t. 409.)

Man wendet die Früchte (Baccae Norlandicae), Beeren von angenehmem Geruch und angenehmem, weinartigem Geschmack an. 4) Rubus trivialis, Mich. ? Ronce commune (Gal.); Dewberry (Ang.).

Am. C.

Ein Strauch Nordamerica's, dessen Rinde abstringirende Kräfte besitzt.

5) Rubus villosus, Willd.; haarige Himbeere; Ronce velue (Gal.); Blackberry (Ang.).

Am. C.

Ein Nordamerikanischer Strauch. (Bigel. Med. Bot. II. t. 38.)

Die Rinde ist abstringirend.

6) Rubus Idaeus, L.; Himbeere; Framboisier (Gal.); Raspberry (Ang.); Maliny, Ostrucini (B.); Hindbaer, Bryngebaer, Himbaer (D.); Frambueso, Sanguesca (His.); Framboizen (Bel.); Rovo ideo, Lamponi, Framboè (I.); Maliny (Pol.); Amoreira frambeeza (Lus.); Hallon (Sa.).

A. Am. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Penn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. O Pol. R. Sax. Succ. Wir. WW. Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (Blackw. t. 289. Plenck t. 407. Hayne III. t. 8. Düss. off. Pfl. t. 20. Pl. méd. III. 170. Bert. Bild. IV. 18 fig. 1.)

Man wendet die Früchte, Himbeeren (baccae s. fructus Rubi Idaei) an; es sind fast runde, rothe, graue oder weiße Beeren, welche aus einer Menge von weichem Fleisch eingehüllt, auf einem sehr langen kegelförmigen Fruchtboden sitzenden Saamen bestehen.

Decoctum Rubi villosi. (Am. B*.)

R. Corticis Radicis Rubi villosi
unciam unam.

Aquae quantum sufficit
ut coquendo unciae octo colaturae obtineantur.

Abstringirend, in Nordamerica in Gebrauch. — Gabe, ein halbes Glas täglich mehrmals.

Syrupus Rubi arcticci, (Succ.)

R. Succi baccarum Rubi arcticci recens expressi et depurati
libram unam.

Sacchari albi libras duas.

Fiat leni calore syrupus.

Succus Rubi Idaei. (Br. Ful. Hass. His. Pal. Sar. Sax. Wir. Pid.)

R. Baccarum Rubi Idaei bene maturarum quantum vis.

Contere inter manus, massam in cavam sepone, donec liquidum clarum supernatet et cola exprimendo; succum per aliquot dies sepone ut depuretur et partem claram in lagenis longicollibus a strato olei obtectam serva. (Br. His. Pal. Sax. Wir.)

Hass et *Pid.* succo antequam in lagenas immittatur, Sacchari partem quartam addere et semel ebullire jubent.

Roob Rubi Idaei. (Br. Ful. His. Wir. Wür. *Pid.* Sw. T.)

℞. Baccarum Rubi Idaei maturorum quantum vis.

Contere, massam per tres dies sepone, et succum leni igne ad consistentiam mellis coque, quartam Sacchari partem addendo. (Br. Ful. Wir. Wür. *Pid.* Sw.)

℞. Sacchari fortissime cocti libras duas.

Succi Baccarum Rubi Idaei, Aquae communis, singulorum libram unam.

Coque ad consistentiam gelatinae et cola. (His. T.)

Geuerlich, Fühlend.

Mel Rubi Idaei. (Vm.)

℞. Succi Baccarum Rubi Idaei recenter expressi . . . partem unam.
Mellis albi . . . partes tres.
Misce frigide et post aliquot tempus sepositionis decantha.

Syrupus Rubi Idaei s. de Frambaeis et Rubi fruticosi. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. L. Lus. O. Pal. Pol. Suec. Wir. Wür. C. Fi. *Pid.* Sw. T. Vm.)

℞. Baccarum Rubi Idaei nondum perfecte maturarum, Sacchari puri, singulorum partes aequales.

Misce leviter agitando, supra lenem ignem collocata, paululum coque, cola per cribrum setaceum arcte textum et syrupum serva. (Gal.)

T. Baccas Rubi fruticosi non perfecte maturas calori balnei aquae bullientis exponere, donec rumpantur, addere per vices Sacchari albi pulverati pondus aequale, continue agitando, calorem deinde ad bullitionem usque augere, mixta adhuc bullientia cribro immittere et syrupum parare.

℞. Succi Baccarum Rubi Idaei modo expressi . . . partes duas.
Sacchari albi partes tres cum dimidia.

Solve in balneo aquae tepido. (Vm.)
℞. Sacci Baccarum Rubi Idaei depurati uncias viginti.

Sacchari albi . . . libras tres.
Liqua blandi caloris ope (ebulliant semel et fiat l. a. syrupus). (Bor. Bor4. Han. HassP. Lus. O. Pal.)

Bor4. Syrupum Rubi fruticosi eodem modo praeparandum indicat; — Ams. B. et Bel. Succi uncias sedecim et Succi libras duas cum dimidia; — D. Pal. Wir. et Wür. Succi uncias viginti et Sacchari triginta duas; — Hass. et *Pid.* Succi uncias decem et Sacchari tredecim cum dimidia; — A. Fenn. Suec. Fi. Succi partem unam et duas Sacchari (eodem modo Syrupus Rubi fruticosi Fi.); — Sw. Succi uncias sedecim et Sacchari viginti octo; — Gen. Succi sesquilibrium et Sacchari libras duas cum dimidia; — C. Succi octarium unum et Sacchari libras duas; — Li. Succi uncias octodecim et Sacchari libras duas; — Ful. Succi et Sacchari partes aequales.

Fi. Succi Baccarum Rubi fruticosi et Mellis despumati, singulorum partes aequales; lente coquendo paratur *Syrupus Rubi fruticosi cum Melle s. Diamoron cum Melle.*

Acetum Rubi Idaei. (Bor. Bor4. Gal. Han. Hass. O. Pal. Pol. Sar. Wir. T.)

℞. Baccarum Rubi Idaei recentium libras sex.

Aceti Vini rubri libras quatuor. Macera per dies quatuor, cola absque expressione et filtra. (Gal.)

Bor. Bor4. Han. O. Pol. et Sar. Baccarum partem unam, Aceti duas et unum mensem macerationis (sepositionem donec liquor colore intense rubro imbutus fuerit Bor4); — Pal. et Wir. Baccarum partem unam, Aceti sex et aliquot dies macerationis soli expositurum; — T. Baccarum libras quatuor, Aceti libras duas et uncias octo, macerationem per dies quatuor vel quinque.

℞. Succi Baccarum Rubi Idaei maturarum . . . libras duas.

Aceti . . . semilibram.
Post duos dies macerationis exprime fortiter et colaturae adde

Sacchari albi . . . sesquilibrium.
Digere blando igne et post refrigerationem decantha. (D.)

HassP. Baccarum recentium partem unam, Aceti duas, macerationem per mensem, Sacchari partem unam et ebullitionem.

Kühlend, beruhigend, in verschiedener Menge zu Tisänen hinzugesetzt.

Aqua Rubi Idaei. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sax. *Pid. Sw. Vm.*)

R. Baccarum Rubi Idaei contritarum partem unam.

Aquae partes duas.

Destillet una pars. (Br.)

Pal. Baccarum partem unam et quatuor Aquae; destillet una pars; — D. Baccarum partem unam et sex Aquae; destillent partes quatuor; — *Vm.* Baccarum partem unam, Aquae viginti quatuor; destillent partes sex; — R. Baccarum partes quatuor et decem Aquae; destillent partes sex; — *Sw.* Baccarum partes decem et Aquae quantum sufficit; destillent partes viginti; — *Li.* Baccarum partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo; — *HassP.* Baccarum contusarum ac statim modice expressarum libras duodecim, Aquae quantum satis; destillent librae octodecim.

R. Pulpae Baccarum Rubi Idaei partem unam.

Aquae partes tres.

Destillent partes duae. (Han.)

Ba. Pulpae partem unam et Aquae sex; destillent partes tres; — O. Pulpae partes duas et Aquae sufficientem quantitatem; destillent partes viginti; — *Hass. et Pid.* Pulpae partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo.

R. Pulpae Baccarum Rubi Idaei partem unam.

Aquae partes sex.

Post aliquot dies fermentationis destillent partes duae. (Sax.)

R. Baccarum Rubi Idaei quantum vis. Contritas cum Aquae tepidae aequali quantitate subig; fermentationi subijce, adde Aquae frigidae partes viginti quatuor et destillando partes sex abstrahe. (*Vm.*)

R. Pulpae (i. e. residui post parationem succi) Baccarum Rubi Idaei libras decem.

Aquae libras triginta.

Subcarbonatis Potassae (Kali carbonici crudi) uncias duas.

Destillent librae viginti. (Bor. Bor4. Pol.)

Bor4. praeterea Residui sale conditi libras quindecim, reliqua ut antea; — Ful. Baccarum libras octo, Aquae viginti quatuor et unam Subcarbonatis; destillent librae sedecim.

R u m e x.

Drei Pflanzen dieser Gattung führen wir hier an:

1) *Rumex aquaticus, L.*; Wasserampfer, Wassermangold, Wassergrindwurzel, Strohampferwurzel, Butterweckenkraut; *Patience d'eau ou aquatique, Rhubarbe sauvage (Gal.); Waterdock (Ang.); Vandskreppe (D.); Waterpatich (Bel.); Labaca major (Lus.); Vatsyra (Suec.).*
A. Ams. B. Bel. Br. D. Ful. Gal. Li. R. Sax. Wir. Bo. C. M. Sp.

2) Eine Pflanze (*Hexandria Trigynia, L.; Polygoneae, J.*), welche in Europa an überwässerten Stellen wächst. (*Zorn Ic. pl. t. 588.*)

Man wendet die Wurzel (*radix Lappathi aquatici s. Herbae Britannicae s. Hydrolappathi s. Rhapontici*) an; sie ist groß, ästigen, geringelt, außen schwärzlichbraun, innen safrangelb und geruchlos. Der Geschmack ist herb und etwas bitter. Tonisch, schweißtreibend, bei Hautkrankheiten sehr in Gebrauch.

3) *Rumex crispus, L.*; Krauser Ampfer; *Patience friée (Gal.); Curled dock (Ang.); Kruzet skreppe (D.); Gekruide patich (Bel.); Svisyra (Suec.).*
Gal. C.

4) Eine Europäische Pflanze. (*Curt. Fl. Lond. t. 204.*)

Man wendet das Kraut (*herba Lappathi crispici*) an; es besteht aus einem walzigen, wenig ästigen Stängel mit lanzettigen, stark wellenförmigen, am Rande wie Frauen Blättern. Es hat einen ganz schwach styptischen Geschmack.

5) *Rumex sanguineus, L.*; Blutampfer, Blutkraut; *Patience rouge (Gal.); Bloody dock (Ang.); Bluedkruid (Bel.).*
Gal.

6) Eine im nördlichen Europa und America wachsende Pflanze. (*Zorn Ic. pl. t. 127.*)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (*radix Lappathi sanguinei*) hat einen herben und abstringirenden Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem ästigen, purpurrothen Stängel mit herzförmigen, lanzettförmigen, feingezähnten purpurrothen Blättern.

7) *Rumex acutus und obtusifolius, L.*; spitz- und stumpfblättriger Ampfer, Grindwurzel; *Patience à feuilles aiguës et vulgaires (Gal.); Romice Lapato, Acetosa maggiora (L.).*

Bor. Bor4. HassP.
Eine in Europa an feuchten Stellen wachsende perennirende Pflanze. (*Blackw. t. 491. Plenck t. 290.*)

Die Wurzel (*radix Oxylappathi s. Lappathi acuti*) ist ästig, von verschiedener Stärke, außen gelblichbraun, innen gelb; getrocknet, außen braun, ohne Geruch, der Geschmack bitter und abstringirend.

Extractum Patientiæ s. Lapathi. (Gal. T. Vm.)

℞. Radicis Patientiæ concisæ

quantum vis.

Superfunde Aquæ quantum sufficit ut leviter obtegatur; macera per horas duodecim, tunc Aquæ æqualem quantitatem addendo macerationem per eundem temporis lapsum continua, liquores commixtos cola et clarificatos ad extracti consistentiam usque consume. (Vm.)

℞. Radicis Patientiæ libram unam.

Aquæ frigidae . . . libras quatuor.

Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; residuum maceretur eodem modo cum nova Aqua et iterum coletur; liquores commixti in balneo aquæ ad extracti spissitudinem evaporent. (Gal.)

℞. Radicis Lapathi . . . libram unam.

Aquæ bullientis . . . libras octo.

Post horas viginti quatuor infusionis cola leviter exprimendo, per pannum vel potius per chartam emporeticam trajice et ad extracti consistentiam inspissa. (T.)

Gabe, ein bis drei Scrupel.

Decoctum Lapathi. (B*. GalM. Ra. Sp.)

℞. Radicis Lapathi . . . unciam unam.

Aquæ . . . libras duas.

Decoque ad dimidiæ partis remanentiam. (B*. Ra.)

℞. Radicis Lapathi . . . drachmas sex.

Aquæ . . . quantum sufficit

ut coquendo librae duæ colaturæ obtineantur; sub finem adde

Radicis Liquiritiæ rasæ

drachmas duas.

Infunde per sexagesimas aliquot et cola. (B*. GalM.)

℞. Radicis Lapathi . . . uncias duas.

— Inulae,

Baccarum Juniperi,

singulorum semunciam.

Aquæ . . . libras sex.

Coquendo ad semilibrae remanentiam consume, sub finem addendo

Herbae Fumariæ concisæ

manipulum unum.

Cola. (Sp.)

Schwach reizend, als blutreinigend betrachtet und bei Hautkrankheiten in Gebrauch. — Gabe, mehrere Gläser den Tag über.

R u s c u s .

In den Pharmacopden findet man zwei Arten dieser Gattung angeführt:

1) *Ruscus Hypoglossum*, L.; Alexandrischer Lorbeer; Laurier alexandrin (Gal.);

Butchers broom (Ang.); Czipkawa by lina (B.); Alexandrinse laurier (Bel.); Loreiro de Alexandria (Lus.).

Br. Gal. Wir. Be. Br. G. M. Sp. Z.

℞ (Dioecia Monadelphia, L.: Asparagineae, J.) Eine Pflanze Eubœotopars. (Zorn Ic. pl. t. 481.)

Man wendet die Blätter (herba Uvulariæ s. Hypoglossi s. Bislinguæ s. Bonifaciæ s. Lauri Alexandrinæ angustifoliae) an; sie sind eiförmig und tragen in der Mitte ihrer obern Fläche einen zungenförmigen Anhang, in dessen Winkel die Blüthen entspringen. Sie haben keinen Geruch, aber einen stark abstringirenden Geschmack.

Schwach abstringirend, aber wenig in Gebrauch.

2) *Ruscus aculeatus*, L.; stacheliger, gemeiner Mäuseborn, Mäusebornbusch, Myrtendorn; Fragon piquant, Petit houx, Houx frelon, housson (Gal.); Butchers broom, Kneeholly (Ang.); Lesny myrtus, Gedliche wlaska (B.); *Ruscus officinale*, Pugnitopo, Brusco (I.).

An. Br. Fer. Gal. GalM. Gen. His.

Wir. Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.

♂ Eine in den Wäldern Europa's wachsende Pflanze. (Bull. t. 243. Blackw. t. 155. Schk. t. 340. Zorn Ic. pl. t. 449.)

Man wendet die Wurzel (radix Ruscus s. Brusci s. Myrtacanthæ) an; sie ist lang, hölzig, weiß und besteht aus vielen feberkieselsäurehaltigen Fasern. Der Geschmack derselben ist anfangs etwas süßlich, hinterher bitter.

Harntreibend. — Sie gehört zu den radices quinque aperientes majores.

Tisana diuretica. (Pie.)

℞. Radicis Rusci . . . uncias sex.

Aquæ . . . libram unam.

Coque et cola.

℞. Radicis Rusci,

— Fragariæ,

— Asparagi,

singulorum drachmas quinque.

Aquæ libras duas cum dimidia.

Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et adde.

Syrupi Hyssopi,

— Quinquæ Radicum,

singulorum unciam unam.

R u t a .

Ruta graveolens, L.; Rautè; Gartenraute; Rue des jardins (Gal.); Common rue (Ang.); Sendib (Ar.); Ruta (B.); Aruda (Cy.); Ruda (D.); Saturei (Hin.); Ruite (Bel.); Ruta (I. Pol. R.); Matskase-so (J.); Inghu (Ja.); Suddab

(*Mal.*); *Sadca (Mal.)*; *Arruda (Lus.)*; *Brubmi, Somalata (Sa.)*; *Winruta (Succ.)*; *Aruda (Tam.)*; *Soddapuaku (Tel.)*.

A. Ams. An. B. Sa. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

Ein Heiner Strauch (Decandria Monogynia, L.; Rutaceae, J.) des südlichen Europa's. (*Blackw. t. 7. Schk. t. 115. Plenck. t. 332. Hayne VI. t. 8. Düss. off. Pfl. i. t. 19. Zorn Ic. pl. t. 163.*)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Rutae s. Rutae hortensis) besteht aus einem walzenförmigen und ästigen Stängel und abwechselnden, gestielten, blaugrünen, fast doppelt gestielten Blättern mit etwas dicken, eirund-länglichen, stumpfen, an der Basis schmälern Blättchen. Es hat einen starken, eigenthümlichen, sehr unangenehmen Geruch und einen brennenden, scharfen, sehr bittern, etwas gewürzhaften Geschmack.

Der Saame ist klein, schwarzlich, nierförmig, runzig und etwas eckig; der Geschmack ist gewürzhaft.

Reizend, magen-, nervenstärkend, schweiß-erregend, bildungstreibend, säulnißwidrig, schmerzstillend und wurmtreibend. — Gabe des Pulvers, von zehn Gran bis zwei Scrupel.

Conserva Rutae. (Sar.)

R. Foliorum Rutae contusorum,
Sacchari albi,
singulorum partem unam.
Commisce terendo.

Confectio Rutae. (Lon. LonN. Ca. Vm.)

R. Foliorum siccatorum Rutae,
Seminum Carvi,
Baccarum Lauri,
singulorum sesquinciunciam.
Sagapeni semunciam.
Piperis nigri . . . drachmas duas.
Mellis despumati uncias sedecim.
Misce. — Reizend, Menstruation treibend.

Pasta rubefaciens et febrifuga. (Bo.)

R. Summitatum recentium Rutae uncias duas.
Sinapis pulveratae drachmas duas.
Contunde simul. — Man legt diesen Teig einige Stunden vor dem Anfall auf das Handgelenk.

Extractum Rutae aquosum. (Br. Du. Ed. Gen. Pal. Wir.)

R. Herbae Rutae . . . libram unam.
Aguas fontanae . . . libras sex.

Digere in loco calido per dies quatuor, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam usque consistentiam inspissa. (Br. Pal. Wir.)

R. Foliorum Rutae . . . libram unam.
Aquaе purae . . . libras octo.

Decoque ad dimidiae partis remanentiam, cola exprimendo et colaturam, blando igne, ad massae pilularis spissitudinem consume. (Du. Ed. Gen.)
Gabe, von zehn Gran bis eine halbe Drachme.

Extractum Rutae alcoholicum. (WVir.)

R. Herbae Rutae,
Alcoholis,
singulorum libram unam.
Aquaе communis . . . libras octo.

Digere blando calore per tres dies, cola exprimendo, sepone et liquorem decantha; alcohole destillatione separato residuum ad aptam usque consistentiam evaporet.

Pulvis antilyssus s. ad morsum canis rabidi. (Pal. Wir. Sp.)

R. Foliorum Rutae,
— Verbenae,
— Salviae,
— Plantaginis,
— Polypodii,
— Absinthii vulgaris,
— Menthae,
— Lamii montani,
— Etonicae,
Summitatum Hyperici,
— Centaurii minoris,
singulorum partes aequales.

Von Paulmier gepriesen. — Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Potio emmenagoga. (Pie.)

R. Succi Rutae . . . unciam unam.
Oxymellis scillitici semunciam.
Eßfettweise bei hysterischen Beschwerden.

Injectio auricularis deterensiva. (Sp.)

R. Herbae Rutae manipulum unum.
Aquaе fontanae . . . uncias sex.
Post horas duodecim infusionis colaturae adde
Essentiae Myrrhae semidrachmam.
Mellis rosati . . . drachmas sex.

Acetum Rutae s. rutaceum. (A. Ams. Bor. Bor4. Br. Hass. Lus. O. Pal. Sar. Wir. Wür. Pid. T. Vm.)

R. Foliorum Rutae recentium partem unam.
Aceti Vini albi . . . partes decem.
Macerata frigide per plures dies, cola leviter exprimendo et filtra. (Vm.)
Sar. Rutae partem unam, quatuor

Aceti et sex dies digestionis blandi caloris ope; — Br. Hass. Pal. Wir. et *Pid.* Rutae partem unam, Aceti sex et aliquot dies digestionis; — Ams. et Bor. Rutae partem unam, Aceti octo et quatuor dies frigidae macerationis; — Wür. Rutae partem unam, Aceti novem et tres septimanas infusionis solis calore; — A. T. Rutae partem unam, Aceti duodecim et macerationem per tres (octo vel decem dierum digestionem in loco tepido T.) dies; — Bor4. Rutae uncias tres, Aceti ferventis quantum sufficit; post horam cola ut sit sesquilibra.

℞. Foliorum recentium Rutae
libram unam.

Aceti communis . . . libras sex.
Macera per dies sex, tunc coque pa-
rumper et colaturae adde

Alcoholis semilibram.
Misce bene. (Lus.)

A. Rutae uncias tres, Aceti destillati libras duas, aliquot dies digestionis blandi caloris ope et Alcoholis partem octavam; — Wir. Alcoholis partem vigesimam.

Der Alcohol dient zur Berhütung der Zerfetzung.

Acetum Rutae camphoratum. (Sw)*

℞. Summitatum Rutae cum floribus
uncias duas.

Aceti uncias sedecim.

Infunde blando calore per horas viginti quatuor, cola et in colatura dissolve

Camphorae . . . drachmas duas.
Fitra. — Ein Trophylacticum.

Oleum Rutae infusum. (Br. Gal. His. Sar. Wir. Wür. Fi. T.)

℞. Herbae recentis Rutae,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.

Post tres dies digestionis exprime.
(Br. Wir.)

℞. Herbae recentis Rutae
partem unam cum dimidia.

Olei Olivarum . . . partes tres.
Digere in balneo aquae per dies tres, post refrigerationem exprime et macerationem cum nova Herba repete. (Sar.)

Gal. digerere inter cineres calidos per horas viginti quatuor Olei partes duas et unam Herbae et operatione denovo repetita, leviter coquere et exprimere; — T. Herbae uncias quindécim, Olei Olivarum libras quinque solis calore per 3 vel 4 dies digerere et operationem cum nova Herba repetere, tertia vice macerationem per mensem circiter protrahere, sepositione clarificare etc.

℞. Herbae recentis Rutae
partem unam.

Olei Olivarum . . . partes duas.
Digere blandi caloris ope per tres dies, coque ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo. (Wür.)

His. Herbae partem unam et tres Olei; — Fi. Herbae libram unam, Olei quatuor per dies duos macerare, per quadrantem horae coquere et exprimere.

Reizend, gegen Kolik und Würmer, nervenstärkend, in Einreibungen und Klystiren.

Unguentum s. Butyrum Rutae. (His.)

℞. Foliorum recentium Rutae,
— — — Absinthii,
— — — Menthae,
singulorum uncias duas.

Axungiae Porci uncias sedecim.
Coque ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo.

Oleum Rutae aetherum, Aethereoleum Rutae. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wür. Br. C. Pid. Sw. T.)

℞. Herbae recentis Rutae
quantum vis.
Aquae communis quantum sufficit.
Destillent. (Ams. B. Bel. Du. Fer. R. Br. C.)

T. Herbae partem unam, Aquae bullientes duplum pondus et plures destillationes atque cohobationes; — Ba. Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — Sw. Herbae unam et quatuor Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — Bor. Bor4. Han. HassP. Pol. et Sax. Herbae unam et octo Aquae (destillatio, oleo separato, cum Aqua stillatitia supra novam Herbam et addita Aquae sufficiente quantitate tam diu repetatur, donec olei desiderata quantitas obtenta fuerit); — A. Herbae unam et Aquae duodecim.

℞. Herbae recentis Rutae
partes viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post dies tres destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. *Pid.*)

℞. Herbae recentis Rutae
quantum vis.

Aquae Rutae . . . quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Balsamum Rutae. (Wir. Sp.)

℞. Olei Nucis moschatae
drachmas duas cum dimidia.
— essentialis Rutae
drachman unam.

Misce bene.

Aquae Rutae. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. Pal. Pol. Sar. Sax. Br. Sw. Vm.)

R. Herbae recentis Rutae

partem unam.
quantum sufficit.
Destillent (post horas viginti quatuor) partes decem. (Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Han. Pol. Sw.)

Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Wür. et Br. Herbae partem unam et sex Aquae; destillent trientes duo; — Ba. Herbae partem unam et sedecim Aquae; destillent partes octo; — Sax. Herbae partem unam et Aquae quinddecim; destillent partes decem; — A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor.

R. Herbae recentis Rutae

partem unam.

Aquae partes quatuor.
Destillet dimidia pars; productum denuo supra novam Herbam destillet. (Sar.)

R. Herbae recentis Rutae

partes decem.
Aquae Vitae partem dimidiam.
— purae

partes centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (Vm.)

Julep s. Julapium antihystericum. (Sm.)

R. *Aquae destillatae* Rutae,

— — — — — Bryoniae,
— — — — — Florum Aurantiorum,
singularum uncias duas.

Syrupi Stoechadis,

— — — — — Valerianae,
— — — — — Paeoniae,
singularum unciam unam.

Zuf drei oder vier Mal zu nehmen.

Sabadilla.

Veratrum Sabadilla, Re.; Sabadille, Mexicanischer Käufelsaame, Käufelsamer, Käufelsamer, Mönchensaat; Cevadille (Gal.); Sabadillkorn (D.); Sabadiglia (I.); Nasikiv sabatylh (Pol.); Sabadill, Husarfrae (Succ.).

A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. Q. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. Be. Br. G. M. Sp. Z.

4 *Polygamia Monosocia, L.;* Colchicaceae, J. Eine Pflanze Mexico's. Willdenow gab mit Unrecht China als das Vaterland derselben an.

Man wendet die Frucht und die Saamen an.

Die Frucht besteht aus drei länglichen, röhlichen, nach innen aufspringenden, dreisaamigen, geruchlosen, einen scharfen, brennenden, anhaltenden Geschmack besitzenden Kapseln.

Der Saame (semen Sabadilli s. Sabadillae) ist länglich, gebogen, an einem Ende stumpf, rufschwarz punctirt, von anfangs sahem, bald darauf bitterem, endlich scharfem und Efel erzeugenden Geschmack.

Er enthält nach Meisner, Pelletter und Caventou Sabadillsaure (Acidum sabadillicum), Acide cevadique und Veratrin oder Sabadillin (Veratrinum, Sabadillinum).

Aufregend, reizend, innerlich. Dose im Ra-

gen und Brechen, äußerlich, besonders bei jungen Personen, Hautentzündung erregend. Man bedient sich derselben zur Eddung der Käufe und der Eingeweidwürmer. Seetiger wandte sie mit Erfolg gegen Bandwürmer an. Der Gebrauch erfordert aber viel Vorsicht.

Pulvis Capucinatorum, (B.)*

R. Seminum Sabadillae,

— — — — — Staphydis agrariae,
— — — — — Petroselinii,

Foliorum Nicotianae,

singularum partes aequales.

Fiat pulvis tenerrimus. — Zur Eddung des Kopfungeiesers. — Dieses Pulver bringt oft Schwindel und andere unruhigende Zufälle hervor.

Unguentum ad s. contra pediculos. (Ful.)

R. Pulveris Sabadillae uncias quatuor.

— — — — — Sinapis,
— — — — — Pyrethri,
singularum uncias duas.

Axungiae praeparatae

uncias triginta duas.

Pilulae anthelminticae. (Ca. Sw.)

R. Sabadillae,

Mellis, singularum semunciam.

Fiant pilulae viginti granorum. (Sw.)

Ca. Olei Foeniculi guttas viginti addit.

Enema s. Clyisma Sabadillae s. contra ascarides. (B* Au. Sw.)

R. Sabadillae drachmas duas.

Aquae Fontanae . uncias decem.
Coque et colaturas unciarum septem
adde

Lactis vaccini . uncias septem.
Infusum ad cimices. Seminum uncias
duas, Aesti unciam unam; digere per
duos dies. — Zur Erddung der Bett-
wanzen, die Bettstellen damit zu waschen.

Saccharum.

Saccharum officinarum, L.; Zucker-
rohr; Sucre (Gal.); Zucchero officina-
le (I.).

(Triandria Digynia, L.; Gramineae,
J.) Eine in Indien einheimische, zwischen
den Wendekreisen häufig angebaute Pflanz-
ze. (Plench t. 40. Tussac Pl. des Ant.
I. t. 23. Diss. off. Pfl. Lief. 8. Bert.
Bild. I. 10. fig. 2. Atlas 3. Wörterb. d. Na-
turgech. 3. Bf. 29. Bf. 3. g. 1.); Arundo sac-
charifera, L. (Rumph. Amb. V. 74.)

Aus der perennirenden Wurzel dieser
Pflanze erheben sich mehrere 1 bis 2 Zoll
dicke, 8, 10 bis 12 Fuß hohe, mit einem
lockern, zelligen, saftigen Mark erfüllte,
grüne, gelbe oder violette oder gelb und
violett gestreifte Halme, welche von zwei-
reihigen, 4 bis 5 Fuß langen, schmalen,
schrägenden Blättern umgeben werden, aus
aus deren Spitze sich auf einem nackten,
glatten, ungefähr 5 Fuß hohen Blüthen-
stiele eine sehr große, ästige, ausgebreitete,
pyramidale Blüthenrispe erhebt.

Der untere Theil des Halmes, von wel-
chem die Blätter abfallen, ist es vor-
züglich, in welchem sich der Zuckerstoff in
größer Menge ausbildet und den man da-
her zur Gewinnung des Saftes, aus wel-
chem nachher der Zucker bereit wird, vor-
zugsweise benützt. Der Zucker,

Saccharum, Sacchar; *Sākharā*, *Sāk-
yāgar*; Sucre (Gal.); Sugar (Ang.);
Sukhir (Ar.); Cukr (B.); Sukker (D.);
Schukkir (Duk. Pe.); Azucar (His.);
Cheni (Hin.); Suiker (Bel.); Zucchero
(I.); Saker (Mah.); Gula (Mal.); Cuck-
iea (Pol.); Assucar (Lus.); Sarkara
(Sa.); Socker (Suec.); Sakkarr (Tel.);
Panchadara (Tam.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
Bor4. Br. D. Da. Ed. Fenn. Fer. Ful.
Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass.
HassB. Hib. Li. Lon. LonN. O. Pol.
R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A.
Re. Br. C. Fl. G. M. Par. Pih. Sp.
T. Z.

ist eine dicke, weiße, krystallinische, zerreib-
liche, geruchlose Substanz von sehr ange-
nehm süßem Geschmack. Der weißeste Zu-
cker (Saccharum albissimum), welcher
gemeinlich Raffinade genannt wird,
ist mehr, der weiße Zucker (Saccharum

album), gewöhnlich *Mellis* genannt, we-
niger rein. Nach Europa wird er als ro-
ther Zucker oder Roscovaber (Moscowatum)
gebracht. Der aus der Auflösung des ge-
reinigten Zuckers durch regelmäßige Cry-
stallisation erhaltene Zucker wird Candis-
zucker, Zuckerland (Saccharum candum
s. cantum s. crystallisatum) genannt,
und ist, je nach dem Grade der Reinheit,
mehr oder weniger weiß oder gelblich, oder
braun und mehr oder weniger durchsichtig.

Bor4. zeigt unter den zur materia phar-
maceutica gehörigen Gegenständen die Ro-
tulae Sacchari, Zuckerkuchen an.

Syrupus simplex s. *communis* s. *Sac-
chari* s. *Sacchari albi*, *Saccharum cla-
rificatum*. (A. Am. Ams. An. B. Ba.
Bel. Bor. Bor4. D. Ed. Fenn. Fer. Ful.
Gal. Galm. Gen. Ham. Hass. HassP.
His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. Suec. Wir.
Wür. C. Fl. Pid. Sw. T. Vm.)

R. Sacchari albi . . . partes tres.
Aqua . . . partem unam.

Dissolve blandi caloris opo, liquori,
despumando continue, Albumen unum
in Aquae parte una dilutum immitte;
coque donec nonnisi parva spuma al-
bae copia appareat et per pannum tra-
jice. (Gal. Galm.)

T. Sacchari libras triginta, Aquae
decem, Albumina Ovorum quatuor cum
Aqua tanta quantitate subacta, ut pon-
dus libras decem aequet.

Parari potest quoque absque ebul-
litione, dissolvendo Sacchari partes duas
in una Aquae, balnei vaporis opo,
(Gal.); — Galm. Syrupus refrigeratus
35° indicet.

Hass. Wür. et Pih. Sacchari partes
quatuor et tres Aquae; — Ams. Ed.
et C. Sacchari quindecim et octo Aquae;
— A. An. B. Ba. Bel. Fenn. Fer. Ful.
HassP. Suec. Wir. Fi. et Sw. Sacchari
partes duas et unam Aquae; — D.
His. et Vm. Sacchari et Aquae, singu-
lorum partes aequales; — Bor. Bor4.
Han. O. Pol. Sacchari libras tres et
Aqua uncias viginti; — Lon. LonN.
Sacchari libras duas cum dimidia et
Aqua octarium unum; — Am. Sac-
chari uncias quindecim et Aquae se-
mioctarium; — Li. Sacchari libras
tres et Aquae uncias viginti septem; —
Gen. Aquae et Sacchari quantum suffi-
cit ut fiat liquor spissus; — RC.
Sacchari libras tres cum dimidia, Aquae
libras duas.

Du. Syrupum simplicem inter ma-
terias pharmaceuticas indicat i. e. ve-
nalem.

Blandeau syrupum colore penitus pri-
vatum ita parare proposuit:

R. Sacchari libras sexaginta.
Carbonis animalis abluti
 uncias sexaginta.
Aquae octarios sedecim.
 Liqva ignis clari ope et infunde per
 duas vel tres vices, solutionem Albu-
 minum Ovorum no. 6. in Aquas octa-
 riis duobus; ab igne remota seponē,
 despuma et per pannu trajice. (GalH.)

Durozier sequenti modo procedit:
R. Sacchari libras quadraginta.
Aquae frigidae libras viginti duas.
 Agita solutionem cum Carbone ani-
 mali loto, et mixturam subinde vehe-
 menter movendo per horas viginti qua-
 tuor, tunc filtra.

Granulaire hunc modum parandi in-
 dicat:

R. Sacchari libras viginti.
Albumina libras decem.
Aqua no. 3.
 In autoclave inclusa stent super igne
 per horae quadrantem.

R. C. praeterea Syrrupum Molassae s.
partem sacchari non-crystallabilem in-
dicat.

Syrupus s. Tinctura Corallii. (Gen.)

R. Corallii rubri,
Cerae Navae libras duas.
 singulorum libras duas.
 Cerae liquefactae corallium immitte
 et tandem coque, donec hujus supremi
 color penitus cum cera commixtus
 sit; decantha deinde et igni appropin-
 quando adde

Sacchari albi libras duas.
Saccharo liquato, ab igne remove et
 adde

Aquae bullentis sesquilibram
 sed sensim infundendo et sub continua
 agitatione, ne materia e vase repellatur;
 coque denno ut cera liquefiat et in lo-
 cum frigidum ad coagulandum sepone;
 crusta deinde semota syrupum serva.

Rotulae Manus Christi, Saccharum per-
latum. (Br. Wir. Sp.)

R. Sacchari albi quantum vis.
Aquae Rosarum quantum sufficit.
 Fiant rotulae. (Sp.)

R. Sacchari albi libram unam.
Aquae Rosarum quantum sufficit
 ad dissolvendum saccharum. Coque ad
 globulum usque et adde

Matris Perlarum pulveratae
 semunciam.
 Fiant rotulae. (Br. Wir.)

S a g a p e n u m.

Gummi Sagapenum s. serapinum; Sa-
γαπέννον; Sagapengummi, Serapingummi;

Sagapenum; Gomma seraphique (Gal.);
Sughenus (Ar. Duk.); Sagapeno (His-
Lus.); Sagapeno, Serapino (I.); Saga-
pen (Pol.); Kundel (Sa.).
 Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br.
 D. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han.
 Hfs. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. Sax.
 Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. M.
 Sa. Sp. T. Z.

Ein Gummiharz in körnigen Massen ober
 erbsengroßen Tropfen (Sagapenum in gran-
 nis, was jedoch sehr selten vorkommt), äu-
 ßerlich von röthlichgelber, innen von röth-
 lichweißer Farbe. Der Geruch ist unange-
 nehm, dem des Asand ähnlich, aber weni-
 ger stark, der Geschmack scharf.

Diese Substanz kommt, nach Willbe-
 n a w, von Ferula Persica, Hope 2, pe-
 risches Sedentkraut (Pentandria Digynia,
 L.; Umbelliferae, J.), einer Pflanze Per-
 sien's. (Phil. Trans. LXXV. 36. t. 3. 4.)
 Reizenb, selten angewendet.

S a g o.

Sagu, Pateula Sagu; Sago; Sagou
(Gal.); Sagu (Ba. Ja. Mal); Sekuhme
(C.); Sanké chawal (Duk.); Sabudana
(Hin.); Schöwarisi (Tam.); Zowbium
(Tel.).

Am. An. B. Ba. Bor4. Fer. Ful. Gal.
 Hass. HassP. Li. Lus. R. Wir. A. Be.
 Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. T.

Eine Stärkemehlartige Substanz in klei-
 ner unregelmäßigen, über Stecknadelnspiz-
 guafen, weißlichen, besonders röthlichen, sehr
 harten, weichsam, besonders in der Mitte,
 hornartigen, geruch- und geschmacklosen
 Körnern. (Orana Sagu.)

Man bereitet von Sago aus dem Mark
 der Sagopalme, Sagus Rumphii, Lamk.,
 welche auf den Moluden wächst.
 Stärkend, erweichend.

Gelatina Sagu. (Lus)

R. Sagu pulverati trachtmaß unam.
Aquae uncias octo.
 Coque lente, agitando continue, ad
 consistentiam requisitam. Adde
Sacchari albi quantum sufficit
 ad gratum saporem.

S a l e p.

Saleb; Salep; Salep (Gal.); Salibi-
misri (Ar. Duk. Hin.); Salamisrie (Tam.).
 A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4.
 BorC. Br. D. Fenn. Gal. Ham. Han.
 Hass. HassP. Lus. O. Pol. R. Sax.
 Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. C. Fi.
 G. M. Pid. Sp. T. 41

Eine Stärkemehlartige Substanz in klei-

nen Stücken von der Größe einer Kaffeebohne bis zu der einer Mandel, von strohähnlicher Farbe, welche halbburchsichtig, fast hornartig ist und einen etwas dick- und saamenähnlichen Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack besitzt.

Man bereitet den Salep in Persten aus den Wurzelknollen unbekannter Orchideen. Vorzüglich wird die Wurzel von *Orchis mascula*, L. (*Blackw.* t. 53. *Plenck* t. 648.) und *Morio*, L. (*Schik.* t. 271. *Plenck* t. 645.) und welche beide in Deutschland, erstere aber vorzüglich häufig in der Türkei und in ganz Asien vorkommen soll, als Salepwurzel benutzt.

Stärkend.

Pulvis Salep. (B*.)

℞. Salep sesquinciā.
 Sagu unciā unā.
 Gummi Tragacanthae drāchmā unā.

Man verbünnt Morgens und Abends einen Kaffeebssel voll mit Wasser und Milch und macht einen Brei daraus, welcher bei Schwindsucht und Husten von Nutzen ist.

Conditum Satyrii, Conserva Orchidis. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Radicis recentis Orchidis librā unā.

Aquae librās octo.
 Macera per dies aliquot, tunc coque ad mollitiem usque; in decocto clarifica deinde

Sacchari albi sesquilibram.
 Infunde radicem per tres dies et tunc coque in syrupo atque in eo retine vel evaporatoria ope tica. (Sar.)

Pal. et Wir. Radicem in Aqua coquando mollescere, tunc exstillare et ei infundere Saccharum ad plumam coctum.

Gelatina s. Mutilago Radicis Salep (An. BorC. Bor4. Han. Lus. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Salep pulverati drachmā unā.
 Aquae unciās octo.
 Coque sufficienter. (Sm.)

Bor4. Salep drachmā unā, Aquae frigidae unciās duodecim, ad unciarum septem remanentiam decoque.

℞. Pulveris Salep drachmas duas.
 Aquae bullientis unciās sex.
 Tritura simul. (An.)

BorC. Salep drachmas duas et Aquae bullientis unciās duodecim.

℞. Salep pulverati drachmā unā.
 Aquae unciās octo.
 Coque et adde

Sacchari sufficientem quantitatem ut sapor gratus prodeat. (Lus.)

Vm. Salep drachmā unā, Aquae unciās quatuor, cum dimidia et Syrupi Sacchari sesquinciā; — Han. Salep drachmas duas, Aquae unciās octo et Syrupi Corticum Aurantiorum sesquinciā; — Fi. Salep unciā unā cum Aquae libris sex ad duarum remanentiam coquere, colare, ad unam lento calore consumere, addere Sacchari unciās duas et ab igne removendo, affundere Aquae Cinnamomi lacteae semunciā; — T. ut Fi. sed sub finem aquae cinnamomi loco Aquae Citri drachmas duas et aliquot guttas solum Aquae Cinnamomi.

℞. Pulveris Salep drachmas duas.
 Aquae frigidae quantum sufficit ut coquendo decocti unciā novem obtineantur, cui adde

Syrupi Papaveris sesquinciā.
 Aquae Lauro-Cerati drachmas sex.
 Misc bene. (Sw.)

Decoctum Radicis s. de Radice Salep, Infusum Orchidis. (Li. Wür. Au. Sz.)

℞. Pulveris Radicis Salep drachmā unā.

Aquae purae unciās sedecim.
 Coque ad colaturae librae unius remanentiam. (Wür.)

Au. Salep drachmas duas et Aquae unciās duodecim.

℞. Pulveris Orchidis drachmā unā.
 Imbibe Aqua frigida, donec volumen quadruplum obtentum sit; adde deinde Aquae bullientis sesquilibram.
 Coque per horam dimidiam. (Li.)

℞. Salep pulverati drachmas duas.
 Aquae fontanae quantum sufficit.
 Decoqe ad librarum duarum colaturae remanentiam et adde

Syrupi Papaveris,
 — Diacodion,
 singulorum unciā unā.

Misce bene. (Sa.)

Mistura s. Potio demulcens. (Ham. Sm.)

℞. Salep pulverati scrupulos duos.
 Aquae fervidae unciās decem.
 Solutioni adde

Sacchari albi semunciā.
 Dissolve. (Ham.)

℞. Salep drachmā unā.
 Aquae bullientis quantum sufficit.
 Coque per horae quadrantem et colaturae unciarum quatuor adde

Laudani liquidi Sydenhami guttas quindecim.
 Syrupi Diacodion drachmas quatuor.
 Misc bene. (Sm.)

Potio pectoralis. (Sm.)
 ℞. Salep pulverati

Sacchari Lactis,
singulorum drachmas duas.
Syrupi Diacodion unciam unam.
— Althaeae . . . uncias duas.
Misce. — Eßfelfweise.

Chocolata s. Succolata alba. (Pic.)

℞. Cacao uncias quatuor.
Saley uncias sex.
Aquaë uncias octo.
Coque exiguo igne per horam dimidiam et adde
Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Farinae quantum sufficit.
Fiant tabellae ponderis semunciae.

Electuarium diasatyrum s. aphrodisiacum. (Pal. Wir. Bo. Sp.)

℞. Cinnamomi . . . drachmas duas.
Vanillae drachmas octo.
Radicis Orchidis . . drachmas sex.
Marrubii scrupulos duos.
Radicis Eryngi conditae uncias duas.
Conservae Inulae quantum sufficit.
Misce bene. (Bo.)

℞. Radicis Orchidis recentis uncias quatuor.
Sacchari ad plurimam cocti uncias duodecim.
Contunde, per cribrum setaceum trahice et tere cum
Nucis Indicae conditae,
Zingiberis conditi,
Pinearum recentium,
Pistaciarum,
singulorum uncia una.
Adde deinde
Pulveris Caryophyllorum,
— Cinnamomi,
— Scincorum marinorum,
singulorum semunciam.
Brodii Zingiberis quantum satis
ut fiat electuarium. (Wir. Sp.)

℞. Radicis recentis Eryngii,
— — Pastinacae,
— — Orchidis,
Nucum conditarum,
Pinearum,
Pistaciarum,
singularum semunciam.
Seminum Anisi,
— Erucae,
— Fraxini,
— Urticae,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum drachmas quinque.
Scinci marini
drachmas duas cum dimidia.
Moschi grana septem.
Mellis despumati . . . libras tres.
Pharmacopoea universalis. II.

Misce fiat electuarium. (Pal.)
Gabe, vier bis sechs Drachmen.

Salicaria.

Lythrum Salicaria, L.; brauner Weiberich, Ackerweiberich, Weiberichblutkraut; Salicaire (Gal.); Common willow herb (Ang.); Wrblina brunatna (B.); Parcike (Bel.); Salicaria (I.).

A. Am. B. Ba. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Ham. His. Li. Sax. Wir. Wür. Rg. C. M. Sp. Z.

♀ (Dodecandria Monogynia, L.; Salicariaeae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Hayne III. t. 39. Düss. off. Pfl. t. 3. Zorn 1c. pl. t. 113.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Salicariae s. Lysimachiae purpureae) ist walzig und gelb. Das Kraut besteht aus einem vierkantigen, röhlichen, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, herzförmig lanzettigen, ganzen, oben glatten, unten behaarten Blättern. Es ist geruchlos und hat einen schleimigen, bitteren Geschmack.

Man hat es bei Diarrhoe und Ruhr empfohlen. — Gabe des Pulvers, von einer Drachme bis zu vier Scrupel.

Opiatum adstringens. (Bo.)

℞. Pulveris Salicariae grana triginta.

— Radicis Arnicae semidrachmam.

— Aluminis grana sex.

Conservae Cynorrhodon quantum sufficit.

Auf einmal und nöthigenfalls binnen vier und zwanzig Stunden zwei Mal wiederholt. Man nimmt es in einer passenden Lixane.

Decoctum Salicariae. (B*.)

℞. Herbae Salicariae unciam unam.

Aquaë fontanae . . . libram unam.

Decoque ad unciarum octo colaturae remanentiam. — Bei Diarrhoe und Ruhr empfohlen. — Gabe, ein Eßfel alle zwei Stunden.

Mixtura antidysenterica. (Ca.)

℞. Pulveris Salicariae sesquidrachmam.

Aquaë Rhoeados . . . libram unam.

Syrupi Althaeae . . . unciam unam.

Gabe, drei und eine halbe Unze alle drei Stunden.

Salix.

In den Pharmacopoen werden fünf Arten dieser Gattung angezeigt:

1) *Salix alba*, L.; gemeine Weide; Saule blanc, Saule commun (Gal.); Willow (Ang.); Wrba (B.); Ppil (D.); Sauce (His.); Wilg (Bel.); Salice (I.); Kora wierzbowa (Pol.); Salguerro (Lus.); Pfl (Suec.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. HassP. R. RC. Sax. Wir. Wür. WW. Br. C. M. Z.

Ein Strauch oder Baum (Dioecia Diandria, L.; Salicineae, J.), welcher in ganz Europa sehr gemein ist. (Blackw. t. 327. Plünc k. t. 710. Zorn Ic. pl. t. 402.)

Man wendet die Rinde der drei- oder vierjährigen Zweige (cortex Salicis albae) an; sie ist dünn, biegsam und braunroth, und hat einen eigenthümlichen Geruch und einen sehr abstringirenden, bitteren, balsamischen Geschmack.

2) *Salix fragilis*, L.; Bruchweide; Saule fragile (Gal.).

Ba. Bor4. Br. D. Du. Fer. Han. HassP. Li. O. R. Sax. E.

Ein fast allenthalben in Europa wachsender Strauch. (Lin. Fl. Lapp. t. 8. fig. 6)

Man wendet die Rinde der ein- bis zweijährigen Zweige (cortex Salicis fragilis) an; sie hat einen etwas balsamischen Geruch und einen sehr bitteren, abstringirenden Geschmack.

3) *Salix capraea*, L.; Soolweide, Sohlweide; Saule marceau (Gal.).

Ed. Fer. Gal. His. Lon. LonN. C.

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (Pall. Fl. Ross. t. 87. fig. 2.)

Die Rinde (cortex Salicis capraeae) ist abstringirend.

4) *Salix vitellina*, L.; Dotterweide; Saule osier jaune (Gal.).

D. R.

Ein Strauch des gemäßigten Europa's. (Hoffm. Fasc. I. 57. t. 11. 12. fig. 1—3 und t. 24. fig. 1.)

Die Rinde (cortex Salicis vitellinae) ist abstringirend.

5) *Salix pentandra*, L.; Baumwollweide, Lorbeerweide; Saule pentandre (Gal.).

A. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. D. Han. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Be. Sp.

Ein in Europa sehr gemeiner Baum. (Oed. Fl. Dan. t. 943.)

Man wendet die Rinde der ein- bis zweijährigen Zweige (cortex Salicis pentandrae s. lauraeae) an; sie ist dünn, biegsam, außen braun und hat einen balsamischen Geruch und einen etwas bitteren und syphtischen Geschmack.

Diese Rinden enthalten ein eigenthümliches Alcaloib, von Fontana, dem Entdecker, Salicin (Salicinum) genannt. Man hat sie als abstringirend und tonisch bei Wechselfiebern statt der China vorge schlagen. — Gabe des Pulvers, von einer halben bis zu einer ganzen Unze.

Pulvis Salicis compositus. (RC.)

℞. Corticis Salicis . unciās novem.

— Quercus . . . unciās duas.

Radiciſ Gentianæ luteae . . . unciām unam.

Misce. — Statt der China.

Cataplasma antisepticum. (Ful.)

℞. Corticis Salicis albae pulverati,

Herbae Rutae,

— singulorum unciās duas.

Aquae Vitae camphoratae . . . unciās tres.

Aceti quantum sufficit.

Unguentum Salicis. (Huf.)

℞. Succī Foliorum Salicis . . . unciās duas.

Axungiae Porci . . . quantum sufficit.

Misce blando calore. — Zum Verband unreiner, scorbutischer und brandiger Geschwüre.

Extractum Salicis aquosum. (A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Ful. Han. HassP. O. Pol. RC. Sax. Br. T.)

℞. Corticis Salicis . . . libram unam.

Aquae frigidae . . . libras decem.

Macera per dies duos, subinde agitando; cola, sepone, et liquorem decanthatum ad consistentiam extracti inspissa. (Pal.)

℞. Corticis Salicis . . . partem unam.

Aquae partes duodecim.

Digere per horas duodecim, blando calore, tunc per horam unam coque, cola et liquorem ad extracti consistentiam consume. (Ba.)

• HassP. ut extractum colombo, ligni campechiensis etc.

℞. Corticis Salicis . . . partem unam.

Aquae bullientis . . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquat cum partibus quatuor Aquae et itidem coletur; liquores commixti et post sufficientem depositionem decanthati ad extracti consistentiam evaporant. (An. Bor. Han. O.)

Bor4. Corticis libram unam cum Aquae sedecim ad octo, residuum cum Aquae sedecim ad dimidium decoquere, decoctionem quoties opus fuerit repetere, liquores commixtos ad remanentiam librarum quatuor et deinde

balnei vaporis ope ad extracti absinthii consistentiam consumere.

RC. Corticis quantum vis cum Aquae octuplo ad dimidium decoquere, exprimere, filtrare et ad mellis spissioris consistentiam consumere; — A. et Sax. Corticem pluribus succedentibus coctionibus penitus extrahere et liquores commixtos in balneo aquae post decanthationem inspissare jubent; — Br. coquere illum jubet per horas duas cum Aquae partibus sex, tunc denuo cum nova Aqua et liquores commixtos consumere; — H. digerere eum per horas viginti quatuor, tunc coquere per duas cum Aquae partibus decem et coctionem per aequale tempus cum nova Aquae partibus octo repetere; — Ams. bis eum decoquere, primum cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aquae, qualibet vice ad dimidium redigendis; — T. Coquere per semihoram Corticis libras duas in Aquae libris viginti quatuor et exprimendo colare, coctionem repetere et decocta filtrata inspissare.

Gabe, jehen bis zwanzig Gran.

Extractum Salicis spirituosum. (Ful.)

R. Corticis Salicis . . . libram unam.

Aquae Vitae . . . libras sex.

Digere per dies aliquot et exprime; faeces coquantur cum Aquae libris tribus et cum expressione colentur; colaturas ambas, quamque seorsim, ad mellis consistentiam inspissa et tunc commixtas sufficienter consume.

Infuso-decoctum Salicis Bremeri. (B*)

R. Corticis Salicis . . . uncias quatuor.

Spiritus Frumenti . . . uncias octo.

Aquae . . . uncias sedecim.

Digere in vase tecto et cola; residuum deinde coquatur cum

Aquae communis uncias triginta ad unciarum quindecim liquidi remanentiam; colaturas commisce. — Fiebermittel. — Zwischen zwei Fieberanfällen zu verbrauchen.

Decoctum Corticis Salicis laurae. (B* BorC.)

R. Corticis Salicis minutim: concisi . . . unciam unam.

Aquae fontanae . . . uncias sedecim.

Decoque ad unciarum octo remanentiam. (B*)

BorC. Corticis sesquiunciam et Aquae uncias quindecim ad novem redigendas.

Zonisch, fieberwidrig. — Glasweise.

Injectio antiseptica. (Ful. Ham.)

R. Corticis Salicis . . . uncias duas.

Aquae . . . libram unam.
Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde

Camphorae in Alcoholis sufficiente quantitate dissoluae

semidrachmam.

Mellis despumati . . . unciam unam.

Decoctura Salicis composita. (RC.)

R. Corticis Salicis drachmas novem.

Gentianae luteae drachmam unam.

Aquae . . . sesquilibram.

Decoque ad libram. — Interdum addi possunt Corticis Quercus drachmae duae. — Statt des decoct. Chinae.

Salsola.

Man findet drei Arten dieser Pflanzengattung in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Salsola Soda*, L.; Salzkrout; Soude commune (Gal.); Saltwort (Ang.); Sul alikantska lavhova (B.); Saltyder (D.); Soda (His.); Loogkruid (Bel.); Soda (I.); Solda (Lus.); Soudaert (Suec.).

Gal. His. M. Z.

⊙ (Pentandria Digynia, L.; Chenopodeae, J.) Eine an den Küsten des Mitteländischen Meeres wachsende Pflanze. (Jacq. Hort. Vind. I. p. 28. t. 68. Plenck t. 161.)

Man wendet das Kraut (herba Vitri) an; es besteht aus ästigen, röthlichen Stängeln mit sitzenden, langen, schmalen, stachellosen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen unangenehmen alkalischen Geschmack.

2) *Salsola Tragus*, L.; stacheliges Salzkrout; Soude épineuse (Gal.).

Gal. M.

⊙ Eine Pflanze des südlichen Europa's.

3) *Salsola Kali*, L.; Kalisalzkrout; Soude kali (Gal.).

Gal. G. M.

⊙ Eine Pflanze Südeuropas.

Diese und die vorhergehende Art können statt des gemeinen Salzkrouts angewendet werden.

Salvia.

Von dieser Pflanzengattung findet man vier Arten in den Pharmacopöen:

1) *Salvia officinalis*, L.; Salbei, Salbey; Saug commune (Gal.); Sage (Ang.); Ssalweg (B.); Salvie (D.); Salvia (His. I.); Salie (Bel.); Szalwia (Pol.); Salva (Lus.); Salvia (Suec.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer.

Pal. Gal. Galm. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Fid. Sp. Z.

2) (*Diandria Monogynia*, L.; *Labiatae*, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 10. *Plenck* t. 19. *Hayne* VJ. t. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 165.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (*herba Salviae minoris*) besteht aus einem vierkantigen, einfachen Stängel mit gegenüberstehenden, eirundlanzettigen, ganzen, gekerbten, runzligen, grünlichgrauen Blättern. Es hat einen angenehmen, stark gewürzhaften und etwas kampherartigen Geruch und einen sypitischen, gewürzhaften, etwas bitteren Geschmack.

Die violettblauen Blüthen bilden eine endständige Aehre. Man sammelt die Pflanze vor dem Aufblühen.

Reizend, nervenstärkend, tonisch, schwach abstringirend, auflösend und austrocknend.

2) *Salvia Horminum*, L.; edles Schachtelkraut; Sauge Hormin (*Gal.*); Purple topped sage (*Ang.*); Horminio (*His.*); Edele sclarey (*Bel.*); Orminio (*I.*); Ormino (*Lus.*).

Br. Gal. His. Wür. Be. Sp.

⊙ Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 244.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (*herba Hormini* s. *Gallitrichi*) besteht aus stumpfen, gekerbten, unangenehm riechenden und etwas bitter schmeckenden Blättern.

Der Saame ist glatt, schleimig und etwas bitter.

Reizend, tonisch.

3) *Salvia pratensis*, L.; Wiesenalbe; Sauge des prés (*Gal.*)

Gal.

4) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 258.)

Man wendet die Blätter (*folia Hormini*) an; sie sind gestielt, langgestreckt, herzförmig, gekerbt, runzelig, glatt, von angenehmem Geruch und bitterem, abstringirendem Geschmack.

4) *Salvia Sclarea*, L.; zahmes Schachtelkraut; Sauge Sclaree (*Gal.*); Common clary (*Ang.*); Graakuse (*D.*); Maro cortoso (*His.*); Tamne sclarey (*Bel.*); Schiarea (*I.*); Esclarea (*Lus.*).
Fer. Gal. His. Wir. G. M.

5) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 484.)

Man wendet das Kraut (*herba Sclareae* s. *Gallitrichi*) an; es besteht aus

einem dicken, vierkantigen, sehr ästigen Stängel mit gegenüberstehenden Zweigen und langgestreckten, herzförmigen, runzligen, spitzigen, sägezahnigen, gegenüberstehenden Blättern. Es hat einen sehr starken und unangenehmen Geruch und einen bitteren, gewürzhaften Geschmack.

Conserva Florum Salviae. (Sar. Wir.)

℞. Florum Salviae . partem unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Contere. (Wir.)

Sar. Florum partem unam et tres
Sacchari ad plumam cocti.

Species s. Herbae aromaticae v. vulnerariae. (A. B*. Ba. Gal. Vm.)

℞. Herbae Salviae,
— Melissaee,
— Thymi,
— Menthae piperitac,
— Hyssopi,
Florum Lavandulae,
singulorum partes aequales.

Concisa misce. (P*.)

℞. Foliorum Salviae,
— Melissaee,
Summitatum florescentium Absinthii,

— — Menthae piperitac,

— — Serpylli,

Florum Chamomillae vulgaris,
singulorum partes aequales.

Concisa misce. (Ba.)

℞. Foliorum Salviae,
— Thymi,
— Serpylli,
— Hyssopi,
— Menthae aquaticae,
— Absinthii,
— Origani,
singulorum partes aequales.

Concisa misce. (Gal.)

℞. Herbae Hyssopi,
— Marrubii,
— Origani,
— Rutae,
— Salviae,
— Saturejae,
— Scordii,
— Serpylli,
singulorum partes aequales.

Concisa misce. (A.)

℞. Cubebarum,
Nucis moschatae,
singularum partem unam.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Caryophyllorum,
singulorum partes duas.
Corticis Aurantiorum
partes quatuor.

Menthae crispae,
Rorismarini,
Salviae, singularum partes octo.
Concisa misce. (Vm.)

Extractum Salviae. (A.)

℞. Foliorum Salviae quantum vis.
Aeque quantum sufficit.
Herbâ pluribus coctionibus successi-
vis penitus extractâ, liquores commisce
et post decanthationem ad extracti con-
sistentiam inspissa.

Infusum Salviae. (BorC. DD. GalM.
RC. Suec. WW. Sa.)

℞. Herbae Salviae drachmam unam.
Aeque bullientis uncias duodecim.
Infunde in vase tecto per horae qua-
drantem et cola exprimendo. (DD.)

BorC. et WW. Salviae sesquinci-
am et Aeque uncias octodecim: — RC.
Suec. Salviae unciam unam et Aeque
libram unam (infunde per horam unam
et cola RC.); — Ham. Salviae un-
ciam unam et Aeque quantum satis
ad colaturam unciarum octo.

℞. Herbae Salviae.
Liquiritiae rasae,
singularum unciam unam.
Aeque bullientis quantum sufficit
ut colaturae octarius (litre) obtineatur.
(GalM.)

℞. Foliorum Salviae . uncias duas.
Florum Rosarum rubrarum
unciam unam.

Aeque bullientis
uncias tres cum dimidia.
Infunde frigide et cola. (Sa.)
Reizend, gewürzhaft. — Zassenwefse.

Infusum Salviae acidulum. (B*.)

℞. Herbae Salviae . . . semunciam.
Aeque bullientis quantum sufficit
ut post semihoram digestionis colatur-
rae unciae sex obtineantur, cui adde
Acidi sulphurici Aqua diluti

drachmam unam.
Misce bene. — Gabe, alle halbe Stun-
den eine halbe Tasse.

Gargarisma stimulan. (Ca Sa.)

℞. Infusi Salviae . . . libras duas.
Roob Juglandis . . . uncias duas.
Aluminis . . . drachmam unam.

Misce. (Sa.)
℞. Infusi Salviae . . . uncias sex.
Tincturae Chinae,
Syrupi Mororum,
singularum semunciam.
Spiritus Cochleariae
drachmam unam.

Misce. (Ca.)

Infusum Salviae vinosum. (B*.)

℞. Herbae Salviae . unciam unam,

Aeque bullientis libram unam.
Digere per horam unam, cola et co-
laturae refrigeratae adde
Vini rubri . . . semilibram.
Gabe, eine halbe Tasse alle zwei Stun-
den.

*Decoctum incitans aromaticum s. aro-
maticum.* (B.)

℞. Foliorum Salviae . . . semunciam.
Aeque . . . quantum sufficit
ut librae duae decocti obtineantur. Co-
laturae adde

Elixir acidi Halleri
drachmam unam.
Den Tag über allmätig zu nehmen.

Vinum aromaticum. (Gal. GalM.)

℞. Specierum aromaticarum
uncias quatuor.
Vini rubri . . . uncias duas.
Macerâ per dies sex in vase clauso,
cola exprimendo et filtra. (Gal.)

℞. Vini rubri . . . partes decem.
Tincturae aromaticae
partem unani.

Commisce. (GalM.)
Heußetlich in Wäschungen oder Bähun-
gen.

Vinum Salviae. (Wir.)

℞. Foliorum recentium Salviae
sesquinci-
am et Vini rubri . . . sesquilibram.
Post horas viginti quatuor macera-
tionis cola.

Fomentum excitans. (Ra.)

℞. Vini Salviae . . . libram unam.
Alcoholis camphorati uncias octo.
Misce.

*Aqua vulneraria spiritiuosa, Aqua ru-
bra, Tinctura vulneraria s. vulneraria
rubra s. aromatica composita.* (Gal. Fi.
T. Vm.)

℞. Foliorum recentium Salviae,
— — Rorismarini,
— — Saturejae,
— — Origani,
— — Majoranae,
— — Thymi,
— — Serpylli,
— — Hyssopi,
— — Melissaе,
— — Calaminthae,
— — Basilici,
— — Menthae aquati-
caе,
— — Foeniculi,
— — Angelicae,
— — Absinthii,
— — Rutae,

Summitatum florecentium Lavau-
dulae,

Summitatum florescentium Hyperici, singularum unciam unam.

Alcoholis (10°) . . . libras duas.

Post octo dies macerationis cola exprimendo et filtra. (Gal.)

T. Salviae, Rorismarini, Origani, Majoranae, Thymi, Serpylli, Hyssopi, Melissaе, Basilici, Menthae piperitae, Foeniculi, Angelicae, Absinthii, Rutae, Spicae, Hyperici, singularum unciam unam, Coccionellae drachmas duas, Aluminis scrupulos quatuor, Alcoholis diluti 22° B. Digere per dies quindecim et filtra. — Si loco alcoholis Acetum optimum adhibetur, obtines *Aquam vulnerariam acetosam*.

Aqua vulneraria acetosa, Acidum acetium dilutum et vulnerarium (Fi.). Angelicae, Salviae, Absinthii Romani, Saturejae, Foeniculi, Menthae viridis, Hyssopi, Melissaе, Basilici, Rutae, Thymi, Rorismarini, Origani, Calamintae, Serpylli, Florum Lavandulae, singulorum sesquiunciam, Aceti fortis libras octo; destillent in balneo aquae librae sex.

℞. Foliorum recentium Absinthii,
 — — Angelicae,
 — — Basilici,
 — — Abrotani,
 — — Foeniculi,
 — — Hyssopi,
 — — Majoranae,
 — — Melissaе,
 — — Menthae aquaticaе,
 — — Origani,
 — — Rutae,
 — — Rorismarini,
 — — Salviae,
 — — Serpylli,
 — — Thymi,

Florum Lavandulae,
 singulorum partem unam.

Aquae Vitae partes triginta duas.

Digere frigide per dies octo, exprime et filtra. (Vm.)

Acetum Salviae. (Gal. Fi. T. Vm.)

℞. Foliorum recentium Salviae
 partem unam.

Aceti albi . . . partes sedecim.

Macera per dies quatuordecim in vase tecto, subinde agitando, cola ac filtra. (Gal.)

Vm. Salviae partem unam, Aceti octo et octo dies macerationis; — T. Foliorum uncias sex, Aceti libras sex et octo ad decem dies digestionis; — Fi. Foliorum libram unam, Aceti fortis duodecim et sex dierum digestionem.

Oleum Salviae aetherum, Aetheroleum Salviae. (A. Br. Gal. Han. HassP. Pal. Sar. Br. T.)

℞. Herbae florescentis Salviae
 quantum vis.

Aquae . . . quantum sufficit.

Destillent. (Br.)

Han. HassP. Herbae partem unam et octo Aquae; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — T. Herbae quantum vis, Aquae bullientis pondus duplum, destillare quamdiu liquor aliquid extrahit, tunc per plures vias cohobare.

℞. Herbae florescentis Salviae
 partes viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.

Salis culinaris . . . partes tres.

Post tres dies destillent. (Br. Pal. Sar.)

Aqua Salviae. (A. Ams. Ba. Bor. Bor4. Gal. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wür. Sw. Vm.)

℞. Herbae florescentis Salviae
 partem unam.

Aquae . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor destillent partes decem. (Ams. Bor. Bor4. Han. O. Pol. Sw.)

HassP. Herbae libras tres, Aquae quantum sufficit, destillent librae viginti quatuor; — Gal. et Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Li. et Wür. Herbae unam et Aquae sex; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sax. Herbae unam et Aquae quindecim; destillent trientes duo; — Ba. Herbae unam et sedecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sar. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae et denuo destillent supra novam Herbam.

℞. Herbae florescentis Salviae
 partes decem.

Aquae purae partes centum viginti.

— Vitae . . . partem unam.

Destillent partes triginta. (Vm.)

Aqua Salviae composita. (Gal.)

℞. Specierum vulnerariarum
 partes duas.

Aquae . . . partes viginti.

Destillent partes octo.

Aqua Salviae spirituosae, Spiritus Salviae. (Fer. Gal. T.)

℞. Herbae florescentis Salviae
 libram unam.

Vini albi . . . libras quatuor.

Post horas viginti quatuor macerationis destillet dimidia pars. (Gal.)

℞. Herbae florescentis Salviae
 sesquilibram.

Alcoholis . . . libras octo.

Destillent librae sex. (Fer.)

T. *Herbae florescentis fibras duas, Spiritus Vini 32° octo; destillent circiter librae quinque.*

Aqua vulneraria s. traumatica s. scopetaria s. vulneraria spirituosa s. vinosa s. scopetaria aromatica s. catapultarium, Alcohol Salviae vulnerarius, Alcohol polyaromaticus. (A. B. Bel. Bor. Bor4. Br. Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. Br. Ca. Fi. Pid. Sp. T. Vm.)*

℞. *Herbae Hyssopi,*
— *Menthae crispae,*
— *Salviae,*
— *Rorismarini,*
— *singularum uncias duas.*

Florum Rorismarini,
— *Lavandulae,*
— *singularum unciam unam.*

Aquae Vitae . . . libras decem.

Desillent, donec liquor limpidus prodire cesset. (Li. Wir.)

℞. *Herbae Absinthii,*
— *Anethi,*
— *Salviae,*
— *Tanacetii,*
— *Serpylli,*
— *Menthae piperitae,*

Florum Lavandulae,
— *singularum sesquiunciam.*

Aquae fontanae libras duodecim.

Alcoholis . . . libras octo.

Post aliquot dierum infusionem destillent librae octo. (Pid.)

℞. *Herbae Absinthii,*
— *Rutae,*
— *Salviae, singularum drachmas octodecim.*

— *Foeniculi,*
— *Menthae piperitae,*
Florum Lavandulae,
— *singularum sesquiunciam.*

Aquae fontanae libras duodecim.

Alcoholis . . . libras octo.

Post duos dies infusionis destillent librae octo. (Hass.)

℞. *Herbae recentis Agrimoniae,*
— *Leptopodii,*
— *Belidis minoris,*
— *Belidis majoris,*
— *Batnicae,*
— *Bugbssi,*
— *Foeniculi,*
— *Hyperici,*
— *Plantaginis,*
— *Saniculae,*
— *Scrophulariae,*
— *Verbernae, singularum manipulos duos.*
— *Aristolochiae,*
— *Artemisiae,*
— *Virgaureae,*

Herbae recentis Salviae, singularum manipulos quatuor.

Vini generosi libras quadraginta. Stent in digestionem, donec massa fermentare parumper coeperit et deinde destillando dimidium abstrahe. (Wir.)

℞. *Radici Consolidae majoris,*
Herbae Consolidae majoris,
— *Artemisiae,*
— *Bugulae, singularum manipulos quatuor.*

— *Betonicae,*
— *Bupthalmi,*
— *Consolidae minoris,*
— *Scrophulariae,*
— *Plantaginis,*
— *Agrimoniae,*
— *Verbenae,*
— *Absinthii,*
— *Foeniculi,*
— *singularum manipulos duos.*

— *Hyperici,*
— *Aristolochiae,*
— *Telephii majoris,*
— *Veronicae,*
— *Centaurii minoris,*
— *Millefolii,*
— *Nicotianae,*
— *Menthae,*
— *Hyssopi, singularum manipulum unum.*

Vini albi uncias centum quadraginta quatuor.

Post trium dierum infusionem destillent. (Sp.)

℞. *Radici Consolidae majoris,*
Herbae Consolidae majoris,
— *Bugulae,*
— *Saniculae,*
— *Betonicae,*
— *Scrophulariae,*
— *Plantaginis,*
— *Agrimoniae,*
— *Hyperici,*
— *Pervinae,*
— *Hederae terrestris,*
— *A. temisiae,*
— *Veronicae,*
— *Verbenae,*
— *Telephii majoris,*
— *Millefolii,*
— *singularum uncias quatuor.*

— *Salviae,*
— *Angelicae,*
— *Tanacetii,*
— *Absinthii,*
— *Chelidonii majoris,*
— *Foeniculi,*
— *Clematitidis,*
— *Menthae,*
— *Hyssopi,*
— *Nicotianae,*
— *singularum uncias octo.*

Herbae Rutae,
 — Chamomillae,
 — Scordii,
 — Majoranae,
 — Rorismarini,
 singularum uncias quatuor.
 Summitatum floresentium Lavandulae,
 — — Origani,
 — — Calamintae,
 singularum uncias sex.
 Vini albi libras quinquaginta.
 Destillet dimidia pars. (Wir.)
 Pal. eandem formulam, addendo tamen Absinthii pontici, Saturejae, singularum uncias octo, Basilici uncias quatuor et Virgaureae tantidem.
 ℞. Foliorum Salviae uncias octo.
 — Rorismarini,
 — Serpylli,
 — Thymi,
 singulorum unciam unam.
 Cardamomi minoris,
 — majoris,
 singulorum drachmas sex.
 Macidis,
 Nucis moschatae,
 Caryophyllorum,
 Zedoariae,
 Galangae,
 Calami, singulorum semunciam.
 Vini albi libras octo.
 Alcoholis libras quatuor.
 Post sufficientem digestionem destillent tres quadrantes. (Wir.)
 ℞. Florum Lavandulae,
 Herbae recentis Hyssopi,
 — — Melissaе,
 — — Menthae crispae,
 — — Origani,
 — — Rorismarini,
 — — Rutae,
 — — Salviae,
 — — Serpylli,
 singularum unciam unam.
 Alcoholis (0,850) uncias decem.
 Aquae libras duodecim.
 Post horas viginti quatuor destillent librae decem. (A.)
 ℞. Herbae recentis Salviae,
 — — Absinthii,
 — — Menthae piperitae,
 — — Rutae,
 — — Rorismarini,
 Florum Lavandulae,
 singulorum uncias quatuor.
 Alcoholis libras sex.
 Aquae communis quantum sufficit.
 Post horas viginti quatuor destillent librae octodecim. (B*. Bor. Han. HassP. O. Pol.)
 Bor4. Herbarum et Florum, singulorum uncias duas, Spiritus Vini rectifi-

cati sesquilibram, Aquae quantum sufficit, destillent librae sex.

℞. Foliorum recentium Salviae,
 — — Angelicae,
 — — Absinthii,
 — — Saturejae,
 — — Foeniculi,
 — — Menthae,
 — — Hyssopi,
 — — Melissaе,
 — — Basilici,
 — — Rutae,
 — — Thymi,
 — — Majoranae,
 — — Rorismarini,
 — — Origani,
 — — Calamintae,
 — — Serpylli,
 Florum Lavandulae,
 singulorum uncias quatuor.
 Alcoholis uncias centum viginti octo.
 Destillent. (Sp.)
 ℞. Herbae florecentis Absinthii,
 — — Basilici,
 — — Catariae,
 — — Hyssopi,
 — — Majoranae,
 — — Origani,
 — — Rorismarini,
 — — Rutae,
 — — Salviae,
 — — Thymi,
 Florum Lavandulae,
 singulorum partes duas.
 Aquae Vitae partes nonaginta sex.
 — purae partes quadringentas
 quinquaginta sex.
 Destillent partes centum octoginta quatuor. (Vm.)
 Bel. Salviae, Absinthii, Catariae, Hyssopi, Melissaе, Basilici, Thymi, Rutae, Majoranae, Rorismarini, Origani et Lavandulae, singulorum partem unam, Aquae Vitae quadraginta octo et Aquae ducentas septuaginta sex; destillent partes nonaginta duae.
 ℞. Summitatum Salviae,
 — — Tanacetii,
 — — Foeniculi,
 — — Thymi,
 — — Lavandulae,
 — — Absinthii,
 — — Menthae aquaticaе,
 — — Hyssopi,
 — — Chamomillae Romanae,
 — — Origani,
 — — Majoranae,
 — — Calamintae,
 Stipitum e Radicis Angelicae,
 singularum uncias duas.
 Alcoholis (22°)
 libras viginti quatuor.

Post sufficientem macerationem destillent in balneo aquae librae viginti. (Gal. Ca.)

T. Salviae, Angelicae, Tanacetii, Menthae vulgaris, Foeniculi, Thymi, Majoranae, Calamintae, singularum uncias quatuor, Absinthii, Hyssopi, Origani, Chamomillae vulgaris, Lavandulae, singularum uncias duas, Alcoholis 36° uncias triginta octo; post duorum dierum digestionem destillent in balneo aquae liquidi unciae triginta vel triginta duae.

R. Florum Lavandulae,
Herbae recentis Absinthii,
— — Salviae,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Hyssopi,
— — Rutae,
— — Melissaе,
— — Thymi,
— — Basilici,
— — Origani,
— — Hyperici,
singularum unciam unam.

Alcoholis (0,985) libras quatuor.

Aquae libram unam.

Post horas viginti quatuor destillent librae tres. (Br. Fi.)

Aqua vulneraria aquosa s. pura destillata, vulneraria (Fi.): Florum Lavandulae, Herbarum recentium Hyssopi, Melissaе, Menthae piperitae, Origani, Rorismarini, Rutae, Salviae, singularum unciam unam, Alcoholis 36° uncias quatuor, Aquae libras duodecim; post horas duodecim digestionis, destillent librae octo.

R. Foliorum Betonicae,
— Hederae terrestris,
— Artemisiae,
— Millefolii, singularum
uncias quindecim.
— Salviae,
— Angelicae,
— Tanacetii,
— Absinthii,
singularum uncias decem.
— Abrotani,
— Foeniculi,
— Menthae,
— Hyssopi,
— Nicotianae,
singularum uncias octo.
— Rutae,
— Chamomillae,
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorismarini, singularum
uncias quatuor.

Summitatum florescentium Lavandulae,

Summitatum florescentium Origani,
— — Calamintae,
singularum uncias sex.

Vini generosi
libras sexaginta septem.

Post horas viginti quatuor macerationis destillet dimidia pars. (Br.)

R. Foliorum Betonicae,
— Agrimoniae,
— Artemisiae,
singularum libram unam.
— Salviae,
— Hyperici,
— Tanacetii,
— Absinthii,
— Menthae,
singularum uncias octo.
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Lavandulae,
singularum uncias quatuor.

Vini albi libras triginta.

Destillet in balneo aquae dimidia pars. (His.)

R. Herbae Salviae,
— Absinthii,
— Menthae piperitae,
— Rutae,
— Rorismarini,
Florum Lavandulae,
singularum partem unam.
Aquae . . . partes quinquaginta.
Alcoholis . . . partes viginti duas.
Post duos dies destillent partes triginta sex. (Sax.)

Teufferlich als zerkleinand, und bisweilen innerlich bei Windcolik.

Elisir vitae mulierum, Aqua s. Balsamum embryonum, Aqua aromatica. (Ams. B*. Bor. Borá. Br. HassP. Pal. Wir. Sp.)

R. Micae Panis triticei modo e furo exsumpti . . . libras duas.
Florum Caryophyllorum rubrorum,
— Tiliae,
singularum libram unam.
Nucis moschatae
uncias tres cum dimidia.
Florum Lavandulae,
Herbae Salviae,
Seminum Carvi,
— Foeniculi,
singularum uncias tres.
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubeborum,
Granorum Paradisi,
Zedoariae,
Herbae Menthae crispae,
Radicis Paeoniae,

Semina Paeoniae,
 Visci querni,
 singularum uncias duas.
 Macidis semunciam.
 Galangae minoris drachmas tres.
 Croci drachmas duas.
 Vini Maderani libras decem.
 Aquae Boraginis,
 — Buglossi,
 singularum libras quatuor.
 — Florum Liliorum Conval-
 lium libras duas et uncias octo.
 Aquae Fragorum,
 — Rosarum,
 singularum uncias sedecim.
 Post tres dies digestionis destillet,
 blando igne, liquidi dimidia pars. (Wir.)
 R. Galangae,
 Zedoariae, singularum semunciam.
 Herbae Menthae,
 — Melissaе,
 singularum unciam unam.
 Florum Stoechadis Arabicae,
 — Caryophyllorum rubrorum,
 — Tiliae, singularum drachmas
 quinque.
 Seminum Sileris montani,
 — Foeniculi,
 singularum semunciam.
 Nucis moschatae unciam unam.
 Cinnamomi drachmas sex.
 Corticis recentis Aurantiorum,
 — Citri,
 singularum sesquiunciam.
 Vini albi libras duas.
 Digere per horas viginti quatuor et
 destillando dimidium producti abstra-
 he. (Pol. Wir.)
 R. eandem formulam sed loco vini
 mixturam e libris quinque Aquae Vi-
 tae et Aquae libris decem et destilla-
 tione liquidi libras sex abstrahere ju-
 bet.
 R. Radicis Paeoniae,
 — Zedoariae,
 — Zingiberis,
 singularum uncias duas.
 — Galangae drachmas sex.
 Herbae Salviae,
 — Melissaе,
 — Foeniculi,
 — Menthae,
 singularum uncias tres.
 Florum Caryophyllorum rubrorum,
 — Tiliae,
 singularum uncias sex.
 — Lavandulae,
 Nucis moschatae,
 singularum uncias tres.
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Cubeborum,
 Granorum Paradisi,

Macidis, singularum uncias duas.
 Alcoholis
 uncias quadraginta quatuor.
 Aquae fontanae
 uncias ducentas quadraginta.
 Post aliquot dies infusionis destilla-
 do uncias centum nonaginta duas ab-
 trahe. (Sp.)
 R. Nucis moschatae,
 Macidis,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Cubeborum,
 Zingiberis,
 Zedoariae, singularum semunciam.
 Galangae minoris drachmas duas.
 Florum Lavandulae,
 Herbae siccae Menthae,
 — Salviae,
 singularum semunciam.
 Seminum Coriandri,
 — Foeniculi,
 singularum drachmas duas.
 Aquae Vitae sesquibram.
 — purae
 libras septem cum dimidia.
 Macera per tres dies et tunc destil-
 lando liquidi libras tres cum dimidia
 abstrahere. (Ams.)
 R. Herbae Salviae uncias octo.
 — Rorismarini,
 — Menthae piperitae,
 Florum Lavandulae,
 singularum uncias quatuor.
 Seminum Foeniculi,
 Cassiae caryophyllatae (cinnamo-
 meae), singularum uncias duas.
 Alcoholis libras quatuor.
 Aquae libras viginti.
 Post horas viginti quatuor macera-
 tionis destillando libras duodecim li-
 quidi abstrahere. (B*. Bor. HassP.)
 Bor4 Spiritus Vini rectificati libras
 sex.

Reizend, stärkend, herzstärkend und blä-
 hungstreibend. — Gabe, eine halbe bis eine
 ganze Unze. — Man wendet es auch äu-
 ßerlich an; ehemals soll man es zur Ver-
 hütung von Fehlgeburt mit Erfolg benutzt
 haben, indem man eine damit befeuchtete
 heiße Brobrinde auf den Leib der Schwan-
 gern legte. Heutzutage weiß man, was
 von der Anwendung solcher reizenden Mit-
 tel zu halten ist.

Sambucus.

In den Pharmacopöen finden sich zwei
 Arten dieser Gattung angezeigt:
 1) *Sambucus Ebulus*; L.; Zwerghol-
 lunder, Attich, Attichhirschwanz; Hieble,
 Yéble (Gal.); Dwart, elder (Ang.);
 Chebdj (B.); Mmerhyld (D.); Yezgo

(His.); Lange vlier (Bel.); Ebbio (I.); Chehd (Pol.); Engos (Lus.); Sommarhyll (Succ.).

A. Ba. Br. Fer. Gal. Gen. His. Lus. Sax. Wir. Wür. *re. Br. M. Pid. Sa. Sp. Z.*

Ein Strauch (Pentandria Trigynia, L.; Caprifoliaceae, J.), welcher überall in Europa wächst. (Blackw. t. 480. Plenck t. 230. Zorn Ic. pl. t. 40.)

Man wendet die Rinde der Wurzel, die Blätter, die Früchte und den Saamen an.

Die innere Rinde der Wurzel (radix Ebuli s. Sambuci humilis s. agrestis s. Chamaeactis) ist weiß und hat einen bittern, widerlichen Geschmack. Die Wurzel selbst ist langgestreckt, fingerdicke. Sie gilt für brechenenerregend und wasserreibend. — Man verordnet zwei Unzen, mit Wasser ausgegossen; auch kann man eine Unze von dem ausgepreßten Saft geben.

Die Blätter sind eiförmig, lanzettförmig, spitzig, gezähnt, oben glatt und glänzend, unten dunkelgrün. Sie haben einen sehr unangenehmen Geruch. Ehedem wendete man sie äußerlich bei Nodem und Erysipelas an.

Die Früchte (baccae s. grana Actes) sind schwarze, dreisaamige Beeren von einem süßen, bittern und widerlichen Geschmack. Sie werden für auflösend, schweiß- und harntreibend gehalten.

Die Saamen geben, in Wasser gewischt und ausgepreßt, Del.

2) *Sambucus nigra*, L.; Hliederbaum, Hollunder; Sureau noir (Gal.); Elder (Ang.); Ukti, khaman (Ar); Bez (B.); Hyld (D.); Sauco (His.); Vlier (Bel.); Sambuco (I.); Bzowy (Pol.); Sabuguiero (Lus.); Busina (R.); Floeder (Succ.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp.

Ein Strauch Europa's. (Blackw. t. 151. Fl. Dan. t. 545. Plenck t. 229. Hayne IV. t. 16. Düss. off. Pl. V. t. 17. Fl. méd. VI. 336.)

Man wendet die Rinde, die Blätter, die Blüthen und die Früchte an.

Die mittlere oder innere Rinde der Zweige (cortex s. alburnum Sambuci), von welcher man gewöhnlich die dünne und aschgraue Oberhaut abzieht, ist grün. Sie hat einen starken und widerlichen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher scharfen und etwas bitteren Geschmack.

Die Blätter sind unpaarig gefiedert, bun-

gelgrün, glatt, die Blättchen eiförmig-lanzettförmig, sägezählig, spitzig. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen scharfen Geschmack.

Die Blüthen (flores Sambuci) sind weiß, klein und haben einen starken und unangenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bitteren Geschmack.

Die Früchte sind saftige, eiförmige, schwarze, genabete, dreisaamige Beeren, welche einen röthlichen, säuerlichen und geruchlosen Saft enthalten. Man nennt sie nach dem Trockenwerden grana Actes. Statt dieser Art gebraucht die Americanische Pharmacopöe die Beeren von *Sambucus Canadensis*, Willd.

Bor4. hat ein Roob *Sambuci crudum* s. *Succus Sambuci inspissatus crudus*.

Pu. vis. ad erysipelam. (BorC.)

℞. Florum Sambuci,

Furfuris triticeae,

singulorum partes aequales.

Misce.

Species sudorificae s. diaphoreticae.

(Gal. Fi. T.)

℞. Florum Sambuci,

— Boraginis,

— Rhoeados,

Ligni Sassafras,

singulorum partes aequales.

(Gal.)

℞. Foliorum Melissae,

Florum siccorum Tiliae,

singulorum partes tres,

— Sambuci . . . partem unam.

Concisa misce. (Fi. T.)

Succus Sambuci s. baccarum Sambuci. (Gal. Sar. T.)

℞. Baccarum Sambuci maturarum

quantum vis.

Contere inter manus, massam tunc per tres vel quatuor dies fermentatam cola exprimendo et succum in lagenis sub olei strato serva.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Succus Ebuli s. baccarum Ebuli. (Gal. Sar. T.)

Ut succum baccarum Sambuci parant.

Tragea granorum Actes, Pulvis Sambuci. (Wir. Sp.)

℞. Succu baccarum Sambuci

quantum vis.

Farinae secalitiae quantum sufficit.

In pastam redige et panes parvos exinde forma, qui prope ignem coquantur, donec bene sint siccati; tunc in pulverem redactos novo succo humecta et sicca. Quam operationem ter e serie repete. Unciae uni massae pulveratae adde

Nucis moschatae pulveratae
drachmam unam.

Gegen Ruhr empfohlen. — Gabe, eine
bis zwei Drachmen.

Syrupus Sambuci. (A.)

℞. Succı Baccarum Sambuci recenter
expressi . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Ebulliant semel.

*Roob Sambuci s. Sambuci depuratum,
Succus Sambuci inspissatus s. inspissatus
depuratus.* (A. Am. An. B. Ba. Bel. Bor.
Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal.
Gen. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal.
Pol. R. Sar. Wir. Wür. Br. C. Fi. Siv.
T. Vm.)

℞. Baccarum Sambuci maturarum
quantum vis.

Coque in vase stanneo tecto, conti-
nue agitando, per semihoram vel do-
nec dirumpantur; trajice per cribrum
et residuum fortiter exprime; liquores
ambos commisce, mixturae libris quin-
decim adde Sacchari libras quatuor,
et bene despumando ad mellis consi-
sistentiam usque inspissa. (Bel.)

B. Succı libras decem, Sacchari qua-
tuor; — An. Succı libras quinque,
Sacchari unam; — D. Succı libras
quatuor, Sacchari unam; — Ba. Succı
sedecim, Sacchari unam; — Fer. Succı
libras quatuor et duas Sacchari; —
HassP. Succı depurati partes octo, Sac-
chari partem dimidiam.

℞. Baccarum Sambuci maturarum
quantum vis.

Inter manus contritis, succum ex-
prime et per pannum laneum trajice;
succı octariis duobus adde Sacchari al-
bi semilibram, tunc ignis vividioris ope
ad mellis consistentiam consume. (Vm.)

Fi. In mortario marmoreo contun-
dere, per diem unum seponere ad fer-
mentationem usque, exprimere, addere
Sacchari pondus duplum, coquere et
ad mellis consistentiam consumere; —
Pal. Sacchari partem unam et duas
Succı; — Am. Ed. et C. Sacchari unam
et quinque Succı; — Ful. Sacchari
unam et Succı quatuor; — Br. Hass.
R. Wir. Wür. et Sw. Sacchari unam
et Succı sex; — A. Sacchari unam et
Succı novem; — Bor. O. Pol. et Sax.
Sacchari unam et sedecim Succı; —
T. Suceum e Baccis contritis post duos
vel tres dies exprimere, in balneo aquae
vel vaporis ad syrupsı et adjectis Sac-
chari uncıis tribus pro quaque libra
ad mellis consistentiam inspissare.

℞. Succı expressı Baccarum Sambuci
quantum vis.

Sepositione depuratum ignis mode-
rati ope sufficienter inspissa. (Du. Gal.
Gen. Li. Sar. Br.)

Bor4. Succum crudum Aqua com-
muni solvere, post decanationem co-
lare et primum leni igne, tunc in bal-
neo vaporis ad syrupsı spissioris consi-
sistentiam consumere jubet.

Schweißtreibend. — Gabe, anberthalb
bis zwei Unzen.

Roob s. Pulpa Ebuli. (A. Ba. Br. Ful.
Pal. Sar. Wir. T. Vm.)

℞. Baccarum Ebuli recentium matura-
rarum . . . partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit
ut empyreuma prohibeatur; coque, do-
nec dirumpantur et exprime succum,
qui addendo Sacchari partem sedeci-
mam ad pulpae consistentiam evapo-
ret. (Ba.)

A. Sacchari partem unam et novem
Succı; — Vm. Sacchari unam et Suc-
cı decem; — Br. Ful. Pal. et Wir.
Sacchari unam et Succı sex.

℞. Succı Baccarum Ebuli
quantum vis.

Cola et in balneo aquae ad electua-
rii consistentiam inspissa. (Sar.)

T. ut roob sambuci parari jubet.
Harntreibend, laxirend. — Gabe, zwei
Unzen. — Man verschreibt es selten al-
lein und fast immer als Exciptiens.

Extractum Florum Sambuci. (Sar.)

℞. Florum Sambuci recentium
libras octo.

Macera per tres dies in alembico et
destillando in balneo aquae uncias cir-
citer duas abstrahe; residuo Aquae tri-
plum infunde et post horas sex dige-
stionis coquendo ad tertiae partis re-
manentiam consume; exprime flores,
liquorem clarificatum et colatum ad
electuarii consistentiam inspissa et huic
nonnisi tepido Aquam destillatam adde.

Mixtura antiasthmatica. (Sm.)

℞. Roob Sambuci,
Pulpae Prunorum,
Syrupsı Rhoeados,
singulorum uncias duas.
Nitri . . . drachmam unam.

Mel Sambuci s. Florum Sambuci. (Wir.)

℞. Florum recentium Sambuci
libram unam.

Mellis despumati . . . libras duas.
Aquae Florum Sambuci uncias sex.
Macera per aliquot dies, tunc coque
blando igne, cola exprimendo et ad
consistentiam requisitam consume. —
Gebem zu erweichenden und zertheilenden
Surgelwassern benuht.

Mel Fructuum s. Baccarum Sambuci.
(His.)

℞. Succī Baccarum Sambuci matura-
rum,
Mellis, singulorum libras duas.
Aquaē . . . quantum sufficit.
Coque ad syrupi spissi consistentiam
& cola. — Gabe, eine halbe bis ganze
Unze.

Acetum Sambuci s. sambucinum. (Ams.
Br. Gal. Lus. Pal. Sar. Suec. Wir.
Wür. *Pid. Sw. T.*)

℞. Florum Sambuci partem unam.
Aceti . . . partes duodecim.
Macerā per dies quatuor, clarifica
lactis ope et filtra. (Suec.)

Gal. Florum partem unam, Aceti se-
decim et quatuordecim dies macera-
tionis; — Br. Pal. Wir. et Sw. Sam-
buci partem unam et sex Aceti; —
Sar. et *Pid.* Sambuci unam, Aceti qua-
tuor et sex dies macerationis; — Wür.
Sambuci unam, Aceti novem et tres
septimanas macerationis; — Ams. Flo-
rum partem unam, Aceti octo et qua-
tuor dies macerationis; — T. Florum
uncias sex, Aceti libras sex, digestio-
nem per octo vel decem dies, colare
leviter exprimendo, clarificare seposi-
tione vel filtrare et infusionem, si vis,
repetere.

℞. Florum Sambuci siccorum
libram unam.
Aceti communis . . . libras sex.
Macerā per dies sex, tunc coque et
colaturā adde
Alcoholis semilibram.
Misce bene. (Lus.)

Schweißtreibend, reinigend und austrock-
nend. — Man wendet es in heißem Auf-
zerwasser an, um Schweiß hervorzurufen.
Auch braucht man es in Gurgelwasser, mit
Wasser und Honig vermischt, bei Bräune.

Oxymel Sambuci. (Wür.)

℞. Aceti Sambuci . . . partem unam.
Mellis albi partes duas.
Coque lente ad consistentiam syrupi.

Decoctum Corticis Sambuci. (B*.)

℞. Corticis Sambuci manipulos tres.
Aquaē fontanae,
Lactis, singulorum libram unam.
Decoque ad librae unius colaturae
rementiam. — Von Boerhaave bei
Wassersucht empfohlen. — Gabe, eine
Halbe des Morgens, die andere des Abends.

*Infusio s. Infusum Florum Sambuci
nigrae.* (An. DD. Gal. GalM. Ham.
RC. *Huf. Ra.*)

℞. Florum Sambuci drachmam unam.
Aquaē bullientis . . . libram unam.

Digere per horae quadrantem et co-
la exprimendo. (DD. *Huf. Ra.*)

Ham. et GalM. Florum unciā unam
et Aquaē bullientis quantum sufficit
ad colaturam unciarum octo; — An.
RC. Florum unciā unam, Aquaē li-
bram unam et digestionem per horam
calore gradatim ad bullitionem usque
ducto. (An.)

℞. Florum Sambuci drachmas duas.
Aquaē bullientis . . . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola
et colaturae adde
Syrupi Capilli Veneris
unciā unam.

Misce bene. (Gal.)

Schweißtreibend, bei rheumatischen Af-
fectionen und hitzigen Granthemen empfoh-
len. — Man wendet den Aufguß heiß und
reichlich an, nachdem man ihn mit Honig,
Sauerhonig oder Weinstein syrup versüßt
hat.

Aqua sulphurosa composita. (Ca.)

℞. Infusi Florum Sambuci,
Aquaē Bareginensis,
singulorum libram unam.
In vier und zwanzig Stunden zu trin-
ken, bei chronischen Catarrhen, Drüsenver-
stopfung, Scropheln und Flechten.

Gargarisma detergens s. detersivum.
(Ful. Sa.)

℞. Florum Sambuci unciā unam.
Aquaē bullientis . . . libram unam.
Infunde, cola et adde
Nitri semunciā.
Essentiae Pimpinellae
drachmas tres.
Oxymellis simplicis unciā duas.
Misce bene. (Ful.)

℞. Florum Sambuci,
— Verbasci,
singulorum manipulum unum.
Aquaē bullientis quantum sufficit
ad colaturam librae dimidiae, cui adde
Nitri semidrachmam.
Salis polychresti drachmam unam.
Roob Sambuci,
Syrupi Mororum,
singulorum unciā unam,
Misce bene. (Sa.)

Gargarisma aluminosum. (RC.)

℞. Aluminis drachmam unam ad ses-
quadrachmam.
Infusi Florum Sambuci
libras duas.
Acidi sulphurici diluti
guttas triginta.
Mellis flavi unciā vel
Sacchari puri . . . semunciā.
Bei atonischen Hals- und Rachengehäwren,

geschwürriger Bräune, Schläffheit des Zäpf-
chens ꝛc.

Fomentum s. Fotus resolvens. (Fi. Ra. Sp.)

℞. Infusi Florum Sambuci . . . libram unam.
Aquae Vitae camphoratae . . . unciis octo.

Misce bene. (Ra.)

℞. Florum Sambuci . . . manipulum unum.

Aquae . . . unciis sedecim.
Infunde per horas duodecim et adde colaturae

Aquae Vitae camphoratae . . . unciam unam.

Acetatis Plumbi drachmam unam.
Misce. (Sp.)

℞. Florum Meliloti,
— Sambuci, . . . singulorum drachmas duas.

Foliorum Menthae,
— Salviae, . . . singulorum drachmam unam.

Aquae bullientis . . . libras duas.

Colaturae adde
Aquae Vitae . . . unciis tres.

Misce. (Ra.)

℞. Infusi Florum Sambuci,
Aceti Vini albi, . . . singulorum sesquilibram.

Ammonii muriatici pulverati . . . drachmas duas.

Misce. (Fi.)

Fomentum siccum. (Fi.)

℞. Florum Sambuci pulveratorum,
— Chamomillae, . . . singulorum unciam unam.

Farinae secalitiae . . . libram unam.

Misce.

Oleum Sambuci. (His. Sar.)

℞. Florum Sambuci . . . partem unam cum dimidia.

Olei Olivarum . . . partes tres.

Post duos dies digestionis in balneo
aquae, refrigerata exprime et operati-
onem cum novis Floribus repete. (Sar.)

His. Florum partem unam et tres
Olei.

Unguentum Sambuci s. sambucinum.
(Du. His. Lon. C. Sp. T.)

℞. Florum recentium Sambuci . . . partes tres.

Axungiae Porci . . . partes quatuor.
Sebi vervecini . . . partes duas,

Coque flores cum axungia, exprime
et adde sebum. (Du.)

Lon. et C. coquere jubent Florum
et Axungiae partes aequales; — His.

Florum partes quatuor, Sebi tres et
Olei Olivarum unam.

℞. Sebi vervecini . . . partes tres.
Olei Olivarum . . . partem unam.

• Liqua simul et in mixtura digere
Florum Sambuci partes quatuor.
Post aliquot tempus cola. (Sp.)

T. Sebi unciis sex, Olei octodecim,
Florum pondus aequale, octo dierum
digestionem, evaporationem humidi in
balneo aquae etc.

℞. Corticis Sambuci . . . libras duas cum dimidia.

Florum Sambuci . . . semilibram.
Axungiae Porci . . . libras novem.

Post dies septem macerationis co-
que ad humidi consumptionem usque.
(His.)

Aqua Florum Sambuci. (A. Ams. B.

Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful.
Gal. Han. Hass. HassP. His. Li. O.

Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür.
Br. Fi. Pid. T.)

℞. Florum Sambuci . . . partes tres.

Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent partes sex. (Suec.)

HassP. destillent partes viginti qua-
tuor; — A. Florum partes sex et Aquae
quantum sufficit; destillent partes octo;

— Gal. Sar. et T. Florum partem
unam et quatuor Aquae; destillent
partes duae; — Ba. Florum partem
unam et sedecim Aquae; destillent par-
tes quatuor; — Pal. Florum partem
unam et Aquae tres; destillet pars una
cum dimidia; — Ams. B. Bel. D.

Han. O. Pol. Florum partem unam et
Aquae quantum sufficit; destillent par-
tes decem; — Hass. R. Sax et Pid.

Florum partem unam et octo Aquae;
destillent partes quatuor; — Wür. et
Br. Florum partem unam et Aquae
sex; — Bor. Bor4. Florum partem
unam et Aquae quindecim; destillent
partes decem; — Fer. Florum partes
tres et Aquae sex; destillent partes
sex; — Fi. Florum libras tres, Aquae
libras quindecim; destillent librae sex.

℞. Florum Sambuci . . . partes tres.

Aquae . . . partes duodecim.

Flores in saccum include medio cu-
curbitae ita suspensum, ut aquam non
attingat; destillent partes sex. (Ful. Li.)

℞. Florum recentium Sambuci . . . partes sedecim.

Aquae . . . partes quadraginta.

Macera per dies duos et fermenta-
tione incipiente destillent partes vi-
ginti. Producto adde

Alcoholis . . . unciam unam.

Misce bene. (His.)

℞. Baccarum Sambuci contusarum
quantum vis.

In dolio fermentent, donec odorem vinosum emittant; destillent deinde leni igne et productum si requiritur rectificata. (Br. Wir.)

Aqua Ebuli. (Wir.)

℞. Baccarum Ebuli contusarum
quantum vis.

In dolium immitte, fermentationi subijce et simulac odorem vinosum adeptae sunt, blando igne destillent; productum, si requiritur, rectificetur.

Julapium sambucinum. (Wir.)

℞. Aquae Sambuci . unciis viginti.
Sacchari albi

libras duas cum dimidia.

Ebulliant semel et colentur.

Spiritus Sambuci. (Br. Pal. Wir.)

℞. Florum Sambuci partem unam.
Aquae Vitae . . partes quatuor.

Post tres dies macerationis destillet dimidia pars.

S a n d a r a c a .

Gummi s. Resina Juniperi, Vernix sicca; Σανδαράκη; Sandarach, Wachs holberharz; Sandaraque, Gomme de genévrier (Gal.); Gum juniper (Ang.); Resina de enebro, Grasilla, Sandaraca (His.); Geneverharb (Bel.).

Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Ham. Han. His. O. Sax. Wir. Wür. Be. Br. G. M. Pid. Sp. T. Z.

Ein Harz in kleinen trocknen Tropfen oder in durchsichtigen Stücken, von hell- oder citronengelber Farbe, welche mit der Zeit roth werden. Der Bruch ist glänzend und glatt, Geruch und Geschmack sind dem des gemeinen Harzes ähnlich. Das Pulver ist weiß.

Nach Broussonet's Vermuthung fließt es aus Thuya articulata, Desf., einem Baume (Monoecia Monadelphica, L.; Coniferae, J.) der Berberri (Vahl Symb. 2. p. 96. t. 18. Desf. Fl. Atlant. II. t. 252.). Lange Zeit leitete man es von Juniperus communis, L., J. lycia, L.; oder J. oxycedrus her, von denen ersterer bisweilen zwischen Holz und Rinde ein sehr verschiedenes, grünliches Harz, welches deutscher Sandarach (Sandaraca Germanica); Sandaraque d'Allemagne (Gal.) genannt wird, zeltg. Reizend.

S a n g u i n a r i a .

Sanguinaria Canadensis, L.; Canadisches Blutkraut; Sanguinaire du Cana-

da (Gal.); Bloodroot Puccoon, Indian paint Turmeric (Ang.).

Am. C.

⊙ (Polyandria Monogynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine Nordamerikanische Pflanze. (Big. Med. Bot. t. 7.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel ist dick und überall mit vielen Fasern besetzt. Sie liefert einen blutrothen Saft. Ihr Geschmack ist scharf und etwas bitter.

Brechenregeb. — Gabe des Pulvers, acht bis zwanzig Gran. — Nach Smith ist ihre Wirkung der des rothen Fingerhuts ähnlich und sie vermindert ebenso die Schnelligkeit des Pulses.

Die Saamen haben in der Wirkung, nach Barton, Aehnlichkeit mit denen des Stechapfels.

Infusum Sanguinariae Canadensis. (B*.)

℞. Radicis Sanguinariae Canadensis
drachmam unam.

Aquae bullientis unciis quatuor.

Infunde et cola. — Brechenregeb, von Tully empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze, bis die beabsichtigte Wirkung eintritt.

Tinctura Sanguinariae Canadensis.

(Am. B* C.)

℞. Radicis Sanguinariae Canadensis
unciis duas.

Alcoholis tenuis octarium unum.
Post sex dies digestionis filtra.

Zu Anfang der Lungenentzündung, bei Brustwassersucht, beginnendem Group etc. empfohlen. — Gabe, zehn bis zwanzig Tropfen und mehr, nach und nach gesteigert.

S a n g u i s D r a c o n i s .

Draconis sanguis, Gummi s. Resina Sanguinis Draconis; Drachenblut; Sangdrakon (Gal.); Dragon's blood (Ang.); Demulak h-wain (Ar. Duk.); Drakowa krew (B.); Drageblod (D.); Sangre de dragon (His.); Heraduky (Hin.); Draakenbloed (Bel.); Sanguie di dragone (I.); Jaranang (Palembang.); Khunisyawashan, Pra Smocza krew (Pol.); Catnkamrigarakta (Sa); Drakblod (Succ.); Kandomurgarittum (Tam.); Catgamurgum intura (Tel.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Han. HassP. His. O. Pol. Sax. Suec. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sa. Sp. T. Z.

Eine dunkel blutrothe, geruch- und geschmacklose, harte, zerreibliche, trockne, am Feuer schmelz- und entzündbare Substanz,

welche mit einem balsamischen Geruch brennt. Man unterscheidet mehrere Sorten:

1) *Sanguis Draconis in granis* (en grains *Gal.*), in kleinen geforderten durchsichtigen Tropfen.

2) *Sanguis Draconis in lacrymis* (en larmes) in eisförmigen, haselnußgroßen, perlenschnurförmig aneinandergereihten Stücken.

3) *Sanguis Draconis in placentis* (en pains), in platten, einen Zoll dicken und einige Unzen schweren Massen oder Kuchen.

4) *Sanguis Draconis in tabulis* (en tables), in drei oder vier Zoll langen und sechs bis acht breiten und über einen Zoll dicken Platten.

Dieser Stoff wird aus den Früchten von *Calamus Rotang*, L. (*Draco*, *Willd.*) (*Hexandria Monogynia*, L.; *Palmae* J.), einem kleinen Baume Ostindiens (*Rheede* Mal. t. 64. *Bert.* Bild. III. 76. fig. 2.), und aus dem Stamme von *Pterocarpus Draco*, L. (*Diadelphia Decandria*, L.; *Leguminosae*, J.), einem Baume Südamerica's (*Hayne* IX. t. 9.); von *Pterocarpus santalinus*, L., einem Baume Ostindiens; von *Dracaena Draco* L. (*Hexandria Monogynia*, L.; *Asparagineae*, J.), auf den Canarischen Inseln (*Blackw.* Herb. t. 358. *Bert.* Bild. II. 8. fig. 1.); von *Dalbergia monetaria* (*Diadelphia Decandria*, L.; *Leguminosae*, J.), einem Baume Surinam's und verschiedenen Arten *Croton* gewonnen.

Melandri (s. *Hayne* getr. Darst. d. Pl.) fand ein eigenes Alcalin, *Dracolin*, welches im S. Drac. in guttis s. lacrymis nur in geringer Menge enthalten ist, dahingegen das S. Drac. in placentis fast ganz daraus besteht.

Ein schwaches Abstringens. — Gabe des Pulvers, von zehn Gran bis zu einer halben Drachme.

Pulvis ad haemoptysin. (Sm.)

℞. *Sanguinis Draconis* drachmas duas.
Magnesia subcarbonicae

drachmas quatuor.

Divide in partes duodecim. — Alle zwei oder drei Stunden ein Stück mit etwas Wasser.

Pulvis adstringens s. contra casum.
(Pal. Sar. Sp.)

℞. *Terrae sigillatae*,
Sanguinis Draconis,
Mumiae Aegyptiacae,
singulorum semunciam.

Cetacei drachmas duas.

Rhei drachmam unam.

Fiat pulvis. (Sp.)

Pal. Trium priorum dictarum sub-

stantiarum, singularum drachmas duas et reliquarum ambarum drachmam unam.

℞. *Baccarum Myrti*,
Balaustiorum,
Boli Armenae,
Mastichis,
Olibani,

Sanguinis Draconis,
singulorum partes aequales.

Fiat pulvis. (Sar.)

Ehem nach Stürzen empfohlen. — Gabe, zwei Scrupel.

Tinctura Sanguinis Draconis. (Sar.)

℞. *Sanguinis Draconis pulverati*
uncias duas.

Alcoholis libram unam.

Post tres dies digestionis in balneo arenae tepido filtra.

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Julep s. Julapium adstringens. (Pie.)

℞. *Aquae Plantaginis*,
— *Rosarum rubrarum*,
singularum uncias tres.

Corallii rubri,
Sanguinis Draconis,
singulorum semidrachmam.

Syrupi Rosarum rubrarum,
— *Cydoniorum*,
singulorum drachmas sex.

Succi Plantaginis . . uncias duas.

Sanicula.

Sanicula Europaea, L.; *Sanidel*; *Sanicle d'Europe* (*Gal.*); *Sanicle* (*Ang.*); *Sanikel* (*Bel. D. Succ.*); *Sanicula* (*His. Lus.*); *Sanicola* (*I.*); *Zakkiel* (*Pol.*).

Br. Fer. Gal. His. Wir. Be. Br. G. M. Sp.

℥. (*Pentandria Digynia*, L.; *Umbelliferae*, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 109.)

Man wendet das Kraut (*herba Saniculae s. Diapensiae*) an; es besteht aus einfachen, langgestielten, runden, fünfspitzigen, sägezahnigen, glänzenden Wurzelblättern, dünnen Stängeln und sitzenden dreispaltigen Stängelblättern. Es hat keinen Geruch und einen bitteren, etwas abstringirenden und salzigen Geschmack.

Es kommt mit zu manchen Brustspecies.

Santalum.

Man kennt drei Holzarten dieses Namens.

1) *Lignum Santali rubri*; rothes Sandelholz, Kollaturholz; *Santal rouge* (*Gal.*); *Red saunders* (*Ang.*); *Sundal almeer*,

Undum (Ar.); Czerweny santal, Czerwene santalowe drewo (B.); Rackta chandana (Beng.); Honnay (Com.); Rucktaudun (Cy); Lal chudend (Duk.); Sandalo rubro (His.); Ruckut chundun, Undum (Hin.); Root zandelhout (Bel.); Sandalo rubio (I.); Sundul surkh, Buckum (Pe.); Kuchandana, Tilaparni, Runjana, Rukta chandana (Sa.); Segapu chandanum (Tam.); Kuchandandum (Tel.).

An. B. Bor4. Br. Du. Ed. Gal. His. Lon. LonN. Suec. Wir. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Sp. Z.

Dieses Holz kommt in mehr oder weniger dicken, der Länge nach geschnittenen, schön rothen, gefurchten Stücken ohne Rinde oder in Kapselspähen vor (Scobs, Rasura Ligni Santali rubri, Lignum Santali rubrum raspatum), zwischen deren Furchen ein harziger verdickter Saft sitzt. Es hat einen sehr merklich gewürzhaften Geruch und einen etwas harzigen Geschmack.

Es kommt von *Pterocarpus santalinus*, L. (*Diadelphia Hexandria*, L.; *Leguminosae*, J.), einem Baume Ostindien's. Peltetter hat darin einen eigenthümlichen färbenden Stoff, das Santaliu (*Santalina*, *Santalinum*), *Santaline*, enthält.

2) *Lignum Santali albi*; weißes Sandelholz; Santal blanc (Gal.); *Ayasru* (Amb.); *White saunders* (Ang.); *Sundel abiez* (Ar.); *Chandana* (Beng.); *Tanmuk* (Cy.); *Srigunda* (Can.); *Cayhuynghan* (Co.); *Sandun* (Cy.); *Sundel* (Duk.); *Chunden*, *Chandana*, *Katchandan* (Hin.); *Sandalo bianco* (I.); *Tsjendana* (Mal.); *Sundul suffleid* (Pr.); *Chandana*, *Malagaja* (Suec.); *Chandanum*, *Chandana-cilltay* (Tam.); *Chandanum* (Tel.); *Aikamenil* (Timor.).

B. Br. Fer. Gal. His. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Sp.

In der Länge nach geschnittenen, sehr schweren, mit einer schwärzlichgrauen, etwas unebenen Rinde bedeckten Stücken von gelblichweißer Farbe, schwach aromatischem Geruch und fast gar keinem Geschmack.

3) *Lignum Santali citrini*; gelbes Sandelholz; Santal citrin (Gal.); *Yellow saunders* (Ang.); *Zlutý santal*, *Zlute santalowe drewo* (B.); *Sandalo citrino* (I.).

An. B. Br. Gal. His. Wir. Fi. G. Z.

Dieses Holz hat eine gelbliche Farbe und ein feineres Korn als das vorige; es ist brüchiger, leichter und gewöhnlich ohne Rinde. Es hat einen sehr deutlich gewürzhaften Geruch und fast keinen Geschmack.

Das weiße und gelbe Sandelholz kommen von *Santalum album*, L. (*Petrandria Monogynia*, L.; *Onagrariae*, J.),

Pharmacopoea universalis. II.

einem Baume Ostindien's. (Rumph. Amb. II. p. 42. t. 11. Plenck t. 101. Lam. III. t. 74.) — Hermann betrachtet das weiße als den Splint, das gelbe als den Kern des Holzes; nach Mérat ist ersteres das junge, letzteres das alte Holz.

Das gelbe Sandelholz ist reizend, schweißtreibend; das rothe schwach abstringirend.

Decoctum Ligni Santali citrini. (B.*)

R. Rasurae Ligni Santali citrini semunciam.

Aquae fontanae libras duas.

Coquendo dimidium consume. — Glas weise.

Oleum Santali citrini vel albi aethereum, *Aethereoleum Santali citrini vel albi*. (Wir. T.)

R. Rasurae Ligni Santali albi quantum vis.

Aquae partes quatuor.

Macerentur, destillet dimidium et cohobetur etc. (T.)

R. Rasurae Ligni Santali citrini libras sex.

Aquae purae libras tringenta sex.

Salis culinaris libram unam.

Macera per quatuor vel quinque dies et distillando obtentum oleum quod in fundum descendit, collige.

Unguentum santalinum, *Emplastrum santalinum s. incognitum*. (Br. Sar. Sax. Wir.)

R. Olei Myrti libras tres.

Cerae albae uncias novem.

Petalorum siccorum Rosarum rubrarum,

Ligni Santali rubri,

singulorum uncias quatuor.

Camphorae semunciam.

Cerae in oleo liquatae pulverem rosarum, tunc santalinum et denique camphoram in olei pauxillo solutam adde.

R. Santali albi,

— citrini,

— rubri,

singulorum drachmas sex.

Florum recentium Rhoeados

— — Rosarum

— — uncias duas cum dimidia.

Olei rosati libram unam.

Vini albi uncias quatuor.

Post duos dies macerationis coque lente ad humidum consumptionem usque, cola exprimendo et adde

Boli Armenae,

Cerae albae,

— — singularum uncias tres.

Camphorae drachmas duas.

Misce. (Wir.)

R. Pulveris Santali rubri partes sex.

Pulveris Croci . . partem unam.
 Olibani,
 Mastichis,
 Myrrhae,
 Aluminis crudi, singulorum partem
 duodecimam.
 Ligua et massae semirefrigeratae
 adde
 Resinae Pini,
 Cerae flavae,
 singularum partes sedecim.
 Misce bene. (Sax)
 R. Cerae,
 Resinae Pini,
 singularum uncias quatuor.
 Ligua et adde
 Ligni Santali rubri sesquiunciam.
 Croci drachmas duas.
 Olibani,
 Mastichis,
 Myrrhae,
 Aluminis,
 singulorum sesquidrachmam.
 Misce. (Br. Wir.)

Species diatrion Santalon. (Pal. Wir.)

R. Santali albi,
 — citrini,
 — rubri, singulorum drachmas
 duas et scrupulos duos.
 Florum Rosarum . uncias tres et
 drachmas tres.
 — Violarum . semunciam.
 Rhei,
 Seminum Portulaccae,
 Eboris ad alborem usti,
 Succi Liquiritiae,
 singulorum drachmas duas.
 Amyli,
 Gummi Arabici,
 — Tragacanthae, singulorum
 scrupulos quatuor.

Addi potest

Camphorae . . scrupulus unus.
 Die Äfen verorbnet diese Species zur
 Verbesserung der unregelmäßigen Hitze der
 Leber, bei schleichenden Fiebern, Gelbfucht
 und Wassersucht. — Gabe, eine halbe bis
 ganze Drachme.

Santolina.

Santolina Chamaecyparissus, L.; Gar-
 tencypresse, Cypressenraut; Santoline à
 feuilles de cyprès, Aurone femelle,
 Garde-robe (Gal.); Sweet scented la-
 vender cotton (Ang.); Santolina (His.
 I. Lus.); Cypresskraut (Bel.).
 Fer. Gal. Wir. Re. Br. M. Sp.

h (Syngenesia Polygamia Aequalis,
 L.; Syanthereae, Cass.) Eine auf den
 Gebirgen des südlichen Europa's wachsende
 Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 245.)

Man wendet das Kraut (herba Santo-
 linae s. Abrotani foeminei s. montani)
 an; es besteht aus grauen, vierzähligen,
 gezähnten, stumpfen, immergrünen Blät-
 tern und hat einen durchbringenden, an-
 genehmen Geruch und einen gewürzhaften
 und bitteren Geschmack.

Reizend, nervenstärkend, wurmmidrig.

Saponaria.

Saponaria officinalis, L.; Seifenkraut,
 Speichelseifenkraut, Waschkraut, Speichel-
 wurz; Saponaire (Gal.); Soapwort (Ang.);
 Mydlj koren (B); Saeburt (D.); Ja-
 bonera (His.); Zeepkraut (Bel.); Sapo-
 naria, Saponella (I.); Mydelnik (Pol.);
 Saboaira (Lus.); Saepaaert (Suec.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Borß.
 Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham.
 Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pol. R.
 R.C. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be.
 Fi. G. M. Fid. Sp. Z.

z (Hexandria Dignya, L.; Caryo-
 phylleae, J.) Eine in Europa gemeine
 Pflanze. (Blackw. t. 113 Schk. t. 121.
 Plencz t. 346. Hayne II. t. 2. Bert.
 Bild. VI. 95. fig. 2. Fl. méd. VI. 311.)

Die Wurzel (radix Saponariae rubrae)
 ist dünn, hart, sehr lang, von der Dicke ei-
 ner Schreibfeder, knotig, außen röthlich-
 braun, innen weiß, runzlig und fast ge-
 ruchlos. Der Geschmack ist anfangs süß-
 lich und schleimig, wird aber bald bitter,
 herb und etwas scharf.

Das Kraut besteht aus einem glatten,
 hohlen, walzenförmigen, gegliederten, wenig
 ästigen Stängel mit unbehaarten, sehr glat-
 ten, dunkelgrünen, fast sitzenden, eiförmig-
 zettelförmigen, ganzen und ganzrandigen,
 breitrippigen, am Grunde verschmälerten,
 kaum spitzigen Blättern. Es hat keinen
 Geruch und einen etwas seifenartigen, schleim-
 igen, schwach bitteren Geschmack.

Das Seifenkraut enthält Harz, Schleim-
 harz und einen eigenen schleimigen Stoff,
 von Bucholz Seifenstoff (Saponi-
 num) genannt.

Tonisch, schweißtreibend, besonders bei
 Haut- und venerischen Krankheiten ange-
 wendet.

Succus Saponariae. (Häss.)

R. Herbae vel Radicis recentis Sapo-
 nariae quantum vis.
 Contunde in mortario lapideo, expri-
 me sedulo, succum sepono ac filtra. —
 Gabe, eine bis vier Unzen.

Extractum Saponariae. (A. An. Gen.
 Han. HassP. Sax. Br. Sw. T. Vm.)

R. Herbae Saponariae libras decem.
 Contunde in mortario ferreo, adden-

℞. Aquae Mbras sex, exprime succum, qui semel ebulliat et tunc leui calore ad consistentiam syrupi spissi: evaporet. (Sw.)

℞. Foliorum recentium Saponariae quantum v.s.

Contunde cum Aquae pauillo et per pannum cola; sepone, decantha tunc prope ignem cogulent et denuo colentur; deinde ad massae pilularis consistentiam evaporata ab igne remove, admisce faeculam repositam et denuo ad justam spissitudinem redige. (Vm.)

℞. Radicis recentis Saponariae quantum vis.

Macera per horas aliquot in Aqua, adde majorem Aquae copiam et postquam aliquoties liquor ebulliverit, albumine clarificatum ad extracti usque consistentiam consume. (Vm.)

℞. Herbae Saponariae partem unam. Aquae communis partes octo.

Infunde per horas viginti quatuor, coque deinde per horae quadrantem et cola forti ex exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquores ambo, post horas viginti quatuor sepositionis ad aptam consistentiam evaporent. (Sax.)

℞. Foliorum recentium Saponariae, Aquae frigidae, singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim, tunc adde

Aquae bullientis duplum pondus totius massae. Postquam refrixerint sepone, albumine clarifica, igni impone et liquorem spissescere coeptum, per pannum trajice et continue agitando, sufficienter consume. (Vm.)

℞. Foliorum recentium Saponariae libras duas.

Aquae communis libras decem. Coque per horae quadrantem, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, qui ad consistentiam requisitam evaporet. (An. Gen.)

L. coquere Radicis libras duas in Aquae octo ad quatuor remanentiam et decoctum evaporare jubet.

℞. Radicis Saponariae partem unam. Aquae bullentis partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur, quo facto liquores ambo commixti et post sufficentem sepositionem decanthati, ad extracti consistentiam evaporent. (Han.)

A Radicem pluribus coctionibus succedentibus penitus extrahere et liquores commixtos post decanationem in balneo aquae consumere jubet; — Br.

Radicem coquere per horas duas cum Aquae partibus sex, tunc denuo cum nova Aqua et liquores commixtos inspissare; — HassP. ut extractum ligni campechianensis; — T. ut extractum cicorii.

Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Decoctum Saponariae officinalis. (B*. Sw. Sy.)

℞. Radicis Saponariae uncias duas. Aquae fontanae libras quatuor. Decoque ad dimidii remanentiam. (B*.)

℞. Herbae Saponariae semilibram. Aquae libras octo. Decoque ad dimidiae partis remanentiam. (Sw. Sy.)

Bei Scropheln, venerischen und Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, zwei bis vier Pfund täglich.

Species resolventes. (Ful. Sar. Pid.)

℞. Radicis Taraxaci, Saponariae, singularum uncias duas. Herbae Centaurii minoris, Marrubii, singularum unciam unam. Florum Tanaceti, Chamomillae, singularum sesquiunciam.

Concisa misce. (Ful. Pid.)

℞. Radicis Taraxaci, Saponariae, Valerianae minoris, singularum partes duas. Herbae Centaurii minoris, Marrubii albi, singularum partem unam. Florum Chamomillae Romanae partem dimidiam. — vulgaris partes duas.

Seminum Lini partes quatuor.

Zum Klystir bei Störungen in den Unterleibsgeweben.

Species Guajacinae compositae s. lignorum (RC.), vgl. Guajacum; Rasurae Ligni Guajaci partes tres, Radicis Bardanae, Caricis, Saponariae, singularum partes duas, Stipitum Dulcamarae partem unam; — Decoctum. Specierum uncias tres, Aquae bullientis libras tres, decoque ad duas, sub finem addendo Radicis Liquiritiae drachmas duas; — Decoctum Specierum cum Mezereio: singulis decocti libris Mezerei drachma una addatur vel: Decocti specierum et Decocti Mezerei, singularum partes aequales.

Sarcocolla.

Gummi Sarcocollae; Sarcocolla, Fischleimgummi; Sarcocolle (*Gal.*); Unzerat (*A.*); Sarcocolla (*His.*); Kunjudelh (*Pe.*).

Ams. Br. Fer. Gal. His. Wir. Wür. A. Be. G. M. Sp. T. Z.

In kleinen unregelmäßigen, eckigen, zerreiblichen Körnern von verschiedener Farbe, vom Bläßgelb bis zum dunkeln Granatroth und ganz- oder halbdurchsichtig und undurchsichtig, geruchlos und einen scharfen und brennenden Geschmack besitzend.

Es fließt aus allen Theilen und besonders aus den Rindern von *Penaea Sarcocolla*, L., (*Tetrandra Monogymia*, L.; *Acanthaceae*, J.), einem Strauche Persien's und Arabien's. (*Enc. méth.* t. 78. fig. 2.)

Diese Substanz enthält, nach Peltier, sehr wenig Schleimharz und Gallertstoff mit einer eigenthümlichen Substanz, dem *Sarcocollin* (*Sarcocollinum*), *Sarcocolline*.

Tinctura Sarcocollae. (Sar.)

R. Sarcocollae uncias duas.
Alcoholis Ithram unam.

Post tres dies digestionis super arena tepida filtra.

Sarsaparilla.

Salsaparilla, *Sarsa*, *Zarsa*, *Zarsaparilla*; *Cassaparille*, *Sarsaparille*; *Salsaparille* (*Gal.*); *Sarzaparilla* (*Ang.*); *Sarsanarylle* (*B.*); *Sarsaparil* (*D.*); *Zarsaparilla* (*His.*); *Sarzaparilla* (*Sel.*); *Salsapariglia* (*I.*); *Sasaparyle* (*Pol.*); *Salsaparilha* (*Lus.*); *Sassaparill* (*Succ.*).

Ams. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. A. Be. Br. C. G. M. Par. *Pid Sp. Z.*

So nennt man die Wurzel der *Smilax Salsaparilla*, L., ♀ (*Diococia Hexandria*, L.; *Asparagineae*, J.), einer Pflanze Perur's und Brasilien's (*Wienck* t. 712. *Blackw.* t. 393. *Berl. Jahrb.* XI. *Bert. Bild.* IV. 53. fig. 2. *Fl. méd.* VI. 308.) (Nach *Willdenow*, *Berl. Jahrb.* 1806. werden die Wurzeln von dieser Art fast gar nicht gebraucht, sondern vielmehr die von *Smilax siphilitica*, *Humboldt*.)

Es kommen davon vier Hauptsorten im Handel vor:

1) *Cassaparille* aus Brasilien oder Portugiesische: in sechs bis acht Fuß langen, etwa zwei Fuß im Umfang haltenden Bündeln, welche aus durcheinandergestochtenen, schreibfederdicken, biegsamen, der Länge nach gerietten Wurzeln bestehen, welche eine dünne Rinde, aber gewöhn-

lich keinen Ausläufer und keine Behaarung haben. Sie ist außen röthlich oder schwärzlichbraun, inwendig weiß und mehlig. Der Geruch geht ihr ganz ab, der Geschmack ist etwas bitter. Diese ist am meisten geschätzt. Sie kommt aus Peru und Maranham.

2) *Cassaparille* von Honduras. Die Rinde ist schmuzigbraun, bisweilen weißlich. Sie hat noch ihre Ausläufer und ist sehr lang und faseriger als die vorige. Inwendig ist die Rinde rosenröthlich weiß, das darunterliegende Holz ist weiß, von saßem, stärkemehlartigem Geschmack, die Rinde dagegen schleimig und oft deutlich bitter. Sie kommt aus der Hondurasbai.

3) *Cassaparille* von Veracruz; mager, dunkelgefärbt und faserig, schlechter als die vorigen.

4) *Rothe* oder *Jamaika-Cassaparille*, mit Ausläufern versehen, sechs bis sieben Fuß lang, rund und durch das Trocknen zusammengebrückt, mit einer orangerothen, röthlichgrauen oder weißlichen Oberhaut bedekt; die Rinde ist bisweilen feucht und der zunächst unter ihr liegende markige Theil weiß (mehr oder weniger buntetroth). Man findet sie in kleiner Menge unter den von Honduras kommenden Bündeln. Sie ist zwar wenig geschätzt, verbietet aber den Vorzug vor den beiden erstern, indem sie einen bitterern, stärkeren und gewürzhafteren Geschmack und einen deutlichen, schon durch Reiben bemerkbar werdenden Geruch besitzt.

Diese Wurzel verdankt, nach *Palotta*, ihre Arzneikräfte einem eigenthümlichen Alkaloid, dem *Parillin* (*Parilline*, *Parillinum*), *Parigline*, das jedoch Planche nicht darstellen konnte. Kolchi hat auch aus dem Kern der *Cassaparillwurzel* ein anderes Alkaloid, das *Smilacin* (*Smilacina*, *Smilacinum*), *Smilacine*, gezogen.

Sie wird im Allgemeinen als harntreibend und besonders schweißregend betrachtet, obgleich in beiden Beziehungen ihre Wirkung sehr schwach ist; offenbar wirkt sie reizend, eine Eigenschaft, welche das *Parillin* in einem noch weit höheren Grade besitzt. (Nach *Palotta* wirkt es zugleich deprimirend.) Man wendet sie vorzüglich in venerischen Krankheiten, chronischen Rheumatismen und verschiedenen Hautkrankheiten an. — In Pulver giebt man sie zu einer halben bis ganzen Drachme, Galläpfelaufgus, Kaltwasser, essigsaures Blei und salpetersaures Quecksilber dürfen weder mit dem Pulver, noch mit dem Aufgus und der Abkochung verbunden werden.

Die in Ostindien anstehenden Engländer führen unter dem Namen einheimische oder Indische *Cassaparille*, *Country sarsaparilla*, die Wurzel von *Periploca indica*, L. (*Pentandria Monogymia*,

L.; Apocynaceae, *J.*), einem in diesen Gegenden einheimischen Strauch, an. Diese Wurzel [*Oshba* (*Ar.*); *Erramassumul*, *Irimusu* (*Cy.*); *Mugrabu* (*Hin.*); *Shariva* (*Sa.*); *Nunnarivayr* (*Tam.*); *Sugundapala* (*Tel.*)] wird zu drei oder vier Unzen in Abkochung bei Scropheln, venerischen und Hautkrankheiten empfohlen.

Pulvis sudorificus et tonicus. (*Pic.*)

R. Sarsaparillae,
Sassafrae,
Radiciis Rusci,
singularum partes aequales.

Gabe, eine Drachme alle Morgen in weißem Wein.

Opiatum arabicum. (*Pic.*)

R. Sarsaparillae,
Chinae,
Nucum Avellanarum tostarum
singularum uncias quatuor.
Caryophyllorum uncias quinque.
Mellis Narbonnensis
quantum sufficit.

Dieses Opiat wird in der Provence häufig gegen venerische Halsgeschwülle und sogenannte chronische oder ausgeartete Syphilis angewendet.

Extractum Sarsaparillae. (*Am.* B. *His.* Lon. LonN. *Sar.* *Wir.* E. *Fi.* T.)

R. Radiciis Sarsaparillae libram unam.
Aeque bullientis . . . octarios octo.

Macera per horas viginti quatuor, decoque deinde ad octariorum quatuor remanentiam; cola liquorem bullentem et ad extracti consistentiam consume. (*Lop.* LonN. C.)

R. Radiciis Sarsaparillae partem unam.
Aeque bullientis . . . partes decem.

Digere per horas viginti quatuor, tunc coque per duas et cola; residuum coquatur per aequale tempus cum novae Aeque partibus quatuor; liquores commixti ad extracti consistentiam evaporant. (*B.* *His.*)

Am. coctionem Radiciis primum cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aeque, qualibet vice ad dimidii remanentiam praescribit; — *Fi.* Sarsaparillam primum cum Aeque sextuplo coquere, colaturae novam Aquam addere et sic radicem penitus extrahere, tunc decocta consumere; — *T.* ut extractum ligni guajacii.

R. Radiciis Sarsaparillae libram unam.
Aeque bullientis . . . libras sex.

Macera per tres dies, coque parumper, cola exprimendo et ad extracti consistentiam consume (*Wir.*)

Sar. liquorem coquendo ad duos trientes consumere, colare et evaporare jubet.

Decoctum Sarsaparillae s. Sarsae s. Smilacis Sarsaparillae. (*Am.* B*. *Du.*

Ed. Lon. LonN. Lus. Suec. *Br.* E. *Fi.* *Ra.* *Sa.* *Sw.* *Sy.* T.)

R. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Aeque . . . libras octo.

Digere modico calore per horas duas, exime deinde radicem et contusam lente in infusione ad dimidii aquae remanentiam coque.

Am. *Du.* et C. Sarsaparillae sequiunciam, Aeque bullientis octariorum duos, duas horas digestionis et coctionem radiciis contusae ad dimidiae partis liquidi remanentiam; — *Sy.* Sarsaparillae uncias tres, Aeque bullientis libras tres, quatuor horas infusionis, infusionem radiciis contusae per horas septem et coctionem ad librarum duarum liquidi remanentiam, vel; Radiciis uncias tres, Aeque bullientis libras tres, duodecim horas digestionis et decoctionem ad librarum duarum liquidi remanentiam; — *Pr.* Radiciis uncias sex, Aeque libras sedecim et post certum tempus digestionis, coctionem ad dimidiae partis liquidi remanentiam;

— Lus. eundem agendi modum, sed Aeque libras decem; — B*. et *Ra.* Sarsaparillae unciam unam et Aeque libras duas ad tertiam partem redigendas: — *Ra.* praeterea: Sarsaparillae unciam unam ad duas et Aeque libras quatuor ad duas redigendas; — B*. Lon. et LonN. Sarsaparillae uncias quatuor, Aeque octarios quatuor, quatuor horas infusionis, tunc duas macerationis radiciis contusae et coctionem ad dimidiae partis liquidi remanentiam; — Suec. Sarsaparillae uncias quatuor, Aeque bullientis uncias sexaginta quatuor, horas quatuor macerationis, duas digestionis radiciis contusae et evaporationem liquidi coctione ad unciarum triginta duarum remanentiam; — *Fi.* Sarsaparillae uncias quatuor, Aeque libras quinque cum dimidia, horas quatuor macerationis et coctionem ad libras tres; — *T.* Sarsaparillae uncias quatuor, Aeque libras sex, macerationem per horas quatuor vel sex et decoctionem ad dimidiam.

Reizend, bei venerischen und rheumatischen Krankheiten angewendet. — Gabe, ein halbes Pfund drei oder vier Mal täglich.

Tysana de Saini Marie.

R. Sarsaparillae concisae
uncias quatuor.

Aeque . . . octarios sex.
Decoque ad octariorum quatuor remanentiam; ab igne removendo adde

Radiciis Liquiritiae contusae
drachmas quatuor.

Post sufficientem infusionem refrigerata cola.

Reizend, bei venerischen Krankheiten empfohlen — Man trinkt die vorgeschriebene Menge, Morgens nüchtern, lauwarm, auf sechszehn Mal, alle Viertelstunden ein Glas.

Liquor antivenericus Roueni. (B*.)

℞. Decocti Sarsaparillae
 unciās triginta duas.
 Nitri drachmas tres.
 Aetheris hydrochlorici semunciam.
 Spiritus Camphorae
 drachmas duas.
 Olei essentialis Anisi
 guttas quinque.

Gabe, ein Eßfel zwei oder drei Mal täglich.

Syrupus Sarsaparillae. (GalF.)

℞. Sarsaparillae concisae libras tres.
 Aquae bullientis libras triginta.
 Infunde per horas viginti quatuor, tunc ad libras duodecim decoque et cola exprimendo; residuum coquatur in Aquae libris triginta ad duodecim remanentiam et cum expressione coletur, quo facto, decocta ambo commixta ad libras decem vaporatione redigantur et post sepositionem filtratis addantur
 Syrupi Sacchari,
 Mellis albi, singulorum librae tres.
 Coque celeriter ad requisitam consistentiam.

Tisana arabica. (Pie.)

℞. Sarsaparillae . . . unciās duas.
 Chinae unciām unam.
 Aquae libras octo.
 Decoque ad librarum quatuor remanentiam.

In der Provence mit dem opiatum arabicum gegen Syphilis gebraucht.

Decoctum Sarsaparillae compositum s. sudoriferum s. Ligni Guajaci compositum, Apozema sudoriferum. (Gal. His. Sar. Ca. Ra. Sp. Sw. Vm.)

℞. Radicis Sarsaparillae sesquunciam.
 Aquae communis libras quinque.
 Coque per semihoram et adde
 Rasurae Ligni Guajaci
 sesquunciam.
 Post horae quadrantem ab igne remove et adde
 Liquiritiae rasae . . . semunciam.
 Ligni Sassafras drachmas duas.
 Vase tecto, liquidum post refrigerationem cola, sepone et libras tres illius defunde. (Vm.)
 ℞. Radicis Sarsaparillae,
 Rasurae Ligni Guajaci,
 singulorum sesquunciam.
 Aquae tepidae . . . libras quatuor.
 Infunde per horas duodecim in vase

tecto, coquendo ad libras tres consume, sub finem addendo

Rasurae Ligni Sassafras

drachmas duas,
 Liquiritiae rasae . . . semunciam.
 Post semihoram infusionis cola. (Gal.)
 ℞. Sarsaparillae unciās duas, Guajaci tantidem, Aquae libras octo ad quatuor redigendas, Sassafras unciām unam et Liquiritiae drachmā unam.
 ℞. Radicis Sarsaparillae unciās duas.
 Rasurae Ligni Guajaci

unciām unam.

Chinae semunciam.
 Aquae octarios duos.

Coquendo dimidium consume, sub finem addendo

Ligni Sassafras drachmas duas,
 Cola leviter exprimendo. (Ca.)

℞. Radicis Sarsaparillae
 unciās triginta.

Aquae bullientis
 libras viginti quatuor.

Post horas viginti quatuor infusionis decoque ad librarum octo colaturam; qua operatione bis cum residuo repetita, decoctorum trium cunctorum mixtorum libris viginti adde

Florum Boraginis,
 Petalorum Rosarum albarum,
 Foliorum Sennae,
 Seminum Anisi,

singulorum unciās duas.

Coquendo ad libras duodecim consume et cola. (Sw)

℞. Radicis Sarsaparillae,
 — Chinae,
 singularum unciās duas.
 Rasurae Ligni Santali rubri

drachmas sex.

— Cornu Cervi sesquunciam.
 Digere per horas viginti quatuor, coque tunc ad dimidii reductionem, sub finem addendo

Rasurae Ligni Santali citrini
 drachmas sex.

Sacchari albi . . . unciās sex.
 Cola. (His.)

℞. Radicis Sarsaparillae
 unciām unam.

Aquae communis . . . libras tres.
 Sulphureti Antimonii in nodulo
 drachmas duas.

Colaе Piscium drachmā unam.
 Coquendo tertiam partem consume.

(Ra.)
 ℞. Radicis Sarsaparillae,
 — Chinae,

singulorum semunciam.

Rasurae Ligni Guajaci,
 Antimonii crudi,

singulorum unciās duas.

Aquae bullientis . . . libras octo.

Macera per horas viginti quatuor, tunc per horam coque in vase tecto; adde deinde

Rasurae Ligni Sassafras unciam unam.

Rad. cis Caryophyllatae semunciam.

Baccarum Juniperi contusarum drachmas duas.

Coque per horae quadrantem et cola. (Sp.) — Durch Zusatz von einer Unze Senna, zu Ende der Kochung, kann man dieser Tisane eine laxirende Wirkung ertheilen, und sie unterscheidet sich dann nur wenig von der Tisana antivenerica purgans.

℞. Radicis Sarsaparillae uncias duas.

— Chinae, Rasurae Ligni Guajaci, singularum unciam unam.

Antimonii crudi in nodulo sesquiunciam.

Aquae communis . . . libras sex.

Digere per horas duodecim inter cineres calidos, tunc lente ad duas libras decoque, sub finem addendo

Liquiritiae rasae drachmas sex.

Cola decoctum et bulliens infunde in Rasurae Ligni Sassafras drachmas tres.

Vas ad perfectam refrigerationem usque tege, et cola. (Sar.)

Bei venerischen, catarrhalischen und exanthematischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, mehrere Gläser täglich.

Tisana sudorifica. (Pie. Ra. Sm.)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.

Chinae, Dulcamarae, singularum unciam unam.

Aquae . . . octarios tres.

Decoque ad tertiae partis consumptionem usque. (Pie.) — Gabe, ein Glas Morgens und Abends. — Man versetzt diese Tisane mit einem Drittheil Milch und versüßt sie mit Zucker.

℞. Sarsaparillae, Dulcamarae, singularum unciam unam.

Rad. cis Saponariae drachmas duas.

Aquae . . . vitra sex.

Coquendo tertia parte consumpta, adde

Lactis vaccini . . . vitra duo.

Misce bene. (Sm.) Täglich in sechs

Gläsern zu nehmen.

℞. Sarsaparillae, Chinae, Guajaci, singularum semunciam.

Sassafras . . . drachmas duas.

Aquae . . . libras duas.

Coque. (Ra.)

So gebraucht, wie die vorigen.

Decoctum diaphoreticum incitans, Tisana sudorifica excitans. (B.)

℞. Radicis Sarsaparillae, Ligni Guajaci, singularum drachmas tres.

Dulcamarae, Foeniculi, singularum drachmas duas.

Aquae . . . quantum sufficit

ut decocti libra una obtineatur. — Auf zwei oder mehrere Male zu nehmen.

Decoctum antisyphiliticum nutriens. (B.)

℞. Sarsaparillae . . . unciam unam.

Lichenis Islandici abluti sesquiunciam.

Aquae . . . quantum sufficit

ut decocti unciae quatuordecim obtineantur. Colaturae adde

Syrupi Sacchari . . . unciam unam.

Auf zwei Mal, Morgens und Abends.

Decoctum Ichthyocollae compositum. (B*)

℞. Radicis Sarsaparillae uncias tres.

Corticis Sassafras, Ligni Sassafras, singularum unciam unam.

Aquae bullientis libras novem.

Digere per horas duodecim, tunc coque et adde

Ichthyocollae . . . uncias tre,

antea dissolutae in Aquae sufficiente quantitate, ut colatura sit unciarum octo.

Von Gimble bei venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, zwanzig bis fünfzig Unzen täglich.

Tisana Feltzii. (Bo. Ca. Pie. Ra.)

℞. Antimonii crudi in nodulo uncias quatuor.

Aquae communis libras duodecim.

Sarsaparillae . . . uncias duas.

Chinae . . . unciam unam.

Collae Piscium, Corticis Buxi, — Hederae, singularum sesquiunciam.

Decoque ad dimidii remanentiam, trajice per annum, seponē, decantha et adde

Sublimati corrosivi . . . grana tria.

Dissolve. (Bo. Ca. Pie.)

Eine Formel von Baumé.

℞. Antimonii crudi pulverati in nodulo uncias quatuor.

In ollam fictilem vitreatam immitte, ita ut fundum non attingat et infunde

Aquae . . . libras sex.

Coque per horas duodecim, tunc ad dimidii remanentiam et adde

Sarsaparillae . . . uncias tres.
Collae Piscinae . . . semunciam.

Ollam per horas viginti quatuor inter cineres calidos relinque et decoctum per linteum teneris texturae trajice. (R.)

Die letztere Formel wird heutzutage allein befolgt. Das Antimon ist unnöthig; wenn man es wegläßt, so wird die Tisane der vorigen ähnlich.

Wendet man durch Schwefelsäure gebleichten Fischleim an, so behält diese Substanz immer eine gewisse Menge Säure, welche auf die Schwefelbase wirkt und etwas rohes Spießglanz bildet. Daher die Kolliden und das Erbrechen, welches diese Tisane bisweilen erregt. Chevallier und Fbt schreiben jedoch diese Zufälle dem Arsenik zu, welches bisweilen in kleiner Quantität in der Schwefelbase enthalten ist und vom Wasser aufgelöst wird. Besser daher, man setzt den Spießglanz gar nicht zu, oder nimmt statt des Fischleims Arabisches Gummi, eine Unze auf anderthalb Pinten der eingedochten Tisane.

Tisana depurans de Vigarous. (Bo. Pie.)

℞. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Foliorum Sennae mundatorum . . . uncias tres.

Rasurae Ligni Guajaci,
— Sassafras,

Radicis Chinae,
— Iridis Florentinae,

Antimonii crudi,
Anisi viridis,

Cremoris Tartari,
Aristolochiae longae,

— rotundae,
Jalapae contusae,

Polypodii querni,
singulorum sesquiunciam,

Juglandium recentium cum putaminibus contusorum . . . no. 12.

Vini albi . . . octarios duos.

Infunde per horas viginti quatuor inter cineres calidos, tunc adde

Aquae fontanae . . . octarios sex.
Consume, modico calore, partem tertiam et per pannum cola.

Residuum cum Vini albi octariis duobus vel tribus et Aquae uncias sex vel septem pro tertia parte consumpta tisanam dilutiorem praebent.

Von der ersten Tisane nimmt man den Tag drei Gläser, die zweite dient zum gewöhnlichen Getränk.

Saint-Marie bereitet mit dieser Abkochung ein Roob *antisyphiliticum*, wozu folgendes die Formel ist:

℞. Tisanae de Vigarous . . . octarium unum,

Sacchari libram unam ad duas.
Coque ad consistentiam roob.

Dieser Roob soll bei Syphilis gute Wirkung thun. — Gabe, ein Eßlöffel, täglich vier Mal. Nach jeder Gabe nimmt man ein großes Glas einer concentrirten Abkochung der Sarsaparille, und steigt damit, bis man täglich neun bis zehn Eßel Roob verbraucht.

Decoctum catholicum. (Sar.)

℞. Radicis Graminis . . . sesquiunciam.
— Sarsaparillae unciam unam.

Foliorum Cichorii,
— Agrimoniae,

— Betonicae,
— Capilli Veneris Monspeliaci,

— Pimpinellae albae, singulorum manipulum dimidium.

— Sennae,
Cuscutae, singulorum semunciam.

Radicis Liquiritiae drachmas duas.
Seminum Anisi drachmam unam.

Aquae communis libras quatuor.

Coque sarsaparillam et radicem graminis in Aqua ad dimidii remanentiam adde liquiritiam et herbas, macera sennam, cuscutam et anisum per horas aliquot in Aquae bullientis uncias sex, cola et infusum cum decocto commisce.

Decoctum antivenerum lazana, Tisana antivenera purgans, Decoctum Guajaci compositum et purgans. (Gal. Ca. Sp.)

℞. Radicis Sarsaparillae,
Rasurae Ligni Guajaci,
singularum unciam unam.

Subcarbonatis Potassae
grana viginti quinque.

Aquae communis libras quatuor.

Macera per horas duodecim, subinde agitando, tunc ad libras tres octione consume; infunde deinde in liquido per semihoram

Foliorum Sennae,
Rasurae Ligni Sassafras,

Liquiritiae,
singulorum drachmas duas.

Rhei,
Coriandri,
singulorum drachmam unam.

Cola leviter exprimendo et post refrigerationem decantha. (Gal. Ca.)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,

Rasurae Sassafras,
singularum uncias duas.

Antimonii crudi unciam unam,
Aquae fontanae

libras duas cum dimidia.
Decoque ad libras duas et adde

Radiciſ Polypodii . semunciam.
 — **Rhei** . . . semidrachmam.
 — **Liquiritiæ**,
Foliorum Sennæ mundatorum,
Ligni Sassafras,
 singulorum drachmam unam.
Subcarbonatis Potassæ . . .
 grana quatuor.
Coriandri . . . semidrachmam.
 Post horas duodecim infusionis bis
 ebulliant et colentur. (Sp.)
Den Tag über zu trinten.
Tisana de Vinache. (Ca.)
℞. Antimonii crudi in nodulo
 uncias duas.
Sarsaparillæ,
Chinæ,
Ligni Guajaci,
 singulorum sesquiunciam.
Aquæ . . . octarios tres.
Decoque ad octarium unum et adde
Sassafras,
Sennæ, singulorum semunciam.
 Post sufficientem infusionem cola,
 sponde et decantha. — In venerischen
 und Hautkrankheiten gebraucht. — Gabe,
 mehrere Gläser täglich.
Tisana de Jausserand. (Bo.)
℞. Radicis Sarsaparillæ,
 — **Chinæ**,
Sulphureti Antimonii in nodulo,
 singulorum uncias duas.
Salis Tartari . drachmam unam.
Foliorum Sennæ,
Ligni Sassafras,
 singulorum unciam unam.
Rhei,
Corticis Chinæ contusi,
 singulorum semunciam.
Aquæ . . . quantum sufficit.
 Coque per horas octo, ignis exigui
 ope, in vase tecto, ad octariorum sex
 liquidi remanentiam, tunc per idem
 tempus infunde et cola. — Besonders
 bei Scropheln empfohlen. — Gabe, täg-
 lich drei Gläser.
Tisana sudorifica Astruc. (Piv.)
℞. Sarsaparillæ,
Sassafras, singulorum uncias duas.
Guajaci,
Chinæ, singulorum sesquiunciam.
Antimonii crudi in nodulo
 drachmas duas.
Aquæ . . . libras duodecim.
 Infunde calide per horas duodecim,
 tunc lente coque, sub finem addendo
Foliorum Sennæ . semunciam.
Radicis Liquiritiæ sesquiunciam.
Decoctum antiarthritis. (Ca.)
℞. Sarsaparillæ . . . uncias quatuor.
Antimonii crudi in nodulo
 uncias sex.
Aquæ . . . ℞. libras duas.

Decoque ad dimidium; in reliquis
infunde
Radicis Liquiritiæ unociam unam.
Seminum Anisi . drachmas duas.
Bon Duarin empfohlen. — Glasweise
zu nehmen.
Decoctum Lusitanicum s. antivenererum
Ulyssiponense s. Sarsaparillæ com-
positum s. cum Mezereu. (Am. B. Du.*
GalF. Lon. LonN. Lus. Suec. C. Sp. Sw. Sy.)
℞. Ligni Santali rubri,
 — albi;
 — **Guajaci**,
 — **Rhodii**,
Sassafras,
 singulorum unciam unam.
Sarsaparillæ . . . uncias tres.
Sulphureti Antimonii in nodulo
 uncias duas.
Corticis Mezerei . . . semunciam.
Aquæ bullientis . . . libras decem.
Infunde et coque deinde ad dimidii
consumptionem, sub finem addendo
Liquiritiæ rasæ . . . semunciam.
Cola. (B*, GalF. Sp.)
℞. Sarsaparillæ,
Ligni Sassafras,
 — **Santali rubri**,
 — **Guajaci**,
 singulorum uncias tres.
Corticis Mezerei unciam unam.
Coriandri drachmas sex ad unciam
 unam.
Aquæ fontanæ . . . libras viginti.
Decoque ad dimidii remanentiam.
 (Sy.)
℞. Sarsaparillæ . . . uncias sex.
Sassafras,
Guajaci, singulorum unciam unam.
Aquæ . . . libras decem.
Macera, blando calore, per horas sex,
tunc ad dimidium decoque et sub finem
adde
Liquiritiæ rasæ . . . unciam unam.
Corticis Mezerei drachmas tres.
Cola. (Sw.)
Lon. LonN. Decocti Sarsaparillæ
 ferventis octarios quatuor, Sassafras,
 Guajaci, Liquiritiæ, singulorum unciam
 unam, Mezerei drachmas tres. Decoque
 per horæ quadrantem et cola.
℞. Radicis Sarsaparillæ uncias tres.
Corticis Mezerei drachmas duas.
Aquæ fontanæ . . . libras tres.
Decoque ad libras duas et in fine
adde
Liquiritiæ rasæ . . . sesquiunciam.
Cola liquidi libras duas. (B*. Sy.)
 In venerischen und Mercurialkrankheiten
 empfohlen. — Gabe, fünfzehn bis fünf-
 zig Unzen täglich, allmählig gestiegen. — Die
 letztere Formel ist von Girtanner und
 den übrigen vorzuziehen.

Tisana antivenerea. (Sm.)

℞. Sarsaparillae concisae uncias duas.
Corticis Mezerei semidrachmam.
Aquaе fontanae sesquioctarium.
Decoque ad octarium unum et colaturae adde Liquoris Swietenii cochlear majus. — In einem Tage zu verbrauchen. — Plend rühmt sie sehr.

Tisana s. Ptisana Callaci, Detocum Sarsaparillae ex Callac. (B. His.)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Mercurii dulcis in nodulo drachmas duas.
Aquaе . . . libras quindecim.
Decoque ad consumptionem tertiae partis, adde deinde
Foliorum Sennae mundatorum unciam unam.
Semini Coriandri drachmas sex.
Aluminis . . . semidrachmam.
Coque denuo per horae quadrantem et ante perfectam refrigerationem cola. (His.)

B*. Coriandri drachmas duas.
Ehedem bei venerischen Krankheiten gebraucht. — Gabe, sechs Unzen zwei oder drei Mal täglich, einen Monat oder sechs Wochen lang.

Decocum antivenereum Passerini vel Salvadorii. (Fi. T.)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Fumariae, Florum Cyani, singulorum drachmas duas.
Foliorum Sennae drachmas tres.
Aristolochiae rotundae semunciam.
Radici Scolymi drachmas duas.
Coque in Aquaе pluvialis . . . libris sex addendo
Mercurii dulcis Aluminis usti, singulorum drachmam unam.

Decoque ad librarum trium remanentiam, cola per linteum fortiter exprimendo.

℞. Sarsaparillae uncias octo, Aristolochiae duas, Scolymi unam, Aquaе libras viginti, decoque ad duarum partium remanentiam, adde Sennae sesquunciam, Fumariae et Cyani, singulorum unciam unam. Decoque ad libras duodecim, adde Mercurii dulcis, Aluminis usti, singulorum semunciam, mixta per duas horas igne blandissimo digere, cola fortiter exprimendo per pannum, ita ut librae decem remaneant.

Tisana sudorifica et purgans. (Sm.)

℞. Sarsaparillae . . . uncias quatuor.

Aquaе purae . . . octarios tres.
Coque per horas tres igne perexiguo et sub finem adde
Sennae mundatae, Salis Epsomensis, singulorum sesquunciam.
Liquiritiae contusae drachmas quatuor.

Post horas viginti quatuor cola. — Gabe, sechs Unzen drei Mal täglich, drei Wochen oder einen Monat lang. — Soll bei chronischem Rheumatismus sehr nützlich seyn. — Sie ist von Hoff.

Decocum Zittmanni. (B. Bor4.)*

℞. Sarsaparillae . . . uncias duodecim.
Aquaе fontanae libras nonaginta (mensuras viginti quatuor Bor4.).
Digere per horas viginti quatuor, immitte deinde liquido in sacculum inclusa

Pulveris styptici (Ed.) (Sacchari aluminati Bor4.) sesquunciam.
Mercurii dulcis . . . semunciam.
Cinnabaris (Antimonii sublimati) drachmam unam.

Decoque ad libras triginta (mensuras octo) et sum finem adde
Seminum Anisi,
— Foenicul,

singulorum semunciam.
Foliorum Sennae . . . uncias tres.
Radici Liquiritiae sesquunciam.
Liquor, nomen *Decocum fortius* generis, seponatur; residuo adde
Sarsaparillae . . . uncias sex.
Aquaе libras nonaginta (mensuras viginti quatuor).

Coque (ad mensuram octo remanentiam), sub finem addendo
Corticis Citri,
Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae),
Cardamomi minoris,
Liquiritiae,

singulorum drachmas tres.
Cola et liqorem, *Decocum tenue s. debile s. mitius* nomen gerentem, sepono.
Ehedem rühmt dieses Präparat bei venerischen Krankheiten.

Roob antisiphiliticum. (T. Vm.)

℞. Sarsaparillae . . . partes quindecim.
Aquaе . . . partes centum viginti.
Coque ternis vicibus, singula quaque ad dimidii remanentiam; colaturas tres clarificatas ad octodecim partes redige et infunde in
Foliorum Sennae,
Florum Boraginis,
— Rosae moschatae,
Seminum Cuminii, singulorum partem unam.
Cola et sepono, tunc decanthatis adde

Sacchari albi partes quinddecim.
Solve leni calore et in refrigerationis momento adde

Mellis albi . . . partes quinddecim.
℞. Sarsaparillae . . . libras tres.

Sassafras,
Rasurae Ligni Guajaci,
singulorum libras duas.

Chinae flavae . . . libram unam.
Aqua . . . libras quinquaginta.

Decoque per horam circiter unam, filtra et decoctionem cum residuo quater vel quinquies repete, commisce liquores et in iis solve

Sacchari albi,
Mellis optimi,
singulorum libras quinddecim.

Despuma, filtra per linteum et sufficienter evaporata in urceolum effunde, continentem sacculos duos, cujus alter Anisi uncias quatuor alter Florum siccorum Boraginis tantidem continet, exprime sacculos ante refrigerationem, misce et syrupum para. (T.) — *Fat viel Mehltscheit mit dem syrupus Cuisinieri.*

Syrupus Sarsaparillae et Guajaci. (Am. C.)

℞. Sarsaparillae concisae,
Guajaci raspati,
singulorum libram unam.

Aqua . . . octarios decem.
Coque per horam unam et exprime; residuum denuo coquatur cum

Aqua . . . octariis decem
per horas duas, sub finem addendo

Petalorum Rosarum,
Gummi Arabici,
Foliorum Sennae,
singulorum unciam unam.

Zingiberis . . . semunciam.

Cola et adde

Mellis despumati,
Sacchari, singulorum libras tres.

Fiat syrupus. — *Unterscheidet sich von dem folgenden Syrup nur durch den Namen.*

Hierher gehört auch der

Syrupus Stevensii. (B*.)

℞. Sarsaparillae,
Ligni Guajaci,
singulorum libram unam.

Petalorum Rosarum rubrarum
unciam unam.

Aqua . . . quantum sufficit.

Coque per horam unam et liquorem decantha; residuum cum Aqua aequali quantitate per horas duas coquatur, sub finem additis

Gummi Arabici,
Foliorum Sennae,
singulorum uncia una.

Zingiberis . . . semuncia.

Decoctis ambobus conjunctis adde Mellis,

Sacchari, singulorum libras tres et syrupum para.

℞. Sarsaparillae,
Guajaci, singulorum libram unam,
Aqua . . . libras duodecim.

Mellis albi,
Sacchari crudi (cassonade),
singulorum sesquilibram.

Syrupus de Sarsaparilla compositus s. de Sarsaparilla et Senna compositus s. sudorificus s. Cuisinieri s. Smilacis Sarsaparillae s. depurans. (Am. An. B* Gal. GalM. C. Ca. Sw. T.)

℞. Sarsaparillae . . . libras duas.
Aqua tepidae . . . libras duodecim.

Infunde per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum

Aqua communis . . . libris decem et ad sex consumatur. Qua operatione his vel ter repetita, decocta commisce et leviter coque cum

Florum Boraginis,
— Rosarum albarum,
Foliorum Sennae,
Seminum Anisi,
singulorum uncias duabus.

Decoque ad dimidium, cola et colaturae adde

Mellis albi,
Sacchari albi,
singulorum libras duas.

Coque ad syrupi spissam consistentiam. (B* Gal. Ca.)

GalH. Sarsaparillam diu maceratam leviter coquere, et Flores, Sennam Anisumque vel seorsim, vel in producto prioris operationis infundere jubet.

GalM. eundem agendi modum indicat ut Gal.; sed loco florum boraginis et rosarum Folia Boraginis adhibendo; — Am. et C. loco florum boraginis eandem quantitatem Liquiritiae, Rosas tamen adhibet; — Sw. binis vicibus sequentibus coquere jubet Sarsaparillae libras duas in Aqua libris novem ad trium remanentiam, in ambobus decoctis conjunctis infundere Sennae sesquiunciam, Florum Boraginis, Rosarum moschatarum et Cumini, singulorum tantidem, colare et cum Sacchari, Mellisque boni, singulorum libris duabus syrupum parare et clarificare; — An. Infundere Sarsaparillae libras duas cum dimidia in Aqua fervidae libris viginti quatuor per horas viginti quatuor, tunc coquere ad colaturam librarum octo, operationem binis vicibus

sequentibus cum faecibus repetere; decocti hoc modo parati libras viginti quatuor evaporando ad dimidium redigere, sub finem addendo Florum Boraginis, Rosarum rubrarum, Sennae, Anisi, singulorum uncias duas et colaturâ lente vaporatâ, cum Sacchari et Mellis despumati, singulorum libris duabus syrupum parare.

Pelletan pluribus vicibus sequentibus coquere jubet Sarsaparillae libras duas in Aquae sufficiente quantitate ad duarum liquoris librarum remanentiam, tunc coquere Sennae uncias duas in Aquae libris duabus per horae quadrantem, liquores commiscere et in illis infundere Florum Boraginis, Buglossi, Rosarum albarum, Anisi, singulorum uncias duas, colare, addere Mellis et Sacchari albi, singulorum libras duas, clarificare et denique ad syrupi consistentiam coquere.

R. Sarsaparillae concisae
libras viginti quatuor.

Aquae bullientis
libras centum et septuaginta.

Infunde per horas duodecim vel quindecim, tum coque per duas, addendo, horae quadrantem antequam, ab igne removeatur

Foliorum Sennae
libram unam et uncias octo.

Cola; residuo infunde
Aquae bullientis libras quindecim.

Colaturae expressae adde
Mellis albi . . . libras octodecim.

Sacchari crudi . . . libras triginta.

Clarifica albuminis ope, infunde supra

Cumini contusi
libram unam et uncias octo.

Coque ad consistentiam syrupi et adhuc bullientis adde

Extracti Boraginis libras quatuor.

Kürzer ist Keraudren's Formel:
R. Syrupi Sarsaparillae vel Boraginis
libras duodecim.

— Sennae . . . uncias octo.

Calefac in balneo aquae et adde
Extracti Boraginis libram unam.

Roob Sambuci . . . uncias tres.

Commisce ad perfectam usque solutionem et cola.

Noch Kürzer ist folgende Formel von Lagneau:

R. Syrupi Sarsaparillae libras quatuor.
Syrupi Sennae . . . uncias tres.

Calefac et adde
Extracti Boraginis uncias quinque.

Roob Sambuci . . . noiam unam.

Syrupus Sarsaparillae vinosus. (Bo. Pic.)
R. Radicis Sarsaparillae sesquilibram.

— Aristolochiae rotundae,

Radicis Aristologiae longae,

— Jalapae,

— Polypodii,

— Chinae,

Ligni Guajaci,

— Sassafras,

Cremeris Tartari,

Sulphureti Antimonii in nodulo,

Anisi viridis, singulorum uncias sex.

Foliorum Sennae uncias duodecim.

Vini albi . . . octarios duodecim.

Macera per horas sex in vase tecto;

adde deinde

Aquae . . . octarios quindecim.

Coque blando igne per horam unam,

defunde et faecibus infunde

Vini albi . . . octarios sex.

Macera per horas tres, cola deinde

Aquae . . . octarios octo.

Coque per semihoram, defunde, li-

quores ambos commisce, sepone et de-

canthatis adde

Sacchari liquidi (melasse),

Sacchari crudi rubri,

singulorum libras novem.

Coque absque clarificando ad syrupi

consistentiam.

Sassafras.

Laurus Sassafras, L.; Fenchelholz, Cassafraß; Sassafras (Gal.); Sasafraß (Ar.); Cay-vang-di (Ce.).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Borß. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. Sax. Suac. Wir. Wüir. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Sp. Z.

Ein Baum (Enneandria Monogynia, L. Laurineae, J.) des südlichen America's. (Blackw. t. 267. Plenck t. 316. Mich. Arb. for. de l'Am. III. t. 7. Big. Am. med. Bot. t. 35. Bert. Bild. III. 29. fig. 1. Pl. méd. VI. 312.)

Das Holz (lignum Sassafras) ist leicht, von schwammigem Gefüge, brüchig, stahlgrau, geruchlos und von einem sehr schwachen Geschmack; das der Wurzel welches zum Theil noch mit der Rinde bedeckt, zum Theil davon entblößt ist, ist gelb oder sahlbräunlich, röthlich, von süßlichem, gewürzhaftem, etwas scharfem Geschmack und fenchelartigen Geruch.

Die Rinde (cortex ligni Sassafras) ist sehr dick, leicht, mürbe, runzig, graulich-braunroth, innen rostbraun; hat einen angenehmen, fenchelartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, schweiß- und harntreibend, bei Gicht, Rheumatismen und venerischen Krankheiten angewendet. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis eine Drachme.

Extractum Ligni Sassafras s. Sassafras.
(Wir.)

℞. Rasuræ Ligni Sassafras
libram unam.

Alcoholis libras quinque ad sex.
Post sufficientem extractionem cola
exprimendo, digere, tunc residuum pa-
rumper cum Aquæ libris tribus coque,
clarifica decoctum albuminis ope et al-
cohole destillatione separato, reliqua ad
extracti consistentiam evaporent. —
Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Infusum Ligni Sassafras s. Sassafras.
(B*. GalM. T.)

℞. Rasuræ Ligni Sassafras
semunciam.

Aquæ bullientis . libram unam.
Infunde per horas sex et cola. (B*.)
GalM. Sassafras unciam unam et
Aquæ bullientis quantum sati*, ut post
horas quatuor infusionis colaturæ se-
millibra obtineatur; — T. Sassafras
drachmam unam, Aquæ bullientis li-
bram unam.

*Aqua Calcis composita, Aqua benedi-
cta s. benedicta composita.* (Br. Du.
Lus. Bo. Pic. Sp. Vm.)

℞. Ligni Sassafras . . . semunciam.
— Guajaci . . . semilibram.

Liquiritiæ . . . unciam unam.
Coriandri . . . drachmas tres.
Aquæ Calcis . . . octarios sex.
Post duos dies digestionis cola. (Br.
Du. Sp.)

℞. Ligni Sassafras . . . uncias duas.
Nucis moschatae . . . drachmas tres.
Liquiritiæ . . . unciam unam.
Aquæ Calcis . . . libras quatuor.
Macera per horas viginti quatuor et
cola. (Lus.)

Vm. Sassafras uncias duas, Nucis mo-
schatae drachmas tres, Liquiritiæ un-
ciam unam, Aquæ Calcis uncias tri-
ginta sex et tres dies infusionis.

℞. Sassafras . . . semunciam.
Liquiritiæ . . . unciam unam.

Aquæ Calcis . . . libras sex.
Infunde per duos dies et cola. (Pic.)

℞. Radicis Althæeae,
— Saponariæ,

— singularium unciam unam.
— Sarsaparillæ,

Ligni Sassafras, singulorum drach-
mas quatuor.

Aquæ Calcis . . . libras quatuor.
Post duos dies macerationis adde

Syrupi Quinque Radicum aperien-
tium . . . uncias duas.

Misce. (Bo.)

Bei scrophulösen Krankheiten. — Gabe,
täglich mehrere Laffen.

*Syrupus e Corticibus s. Cortice Ligni
Sassafras s. Sassafras.* (Wir.)

℞. Corticis Ligni Sassafras uncias tres.
Vini albi . . . uncias viginti duas.

Infunde et colaturæ adde
Sacchari . . . uncias triginta duas.

Tinctura s. Essentia Ligni Sassafras.
(Br. Wir. Sw*.)

℞. Rasuræ Ligni Sassafras
uncias duas.

Aquæ Vitæ . . . uncias duodecim.
Digere per tres dies et filtra. (Sw*.)

Br. et Wir. Sassafras sesquunciam.
Alcoholis uncias ooto et octo (tres)
dies digestionis s. macerationis.

Reizend, ehehem als Mittel gegen Ca-
tarrh und als blutreinigend, jetzt besonders
als schweiß- und harntreibend betrachtet
und vorzüglich bei chronischen Rheumatis-
men angewendet. — Gabe, eine Drachme
täglich vier Mal, in Cassiasträthee.

*Essentia s. Tinctura Sassafras s. Li-
gni Sassafras composita.* (Wir.)

℞. Corticis Ligni Sassafras
uncias quatuor.

Poliorum Salviæ . . . uncias duas,
Nucis moschatae . . . unciam unam.

Cinnamomi . . . semunciam.
Anisi stellati . . . drachmas tres.

Alcoholis . . . libras duas.

Post tres dies digestionis cola expri-
mendo et filtra. — Reizend, bei Catar-
rhalsbeschwerden, Sicht, Krankheiten von
Luftansammlung, manchen Arten von Krätz-
ze etc. — Gabe, fünfzig bis achtzig Tro-
pfen.

*Oleum Ligni Sassafras aethereum,
Aethereoleum Sassafras Ligni.* (Am. Ams.
Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass.
HassP. Li. Pal. Sar. Wir. Wür. C. Fi.
Pid. Sw. T.)

℞. Ligni Sassafras . . . quantum vis.
Aquæ . . . quantum sufficit.

Destillent. (Am. Ams. Du. Ed. C.)
Ful. Wür. et Sw. Ligni partem unam

et quatuor Aquæ; — Pal. Ligni unam
et sex Aquæ; — Han. Ligni unam et
octo Aquæ; — T. Ligni partem unam
quatuor Aquæ, unum diem maceratio-
nis, destillationem dimidia partis, co-
hobationem et separationem olei.

℞. Ligni Sassafras . . . partes decem.
Aqua . . . partes viginti.

Salis culinæ . . . partem unam.
Post horas duodecim destillent et

oleum fundum petens colligatur (Gal.).
Sar. Ligni partes tres, Aquæ viginti
quatuor et unam Salis; — Hass. Wir.
et Pid. Ligni sex, Aquæ triginta et Sa-
lis tres; — Fi. Salis unam cum dimi-

dia, caeterum ut Fer.; — HassP. Ligni, Salis, singulorum libras duas, Aquae sedecim et repetitionem operationis cum Aqua stillatitia etc.

℞. Ligni Sassafras . . . libras duas.
Alcoholis uncias octo.
Post duos dies adde
Aquae libras duodecim.
Salis culinaris . . . libram unam.
Destillant. (Li.)
Gabe, zwei bis acht Tropfen.

Oleosaccharum s. Elaeosaccharum Sassafras. (B*.)

℞. Olei essentialis Sassafras guttas decem.
Sacchari albi . . . drachmas tres.
Contere.

Aqua Ligni Sassafras s. Sassafras. (Gal. Sar. Fi.)

℞. Ligni Sassafras . . . partem unam.
Aquae partes octo.
Post horas duodecim destillent partes quatuor. (Gal.)
Sar. Ligni partem unam, Aquae sex et Salis parvam quantitatem; — Fi. Ligni uncias sex, Aquae libras quatuor cum dimidia, destillent in balneo aquae calido librae tres.
Gabe, eine bis vier Unzen.

Aqua Ligni Sassafras s. Sassafras composita. (Wir.)

℞. Ligni Sassafras . . . semilibram.
Cinnamomi uncias tres.
Vini generosi libras decem.
Post aliquot dies digestionis destillet sesquilibra.

Satureja.

In den Pharmacopöen werden drei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Satureja hortensis*, L.; Gartensaturei, gemeines Pfefferkraut; Sarriette des jardins (Gal.); Savory (Ang.); Satureye (B.); Saer (D.); Ajedrea (His.); Keulen (Bel.); Santoreggia (I.); Ozabr (Pol.); Segureilha (Lus.); Kyndel (Succ.).

A. Ams. B. Br. Fer. Gal. His. Wir. Wür. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

⊙ (*Didynamia Gymnospermia*, L.; Labiatae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (Blackw. t. 419. Plenck t. 486. Hayne VI. t. 9. Zorn Ic. pl. t. 216.)

Das Kraut (*herba Saturejae* s. *Cunilae sativae*) besteht aus einem sehr ästigen, vierkantigen, dünnen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, einfachen, lanzettigen, linienförmigen Blättern. Es hat einen angenehmen, stark gewürzhaften Geruch und einen etwas scharfen, brennenden und gewürzhaften Geschmack.

Reizend.

2) *Satureja capitata*, L.; kopfförmige Saturei; Thym de Crête (Gal.).

Br. Gal. His. Wir. Be. Sp.
⊙ Eine Pflanze des südlichen und östlichen Europa's.

Man wendet das blühende Kraut (*herba et spicae Thymi Gretici*) an; es besteht aus einem dünnen Stängel mit kleinen, schmalen, entgegengesetzten, gefielten, punctirten Blättern und weißen, eine endständige Achse bildenden Blüthen. Es hat einen starken und angenehmen Geruch und einen brennenden und gewürzhaften Geschmack.

Reizend.

3) *Satureja Thymbra*, L.; Cretische Saturei; Sarriette de Crête (Gal.).

Gal. His.

⊙ Eine auf Creta wachsende Pflanze. Des Kraut hat kleine, eirunde und spitzige Blätter.

Oleum Saturejae aethereum, *Aethereolum Saturejae*. (Epl.)

℞. Herbae florescentis Saturejae partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies digestionis destillent.

Saxifraga.

Saxifraga granulata, L.; weißer Steinbrech, Hundsbrebe, Keilshaut; Saxifrage blanche (Gal.); Common saxifrage (Ang.); Huid steenbraek (D.); Witte steenbreek (Bel.); Saxifraga branca (Lus.); Steenbraecke (Succ.).

Br. Gal. His. Wir. Be. M. Sp.

4) (*Hexandria Digynia*, L.; Saxifrageae, J.) Eine in ganz Europa verbreitete Pflanze. (Blackw. t. 214. Plenck t. 345. Hayne III. t. 23. Zorn Ic. pl. t. 309.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (*radix Saxifragae albae*) besteht aus kleinen runden Körnchen von der Größe der Corianbursaamen, welche unter einander mittelst Fasern vereinigt und mit einem rothen Felchen bedeckt sind, welche man ehemals mit dem unpassenden Namen semen Saxifragae albae belegte. Sie hat einen etwas süßlichen und bitteren Geschmack, welcher sich beim Trocknen verliert.

Das Kraut besteht aus einem ästigen Stängel mit nierförmigen, sappigen Blättern. Es hat einen scharfen, etwas sauren Geschmack, von welchem nach dem Trocknen fast keine Spur zurückbleibt.

Scabiosa.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöden angeführt:

1) *Scabiosa succisa*, L.; Teufelsabbiss; Mors du diable (Gal.); Devilsbitt (Ang.); Czertkus (B.); Dievelsbid (D.); Mordisca de diavolo (His.); Duivelsbeet (Bel.); Morso del diavolo (I.); Cisyna (Pol.); Morso de diabo (Lus.); Engvaedd (Suec.).

An. Br. Gal. Wir. Be. M. Sp. Z.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Dipsacaceae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Hayne V. t. 37. Diüss. off. Pfl. VII. t. 20. Zorn Ic. pl. t. 150.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Succisae s. Morsus Diaboli) ist kurz, faserig, außen gelblich, innen weißlich und in der Mitte wie benagt, indem sie am Ende jedes Jahres zum großen Theil abstirbt.

Das Kraut besteht aus einem einfachen, runden, behaarten, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden Zweigen, welche an jedem Gelenke zwei kleine entgegengesetzte, lanzettförmige, ganze Blätter tragen. Es hat einen kaum merklichen Geruch und einen bitterlichen, süßen, styptischen Geschmack.

Schwach abstringirend, aber wenig gebraucht.

2) *Scabiosa arvensis*, L.; Acker-scabiose; Scabieuse des champs (Gal.); Field scabious (Ang.); Kawias (B.); Scaburt (D.); Escabiosa (His.); Gemeen scharfkraut (Bel.); Scabiosa (I.); Dryakiew polne (Pol.); Escabiosa dos campos (Lus.); Akervaedd (Suec.).

A. Ams. Br. Fer. Gal. His. Wir. Wür. Be. Br. M. Sp. Z.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Dipsacaceae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 447. Blackw. t. 185. Schk. t. 22. Hayne V. t. 38. Zorn Ic. pl. t. 141.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Blüthen an.

Die Wurzel ist lang, dünn, weiß und hat keinen merklichen Geruch und einen bittern, styptischen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem runden, behaarten, hohlen Stängel und eirundlanzettigen, gezähnten untern und wie gestielten obern Blättern.

Die Blüthen sind blaspurpurroth.

Aqua Scabiosae. (Pal.)

R. Herbae Scabiosae partem unam.

Aquae . . . partes tres.

Destillet dimidia pars.

Scammonium.

Diacrydium; *Σκαμμωνία*; Scammo-

nium, purgirender Binsenast; Scammonée (Gal.); Scammony (Ang.); Skammonia (B.); Sukmumia (Ar. Duk.); Skammonium (D. Suec.); Escampona (His. Lus.); Mehmudeh (Hin.); Scammonium (Bel.); Scamonea (I.); Skammonia, Sok suznikowy (Pol.).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Galm. Han. HassP. His. Li. Lou. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. T. Z.

Ein Gummiharz, von welchem man drei Sorten unterscheidet:

1) *Scammonium de Aleppo s. Aleppense s. Halepense s. Syriacum*, Scammonium von Aleppo, Scammonée d'Alep (Gal.), in regelmäßigen, aschgrauen, leichten, trocknen, sehr zerreiblichen Massen. Der Bruch ist glänzend, das Pulver bräunlichweiß, der Geruch stechend und etwas widerlich, der Geschmack scharf und bitter.

Es ist der getrocknete Milchsaft von *Convolvulus Scammonia*, L., 4 (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.), einer Pflanze Syriens. (Plenck t. 92. Mill. Diet. t. 102. Zorn Ic. pl. t. 214.)

2) *Scammonium Smyrnaeum*, Scammonium von Smyrna, Smyrnisches oder Antiochisches Scammonium; Scammonée de Smyrne (Gal.) ist schwerer, dichter, weniger zerreiblich, dunkler, von unangenehmer Geruch und nicht so geschädigt wie das vorige.

Es kommt von *Periploca Scamone*, L. 4 (Pentandria Monogynia, L.; Apocynaceae, J.), einer Pflanze Aegyptens. (Nip. de pl. Aeg. t. 48.) — Sibthorp leitet es von *Cynanchum monspeliacum* her.

3) *Scammonium Monspeliacum*; Scammonium von Montpellier; Scammonée de Montpellier (Gal.), ist ganz schwarz, sehr hart und herb.

Es kommt von *Cynanchum Monspeliacum*, L., einem Strauche (Pentandria Monogynia, L.; Apocynaceae, J.) des südlichen Frankreichs und Spaniens (Sibthorp Fl. graec. t. 251. Jacq. Coll. II. t. 340. Cavan. lc. rar. I. t. 60.)

Ein drastisches Purgirmittel. — Gabe des Pulvers, drei bis funfzehn Gran.

Diacrydium sulphuratum. (Pal Sar. Wir. T.)

R. Scammonii pulverati quantum vis. Supra chartam albam sparsum supra cratem, cui carbo vivus est subditus, in quem sulphuris uncia successively inficiatur, suffumigetur, agitando donec resina liquefieri et chartae adhaerere incipiat.

Diacrydium glyzyrrhizatum s. *Liquiritia edulcoratum*. (Sar. Wir.)

℞. Scammonii semibraam.
Decocti Liquiritiae libram unam.

Contere, sepone, liquorem vaporando ad siccum redige et residuum pulvera.

Diacrydium rosatum ohtines, si loco decocti liquiritiae Infusum Rosarum; *Diacrydium cydoniatum*, si loco infusi Succum Cydoniorum depuratum adhibes.

Resina Scammonii. (Ams. An. Br. Ful. Gal. Pal. R. Sax. Wir. Br. T.)

℞. Scammonii pulverati partem unam.
Alcoholis (0,907) . . partes sex.

Dissolve, filtra liquorem et destillando dimidium abstrahe; resinam e residuo Aquae ope praecipitatum bene ablue et blandissimi caloris ope sicca. (Ams. An. Br. Gal. R. Sax. Wir. Br.)

Pal. tincturam destillando ad perfectam siccitatem redigere, et residuum siccatum pulverare jubet; — T. Scammonii uncias sex cum Alcoholis diluti 25° B. per plures vices calide digerere, liquoribus commixtis destillatione ad dimidium redigere et residuum ad extracti consistentiam evaporatum in rotulas formare, quae super charta uncta aëris vel vaporatorii ope siccantur.

Gabe, drei bis zehn Gran.

Pulvis Scammonii s. *Scammoneae compositus* s. *catholicus* s. *caryocostinus* s. *diacarthami* s. *purgans*, *Species caryocostinae*. (Am. An. Ed. Fer. His. Lon. LonN. Lus. Sar. C. Vm.)

℞. Scammonii,

Cremeris Tartari,
singulorum partes aequales.

Misce triturando. (Am. Ed. Lus. C.)

Fer. Scammonii, Tartari, Sacchari,
singulorum grana octo.

℞. Scammonii,

Extracti Jalapae sicci,
singulorum partes quatuor.

Zingiberis . . . partem unam.

Fiat pulvis. (Lon. LonN.)

℞. Scammonii . . . semunciam.

Radici Mechoacannae,

— Jalapae,

singulorum drachmas sex.

Cremeris Tartari drachmas tres.

Misce. (His.)

℞. Scammonii,

Hermodytylorum,
singulorum uncias duas.

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

singulorum unciam unam.

Fiat pulvis. (An.)

℞. Cinnamomi,

Costi Arabici,

Zingiberis,

singulorum partem unam.

Hermodytylorum,

Scammonii,

singulorum partes duas.

Fiat pulvis. (Vm.)

℞. Seminum Carthami drachmas sex.

Gummi Tragacanthae,

Hermodytylorum,

Scammonii,

singulorum semunciam.

Cinnamomi,

Liquiritiae,

singulorum drachmas duas.

Turbithi . . . unciam unam.

Fiat pulvis. (Sar.)

Dieser Pulver hat Kechnlichkeit mit dem pulvis cornachini. — Gabe, zehn bis fünfzehn Gran.

Pulvis antarthriticus s. *antarthriticus purgans*. (Ca. Sp.)

℞. Seminum Cardui benedicti,

— Carthami,

Scammonii,

Radici Sarsaparillae,

— Chinae,

Ligni Guajaci,

singulorum semunciam.

Cremeris Tartari,

Foliorum Sennae,

singulorum unciam unam.

Cinnamomi . . . drachmas duas.

Fiat pulvis. (Sp.)

Ca. Seminum, singulorum drachmas decem, Salis et Sennae, singulorum semunciam, Scammonii, Sarsaparillae, Chinae et Guajaci, singulorum drachmas duas et Cinnamomi drachmam unam.

Pilulae resolventes. (Ca.)

℞. Extracti Gentianae semunciam.

Fellis Tauri . . . drachmas tres.

Scammonii . . . drachmas duas.

Fiant pilulae centum sexaginta duae. — Gabe, vier bis sechs Stück täglich, nüchtern ober vor dem Mittagessen.

Pilulae Extracti catholici s. *purgantis*. (Ams.)

℞. Extracti Aloës gummosi

unciam unam.

— Hellebori nigri

drachmas duas.

— Colocynthidis

drachmam unam.

Scammonii . . . drachmas tres.

Fiat massa pilularis.

Tabellae diacarthami s. *Scammonii* et *Sennae purgantis* s. *purgantis compositae*. (Gal. Sar. Pic. T.)

℞. Pulveris Diacarthami (Sar.)

uncias tres.

Sacchari pulverati libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.

Fiant tabellae. (Sar.)

℞. Cremoris Tartari . . . semunciam.
Scammonii . . . drachmas tres.
Sacchari albi . . . uncias octo.

Olei essentialis Cinnamomi

guttas quatuor.

Aquae Rosarum quantum sufficit.

Fiant tabellae drachmae unius. (Plz.)

℞. Scammonii . . . drachmas tres.
Foliorum Sennae drachmas qua-
tuor cum dimidia.

Rhei . . . sesquidrachmam.

Corticis Citri conditi

unciam unam.

Sacchari

uncias sex et drachmas sex.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae
cum Aqua Cinnamomi paratae
quantum requiritur.

Fiant tabellae drachmarum sex. (Gal.)

T. tabellas scrupulorum, quatuor pa-
rare jubet.

Gabe, zwei bis sechs Drachmen und mehr.

Electuarium caryocostyum. (Vm.)

℞. Pulveris Scammonii compositi
partem unam.

Mellis albi . . . partes sex.

Misce. — Purgitreb. — Gabe, eine
bis sechs Drachmen.

Electuarium hydragogum. (Br*. Ca.)

℞. Scammonii,

Radici Jalapae,

singulorum drachmas duas.

Scillae . . . sesquidrachmam.

Resinae Jalapae semidrachmam

Syrupi Rhamni cathartici

quantum sufficit.

Purgitreb. — Gabe, bis vier, und zwanzig
Gran, bei sogenannten asthenischen Was-
sersuchten.

Electuarium Scammonii s. purgans.
Confectio Scammoniae. (Am; Du. Lon.
LonN. C. Ra. Sp. Vm.)

℞. Scammonii,

Zingiberis,

singulorum unciam unam.

Olei Caryophyllorum

scrupulum unum.

Syrupi Corticum Aurantium

quantum sufficit.

Misce. (Am. Du. C.)

℞. Scammonii . . . sesquiunciam.

Caryophyllum,

Zingiberis,

singulorum drachmas sex.

Olei Carvi . . . semidrachmam.

Syrupi Rosarum quantum sufficit.

Fiat electuarium. (Lon. LonN.)

Pharmacopoea universalis. II.

℞. Coriandri . . . drachmas duas.
Caryophyllum,
Zingiberis,

singulorum drachmas sex.

Scammonii . . . sesquiunciam.

Syrupi Rosarum quantum sufficit.

Misce. (Vm.)

℞. Scammonii . . . semunciam.

Radici Jalapae . . . uncias quatuor.

Amygdalarum dulcium . . . no. 20.

Foliorum Sennae . . . uncias duas.

Anisi,

Cremeris Tartari,

singulorum unciam unam.

Pulpae Prunorum uncias sedecim.

Tamariudorum uncias octo.

Misce. (Sp.) — Gabe, eine bis zwei
Drachmen.

Electuarium Diuphoenix s. Scam-
monii et Turpethi compositum. (Gal.
Sar.)

℞. Pulpae Dactylorum

libram unam.

Turbith . . . uncias quatuor.

Liquiritiae . . . uncias duas.

Scammonii . . . sesquiunciam.

Mellis depurati

libras duas cum dimidia.

Coque pulpam, cum melle ad con-
sumptionem humidi superflui et adde
pulveres. (Sar.)

℞. Pulpae Dactylorum semilibram.

Amygdalarum dulcium excortica-
tarum uncias tres et dimidiam.

Sacchari pulverati . . . semilibram.

Mellis depurati . . . libras duas.

Pulveris Zingiberis,

— Piperis,

— Macidie,

— Cinnamomi,

— Foliorum Rutae,

— Seminum Dauci Cretici,

— Foeniculi,

singulorum drachmas duas.

— Radici Turpethi

uncias quatuor.

— Croci . . . grana sex.

— Scammonii . . . sesquiunciam.

Misce bene. (Gal.) — Gabe, von ei-
ner halben Drachme bis zur halben Unze.

Pruna praeparata s. purgantia. (Fi.)

Parantur e Prunis perniciousis, densis,
nucleum eximendo, et loco ejus bolum
e Scammonii granis decem et Conser-
vae Violarum sufficiente quantitate
paratum ingerendo. — Auf einmal.

Tinctura Scammonii. (Gal. T.)

℞. Scammonii grossiuscule trituro,

partem unam.

Alcoholis (22°) . . . partes quatuor.

Digere per tres dies et cola. — Gabe, zwanzig Tropfen bis eine Drachme.

T. Scammonii sesquiumciam, Alcoholis 25° libram unam et digestionem per dies decem. — Nicht über einen Scrupel und mit einer Emulsion.

Elizir polychrestum Halensa. (Wir. Sp.)

℞. Extracti panchymagogi unciam unam.

Alcoholis unciās sex.

Dissolve et solutioni adde

Acidi sulphurici drachmas tres.

Filtra. (Wir. Sp.)

℞. Extracti panchymagogi unciam unam.

Mixturae simplicis unciās sex.

Dissolve. (Wir.)

Purgirend. — Es war lange ein Geheimmittel. Die Formel ist von Triller. — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen und mehr.

Oleum purgans. (Sw*)

℞. Scammonii scrupulos quatuor.

Olei Amygdalarum dulcium unciās quatuor.

Dissolve blandi caloris ope. — Mildes Purgirmittel. — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen, in Emulsion oder mit syrupus papaveris.

Syrupus drasticus. (Bo.)

℞. Syrupi Limonum unciās quinque.

Scammonii pulverati drachmas quatuor.

Croci Martis aperientis,

Antimonii crudi porphyrisati,

singulorum drachmas duas.

Misce exacte.

Syrupus de Scammonio; Syrupus ad ar-

thritidem et hydropem s. antarthriticus vel

antihydropsicus. (Gal. Ca. Fi. T. Vm.)

℞. Scammonii pulverati semunciam.

Sacchari albi unciās quatuor.

Alcoholis (22°) unciās octo.

In pelvim argenteamingere, supra

ignem collocandam et simulac massa

aliquento est calefacta, cerei flamma ad-

moveatur ut liquor incendatur; agita

continue cum spatula, donec flamma ex-

tingatur, ab igne vase remoti; liquori

refrigerato et per pannum colato adde

Syrupi Violarum unciās quatuor.

Serva. (Gal.)

Fi. Alocholēm 20° adhibet; — T.

Scammonii drachmas sex, Sacchari unci-

ās sex, Alcoholis unciās duodecim,

Syrupi Violarum unciās sex. — Gabe,

zwei Drachmen bis eine halbe Unze, bis

eine Unze. T.

℞. Scammonii pulverati partem unam.

Aquae Vitae partes sedecim.

Dissolve, liquori ignem admove et

flammā sponte extinctā, per linteum

trajice et adde

Syrupi Violarum partes octo.

Serva. (Vm.)

℞. Gummi Arabici partem unam.

Scammonii partes duas.

Misce triturando et cum

Aquae sufficiente quantitate

emulsionem spissam para, cum qua

commisce

Syrupi Violarum partes viginti.

Serva. (Vm.)

Potio purgans, Mixtura cathartica Ara-

bica. (Ca.)

℞. Aquae Florum Aurantium,

Syrupi Florum Persicae,

singulorum unciām unam.

Spiritus Rorismarini

drachmā unam.

Scammonii grana duodecim.

Misce.

℞. Syrupi Limonum unciām unam.

Sulphureti Antimonii

grana duodecim.

Scammonii scrupulum unum.

Misce. — Auf ein Rat. — Die zweite

Formel wurde besonders gegen Wasserflucht

geprüft.

Emulsio purgans. (Gal.)

℞. Scammonii grana duodecim.

Sacchari albi drachmas duas.

Vitelli Ovi no. ½

Tere, sensim addendo

Emulsionis simplicis unciās quinque.

Aquae Florum Aurantium

drachmas duas.

Emulsio vermifuga. (Sa.)

℞. Nucleorum Persicarum

Amygdalarum amararum,

singulorum drachmas duas.

Scammonii semiscrupulum;

Aquae Absinthii unciās tres.

Scilla.

Scilla maritima, L.; Meerzwiebel,

Mauszwiebel; Scille, Oignon marin (Gal.);

Sea onion (Ang.); Alaschil (Ar.); Mers-

ka cybulu (B.); Strandlaeg (D.); Es-

cilla, Cebolla albarana (H.); Zeau-

juip (bet.); Scilla, Cipolla marina (I.);

Korzen cebuli morskiej (Pol.); Albar-

ra, Cebolla albarra (Lus.); Sjaelaek

(Suec.).

A. Am. Aps. An. B. Ba. Bel. Bor.

BorC. BorG. Br. D. DD. Du. Ed. Feun.

Per. Ful. Gal. Galm. Gen. Han. Hass.

Mass. Hb. Lh. Lon. Lonn. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suet. Wix. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.

2. (Hexandria Monogynia, L.; Asphodelaeae, J.) Eine im südlichen Europa am Meeresufer wachsende Pflanze. (*Blackw. t. 591. Plenck. t. 271. Bert. Bild. VIII. 17. Fl. mé. VI. 313*)

Man wendet die Zwiebel (*radix Scillae marinae s. Squillae s. Scillae rubrae s. Pancreatii veri*) an; sie ist birnförmig, sehr groß und mit mehreren trocknen, dünnen, papierartigen Häuten bedeckt, unter denen man eirunde, fleischige, rothe oder weisse Schuppen findet. Ihr Geruch ist beizend, der Geschmack anfangs schleimig, wird aber dann bitter, scharf und widerlich. Man wendet nur die rothe Spizart an.

Die Meerzwiebel enthält, nach Vogel, außer Schleimharz, hölzigen Bestandtheilen z., einen eigenthümlichen bitteren Stoff, Scillitinin (Scillitimum) Scillitine (Gal.), welcher den Grund ihrer Wirksamkeit enthält. Nach Lillij besteht dieser Stoff aus nicht crystallisbarem Zucker und zwei Stoffen, einem sehr bitteren und einem außerordentlich scharfen.

In Indien braucht man, nach Kinskie, statt der Meerzwiebel die Zwiebel von

Erythronium Indicum, Rottler; Unsul, Iskil (Ar.); Nurriala (Cy.); Junglie piay (Duk.); Kanda (Hin.); Peyaz ideschi (Pe.); Nurri wungyum (Tam.); Addivittella guddalu (Tel.).

Einige Schriftsteller haben behauptet, die Meerzwiebel wachse in Ceylan, allein White von Bombay ist der Meinung, daß man *Amaryllis zeylanica* dafür genommen habe.

Reizend, harntreibend, Brustmittel, bei Wasserfucht und chronischen Catarrhen in Gebrauch. — Gabe des Pulvers, ein bis zehn Gran.

§. I. Präparate, welche die Meerzwiebel in Substanz enthalten.

Scilla praeparata. (RC. Fi.)

Bulbos Scillae, remotis aquamis externis, virgulis penetratos in evaporatorio vel furno parum calido sicca, contunde in mortario, denuo in evaporatorio calefactos contunde et pulverem per setaceum trajiciens peritus siccatum serva. (Fi.) — RC. in taleolas transversim sectos leni calore vel balnei aquae vel aestivo soli expositos vel in loco temperate calido exsicca, ut

fiant friabiles, tunc in pulverem terantur etc.

Pulpa Scillae. (Gal. Fi. T.)

R. Bulborum Scillae quantum vis. Radicibus et tegminibus externis semotis, reliqua inter chartam inclusa coque inter cineres calidos, donec bulbus facile inter manus conteri possit; tunc partibus combustis separatis, medias in mortario marmoreo contunde et per cribrum arcte textum trajiciendo, pulpam para.

Involvi quoque potest bulbus strato tenui pastae farinaceae et sic inter cineres vel in furno coqui. (Gal. T.)

Trochisel de Scilla Damocratis s. scillitici. (His. Pal. Sar. Wir. Sp.)

R. Scillae . . . uncias duodecim. Contunde in mortario, addendo Farinae Orobi vel Lupini

uncias octo. Divide massam in trochiscos drachmarum duarum. (Pal. Wir. Sp.)

His. et Sar. loco farinae Pulverem Radicis Fraxinellae adhibent.

Pulvis Scillae compositus s. compositus Stahlii. (B. BorC. Br. DD. Fenn. Pal. Gen. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. Au. Ca. E. Pid. Sa. Sm. Sp. Sw. Vm.)*

R. Scillae . . . partes sex. Radicis Vincetoxici partem unam. Fiat pulvis. (Ca. Sw.)

Br. Pal. Sar. Wir. et Sp. Scillae partes tres et unam Vincetoxici; — B. Scillae partes duas et unam Vincetoxici.*

R. Scillae . . . partem unam. Radicis Vincetoxici . . . partes sex. Nitri depurati . . . partes octo.

Fiat pulvis. (Pid.)

R. Scillae . . . partem unam. Nitri . . . partes quatuor. Fiat pulvis. (Sm.)

E. Scillae partem unam et Nitri sex; — Gen. Scillae unam et octo Nitri.

R. Scillae . . . drachmam unam. Nitri . . . drachmas duas. Cinnamomi . . . scrupulum unum.

Fiat pulvis. (Wür.)

Sa. Scillae grana decem, Nitri quindecim et Piperis Jamaicaensis quinque; — Sw. Scillae, Piperis Jamaicaensis, singulorum decem et Nitri quindecim.

R. Scillae . . . partem unam. Nitri, Cremoris Tartari, singulorum partes sex.

Fiat pulvis. (Pie.)

Pie. praeterea Scillae partes sex, Nitri duodecim et Cremoris Tartari viginti.

- ℞. Scillae partem unam.
Nitri partes tres.
Cremoris Tartari partes quatuor.
Pulveris aromatici partes duas.
Fiat pulvis. (Fenn. Suec.)
- ℞. Scillae partem unam.
Cremoris Tartari partes viginti quinque.
Elaeosacchari Foeniculi partes quinque.
Fiat pulvis. (DD.)
- ℞. Scillae,
Zingiberis,
singulorum grana duodecim.
Kali sulphurici drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ful.)
- ℞. Scillae partem unam.
Pulveris aromatici partes duas.
Nitri partes tres.
Sulphatis Potassae partes quatuor.
Fiat pulvis. (Vm.)
- ℞. Natri acetici,
Elaeosacchari Juniperi,
singulorum drachmas tres.
Scillae grana sex.
Radici Calami semigranum.
Opium grana tria.
Fiat pulvis in partes sex dividendus.
(BorC.)
- ℞. Scillae grana duo.
Foliorum Digitalis purpureae granum unum.
Tartari depurati semidrachmam.
Fiat pulvis. (B*.)
- ℞. Scillae,
Digitalis purpureae,
singulorum granum unum.
Olei Juniperi guttas duas.
Tartari boraxati,
Liquiritiae,
singulorum scrupulum unum.
Cinnamomi grana duo.
Misc. (B*.)
Panttreibend. — Gabe, zehn bis zwanzig Gran.
- ℞. Scillae grana duo.
Baccarum Juniperi grana octodecim.
Auf eine Gabe. (Au.)
- ℞. Scillae grana quindecim.
Iridis Florentinae,
Liquiritiae,
singulorum grana decem.
Sacchari Lactis scrupulos duos.
Olei Anisi guttas tres.
Fiant doses tres. — Gabe, Morgen
und Abends ein Stück. (Au.)
- ℞. Acetatis Sodae,
Elaeosacchari Juniperi,
singulorum drachmas tres.
Scillae grana sex.
Galami aromatici semidrachmam.
Opium grana tria.
- Fiant doses sex. — Gabe, drei Stück
täglich in Wachholderthee. (Au.)
- Boli scillitici s. ad s. contra oedema
pulmonum. (Pie. Ra.)
- ℞. Scillae pulveratae grana sex.
Sulphatis Potassae grana duo.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Fiat bolus. (Ra.)
- ℞. Radicis Vincetoxici semunciam.
— Scillae drachmas duas.
Salis Absinthii drachmam unam.
Syrupi Valerianae quantum sufficit.
Fiant boli viginti quatuor. (Pie.)
- Pilulae scilliticae s. scillinae. (Ara.
Ams. An. B*. Bel. BorC. Br. D. Du.
Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hags.
His. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Sar.
Wir. Wür. Au. Br. C. Ca. Fi. Huf.
Pid. Pie. Sp. Sw. Vm.)
- 1) Dyne Seife.
- ℞. Pulveris Scillae sesquinciā.
Gummi Ammoniaci semunciam.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Gal. GalM.)
Fer. Scillae pulveratae, Gummi
Ammoniaci partes aequales et Balsami
Copaivae quantum sufficit.
- ℞. Scillae pulveratae semidrachmam.
Gummi Ammoniaci drachmas tres.
Nitri depurati drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum quatuor.
(Gen.)
- ℞. Gummi Ammoniaci,
Scillae siccatae,
singulorum partes duas.
Cardamomi minoris partem unam.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Ams.)
Ful. et Li. Trium substantiarum, sin-
gularum partes aequales, cum Oxy-
melle scillitico; — Lus. et Ca. Partes
aequales cum Syrupu Sacchari; — Wür.
et Pie. Partes aequales cum Balsamo
Copaivae; — Hass. et Pid. Partes ae-
quales absque syrupo et balsamo; —
Au. Scillae, Gummi Ammoniaci, sin-
gularum partes duas et unam Carda-
momi absque oxymelle, syrupo et bal-
samo.
- ℞. Scillae pulveratae partem unam.
Gummi Ammoniaci,
Cardamomi minoris,
Extracti Liquiritiae,
singulorum partes tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (An. Br. Sw.)
- ℞. Scillae pulveratae,

- Gummi Ammoniaci,**
Millepedum,
singulorum partes octo.
Cardamomi minoris partes duas.
Balsami Copaivae partem unam.
Fiat massa pilularis. (Br.)
- 2) *Wit Seife.*
- R. Scillae pulveratae drachmam unam.
Saponis albi grana viginti quatuor.
Fiant pilulae quadraginta. (Am. C.)
- R. Saponis albi . . . partes septem.
Gummi Arabici . . . partes tres.
Scillae pulveratae,
Balsami Copaivae,
singulorum partem unam.
Fiat massa pilularis. (His.)
- R. Saponis albi . . . partes duas.
Gummi Ammoniaci,
Scillae pulveratae,
singulorum partem unam.
Emulsionis spissae Balsami Copai-
vae . . . quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Vm.)
- R. Saponis . . . partes duas.
Scillae pulveratae,
Nitri, singulorum partem unam.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (Ca.)
- R. Saponis Hispanici . partes octo.
Gummi Ammoniaci,
Radici Vincetoxici,
Scillae, singulorum semunciam.
Balsami Copaivae drachmam unam.
Fiat massa pilularis. (D.)
- R. Saponis albi,
Gummi Ammoniaci,
singulorum drachmas duas.
Zingiberis . . . scrupulos duos.
Scillae siccatae grana duodecim.
Alcoholis . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum.
(BorC. Au.)
- Lon. LonN. Saponis, Zingiberis, sin-
gulorum partes tres, Gummi Ammo-
niaci duas, Scillae unam et Syrupi Sac-
chari quantum sufficit; — Du. et C.
Scillae drachmam unam, Zingiberis duas,
Olei Anisi guttas decem et Gelatinae
Saponis quantum sufficit; — Br. Scil-
lae drachmam unam, Zingiberis, Sapo-
nis, singulorum tres, Gummi Ammo-
niaci duas et Syrupi Zingiberis suffi-
cientem quantitatem; — Ca. Saponis,
Zingiberis, singulorum drachmas tres,
Gummi Ammoniaci drachmas duas,
Scillae unciam unam et Syrupi Saccha-
ri quantum sufficit; — Hap. Scillae
drachmam unam, Zingiberis, Saponis,
singulorum tres, Gummi Ammoniaci
duas et Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit.
- R. Scillae siccatae et pulveratae,
Gummi Ammoniaci, vel

- Asae foetidae,
Pulveris aromatici, vel
— Zingiberis, vel
— Cardamomi,
Saponis oleosi,
singulorum partes aequales.
Tincturae aromatica, vel
— Guajaci volatilis, vel
Syrupi simplicis quantum sufficit.
Fiat massa. (R.C.)
- R. Scillae,
Gummi Ammoniaci,
Millepedum,
singulorum semunciam.
Saponis . . . unciam unam.
Balsami Copaivae drachmam unam.
Fiant pilulae granorum decem. (B*.
Sar. Wir. Huf.)
- Fi. eandem formulam sed Balsami
Copaivae quantum satis ut fiat massa
pilularis.
- R. Saponis Veneti . drachmas duas.
Gummi Ammoniaci,
Scillae pulveratae,
Millepedum,
singulorum drachmam unam.
Olei Anisi . . . guttas septem.
Mellis rosati . quantum sufficit
ut fiat pilulae ponderis grani unius.
(B*)
- Bel. Pie. et Sp. eandem formulam
sed loco balsami copaivae Orymel scil-
liticum adhibent.
- Die Gabe dieser Pillen ist im Allgemei-
nen sechs bis funfzehn Gran.
- Pilulae desobstruentes s. diureticae re-
solventes.* (B. Ca. Sw.)
- R. Gummi Ammoniaci,
Saponis medicinalis,
singulorum sesquidrachmam.
Scillae pulveratae,
Pulveris aromatici,
singulorum semidrachmam.
Olei essentialis Juniperi
guttas viginti.
Syrupi Corticum Aurantium
quantum sufficit.
Fiant pilulae quinque granorum. —
Gabe, vier Stück alle drei Tage, bei Bleich-
sucht und chronischen Leberkrankheiten.
- R. Saponis medicinalis,
Extracti Taraxaci,
singulorum drachmam unam.
Natri sulphurici scrupulos quatuor.
Scillae . . . grana sedecim.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. —
Gabe, ein Stück alle drei Stunden. (B.)
- Pilulae pectorales.* (Saxo.)
- R. Gummi Ammoniaci,

Sulphatis Potassae,
singulorum drachmas sex.
Radicis Iridis Florentinae
semunciam.
Scillae drachmas duas.
Saponis albi uncias duas.
Extracti Rhoeados quantum sufficit.
Fiant pilulae quinque granorum. —
Gabe, fünf Stück täglich drei Mal.
Pilulae physagogae. (B. Wür. Sm.
Sw.)
R. Scillae,
Extracti Elaterii,
singulorum semunciam.
Acidi succinici drachmam unam.
Sulphuris Antimonii aurati
semidrachmam.
Fiant pilulae granorum trium. (Sw.)
R. Scillae semunciam.
Sulphuris Antimonii aurati,
Acidi succinici,
singulorum drachmam unam.
Extracti Elaterii . . . semunciam.
Olei Anisi guttas aliquot.
Succi Liquiritiae quantum sufficit.
Fiant pilulae centum quinquaginta.
(B. Wür. Sm.)
Pilulae hydragogae. (Ca. Pid. Pic.)
R. Extracti Colocynthis
drachmas quinque.
Scillae drachmas quinque cum di-
midia.
Fiant pilulae ducentae. (Pic.)
R. Scillae pulveratae,
Mercurii dulcis, singulorum drach-
mas duas cum dimidia.
Oxymellis scillitici
sufficientem quantitatem.
Fiant pilulae centum. (Pic.)
R. Scillae,
Extracti Trifolii,
singulorum sesquidrachmam.
Digitalis purpureae,
Asae foetidae,
singulorum drachmam unam.
Fiant pilulae centum. (Ca.)
R. Extracti Taraxaci
drachmas tres cum dimidia.
Saponis Hispanici sesquidrachmam.
Galbani drachmas duas.
Scillae grana viginti quatuor.
Mercurii dulcis . . . grana sedecim.
Camphorae scrupulum unum.
Essentiae Aprantiorum
quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum (Pid.)
Gabe, vier Stück Morgens und Abends.
R. Asae foetidae . . . drachmas duas.
Saponis medicinalis
drachmam unam.
Camphorae semidrachmam.
Scillae grana duodecim.

Olei Juniperi . . . guttas viginti.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, zehn Stück Morgens und Abends.
(Au.)
R. Asae foetidae,
Extracti Valerianae,
singulorum drachmas duas.
Scillae,
Opii, singulorum grana decem.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, wie bei den vorhergehenden. (Au.)
Pilulae diureticae. (B. Ca. Sm.)
R. Cremoris Tartari drachmas quatuor.
Gummi Ammoniaci drachmas duas.
Scillae sesquidrachmam.
Croci pulverati . . . scrupulos duos.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Fiant pilulae sexaginta. (Ca. Sm.)
R. Scillae grana viginti.
Digitalis purpureae
grana octodecim.
Roob Juniperi . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae decem. — Gabe, ein
Stück alle zwei Stunden. (B.)
R. Pulveris Millepedum
drachmas duas.
Scillae pulveratae
grana triginta sex.
Gummi Ammoniaci drachmas tres.
Myrrhae drachmam unam.
Roob Juniperi drachmas quatuor.
Fiant pilulae trium granorum. (Sm.)
Pilulae expectorantes. (E. Far.)
R. Myrrhae sesquidrachmam.
Scillae semidrachmam.
Extracti Hyoscyami scrupulos duos.
Aquaes quantum sufficit.
Fiant pilulae triginta. — Gabe, zwei
Stück Morgens und Abends.
Pilulae incisivae. (Ca. Pic.)
R. Scillae drachmam unam.
Kermets mineralis . . grana octo.
Extracti Opii gummosi grana sex.
Butyri Cacao . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae triginta sex. (Ca.)
R. Scillae semunciam.
Ipecacuanhae . . . drachmas duas.
Extracti Opii gummosi
grana quindecim.
Butyri Cacao unciam unam.
Syrupi Gummi . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (Ca.)
R. Scillae grana sex.
Succini grana quindecim.
Ipecacuanhae grana duo.
Conservae Inulae quantum sufficit.
Fiant pilulae novem. (Pic.) Gabe,
zwei oder drei Stück täglich drei Mal.
Trachiaci scillitici. (Pic.)
R. Scillae semidrachmam.

Sacchari uncias duas.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
 quantum sufficit.
Fiant trochisci centum et vi inti.
Electuarium desobstruens s. aperiens.
 (Sw.)
R. Pulveris Scillae compositi (Sw.),
Gummi Ammoniaci,
Tartratis Potassae,
 singulorum drachmas duas.
Salis Ammoniaci scrupulum unum.
Syrupi Cinnamomi
 quantum sufficit.
Bei Wasserflucht. — Gabe, zwei Drach-
 men drei Mal täglich.
Looch ad asthma s. de Scilla. (Br, Pal.
 Wir. Fi. Pic. Sq.)
R. Succo Scillae,
Mellis depurati,
 singulorum uncias quatuor.
Misce bene. (Pic.)
Fi. Succo et Mellis, singulorum un-
 cias sex.
R. Scillae pulveratae grana octo.
Gummi Ammoniaci grana viginti.
Syrupi Althaeae,
Oxymellis scilliticoi,
 singulorum unciam unam.
Aquae Boraginis uncias duas.
Misce sedulo. (Pic.)
R. Scillae siccatae semunciam.
Iridis Florentinae drachmas duas.
Marrubii,
Hyssopi,
 singulorum drachmam unam.
Myrrhae,
Croci, singulorum semidrachmam.
Mellis depurati uncias sex.
Misce exacte. (Br. Pal. Wir. Sp.)
Unguentum Scillae. (B. Hus.)
R. Scillae uncias tres.
Lixivii caustici quantum sufficit.
Coquendo in mucilaginem redactis
adde
Axungiae Porci quantum sufficit
 ut fiat unguentum. — Auflösend, in
 Einreibungen auf schmerzlose Geschwülste.
Unguentum diureticum resolvens. (B.)
R. Unguenti mercurialis
 drachmam unam
Scillae semidrachmam.
In Einreibungen der Wasserflucht auf die
innere Seite der Beine, in die Lenden
und auf den Unterleib.
Linimentum diureticum s. diureticum
gastro-scilliticum. (B.)
R. Scillae pulveratae drachmam unam
Succi gastrici vitulini uncias duas.
Man reibt in Fällen von Wasserflucht da-
mit die Lendengegend ein, wenn der Kranke
die passenden Mittel nicht durch den Mund
nehmen kann.

§. II. Präparate, welche nur das wirk-
same Princip der Meerzwiebel,
mehr oder weniger rein enthalten.
A. Auszug durch Wasser.
Extractum Scillae. (A. Ba. Bel. Bor4.
 Fer. Wür. Br. T. Vm.)
R. Squamarum Scillae recentis
 quantum vis.
Contande in mortario, exprime suc-
cum et de tempore primum leni igne,
deinde in balneo aquae vaporando con-
sumente. (A.)
Bel. contundere jubet Scillam cum
Aquae sufficiente quantitate, ut massa
fers liquida obtineatur, colare expri-
mendo, residuum cum Aquae parvillo
triturare et cum expressione colare, li-
quores tunc commiscere, seponere et
decanthates in balneo aquae consumi-
re; — Br. Balbos contundere, cum
Aqua conterere, succum exprimere, re-
siduam cum nova Aquae quantitate co-
quere et liquores commixtos evaporare;
— T. macerando radicem siccataam
in pondere Aquae quadruplo ut extrac-
trum columbo parari jubet; quod vi-
de; — Fi. Squamarum recentium par-
tem unam contundere; Aquae frigidae
partes sex addere, in saccum ingerere et
prelo submittere, residuum cum nova
Aqua per horas circiter quadrantem
coquere etc. et liquores consumere.
R. Scillae concisae quantum vis.
Coque per horas unam in Aquae
sufficiente quantitate; cola exprimendo,
sepone, decantha liquorem et ad mell-
lis spissi consistentiam constatue. (Fer.
 Wür.)
Bor4. Scillae quantum vis cum Aquae
fervidae decuplo per horas triginta sex
infundere, liquorem exprimendo sepa-
rare, residuum iterum cum Aquae fer-
vidae quintuplo infundere et post re-
frigerationem exprimere, liquores de-
canthando etc. depuratos primum leni
igne ad tertiam partem, tum in balneo
vaporis ad justam extracti spissitudi-
nem consumere.
R. Scillae recentis partem unam.
Aquae partes quatuor.
Macera per horas viginti quatuor et
cola absque expressione; liquorem tunc
sufficienter consume. (Ba. Vm.)
Electuarium resolvens martiale diuret-
cum s. diureticum. (B.)
{R. Saponis Veneti drachmam unam.
Extracti Gicetae grana duodecim.
 — **Scillae scrupulum unum.**
Aethiopsis martialis
 drachmam unam.
Oxymellis simplicis
 quantum sufficit.

Altmittels zu nehmen.

Decoctum Scillae. (Am. B. C.)

- ℞. Scillae drachmas tres.
 Juniperi uncias quatuor.
 Radicis Senegae uncias tres.
 Aquae octarios quatuor.
 Decoque ad dimidium, cola et adde
 Aetheris nitrici uncias quatuor.
 Reizend, bei Wasserfucht empfohlen. —
 Gabe, einen halben bis ganzen Eßffel.

Decoctum hydragogum. (Sa.)

- ℞. Radicis Taraxaci integrae uncias duas.
 — Althaeae drachmas decem.
 Aquae quantum sufficit.
 Coque per horae quadrantem et adde
 Scillae sesquiniunciam.
 Florum Chamomillae uncias duas.
 Post horam unam digestionis in vase
 tecto, uncis quatuordecim colaturae
 adde
 Syrupi Liquiritiae uncias duas.
 Misce bene.

Apozema pectorale et inopisivum. (Bo.)

- ℞. Radicis Taraxaci,
 Florum Taraxaci,
 singularium uncias, duas.
 Radicis Althaeae unciam unam.
 Florum Chamomillae drachmas tres.
 Scillae sesquidrachmam.
 Nucis Liquiritiae unciam unam.
 Aquae quantum sufficit
 ut librae tres colaturae obtineantur,
 cui adde
 Oxy mellis scillitici,
 Syrupi Althaeae,
 singularium drachmas sex.
 Brustmittel, harntreibend. — Zassen-
 weile, stündlich.

Decoctum diureticum Hufelandi. (Ca. Vm.)

- ℞. Scillae semidrachmam.
 Aquae uncias sex.
 Liquori postquam semel ebullierit, ab
 igne remoto adde
 Radicis Valerianae drachmas duas.
 Cola leviter exprimendo; post refri-
 gerationem colaturam contere cum
 Gummi Arabici,
 Resinae Guajaci,
 singularium drachmis duabus
 ut fiat emulsio, cui denuo colatae adde
 Tincturam Antimonii acris,
 Spiritus Nitri dulcis,
 singularium drachmas duas.
 Misce. (Vm.)
 Ca. coquere jubet per sexagesimas
 viginti Scillae seminiunciam in Aquae un-
 ciae haecum, sub finem addere Radicis

Valerianae pulveratae drachmas duas,
 colare et colaturam commiscege cum
 Syrupi Corticum Aurantium uncia
 una, Mucilaginis Gummi Arabici drach-
 mis tribus, Resinae Guajaci, Tincturae
 Antimonii acris, Spiritus Nitri dulcis,
 singularium drachmis duabus et Laudani
 liquidi guttis viginti.

Gabe, ein Eßstöffel alle zwei Stunden.

Mel scilliticum. (Gal. T. Vm.)

- ℞. Squamarum Scillae uncias duas.
 Aquae communis libras tres.
 Coque leviter per aliquot sexagesi-
 mas, tunc digere per dies duos, cola
 exprimendo et colaturae adde
 Mellis sesquilibram.
 Clarifica et coque ad syrupi consi-
 stentiam (Gal.)
 T. Mellis 32° B. libras duas, caete-
 rum ut Gal. Fl. Squamarum drach-
 mas quindecim, Aquae et Mellis, sin-
 gularium libras duas cum dimidia.
 ℞. Scillae siccatae partem unam.
 Aquae quantum sufficit
 ad obtinendas infusi partes duodecim,
 quarum colaturae adde
 Sacchari albi partes duodecim.
 Coque parumper, cola per pannum
 et post refrigerationem adde
 Mellis partes duodecim.
 Misce bene (Vm.)
 Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

*Syrupus de Scilla s. scilliticus s. Scil-
 lac.* (T. Vm.)

- ℞. Scillae siccatae partem unam.
 Aquae tepidae partes duodecim.
 Infunde per horas duodecim, cola
 exprimendo et adde
 Sacchari albi partes sedecim.
 Clarifica et coque ad syrupi consi-
 stentiam.
 Fi. et T. ut mel scilliticum sed loco
 mellis cum Saccharo clarificato parare
 jubent.

Looch pectorale. (Ra.)

- ℞. Looch simplicis uncias quatuor.
 Mellis scillitici unciam unam.

Mixtura scillina. (R.G.)

- ℞. Aquae Menthae pipentae uncias quatuor.
 Syrupi Scillae, vel
 Oxy mellis ejusdem uncias duas.
 Misce. — Interdum additur Tinctu-
 rae Opii camphoratae uncia una. —
 Gabe, eine halbe bis ganze Unze täglich
 vier Mal.

Potio diuretica. (Ra.)

- ℞. Aquae Valerianae uncias quatuor,

Aquae Menthae piperitae . . . unciam unam.

Aetheris nitrici drachmam unam.
Laudani liquidum . . . semidrachmam.
Mellis scillitici drachmas quatuor.
Syrupi Quinque Radicum . . . unciam unam.

St nach dem decoctam duntrefficum Hufelandi getrobet.

Mel Scillae s. scilliticum compositum, Syrupus Scillae compositus. (Am. B* C E.)

R. Scillae siccatae et confusae, Radicis Polygalae Virginicae, singularium unciis quatuor, Aquae . . . octarios quatuor.

Coque blando igne ad dimidiae partis aquae consumptionem, cola et adde Mellis despumati . . . libras duas.

Coque denuo ad octariorum trium remanentiam et in hujus syrupi unciis quatuor dissolve

Parti stibati . . . granum unum.
Retzen, auflösend, karntreibend, bei schleimiger Engbrüstigkeit gerühmt. — Gebe von zehn Tropfen bis zu einem Kaffeelöffel und mehr, alle Viertel, halbe oder ganze Stunden, je nach Alter des Kranken und nach der Indication.

Syrupus Scillae compositus. (Fenn. O. Supp. Sp. Vm.)

R. Scillae siccatae . . . unciam unam.
Zingiberis . . . semunciam.
Herbae siccatae Hyssopi . . . unciis duas.

Aquae Menthae piperitae . . . libras duas.

Macera per horas viginti quatuor in vase clauso, cola exprimendo et liquori sepositione depurato adde

Sacchari albi . . . libras tres.

Coque parumper. (Fenn. Succ. Sp.)
O. loco aquae menthae illam Hyssopi indicat; — Vm. Zingiberis partem unam, Scillae duas, Hyssopi quatuor, Aquae viginti, infusionem in balneo aquae et Sacchari partes triginta sex.

B. Xuzgug butch Wein.

Vinum Scillae s. Scillae mariumae s. scilliticum. (Am. B* Ful. Gal. GalM. Ham. Li. Lus. RC. Sar. Succ. Wür. Au. Ca. Fi. Pie. Sâ. T. Vm.)

R. Scillae siccatae . . . unciam unam.
Vini Malacensis . . . libram unam.
Maçera per horas duodecim, cola ac filtra. (Gal.)

Lus. Scillae unciam unam et Vini libras duas; — Sar. Scillae semunciam et Vini libras duas.

T. Squamarum Scillae unciam unam;

Vini albi generosi unciis sedecim, Spiritus Vini 36 unciis tres, macerationem per octo dies.

R. Scillae conoise drachmam unam.
Corticis Aurantiorum . . . unciam unam.

Vini albi . . . libras duas.
Digere per horas viginti quatuor et cola. (Ham.)

R. Scillae semunciam, Corticis drachmam unam, Vini albi unciis novem, infusionem frigidam per triduum.

R. Scillae recentis . . . drachmas sex.
Cinnamomi . . . drachmas tres.
Vini . . . sesquilibram.
Infunde frigide per horas duodecim et cola. (Wür.)

Vm. Scillae partem unam, Cinnamomi partem dimidiam, Vini Maderani partes quadraginta octo et octo dies macerationis,

R. Scillae recentis . . . semunciam.
Zingiberis . . . drachmam unam.
Alcoholis (0,9817) . . . unciis duas.
Vini albi . . . libras duas.

Post tres dies cola. (Am.)
Succ. Scillae unciam unam, Zingiberis drachmam unam et Vini albi libras duas; — Au. Scillae drachmam unam, Calami drachmas duas et Vini libram unam.

R. Scillae . . . unciam unam.
Corticis Aurantiorum, . . .
Radicis Calami, . . .
singularum drachmas duas.

Vini albi . . . sesquilibram.
Post tres dies digestionis adde Oxymellis scillitici drachmas duas.

Misce bene. (Ca. Pie.)
RC. Corticis et Radicis, singularum drachmam unam, Vini albi libram unam, Oxymellis scillitici unciam unam, caeterum ut antea.

R. Scillae siccatae, Baccarum Juniperi, . . . singularum drachmam unam.
Radicis Calami . . . drachmas duas.
Vini albi . . . libram unam.

Post tres dies macerationis cola. (B* Ful.)

Li. Vini albi unciam unam, Scillae grana quinque, Baccarum Juniperi scrupulos duos et Calami grana decem.

R. Scillae . . . drachmam unam.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Cardamomi minoris semidrachmam.
Vini albi . . . semilibram.

Digere blando calore per tres dies. (B*)

R. Scillae, Cardamomi minoris, . . . singularum partem unam.
Baccarum Juniperi,

Semina Dauti,
singulorum partes duas.

Vini Maderani partes triginta duas.
Post plures dies frigidae macerationis cola leviter exprimendo et filtra.
(Pm.)

R. Tincturae Scillae grana viginti.
Vini albi unciam unam.

Misce. (GalM.)
Reizend, zuweilen Ekel, selbst Brechen
erregend. — Gabe, zwei oder drei Löffel
täglic.

Vinum diureticum amarum s. amarum
scilliticum compositum, Infusum
scilliticum vinorum compositum, (Gal.
Ca. Ra. Sa.)

R. Scillae drachmas sex.
Cinnamomi,
Corticis Winteri, singulorum drachmas
quatuor.

Radice Inulae drachmas unam.
Vini libram unam.

Post sufficientem extractionem cola.
(Sa.)

R. Squamarum Scillae,
Radice Vinetoxici,
singulorum semunciam.

Corticis Chinae,
— Winteri,
— Citri,
singulorum uncias duas.

Stipitem Angelicae Bohemicae
semunciam.

Foliorum Absinthii,
— Melissaе,
singulorum unciam unam.

Baccarum Juniperi,
Macidis, singulorum semunciam.

Vini albi generosi libras octo.

Digere cortices, radices, scillam et
baccas integras in vino, leni calore per
dies quatuor, cola deinde, leviter ex-
primendo et filtra. (Gal.)

R. Scillae siccatæ,
Radice Vinetoxici,
— Angelicae,
Chinae pulveratae,
singulorum unciam unam.

Corticis Citri,
— Winteri,
singulorum uncias duas.

Baccarum Juniperi,
Macidis, singulorum drachmas duas.

Foliorum siccorum Absinthii,
— Melissaе,
singulorum semidrachmam.

Alcoholis uncias duas.
Vini albi libras quatuor.

Digere in balneo arenae per horas
viginti quatuor, subinde agitando, cola
exprimendo ac filtra. (Ca)

R. Corticis Winteri,
Chinae,
Cinnamomi,
singulorum unciam unam.

Radice Angelicae,
Squamarum Scillae,
Baccarum Juniperi,
Macidis, singulorum uncias duas.

Foliorum siccorum Absinthii,
— Melissaе,
singulorum manipulos duos.

Vini albi libras duas.

Macera per horas viginti quatuor.
(Ra.)

Leicht, in Fällen, wo Reizung des Ma-
gens nöthig ist und bei sogenannten pass-
siven Wasserflüchten empfohlen. — Gabe,
eine bis vier Unzen täglich.

Infusum Kali carbonici cum Scilla vi-
nosum, Vinum Scillae alcalinum, (Au.
T.)

R. Kali subcarbonici semunciam
Scillae scrupulum unum.
Cinnamomi drachmas duas.

Vini albi uncias 950.

Infunde per horas duodecim et cola,
— Gabe, ein oder zwei Löffel alle zwei
oder drei Stunden.

T. Zedoariae drachmas duas, Squa-
marum Scillae, Rhei, Baccarum Jun-
iperi, singulorum drachmam unam,
Cinnamomi drachmas tres, Kali sub-
carbonici sesquidrachmam et Vini albi
austeri et vetusti uncias triginta duas.

G. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Scillae s. Scillae maritimaе.
(An. B. D. Du. Ed. GalM. Han.
HassP. Lon. LonN. RC. C. T. Pm.)

R. Squamarum Scillae siccatæ
partem unam.

Alcoholis (22°) partes quatuor.
Digere per dies sex et cola. (Gal.
GalM.)

B. Lon. et LonN. Scillae uncias
quatuor, Alcoholis (0,990) octarios
duos et quatuordecim dies infusionis;

— Du. HassP. Scillae uncias quatuor,
Alcoholis (0,990) Spirit. Vini rectificati
HassP.) libras duas et octo dies infu-
sionis (tinctura expressa unciarum vi-
ginti pondere par sit HassP.); — Ed.
Scillae uncias duas, Alcoholis (0,995)

sedecim et octo dies infusionis; —
Pm. Scillae partem unam, et sex Aquae
Vitae; — D. Scillae uncias sex et duas
libras Aquae Vitae; — Han. Scillae
uncias quinque et Aquae Vitae libras
duas; — O. Scillae uncias quinque et
Alcoholis (0,990) octarios duos; — RC.
Scillae uncias duas, Alcoholis distilli Sa-
brum unam et septem dies digerit onis;

— T. Scillae unciam unam, Alcoholis 26° B. octo, digestionem per 12 vel 15 dies.

℞. Scillae recentis contusae unciās sex.
 Alcoholis (36°) . . . unciās octo.
 Post quatuor dies digestionis cola exprimendo et residuo infunde Alcoholis (36°) . . . unciās duas.
 Digere iterum blande calore et cola, colaturas mixtas filtra. (An.)

Reizend, harntreibend, besonders bei Wasserfuchtyen gebraucht. — Gabe, zehn bis zwanzig Tropfen in Emulsion oder in einem schleimigen Wasser.

Mixtura anticatarrhalis. (Ca.)

℞. Elixir pargorici unciās quinque.
 Tincturae Scillae unciam unam.
 Gabe, ein Kaffeelöffel, Morgens und Abends.

Mixtura diuretica. (E.)

℞. Tincturae Scillae drachmas duas.
 Aetheris nitrici unciam unam.
 Gabe, ein Kaffeelöffel, fünf oder sechs Mal täglich, in Wachholdertheer.

Hierher gehört auch die von Au. sehr unpassend sogenannte Tinctura Scillae.

℞. Scillae sesquiniunciam.
 Aetheris muriatici,
 Spiritus Juniperi, singularorum semilibram.
 Aquae quantum sufficit.
 Destillent libras sex. — Gabe, zehn bis dreißig Tropfen.

Tinctura Scillae aromatica. (Succ.)

℞. Scillae siccatae unciam unam.
 Cinnamomi pulverati drachmas duas.
 Alcoholis Aqua diluti semilibram.
 Infunde per tres dies ac filtra.

Man könnte statt des Zimmt auch das Gelbe der Pomeranzenschale nehmen und die Tinctur auch auf der Stelle bereiten, indem man zu der einfachen tinct. Scillae eine größere oder geringere Menge tinct. Cort. Aurant. setzt. Die tinct. Scill. aromat. verdient den Vorzug vor der einfachen, sie schmeckt weniger unangenehm und ist vielleicht auch nicht so reizend.

Tinctura Scillae composita. (Vm.)

℞. Aceti scillitici partes tres.
 Tincturae Corticum Aurantium partem unam cum dimidia.
 Extracti Trifolii partem unam.
 Post plures dies macerationis cola per pannum.

Tinctura Scillae kalina. (B* Bor4. Fenn. Fer. Hass. Li. Wir. Huf. Sw*. Vm.)

℞. Scillae pulveratae,

Kali subcarbonici, singularorum unciam unam.

Tritura simul in mortario et adde Alcoholis unciās quatuor.
 Post has sex digestionis cola leviter exprimendo. (Hass.)

B*. Bor4. et Huf. Scillae unciās tres (duas Bor4.), Potassae causticae drachmas duas, Alcoholis libram unam et tres dies digestionis; — Li. Scillae, Kali subcarbonici, singularorum unciam unam et octo unciās Alcoholis.

℞. Scillae siccatae unciam unam.
 Cinnamomi drachmas duas.
 Solutionis Potassae causticae drachmam unam.

Alcoholis semilibram.
 Digere per tres dies et filtra. (Fenn.)
 Vm. Potassae causticae partem unam, Cinnamomi duas, Scillae octo et Aquae Vitae quadraginta octo.

℞. Kali subcarbonici semunciā.
 Aceti scillitici unciās duodecim.
 Evaporent leni igne ad mellis consistentiam, tum residuum digere cum

Alcoholis unciās sex.
 Post aliquot dies filtra. (Wir.)
 Sw*. Aceti scillitici unciās octodecim et duodecim Alcoholis.

℞. Scillae, Acetatis Potassae, singularorum unciam unam.
 Alcoholis unciās sex.
 Post tres dies filtra. (Fer.)

Reizend, eins der wirksamsten auflösenden und harntreibenden Mittel; bei Wasserfuchtyen und Asthma empfohlen. — Man fängt mit dreißig Tropfen an und steigt alle zwei oder drei Stunden um fünf, bis der Kranke hundert und mehr nimmt.

Potio diuretica. (E.)

℞. Subcarbonatis Potassae drachmam unam.
 Succu Citri quantum sufficit ad dissolutionem adde Tincturae Scillae semunciā.
 — Opit guttas triginta.
 Aquae Cinnamomi unciās quatuor.
 Gabe, alle zwei oder drei Stunden ein Eßfel.

Elixir pectorale Wedelm. (B*. Br. Li. Wir. Ca. Huf. Sp. Vm.)

℞. Radicis Scillae,
 — Iridis Florentinae,
 — Inulae, singularorum unciam unam.
 — Liquiritiae semunciā.
 Ligni Santali rubri unciam unam.
 Herbae Roris Solis sesquiniunciam.
 Seminum Anisi semunciā.
 Benzoes drachmas sex.

Myrrhae semunciam.
 Gummi Ammoniaci drachmas duas.
 Croci drachmas tres.
 Aquae Vitae libras duas.
 Digere seorsim gummi ammoniacum, myrrham et benzoën et post sufficientem extractionem tincturam cum ea reliquarum substantiarum commisce. (Br. Wir.)
 B. Rorellam omittit; — Sp. addit Radicis Althaeae unciam unam et Benzoës concisae drachmas quatuor.
 R. Radicis Scillae,
 — Iridis Florentinae,
 — Inulae,
 singularum unciam unam.
 Benzoës,
 Myrrhae,
 Anisi,
 Succo Liquiritiae,
 Gummi Ammoniaci,
 singularum semunciam.
 Croci drachmas tres.
 Alcoholis libram unam.
 Post sufficientem digestionem cola. (Huf.)
 Elisir pectorale anglicum. (Ca.)
 R. Scillae,
 Radicis Inulae,
 Iridis Florentinae, singularum uncias tres et drachmam unam.
 Benzoës drachmas duas.
 Liquiritiae,
 Anisi,
 Myrrhae, singularum drachmam unam et grana octodecim.
 Gummi Ammoniaci scrupulos duos.
 Croci grana septemdecim.
 Aquae Vitae (12°) libram unam et uncias sex.
 Macera per dies quatuordecim, subinde agitando et filtra.
 R. Croci concisi scrupulos duos.
 Aquae Vitae uncias triginta duas.
 Infunde per dies duos et adde Radicis Liquiritiae,
 Seminum Anisi,
 singularum semunciam.
 Radicis Inulae,
 — Iridis Florentinae,
 singularum unciam unam.
 Gummi Ammoniaci drachmas duas.
 Myrrhae semunciam.
 Infunde iterum per dies duos et adde Scillae unciam unam.
 Benzoës drachmas tres.
 Digere per aliquot tempus et filtra. (Vni.)

R. Radicis Inulae,
 — Iridis Florentinae,
 — Scillae,
 singularum semunciam.
 — Liquiritiae,
 Seminum Anisi,
 Florum Rhoeados,
 singularum drachmas duas.
 Alcoholis uncias quatuordecim.
 Digere blando calore per dies quatuor. Praeterea digere in Alcoholis unciantibus per eandem temporis decursum Gummi Ammoniaci drachmam unam.
 Myrrhae drachmas duas.
 Benzoës drachmas tres.
 Cola leviter exprimendo et colaturam utramque commisce. (Li.)
 Krizend, bei Asthma, Catarrhen, Husten und Heiserkeit empfohlen. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen.
 D. Auszug durch Weineffig.
 Acetum Scillae s. scilliticum, Acidum aceticum scilliticum s. cum Scilla maritima. (A. Am. Ans. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HasP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. C. Fl. Pid. Sp. Su. T. Vm.)
 R. Scillae praeparatae et minutim concisae partem unam.
 Aceti boni partes duodecim.
 Digere blando calore per dies septem, cola fortiter exprimendo et filtra. (Bor. BorC. D. Han. O. Sax. Suec. Br. Sp.)
 Br. Scillae partem unam cum dimidia, Aceti duodecim, et horas quadraginta octo infusionis; — Pal. Scillae unam, Aceti novem et dies quadraginta infusionis; — DD. Sar. et Wir. Scillae unam, Aceti octo et quatuordecim dies infusionis; — A. Hass. Li. R. et Pid. Scillae unam, Aceti sex et tres dies digestionis; — Bor4. Scillae siccatae uncias duas, Aceti destillati quantum satis ut post macerationem per triduum cblatura post lenem expressionem sit unciam octodecim.
 R. Scillae concisae partem unam.
 Aceti albi ferventis partes undecim.
 Acidi acetici partem unam.
 Macera per dies octo, cola exprimendo et post tempus aliquot decantha. (Fenn.)
 GalM. Scillae partes octo, Aceti rubri nonaginta duas, Acidi acetici (10°) unam et quatuordecim dies infusionis.
 R. Scillae concisae uncias duas.
 Aceti uncias duodecim.

Digese blando calore, per dies octo, in vase tecto, cola exprimendo et colaturae adde

Alcoholis . . . unciam unam,
Sepone, decantha et serva. (B. Ba. Bel.)

HassP. Scillae siccatae et concisae uncias duas, Aceti Vini libras duas, octo dierum macerationem, Spiritus rectificatissimi sesquiunciam; — Ams. Scillae semilibram, Aceti libras quatuor, viginti quatuor horas macerationis blando calore et ad colaturam partem duodecimam Alcoholis (0,907); — Wür. Scillae semilibram, Aceti libras quatuor, quatuor dies digestionis leni calore et tres uncias Alcoholis; — R.C. Scillae siccatae et contusae drachmas duas, Aceti libras duas cum dimidia, macerationem per quatrimum et Alcoholis uncias tres; — Lus. Scillae libram unam, Aceti libras sex, sex dies macerationis, levem ebullitionem et Alcoholis semilibram; — His. Scillae libram unam, Aceti sex, viginti quatuor horas digestionis blando calore et tres uncias Alcoholis; — Gal. Scillae siccatae semilibram, Aceti rubri libras sex, Alcoholis (22°) unciam unam et quatuordecim dies macerationis; — Pol. Scillae unciam unam, Aceti libram unam et Alcoholis sesquiunciam; — Sw. Scillae libram unam, Aceti libras octo, duos vel tres dies digestionis blando calore et Aquae Vitae uncias octo; — Vm. Scillae partem unam, quatuor Aceti et Aquae Vitae duas; vel Scillae unam, Aceti duodecim, unam Aquae Vitae et octo dies frigidae macerationis; — Am. Du. et. C. Scillae semilibram, Aceti Vini octarios tres et Alcoholis (0,840) uncias quatuor; — Lon. LonN. Scillae libram unam, Aceti aceticum octarios sex, macerationem per horas 24 et Alcoholis (0,980) semioctarium; — Ed. Scillae unciam unam, Aceti uncias quindecim et Alcoholis (0,885) sesquiunciam; — Gen. Scillae uncias quatuor, Aceti libras duas, Aquae Vitae uncias tres; — Ful. Scillae uncias quatuor, Aceti libras quatuor et Aquae Vitae uncias duas; — Fer. Scillae libram unam, Aceti libras sex et Alcoholis uncias tres; — Fi. Scillae uncias sex, Aceti fortis libras quatuor, Alcoholis 24° uncias duas; — T. Squamarum interiorum siocatarum uncias duodecim, Aceti communis libras octo, Spiritus Vini 84° B. uncias quatuor, et Aceti radicalis pondus aequale, expose soli vel balnei vaporis calori in vase clauso per dies quindecim et filtra

R. Radicali Scillae recentis
libram unam,
Aceti gelu concentrati
sesquilibrum.

Digere per septimanam in vase tecto, saepius agitando, cola cum expressione et residuo infunde

Aceti gelu concentrati semilibram.
Exprime, sepone colaturas ambas commixtas, filtra et adde
Alcoholis (38°) . . . uncias duas.

Misce bene. (An.)
Reizend, besonders bei chronischen sogenannten schleimigen Lungenäbeln und bei Wasserfuchten angewendet. Man benutzt diesen Essig auch in Sargelwasser, bei Entzündung der Mandeln und in gewissen Fällen von beschwerlichem Schlingen. — Gabe, von fünf Tropfen bis zu einer Drachme, täglich zwei Mal, in irgend einem aromatischen Wasser oder in einer Emulsion mit Ammoniakgummi.

Syrupus Scillae acetosus, Oxysaccharum scilliticum. (Am. B. Br. Ed. Han. Lon. RC. Wir. Wir. WW. Br. C. Sw.)

R. Aceti scillitici . . . libras duas,
Sacchari contusi . . . libras tres.
Dissolve blandi caloris ope. (B. Lon.)
Am. Ed. et C. Aceti partes quatuor et septem Sacchari; — Wür. Aceti unam cum dimidia, Sacchari tres cum dimidia; — Br. RC. Aceti duas et Sacchari tres cum dimidia.

R. Aceti scillitici . . . sesquilibrum.
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum unciam unam.

Digere per tres dies, cola et adde
Sacchari albi . . . uncias triginta.
Ebulliant semel et colentur. (Br. Han. Wir.)

R. Aceti scillitici . . . semilibram.
Syrupi Cinnamomi,
— Zingiberis,
singulorum libram unam.

Misce. (Sw.)
Potio expectorans. (E.)

R. Syrupi Scillae . . . semunciam.
Tincturae Opii camphoratae
drachmas duas.
Vini stibiati . . . drachmam unam.
Gummi Arabici semidrachmam.
Aquae uncias duas.
Gabe, ein Kaffeestoff alle Stunden oder zwei Stunden. — Dieser Trank ist besonders für Kinder.

Mel Scillae acetatum, Oxymel scilliticum, Mel Aceti Scillae s. Scillae maritimae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorG. Bor4. Br. D. DD. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GallM. Gen Han.

Hass. HassP. His. Li. Lon. Lond. Lat. O. Pal. Pfl. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Br. C. Fi. Pfl. Sp. Sw. T.)

℞. Aceti scillitici . . . partem unam.
Mellis albi . . . partes duas.

Coque ad consistentiam syrupi. (A. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. His. Li. O. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Br. Fi. Pfl. Sp. Sw. T.)

Lus. et Pal. Aceti partes duas et Mellis tres; — Am. Du. Lon. Lond. et C. Aceti octavos duos et Mellis libras tres; — Ams. et Vm. Aceti partem unam et tres Mellis; — DD. Aceti et Mellis partes aequales; — D. Mellis despumati uncias triginta ad sex vel octo consumptas et Aceti duodecim; — Gen. HassP. Aceti partem unam et quatuor Mellis (HassP. Acetum adhibitum e Squamarum Scillae siccatarum uncias quatuor cum diuidia et Aceti Vini libris duabus tepida per dies sex in vitro clauso maceratione, colando filtrandoque paratur).

Im Journal de pharmacie findet sich von einem Unbekannten folgende Formel:

℞. Scillae siccatae . . . libram unam et uncias duas.
Aceti rufi . . . libras sex.
Alcoholis (36°) . . . uncias duas.
Macera per mensem, cola ac filtra; tunc balnei aquae ope in hujus aceti scillitici libra una et uncia una solve Mellis albi libras quatuor.

Effetweise, aber häufiger in Potionen zu einer bis vier Drachmen.

Looch pectorale, *Linctus expectorans.* (Li. Fi. Pic. Sw.)

℞. Oxymellis scillitici . . . semunciam ad unciam unam.
• Syrupi Althaeae . . . unciam unam.

Misce. (Sp.)

℞. Oxymellis scillitici,
Syrupi Althaeae,
Mucilaginis Gummi Arabici,
singulorum partes aequales.

Misce. (Li.)

℞. Oxymellis scillitici . . . semunciam.
Syrupi balsamici . . . unciam unam.
Olei Amygdalarum dulcium . . . sesquinoiam.

Misce. (Sw.)

℞. Mellis optimi . . . uncias sex.
Syrupi Polygalae Virginicae,
— scillitici,
singulorum unciam unam.

Florum Sulphuris,

Acidi benzoici,

singulorum scrupulum unum.

Ipecacuanhae pulveratae grana sex.

Misce sedulo. (Fi.)

• Affectöfittelse.

Gargarisma e Scilla. s. scillitica (Sw.)

℞. Oxymellis scillitici unciam unam.
Aquaе Cinnamomi uncias decem.

Potio ad catarrhum s. antieatarrhalis. (Sm.)

℞. Radicis Zedoariae . . . drachmam unam.

Camphorosmae . . . pugillum unum.

Aquaе . . . uncias octo.

Decoquo ad quingue remanentiam et colaturae refrigeratae adde

Salis Ammoniaci . . . grana sex.

Spiritus Nitri dulcis . . . guttas sex.

Oxymellis scillitici unciam unam.

Xuf vier Rd, alle zwei Stunden, zu nehmen.

Potio scillitica acidulata s. diuretica. (GalM. B. Ca. Ra. Sa.)

℞. Oxymellis scillitici . . . semunciam.

Aquaе Menthae . . . unciam unam.

— trisma Nucam . . . uncias quatuor.

Misce. (Ca.)

℞. Oxymellis scillitici . . . semunciam.

Infusi Hyssopi . . . uncias quatuor.

Spiritus Nitri dulcis . . . semidrachmam.

Misce. (GalM.)

℞. Oxymellis scillitici . . . sesquidrachmam.

Aquaе Cinnamomi . . . drachmas sex.

Spiritus Lavandulae . . . drachmam unam.

Subcarbonatis Potassae . . . grana decem.

Misce sedulo. (Ca.)

℞. Decocti Quinque Radicum . . . uncias tres.

Aquaе Florum Aurantium . . . semunciam.

Oxymellis scillitici . . . drachmas duas.

Syrupi Sacchari . . . unciam unam.

Laudani liquidi,
Tincturae Castorei,
— Moschi,
singulorum guttas sex.

Spiritus Nitri dulcis,
Aetheris sulphurici,
singulorum guttas decem.

Misce. (Ra.)

℞. Baccarum Juniperi . . . semunciam.

Aquaе bullientis quantum sufficit

ut octo unciae infusi obtineantur. Colaturae adde

Aetheris sulphurici . . . guttas viginti.

Oxymellis scillitici . . . semunciam.

Misce. (B.)

℞. Baccarum Juniperi . . . unciam unam.

Aquaе . . . quantum sufficit

ad infusi uncias sex; colaturae adde

Acetatis Potassae . . . drachmas duas.

Spiritus Fuliginis . . . guttas triginta.

- Liquoris Cornu Cervi tinctum**
drachmas duas.
- ℞. **Oxymellis scillitici** drachmam unam,
Misc. (B.)
Emulsionis Amygdalarum amara-
rum libram unam.
Nitri drachmas duas.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misc. (B.)
- ℞. **Decocti Graminis** libras duas.
Liquoris Hoffmanni guttas viginti.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misc. (B.)
Eßlösweiß.
- Bradyum diureticum. (Pie.)*
- ℞. **Radicis Taraxaci unciam unam.**
— **Liquiritiae** semunciam.
Millepedes no. 80.
Foliorum Taraxaci
manipulum dimidium.
— **Polygalae,**
Camphorae
singulorum pugillum unum.
Oxymellis scillitici semunciam.
Kermes mineralis granum unum.
Miscera pectoralis. (S. Ca. Sa.)
- ℞. **Oxymellis scillitici,**
Spiritus Piperis Jamaicae,
singulorum unciam unam.
Aquae Menthae uncias duas.
Misc. (Sa.)
- ℞. **Decocti Hordei** semilibram.
Aquae Hyssopi uncias quatuor.
Oxymellis scillitici uncias tres.
Aceti scillitici drachmas sex.
Sulphatis Sodae drachmam unam.
Misc. bene. (Ca.)
- ℞. **Gummi Ammoniaci**
drachmam unam.
Aceti scillitici uncias sex.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misc. (Ca.)
- ℞. **Radicis Polygalae Virginicae,**
Aquae quantum sufficit
ut decocti unciae sex obtineantur, qua-
rum colaturae adde
Lactis ammoniacalis
drachmam unam.
Camphorae semidrachmam.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misc. (B.)
- Gabe, eine Unze alle halbe Stunden.**
Julep s. Julapium scilliticum. (Ra.)
- ℞. **Specierum bechicorum,**
Gummi Arabici,
singulorum grana viginti.
Syrupi Sacchari,
Oxymellis scillitici,
singulorum unciam unam.
Aquae uncias quatuor.
Potio incisiva s. gummosa scillitica.
(GalM. E. Ra.)
- ℞. **Portionis gummosae uncias quatuor.**

- Oxymellis scillitici** semunciam.
Misc. (Ra.)
- ℞. **Gummi Ammoniaci pulverati**
partem dimidiam.
Tere sensim addendo.
Aceti scillitici partes triginta.
Infusi Hyssopi partes centum.
Misc. bene. (GalM.)
- ℞. **Gummi Ammoniaci**
drachmam unam.
Aquae uncias quatuor.
Oxymellis scillitici uncias duas.
Tincturae Opii camphoratae
semunciam.
Gabe, ein Eßel alle zwei Stunden. (E.)
Syrupus pectoralis. (Ca.)
- ℞. **Oxymellis scillitici** sesquinci-
am.
Syrupi Ipecacuanhae,
— **Discodion,**
singulorum uncias duas.
— **Florum Aurantiorum**
semunciam.
Misc. — **Gabe, alle Stunden zwei**
Eßel in einer Tasse Brustthee. — **Ge-**
gen Reuchhusten.
- E. Xuzug durch Del.**
Oleum Bryoniae compositum. (His.)
- ℞. **Radicis recentis Bryoniae,**
— **Gucumeris asinini,**
singulorum libram unam.
— **Scillae,**
— **Iridis Germanicae,**
— **Ebuli,**
singulorum semilibram.
Olei Olivarum libras quatuor.
Coque lente ad consumptionem hu-
midi et cola.
- Unguentum Bryoniae s. Agrippae. (His.**
Sar. Wix.)
- ℞. **Succi Bryoniae** libras tres.
— **Elaterii** libras duas.
Scillae,
Radicis Iridis Germanicae,
— **Filicis maris,**
singulorum uncias sex.
Macera per horas duodecim, tunc
coque, cola exprimendo, et ad extracti
consistentiam evaporatis adde
Cerae albae uncias quindecim.
Olei Mucilaginis libras quatuor.
Misc. bene. (Sar.)
- ℞. **Radicis Bryoniae** libras duas.
— **Cucumeris asinini**
libram unam.
— **Ebuli,**
— **Filicis,**
— **Iridis Germanicae,**
singulorum uncias tres.
Scillae semilibram.
Tribulorum aquaticorum
uncias duas.
Olei Olivarum libras sex.

Post dies octo macerationis coque,
exprime et adde

Cerae flavae . . . libram unam.

Liqua in balneo aquae. (Wir.)

℞. Olei Bryoniae compositi . . .

libras quatuor.

Cerae albae . . . libram unam.

Liqua lente. (His.)

Ein nicht sehr starkes Reizmittel, jedoch,
wie man glaubt, nicht ganz unwirksam;
auflösend, schmelzend, gegen Wasserfucht.

Scolopendrium.

Scolopendrium officinale, Sm.; Hirschwurze; Sclopendre, Langue de cerf, Langue de boeuf (*Gal.*); Hierstongue (*Ang.*); Gelenj gazyk, Psany trunk, Cetarak (*B.*); Hiortetongue (*D.*); Lengua de cervo (*His.*); Hiertstong (*Bel.*); Lingua di cervo (*I.*); Jalenj szczaw (*Pol.*); Lingua cervina (*Lus.*); Hiorttunga (*Succ.*).

Br. Fer. Gal. Galm. Gen. His. Wir.
Wür. Be. Br. M. Sp. Z.

℥ (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine in Süd-europäische Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 47.)

Man wendet das Kraut (herba Scolopendrii s. Linguae cervinae s. Phyllitidis s. Lonchitidis) an; es besteht aus langen, am untern Theile herzförmigen Blättern mit behaarten Stielen. Es hat einen abstringirenden Geschmack.

SCORZONERA.

In den Pharmacopöen werden zwei Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Scorzonera humilis*, L.; Walscorzonere, Nattermilch; Scorzonere d'Allemagne ou de Bohème (*Gal.*).

Ams. Bor. Br. Fer. Ful. Gal. Han. Li. O. Wir. Wür. Fi. M.

℥ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, J.) Eine im nördlichen Europa wachsende Pflanze. (Jacq. Austr. VI. t. 36.)

Man wendet die Wurzel (radix Scorzonerae latifoliae sinuatae s. Serpentariae) an; sie ist geringelt, dick, holzig, außen schwarz, innen weiß, und enthält, im frischen Zustande, einen Milchsaft. Sie hat einen etwas bitteren und herben Geschmack.

2) *Scorzonera Hispanica*, L.; Garten-scorzonere, Schlangengras, Schwarzwurze, Nattergras; Scorzonere d'Espagne, Sal-sifis noir (*Gal.*); Garden scorzonera (*Ang.*); Hadj mordowy koren (*B.*); Skorzonera (*D.*); Escorzonera (*His.*);

Spanische Skorzonere (*Bel.*); Skorzonera (*I.*); Escorzoneira (*Lus.*); Skorzonera (*Succ.*).

Bor. Fer. Gal. Han. His. O. Sax. Be. Br. Fi. Sp. Z.

℥ Eine Pflanze des gemäßigten und südlichen Europa's, welche in Küchengärten gezogen wird. (*Blackw.* t. 406. *Plenck* t. 592. *Düss. off. Pl.* I. t. 7. *Zorn* Ic. pl. t. 405.)

Man wendet die Wurzel (radix Scorzonerae) an; sie ist lang, fingerdick, außen schwarz, innen weiß, mit ringförmigen Runzeln besetzt, und mit einem Milchsaft angefüllt, welcher ausfließt, wenn man in sie einschneidet. Man verkauft sie, abgeschabt und getrocknet, in länglichen, bräunlichrothgelben Stücken. Sie hat keinen Geruch; der Geschmack ist im frischen Zustande süßlich, bitter und mehlig, getrocknet bloß schlemmig.

Reizend, harntreibend.

Extractum Scorzonerae. (Br.)

℞. Radicis Scorzonerae libram unam.

Aquae fontanae . . . libras sex.

Macera per dies quatuor in loco calido tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam consume.

Decoctum Scorzonerae bezoardicum, *Bezoardicum Curvi incompletum*. (His.)

℞. Radicis Scorzonerae unciam unam.

Semini Citri contusorum

drachmas duas.

Aquae . . . libras sex.

Decoque ad libram quatuor remanentiam, cola et adde

Pulveris bezoardici Chinae

semunciam.

Mellis Sambuci . . . uncias tres.

Gabe, vier Unzen.

Decoctum Scorzonerae bezoardicum solutivum, *Bezoardicum completum s. purgans Curvi*. (E.)

℞. Decocti Scorzonerae bezoardici libras quatuor.

Foliorum Sennae mundatorum

semunciam.

Coque lente, cola et colaturae adde

Syrupi Rosarum pallidarum

uncias sex.

Pulveris bezoardici Chinae

semunciam.

Purgirent. — Gabe, vier Unzen.

Scrophularia.

In den Pharmacopöen finden sich zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Scrophularia aquatica*, L.; Wasser-

brannwurz, Wassertröpfwurz; Scrofulaire aquatique (Gal.); Water figwort (Ang.); Escrofularia aquatica (His.); Water speenkruid (Bel.); Scrofularia aquatica (L.); Escrofularia dos rios (Lus.).
Gal. Gen. His. Wir. M.

♂ (Didynamia Angiospermia, L.; Scrophulariae, J.) Eine Pflanze, welche in ganz Europa an dem Ufer von Bächen wächst. (Blackw. t. 86. Hayne V. t. 36. Fl. méd. VI. 324.)

Man wendet das Kraut (herba Scrophulariae aquaticae s. Betonicae aquaticae s. Ficariae s. Castrangulae) an; es besteht aus einem glatten, vierseitigen, ästigen Stängel mit entgegengesetzten, gestielten, eirunden, fast herzförmigen, gekerbten, grünlich, glatten Blättern und hat einen unangenehmen und widerlichen Geruch und einen bitteren, etwas scharfen, ekelhaften Geschmack.

2) *Scrophularia nodosa*, L.; Knotige, gemeine Braunwurz, Felsgrauwurz, Knotenwurz; Scrofulaire nouzeuse (Gal.); Knotty rooted figwort (Ang.); Swinsky neb Kyticnjkowy koren, Rozchodnik, Aneb prutznik (B.); Millemorbria, Ferraria, Castrangola (I.); Fredewnik (Pol.).

Br. Du. Fer. Gen. H's. Wir. Wür. Be. Br. C. Fi. M. Sp. Z.

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Scrophulariae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 37. Plenck t. 504. Hayne V. t. 35. Zorn Ic. pl. t. 28.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Scrophulariae s. Scrophulariae foetidae s. vulgaris) ist dick, weiß, knotig, von unangenehmem Geruch und bitterem, etwas scharfem Geschmack, welcher durch Trocknen sich etwas verliert.

Das Kraut besteht aus einem knotigen Stängel mit ganzen, eirunden, dreilappigen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen bitteren, ekelhaften Geschmack.

Oleum Scrophulariae. (Vm.)

R. Herbae et Radicis Scrophulariae recentium . . . partes tres.
Olei Olivarum . . . partem unam.
Infunde et cola exprimendo.

Secale.

Secale cereale, L.; Roggen; Seigle commuu (Gal.); Rye (Ang.); Rug (L.); Genteno (His.); Rog (Bel.); Segale (I.); Rez (Pol.); Soitejo (Lus.); Raeg (Succ.).

Pharmacopoea universalis. II.

Ba. BorC. Bor4. Fer. Gal. Gen. His. R.C. Succ. Wür. Be. Br. G. M. Sp. Z.

⊙ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine Pflanze, welche ursprünglich in Creta und an den Ufern des Caspischen Meeres einheimisch seyn soll. (Plenck t. 46. Lam. III. t. 49. Blackw. Herb. t. 424. Bert. Bild. II. 15. f. 2.)

Man wendet den Samen (semen Secalis s. Frumentum) an; er ist länglich, walzig, etwas spitzig und röthlich und wird besonders als Mehl (farina) benugt.

Farinae resolventes. (Sp.)

R. Farinae secalitiae,
— triticeae,
— Hordei,
— Fabarum,
singularum partes aequales.
Misce exacte.

Pulvis absorbens pro usu externo. (B.)

R. Farinae Secalis uncias quatuor.
— Lupini . . . uncias octo.
Bei Rothlauf, Morgens und Abends die ergriffenen Theile damit zu bedecken.

An den Aehren einiger Getreidearten, besonders aber des Roggens, entwickelt sich eine Art Horn oder Sporn, welcher unter dem Namen

Secale cornutum; Mutterkorn; Ergot (Gal.); Spurred, horned rye (Ang.).

Am. Bor4. HassP. C.

bekannt ist. Es ist gewöhnlich krumm und langgestreckt, selten rundlich, zeigt meist drei stumpfe Ecken und Längsrinnen, und hat eine violette Farbe mit verschiedenen Schattirungen. Die innere Substanz ist schmutzigweiß und fest, zerbricht glatt und mit Geräusch; der Geruch ist, wenn das Mutterkorn frisch und in großer Menge vorhanden ist, unangenehm, der Geschmack etwas beißend und widerlich. Es wird bis einen und anderthalb Zoll lang und zwei bis drei Linien dick.

Nach Decandolle ist es eine Art Schwamm, Sclerotium Clavus (Mém. du Mus. 1816 t. XIV. fig. 8.), nach Andern, und mit größerer Wahrscheinlichkeit, eine bloße krankhafte Ausartung des Ovariums der damit behafteten Grasarten, welche, nach Martin Field, durch den Stich einer Fliege verursacht wird, die darin eine schwärzliche Flüssigkeit zurückläßt, aber ihre Eier nicht in die Stachwunde legt. Dr. Winkler (Geiger's Mag. 1826 Nov.) nimmt ebenfalls eine thierische Excretion, z. B. Honigthau, als Ursache an.

Es enthält, nach Bauquelin, einen gelbsärbenden, einen andern violetten Stoff, ein weißes Del, eine freie Säure, welche Phosphorsäure zu seyn scheint, freies Ammoniak und einen stickstoffhaltigen Stoff.

Ein Reizmittel, dessen Gebrauch schwere Zufälle, Starrkrampf, Brand der Glieder und den Tod hervorbringt. In kleinen Gaben scheint es Zusammenhang des Uterus zu bewirken. Auch hat man es bei schweren Niererkünften in Folge der Unthätigkeit dieses Organs, oder bei Mutterblutflüssen von Mangel an Ton desselben empfohlen. Nach Hall (vergl. v. Froriep's Notiz, v. Nat. u. Heilf. Nr. 322.) wirkt es durch Einsaugung in die Blutmasse und Langsamermachen der Circulation, wodurch das Blut unfähig wird, den Uterus und Fötus länger zu erhalten. — Gabe, zehn bis dreißig Gran in sechs Unzen Bechdel.

Infusum Secalis cornuti. (B*.)

℞. Secalis cornuti semidrachmam.
Aquaë bullientis uncias quatuor.
Infunde et cola. — Gabe, den dritten Theil, und nöthigen Falls nach vier und zwanzig Stunden diese Gabe zu wiederholen.

Decoctum Secalis cornuti. (B* Au.)

℞. Secalis cornuti . . . unciam unam.
Aquaë fontanæ . . . sesquioctarium.
Decoque ad octarii unius remanentiam — Von mehreren Practikern dem Aufguss vorgezogen. — Gabe, ein Edffel alle Viertelsstunden.

Potio partium accelerans s. ocytica.
(Pie.)

℞. Secalis cornuti pulverati drachmam unam.
Syrupi Sacchari . . . uncias tres.
Laudani liquidi . . . guttas viginti.
Essentiaë Bergamottaë quantum sufficit.

S e d u m.

In den Pharmacopöden werden drei Pflanzen dieses Namens angeführt:

1) *Sedum acre*, L.; Kagnetraublein, Mauerpfeffer, kleines Hauslauch; Vermiculaire brûlante, Poivre de muraille (Gal.); Wallpepper (Ang.); Netresk, Tucny muzjk neymensj (B.); Helleknop (D.); Siempreviva menor, Uvas de gato (His.); Sherp huislock (Bel.); Sedo acre o minore, Vermicolaria, Erba pignuola (I.); Vermicularia (Lus.); Motodile (R.); Fetknoppar, Haellegraes (Suéc.).

Ams. An. B. Ba, Bel. Br. Fer. Gal. Gen. His. Sax. Suéc. Wir. Be. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

2) *Decandria Pentagynia*, L.; Crassuleae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. IV. 209.)

Das Kraut (herba Sedi minoris s. Illecebræ vermicularis) besteht aus einem glatten Stängel mit zerstreuten, eirunden, fast dreieckigen, kurzen, fastigen, hellgrünen, nahe aneinander stehenden Blättern, hat keinen Geruch, aber einen scharfen, beißenden, pfefferartigen Geschmack, welcher sich beim Trocknen verliert.

Innerlich reizend, Brechen und Purgiren erregend, äußerlich Hautirrend.

2) *Sedum Rhodiola*, L.; Rosenwurz, Rhodifectwurz; Orpin rose (Gal.); Rosewort (Ang.); Rosenrod (D.); Roozenwortel (Bel.); Rodiola (I.); Rosenrot (Suéc.).

Br. Gal. Wir. Be. M. Sp.

3) *Diœcia Octandria*, L.; Crassuleae, J.) Eine auf hohen Gebirgen Europa's wachsende Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 180.)

Man wendet die Wurzel (radix Rhodiolæ s. Rosariæ) an; sie ist ästig, weiß, fleischig und knollig, besonders am obern Theil. Sie hat einen sehr angenehmen Rosengeruch und einen etwas scharfen, styptischen Geschmack.

Schwach adstringirend.

3) *Sempervivum tectorum*, L.; großer Hauslauch, Hauswurzkräut; Joubarbe des toits, grande Joubarbe (Gal.); Great common houseleek (Ang.); Netresk, Tucny muzjk weltsj (B.); Huuslaeg (D.); Siempreviva de tejados (His.); Donderbaard, Huuslook (Bel.); Siemprevivo, Orchiella, Barba di Giove (I.); Hazi zoeld (M.); Rozchadnik wielki (Pol.); Sempreviva (Lus.); Tschesnok dikoi (R.); Huuslaek (Suéc.).

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. His. Li. O. R. Wür. Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.

4) *Dodecandria Dodecagynia*, L.; Crassuleae, J.) Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Fl. méd. IV. 208.)

Man wendet das Kraut (herba Sempervivi s. Sedi majoris) an; es besteht aus einer Rose zarter, fleischiger, eirunder, spitziger, grüner, auf beiden Seiten glatter, an den Rändern behaarter Blätter. Der Geruch ist kaum merklich, der Geschmack wässerig, kühlend, herb, styptisch, wie salzig.

Gabe des Safts, zwei Unzen. — Äußerlich zum Pflaster. (Fi.)

Cerevisia antiscorbutica. (B*.)

℞. Sedi acris . . . manipulos ooto.
Cerevisiaë . . . libras octo.

Decoque ad dimidii remanentiam. — Gabe Morgens nüchtern: drei bis vier Unzen.

Syrupus Sedi majoris s. Sempervivi.
(Wir.)

℞. Succis Sempervivi decoctione ad dimidium redacti uncias decem.
Sacchari albi . . . uncias sedecim.
Ebulliant semel et colentur. — Röhrend, beruhigend.

Unguentum leniens, Pomatum sedans.
(Ca. Sm.)

℞. Succis Sedi majoris,
Olei Olivarum,
singulorum partes aequales.
Subige. (Sm)

Ca. Succis, Axungiae, singulorum uncias tres et Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor.

Wortrefflich bei Hautreizung und, wie man behauptet, auch zur Stillung von mit Krebschäden verbundenen Schmerzen.

Selinum.

In den Pharmacopöen werden drei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Selinum Cervaria*, Ro.; Hirschwurz, Hirschheil, Hirschkpetersilie, Bergketersilie; Carotte de montagne, Persil de montagne (Gal.); Broad leaved spignel (Ang.); Gekrauste heerwortel (Bel.).

Wir. Sp.

♀ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze, welche auf den Gebirgen Europa's wächst. (Jacq. Austr. I. t. 69.)

Man wendet die Wurzel (radix Cervariae nigrae s. Gentianae nigrae) an; sie ist lang, dick, geringelt, außen schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen angenehmen und starken Geruch und einen gewürzhaften, beißenden Geschmack.

2) *Selinum palustre*, L.; Sumpfsüßnich, Milchkpetersilie, Sumpfketersilie; Persil des marais (Gal.); Marsh selinum (Ang.); Wandmerke (D.); Apio lechal (His.); Wilde eppe (Bel.); Finsk ingfaera (Succ.).

Br. Wir. Sp.

♂ oder ♀ Eine in Europa an sumpfigen Orten häufige Pflanze. (Jacq. Austr. II. t. 152.)

Man wendet die Wurzel (radix Tyllelini s. Olsmitii) an; sie ist spindelförmig, ästig, außen gelblich oder schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen starken, gewürzhaften und unangenehmen Geruch und einen starken, etwas bitteren und brennenden Geschmack.

3) *Selinum Oreoselinum*, Ro.; Bergketersilie, Grundheil; Selin de montagne, Persil de montagne (Gal.); Divariated spignel (Ang.); Wilde quale rodder (D.); Apio de montana (His.); Bergselie

(Bel.); Apio de montagna (I.); Opich gorny, Pietruszka gorna (Pol.); Apio di montanna (Lus.); Vild morat (Succ.).

Bor. Br. Gal. Han. Pol. Sax. Wir. M. Sp.

♀ Eine Europäische Pflanze. (Hayne VII. t. 3. Zorn Ic. pl. t. 400.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Oreoselini s. Apii montani) ist fingerdick, sehr lang, faserig, mit einer schwärzlichen Oberhaut bebedt, unter derselben weiß und in der Mitte gelblich. Sie hat einen angenehmen, gewürzhaften Geruch und einen gewürzhaften, bitterlichen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem runden, schwach gestreiften, glatten, röthlichbraunen Stängel mit dreifach gefiederten, hellgrünen, glatten, aus lanzettigen Blättchen bestehenden Blättern. Der Geruch ist angenehm, der Geschmack bitter und gewürzhaft.

Der Saame ist eiförmig, platt, auf einer Seite glatt, auf der andern gefurcht, roth und mit einem weißen Rande umgeben. Er hat einen starken Geruch und einen bitteren Geschmack.

Reizend, harntreibend, nervenstärkend.

Tinctura Oreoselini. (Sw*.)

℞. Foliorum recentium Oreoselini uncias duas.

Seminum Selini . . . unciam unam.
Aeque Vitae uncias quatuordecim.

Post aliquot dies infusionis cola.

Reizend, blähungtreibend; in Fällen empfohlen, wo es passend ist, besonders den Magen zu reizen. — Gabe, eine Unze zweimal täglich, nach der Mahlzeit.

Senecio.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Senecio vulgaris*, L.; gemeines Kreuzkraut; Senegon ordinaire (Gal.); Common groundsel (Ang.); Kaasurt (D.); Hierba cuna (His.); Gemeen kruiskruid (Bel.); Senecione (I.); Przymietowoziele (Pol.); Tarneirnika (Lus.); Krastownik (R.); Stonaert (Succ.).

Br Gal. His. Wir. M. Sp.

⊙ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthreae, Cass.) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (Hayne VIII. t. 10 Fl. méd. VI. 324.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Senecionis s. Erigeri) an; es besteht aus einem röhrigen, fast glatten, ästigen Stängel mit sitzenden, abwechselnden, umfassenden, am Rande behaarten, buchtigen, gezähnelten, unregelmäßigen, glatten Blät-

tern und einen sehr schlaffen, endständigen Strauß bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch, der Geschmack ist krautartig, etwas sauer und salzartig.

Nach Finazzi dient ein Eßlöffel des Safts zur Verhütung hysterischer Zuckungen, wenn man ihn vor dem Eintritt derselben reicht.

2) *Senecio Jacobaea*, L.; Jakobskraut, Jakobskreuzkraut; Jacobée (*Gal.*); Ragwort (*Ang.*); Jacobskruid (*Bel.*).

Gal. Sp.

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne VIII. t. 11. Oed. Fl. Dan. t. 944.*)

Man wendet das Kraut (herba *Jacobaeae*) an; es besteht aus leinertförmigen, doppeltgefiebertgespaltenen, gezähnten, glatten Blättern von unangenehmem, scharfem und bitterem Geschmack.

Tonisch.

Senna.

Senna; Séné (*Gal.*); Senna (*Ang.*); Suna (*Ar.*); Sena (*B.*); Sanapat (*Beng.*); Nilaverie (*Cy.*); Senet (*D.*); Sen (*His.*); Suna mukki (*Hin.*); Senne (*Bel.*); Sena (*I.*); Liscia, Senesowe (*Pol.*); Senne (*Lus.*); Amschunatydivandiva, Buttalapotaka (*Sa.*); Nilaverie, Nilavaghei (*Tam.*); Nayla tungadu, Nela ponna (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. Ha sP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pil. Sa. Sp. Z.

Man wendet unter dem Namen Senna in der Medicin Blätter und Früchte (*Folia et Fructus*) an.

A. Folia. Die im Handel vorkommenden Sennesblätter sind eine Mischung von Blättern dreier verschiedenen Pflanzen:

1) *Cassia obovata*, Coll. (*Decandria Monogynia*, L.; *Leguminoae*, J.), stumpfblättrige Senna; Cassie; Casse à feuilles obtuses (*Gal.*), ein Strauch Syriens und Aegyptens. (*Hayne IX. t. 43. C. obtusata*) (*Fl. méd. VI. 323. Lrt. Bild. IV. 32. f. 1.*) Diese Pflanze liefert die Senna von Cayb, Thebaïs, die stumpfblättrige Senna, die Senna der Armen, von Aleppo, der Barbarei, die Spanische, Italische (*Seua belady*, *Ar.*), welche aus eirunden, am Grunde verschmälernten, kurz stachelspitzigen, unten schrägen, mit deutlichen Seitenrippen versehenen Blättern besteht.

2) *Cassia lanceolata*, *Forsk.*; lanztblättrige Senna; Cassie; Casse lanceolée (*Gal.*), ein Halbstrauch Arabiens und Sen-

naars (*Encycl. méth. t. 33. fig. 3.*), welcher die Arabische, Bicharische, spitzblättrige, Alexandrinische, Morgenländische, Aegyptische, Palthische (de la Palthe) und, nach *Hayne*, auch die Tripolitaniische (*Senna guebelly*, *Mekky*, *Lissan alasfour*, *Ar.*) Senna liefert, deren Blättern unten behaart, lanzettförmig und kurz stachelspitzig sind.

3) *Cynanchum Arghel*, *Del*; Arghel; Argel, Arghel (*Gal.*) ♀ (*Pentandria Monogynia*, L.; *Apocynaeae*, J.), eine Pflanze Oberägyptens (*Nect. Voy. en Haute-Egypte t. 3.*), welche allein von der Französischen Pharmacopöe aufgenommen ist. Die Blätter, unter dem Namen Séné de la pique bekannt, sind eirund-lanzettförmig, ganz, lebrig, weißlich, fast sitzend, zwölf bis vierzehn Linien lang und am Grunde regelmäßig, mit einer unten hervorstehenden Mittelrippe ohne Seitenrippen.

Seit dem J. 1821 ist auch eine Sorte Sennesblätter unter dem Namen der Indischen (*folia Sennae indicae s. de Mokka*) im Handel vorgekommen, die sich durch größere Länge, blaß gelbliedgrüne Farbe u. unterscheiden. Sie sollen von *Cassia elongata*, *Lemaire*, nach *Hayne* von *Cassia acutifolia*, kommen. —

Außerdem findet man noch in der käuflichen Senna Reste von Stielen oder Zweigen, bisweilen auch Bälge oder Früchte, Reste von Blättern, Blüthen u., fremde Stoffe, und besonders Blätter vom Blasenstrauch (*Colutea arborescens*). Ihr Geruch ist elektrisch, anhaltend, eigenthümlich und sehr widerlich; der Geschmack etwas bitter.

2) *Fructus, folliculi Sennae*. Es sind eirunde, längliche, zusammengedrückte, bogenförmig gekrümmte, gelbliche Hülsen oder Bälge ohne ihre vier oder sechs herzförmigen Saamen.

Die Senna enthält, nach *Cassaigne* und *Feneulle*, Chlorophyll, eine geringe Menge fettes Del, Gineis, einen gelbfärbenden Stoff, Aepfelsäure, Kali- und Kalisalze und endlich einen eigenthümlichen Stoff, welcher den Grund ihrer Wirkung zu enthalten scheint, das Cathartin (*Cathartina*, *Cathartinum*).

Mit starken Säuren, kohlenfädrlichen Alkalien, Kaltwasser, salpetersaurem Silber, essigsaurem Blei, Brechweinstein und dem Aufguss der gelben China darf man sie nicht verbinden.

Es ist ein sehr kräftiges Purgirmittel, dessen Wirkung auf die Verdauungsweise fast immer Ekel und Coliken veranlaßt. Man wendet sie selten in Pulver und dann zu einem Scrupel bis zu einer Drachme an.

§. I. Präparate, welche die Senna in Substanz enthalten.

Species purgantes. (Huf.)

℞. Foliorum Sennae drachmam unam.
Natri sulphurici . . . unciam unam.
Man läßt diese Species in drei Tassen Wasser kochen und nimmt von dieser Abkochung alle Stunden eine halbe Tasse.

¶ *Pulvis pectoralis. (B*)*

℞. Foliorum Sennae,
Seminum Anisi,
Radici Liquiritiae,
singulorum semunciam.
Sacchari crystallisati
uncias duas cum dimidia.
Bon Frige gerührt. — Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich vier Mal.

Pulvis Liquiritiae compositus s. pectoralis s. Sennae cum Sulphure. (Bor. BorC. Bor4. GalM. Han. Pol. Au.)

℞. Foliorum Sennae . . . semunciam.
Florum Sulphuris,
Seminum Anisi,
singulorum unciam unam.
Radici Liquiritiae
uncias duas cum dimidia.
Misce. (BorC. GalM. Au.)

℞. Foliorum Sennae,
Radici Liquiritiae,
singulorum uncias duas.
Seminum Foeniculi,
Florum Sulphuris,
singulorum unciam unam.
Sacchari albi . . . semilibram.
Misce. (Bor. Han. HassP. Pol.)

Au. Sennae, Sulphuris, singulorum sesquidrachmam, Foeniculi, Liquiritiae et Sacchari Lactis, singulorum drachmam unam; — Bor4. Sennae, Glycyrrhizae, singulorum uncias sex, Sacchari libras tres, Anisi uncias duas, Florum Sulphuris quatuor.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle drei Stunden.
Pulvis Guajaci cum Senna s. antiictericus. (Au.)

℞. Foliorum Sennae,
Radici Guajaci,
singulorum partes aequales.
Gabe, zwei Kaffeelöffel, zwei oder drei Mal täglich. — Soll mit großem Erfolg bei Gelbsucht angewendet worden seyn.

Pulvis laxans s. lenitivus tartarizatus s. Sennae compositus. (O. Wir. Sw. Vm.)

℞. Pulveris Foliorum Sennae,
— Anisi,
— Sacchari albi,
— Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.

Misce bene. (O.)

℞. Foliorum Sennae,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Cinnamomi,
Anisi,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. (Sw)

Wir. Anisi et Foeniculi, singulorum semidrachmam.

℞. Foliorum Sennae partes sedecim.
Cremoris Tartari partes quatuor.
Foeniculi . . . partes duas.
Cinnamomi,
Macidis, singulorum partem unam.
Misce. (Vm.)

Pulvis antiarthriticus purgativus s. Sennae compositus, Pulvis diasennae, Pulvis gregorianus. (Gal. GalM. Lon. LonN. Sar. Suec. Wir. C. Vm.)

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas.
Scammonii . . . unciam unam.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Pulverata seorsim deinde misce. (Fenn. Suec.)

℞. Foliorum Sennae,
Cremoris Tartari,
singulorum uncias duas.
Scammonii . . . semunciam.
Zingiberis . . . drachmas duas.
Pulveratis scammonio et reliquis seorsim, pulveres commisce. (Lon. LonN. C.)

Vm. Sennae, Cremoris Tartari, singulorum partes octo, Scammonii duas et unam Zingiberis.

℞. Foliorum Sennae,
Cinnamomi,
Cremoris Tartari,
Gummi Arabici,
singulorum partes quatuor.
Ligni Guajaci,
Sarsaparillae,
Scammonii, singulorum partes duas.
Fiat pulvis tenerrimus. (GalM.)

Gal. eandem formulam, Chinae tamen partes duas addendo.

℞. Foliorum Sennae . . . sesquiunciam.
Cremoris Tartari,
Mechoacannae,
singulorum semunciam.

Rhei . . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Sar.)

℞. Sennae . . . scrupulos duos.
Cremoris Tartari
grana viginti quinque.

Zingiberis,
Jalapae,
Baccarum Juniperi,
singulorum grana quindecim.
Sacchari . . . semunciam.

Fiat pulvis. (Wir.)

Pulvis longae vitae s. ad longam vitam.
(Bo. Ca.)

- ℞. Foliorum Sennae mundatorum,
Rasurae Ligni betulini,
singulorum libram unam.
Seminum Anisi,
— Portulacae,
singulorum libras duas.
Ligni Santali albi,
— — rubri,
singulorum semilibram.

Fiat pulvis. — Gabe, ein Kaffeelöffel
auf sechs Tassen kochendes Wasser, welches
man mit Zucker versüßt und Morgens
nüchtern trinkt. — Ein mildes Caric-
mittel.

Nodus purgans. (Sa.)

- ℞. Herbae Trifolii,
— Fumariae,
singularum manipulum unum.
Radices Pimpinellae albae
drachmas tres.
— Gentianae,
Cascarillae,
singularum semunciam.
Corticis Aurantii Curassavensis
drachmas sex.
Seminum Dauci,
— Anethi,
singulorum drachmas duas.
Rhei semunciam.
Foliorum Sennae drachmas sex.
Salis cathartici amari duas.

Bolus purgans. (Sp.)

- ℞. Pulveris laxantis
grana viginti quatuor.
Mellis quantum sufficit.
Fiat bolus.

Pilulae tonicae et purgantes. (Pie.)

- ℞. Foliorum Sennae,
Radicum Scrophulariarum amba-
rum, singularum unciam unam.
Hermodactylorum,
Radiois Angelicae,
Turpethi vegetabilis,
singulorum drachmas duas.
Scammonii scrupulos quatuor.
Syrupi Rosarum pallidarum
quantum sufficit

ut fiat massa pilularis. — Gabe bis
zwei Drachmen, nöthigenfalls mit Zusatz
von zwanzig Gran mercurii dulcis.

Passulae laxativae, Confectio passulata.
(D. Pal. Sar. Wir. Sp. Vm.)

- ℞. Foliorum Sennae unciis quatuor.
Aquae communis libras quatuor.
Sacchari albi,
Passularum minorum,
singulorum libram unam.

Olei essentialis Citri guttas viginti.
Digere sennam in aqua bulliente et

in colatura coque passulas; pulpam per
cribrum setaceum trajice, illam cum
saccharo ad plumam cocto blando igne
ad electuarii consistentiam inspissa et
refrigeratae adde oleum cum sacchari
pauillo contritum (Sar.)

Addendo hujus electuarii semunciae
drachmam unam Pulveris Jalapae Con-
fectio passulata cathartica (Sar) obti-
netur.

- ℞. Cinnamomi . . . drachmas tres.
Foliorum Senhae . . . unciis duas.
Passularum minorum,
Sacchari,
singulorum libram unam.

Macera sennam in Aquae unciis qua-
tuor; post sufficientem extractionem
adde liquidi unciis octo et passulas
bene mundatas submergendo, cum sac-
charo syrupum spissum para; syrupo
adhuc calido adde passulas et ad re-
frigerationem usque agita. (Vm.)

Wir. et Sp. Sennae unciis quatuor,
Aquae decem, Cinnamomi drachmas
duas, Zingiberis albi sesquidrachmam,
Sacchari et Passularum minorum, sin-
gularum unciis duodecim; — Pal.
Sennae unciis octo, Foeniculi semun-
ciam, Cinnamomi drachmas duas, Aquae
satis ut sesquifibra colaturae obtineat-
ur, Sacchari ad plumam cocti sesqui-
libram et Passularum minorum mun-
datarum tantidem.

- ℞. Foliorum Sennae unciis quatuor.
Aquae communis unciis decem.
Coque, sub finem addendo
Cinnamomi . . . draohmas tres.
Cola exprimendo, colaturam coque
cum

Sacchari albi libra una.
Syrupum colatum infunde
Passularum minorum librae uni.
Sera. (D.)

Eodem modo praeparatur *Confectio
de Prunis s. diaprunum* (Sar. Wir. Sp.)
loco passularum Pruna Damascena in
Aqua ad mollitiem usque cocta adhi-
bendo.

*Electuarium Sennae s. e Senna s.
Sennae cum Pulpis s. Sennae composi-
tum, Electuarium aperiens s. catholicum
commune s. diaprunum s. ecoproticum
s. lenitivum, Electuarium Tamarindor-
um, Confectio Sennae.* (A. Am. Ams.
B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D.
Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalF. Gen.
Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus.
O. Pal. Pol. Sar. Sax. Succ. Wir. WW.
C. Fi. Sp. T. Vm.)

- 1) Ohne Weinsteinrahm.
℞. Radiois Polypodii querni
unciis quatuor.

Foliorum Sennae mundatorum
 uncias duas.
 — Mercurialis manipulos tres.
Aquae communis uncias octo.
Macera sennam per horas sex in
Aquae bullientis uncias duabus et cola;
 infunde **polypodium** in reliqua aqua et
 coquendo dimidium consume; adde
 deinde **folia mercurialis**; post brevem
 ebullitionem exprime et cola; in co-
 latura coque
Prunorum dulcium enucleatorum
 uncias sex.
Pulpam per cribrum setaceum tra-
 jice et tunc
 ℞. **Hujus Pulpae,**
Pulpae Tamarindorum,
 — **Cassiae,**
Conservae Violarum,
 singularum uncias sex.
Sacchari albi in **Tinctura Sennae**
 soluti et ad **syrum spissum**
 cocti libras duas.
 Coque pulpas et **syrum igne blan-**
dissimo et continue agitando ad hu-
 midum superflui consumptionem usque;
 adde **conservam** et tunc pro quaque li-
 bra **electuarii refrigerati**
Pulveris Sennae mundatae
 sesquiunciam.
 Miscere bene. (Sar.)
 ℞. **Radici Polypodii querni**
 uncias duas.
 — **Liquiritiae** semunciam.
Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,
 — **Mercurialis,**
 singularum unciam unam
Florum Violarum semunciam.
Hordei mundati,
Passularum minorum,
 singularum uncias duas.
Jujubarum,
Sebestenarum,
 singularum unciam unam.
Aquae fontanae
 libras duas cum dimidia.
 Coque ad libram unius **liquidi reman-**
entiam et in colatura solve
Pulpae Cassiae,
 — **Prunorum,**
 — **Tamarindorum,**
Sacchari albi,
 singularum uncias sex.
 Coque ad consistentiam **electuarii** et
 adde
Pulveris Foliorum Sennae
 uncias tres cum dimidia.
Conservae Violarum uncias sex.
 Miscere exacte. (Br. Sp.)
 ℞. **Uvarum Passarum enucleatarum**
 uncias duas.
Adianti nigri,
Florum Violarum,

Hordei mundati,
 singularum manipulum unam.
Jujubarum,
Sebestenarum, singularum no. 20.
Liquiritiae semunciam.
Prunorum enucleatorum,
Tamarindorum,
 singularum drachmas sex.
Foliorum Sennae,
Polypodii quercini,
 singularum uncias duas.
Mercurialis manipulum unum cum
 dimidio.
Aquae quantum sufficit.
 Coque ad consumptionem **liquidi tri-**
entium duorum, cola et in colatura
 dissolve
Sacchari albi uncias sex.
 Coque ad aptam consistentiam et
 adde
Pulpae Cassiae,
 — **Prunorum,**
 — **Tamarindorum,**
Conservae Violarum,
 singularum uncias sex.
Pulveris Foliorum Sennae
 uncias tres cum dimidia.
 Miscere bene. (Pal.)
 ℞. **Hordei integri,**
Radici Polypodii,
Passularum minorum,
Tamarindorum,
 singularum uncias duas.
Prunorum Damascenorum,
Jujubarum,
Foliorum recentium Scolopendrii,
 singularum sesquiunciam.
Liquiritiae rasae et **contusae**
 unciam unam.
Foliorum Mercurialis
 uncias quatuor.
 Coque hordeum, donec dirumpatur,
 tunc **polypodium** contusum et denique
 reliquas substantias in **Aquae** sufficiente
 quantitate; coque itidem seorsim
Foliorum Sennae uncias duas.
 Decocta commixta coque ad unciam
 quinquem **liquidi remanentiam** et
 adde deinde
Sacchari albi
 libras duas cum dimidia.
 In **syruo** ad aptam consistentiam
 cocto solve
Extracti Cassiae,
Pulpae Tamarindorum,
 singularum uncias novem
 et tunc, commixtis
Pulveris Foliorum Sennae
 uncias quinque.
 — **Foeniculi contusi,**
 — **Anisi contusi,**
 singularum drachmas duas.

Commisce spathulae lignae ope.
(Gal.)

℞. Liquiritiae . . . unciam unam.
Radice Polypodii,
Sennae mundatae,
 singularum uncias duas.
Succi Mercurialis depurati
 uncias octo.

Infunde, cola leviter exprimendo et
in colatura dilue

Passularum minorum contusarum
 uncias quatuor.

Solve deinde in massa
Sacchari crudi teneris
 uncias quadraginta.

Cola syrupum calidissimum per pan-
num et ad consistentiam roob inspisa-
tato adde

Pulpae Prunorum uncias quatuor.
— Cassiae,
— Tamarindorum,

 singularum uncias septem.

Ad electuarii consistentiam consume,
sub finem, calore diminuto, addendo

Seminum Anisi,
— Foeniculi,
 singularum drachmas duas.

Pulvera et parumper cum una pul-
parum tere. (Vm.)

℞. Radice Polypodii contusae
 uncias sex.

Aquae libras decem.
Coque, sub finem addendo

Foliorum Malvae unciam unam.
In colatura dissolve

Mellis libras novem.
Fiat syrupus spissus, cui adde

Pulpae Prunorum sesquilibram.
Pulveris Sennae libram unam.

— Anisi uncias duas.
Misce. (His.)

℞. Radice Polypodii uncias quatuor.
Aquae libras quatuor.

Coque ad duorum trientium liquidi
circiter remanentiam, adde

Foliorum Sennae uncias duas
et ab igne remove, post refrigerationem
cola et in liquido solve

Sacchari albi libras duas
et ad syrupi spissi consistentiam con-
sume; syrupo adde

Pulpae Prunorum,
— Tamarindorum,
— Cassiae,

 singularum uncias sex.

Massam, addendo

Foliorum Sennae subtilissime pul-
veratorum uncias duas
ad requisitam consistentiam redige. (T.)
℞. sub finem addit Foliorum Sen-
nae uncias duas cum dimidia.

℞. Caricarum uncias sex.
Radice Liquiritiae uncias duas.

Aquae libras quatuor.
Decoque ad dimidii remanentiam,

cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi uncias sedecim.

In syrupo dilue
Pulpae Tamarindorum,
— Prunorum,

 singularum uncias quinque.

Pulveris Foliorum Sennae
 uncias quatuor cum dimidia.

— Anisi semunciam.
Misce bene. (Bor. Han. O. Pol.)

Bor4. Caricarum uncias octo ex Aquae
libris quatuor ad dimidium coquere,
exprimere, colare, decocto ad uncias
duodecim consumere, dissolvere in eo
Sacchari uncias sedecim et syrupi im-
miscere Pulpae Tamarindorum uncias
octo, Foliorum Sennae et Anisi stellati
ut Bor. absque liquiritia et pulpa pru-
norum.

℞. Foliorum Sennae uncias octo.
Coriandri uncias quatuor.

Liquiritiae uncias tres.
Caricarum siccarum libram unam.

Pulpae Tamarindorum,
— Cassiae,
— Prunorum,

 singularum semilibram.

Sacchari albi
 libras duas cum dimidia.

Tere sennam cum coriandro et cri-
bra, separa pulveris uncias decem; re-
siduum cum caricis et liquiritia in
Aquae libris (octariis) quatuor ad duas
decoque; cola exprimendo, quartam
colaturae partem consume, adde sac-
charum et syrupo pulpas et tunc pul-
verem immiscere. (Ann. B. Bel. Ed. Gen.
Lon. LonN. C.)

℞. Pulpae Prunorum libram unam.
— Tamarindorum uncias duas.

Syrupi Sacchari sesquioctarium.
Coque ad mellis consistentiam et
adde

Pulveris Foliorum Sennae
 uncias quatuor

et post refrigerationem
Olei essentialis Carvi

 drachmas duas.

Misce sedulo. (Du.)

℞. Pulpae Prunorum,
— Tamarindorum,

 singularum unciam unam.

Pulveris Foliorum Sennae
 drachmas duas.

— Foeniculi semunciam.
Misce triturando. (Li.)

℞. Pulpae Prunorum libram unam.
— Cassiae,
— Tamarindorum, singularum
 uncias duas cum dimidia.

- Pulveris Foliorum Sennae** uncias quatuor.
 — Coriandri semunciam.
 Syrupi Sacchari libram unam.
 Misce. (Ams.)
- ℞. **Pulpae Tamarindorum** libram unam.
Pulveris Foliorum Sennae uncias quatuor.
 — Coriandri semunciam.
 Syrupi Sacchari uncias octo.
 Misce bene. (Fenn. GalF. Suec.)
- ℞. **Pulpae Prunorum** libras duas.
Pulveris Foliorum Sennae uncias octo.
 — Coriandri uncias quatuor.
 Syrupi Rosarum solutivi quantum sufficit.
 Misce. (Lus. Wir.)
- ℞. **Pulveris Seminum Anisi grana sex**
 — **Foliorum Sennae** drachmam unam.
Pulpae Tamarindorum drachmas duas.
 Syrupi Althaeae drachmas sex.
 Misce ex tempore. (HassP.)
- ℞. **Roob Sambuci** unciam unam.
Pulveris Foliorum Sennae drachmas duas.
Pulveris Anisi semidrachmam.
 Misce. (Ful.)
- 2) **Mit Weinsteinrahm.**
- ℞. **Pulpae Tamarindorum partes octo**
 Syrupi Rhei partes sex.
 Commisce et adde
Pulveris Foliorum Sennae
 — **Cremoris Tartari** singulorum partem unam.
 Misce. (Sax.)
- ℞. **Pulpae Prunorum sesquiunciam**
Foliorum Sennae pulveratorum
Cremoris Tartari singulorum sesquidrachmam.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Misce. (B*.)
- Ba. **Pulpae Tamarindorum partes octo**
Sennae, Cremoris Tartari singulorum unam,
 Syrupi Sacchari quatuor;
 — D. **Pulpae Tamarindorum duodecim**
Sennae sex, Cremoris Tartari tres
 et Syrupi Mannae viginti quatuor.
- ℞. **Pulpae Prunorum partes viginti quatuor**
Foliorum Sennae pulveratorum partes tres
Cremoris Tartari partem unam
Mellis puri partes duodecim
 Misce. (BorC. WW.)
- Sp. **Pulpae Tamarindorum, Prunorum**
 singulorum partes octodecim,
Roob Sambuci duodecim, Sennae sex

quatuor Cremoris Tartari et Mellis quantitatem sufficientem.

Alle diese Präparate sind mehr oder weniger purgirend. Man wendet sie häufiger in Rhistir als auf eine andere Weise an, und in allen Fällen ist die Gabe nach der verschiedenen Menge der darin enthaltenen Senna verschieden. Die folgenden Electuarien unterscheiden sich von diesem fast nur durch den Namen.

Electuarium diartartareum. (B*.)

℞. **Sennae mundatae, Tartari albi cribrati** singulorum sesquiunciam.
Mannae electae, Sacchari albi singulorum unciam unam.

Zingiberis,

Anisi,

Cinnamomi,

Galangae,

singulorum drachmam unam.

Syrupi Rosarum solutivi uncias quinque.

Gabe, eine Unze, vor der Mahlzeit, wozu man vier Unzen Fleischbrühe trinkt.

Man kann es auch auf folgende Weise bereiten:

℞. **Sennae electae** uncias sex.

Zingiberis,

Galangae,

singulorum drachmas tres.

Infusi Rosarum pallidarum libras tres.

Infunde per horas viginti quatuor in balneo aquae tepido, in vase tecto, et coque; cola, clarifica et colaturae adde

Sacchari albi uncias octo.

Cremoris Tartari semunciam.

Olei essentialis Anisi semiscrupulum.

Misce. — Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Conditum tamarindinaceum. (Sw*.)

℞. **Foliorum Sennae drachmas tres,**

Cremoris Tartari sesquidrachmam,

Mannae,

Pulpae Tamarindorum,

singulorum sesquiunciam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Bei Hämorrhoiden und Blutbrechen empfohlen. — Gabe, drei Kaffeelöffel, zwei, drei oder vier Mal täglich.

Man kann auch zwei Drachmen Schwefel zusetzen, wo dann diese Marmelade sich nicht von der folgenden Latwerge unterscheidet.

Electuarium antihæmorrhoidale. (Vm.)

℞. **Foliorum Sennae,**

Florum Sulphuris,

Crémoris Tartari,
singulorum partem unam.

Mannae . . . partes sex.

Pulpae Tamarindorum partes octo.

Syrupi Sennae quantum sufficit.

Tere mannam primò cum Syrupi
pauzillo, dein cum pulpae parte una,
adde pulveres trititando commixtos,
tunc reliquam pulpam et syrupi quan-
titate sufficientem.

Electuarium lenitivum cum Sulphure
(Sp.). Electuario lenitivo Sp. addatur
Florum Sulphuris uncia una. — Zu
einer halben Unze täglich mehrmals, gegen
Stärke empfohlen.

Electuarium mundificans. (Li.)

℞. Pulveris Radicis Patientiae
uncias tres.

— — Rhei semunciam.

— Sassafras . . uncias duas.

— Foliorum Sennae
drachmas sex.

— Resinae Guajaci,
Florum Sulphuris lotorum
unciam unam.

Mellis despumati . . libras tres.

Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Electuarium e Senna cum Carbone. (Au.)

℞. Electuarii e Senna uncias quatuor.

Natri subcarbonici,
Carbonis,
singulorum drachmas duas.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen, zwei
oder drei Mal.

Electuarium purgans. (B.)

℞. Confectionis Sennae,
— Cassiae,
singularum uncias duas.

Crémoris Tartari drachmas tres.

Syrupi Rosarum quantum sufficit.

Gabe, einer Meßelstauß groß, stündlich,
bei Verstopfung Schwangerer.

℞. Pulpae Tamarindorum
unciam unam.

Foliorum Sennae drachmam unam.

Crémoris Tartari unciam unam.

Mellis despumati quantum sufficit.

Auf zwei Mal zu nehmen.

Electuarium catholicum s. catholicum

duplicatum s. de Rhabarbaro s. diaca-

tholicum s. Rhei compositum. (Gal. Pal.

R. Wir. Wür. Br. Ca. Pid. Sp. Vm.)

℞. Radicis Polypodii . uncias sex.

Aquae fontanae
uncias quadraginta octo.

Coquendo parte quarta liquidi con-
sumpta, in colatura dissolve

Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
singularum uncias quatuor.

Sacchari uncias quadraginta octo.
Coque blando igne ad mellis consi-
stentiam; adde sensim

Pulveris Radicis Polypodii,

— — Rhei,
singulorum uncias duas.

— — Liquiritiae,
drachmas duas.

— Foliorum Sennae
uncias quatuor.

— Florum Violarum,
— Seminum Anisi,
singulorum uncias duas.

Misce. (Wir.)
℞. Radicis Polypodii . uncias octo.

Aquae fontanae
uncias nonaginta sex.

Decoque ad dimidium et colaturam
cum

Quatuor Seminum frigidiorum ma-
jorum, singulorum semuncia,

Seminum Violarum uncias duabus
ad emulsionem tere, cola et in liquore
dissolve

Sacchari albi
uncias quadraginta octo.

Syrupo, coquendo parato paulatim
adde

Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,

Pulveris Rhei,
— Foliorum Sennae,
singulorum uncias quatuor.

— Anisi . . . uncias duas.

— Liquiritiae unciam unam.

Misce. (Sp.)
Pal. coquere jubet Polypodii semi-

libram in Aquae octo ad dimidii re-

manentiam, in colatura dissolvere Sac-

chhari libras quatuor, cum syrupo co-

cto commiscere Pulpae Cassiae et Ta-

marindorum, singularum uncias qua-

tuor, massae denique addere mixturam
pulverulentam e Sennae uncias quatuor,
Rhei duabus, Violarum et Anisi, sin-

gulorum tantidem, Polypodii uncias
duabus et Quatuor Seminum frigidio-

rum majorum, singulorum semuncia.

℞. Radicis Polypodii contusae
semilibram.

— Cichorii . . uncias duas.

— Liquiritiae unciam unam.

Foliorum Agrimoniae,
— Scolopendrii,
singulorum uncias tres.

Aquae . . . libras sex.

Coque blando igne ad tertiae partis
remanentiam; adde

Seminum Foeniculi drachmas sex.
Cola et exprime, colaturam coque
cum

Sacchari albi . . libris quatuor

ad syrupi spissi consistentiam. Ab igne remotis adde

- Pulpae Cassiae,
 — Tamarindorum,
 Pulveris Rhei,
 — Sennae,
 singularum uncias quatuor.
 — Seminum Violarum
 uncias duas.
 — Liquiritiae raeae,
 — Quatuor Seminum frigidorum,
 singularum unciam unam.
 — Seminis Foeniculi
 semunciam.

Misce sedulo. (Gal. Ca.)

℞. Radicis Polypodii . uncias sex.

- Herbae Malvae,
 — Mercurialis,
 — Parietariae,
 — Violarum,
 singularum manipulos duos.
 Aquae fontanae uncias centum
 quadraginta quatuor.

Coquendo tertia parte consumpta, in colatura dissolve

Mellis . . . uncias nonaginta sex.
 Coque ad syrupi consistentiam et adde

Pulpae Prunorum
 uncias viginti quatuor.

- Pulveris Polypodii,
 — Rhei,
 singularum uncias quatuor.
 — Liquiritiae . . . semunciam.
 — Sennae . . . uncias octo.
 — Florum Violarum
 uncias quatuor.
 — Foeniculi,
 — Quatuor Seminum frigidorum
 majorum,
 singularum unciam unam.
 — Anisi . . . uncias quatuor.

Misce bene. (Sp.)

℞. Pulveris Rhei,
 — Sennae,
 singularum drachmas duas.
 — Foeniculi . . . drachmas tres.
 — Liquiritiae . . . semunciam.

Tere cum Syrupi paxillo et adde

Pulpae Cassiae,
 — Tamarindorum,
 singularum uncias duas.

Syrupi Polypodii
 quantitatem sufficientem.

Misce. (Vm.)

℞. Commiscere jubet mixturam pulveratam Rhei, Jalapae, Anisi, Foeniculi, singularum unciam unam, et Sennae, uncias duas cum Pulpae Cassiae unciis duabus, Pulpae Tamarindorum tantidem et Syrupi Polypodii unciis triginta sex.
 ℞. Foliorum Sennae unciam unam.
 Rhei semunciam.

Seminum Anisi drachmas duas.
 Pulpae Tamarindorum,
 Roob Sambuci,
 singularum uncias quatuor.

Misce. (R.)

℞. Pulveris Sennae . uncias duas.
 — Rhei,
 — Cremoris Tartari,
 singularum semunciam,
 — Anisi . . . drachmas tres.
 Pulpae Tamarindorum
 sesquunciam.

Mellis despumati libram unam.

Misce bene. (Wür.)

Pid. eandem formulam sed absque cremore tartari.

Electuarium lenitivum (R. Wür. et Pid.) unterscheidet sich nur durch den Zusatz der Rhabarber. Es ist, zu einer halben bis ganzen Unze genommen, purgirend. Auch verordnet man es in Klystir.

§. II. Präparate, welche den wirksamen Stoff der Senna ohne das zu seiner Ausziehung angewendete Vehikel enthalten.

Extractum Sennae (aquosum). Gal.
 His. Sar. Wir. T. Vm.)

℞. Foliorum Sennae mundatorum
 semilibram.
 Aquae fontanae . . . libras tres.

Digere per horas viginti quatuor in loco calido, cola exprimendo et igne blandissimo consume. (Sar. Wir.)

Gal. Macerationes duas succedentes frigidas Sennae librae unius in Aquae libris quatuor et evaporationem colaturae utriusque commixtae in balneo aquae; — His. Macerationem per tres dies et levem bullitionem Sennae librae unius in Aquae libris sedecim et infusionem lentam infuso-decocti sepositione purificati; — T. Foliorum libram unam cum Aquae bullentis octo per horas viginti quatuor infundere; colare cum leni expressione, per pannum vel melius per chartam emporeticam filtrare et ad extracti consistentiam consumere.

℞. Foliorum Sennae mundatorum et concisorum . . . quantum vis.

Superfunde Aqua frigida et macera per horas duodecim; adde deinde Aquae ferventis duplum frigidae, post refrigerationem cola absque expressione; residuo infunde dimidium ejusdem copiae Aquae ferventis et refrigerata cola; albuminis ope clarificata evaporent absque ebullitione ad extracti consistentiam. (Vm)

Sal essentielle Sennae. (Gal.)

℞. Foliorum Sennae . . . libras duas.
 Aquae frigidae libras duodecim.
 Macera per horas viginti quatuor,
 subinde agitando, et cola; residuum
 maceretur cum Aquae libris octo et
 itidem coletur; colaturae commixtae
 in balneo aquae ad syrapi consisten-
 tiam evaporent, quem linearum dua-
 rum crassitie supra patinas effusum in
 balneo aquae vel in furno ad siccum
 consume et tunc squamas separa.

Extractum Sennae alcoholicum. (Wür.)

℞. Foliorum Sennae,
 Alcoholis, singulorum libram unam.
 Aquae communis . . . libras octo.
 Digere blando calore per tres dies,
 cola exprimendo, seponē et decantha
 liquorem, et alcohole destillando separa-
 rato, residuum ad aptam consistentiam
 consume.

Extractum solutivum. (Br.)

℞. Foliorum Sennae,
 Rhei, singulorum uncias tres.
 Cinnamomi,
 Anisi, singulorum drachmam unam.
 Tartari tartarisati sesquidrachmam.
 Aquae fontanae . . . libram unam.
 Digere per horas viginti quatuor
 blando calore in balneo aquae, cola
 levi cum expressione et liquorem ad
 extracti consistentiam consume.

§. III. Préparate, in denen der wirt-
 same Stoff der Senna mit dem
 zu seiner Ausziehung angewendeten
 Behülfel enthalten ist.

A. Auszug durch Bier.

Cerevisia purgans. (Ca. Vm.)

℞. Allii octarios viginti.
 Sennae uncias duas.
 Summitatum Centaurii minoris,
 — Absinthii,
 singularum sesquiunciam.
 Aloës Socotrinae drachmas duas.
 Post sufficientem digestionem cola.
 (Ca.)

℞. Allii octarios quadraginta quinque.
 Polypodii quercini libram unam.
 Rhapontici,
 Sennae mundatae,
 Uvarum passarum,
 singularum semilibram.
 Foliorum Cochleariae,
 — Salviae,
 singularum uncias sex.

Rhei,
 Raphani,
 singularum uncias tres.

Fructus Aurantium concisos

no. 4.

Infunde et cola. (Ca.)

℞. Rhei partes tres.
 Coriandri partem unam.
 Rhapontici,
 Sennae, singulorum partes quatuor.
 Polypodii partes octo.
 Cerevisiae fortis partes ducentas
 quinquaginta sex.

Post plures dies macerationis cola
 absque expressione. (Vm.)

Cerevisia antiictérica. (Vm.)

℞. Curcumae,
 Rhei, singulorum semunciam.
 Corticis Aurantium,
 Foliorum Sennae,
 singularum drachmas sex.
 Seminum Dauci sylvestris
 unciam unam.

Foliorum Absinthii,
 — Marrubii,
 Florum Centaurii minoris, singu-
 lorum manipulum dimidium.
 Cerevisiae fortis
 uncias sexaginta quatuor.

Macera per aliquot dies in cerevi-
 siae octantibus septem et per pannum
 cola; faeces cum reliqua cerevisia ab-
 lue et itidem cola; colaturas commisce.

B. Auszug durch Wein.

Vinum s. Elixir Sennae. (Suec.)

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
 Coriandri,
 Foeniculi,
 singularum drachmas duas.
 Vini Hispanici
 libras duas cum dimidia.

Post tres dies digestionis adde
 Uvarum passarum enucleatarum
 uncias tres.

Macera per horas viginti quatuor et
 cola exprimendo.

Vinum purgans et tonicum. (Pie.)

℞. Foliorum Sennae mundatorum
 unciam unam.
 Rhei drachmas sex.
 Caryophyllorum,
 Croci, singulorum drachmam unam.
 Vini Hispanici octarios duos.
 Infunde frigide per dies quinque vel
 sex, saepius agitando et supra faeces
 relinque.

Bei Krankheiten von Schwäche des Ma-
 gens. — Gabe, Morgens nüchtern zwei
 bis vier Löffel.

Vinum antiictericum. (Sw. Vm.)*

℞. Foliorum Sennae,
 Corticis Aurantium,
 singularum partes tres.

Rhei,
Curcumae, singulorum partes duas.
Foliorum Absinthii,
— Marrubii,

— singulorum partem unam.
Vini Rhenani partes ducentas quin-
quaginta sex.

Infunde frigide per dies octo, cola
leviter exprimendo et filtra. — Ko-
nisch, Schwach purgirend. — Gabe, zwei
bis vier Unzen täglich drei Mal. —

*Vinum amarum et diureticum, Vinum
aperiens et purgans, Vinum purgans.*
(Bo. Ca. Pic.)

℞. Foliorum Sennae mundatorum
unciam unam.

Agarici albi . . . sesquidrachmam.
Cremoris Tartari drachmas tres.

Radici Scillae,
— Inulae,

Herbae Marrubii,
singularum uncias tres.

Radici Iridis Florentinae
uncias sex.

Zingiberis . . . scrupulos duos.
Vini libras tres.

Infunde, cola et colaturae adde
Tincturae Gentianae drachmas tres.

Misce. (Ca.)
℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.

Algarici albi . . . drachmas duas.
Corticis Sambuci,

— Ebuli,
singulorum unciam unam.

Radici Scillae,
— Inulae,

— Iridis Florentinae,
singularum semunciam.

Herbae Marrubii manipulum unum.
Zingiberis . . . drachmam unam.

Vini libras quatuor.
Post sufficientem digestionem cola.

(Pic.)
℞. Foliorum Sennae,

Agarici albi,
Radici Jalapae,

— Hellebori nigri,
— Iridis Florentinae,

— singularum drachmas duas.
— Inulae,

— Scillae, singularum uncias
duas cum dimidia.

Corticis Winteri,
— Sambuci,

— Ebuli,
singulorum unciam unam.

Vini albi libras quatuor.
Post frigidam infusionem cola. (Ca.)

Bo. Iridis, Sennae, singularum un-
cias duas, Inulae, Scillae, Sambuci,
Ebuli, singularum unam, Jalapae, Hel-
lebori, Agarici, singularum drachmas

duas, Vini albi libras sex, horae qua-
drantem ebullitionis et deinde horas
duodecim infusionis.

Gabe, eine bis zwei Unzen, Morgens und
Abends.

C. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Sennae. (Huf.)

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas.
Alcoholis libram unam.

Post tres dies digestionis cola.

*Tinctura Sennae s. Sennae composita
s. aromatica, Elizir salutis, Tinctura
cathartica.* (Am. Ams. B*. Bor4. D.
Du. Ed. Gen. Han. Lon. LonN. Lus.
Pal. Sax. Suec. Wir. C. Ca Sw. Vm.)

℞. Foliorum Sennae . . . partes sex.
Cardamomi minoris partem unam.
Aquaе Vitae

partes quadraginta octo.

Infunde frigide per dies octo, cola
exprimendo et filtra. (Vm.)

℞. Foliorum Sennae . . . libram unam.
Seminum Carvi . . . sesquiunciam.

Cardamomi minoris semunciam.
Alcoholis (0,930) . . . octarios octo.

Post quatuor dies digestionis cola.
(B*. Du.)

*Vm. Sennae sesquiunciam, Carvi ses-
quidrachmam, Cardamomi semidrach-
mam et Aquaе Vitae uncias sedecim;*
— Gen. Sennae uncias tres, Anisi drach-
mas tres, Cardamomi drachmam unam
et Aquaе Vitae libras duas.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Carvi drachmas tres.

Cardamomi minoris
drachmam unam.

Passularum minorum enucleatarum
uncias quatuor.

Aquaе Vitae
libras duas cum dimidia.

Macera et filtra. (Han.)

*Sw. Sennae sesquidrachmam, Carvi drach-
mas sex, Cardamomi drachmas duas,
Passularum uncias octo et Alcoholis
(0,930) libras quatuor, — Lon. LonN.
Sennae uncias tres, Carvi drachmas
tres, Cardamomi drachmam unam, Pas-
sularum uncias quatuor et Alcoholis
(0,930) octarios duos; — Suec. easdem
ingredientium quantitates et Alcoholis
Aqua diluti uncias triginta duas; —
Bor4. Foliorum uncias tres, Passulas
maiores ut Han., Spiritus Vini Gallici
fortioris libras tres, caeterum ut Han.
et quatuordecim dierum macerationem.*

℞. Extracti Liquiritiae semunciam.
Aquaе bullientis uncias quinque.

Dissolve et liquori adde

Foliorum Sennae . . . sesquiunciam.
Anisi drachmas duas.

Alcoholis . . . uncias quinque.
Digere per dies duos, blando calore, saepius agitando, et cola. (Sw.)

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas
Radiciſ Jalapae . . . unciam unam.
Coriandri . . . semunciam.
Alcoholis (0,935)
libras tres cum dimidia.

Digere per tres dies, filtra et colaturae adde

Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Dissolve. (B*. Ed.)

Lus. Sennae uncias duas, Jalapae unam, Anisi stellati drachmas duas, Aquae Vitae libras tres cum dimidia, octo dies macerationis et in colatura solvere Sacchari uncias quatuor; — Am. B*. et C. Sennae uncias tres, Rhei unam, Coriandri dimidiam, Carvi tantidem, Cardamomi drachmas duas, Alcoholis (0,930) octarios quatuor cum dimidio et Sacchari uncias quatuor; — ℞m. Sennae partes quatuor, Jalapae duas, Coriandri unam, Aquae Vitae septuaginta duas et Sacchari octo; — D. Sennae uncias duas, Jalapae semunciam, Alcoholis libras tres, Sacchari albi uncias quatuor absque coriandro.

℞. Foliorum Sennae . . . partes octo.
Rhei . . . partes quatuor.
Coriandri,
Corticis Aurantiorum,
singulorum partem unam.

Aquae Vitae
partes centum duodecim.

Infunde frigide per dies octo, exprime et filtra. (Vm.)

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas.
Passularum minorum semilibram.
Radiciſ Inulae,
Coriandri,
Anisi, singulorum unciam unam.
Aquae Vitae . . . libras tres.

Macera per dies octo, subinde agitando et cola. (Am.)

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas.
Radiciſ Inulae,
— Liquiritiae,
— Rhei,
Seminum Anisi,
— Carvi,
— Coriandri,
singulorum unciam unam.

Passularum minorum euucleatarum uncias quatuor.

Subcarbonatis Potassae drachmas duas.

Aquae bullientis . . . libram unam.

Digere et refrigeratis adde
Alcoholis . . . libras duas.

Stant in digestionem adhuc per dies

octo, tunc cum expressione colentur. (B*. Wir. Sa.)

Sax. infundere jubet Sennae partes tres, Radiciſ Inulae, Liquiritiae, Rhei, Anisi, Garvi, Coriandri, singulorum unam et Subcarbonatis Potassae partem quartam in Aquae bullientis duodecim, refrigeratis addere Alcoholis concentrati partes viginti quatuor, digere blando calore per dies sex, colare exprimendo et filtrare.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Radiciſ Inulae,
— Rhei,

— Rhei,
singulorum uncias duas.

Subcarbonatis Potassae
sesquidrachmam.

Aquae bullientis . . . libras tres.

Digere per tres horas in vase tecto,

tum
℞. Ligni Guajaci,
Anisi,
Carvi,
Coriandri, singulorum uncias duas.
Aquae Vitae . . . uncias tres.

Infunde frigide per tres dies, cola exprimendo et colaturam cum praemunita commisce. (Pal.)

Ca. Sennae uncias duas, Guajaci unam, Inulae, Anisi, Carvi, Coriandri, Liquiritiae, singulorum drachmas sex, Passularum uncias quatuor et Aquae Vitae libras tres.

Alle diese Präparate wirken mehr oder weniger purgirend, je nach der Menge der in ihnen enthaltenen Senna. — Die Garbe ist sehr verschieden, im Allgemeinen von zwei Drachmen bis eine Unze.

Haustus oleosus laxans, Potio laxans oleosa. (Vm.)

℞. Tincturae Sennae,
Olei Amygdalarum dulcium,
singulorum unciam unam.

Tinctura Sennae amara. (Sw.)

℞. Foliorum Sennae partes quatuor.
Radiciſ Gentianae,
Corticis Aurantiorum,
singulorum partem unam.
Aquae Vitae

partes sexaginta quatuor.

Infunde frigide per plures dies, saepius agitando, tunc exprime leviter et filtra.

Guttae cordiales Warneri. (Am. B. C. Par)*

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Coriandri,
Foeniculi,
singulorum drachmam unam.
Coccionellae,
Croci,

Liquiritiae,
singulorum semidrachmam.
Passularum minorum enucleatarum
semilibram

Aquae Vitae . . . octarios duos.
Infunde per dies sex, saepius agitan-
do et cola; faecibus reafunde Aquae
Vitae octarium unum, post sufficientem
extractionem cola et colatras ambas
commisce. (C.)

Am. Rheum omittit; — B* et Par.
Rhei unciam unam, Sennae semunciam,
Croci drachmam unam, Liquiritiae
drachmas quatuor, Passularum libram
unam, Aquae Vitae octarios tres et octo
dies digestionis.

Keitzend und herzstärkend, bei den Eng-
ländern berühmt. — Gabe, vier oder fünf
Eßffel in irgend einer Flüssigk., alle halbe
Stunden. Cox führt dieses Präparat un-
ter dem Namen *Tinctura Sennae aroma-
tica* an, welchen es auch in der Americant-
schen Pharmacopöe führt. Seine Formel
unterscheidet sich kaum von einigen andern,
nach welchen das elixir salutis bereitet ist.

Tinctura s. Elixir Daffyi. (B*. Ca. Sw.)

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas.
Rhei unciam unam.
Foeniculi,
Baccarum Juniperi,
Guajaci, singulorum semunciam.
Sacchari albi uncias quatuor.
Aquae Vitae libras duas.

Digere per dies octo, saepius agitan-
do et cola. (B*.)

Sw. eandem formulam, sed Aquae
Vitae uncias quinque.

℞. Foliorum Sennae unciam unam,
Radici Jalapae,
Coriandri,
Cremoris Tartari,
singulorum semunciam.

Sacchari uncias sex.
Aquae Vitae semisextarios (demi-
setiers) tres.

Digere et filtra. — Gabe, eine bis
brei Unzen. (Ca.)

Elixir polychrestum purgativum. (Br.)

℞. Foliorum Sennae mundatorum
unciam unam.
Rhei semunciam.
Corticis Citri,
Kali subcarbonici,
singulorum drachmas duas.

Alcoholis uncias decem.

Post sufficientem extractionem cola
exprimendo et colaturae adde

Resinae Jalapae drachmas decem.
Spiritus Cochleariae uncias sex.

Elixir Raulini. (Ca.)

℞. Folliculorum Sennae,

Rhei,
Summitatum Absinthii vulgaris,
— Chamaedryos,

Radici Gentianae,
Corticis Aurantii amari,
singulorum uncias duas.

Cascarillae,
Aloës Socotrinae,
singulorum drachmam unam.

Aquae Vitae (15°) libras quatuor.

Infunde frigide per dies octo ad duo-
decim et filtra. — Purgirend, bei Scrop-
pelleiden empfohlen. — Gabe, ein Eßßf-
fel vor der Mahlzeit.

D. Auszug durch Weinessig.

Acetum laxans s. laxativum. (Pie.)

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Cremoris Tartari semunciam.
Corticis Citri,
Anisi,
Cinnamomi,

singulorum semidrachmam.
Aceti octarium dimidium.

Infunde per horas quadraginta octo.
— Purgirend, besonders bei innern Blut-
flüssen des Darmcanals empfohlen, um das
Blut auszuführen.

E. Auszug durch Molken.

Serum Lactis Weissii. (Bo. Ca. Pie. Ra.)

℞. Folliculorum Sennae,
Salis Epsomensis,
singulorum semidrachmam.

Summitatum florescentium Hype-
rici,
— Galii lutei,
singulorum scrupulum unum.

Florum Sambuci quantum sufficit.

Infunde per horas duodecim in loco
calido et cola. (Pie.)

Bo. et Ca. Galii lutei, Florum Sam-
buci, Hyperici, Tiliae, singulorum scru-
pulum unum, Sulphatis Sodae, Follicu-
lorum Sennae, singulorum drachmam

unam, Seri Lactis bulliantis libram
unam et post semihorae vel horae in-
fusionem filtrare; — Ra. Summitatum

Hyperici, Florum Sambuci, singulorum
scrupulum unum, Sennae, Galii lutei,
Salis Epsomensis, singulorum drachmam

unam, Seri Lactis libram unam et ho-
ras duodecim infusionis.

Nach Zanetti ist folgendes die einzige
authentische Formel:

℞. Radicis Aristolochiae longae,
— Filicis maris,

Calendulae,
singulorum uncias quatuor.

Foliorum Betonicae,
— Pervinae,
— Verbenae,

Florum Serpylli,
 — Tiliae,
 — Galii,
 — Primulae veris,
 — Daphnes Laureolae,
 — Hyperici,

Visci querni,
 Radicis Patientiae,
 — Scrophulariae,

singulorum uncias duas.
 Cuncta anni tempore apto collecta,
 mundata, sedulo siccata atque grossi-
 uscule pulverata exacte commiscean-
 tur, tunc adde

Pulveris Foliorum Sennae munda-
 torum uncias sex et drachmas
 quatuor.

Gabe, zwei Drachmen mit einer Drachme
 Bittersalz, Abends und Morgens zu zwei
 Stößen abgetrübten Mosten gethan; man
 seiht den Trank vorher durch, trinkt ein
 Glas und nach zwei Stunden das andere,
 und in der Zwischenzeit einen Aufguss von
 Capillus Veneris.

Dieses Präparat galt als ein vorzüglich-
 es Mittel zur Vertreibung der Milch;
 man muß zwanzig und selbst dreißig Tage
 damit fortfahren; gegen den zehnten oder
 fünfzehnten Tag verschreibt man ein ge-
 wöhnliches Mittel, welches man am Ende
 der Behandlung wiederholt.

F. Auszug durch Wasser.

Infusum Sennae s. Sennae simplex
 (compositum Lon.). (Am. B. DD. Du.
 Ed. Fenn. Lon. LonN. Lus. RC. Suec. Br.
 C. Fi. Ra. T.)

℞. Foliorum Sennae mundatorum
 drachmas sex.

Aquae bullientis . . . semilibram.
 Macera per horam unam et cola.
 (B. Fenn. Suec.)

DD. et Ra. Foliorum unciam unam
 et duodecim Aquae.

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
 Anisi stellati pulverati

drachmam unam.
 Aquae bullientis uncias sedecim.
 Digere per horam unam in vase clau-
 so et post refrigerationem cola. (Lus.)

RC. Anisi vel Foeniculi semunciam,
 Cremoris Tartari drachmas duas et Aquae
 libram; — *Fi.* Foliorum uncias sex, Ani-
 si sesquiunciam, Cinnamomi drachmas
 duas, Aquae bullientis libras sex; — *T.*
 Sennae unciam unam, Anisi drachmas
 duas, Cinnamomi scrupulum unum,
 Aquae bullientis uncias sex, infusio-
 nem per horas octo.

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Zingiberis pulverati semidrachmam.
 Aquae bullientis uncias duodecim.
 Post unam horam macerationis cola.
 (Br.)

Am. Lon. LonN. et C. Sennae ses-
 quunciam, Zingiberis drachmam unam
 et Aquae octarium unum; — *Ed.* Sen-
 nae drachmas sex, Zingiberis scrupu-
 lum unum et Aquae uncias novem; —
 Am. Cremoris Tartari drachmas duas
 addit.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
 Cardamomi minoris

semidrachmam.
 Aquae bullientis quantum sufficit
 ut colaturae unciae sex obtineantur.
 Stent in digestionem per horam unam
 et post refrigerationem colentur. (Du.)
Caricend. in Fällen von hartnäckiger Ver-
 stopfung, oder wenn man eine Ableitung
 auf den Darmcanal machen will.

Syrupus Sennae s. Cassiae Sennae.
 (B. Bel. Bor4. Du. Ed. Fer. HassP.
 Lon. LonN. C. Fi. T. Vm.)

℞. Foliorum Sennae mundatorum
 uncias octo.

Aquae bullientis libras quatuor.
 Macera per horas duas, cola expri-
 mendo et colaturae depositione depu-
 ratae adde

Sacchari albi . . . libras tres.
 Fiat blando igne syrupus. (B. Bel.)
 Du. Sennae semunciam, Aquae fer-
 ventis libram unam, duodecim horas
 macerationis, Sacchari et Mannae, sin-
 gulorum libram unam.

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas.
 Aquae bullientis . . . sesquilibrium.

Macera per horas quatuor in vase
 tecto, cola et adde

Sacchari liquidi (melasse)
 uncias octo.

Coque leni igne ad syrupi (melasse)
 consistentiam. (Ed.)

Fi. Sennae unciam unam, Aquae bul-
 lientis libram unam, infusionem per
 horas duodecim et Sacchari libram
 unam; — *T.* Sennae et Aquae ead-
 dem quantitates, infusionem ad ebul-
 litionem usque et Sacchari duplum
 pondus.

℞. Foliorum Sennae,
 Aquae frigidae,

singulorum partem unam.
 Macera per tres horas et adde

Aquae bullientis . . . partes tres.
 Post refrigerationem cola, leviter ex-
 primendo, et adde

Sacchari albi . . . partes quatuor.
 Inspissa et despuma. (Vm.)

℞. Foliorum Sennae . . . semunciam.
 Aquae bullientis octarium unum.

Macera per horas duodecim et adde
 Mannae,

Sacchari, singulorum libram unam.
 Fiat syrupus. (C.)

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas.
 Foeniculi contasi . . . unciam unam.
 Aquae bullientis . . . octarium unum.
 Post horam unam macerationis, blan-
 do calore, cola et adde
 Mannae uncias tres.
 Sacchari libram unam.
 Coque sufficienter. (Lon. LonN.)
 Fer. Sennae uncias quatuor, Foeni-
 culi drachmas duas, Aquae bullientis
 libras duas, Mannae uncias sex et Sac-
 chari libras duas; — Bor4 loco foe-
 niculi Anisi semunciam, digestionem
 per horas aliquot et in liquoris expres-
 si et colati uncis viginti solvere Sac-
 chari libras tres absque manna, cae-
 terum ut Fer.
*Infusum Sennae cum Succo Citri s. ci-
 tratum.* (Gen. Suec.)
 ℞. Foliorum Sennae . . . drachmas sex.
 Aquae bullientis . . . semilibram.
 Macera per horam unam, cola et
 colaturae adde
 Succi Citri semunciam.
 Misce. (Suec.)
 ℞. Foliorum Sennae . . . sesquiunciam.
 Corticis recentis Citri,
 Succi Citri,
 singulorum¹ unciam unam.
 Aquae bullientis libram unam.
 Digere et post refrigerationem cola.
 (Gen.)
Decoctum Prunorum cum Senna. (A*.)
 ℞. Foliorum Sennae . . . unciam unam.
 Prunorum semilibram.
 Aquae libras duas.
 Digere per noctem inter cineres ca-
 lidos et cola.
 Ein gelindes Exirrmittel, welches von
 Lieutaud empfohlen wird.
*Syrupus Pomorum s. de Pomis com-
 positus s. solutivus.* (Gal. Sar.)
 ℞. Succi Pomorum fermentati
 libras quatuor.
 Foliorum Sennae mundatorum un-
 cias quatuor cum dimidia.
 Digere per noctem; altero mane co-
 la exprimendo et adde
 Sacchari albi libras tres.
 Clarifica et coque ad syrupi consi-
 stentiam. (Sar.)
 ℞. Foliorum Sennae mundatorum
 semilibram.
 Seminum Foeniculi unciam unam.
 Caryophyllorum drachmam unam.
 Succi depurati Pomorum Reinette
 dictorum libras quatuor.
 — — Boraginis,
 — — Buglossi,
 singulorum libras tres.
 Pharmacopoea universalis, II.

Infunde per horas viginti quatuor,
 tunc leviter coque, cola et exprime;
 residuum iterum coque cum
 Aquae communis libris quatuor.
 Ad dimidium evaporata cola expri-
 mendo, colaturas ambas comisce et
 in iis solve
 Sacchari albi libras quatuor.
 Coque ad consistentiam syrapi, quem
 adhuc ferventem supra
 Seminum Foeniculi,
 Caryophyllorum,
 singulorum sesquidrachmam.
 linteo inclusa infunde et per horas sex
 digere (Gal.)
Decoctum antihæmorrhoidale. (Vm.)
 ℞. Foliorum Sennae . . . unciam unam.
 Aquae uncias duas.
 Post unam horam infusionis adde
 Aquae uncias sedecim.
 Calefac per temporis momentum,
 cola et colaturae adde
 Passularum minorum,
 Sacchari crudi,
 singulorum uncias duas.
 Anisi drachmam unam.
 Post refrigerationem cola et liquori
 sepositione depurato adde
 Rhei,
 Cremoris Tartari,
 singulorum drachmam unam.
*Syrupus Sennae compositus s. Rhei
 cum Senna.* (Am. C. Sw. Vm.)
 ℞. Foliorum Sennae mundatorum
 uncias duas.
 Rhei semunciam.
 Coriandri drachmas duas.
 Aquae bullientis
 uncias quatuordecim.
 Infunde in vase tecto, post refrige-
 rationem cola et colaturae adde
 Mannae uncias quatuor.
 Sacchari albi uncias viginti.
 Despuma et per cribrum setaceum
 trajice. (Sw.)
 ℞. Rhei;
 Sennae, singulorum sesquiunciam.
 Cardamomi drachmas tres.
 Aquae bullientis octarium unum.
 Digere per horas viginti quatuor et
 evaporatione ad dimidium consumptis
 adde
 Sacchari libram unam.
 Fiat syrupus. (Am. C.)
 ℞. Syrupi Sennae . . . partes quatuor,
 — Rhei partes duas.
 — Cinnamomi partem unam
 Misce (Vm.)
*Infusum Sennae et Tamarindi s. com-
 positum s. tamarindatum s. tamarindi-
 narum s. cum Tamarindo.* (Am. Du.
 Ed. Suec. C. Fi. T.)
 ℞. Foliorum Sennae drachmam unam.

Tamarindorum . unciam unam.
 Coriandri . . . drachmam unam.
 Sacchari . . . semunciam.
 Aquae bullientis . . . uncias octo.
 Macera, subinde agitando, per horas
 quatuor. (Am. Du. Ed. C.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Aquae bullientis . . . semilibram.
 Macera per horam unam, cola et
 colaturae adde

Pulpae Tamarindorum semunciam.
 Dissolve. (Suéc.)

℞i. et T. Folia et Pulpam cum Aqua
 bulliente (omnium copiam eandem ut
 Suéc.) per horam infundere et filtrare
 jument.

*Aqua s. Potio laxativa s. Viennensis,
 Infusum laxativum simplex s. Viennense,
 Infusum Sennae compositum sine aro-
 matibus s. Foliorum Cassiae Sennae
 compositum, Decoctum laxativum Vien-
 nense, Infusum Sennae tartarisatum s. cum
 Manna, Pitiana laxativa s. passulata,
 Infusum Sennae laxativum s. purgans,
 Tisana regia. (A. Am. An. Ba. Bor.
 BorC. Bor4. Br. D. DD. Fer. Ful. Gal.
 GalM. Gen. Ham. Han. HassP. Li.
 Lus. Pal. RC. Sar. Sax. Suéc. Ho. C.
 Ca. E. Fi. ParC. Sa. Sp. Sw. T. Ym.)*

1) Dñne ein Galz.

℞. Foliorum Sennae partem unam.
 Aquae bullientis . . . partes octo.
 Infunde per semihoram, tunc in infuso
 dissolve

Mannae . . . partem unam.
 Ham. his coquere jubet Sennae par-
 tes tres in Aquae triginta sex et cola-
 turis ambabus addere Mannae partes
 octo; — Sax. infundere Sennae par-
 tem unam in Aquae octo et addere
 Mannae partem unam cum dimidia.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
 Mannae . . . uncias duas.
 Fructum Citri . . . no. 1.
 Aquae tepidae . . . uncias octo.
 Infunde per horas duodecim et cola.
 (Fer.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Cardamomi minoris

drachmas duas.
 Aquae bullientis octarium unum.
 Infunde per semihoram et cola. (E.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Mannae . . . unciam unam.
 Rhei,

Cardamomi minoris,
 singulorum drachmas duas.

Aquae bullientis octarium unum.
 Infunde per horam unam. (E.)

℞. Foliorum Sennae sesquunciam.
 Coriandri . . . drachmas duas.

Aquae communis uncias sedecim.
 Digere per horam unam, ignem fere

ad bullitionem usque augendo; cola et in
 unciis quatuordecim colaturae dissolve
 Mannae . . . uncias quatuor.
 Cola, sepone et sedulo decantha.

(An.)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
 Passularum minorum semunciam.
 Corticis Aurantiorum

scrupulos duos.
 Aquae bullientis . . . uncias sex.
 Ebulliant semel, tunc per sexagesi-
 mas decem digesta, leni cum expressio-
 ne colentur. (Ful.)

℞. Sennae . . . uncias duas.
 Mannae . . . uncias quinque.
 Aquae bullientis

uncias viginti octo.
 Digere blando calore, per horas sex,
 cola et colaturae adde

Aetheris sulphurici drachmas duas.
 Misce bene. (Li.)

2) Mit Weinsteinrahm.

℞. Foliorum Sennae . . . uncias duas.
 Cremoris Tartari . . . semunciam.
 Aquae bullientis . . . libras duas.
 Macera per horas sex et cola leviter
 exprimendo. (Sax.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Cremoris Tartari drachmam unam.
 Aquae bullientis . . . uncias sex.
 Post horae quadrantem infusionis
 cola exprimendo et in colatura solve
 Mannae electae . . . unciam unam.
 Sepone et decantha. (A.)

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
 Cremoris Tartari drachmam unam.
 Anisi stellati . . . semidrachmam.
 Aquae bullientis . . . uncias sex.
 Digere per horam unam, cola et co-
 laturae adde
 Mannae . . . uncias duas.
 Dissolve blando igne, sepone et de-
 cantha. (Lus.)

RC. Foliorum sesquunciam, Anisi
 vel Foeniculi semunciam, Cremoris
 drachmas duas, Aquae libram unam,
 absque manna; — Fer. Sennae drach-
 mas tres, Cremoris Tartari drachmam
 unam, Anisi stellati scrupulum unum,
 Aquae uncias sex et Mannae unciam
 unam; — Am. et C. Sennae sesqui-
 unciam, Cremoris Tartari drachmas
 duas, Zingiberis drachmam unam et
 Aquae bullientis octarium unum; —
 Ft. T. Foliorum drachmas sex, Cremo-
 ris unam, Aquae bullientis uncias sex,
 post 1, 5 vel 20 sexagesimas infusio-
 nis, filtrare, addere Mannae unciam
 unam, et clarificare albuminis ope.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
 Cremoris Tartari drachmam unam.

Passularum minorum . . . drachmas tres.
 Zingiberis albi scrupulum unum.
 Aquae bullientis uncias quatuor.
 Post horas viginti quatuor digestionis cola exprimendo et in colatura solve

Mannae electae . . . unciam unam.
 Clarifica albuminis ope. (Wir.)
 R. Foliorum Sennae . . . uncias tres.
 Passularum minorum sesquiunciam.
 Coriandri . . . drachmas duas.
 Cremoris Tartari . . . semunciam.
 Aquae bullientis . . .
 libras duas cum dimidia.
 Macera per horam unam, cola exprimendo et colaturae adde

Mannae electae . . . uncias octo.
 Solutionem iterum cola. (Han.)
 HassP. Sennae partes sex, Passularum tres, Cremoris unam, Coriandri dimidiam, Aquae fervidae sexaginta octo et Mannae sedecim; — Pal. Wir. Ca. Sp. et Vm. eandem indicant formulam, sed Radicis Polypodii drachmas tres addunt.

3) Mit Weinsteinfall.

R. Foliorum Sennae sesquiunciam.
 Zingiberis,
 Corticis Citri,
 singulorum drachmam unam.
 Aquae communis uncias duodecim.
 Alcoholis tenuis uncias quatuor.
 Macera per dies octo, subinde agitand, cola et singulis unciis tribus adde Mannae unciam unam, vel Tartratis Potassae sesquidrachmam, vel Electuarii Scammonii drachmam unam. (Sa.)

R. Foliorum Sennae . . .
 drachmas tres ad quatuor.
 Cardamomi minoris . . .
 drachmam unam.
 Tartratis Potassae drachmas sex.
 Aquae bullientis . . . uncias sex.
 Digere per horas duas et colaturae adde

Syrupi Sacchari unciam unam.
 Mische bene. (Sw.)
 R. Foliorum Sennae sesquiunciam.
 Passularum minorum . . .
 drachmas sex.
 Coriandri . . . drachmas duas.
 Tartratis Potassae . . .
 drachmas quinque.

Aquae bullientis . . .
 uncias viginti quatuor.
 Post aliquot horas digestionis coque leviter, cola exprimendo et colaturae unciis quatuordecim adde
 Mannae . . . uncias quinque.
 Cola iterum. (D. Suec.)
 Br. Sennae sesquiunciam, Passula-

rum tantidem, Coriandri, Tartari solubilis, singulorum semunciam et Mannae uncias quatuor.

R. Foliorum Sennae drachmas sex.
 Corticis recentis Citri,
 Tartratis Potassae,
 singulorum drachmas tres.
 Succu Citri . . . semunciam.
 Aquae bullientis . . . uncias octo.
 Post refrigerationem cola et colaturae adde
 Mannae electae drachmas decem.
 Solutionem iterum cola et adde
 Aetheris sulphurici guttas octo.
 Mische bene. (Wür.)

4) Mit weinsteinsäurem Natron.

R. Foliorum Sennae . . . semunciam.
 Aquae bullientis, uncias quatuor.
 Post horam dimidiam cola exprimendo et in colatura solve
 Tartari natronati drachmas duas.
 Mannae . . . drachmas sex.
 Cola iterum. (Bor.)
 Bor4. Tartari natronati semunciam et Elaeosacchari Citri drachmam unam.

5) Mit Glaubersalz.

R. Foliorum Sennae drachmas duas.
 Aquae bullientis uncias quatuor.
 Post horam dimidiam cola exprimendo et in colatura solve
 Natri sulphurici drachmas sex.
 Mellis puri . . . semunciam.
 Cola iterum. (BorC. WW.)
 R. Foliorum Sennae,
 Sulphatis Sodae,
 singulorum drachmas quatuor.
 Anisi . . . drachmam unam.
 Infusi calidi Cichorii . . .
 octarium unum.

Post horas duodecim infusionis cola. (ParC.)

R. Foliorum Sennae,
 Sulphatis Sodae,
 singulorum semunciam.

Anisi,
 Coriandri,
 singulorum drachmam unam.
 Foliorum concisiorum Gerefolii,
 — — Pimpinellae,
 singulorum semunciam.
 Aquae frigidae . . . libras duas,
 Fructum Citri in taleolas concisum
 no. 1.

Macera per horas viginti, subinde agitand; cola leviter exprimendo et filtra. (Gal.)

R. Tamarindorum . . . unciis duas.
 Foliorum Sennae,
 Sulphatis Sodae,
 singulorum drachmas quatuor
 Anisi,

Coriandri,
Cerefolii,
Pimpinellae,

singulorum pugillum unum.
Aeque bullientis octarium unum.
Infunde per semihoram et cola. (Bo.

Ca.)

℞. Foliorum Sennae partes quindecim.
— Cichorii partes decem.

Sulphatis Sodae
partes decem vel viginti.

Aeque bullientis quantum sufficit.
Post horas al'quot infusionis cola exprimendo et adde

Aeque Citri aromatica
partes triginta.

Misce bene (GalM.).

℞. Infusi Foliorum Sennae
uncias octo.

Sulphatis Sodae vel Magnesia
drachmas tres.

Mellis crudi . . . drachmas duas.

Liqua. (DD.)

6) Mit Bittersalz.

℞. Passularum minorum uncias duas.
Foliorum Sennae . . . semunciam.

Aeque . . . quantum sufficit
ut libra una decocti vel infusi obtineatur; colaturae adde

Salis cathartici amari semunciam.
Dissolve. (Gen.)

Alle diese Aufgüsse führen, je nach den verschiedenen Fällen oder der Anwendungsweise gelinder oder stärker ab. Die Gabe ist je nach den Formeln verschieden, im Allgemeinen von drei bis sechs Unzen. Auch die folgenden gehören eigentlich hierher.

Potio purgans s. laxans. (Gal. GalM.
Hass. HassP. Li. Wür. Au. Bo. Huf.
Pie. Ra. Sa. Sm. Sw.)

1) Ohne ein Salz.

℞. Foliorum Sennae . . . semunciam.
Aeque bullientis quantum sufficit
ut semilibra colaturae obtineatur. Post

horae quadrantem infusionis adde

Tincturae Aurantium; (sesquidrachmam HassP.)

Syrupi Cerasorum,
singulorum semunciam.

Misce bene. (Hass. HassP.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.

Aeque frigidae quantum sufficit
ad humectanda folia. Post horas duas
adde

Aeque bullientis quantum sufficit
ut exprimendo colaturae unciae sex
obtineantur; cola liquorem refrigeratum
et adde

Syrupi Sacchari . . . unciam unam.
Tincturae Corticum Aurantium
semunciam.

Misce. (Sw*.)

℞. Infusi Sennae . . . uncias tres.
Aeque Piperis Jamaicaensis
semunciam.

Syrupi Rhamni . . . unciam unam.

Misce. (Sa.)

℞. Mannae uncias duas cum dimidia.
Folliculorum Sennae drachmas duas.

Tamarindorum . . . semunciam.

Florum Persicae pugillum unum.

Aeque fontanae . . . vitram unum.

Infunde. (Pie.)

℞. Foliorum Sennae drachmam unam.

Rhei . . . semidrachmam.

Florum Persicae semipugillum,

Decocti Polygodii querni
uncias octo.

Coque leviter, cola exprimendo et
colaturae adde

Mannae . . . uncias duas.

Solutionem iterum cola. (Pie.)

℞. Mannae uncias duas cum dimidia.
Folliculorum Sennae
drachmas duas.

Tamarindorum . . . drachmas sex.

Florum Persicae pugillum unum.

Corticis Atrantii amari
semidrachmam.

Coffeae Mokkaënsis drachmas duas.

Aeque fontanae quantum sufficit.

Fiat infusum. (Pie.)

2) Mit weinsteinsäurem Kalk.

℞. Foliorum Sennae . . . semunciam.

Foeniculi . . . drachmam unam.

Aeque . . . quantum sufficit

ut infusi unciae duae cum dimidia obtineantur; colaturae adde

Mannae . . . unciam unam.

Cremoris Tartari drachmam unam.

Dissolve. (Au.)

℞. Sennae mundatae,

Rhei,
Cremoris Tartari,
singulorum drachmam unam.

Aeque . . . quantum sufficit.

Coque ad unciarum quatuor colaturam et adde

Mannae . . . sesquiunciam.

Infusi Florum Persicae
unciam unam.

Misce bene. (Pie.)

℞. Corticis Aurantii siccati,

Foliorum Sennae,
singulorum drachmam unam.

Cremoris Tartari drachmas duas.

Salis Se'gnetti . . . drachmas sex.

Aeque communis . . . uncias octo.

Digere, blando calore, per horam unam et adde

Pulpae Tamarindorum uncias duas.

Cola exprimendo. (Sa.)

℞. Sennae, . . .

Tartratis Potassae et Sodae,
singulorum drachmas duas.
Mannae uncias duas.
Aquae uncias quatuor.
Fiat infusum, cujus colaturae, pro re
nata, adde Chinæ drachmam unam,
Syrupi Florum Persicae unciam unam
vel Jalapae pulveratae grana octo. (Ra.)
℞. Rhei drachmam unam.
Foliorum Sennae drachmas duas.
Salis Seignetti semunciam.
Aquae quantum sufficit
ut decocti unciæ sex obtineantur; colaturae adde
Mannae uncias duas.
Dissolve. (Au.)
℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Corticis recentis Citri,
Tartratis neutralis Potassae,
singulorum drachmas tres.
Succi Citri semunciam.
Rhei drachmas duas.
Aquae bullientis uncias octo.
Infunde et post refrigerationem cola;
colaturae adde
Mannae drachmas decem.
Solutionem cola et adde
Aetheris sulphurici guttas octo.
Misce bene. (Wür.)
3) Mit Bittersalz.
℞. Folliculorum Sennae,
Sulphatis Magnesiaë,
singulorum drachmas duas.
Tamarindorum semunciam.
Mannae uncias duas.
Aquae quantum sufficit
ut infusi vitrum unum obtineatur. (Bo.)
℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias tres.
Post horam unam macerationis colaturae
adde
Sulphatis Magnesiaë drachmas tres.
Tincturae Sennae semunciam.
Misce bene. (Sw.)
℞. Sennae drachmas tres.
Sulphatis Magnesiaë semunciam.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Succi Citri drachmam unam.
Aquae uncias octo.
Fiat infusio. (Ra.)
℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Salis Epsomensis drachmas tres.
Aquae vitrum unum.
Infunde per semihoram inter cineres
calidos et sub finem adde
Mannae uncias duas cum dimidia.
Essentiae Citri quantum sufficit.
Misce. (Pie.)
℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Rhei drachmam unam.
Salis Epsomensis drachmas tres.
Florum Persicae pugillos duos.
Mannae uncias duas.

Aquae quantum sufficit.
Fiat infusio. (Pie.)
℞. Folliculorum Sennae,
Salis Epsomensis,
singulorum drachmas duas.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Tartari stibiati granum unum.
Aquae quantum sufficit.
Fiat infusio. (Pie.)
4) Mit Glaubersalz.
℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Sulphatis Sodae semunciam.
Syrupi Rhamni unciam unam.
Aquae uncias quatuor.
Fiat infusio. (GalM. Ra.)
℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Sulphatis Sodae
drachmas duas cum dimidia.
Mannae uncias duas.
Infusi Cichorii uncias sex.
Fiat infusio. (Ra.)
℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae uncias quatuor.
Panlulum coque et colaturae adde
Sulphatis Sodae unciam unam.
Syrupi Ribium uncias duas.
Misce. (Li.)
Huf. Sennae drachmas duas, Aquae
bullientis uncias quatuor, horæ qua-
drantem infusionis, Sulphatis Sodae
semunciam et Mannae tant dem.
℞. Sennae mundatae,
Sulphatis Sodae,
singulorum drachmas duas.
Aquae bullientis vitrum unum.
Colaturae adde
Mannae in lacrymis uncias duas.
Syrupi Cichorii compositi
unciam unam
et post refrigerationem
Essentiae Anisi guttas tres.
Misce. (Sm.)
℞. Foliorum Sennae uncias duas.
Sulphatis Sodae drachmas duas.
Aquae uncias quatuor.
Pulveris Jalapae
grana viginti quatuor.
Infunde et colaturae pulverem adde.
(Ra.)
℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Subcarbonatis Sodae crystallisati
semidrachmam.
Aquae destillatae uncias sex.
Infunde frigide per horas duodecim,
cola et adde
Acidi sulphurici guttas viginti ad
viginti quatuor.
Post effervescentiam adde
Syrupi de Cichorio compositi
uncias quatuor.
Jalapae pulveratae cum duplo Sac-
chari contritae grana duodecim
ad viginti quatuor.

Aquae Cinnamomi quantum sufficit.
 Misc. (Pie.)
 ℞. Foliorum Sennae,
 Sulphatis Sodae,
 singulorum drachmas duas.
 Rhei semidrachmam.
 Mannae sesquiunciam.
 Aquae quantum sufficit.
 Fiat infusum vel decoctum. (Gal.)
 Der Aufguß wird bereitet, indem man die genannten Substanzen acht Stunden lang in fünf Unzen kochendem oder dieselbe Quantität zwölf Stunden lang in kaltem Wasser stehen läßt; die Abkochung, indem man die Rhubarber und Senna mit so viel Wasser kochen läßt, daß die Colatur fünf Unzen beträgt, worin man dann das Salz und die Wanne auflöst. Man kann die Abkochung abklären, daß man sie zwei Minuten lang mit einem zu Schaum geschlagenen Eiweiß kochen läßt, indem man der Flüssigkeit, wenn sie in's Kochen kommen will, zwei Drachmen Zitronensaft zusetzt, hierauf sie vom Feuer nimmt und filtrirt.

℞. Folliculorum Sennae drachmas tres.
 Rhei drachmam unam.
 Ipecacuanhae grana decem.
 Aquae quantum sufficit.
 Coque et adde
 Mannae,
 Sulphatis Sodae,
 singulorum drachmas duas.
 Liquorem cola. (Pie.)

Clyster s. Enema laxans s. purgans.
 (GalM. ParC. Ra.)

℞. Sennae uncias duas.
 Aquae libram unam.
 Coque et cola. (Ra.) — Addere potes Sulphatis Sodae semunciam et Mellis communis uncias tres vel quatuor.

ParC. Sennae drachmas quatuor,
 Aquae libram unam et Mellis Mercurialis annuae uncias duas.

℞. Sennae drachmas quatuor.
 Sulphatis Sodae drachmas sex.
 Aquae quantum sufficit.
 Fiat decoctum. (GalM.) — Adduntur si necesse est Tartari stibiati grana duo vel tria.

Potio purgans vermifuga. (Pie. Sm.)
 ℞. Sennae mundatae drachmas duas.
 Coffeae tostae pulveratae
 pugillos duos.
 Lactis,
 Aquae, singulorum quantum sufficit.
 Coque et cola. (Pie.)

℞. Sennae mundatae
 drachmas duas ad quatuor.
 Helminthochortos drachmam unam.

Fructum Citri in taleolas concisum no. 1.
 Mannae uncias duas.
 Aquae bullientis vitrum unum.
 Post duodecim horas infusionis cola.
 (Sm.)

℞. Sennae mundatae
 drachmas duas ad tres.
 Seminis Contra pugillum unum.
 Subcarbonatis Potassae
 drachmam unam.
 Aquae fontanae uncias duodecim.
 Post horas duodecim infusionis inter
 ciueres calidos adde
 Mannae uncias duas.
 Tartari stibiati grana duo.
 Cola. (Pie.)

Potio purgans camphorata. (DD.)
 ℞. Infusi laxativi (DD.) uncias duas.
 Mixturae camphoratae acidae
 uncias sex.

Misce.

Julep diartararum. (Bo.)

℞. Sennae mundatae uncias sex.
 Zingiberis,
 Galangae,
 singulorum drachmas tres.
 Infusi Rosarum pallidarum
 libras tres.
 Infunde in balneo aquae tepido, per
 horas viginti quatuor in vase tecto,
 tunc parumper coque; cola, clarifica
 et adde
 Sacchari albi uncias octo.
 Cremoris Tartari semunciam.
 Olei Anisi semiscrupulum.
 Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus vermifugus et purgans. (Ca.)
 ℞. Sennae mundatae semilibram.
 Seminum Cinae,
 Helminthochortos,
 Rhei, singulorum uncias quatuor.
 Corticis Aurantiorum unciam unam.
 Cinnamomi uncias duas.
 Sacchari libras viginti sex.
 Gabe, eine bis anberthalb Unzen.

Potio purgans et febrifuga. (Bo.)

℞. Chinae,
 Folliculorum Sennae,
 Cremoris Tartari,
 singulorum drachmas duas.
 Mannae uncias duas cum dimidia.
 Florum Chamomillae
 pugillum unum.
 Aquae vitrum unum.
 Infunde et in infuso solve
 Tartari stibiati granum unum.

Apozema purgans. (Gal. Ca.)
 ℞. Foliorum recentium Cichorii,

Foliorum recentium *Englossi*,
 — *Boraginis*,
 singulorum unciam unam.
 Sulphatis Sodae . . . semunciam.
 Foliorum Sennae mundatorum
 drachmas duas.
 Aquae bullientis . . . libras duas.
 Infunde per horam unam, cola et
 colaturae adde
 Syrupi Sennae . . . unciam unam.
 Misce bene. (Gal.)
 ℞. Foliorum Cichorii,
 — Taraxaci,
 — Parietariae,
 singulorum unciam unam.
 — Sennae drachmas tres.
 Sulphatis Sodae . . . semunciam,
 Pimpinellae,
 Cerefolii,
 Coriandri,
 singulorum pugillum unum.
 Aquae . . . libras duas.
 Coque leviter per horae quadrantem,
 cola et adde
 Syrupi Cichorii . . . uncias duas.
 Misce bene. (Ca.)
 Glasweise des Morgens bis zur erfolg-
 ten Wirkung.
Decoctum pectorale solutivum. (Vm.)
 ℞. Seminum Anisi . . . semidrachmam.
 Radicis Liquiritiae,
 Foliorum Hyssopi, . . . singulorum
 drachmam unam.
 — Sennae drachmas tres.
 Aquae . . . uncias sex.
 Infunde frigide, cola exprimendo et
 adde
 Syrupi Althaeae . . . unciam unam.
Decoctum antiaechecticum. (Sw. Sy.)
 ℞. Radicis et Foliorum recentium Ci-
 chorii,
 — — — — — Acetosae,
 — — — — — Fragariae,
 — — — — — Calcitrapae,
 — — — — — Violarum,
 Florum Nymphaeae albae,
 singulorum unciam unam.
 Petalorum Rosarum rubrarum
 uncias duas.
 Radicis Parietariae . . . semunciam.
 Aquae . . . libras duodecim.
 Decoque ad librarum octo remanen-
 tiam et liquori bullienti adde
 Foliorum Sennae uncias quatuor.
 Anisi,
 Nitri, singulorum semunciam.
 Post horas infusionis viginti quatuor
 cola.

Einschneidend und blutreinigend, bei
 Dysurie, Hämurie, kalten Geschwülsten,
 hartnäckigen venerischen Uebeln, Scro-
 pheln und chronischen Hautkrankheiten em-
 pfohlen. — Gabe, acht Unzen nüchtern in

vier Tagen und dann alle zwei Tage, drei
 Wochen hintereinander. Ist der Kr. stark,
 so kann man bis auf zehn und selbst zwölf
 Unzen steigen

Sericum.

*Sericum crudum, Serici folliculi; Sei-
 denbälglein, rothe Seide; Soie, Cocon de
 soie* (Gal.); Capullo de seda (His.).

Gal. His. Wir. G. Sp.

Ein eirunder Balg von dickem, sehr fei-
 nem Seidengewebe, meist von schön gelber,
 bisweilen weißer Farbe, welchen die Raupe
 des Seiden spinners (Bombyx Mori,
 L.), eines Nachtfalters (Nocturna, Bom-
 bycites, Latr.), welcher ursprünglich in
 Asien zu Hause ist, webt, um sich darin
 einzupuppen. (Roes. Ins. III. VII. IX.
 Bert. Bild. I. 5.)

S e r u m.

*Serum Lactis, Serum Lactis vacci-
 num; Molken; Petit-lait* (Gal.).

Der seröse, wässrige, von dem Käse und
 Fett geschiedene Theil der Milch.

Serum Lactis depuratum. (Fi T.)

℞. Seri Lactis vaccini recentis
 libram unam.

Albumen Ovi no. 1.
 Coque in vase cupreo, stanno obdu-
 cto et post despumationem cola.

T. Seri uncias viginti, Albumen Ovi
 cum seri circiter uncias duabus in
 spumam conversum, Cremoris Tartari
 grana aliquot vel Succu Limonum guttas
 aliquot coquere per pauca momenta et
 ab igne remotis immergere corticis Citri
 vel Limonum frustula aliquot.

Serum Lactis pulveratum. (B* Br.)

℞. Sacchari Lactis . . . drachmas duas.
 — albi . . . unciam unam.

Gummi Arabici . . . semidrachmam.
 Misce. — Solve, si requiritur, in
 Aqua.

Serum Lactis dulce Hoffmanni. (Br.)

℞. Lactis vaccini . . . quantum vis.
 Evaporet ad siccum in pelvi cuprea
 stanno bene obducta, blando igne et
 sub continua agitatione; partem oleo-
 sam, pulveri plerumque supernatantem
 separa, tunc adde Aquae bullientis ear-
 dem quantitatem quantum lactis adhi-
 bueras; coque parumper, blando igne
 et filtra.

Serum Lactis dulce s. sincerum. (B*
 Boré, Fer. Ful. Gal. Hass. His. Li.
 Lus. Suec.)

℞. Lactis bullientis . . . libram unam.
 Casei stomachi vitulini (présure),
 Aqua diluti . . . drachmam unam.

Coque, cola, adde Albumen Ovorum
 trium in spumam conversum; ebulliant
 semel, tunc per linteam trajice. (B*
 Fer. Ful. Hass.)

Bor4. Lactis vaccini recentis libras duas, Stomachi vitulini exsiccati et per horas sex Aquae communis frigidae uncias tribus immersi drachmam unam, una cum aqua maceratione adhibita, exponi leni calori et digere, donec coagulatio facta sit; liquorem decantha et cola.

R. Lactis vaccini . partes bis mille.
Casei stomachi vitulini Aquae pauxillo diluti

partes duas cum dimidia.

Supra cineres calidos ponantur et simulac lac coagulare coepit, ignem gradatim auge sed non ad bullitionem usque, ita ut pars caseosa magis magisque concreseat, serum deinde alii vasi infunde, coagulum vero craticulae vimineae imponatur, ut serum penitus exstillet, quod priori admisceatur. (Gal. Li. Lus. Suec.)

His loco coaguli e stomacho vitulino Flores Scolymi adhibet.

Serum Lactis dulcificatum. (Bor4.)

R. Lactis vaccini . . . libras tres.

Coque et sub initio bullitionis adde Tartari purati drachmam unam. Coagulatione perfecta liquorem semirefrigeratum cola et cum

Albuminis Ovorum in spumam reducti . . . sufficiente quantitate ad albuminis coagulationem usque coque. Colato adde

Concharum praeparatarum quantum ad neutralisationem acidi requiritur et filtra.

Serum Lactis chalybeatum. (Br.)

R. Seri Lactis . . . quantum vis. Exstingue in illo pluries Ferrum rubro exandescens et filtra deinde.

Serum Lactis vinosum. (Br. Ful. Hass. Li. Lus. Au. Br. E. Sa. Sm. Sw.)

R. Lactis vaccini . . . octarios duos. Vini albi aciduli . . . uncias octo. Coque simul, post coagulationem cola et clarifica. (Br. Ful. Hass. Sm.)

Li. Lactis partes tres et unam Vini; — **E.** Lactis semioctarium et Vini albi unciam unam ad duas.

R. Lactis vaccini,
Aquae, singulorum libras duas.
Vini Rhenani . . . sesquiunciam.
Coque simul, cola et post coagulationem clarifica. (Sw.)

R. Seri Lactis . . . uncias quatuor.
Vini albi . . . uncias octo.
Coque parumper, cola et Albuminis ope clarifica. (Sa)

Lus. et Sm. Lactis uncias octo et Vi-

ni libras duas; — **Au.** Seri Lactis libras tres et unam Vini.

Serum Lactis acidum s. tartarisatum. (B*. Bor4. Br. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. Suec. Ra. Sp. Vm.)

R. Lactis vaccini . . . octarios duos.

Cremoris Tartari scrupulos quatuor. Coque lac et deinde sal supersperge; ab igne remove et spatulae ope hic et illic ac lente liquorem agitando, sepone, et post refrigerationem per pannum laneum (Glanell) trajice, in colatura Albumen Ovi unius in spumam conversum prope ignem repone et simulac ebulliat, facibus sepositis superinfunde. (B*. Br. GalM. Hass. Sp. Vm.)

Li. Lactis partes octodecim et unam Cremoris Tartari; — Ful. Lactis triginta sex et unam Cremoris Tartari; — HassP. Lactis libras quatuor, Cremoris scrupulos quatuor usque sex, sero colato addere Albumen Ovorum no. 2, ebulliat deinde et filtratur; — Bor4. ut serum lactis dulcificatum sed absque conchis.

Loco cremoris tartari Acetum vel Succus Citri adhiberi potest. (Han. Hass. Ra.)

R. Seri Lactis . . . libras quatuor.
Albumina Ovorum . . . no. 3.
Cremoris Tartari

grana viginti quatuor. Subige albumina cum seri pauxillo, adde hujus quod restat, coque et simulac bullire incipiant, cremorem tartari sensim adde, liquorem agitando; tunc cola et filtra. (Gal. His. Lus. Suec.)

Serum Lactis aluminatum s. aluminosum. (Bor4. HassP. RC. Fi.)

Loco cremoris Aluminis crudi pulverati eadem copia adhibetur; — RC. Fi. Lactis libram unam, Aluminis drachmam unam.

Serum Lactis tamarindinatum. (Bor4.)

Loco cremoris Pulpae Tamarindorum uncia una adhibetur.

Serum Lactis acetosum. (RC. Sa. Sw.)

R. Lactis vaccini,
Aquae fontanae,
singulorum libras duas.

Coque et adde Aceti . . . sesquiunciam.

Postquam coagulum ortum est, cola. RC. Lactis, Aquae, singulorum libram unam, Acidi acetici impuri unciam unam; — Aceto substitui possunt subinde Cremoris Tartari drachmae duae vel Vini albi aciduli semilibra vel

pro re nata intercoquendum: Fractus Amylcae Indicae si praesto est, sequi quia vel Succo antiscorbutico unciarum duarum.

Serum Lactis compositum. (Bo.)

℞. Seri Lactis acidi
libras duas cum dimidia.
Succi recentis Citri unciam unam.
Conservae Rosarum vitriolatae
drachmas sex.

Misce.

Serum antiscorbuticum (Fi.)

℞. Lactis vaccini recentis
libram unam.
Succi antiscorbutici unciis quatuor.
Coque et post coagulationem cola. —
Dabe, drei bis sechs Unzen.

Sesamum.

Sesamum orientale, L.; Sesam; Sésame d'Orient (Gal.).

Am. Gal. His. RC. Wir. A. C. M. Sp.

⊙ (Didymia Angiospermia, L.; Bignoniaceae, J.) Eine Pflanze Syriens und Aegyptens. (Burm. Zeyl. t. 38. f. 1.)

Man wendet den Saamen, Sesam; Sesamum; *Σησαμύον*; Sésame (Gal.); Sesamum (Ang.); Sesam (Bel.); Sumsum (Ar.); Ellu (Can.); Tal (Guz.); Till (Hin.); Kunjid (Pa.); Taila (Sa.); Yellu (Tam.); Nuwálu (Tel.) an. Er ist eirund, gelb, ölig, von süßem, angenehmem Geschmack.

Oleum Sesami orientalis. (His. Pal. RC. T.)

℞. Seminum Sesami quantum vis. Contunde in mortario et exprime. (His.)

Pal. antequam prelo subjiciantur, semina paullo torrere jubet.

Seseli.

Unter diesem Namen werden in den Pharmacopöen drei Pflanzen angeführt:

1) *Tordylium officinale*, L.; Cretisches Seseli; Séséli de Crète (Gal.).

Br. His. Wir. Be. M. Sp. Z.

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze Südeuropas. (Zorn Ic. pl. t. 278.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (*radix Tordylii* s. *Seseli Cretici* s. *montani*) ist lang, dünn, faserig und weiß.

Der Saame ist lang, fast platt, rauh

anzufühlen, mit drei hervorstehenden Einen bezeichnet und mit einem weißen Ranke versehen. Er hat einen gewürzhaften Geruch und einen eben solchen aber schwachen Geschmack.

Reizend.

2) *Seseli tortuosum*, L.; büschelblättriges Seseli; Séséli de Marseille (Gal.); Comino de Marsella (Lus.).

Br. Gal. His. Wir. G. M.

♂ oder ♀ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze des südl. Europäischen. (Reyn. Bot. t. 313.)

Man wendet den Saamen (*semen Seseli* s. *Marsiliensis*) an; er ist langgestreckt, gestreift, grünl.lich, von gewürzhaftem Geruch und scharfem und gewürzhaftem Geschmack.

3) *Peucedanum Silaus*, L.; Silau, Mattensteinbrech; Séséli des prés, Saxifrage des Anglais (Gal.); Meadow sulphurwort (Ang.); Weld minuin (D.); Haair streng (Bel.).

Gal.

♀ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze Südeuropas. (Jacq. Fl. Austr. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (*radix Seselios pratensis* s. *Saxifragae Anglicae*) ist groß, dick, oft gabelig und unten mit einem Büschel Haare versehen.

Der Saame ist auf der einen Seite platt, auf der andern gewölbt und mit fünf Streifen bezeichnet. Geruch und Geschmack sind scharf und gewürzhaft.

Silene.

Von dieser Pflanzengattung finden sich zwei Arten in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Silene Otites*, Cand.; seßblebender Laubentropf; Silene Otites (Gal.); Field campion (Ang.).

Br. Wir.

♂ (Decandria Trigynia, L.; Caryophyllaeae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 518.)

Man wendet das Kraut (*herba Visca-ginis*) an; es besteht aus einem einfachen, flebrigen Stängel mit wenigen Blättern, von denen die untern spatelförmig, die obern lanzett- oder linienförmig sind. Es hat einen abstringirenden und etwas bitteren Geschmack.

2) *Silene Virginica*, L.; Virginischer Laubentropf; Silene de Virginie (Gal.).

C.

♀ Eine in Virginien einheimische Pflanze. Die Wurzel, welche man anwendet, gilt für ein Wurmmittel.

S i m a r u b a

Simaruba amara, Aublet; *Simarubae* rinde, Rührinde; *Simarouha* (*Gal.*); *Simaruba* (*His. I. Lus.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würt. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

Eine Baum (*Decandria Monogynia*, L.; *Simarubae*, *Cand.*) Südamerica's; (*Aubl. Guian. t. 331. 332. Lam. Ill. gen. t. 343. f. 2. Desc. Fl. méd. d. Ant. t. 14. Fl. méd. VI. 327.*)

Man wendet die Rinde (*cortex Simarubae*) an; sie besteht in langen, eingerollten, dünnen, biegsamen, zähen, faserigen, äußerlich gleichsam warzigen, blasgelben, inwendig gelblichgrauen, geruchlosen Stücken. Sie hat einen bitteren Geschmack.

Man nimmt fast immer die der Wurzel, selten die des Stängels.

Sie enthält, nach Morin, Quasskastoff, einen harzigen Stoff, ein flüchtiges Del, Aluminium, Kesselsäure, etwas Gallussäure und verschiedene Salze.

Tonisch, bei Wechselstiebern und Schleimflüssen aller Art. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zu einer halben Drachme.

Decoctum Simarubae s. Corticis Simarubae. (B*. Ful. GalM. Gen. Sa. Sw.)

R. Corticis Simarubae . semunciam.

Aquae . . . quantum sufficit ut post coctionem librae duae colaturae obtineantur. Coque per horae quadrantem. (GalM.)

B*. Corticis drachmas duas ad semunciam, Aquae libras duas ad remanentiam unciarum octo; — Sa. Radicis drachmas duas ad semunciam, Aquae sesquilibram ad librae unius remanentiam; — Sa. Radicis drachmas duas, Aquae libras duas ad dimidii remanentiam; — Gen. Radicis drachmas duas et Aquae libram unam ad unciarum duodecim remanentiam; — Ful. Corticis semunciam et Aquae libram unam ad octo unciarum remanentiam.

Gabe, eine Unze, alle zwei oder drei Stunden, oder vier Unzen täglich drei Mal. *Infusum Simarubae.* (B*. Lon. LonN. C. Fi. T.)

R. Corticis Simarubae semidrachmam.

Aquae bullientis . semioctarium.

Macera per horas duas in vase leviter tecto et cola.

T. Simarubae semidrachmam, Aquae bullientis uncias sex. — Bitter, gewürzhaft.

Hauustus adstringens, Patio adstringens. (B.)

R. Corticis Simarubae semunciam.

Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde

Emulsionis gummosae uncias duas.

Tincturae thebaicae guttas viginti.

Allmächtig zu nehmen, bei sogenannten atonischer Diarrhöe.

R. Corticis Simarubae . semunciam.

Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur.

Colaturae adde

Tincturae thebaicae . . . scrupulum unum.

Alepholis . . . unciam unam.

Aquae Cinnamomi . semunciam.

Wie den vorhergehenden Trant und in denselben Fällen zu nehmen.

S i n a p i s .

Man findet in den Pharmacopöen zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Sinapis alba*, L.; weißer Senf, Mostard; *Moutarde blanche* (*Gal.*);

Bor. D. Du. Ed. Gal. Han. Li. Pal. Wir. E. G. Sp.

⊙ (*Tetradynamia Siliquosa*, L.; *Cruciferae*, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn Ic. pl. t. 92*.)

Man wendet die Saamen (*semen Sinapis s. Sinapios albae s. Erucae*) an; sie sind klein, rund, gelblich, von flüchtigem Geruch und scharfem, bitterem Geschmack.

2) *Sinapis nigra*, L.; Senf; *Moutarde noire* (*Gal.*); *Mustard* (*Ang.*); *Senep* (*D.*); *Mostaro* (*His.*); *Mosterd* (*Bel.*); *Senapa*, *Senevra* (*I.*); *Gorczyca czarna* (*Lus.*); *Mostarda* (*Lus.*); *Senap* (*Succ.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würt. WW. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa. Sp.

⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw. t. 416. Plenck t. 524. Hayne Villf. t. 40. Düss. off. Pl. XIII. 22. Bert. Bild. II, 77. f. 1. Zorn Ic. pl. t. 162.*)

Man wendet den Saamen (*semen Sinapis s. Sinapios nigrae s. Erucae nigrae*) an; er ist sehr klein, rundlich, schwarz, oder schwärzlichbraun, von flüchtigem Geruch und scharfem, bitterem Geschmack.

Beide Arten Saamen sind stark reizend.

Man zählt sie zu den antiscorbutischen Mitteln. — Henry und Barron haben in denselben Schwefelsäure gefunden, welche mit der Schwefelsäure Aehnlichkeit hat, aber sich durch ihre Grundbestandtheile unterscheidet.

Unguentum Sinapis. (Au.)

℞. Seminum Sinapis . . . uncias tres.
 Olei Amygdalarum . . . semunciam.
 Sacca Citri . . . quantum sufficit.
 Non sponat bei Epymosen geröht.
 Boll ad paralysis s. stimulant. (Ca.
 Sa. Sw.)

℞. Seminum Sinapis semidrachmam.
 Carvi,
 Cinnamomi,

singulorum grana quatuor.

Zingiberis . . . grana duo.

Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiat holum. (Sa.)

Ca. et Sw. misso zingibere Syru-
 pum Zingiberis loco simplicis adhi-
 bent.

Zwei Mal täglich, bei Eßmung.

Electuarium antiscorbuticum. (Vm.)

℞. Pulveris Cinnamomi,

— Sinapis,

singulorum partes unam.

Carticis, Aurantiorum,

Extracti Trifolij

singulorum partes duas.

Conservae Beccabungae,

— Armoraciae,

— Cochleariae,

— Nasturtii,

singulorum partes tres.

Misce sedulo.

Cataplasma epispasticum s. Sinapis s. Sinapeos, Linimentum rubefaciens, Sinapisinus, Sinapismus irritans. (Bor4. Br. DD. Du. Per. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Lon. LonN. Lus. RC. Sax. WW. Au. Br. C. Ca. E. Fi. ParC. Ra. Sa. Sw. T. Vm.)

℞. Seminum Sinapis grossiuscule pul-
 veratorum . . . quantum vis.

Aceti . . . quantum sufficit

ut pasta satis spissa fiat. (DD. Gal.
 GalM. Han. Ca. E. ParC. Ra.)

HassP. Pulveris Sinapis partes quin-
 que, Aceti crudi tres.

Die Quantität des Senfs wechselt von
 anderthalb bis vier Unzen.

℞. Farinae Sinapis,

Micæ Panis,

singulorum partes aequales.

Aceti . . . quantum sufficit

ut fiat pasta mediocri consistientiae,
 (Lus. Br.)

Sw. et Vm. Sinapis partem unam,
 Fermenti duas et Aceti calidi quanti-
 tatem sufficientem.

℞. Fermenti,

Farinae Sinapis,

singulorum partes aequales.

Aceti simplicis vel scillitici

quantum satis

ut fiat puls spissa. (Sax.)

Ra. Fermenti partes quatuor et unam
 Sinapis; — Fi. T. Fermenti uncias
 quatuor, Sinapis duas, Aceti quantum
 satis.

℞. Farinae Sinapis,

— Seminis Lini,

singulorum semilibram.

Aceti . . . quantum sufficit.

Commisce. (Lon. LonN.)

Ra. Cataplastnatis Farinae Lini un-
 cias quatuor et Farinae Sinapis sem-
 unciam; — Du. et C. Sinapis, Micæ

Panis, singulorum semilibram, Aceti

sufficientem quantitatem et si requiri-
 tur Armoraciae uncias duas; — WW.

Farinae secalitiae partes quatuor, Si-
 napis duas et Aceti sufficientem quan-
 titatem; — Bor4. Farinae Sinapis un-

ciam unam, Farinae Secalis semun-
 ciam, Aceti quantum satis, ut fiat em-
 plastrum mollioris consistientiae; —

Sw. Farinae secalitiae partes duas, Si-
 napis tantidem et Aquae sufficientem

quantitatem; — Sa. Farinae triticeae,
 Farinae Sinapis, singulorum partes duas

et Aceti sufficientem quantitatem; —

RC. Sinapis, Farinae avenaceae, vel

triticeae, vel Micæ Panis, vel Per-
 menti, singulorum partes aequales,

Aceti quantum satis.

℞. Farinae avenaceae uncias quatuor.

Aceti . . . uncias sex.

Coque ad consistentiam cataplasma-
 tis, sub finem addendo

Pulveris Florum Sambuci

uncias tres.

— Seminum Sinapis

drachmas tres.

Misce. (Au.)

℞. Fermenti,

Radiois Armoraciae raseae,

Sinapis contusae,

singulorum sesquunciam.

Aceti . . . quantum sufficit.

Misce simul. (Han.)

GalH. et Sw. Farinae triticeae par-
 tes quatuor, Farinae Sinapis tantidem,
 Armoraciae unam et Aceti sufficientem

quantitatem.

℞. Fermenti,

Sinapis, singulorum uncias tres.

Piperis nigri contusi

unciam unam.

Aceti . . . quantum sufficit

ut fiat pasta. (Hass. HassP.)

Han. Sinapis sesquunciam, Piperis

drachmam unam, Armoraciae, Fermenti,
 singulorum unciam unam et Aceti suf-
 ficientem quantitatem; — Ca. Sinapis

semilibram, Piperis, Zingiberis, singu-
 lorum drachmam unam et Oxymellis

sufficientem quantitatem.

℞. Fermenti . . . uncias duas.

Serpentariae Virginicae drachmas tres.
 Foliorum Rorismariae semunciam.
 Cerevisiae levis libras octo.
 Macera frigida per dies duos et cola.

Gargarisma siagogum. (Sp.)

R. Aquae Angelicae,

— Hyssopi,

Singulorum uncias sex,
 Spiritus Cochleariae semunciam.

— Salis Ammoniaci

scrupulos quatuor.
 Pulveris Sinapis drachmam unam.
 Mellis rosati uncias quatuor.

Gargarisma adstringens. (Pfc.)

R. Seminum Sinapis drachmam unam.

Aceti rosati,

Sacchari albi,

singulorum unciam unam.

Aquae uncias tres.

Collutorium excitans. (B*.)

R. Pulveris Sinapis sesquidrachmam.

Aceti unciam unam.

Aquae fontanae uncias quatuor.

Sison.

Sison Amomum, L.; Deutsches Amomum; Amome faux (Gal.); Field hennwort (Ang.); Wssekko korenj (B.).

Gal. Wir. Wür. Sp. Z.

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Blackw. Herb. t. 442.)

Man wendet den Saamen (semen Sisonis Amomi) an; er ist klein, grau, gekielt, süß, von gewürzhaftem Geruch und Geschmack.

Reizend, für harntreibend gehalten.

Sisymbrium.

Sisymbrium Sophia, L.; Sophienkraut; Sagesse des chirurgiens (Gal.); Flixweed sisymbrium (Ang.); Barbierforstand (D.); Talicro (His.); Fjerkruud (Bel.); Talitro (I.); Herva Sophiae (Lus.); Stiltfræe (Juec.).

Gal. Wir. Be. M. Sp.

⊙ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Zorn Icon. pl. t. 339.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Sophiae chirurgorum) besteht aus einem runden, ästigen, etwas behaarten Stängel mit abwechselnden, in kleine Lappchen zerfallenen glatten Blättern.

Der Saame ist sehr klein, eiförmig, glatt

und köstlichbaum. Es hat ebenso, wie das Kraut, einen scharfen und brennenden Geschmack.

Reizend, gegen Scorbut.

Sium.

In den Pharmacopden findet man fünf Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Sium angustifolium, L.*; schmalblättriger Merf; Berle à feuilles étroites (Gal.); Narrow leav'd water parsnip (Ang.); Bernera de hoja angusta (His.); Smalbladiges wate reppe (Bel.). Gal.

♀ (Pentandria Monogynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Jacq. Fl. Austr. t. 67.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem hohlen Stängel mit eingeschnittenen, am Grunde fast gedörnten Blättern. Es hat einen bituminösen Geruch und einen bitteren, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, harntreibend.

2) *Sium latifolium, L.*; breitblättriger Merf; Berle à larges feuilles (Gal.). Gal.

♀ Eine Europäische Pflanze. (Moris. Hist. II. 9. t. 5. f. 1.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem hohlen Stängel mit gestielten, auslanzettigen, sägezahnigen Blättern bestehenden Blättern.

Diese Pflanze wird fast stets statt der vorigen angewendet.

3) *Sium nodiflorum, L.*; knotenblumiger Merf, kleiner Eppich; Berle nodiflore (Gal.); Creeping water parsnip (Ang.).

Du. C.

♀ Eine Europäische Pflanze. (Moris. Hist. II. 9. t. 5. f. 3.)

Man wendet das Kraut an; es besteht aus einem hohlen Stängel mit einfach gestielten Blättern, deren Blättchen lanzettförmig und gezähnt sind.

Harntreibend. — Nach Morison ist der ausgebrüchte Saft in verschiedenen Hautkrankheiten nützlich. Withering gab davon Erwachsenen Morgens drei oder vier Unzen, und jungen Personen drei Eßffel täglich zwei Mal.

4) *Sium Sisarum, L.*; Zuckerrüzelmerf; Berle Chervi (Gal.); Sisara, Chiriviva de quaresma (His.).

His.

♀ Eine Pflanze, welche in China zu Hause seyn soll. (Schk. t. 69. Moris. Hist. II. 9. t. 4. f. 8.)

Die Wurzel besteht aus mehreren länglichen, gerundeten; in ein Bündel verknüpften Knollen.

Der Saame ist eiförmig, glatt und gestreift.

Diese Pflanze soll gegen Mercurialkrankheit von Nutzen seyn.

5) *Sium Ninsi*, L.; Ninsing, Ninsingmerk; Ninsi (*Gal.*); Ninsiwortel (*Bel.*), *Br. Gal. Wir. G. M. Sp.*

4 Eine auf den Gebirgen China's wachsende Pflanze. (*Burm. Fl. Ind. t. 29. f. 1.*)

Man wendet die Wurzel (*radix Ninsi s. Ninsing s. Ninsini*) an; sie ist spindeiförmig, geringelt, weißlich, hornartig und halburchsichtig, oder gelblichbraun, ober undurchsichtig, je nachdem sie entweder in kochendem Wasser gebleicht und der Oberhaut beraubt ist oder nicht. Die Dicke ist verschieden, wie eine Schreiselfeder oder Kleinen Fingers dick. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher etwas bitteren Geschmack.

Die Chinesen schreiben dieser Wurzel fast wunderähnliche Kräfte zu, jedoch sind sie sehr beschränkt, und sie würde daher mehr unter die Schwengewächse zu verweisen seyn. übrigen kommt sie auch selten vor.

S o d i u m.

Von diesem an sich selbst in der Medicin ungebrauchlichen Metall wendet man folgende Zusammensetzungen an:

Protoxydum Sodii, *Soda caustica s. pura*; kausische, reine Soda.

§. I. Im flüssigen Zustande.

Lixivium causticum s. Sodae s. Sodae purae s. saponariorum, *Soda caustica fluida*, *Liquor Sodae concentratus*, *Liquor Natri caustici s. Hydratis natri*; Seifenstieberlauge; *Lessive des savonniers* (*Gal.*).

Bor4. Fer. GalH. GalM. Lus. Sax. Fl. Su. Vm.

R. Subcarbonatis Sodae partes duas. Calcis vivae . . . partem unam.

Coque cum Aquae sufficiente quantitate, cola lixivium et consume, donec vas octo drachmas Aquae communis continens draohmas undecim contineat et refrigeratum 36° Ar. indicet.

Bor4. ut liquorem kali caustici parari jubet; — *Fl.* Subcarbonatis partes tres, Calcis duas, caeterum ut potassam causticam.

§. II. Im festen Zustande.

Al. Fer. Br. Fl. Vm.

R. Lixivii Sodae causticae

quantum vis.

Evaporet in tantum, donec olei instar fluat et gutta una, corpori frigido infusa concreseat; infunde deinde supra laminam marmoream vel in fusoriata.

Die kausische Soda kann ebenso benützt werden, wie die Potasche.

Sapo Ceræ s. cereus. (*Vm.*)

R. Ceræ flavae . . . partes tres.

Liqua et adde

Sodae causticae liquidæ

partes duas.

Prope ignem relinque, agitare continuando, donec massa in aqua absque decompositione dissolubilis fiat.

Protoxysulphuretum Sodii, *Deutoxysulphuretum Sodii*, *Sulphuretum Protoxydi Sodii*, *Sulphuretum Sodat*, *Natrium sulphuratum.* (*Am. Fer. Br. C. Fl. Sw. T. Vm.*)

R. Florum Sulphuris,

Subcarbonatis Sodae,

singulorum partes aequales.

Liquata simul super igne gradatim aucto supra tabulam marmoream effunde et post refrigerationem in frustula minora diffrange. (*Am. Fer. Br. C. Fl.*)

Su. Sulphuris partem unam et duas Alkali mineralis.

R. Sulphuris in baculis partes tres.

Sodae causticae

partes septem cum dimidia.

Mixta liqua in retorta balneo arenae imposita. (*Vm.*)

T. Florum Sulphuris partes duas, Sodae causticae vel Carbonatis Sodae partes quatuor, caeter, ut sulphuret, potassae. *Ban Monz* nennt dieses *Sulphuretum simplex Sodae*. Die Formel zu seinem *Supersulphuretum Sodae* ist folgende:

R. Sulphuris in baculis

partes tres cum quadrante.

Sodae causticae fusae

partes quatuor.

Liqua in retorta vitrea balneo arenae gradatim calefaciendo imposita.

Die Eigenschaften des schwefelsauren Natron's oder der natriischen Schwefelleber sind dieselben, als die der kausischen. „Der Practiker, sagen *Fel* und *Chevallier*, sollte dieses Mittel immer der kausischen Schwefelleber vorziehen, da das kausische Natron hinsichtlich seiner Reinheit nur wenig Veränderung zeigt und man daher sicher ist, immer ein in seiner Zusammensetzung sich gleichbleibendes Präparat zu erhalten, da hingegen die kausische Schwefelleber wegen der verschiedenen Reinheit des kausischen Kali's von zwölf bis fünf und

spanzig Prozent Verschiedenheiten unterworfen ist." Man wendet es oberflächlich geachtet nur sehr wenig an.

Aqua antipsorica. (Vm.)

℞. Sulphureti Sodae
drachmam unam.

Salis Ammoniaci
scrupulos duos cum dimidio.

Dissolve sales singulos seorsim in
Aquaee uncis sex, filtra et solutiones
commisce.

Lotio ad s. contra tineam. (Bo. Ca.)

℞. Sulphureti Sodae uncias tres.
Saponis medicinalis
sesquidrachmam.

Aquae Calcis
uncias septem cum dimidia.

Alcoholis drachmas duas.

Man schlägt alle zwei Tage ein mit die-
ser Flüssigkeit getränktes leinenes Tuch
um den Kopf.

Sapo sulphuratus Sodae. (Vm.)

℞. Saponis Medullae partem unam.

Sulphureti Sodae partes duas.

Alcoholis partes sex.

Dissolve et solutionem cola.

Unguentum antipsoricum. (Sw.)

℞. Sulphureti Sodae drachmas tres.

Axungiae Porci sesquiangiam.

Misce triturando.

Linimentum sulphuro-saponaceum. (Vm.)

℞. Olei Amygdalatum dulcium,

Sulphuris pulverati, singulorum

partem unam cum dimidia.

Sulphureti Sodae pulverati

partes quatuor cum dimidia.

Axungiae Porci partes sex cum dimidia.

Contere pulveres cum axungia et ad-

de sensim oleum. — In Einreibungen

gegen Krätze.

Protoxychloruretum Sodii, Chlorure-

tum Protoxydi Sodii, Chloruretum So-

dae, Aqua „Eau de javelle“ dicta.) (Galf.

Gal. H. Ma.)

℞. Subcarbonatis Sodae
libras quinque.

Aquae destillatae
libras viginti.

Infunde liquorem, 12° R. indicantem

in lagenam, cujus tres quadrantes ab

illo solum implentur et torrentem Chlo-

ri e mixtura Salis marini libra una,

Acidi sulphurici sesquilibra et Aquae

tribus librae quadrantibus extricati im-

mitte.

Die Chlorüre ist stark genug, wenn sie

achtzehn Theile schwefelsauren Indigo ent-

hält.

Man wendet sie, mit zehn bis fünfze-

hn Theilen Wasser verdünn, zum Ver-
binden bei Hospitalbrand, ausgeartetem
venerischen Geschwüren, brandigen Wunden,
welche sie schnell zum Vernarben bringt,
und bei Krebsgeschwüren an, wo sie den
Gestank beseitigt und zu gleicher Zeit die
Schmerzen lindert. Alibert benutzte sie
mit Warheit zum Waschen fressender Flech-
ten. Man hat eine tineae favosa damit
geheilt, auch ist sie mit Erfolg bei häuti-
ger Bräune in Gurgelwasser gebraucht wor-
den. Außerdem ist sie auch innerlich zu
25 oder 30 Kropfen in einer Pinte Zisane
gegeben worden.

Chloruretum Sodii, Quadrchloruretum

Sodii (B), Chloruretum Natrii, Murias So-

dae, Murias Sodae fossilis, Hydrochlo-

ras Protoxydi Sodii, Protahydrochloras

Sodii, Sal culinare, Sal Gemmae vel ma-

rinum, Hydrochloras natricus, Hydrochlo-

rinus natricus, Muria, Natrum muriati-

cum, Sal commune s. communis, Soda mu-

riatica (H.); Kochsalz, Kochsalz, Stein-

salz, Seesalz, salzsaures Natron; Chlo-

urure de sodium, Quadrchlorure de so-

dium, Murias de soude, Hydrochlorate

de protoxide de sodium, Protahydro-

chlorate de sodium, Hydrochlorate

de soude, Sel de cuisine ou de ga-

belle, Sel gemme ou marin, Soude

muriatée (Gal.); Salt (Ing. D. Suec.);

Melz (Ar.); Uyah (Sal.); Yen (C.);

Luna (Cy.); Nimmuk (Duk.); Sal (His.

Lus. Pol.); Lun (Hin.); Zout (Bel.);

Sale (I.); Mit (Mah.); Garap (Mal.);

Hemuck (Pe.); Lavana (Sa.); Uppa

(Tam.); Lavanum (Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.

BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful.

Gal. Gen. Ham. Han. Haas. HasaP. His. Lib.

Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec.

Wür. WW. A. Fi. G. Par. Pid. Sp. T.

Der häusliche Gebrauch des Kochsalzes

ist zu häufig und so allgemein bekannt,

dass es nicht nöthig ist, hier darüber Nä-

heres anzugeben. In der Medicin benutzt

man es nur wenig. Doch setzt man es oft

zu Fußbädern, um diese reizender zu ma-

chen. Zuweilen hat man es auch innerlich

bei Krankheiten, welche man von Schwäche

herstellte, so wie äußerlich in verschiedenen

Hautkrankheiten, besonders Kopfgrind und

Krätze angewendet.

Sacculus resolvens. (Sm.)

℞. Salis culinaris,

— Gemmae,

singulorum unciam unam.

— Ammoniaci drachmas quatuor.

Misce.

Pulvis vermifugus. (L.)

℞. Salis culinaris drachmas tres.

Coccionellae grama quindecim.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle Morgen. — Bon Rufh empfohlen.

Clyma s. Clyster ad ascarides, Enema vermifugum. (Sw.)

℞. Vini rubri . . . uncias sex.
Salis culinaris . . . quantum sufficit
vel quantum vinum dissolvere potest.

Clyma s. Clyster s. Enema purgans. (B. E. Ra.)

℞. Salis culinaris . . . unciam unam.
Tisanæ emollientis . . . libras duas.
Dissolve. (Ra.)

℞. Decocti Hordei . . . uncias quatuor.
Salis culinaris . . . semunciam.
Olei Olivarum . . . uncias quatuor.
Misce. (B.)

℞. Salis culinaris . . . semunciam.
Olei Ricini,
Syrup! Sacchari,
singulorum uncias duas.
Decocti Seminum Lini . . . octarium unum.
Misce. (Sax.)

Clyma s. Clyster s. Enema antispasmodico-resolvens s. antispasmodicum. (B.)

℞. Salis culinaris drachmas quatuor.
Olei Lini . . . uncias quatuor.
Infusi Chamomillæ . . . uncias tres.

Solutio s. Mixtura citro-muriatica s. excitans. (Bo. Ca. Pie. Sw.)

℞. Sucçi-Citri . . . quantum vis.
Salis culinaris . . . quantum sufficit
vel quantum succus dissolvere potest.
— Broussonet empfahl diese Mixtur bei fogenannten abnämlichen Fiebern. — Gabe, stündlich ein Eßffel.

Unguentum Salis marini. (Sm)

℞. Salis culinaris . . . sesquunciam.
Cerati Galeni . . . uncias tres.
Unguenti rosati . . . unciam unam.
Morgens und Abends in die von tineæ befallenen Stellen einzureiben.

Aqua marina s. marina artificialis. (B. Gen. RC. Au. Br. F. Sw.)*

℞. Salis culinaris . . . semunciam.
— cathartici amari,
Syrupi Rhamni cathartici,
singulorum drachmam unam.
Aquæ . . . libras duas.
Misce. (Gen.)

℞. Salis culinaris . . . uncias decem.
Muriatis Magnesiæ . . . drachmas decem.
— Calcis . . . uncias duas.
Sulphatis Sodæ,
— Magnesiæ,
singulorum drachmas sex.

*Aquæ . . . libras quinquaginta.
Dissolve. (B*. RC. Sw.)*

Br. eandem formulam sed absque muriatæ calcis; — *Fi. Aquæ libras quinquaginta, Salis marini uncias novem, Muriatis Magnesiæ unciam unam, Muriatis Calcis drachmas quatuordecim, Sulphatis Sodæ, Sulphatis Magnesiæ, singulorum drachmas sex;— Au. Aquæ octarios duos, Salis communis grana viginti quatuor, Sulphatis Magnesiæ quatuor, Sulphatis Calcis, Carbonatis Magnesiæ, singulorum quindecim et torrentem Gasis acidi carbonici in liquorem immittere.*

Dieses Wasser ist als ein vortreffliches auflösendes und schmelzendes Mittel empfohlen worden.

Aqua Selterana. (Suec.)

℞. Salis culinaris . . . grana centum.
Subcarbonatis Sodæ . . . grana viginti quatuor.
— Magnesiæ . . . grana viginti novem.
— Calcis . . . grana septemdecim.
Aquæ . . . uncias octoginta duas.
Satura cum Acido carbonico.

Aqua mineralis acidula. (RC.)

Aquæ puræ libras quinquaginta,
Carbonatis Calcis drachmas duas, Subcarbonatis Magnesiæ unciam unam, Subcarbonatis Sodæ drachmas sex, Muriatis Sodæ sesquunciam trajice per solutionem Gasis acidi carbonici pollicibus cubicos 909 ad 1000.

Aqua Pyrmontana. (Suec.)

℞. Salis culinaris . . . semiscrupulum.
Sulphatis Magnesiæ . . . grana triginta quinque.
— Calcis grana triginta sex.
Subcarbonatis Calcis . . . grana quindecim.
Limaturæ Ferri . . . unciam unam.
Aquæ . . . uncias octoginta duas.
Satura cum Acido carbonico.

Aqua mineralis sulphurata. (RC.)

℞. Aquæ puræ libras quadraginta,
Carbonatis Calcis . . . drachmas quinque.
Subcarbonatis Sodæ . . . drachmas decem.
Muriatis Sodæ drachmas septem.
Salis acidi carbonici,
— hydrogen. sulphurat., singulorum poll. cub. 900 ad 1000.

Aqua Selterani alia. (Gal. Vm.)

℞. Salis culinaris . . . grana viginti duo.
Subcarbonatis Sodæ grana quatuor.
— Magnesiæ grano duo.

Aquae quintuplo volumine Acidi carbonici saturatae

upcias viginti cum dimidia.

Dissolve. (Gal.)

R. Aquae libras tres.

Infunde in lagenam, in cujus fundum, tubi ope intromitte

Acidi hydrochlorici fumantis

grana septuaginta.

Adde deinde, alterum post alterum

Subcarbonatis Calcis grana sex.

— Magnesiae

grana decem.

Carbonatis neutri Sodae

grana quinquaginta quatuor.

Lagenam bene claud. (Pm.)

Aqua Belhucana (Balaruc). (Gal.)

R. Salis culinaris sequidrachmam.

Muriatis Calcis grana octodecim.

— Magnesiae

grana quinquaginta sex.

Subcarbonatis Magnesiae

granum unum.

Aquae duplum volumem Gasis acidi carbonici continentis

uncias viginti duas.

uncias viginti duas.

Aqua Borvonensis (Bourbonne les Bains).

(Gal.)

R. Salis culinaris drachmas duas.

Muriatis Calcis grana decem.

Aquae duplum volumem Gasis acidi carbonici continentis

uncias viginti cum dimidia.

Liquor Sodae oxymuriaticae s. Natri

chloridi, Subchlorureum Sodae liquidum.

(HassP.)

R. Salis Sodae depuratae

partem unam.

Aquae destillatae partes tres.

Immitte ad saturationem usque Acidum Salis dephlogisticatum. Liquorem

obtentum Aquae destillatae ea quantitate dilutum ut sit ponderis specifici

1,0429 = 7° Ar. Rk. serva in vitris

pluribus, unciarum circiter quatuor capacibus etc.

Liquor Natri muriatici (Bor4.) ut

reagent.

Subprotocarbonas Sodii, Subcarbonas

Protoxydi Sodii, Subdeutocarbonas Sodii

impurum, Subcarbonas Sodae, Soda,

Soda cretacea, impura, aërata s. efferves-

scens, Mephitis Sodae, Creta soda, Al-

cali minerale fixum, Natron, Natrum,

Alcali minerale, Carbonas Sodae, Car-

bonas Sodae impurus, Subcarbonas So-

dae impurus s. impura, Hypercarbonas

Sodae, Natrum carbonicum s. subcar-

bonicum crudum, Subcarbonas natricum,

Carbonas Sodae alcalinus s. incomple-

tus, Hypocarbonas Sodae; kohlensaures

Natron oder Natrum, Soda, mineralisches

Laugensalz; Sousprotocarbonate de so-

Pharmacopoea universalis. II.

dium, Souscarbonate de protoxide de sodium, Souscarbonate de soude, Soude crayeuse, aëree ou effervescente, Méphite de Soude, Craie de soude, Alcali fixe minéral (Gal.).

1) Wie man es im Handel findet.

Soda, Barilla, Carbonas natricum s. Sodae impurum s. venale, Sal Sodae crudum, Alcali minerale crudum, Natrum carbonicum crudum; Soda, Barille; Soude, Barille (Gal.).

A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Pul. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T.

Man unterscheidet im Handel vier Arten Soda:

A. Natürliche Soda in feinen Nadeln oder pulverartigen schneigen Efflorescenzen. Sie ist in Aegypten, in der Wüste von Eghait, westlich vom Delta und in den Ebenen Oberungarns sehr häufig.

B. Die durch Einäscherung einer großen Anzahl von Seepflanzen, besonders solcher zu der Familie der Atripliceen und der Länge gehöriger, wie von Salsola, Chenopodium, Atriplex, Fucus, gewonnene. Sie ist in derten, festen, halbgeschmolzenen, steinharten, bläulichgrauen Massen von salzigem und laugenartigem Geschmack. Sie enthält kohlensäuerliche Soda in sehr verschiedener Menge, schwefelsaure Soda, Seesalz, kohlensauren Kalk, Magn. Kieselerde und Eisen, bisweilen auch schwefelsaures Kali, salzsaures und selbst Jodkali.

C. Die durch Zersetzung des Seesalzes mittelst Bleiglätte gewonnene.

D. Die, welche man durch Calcination des schwefelsauren Natrums mit Kohle und Kreide erhält. Sie besteht aus kaultischem Natron, kohlensaurem Kalk, Schwefelkalk mit Ueberschuß der Base und Kohle.

2) Reinigung des käuflichen. Natrum carbonicum depuratum.

R. Natri venalis quantum vis.

Grössiuscule pulveratum dis olve in Aqua, lixivium vaporando in tantum consume, donec 28 vel 30° Ar. indicet et crystallisationi subijce.

Fi. Cinerum Sodae quantum vis, Aquae quantum sufficit, solve in vase idoneo, post tres dies decantha, filtra per chartam panno, pulvere carbonis recentis strato tectam et omni residuo, novam Aquam addendo pluries sic age; lixivium evaporant vel ad pelliculam ut crystallos praebent vel ad siccum; — T. Cineres ter vel quater cum Aqua frigida tractare, liquida commixta ad cuticulam evaporare, ad crystallisandum seponere et crystallos nova solutione

etc. purificare; — praeterea (et T): Muriatis Sodae libras quinque, Salis Tartari libras tres cum dimidia, Aquae communis quantum sufficit, solve, filtra, crystallisationi subijce, sales adhuc humidos commixtos lento calori exponere, quo facto carbonas sodae liquatur, murias potassae vero intactus erit; liquido decanthato, muriatem ahlus ad separandum omnem carbonatem et totum fluidum ad siccum consume.

Das Verfahren ist sonst in allen Phar-macopden fast gleich.

Das kohlensaure Natron wird bei Scropheln, sogenannten passiven Wassersuchten, Verstopfungen der Unterleibsorgane, Harngrüß und Harnsteinen mit harnsaurer Base angewendet. — Gabe, von zehn bis zwanzig Gran.

Sodae Subcarbonas exsiccata, Natrum carbonicum depuratum siccum, Carbonas natricus depuratus, Sal Sodae depuratum siccum. (Bor4. HassP. LonN)

Sal Sodae depuratum crasse tritum solis aut modico fornacis calori exponere, donec in pulverem siccum fatiscat etc. (Vergl. vorher das Verfahren von Fi)

Boli stomachici. (Sw*.)

℞. Subcarbonatis Sodae semisrupulum.
Pulveris aromatici scrupulos quatuor.
Syrupi Chinae quantum sufficit
ut fiant boli tres.

Pilulae Subcarbonatis Sodae s. lithontripicae. (Am. B*. Ed. RC. Au. C. K.)

℞ Subcarbonatis Sodae siccae partes quatuor.
Saponis duri partes tres.
Syrupi simplicis quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, wenigstens zehn Stück alle zwei Stunden.

Am. C. et E. Subcarbonatis drachmam unam et Saponis semidrachmam ut fiant pilulae quadraginta; — RC. Subcarbonatis semunciam, Saponis olivosi drachmas tres, Syrupi Zingiberis vel simplicis quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quinque. (Gabe, zwei bis vier, täglich drei Mal, bei Steinkrankheit.)

Pilulae absorbentes. (E.)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Rhei,
Extracti Gentianae,
singulorum scrupulum unum.
Mercurii dulcis grana tria.
Fiant pilulae viginti. — Gabe, zwei Stück auf einmal, bei Verdauungsbeschwerden.

Unguentum s. Pomatum alcalinum. (Ra.)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmas duas.

Laudani Sydenhami drachmam unam.

Axungiae Porci unciam unam.

Misce. — Gullerier wandte diese Salbe bei verschiedenen Hautkrankheiten an, bei welchen viel Schmerzen vorhanden waren.

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sulphureti Potassae,
singulorum drachmas tres.

Axungiae Porci unciam tres.

Alibert läßt diese Salbe bei tineas täglich in den Kopf einreiben, nachdem er vorher die Krusten mittelst erweichender Umschläge erweicht und zum Abfallen gebracht hat

Aqua nephritica s. antinephritica (B*. Ful. Ham. Li.)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmas duas.

Aquae Calcis libras duas.
Gabe, zwei oder drei Eßfel.

Liquor Natri carbonici. (Bor4.)

Ut reagens, paratio non indicatur.

Potio absorbens, Mixtura emacida (E. Sw*.)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.

Vitellus Quorum no. 2

Mellis albi drachmas duas.

Misce. (Sw*.)

℞. Subcarbonatis Sodae scrupulos quatuor.

Infusi Gentianae,

Aquae Cinnamomi,

singulorum uncias tres.

Fincturae Cardamomi semunciam.
Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen Eßfel. (E.)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmam unam.

Sacchari albi semunciam.

Mucilaginis Gummi Arabici unciam duas.

Aquae uncias triginta.

Tincturae Piperis Jamaicaensis unciam duas.

Gabe, zwei Unzen, drei oder vier Mal täglich. (Sw.)

℞. Subcarbonatis Sodae scrupulos duos.

Rhei drachmas duas.

Syrupi Sacchari unciam unam.

Aquae Menthae crispae unciam octo.

Gabe, zwei Eßfel täglich drei Mal. (Sw*.)

Infusum anacardium cum Natro, Potio digestiva. (Au.)

℞. Radicis Gentianae drachmas duas.
Fructuum Aurantiorum viridium
sesquidrachmam.
Cardamomi minoris semidrachmam.
Subcarbonatis Sodae
drachmam unam.
Aquae bullientis . . . uncias sex.
Post sex horas infusionis cola. —
Gabe, ein Eßfel täglich drei Mal.

Potio antiscrophulosa. (Ra.)

℞. Subcarbonatis Sodae semidrachmam.
Tincturae Gentianae semunciam.
Seit 1846 wendet Pech der eine mehr
oder weniger harte Auflösung des kohlen-
säuren Natrums gegen Kröpf an, z. B.
zwei bis vier Drachmen desselben in acht
Unzen Wasser; er giebt davon täglich zwei
Mal einen Eßfel in einem halben Glase
Wein oder gepürzter Zuckerpflaster. Pu-
bel and verdorbet täglich vier Eßfel einer
Auflösung von zwei Drachmen des Salzes
in sechs Unzen Meißnerwasser und einer
halben Unze Zimmtwasser.

Tisana ad urinam arenosam. (Sm.)

℞. Seminum Lini contusorum,
Capilli Veneris Monspoliaci,
Mesembryanthemi crystallini,
singulorum pugillum unum.
Aquae . . . octarium unum.
Coque per horae quadrantem et co-
laturae adde

Subcarbonatis Sodae . . . scrupulum unum.

Den Tag über zu trinten.

Solutio balsamica alkalisata. (Sw.)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sacchari,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Balsami Peruviani . . . semunciam.
— . . . Canadensis
drachmas decem.

Aquae . . . sesquilibram.

Man vermischt von dieser Auflösung eine
Unze mit einer Pinne Wasser und läßt drei
oder vier Mal täglich ein halbes Pfund
davon nehmen.

Injectio lithonriptica (Bo.)

℞. Subcarbonatis Sodae
drachmam unam.
Saponis . . . uncias duas.
Aquae communis uncias duodecim.
Zur Auflösung von harnsauren Blasen-
steinen empfohlen.

Potio lithonriptica. (E.)

℞. Subcarbonatis Sodae
grana duodecim.

Vini Ipecacuanhae guttas viginti.
Tincturae thebaicae guttas quatuor.
Aquaë . . . unciam unam.

Bei Reuchhusten. — Alle zwei oder drei
Stunden einen Kaffeelöffel voll.

*Infusum Quassiae cum Natro, Aqua sto-
mashica. (Au.)*

℞. Ligni Quassiae sesquidrachmam.
Subcarbonatis Sodae
drachmas duas cum dimidia.
Aquae bullientis . . . libram unam.

Infunde per horam et cola. — Ga-
be, täglich zwei bis vier Eßfel bei Ver-
bauungsbeschwerden.

*Protocarbonas Sodii, Carbonas Proto-
oxydi Sodii; Carbonas Sodae s. natrium,
Bicarbonas Sodae s. natrium cum
Aqua, Carbonas neutrum Sodae s. Sodae
completum, Sodae Carbonas, Sal Sodae
perfecte saturatum, Natrium carbonicum
perfecte saturatum s. neutrale, Deuto-
carbonas Sodii; Alkali minerale perfecte
saturatum, Natrium carbonicum acidu-
lum; gefättigte luftsaure Soda, gefättigtes
kohlenäures Natrium.*

1) Im festen Zustande.

Am² B. Ba. Bel. Bor⁴. Ed. Fenn.
HassP. Li. Lon. LonN. Suec. C. Fi. T.

℞. Subcarbonatis Sodae purificati
partem unam.

Aquae calidae . . . partes duas.

Transmitte per solutionem filtratam
et refrigeratam Gasis acidi carbonici
torrentem et crystallos exinde sponte
enatas serva. (Am. B. Ba. Bel. Ed.
Fenn. Suec. C. T.)

℞. per solutionem Subcarbonatis in

lagna Woulfiana torrentem gasis trans-
mittit ad saturationem usque etc.; —

HassP. Salis partes duas, Aquae tres,
solutioni filtratae torrentem Gasis acidi

carbonici extricati e mixtura Cretae
albae s. Lapidis calcaei purioris pul-

verati parte una et dimidia, Aquae com-
munis partibus quatuor, Acidi Vitrioli

diluti partibus affusis duodecim; —

Bor⁴. Natri carbonici depurati sesqui-
unciam, Aquae destillatae tres cum di-

midia, liquorem immitte in vas libra-
rum decem capax, Gase Acidi carbo-

nici repletum etc.; — LonN. Sodae
Subcarbonatis libram unam, Aquae

octarios tres, solutioni Gas ad satura-
tionem completam immitte et ad crys-

tallisandum sepone, crystallos sicobag
liquorem reliquum consume cavendo
ne calor gradum 120 excedat, ut iterum
prodeant crystalli.

℞. Subcarbonatis Sodae libram unam.
Aquae . . . octarium unum.

Solutioni adde

Subcarbonatis Ammoniaci

uncias tres.
Miscet et per tres horas calori 80°C.
exponet, donec omne ammoniacum sit
expulsum et liquorem ad crystallisan-
dum seponet. (Am. Lon. C. Fi.)

2) Im flüssigen Zustande.

*Aqua Supercarbonatis Sodae s. Car-
bonatis Sodae acidula.* (B. Ed. Fenn.
Han. Pol. R. R. C. Suec. Sm. Vm.)

R. Subcarbonatis Sodae uncias duas:
Aquae libras decem.

Per solutionem transmittit Gas aci-
dum carbonicum e mixtura Cretae,
Acidi sulphurici, singulorum unciarum
triump et Aquae trium librarum.

Dieses Salz, welches man heutzutage
viel in Gebrauch zieht, unterscheidet sich
in therapeutischer Hinsicht nicht viel von
dem vorhergehenden.

Aqua Sodae, Aqua alcalina gasosa. (Am.
C. Ra.)

R. Subcarbonatis Sodae drachmas tres.
Aquae octarios octo.

Solutionem volumine Gas acidum car-
bonici decuplo saturat. (Am. C.)

R. Subcarbonatis Sodae grana octodecim.
Acidi hydrochlorici semidrachmam.

Aquae uncias duodecim.

Serva in lagena bene obturata. (Ra.)

Potio febrifuga. (Bo.)

R. Aquae destillatae uncias octo.
Acidi carbonici quantum sufficit
ut sit volumen duplum Aquae; solu-
tioni adde

Subcarbonatis semidrachmam.
Camphorae grana viginti.

Syrupi Papaveris drachmas sex.

Man läßt die Hälfte davon vier Stun-
den vor dem Anfall und das Uebrige im
Augenblicke des Eintretens desselben neh-
men. Man muß sieben oder acht Tage
damit fortfahren.

Trochisci digestivi. (GalF. GalH. Ma.)

R. Bicarbonatis Sodae partes ducentas quinquaginta.
Sacchari albi partes quater mille
septingentas quinquaginta.

Olei essentialis Menthae partes octo.

Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantum sufficit.

Fiant trochisci granorum octodecim.

— Gabe, zwei oder drei Stück vor und
nach der Mahlzeit bei Stein und Sicht.

(Subprotoboras Sodii, Subboras Pro-
toydi Sodii, Subboras Sodae, Boras su-
persaturatus Sodae, Boras Sodae cum
baseos excessu, Soda borazata (H.), Bo-
ras Sodae (B.), borax, Borax crudus,
Natrium subboracicum, Tinckal, Tin-

kar, Boras Sodae alcaliscentes s. alcali-
num s. alcalinum, Boras supersodiques,
natricus cum Aqua, Borax Venetus s.
Veneta s. raffinata, Hypoboras Sodae,
Subboras natricum; Borax, natürliches
Sodabitsalz; Sousprotoborate de sodium,
Sousborate de protoxide de sodium,
Sousborate de soude, Borate sur-saturé
de soude, Borate de soude avec excès
de base, Soude boratée (H.), Borate de
soude (R.), Borax, Borax brut, Tinckal,
Tinkar (Gal.); Atinkal (Ang.); Bjuruk
(Ar.); Piger (Bala. Jav. Mah.); Lansipustara (Cy.); Sohaga (Duk. Hin.);
Borace, Tinkal (A.); Chaularya (Nep.);
Tunkar (Pte.); Borax (Hol. Suec.); Tincal
(Lus.); Tankana (Sa.); Velligarum,
Vengarum (Tam.).

A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Borä.
Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful.
Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass.
HassP. His. Li. Lon. LonN. Lug. O.
Pol. R. R. C. Sax. Suec. Wir. WW. A.
Ei. G. Par. Sp. T.

Im herabdrückenden, mehr oder weniger ab-
geplatteten, in diebstichigen Pyramiden ab-
gebenden, halb farblosen, halb gelblichen ober-
grünlichen, stets mit einem erdigen, fett-
anzufühlenden, seifenartig riechenden Ueber-
zug bedeckten Prismen von glasigem Bruch,
mit Ausplüßungen überzogen und von
schwach alkalischem Geschmack.

Borax pura (HassP.) vel crystallisata
vel usta ut reagens adhibetur.

Species diahoracis. (Wir.)

R. Boracis Veneti semunciam.
Cassiae lignae,
Croci orientalis,

singulorum drachmam uniam.

Rasurae Ligni Sabinae,
Succini albi praeparati,

singulorum semidrachmam.

Ossis Cordis cervini,
Visci querril,

Florum Cherii,
singulorum scrupulum unum.

Fiat pulvis. — Man sieht empfahl
diese Species zur Erleichterung der Nie-
berkunft. — Gabe, von einem Scrupel
bis zur halben Drachme.

Pulvis ad partum promovendum. (Pal.
Wir.)

R. Boracis semunciam.
Castorei,
Croci,

singulorum sesquidrachmam.

Olei Cinnamomi guttas octo.
— Succini guttas sex.

Misce ut fiat pulvis. (Wir.)
R. Cassiae lignae,

Cinnamon, singulorum drachmas duas.
 Boracis;
 Sacconi albi preparati singulorum drachmam unam.
 Croci semidrachmam.
 Olei Cinnamomi guttas tres.
 Misce ut fiat pulvis. (Pal.)
 Man schrieb diesem Pulver ebenem denselben Nutzen zu, als dem vorhergehenden.
 — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Mixtura ad partum. (Sib.)

R. Boracis drachmas duas.
 Aquae Chamomillae Romanae uncias quatuor.
 Syrupi Corticum Aurantium semunciam.
 Succinatis Ammoniaci liquidi drachmas duas.
 Laudani Sydenhami semidrachmam.
 Gabe, alle halbe Stunden zwei Essel.

Infusum Salep cum adstringentibus, Potio adstringens. (Au.)

R. Salep drachmam unam.
 Aquae bullientis uncias decem.
 Colaturae adde
 Extracti Chinae,
 — Ligni Campechiensis, singulorum drachmam unam.
 Boracis semidrachmam.
 Syrupi Althaeae unciam unam.
 Effectweise zu nehmen, bei chronischer Diarrhoe, besonders aber bei sogenannten offentlichen bössartigen Geschwüren und Schrämmchen.

R. Salep drachmas duas.
 Seminum Lini semunciam.
 Aquae bullientis uncias decem.
 Post sufficientem extractionem cola et colaturae adde
 Boracis semidrachmam.
 Extracti Ligni Campechiensis, — Chinae, singulorum drachmam unam.
 Syrupi Althaeae unciam unam.
 Effectweise, in denselben Fällen, wie das vorhergehende.

Lintimentum de Borate s. ad aphthas, Mel Boracis s. boraxatum s. Subboratis Sodae, Linctus de Borace s. ad aphthas, Collutorium boraxatum s. adstringens. (DD. Ed. GalM. Ham. Lon. LonN. Suec. Au. C. Pic. Sa. Sw. Sy. Vm.)

R. Boracis drachmam unam.
 Olei Amygdalarum dulcium unciam unam.
 Vitellam Ovi no. 1.
 Misce triturando (Sa. Sw.)

R. Boracis partem unam
 Mellis despumati partes octo.
 Misce. (Ed. Ham. Lon. LonN. C.)
 GalM. Boracis partem unam, Mellis decem; — Pic. et Vm. Boracis unam et duodecim Mellis; — Au. Boracis et Mellis, singulorum partes aequales.
 R. Boracis drachmam unam vel duas.
 Mellis despumati unciam unam.
 Extracti Iuglandis drachmam unam vel duas.
 Misce triturando. (Sw.)

R. Boracis drachmam unam.
 Syrupi Mororum unciam unam ad tres.
 Misce. (Au.)

R. Boracis drachmam unam ad duas.
 Mucilaginis Seminum Cydoniorum, Syrupi Mororum, singulorum unciam unam.

Misce. (Sw. Sy.)

R. Boracis sesquidrachmam.
 Aquae fontanae, Mellis, singulorum unciam unam.
 Misce triturando. (DD. Suec.)

Gargarisma e Borace s. ad aphthas s. boraxatum s. Subboratis Sodae, Mixtura boraxata; Liquor ad aphthas. (DD. Gen. Ham. RC. Au. B. Ca. E. Pic. Ra. Sa. Sw. Sy.)

R. Boracis semunciam.
 Aquae libram unam.
 Mellis flavi semunciam.
 Interdum additur Alcoholis impuri uncia una vel sesquiuncia.

R. Boracis drachmas duas.
 Mucilaginis Seminum Cydoniorum semilibram.
 Mellis rosati unciam unam.
 Misce. (Gen. Sa.)

Sw. coquere jubet Seminum Cydoniorum unciam unam in Aquae sedecim ad duodecim remanentiam et colaturae addere Boracis drachmas tres et Mellis rosati sesquiunciam.

R. Boracis drachmas sex.
 Infusi Salviae uncias decem.
 Mellis despumati uncias duas.
 Misce. (Ham.)

DD. Boracis drachmas duas, Infusi Salviae uncias octo et Mellis unciam unam; — B. Boracis scrupulum unum, Decocti Salviae libram unam et Aquae Vitae unciam unam.

R. Boracis drachmas duas.
 Aquae, Tincturae Myrrhae, singulorum unciam unam.
 Mellis rosati uncias duas.
 Misce. (Ca. Sw.)

Aa. et Sy. Boracis unciam unam, Aquae libram unam, Tincturae Myr-

rhæ uncias duas et Mellis tantidem;
— E. Boracis drachmam unam, Aquæ
uncias quatuor, Tincturæ Myrrhæ
semunciam et Mellis unciam unam.

R. Boracis . . . drachmas duas.
Decocti Hordei . . . sesquilibram.
Syrupi Gummi . . . unciam unam.

Misce. (Ra.)

R. Boracis . . . drachmas duas.
Infusi Rosarum . . . uncias decem.
Syrupi Mororum . . . semunciam.

Misce. (B.)

R. Boracis . . . drachmas tres.
Decocti Chinæ . . . uncias duodecim.
Mellis . . . sesquinciam.

Misce. (Ra.)

R. Boracis . . . drachmas duas ad tres.
Mellis . . . unciam unam.
Extracti Juglandis . . . semunciam.
Alcoholis . . . unciam unam ad duas.
Aquæ bullientis . . . libram unam.

Misce. (Sw.)

R. Boracis,
Sulphatis Cupri,
singulorum grana octo.
Tincturæ Coccionellæ . . .
drachmam unam.

Aquæ . . . unciam unam.

Spiritus Cochleariæ . . . uncias duas.

Syrupi Rubi Idæi . . .
quantum sufficit.

Misce. (Pic.)

Collyrium boracicum. (Au.)

R. Boracis . . . semidrachmam.

Sacchari . . . drachmam unam.

Aquæ Rosarum . . . uncias duas.

Aqua cosmetica. (Au.)

R. Furfuris Amygdalarum . . .
uncias duas.

Aquæ Rosarum,

— Florum Aurantiorum,
singularum uncias octo.

Fiat emulsio, cui adde

Tincturæ Benzoes drachmas duas.

Boracis . . . drachmam unam.

Subprotophosphas Sodii, Subphosphas

Protoxydi Sodii, Subphosphas Sodæ,

Sal mirabile perlatum, Phosphas Sodæ

s. natricum, Soda phosphorata, Natrium

phosphoricum s. oxyphosphorodes, Al-

cali minerale phosphoratum, Sal cathar-

ticum Pearsoni s. perlatum. (Am, An, B.

Ba, Bel, Bor, Bor4, D, Du, Ed, Fenn, Fer,

Gal, Han, HassP, O, Pol, Sax, Suec,

Br, C, Fi, Sw, T, Vm.)

R. Acidi phosphorici . . . partem unam.

Aquæ . . . partes octo.

Mixturæ sensim infunde

Solutionis Subcarbonatis Sodæ

quantum sufficit

i. e. donec alcali levis excessus adsit;

liquor filtratus evaporet, ut crystallos

demittat, quas in loco bene sicco ser-

va. (An, B, Bor, D, Han, O, Pol, Sax,
Br, Sw.)

Bor4. Natrium carbonicum crudum
adhibet.

R. Supersulphatis Calcis quantum vis
Subcarbonatis Sodæ.

quantum sufficit
ad saturandum acidum; liquor clarus
post decanthationem evaporet, donec
25^o an, indiget, quo facto crystallisa-
tioni subjiciatur. (Am, B, Ba, Bel, Du,
Ed, Fenn, Fer, Gal, Suec, O, Vm.)

R. Pulveris Cornu Cervi usti albi aut
albrum ossium animalium cal-
cinatorum ad albedinem

libras quinque.

Misce in vase murrhino cum

Aquæ communis libris quindecim.

Deinde sub assidua agitatione sen-

sim adde

Olei Vitrjoli Nordhusani

libras quatuor cum dimidia.

Post duodecim horas adde

Aquæ communis frigidae libras

quindecim usque viginti

et mixtionem, frequenter agitando, per

horas quadraginta et oculo super igne

digere, cola fluidum per linteam ac

residuum bene elotum in prelo lami-

nis ligneis vel stanneis minuto exprime.

Liquori obtento in aeno stanneo, ca-

pacæ, calefacto, sensim affunde

Liquorem Salis Sodæ depuratæ

concentratum

ad saturationem usque et donec soda

paullulum praevaleat, tunc filtretur et

residuum eluatur. Filtratam evaporet,

donec gutta lapidi instillata, crystallos

exhibeat, tunc ad crystallandum se-

ponatur; crystallos inter chartam bi-

bulam siccatis statim serva. (HassP.)

Fi. Ossium calcinatorum libras quin-

que cum Aquæ communis libris de-

cem in vas ingerere, et bene commix-

ta addere Acidi sulphurici concentrati

libras tres, per aliquot dies seponere;

aliam Aquam addere, colare et filtrare,

sedimentum abluere et liquores ad syr-

rupi consistentiam consumere, novam

Aquam affundere, filtrare et denuo ad

syrupi consistentiam consumere, ut re-

frigeratione, crystalli erascantur etc.;

— vel: Salis Glauberi libras duas, Os-

sium calcinatorum libras duas cum di-

midia et Aquæ communis libras qua-

tuor coquere per horam circiter unam;

decanthare fluidum, residuum abluere,

liquores filtrare et consumere ut cry-

stallisent.

T. Solutionem Subcarbonatis Sodæ

iteratim Phosphato acido Calcis infun-

dere, mixta per aliquot momenta cal-

lori modico exponere, precipitatum

filtrando separare, addere solutionis filtratae Subcarbonatis Sodae parvum excessum, consumere ad pelliculam et in crystallos cogere.

Ein mildes Abführmittel. — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen in Fleischbrühe.

Mixtura Natri phosphorici, Potio laxans. (Au.)

R. Phosphatis Sodae,
Syrupi Althaeae,
singulorum semunciam.

Aquae unciās quatuor.

Portionenweise stündlich zu nehmen.

Phosphas Sodae et Ammoniaci. (Pa)

R. Subphosphatis Sodae partes sex.

Liqua, lem igne, in

Aquae destillatae calidae

partibus duabus

in solutione tenentibus

Salis Ammoniaci partem unam.

Solutionem per horas viginti quatuor in loco frigido relinque et crystallos enatas collige atque sicca.

Superprotosulphas Sodii, Supersulphas Protoxydi Sodii, Sulphas Sodae acidulus s. acidus. (Sw. Vm.)

R. Acidi sulphurici,

Aquae, singulorum unciās quatuor.

Mixturae aqde

Subcarbonatis Sodae unciās octo.

Filtra et ad crystallandum reponē.

Purgirend. — Gabe, zwei bis sechs Drachmen.

Protosulphas Sodii, Sulphas Protoxydi Sodii, Sulphas Sodae, Hydrosulphas Sodae (S.), Soda sulphurica (H.), Soda vitriolata, Alkali minerale sulphuricum s. vitriolatum, Natrum sulphuricum, Sal catharticum s. mirabile Glauberi, Sulphas natricus, Vitriolum Sodae; schneißsaures Natron, Glaubersalz.

1) Wie man es im Handel findet:

A. Am. Ams. An. B. Ea. Bel. BorC. Bor4. DD. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Sax. Suec. VV. C. G. Par. T.

In langen, sechsseitigen, in eine zwölfeckige Spitze endigenden, durchsichtigen, weißen, ausstühenden Prismen von anfangs kühnem, dann bitterem Geschmack.

2) Im Ganzen bereitet:

A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. R. Sar. Wir. Br. Fi. Pil. Sp. Sw. T. Vm.

R. Residui e destillatione Acidi hydrochlorici . . . quantum vis

Dissolve in Aquae pondere triplo, satura liquorem cum Subcarbonate Sodae et filtratum ad crystallandum se pone. (A. Ams. B. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gen. Han. Hass. HassP.

Lon. LonN. Lus. O. R. Sar. Wir. Br. Fi. Pil. Sp. Sw. T. Vm.)

Bor4. praeterea Natrum sulphuricum crudum in Aquae s. q. solvere, filtrare et l. a. in crystallos redigere jubet.

R. Subcarbonatis Sodae quantum vis. Dissolve in Aqua et liquori infunde Acidi sulphurici quantum sufficit ad neutralisandum alcali; solutionem consume ut crystallos demittat. (Ams. Au. R. Bel. Fer. Gal. Fi.)

T. praeterea ut Sulphatem Potassae parari jubet.

Gabe, zu einer bis anderthalb Unzen, ein gelind reizendes Abführmittel; zu drei bis fünf Scrupel heiztreibend. — Man wendet es auch als eröffnend an.

Sal mirabile Glauberi siccatum. (Bor4. HassP.)

Sal mirabile depuratum crasse tritum solis aut modico fornacis calori expose, donec in pulverem siccum fatiscat et cibra. — Bor4. ut Natrum carbonicum depuratum siccum.

Potio-purgans. (B. BorC. GalM. Ham. Au. Ra. Sa.)

R. Sulphatis Sodae partes sedecim.

Aquae partes quingentas.

Dissolve. (GalM.)

R. Sulphatis Sodae unciam unam.

Aquae unciās octo.

Mellis puri . . . semunciam.

Dissolve. (BorC.)

R. Sulphatis Sodae . . . semunciant.

Nitri . . . drachmam unam.

Succi Citri . . . sesquunciam.

Syrupi Rubi Idaei unciās duas.

Aquae Rubi Idaei unciās decem.

Misce. (Sa.)

R. Sulphatis Sodae unciam unam.

Sacchari . . . semunciam.

Succi Citri . . . semunciam.

Decocti Cruti . . . octarium unum.

Stoßweise stündlich. (Au.)

R. Salis Glauberi . . . unciam unam.

Aquae Menthae piperitae,

Infusi Rhei,

singulorum unciās tres.

Oxymellis scillitici unciam unam.

Misce. (Ham.)

R. Seminae . . . drachmas tres.

Sulphatis Sodae . . . drachmas duas.

Mannae . . . unciam unam.

Aquae bullientis unciās quatuor.

Infunde et cola. (Ra.)

R. Pulpae Tamarindorum

sesquunciam.

Aquae . . . quantum sufficit

ut unciā quatuor decocti obtineantur,

quarum colaturae adde

Sulphatis Sodae . . . semunciam.

Syrupi Rosarum solutivi

drachmas sex.

- Misce. (Sa.)
 ℞. Sulphatis Sodae . . . sesquinciā. . .
 Mannae unciā unā.
 Aquae unciā sex.
 Effetweise. (Au.)
- ℞. Sulphatis Sodae drachmas duas.
 — Magnesiaē unciā unā.
 Infusi Corpicis Aurantiorum . . .
 unciā octo.
 Vini rubri parvam quantitatem.
 Misce. (B*.)
- Clyster s. Enema purgans. (Li. Ra. Sa. Sy.)*
- ℞. Sulphatis Sodae unciā unā.
 Olei Lini unciā duas.
 Decocti Hordei . . . unciā sex.
 Misce. (Sy.)
- ℞. Specierum emollientium . . .
 unciā duas.
 Foliorum Sennae . . . semunciā.
 Sulphatis Sodae drachmas duas.
 Aquae bullientis . . . libram unā
 Infunde et cola. (Ra.)
- Ra. praeterea Sennae drachmas duas,
 Sulphatis Sodae unciā unā et Decocti emolli-
 entis libras duas, vel: Sennae semunciā,
 Sulphatis tantidem et Aquae libram unā;
 — Li. Decocti emollientis unciā octo,
 Oxymellis unciā tres et Sulphatis unciā unā.
- ℞. Herbae Rutae,
 Florum Chamomillae,
 — Sambuci,
 singulorum semunciā.
 Aquae libram unā.
 Coquendo partem tertiam consume
 et colaturae adde
 Salis Glauberi . . . drachmas tres.
 Oxymellis simplicis,
 Olei Chamomillae,
 singulorum unciā unā.
 Misce. (Sa.)
- Apozema depurans et tonicum. (Pie.)*
- ℞. Radicis Patientiae unciā unā.
 — Fragariae . . . semunciā.
 — Inulae . . . drachmam unā.
 Foliorum Cichorii,
 — Cerefolii,
 — Nasturtii,
 singulorum manipulum unum.
 Sulphatis Sodae drachmam unā.
 Syrupi Cichorii compositi
 drachmam unā.
 Alle Morgen zu nehmen.
- Decoctum Carnis depurans, Bradium depurativum. (Pie.)*
- ℞. Brodii gallinacei octarium unum.
 Radicis Patientiae . . unciā duas.
 Coque per horae semiquadrantem et
 sub finem adde

- Foliorum Nasturtii,
 — Melissaē,
 — Primulae Veris,
 singulorum manipulum unum.
 Cola et adde
 Sulphatis Sodae . . unciā duas.
- Apozema laxans. (Gal. Ca. Fi.)*
- ℞. Foliorum viridium C cherii,
 — — Ruglosi,
 — — Boraginis,
 singulorum unciā unā.
 Aquae bullientis . . . libras duas.
 Infunde per horae quadrantem, cola
 et colaturae adde
 Sulphatis Sodae drachmas duas.
 Syrupi Violarum unciā unā.
 Misce bene. (Gal.)
 Fi. Aquae libras duas et unciā octo;
 caeterum ut Gal.
- Lotto ad tiniam s. excitans. (Sw.)*
- ℞. Sulphatis Sodae . . . unciā sex.
 Saponis albi . . . drachmas tres.
 Aquae Calcis . . . unciā octodecim.
 — Vitae . . . drachmas sex.
- Solutio salina gelatinosa. (Ca.)*
- ℞. Aquae libram unā.
 Subcarbonatis Sodae,
 Collae Flammulae,
 singulorum unciā unā.
 Sulphatis Sodae,
 Salis culinariae,
 singulorum semunciā.
 Petrolei guttas viginti.
- Pulvis cathartico-diureticus. (Sw*)*
- ℞. Tartari stibiati,
 Opii, singulorum granum unum.
 Sulphatis Sodae . . . unciā duas.
 Gummi Arabici,
 Radicis Liquiritiae,
 singulorum drachmas duas.
 Dret oder vier Mal täglich in einem
 Glase Wasser zu nehmen.
- Sul Guaiac. (B* Ca.)*
- ℞. Sulphatis Sodae unciā unā.
 Nitri grana duodecim.
 Tartari stibiati . . . semigranum.
 Purgirend. — Man läßt es in einer
 Pinte Wasser oder Kräuterbouillon auf-
 kochen und am Morgen nehmen.
- Aqua resolvens. (Ca.)*
- ℞. Sulphatis Sodae unciā unā ad duas.
 Nitri grana decem.
 Tartari stibiati . . . semigranum.
 Aquae libras duas.
- Aqua purgans cum Tartaro emetico, Aqua mineralis. (GalM. Ra.)*
- ℞. Sulphatis Sodae drachmas tres

Tartari stibiati . . . grana tria.
Aquae calidae . . . uncias decem.

Potio cathartica. (Ca.)

℞. Sulphatis Sodae,
Mannae in lacrymis,
singulorum semunciam.
Tartari stibiati . . . grana duo.
Aquae . . . uncias quatuor.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden ein Eßfel.

Sulphas Sodae et Magnesiae, Sal Astracananis artificialis (Sw.) Sulphas Magnesiae et Sodae (Fi.).*

℞. Supersulphatis Sodae
quantum vis.

Aquae tepidae quantum sufficit
ad exactam salis dissolutionem; quam
cum Magnesia calcinata saturatam fil-
tra et ad crystallisandum sepone. —
Färbend oder harntreibend, je nach der
Gabe. — Gabe, von einer halben bis
zwei Drachmen; täglich mehrmals, bis auf
eine oder zwei Unzen auf einmal.

Protosulphatis Sodii, Sulphis Sodae. (Vm.)

℞. Subcarbonatis Sodae
partem unam.

Aquae . . . partes quatuor.
Dissolve, satura Gase acido sulphu-
roso, calefac deinde in balneo aquae
tepidae et liquorem sepone ut crystal-
los demittat.

Protohyposulphatis Sodii, Hyposulphatis Sodae, Sulphatis sulphuratis Sodae. (Gal. Vm.)

℞. Subcarbonatis Sodae partes octo.
Aquae . . . partes sedecim.

Solutioni adde

Sulphuris sublimati partem unam.

In liquorem immitte torrentem Gas
acidi sulphurosi, filtra post satura-
tionem, tunc evaporet liquor ut crys-
talli evascentur. (Gal.)

*Vm. transmittere jubet torrentem Gas
acidi hydrosulphurici in solutionem.*
Sulphatis Sodae vel torrentem Gas
acidi sulphurosi in illam Hydrosulphatis
Sodae.

Protonitras Sodii, Nitras Protoxydi Sodii, Nitras Sodae s. natrium s. cubicum, Nitrum cubicum, Nitrum rhomboidale. (B.)*

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Acidi nitrici tenuis

quantum sufficit
ad saturandum alcali; solutionem ad
crystallisandum sepone. — Man hat
dieses Salz bei Ruhr empfohlen.

Solutio Nitratris Sodae. (B.)*

℞. Nitratris Sodae . . . semunciam.

Gummi Arabici . . . grana decem.
Aquae . . . uncias octo.
Gabe, alle Stunden einen Eßfel.

Hydrosulphas Sodae. (Vm.)

℞. Sodae causticae calcinatae
partem unam.
Aquae . . . partes sex.
Post solutionem torrentem Gas
acidi hydrosulphurici in liquorem immitte
et sepositione clarificatum serva.

Balneum sulphurosum. (Ca.)

℞. Hydrosulphatis Sodae
uncias decem.

Solutionis salinae gelatinosae
uncias quatuor.
Man thut es im Augenblicke des Ba-
dens in das Badewasser.

Protoacetis Sodii, Acetas Protoxydi Sodii, Acetas Sodae, Acetas Sodae crystallisatus, Acetis Sodae, Deutoacetis Sodii, Sal Sodae acetatum, Sal acetosum minerale, Acetas natrium, Alkali minerale acetatum, Natrum aceticum, Soda acetata s. acetosa, Terra foliata mineralis s. Tartari crystallisata. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. D. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Sar. Fi. Sw. Vm.)

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Aceti destillati quantum sufficit
ad saturandum alcali; cola liquorem,
qui ad pelliculam evaporatus refrige-
ret ut crystalli enas antur.

Harntreibend oder cathartisch, je nach
der Gabe; letztere von zwei bis vier Drach-
men.

Pilulae antilactae s. ad repulsionem lactis. (Bo.)

℞. Acetatis Sodae drachmas quinque.
Camphorae,
Nitri, singulorum drachmas duas.
Roob Sambuci quantum sufficit.
Fiant pilulae centum viginti. — Ga-
be, zwei Stück Morgens und zwei Abends.

Pulvis diureticus. (Au.)

℞. Acetatis Sodae,
Elaeosacchari Juniperi,
singulorum drachmas tres.
Scillae . . . grana sex.
Calami aromatici semidrachmam.
Opii . . . grana tria.
Fiant doses sex. — Gabe, täglich drei
Stück in Wachholderthee.

Pilulae e Rheo cum Natro acetico s. laxantes. (Au.)

℞. Rheii,
Acetatis Sodae,
Fellis Tauri inspissati,
singulorum drachmam unam.

Gummi Arabici . semidrachmam.
Fiant pilulae granorum duorum. —
Gabe, zehen bis funfzehn Stück täglich
zwei Mal.

*Protomeconas Sodii, Meconas Protoxy-
di Sodii, Meconas Sodae.* (Fer.)

℞. Acetatis Sodae . unciam unam.
Tincturae Opii alcoholicae
uncias quatuor.

Digere per dies aliquot, filtra ut
crystalli enatae separentur, quae Alco-
holis bullientis ope purificentur.

Man hat dieses Salz als ein sicheres
Mittel gegen Wandwurm empfohlen; man
muß es aber mit großer Vorsicht anwen-
den, da es schon, zu einem halben Gran ge-
geben, ein heftiges Gift ist.

Proto-Oleomargaras Sodii.

℞. Proto-Oleomargaras Potassii.

Solanum.

Wir führen hier folgende vier Arten die-
ser Pflanzengattung an:

1) *Solanum Lycopersicum, L.*; Pie-
besäpfel, Goldapfel; Tomate, Pomme
d'amour (Gal.); Lovapple (Ang.); Els-
kobsneble (D.); Tomates (His.); Ap-
peltje der liefde (Bel.); Pomo d'amore
(I.); Tomato (Lus.); Karleksäple
(Suec.).

Gal.

⊙ (Pentandria Monogynia, L.; So-
laneae, J.) Eine Südamerikanische, in
Europa cultivirte Pflanze. (Rumph Amb.
V. t. 154. Blackw. t. 133. Plenck t. 122.)

Man wendet die Früchte (Mala Lyco-
persica) an; es sind runde, verschiedenlap-
pige, fleischige, saftige, glatte, glänzende,
gelbe oder rothe Beeren, welche in einem
säuerlichen Fleische eine große Anzahl Eaa-
men enthalten.

2) *Solanum Melongena, L.*; Eier-
frucht; Aubergine, Melongene (Gal.);
Eggplunt (Ang.); Berinjela (His.); Ei-
jerdragende nagtschade (Bel.); Melan-
zana (I.); Beringela (Lus.).

His. Be.

⊙ Eine im südlichen Europa cultivirte
Pflanze. (Plenck t. 123.)

Man wendet die Frucht (pomum Me-
longenae s. Mala insana) an; sie ist
von verschiedener Gestalt und Farbe, bald
weiß und vollkommen eiförmig, bald lang-
gestreckt und violett.

Nährend, lindernd. — Man wendet sie
auf schmerzhaftes Hämorrhoidalnoten an.

3) *Solanum nigrum, L.*; schwarzer
Nachtschatten; Morelle noire (Gal.);
Black nightshade (Ang.); Psy vjino (B.);
Svineurt, Soeber (D.); Hierba moiro

(His.); Zwarte nagtschade (Bel.); So-
lano nero, Solatro, Erba morella (I.);
Psinki ziele (Pol.); Herba moira (Lus.);
Hansletsgras (Suec.).

An. Ba. Br. D. Fer. Gal. GalM. Gen.
His. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. M. Sp.
Z.

⊙ Eine in ganz Europa sehr gemeine
Pflanze. (Bull. t. 67. Blackw. t. 107. Plenck
t. 120. Hayne II. t. 40. Zorn Ic. pl. t. 44.)

Man wendet das Kr. ut (herba Solani
nigri) an; es besteht aus einem rundli-
chen, wehrlosen, ästigen, glatten Stängel
mit eirunden, eckig und spizig gezähnten
Blättern. Es hat einen unangenehmen,
betäubenden Geruch und einen Ekcl erze-
genden Geschmack.

Die Beeren enthalten, nach Desfosses,
ein eigenthümliches Alcaloid, das Sola-
nin (Solaninum, Solanina).

Leicht schweißtreibend, äußerlich erweichend
und lindernd.

4) *Solanum tuberosum, L.*; Kartoffel;
Pomme de terre (Gal.); Common po-
tatoe (Ang.); Rata inuada (Cy.); Jor-
deable (D.); Patata de la Mancha
(His.); Patata, Pomo di terra (I.);
Aardappel (Bel.); Z'ennce jablko (Pol.);
Batata du terra (Lus.); Jordpaeron
(Suec.); Wal arai kilangu (Tam.);
Uralay gudda (Tel.).

Fer. Gal. A. Fi. G. M.

⊙ Eine in America einheimische, von
Walter Raleigh im Jahr 1584 nach
Europa gebrachte Pflanze. (Bauh. Prodr.
t. 39. Plenck t. 121. Bert. Bild. II. 56.
fig. 2.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut
an.

Der Gebrauch der Wurzel in der Küche
ist allgemein bekannt.

In der Medicin wendet man das Stär-
kemehl an, welches diese Wurzel in großer
Menge enthält.

Das Kraut gilt für krampsstillend. La-
t'ham empfiehlt das Extract davon.

Decoctum narcoticum. (Ra.)

℞. Foliorum siccorum Solani nigri
uncias duas.

Capita Papaveris albi . . . no 4.

Aquae libras duas.

Coque et cola. — Lindernd und be-
sänftigend, in Bädungen, örtlichen Bädern,
Einspritzungen und Klystiren anwendbar.

Oleum Solani nigri. (Gal. His. T.)

℞. Herbae Solani nigri cum semini-
bus partes unam.

Olei Olivarum partes tres.

Digere per aliquot tempus inter ci-
neres calidos, tunc ad consumptionem
humidi usque coque. (His.)

Gal. Foliorum partem unam et duas
Olei; . . . T. Herbae uncias duodecim,

Ql. libras quatuor, digestionem per horas 24, filtrationem olei, expressionem faecum, novam cum aequali Summatum et Flarum copla, levem coctionem per aliquot momenta, novam filtrationem et expressionem et demum sepositivum olei ut clarificetur.

Unguentum Solani. (Sp.)

R. Succi Foliorum et Baccarum Solani expressi uno as triginta sex. Olei Olivarum

uncias quinquaginta quatuor.

Cerussae uncias octodecim.

Lithargyri uncias triginta sex.

Coque et adde

Cerae albae uncias sex

Pulveris Oljvani uncias tres.

Aqua Solani nigri. (Br. Gal. Pal.)

R. Herbae Solani nigri partem unam.

Aquae partes tres.

Destillet dimidia pars. (Br. Pal.)

Gal. Herbae partes quinque in Aquas duodecim cum dimidia submersas, destillando partes decem abstrahere, productum miscere cum Herbae partibus quinque et Aquae decem, destillando iterum partes decem abstrahere et operationem, si necessarium videtur, tertio repetere.

Faecula s. Amylin Solani tuberosi. (B. Bel. Fer. Gal. Fl. T. Vm.)

R. Pomorum terrestrium lotorum quantum vis.

Raspe, pulpa commisce cum Aquae tanta quantitate ut per cribrum e erinibus lectum possit transmitti; liquorem turbidum exinde fluentem in vase porcellaneb (Fajente) excipe, sepono, faeculam lotionibus reiteratis purifica et blando calore in loco obscuro sicca.

Fi. Poma terrestria, recentia rasa in vas Aqua repletum immittere, faeculam ad fundum descendantem pluries lavare et siccare jubeb; T. Poma terrestria rasa vel mollia Aqua multa super cribro e erinibus confecto tractare etc. jubet.

Gelatina ex Amylo Solani tuberosi. (B.)

R. Faeculae Solani tuberosi unoiam unam.

Aquae libram unam.

Syrupi Sacchari unciam unam.

Coque sufficienter.

Soldanella.

Calystogla Soldanella, Röm. et Sch.; Meerfohl, Seefohl, Meerwinde; Meerstranbwinde; Soldanelle, Chou marin

(Gal.); Seehundswort (Ang.); Seemerale (D.); Soldanella (His. I. Lus); Zeevinde (Bel); Sjavorinda (Jap.); Br. Gal. Wig. Ha. M. Sp.

2 (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.) Eine in Europa am Meeresufer wachsende Pflanze. (Lob. It. t. 602. Pienak t. 92.)

Man wendet das Kraut (herba Soldanellae s. Brassicae maritima) an; es besteht aus einem, ästigen Stängel mit runden, lichen ober nierförmigen, am Grunde herzförmig ausgezandeten, glatten, sehr langgestielten Blättern.

Purgend. — Gabe, vor einem Scrupel bis zu anderthalb Drachmen.

Sonchus.

Sonchus oleraceus, L.; Kohlgänsebitze, Gemüschsaufenbhl; Laiteron commun (Gal.); Common sowthistle (Ang.); Svinetistel (D.); Corraja (His.); Melkdistel (Bel); Sonco (I.); Mlezno (Pol.); Serrutha (Lus.); Mjaelk tistel (Juc.). Br. Gal. G. M. Sp.

⊙ (Syngenesia Polygamia: Aequalis, L.; Synantheseae, Cass.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 148. Blackw. t. 30. 130. Hayne I. t. 48.)

Man wendet das Kraut (herba Sonchilaevis et asper) an; es besteht aus einem ästigen, walzigen, glatten, hohlen Stängel mit abwechselnden, umfassenden, glatten, gewöhnlich schrotsägeförmig, in spitzige, gezähnte Lappen, mit dreieckigem, sehr großen Endblausen, getheilten Blättern. Es hat einen schwach bitteren Geschmack.

Sorbus.

In den Pharmacopoen werden zwei Arten dieser Pflanzengattung angezigt:

1) Sorbus domestica, L.; Spierlingsbaum, Gährbeinbaum; Cornier (Gal.); Sorbo officinale (I.). Gal. Wig. Bz. Br.

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.) Europa's. (Jacq. Austr. V. t. 447.)

Man wendet die Frucht (fructus Sorbi) Corne, Sorbe (Gal.) an; es ist ein kleiner kernförmiger Apfel, welcher drei knospelige längliche Saamen enthält. Sie ist anfangs sehr herbe, wird aber bei anfangender weinsäuerlicher Gährung süß, behält jedoch immer etwas Abstringirendes.

2) Sorbus aucuparia, L.; Vogelbeerebaum; Sorbier des oiseleurs (Gal.); Mountain ash (Ang.); Englebaer (D.); Serbar de cazador (His.); Sorbenboom (Bel.); Sorbo selvatico (I.); Jakszebina

(Pol.); *Servaiva brava* (Lus.); *Röenn* (Succ.)

Br. Fer. Ful. Li. Suec. Be. Sp.

Ein Baum (*Icosandra Trigynia*, L.; Rosaceae, J.), welcher in ganz Europa wächst. (Zorn Ic. pl. t. 440. *Blackw.* t. 178.)

Man wendet die Früchte (baccae s. pomae Sorbi anoupariae) an; es sind kleine runde, hellrothe, weiche, an der Spitze mit einem Nabel versehene Beeren, welche drei knorpelige Samen enthalten. Ihr Geschmack ist abstringirend, sauer und unangenehm.

Die Bogelbeersäure (*Acidum sorbicum*), von welchem er herrührt, ist nach *Labiellarbierre* und *Braconnot* nichts anders als Aepfelsäure.

Abstringirend, harn-, wassertreibend, antiscorbütisch.

Pulpa baccarum Sorbi. (T.)

Fructus sicci coquantur cum Aquae bullientis sufficiente quantitate ad mollitiem usque, et nucleis separatis in mortario contundantur; trajice pulpam per crinium.

Conserva fructuum Sorbi. (Ei. T.)

R. Fructuum Sorbi non maturorum quantum vis.

Coque ad mollitiem, tunc cum Sacchari pondere aequali ad conservae consistentiam.

T. Pulpae Sorbijum libras quatuor, Syrupi parati cum liquido decocti fructuum et ad plumam evaporati libras sex ad consistentiam necessariam vaporando redigere.

Roob Sorbi aucupariae. (Ful. Li.)

R. Baccarum Sorbi aucupariae contusarum libras octo.

Infunde tantam Aquae quantitatem ut digiti crassitiem tegantur et vase leni igni imposito coque per semihoram, cola fortiter exprimendo, colaturae adde Sacchari libram unam et blando igne ad consistentiam requisitam consume.

Lühend, harnntreibend. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Spigelia.

Von dieser Pflanzengattung werden zwei Arten in den Pharmacopöden angeführt:

1) *Spigelia anthelmia*, L.; wurmwidrige Spigelie; Spigelie anthelminthique (Gal.); *Arapubaca* (Br.); *Espigelia* (Lus.).

Ams. B. Br. D. Fer. Gal. R. Sax. Wir. Wür. G. M.

⊙ (*Pentandria Monogynia*, L.); Gen-

tianae, J.) Eine Nordamerikanische Pflanze. (Desc. Fl. Ant. 1. 61. Lam. Ill. t. 107. *Plenck* t. 88. Zorn Ic. pl. t. 469.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Spigeliae anthelmiae) ist klein und faserig.

Das Kraut besteht aus einem runden Stängel, an dessen Spitze vier große, wirtelförmig gestellte Blätter entspringen.

2) *Spigelia Marylandica*, L.; Marylandische Spigelie; Spigelie de Maryland (Gal.); Carolina pink, Indian pink, Snake root (Ang.)

Am. Ams. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. His Li. Lon. LonN. Lus. R. Sax. Suec. Wir. He. Br. C. M.

⊙ Eine Nordamerikanische Pflanze. (Cat. Carol. 2. p. 78. t. 78. *Plenck* t. 89. Schk. t. 37. Hayne Term. bot. t. 44. f. 5 *Bigel* t. 14.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Spigeliae Marylandicae) ist einfach und faserig.

Das Kraut besteht aus einem vierseitigen Stängel mit gegenüberstehenden, sitzenden, eiförmigen, ganzen, spitzigen, glatten Blättern. Es hat einen häßlichen betäubenden Geruch und einen bitteren ekelhaften Geschmack.

Reizend, wurmwidrig, laxirend. — Gabe des Pulvers, für Kinder von zwölf Jahren zwölf Gran, für Erwachsene eine Drachme.

Pulvis vermifugus. (E.)

R. Spigeliae Marylandicae

Mercurii dulcis grana sedecim.
Auf eine Gabe. grana octo.

Decoctum Spigeliae. (Ful. Wür.)

R. Herbae Spigeliae anthelmiae manipulos duos.

Aquae fontanae libras duas.

Coque et colaturae adde

Succi Citri recens expressi drachmas sex.

Syrupi Florum Persicae

uncias duas.

libras duas.

Gabe, alle sechs Stunden zwei bis drei Unzen für einen Erwachsenen.

Infusum anthelminthicum s. *Spigeliae anthelmiae.* (Am. B. Ful. C. E. Sa. Sw.)

R. Herbae Spigeliae anthelmiae semunciam.

Aquae bullientis uncias sex.

Macera per horas duas et cola. (E. Sa. Sw.)

Am. et C. Spigeliae drachmas duas, Aquae semioctarium, et quatuor horas digestionis.

R. Herbae Spigeliae drachmas tres.
 Aquae bullientis uncias quatuor
 Adde colaturae
 Olei Rutae . . . guttas duas.
 Misce bene. (Ful.)
 Gabe, Abends anberthab bis zwei Unzen. — Man kann zwei Drachmen Serpentaria zusehen.

Infusum vermifugum. (E.)

R. Spigeliae Marylandicae semunciam.
 Foliorum Sennae drachmas duas.
 Mannae . . . unciam unam.
 Foeniculi
 drachmas duas ad quatuor.
 Aquae bullientis octarium unum.
 Gabe, ein Glas täglich drei oder vier Mal.

Syrupus Spigeliae. (Ca.)

R. Foliorum Spigeliae anthelmiae
 uncias duas.
 Seminum Anisi contusorum
 semidrachmam.
 Aquae . . . uncias sex.
 Infunde in balneo aquae per horas
 sex vel septem, cola fortiter exprimendo et adde
 Extracti Jalapae gummosi
 semunciam.
 Dissolve, filtra et colaturae adde
 Sacchari albi . . . duplum.
 Gabe, zwei Kaffeelöffel täglich für Kinder; für Erwachsene ein Eßlöffel Morgens und Abends in einer halben Tasse Behikel.

Spinacia.

Spinacia oleracea, L.; Spinat; Epinard commun (Gal.)
 Br. Gal. B. M.
 ♂ oder ♀ (Dioecia Pentandria, L.; Atriplicaceae, J.) Eine Pflanze, deren Vaterland nicht bekannt ist, und welche man in Europa in Küchengärten baut. (Encycl. méth. t. 344. Blackw. t. 49, f. 2 — 4. Schk. t. 324.)
 Man wendet das Kraut (herba Spinaciae s. Spinachiae) an; es besteht aus einem geraden, etwas ästigen Stängel mit gestielten, pfelförmigen, dunkelgrünen Blättern. Sein Geschmack ist süße.
 Erweichend.

Spiraea.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopden zwei Arten angeführt:
 1) *Spiraea Filipendula*, L.; Steinerstaube; Filipendulwurzel, rothe Steinerstaube; Filipendule (Gal.); Dropwort (Ang.); Roed steenbraak (D.); Roodde steenbreck (Bel.); Filipendula (L.); Kropi-

delso mnicysa (Ret.); Brudbroed (Succ.)
 Br. Gal. His. Li. Wir. Wür. Be. G. M. Sp.

2) (*Rosandria Pentagynia*, L.; Rosaceae, J.) Eine Europäische Pflanze (Zorn 1c pl. t. 394. Hayne VIII. t. 30.)

Man wendet die Wurzel (radix Saxifragae rubrae s. Filipendulae) an; sie besteht aus vielen dünnen, mit fleischigen, runden oder länglichen Höckern besetzten Fasern, ist außen dunkelbraun oder schwärzlich und innen röthlichweiß, hat bloß im Herbst einen Orangengeruch und einen süßlichen Geschmack, welcher beim Trocknen abstringirend und bitterlich wird.

In Rußland wird von den Köpfen der Aufguß der Blätter gegen Bandwurm angewendet.

2) *Spiraea Ulmaria*, L.; Geißbartwurzel, Bienenkönigin, Gumpffierstaube; Reine des prés (Gal.); Queen of the meadows (Ang.); Miaedurn (D.); Reyno del Prado (His.); Reynette (Bel.); Regina degli prati (I.); Rozia brodka (Pöl.); Rainha dos prados (Lus.); Miaeaert (Succ.)

Br. Gal. Gen. His. Wir. Be. M. Sp.
 2) Eine Europäische Pflanze. (Zorn 1c. pl. t. 141. Hayne VIII. t. 31. Düss. off. Pfl. V. t. 6.)

Man wendet die Wurzel, die Blätter und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Barbae caprinae s. Barbulae caprinae s. Ulmariae s. Reginae pratensis) ist wäslig, ungleich, mit reichlicher Behaarung versehen, außen schwärzlichbraun, innen röthlich oder gelblich, von etwas bitterem und styptischem Geschmack.

Die Blätter sind gefiedert, am Ende mit einem unpaarigen dreilappigen Blättchen, die Blättchen sind abwechselnd groß und klein.

Die Blüthen sind weiß und haben einen schwachen, aber angenehmen Geruch nach bitteren Mandeln, welcher sich beim Trocknen verliert und einen süßen etwas abstringirenden Geschmack.

Spongia.

Spongia marina; Badeschwamm, Meeresschwamm, Waschwamm; Eponge de mer (Gal.); Sponge (Ang.); Isfenj (Ar.); Esponjas (His.); Muabadul (Hin.); Spoons (Bel.); Spugna (I.); Univatta (J.); Abermurdeh (Pe.); Esponja (Lus.); Badschwamm (Succ.)

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorG. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.

Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür.
WW. A. Br. C. Fi. G. Par. Pid. Spi.
T.

Ein faseriges Geflecht oder vielmehr Fetz von verschiedenen Seebüchern, welche hinsichtlich ihrer Organisation an den Grenzen des Thierreichs stehen.

Man wendet vorzugsweise den lappigen Seeschwamm, *Spongia laciniatosa*, Lmk. (Esp. Pflzth. II. t. 15 — 17, Eponge pluchée (Gal.), aus dem Mitteländischen, dem Rötchen Meere und dem Indischen Ocean, an. Er ist rundlich, platt, kaum lappig, weich, fzig, sehr löcherig und auf der Oberfläche mit unzähligen Höpchen bedeckt.

Boyle hat Jod darin gefunden.

Spongia praeparata. (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

1) Ohne Wachs. *Spongia praeparata absque cera, Spongiae compressae*.

R. Spongiam tenerem lotam et mundam no. 1.

Humidam adhuc funiculis circumductis constringe fortiter: gyrus funiculi sta contiguus ut nullus intersit spongiae exitus, nodoque facile solubili retine, sicca sedulo et in loco bene sicco serva. (Fer. Gal. GalM. Fi. Sw.)

Bor4. Spongas in frustula oblonga scissas et Aqua fervida humectatas constringere; — His. Spongiam in longos lobos concisam Albumini Ovi immingere antequam funiculis circumstringitur, jubet; — Vm. Mucilage Gummi Arabici illam imbibere jubet.

2) Mit Wachs. *Spongia cerata s. Spongiae ceratae*.

R. Spongiam teneram, siccam, bene lotam et ab omnibus alienis liberatam no. 1.

In ceram flavam igne liquatam immerge, interpositam deinde laminis duabus stanneis in balneo aquae calefactis comprime et post refrigerationem exime. (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Wür. Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

Man bedient sich desselben, um Fisselgänge und natürliche oder wibernatürliche Oeffnungen zu erweitern.

Stachys.

Stachys recta, L.; Beruſtraut; Crapudine (Gal.); White stachys (Ang.); Estaquis recta, Yerba de feridura (His).

His. Wir. Sp.

N. (Didymia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Süd europäische Pflanze. (Jacq. Austr. IV. t. 355.)

Das Kraut (herba Sideritidis hirsutae) besteht aus einem vierkantigen, wenig ästigen, schwach behaarten Stängel mit elliptischen oder lanzettförmigen, herzförmigen, geferbten, raub anzufühlenden Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften Geschmack. Reizend, für ein Wundmittel geltend.

Stannum.

Jupiter; *Karruzos*, *Strayos*; Zinn; Etain (Gal.); Tin (Ang. Bel. D.); Myster, Resas (Ar.); Bédil (Ebr.); Gaimathar (Chald.); Xiflil. (Ind.); Paraz (Sarae.); Yang-eih (C.); Runga (Duk.); Estanno (His.); Kulai (Hin.); Stagno (I.); Tima (Mal.); Urziz (Pe); Gyna (Pol.); Estanho (Lus.); Olowo (R.); Trapu, Ranga (Sa.); Tenn (Suec.); Tagarum (Tain); Galai (Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Haw. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. A. C. Fi. G. Par. Sa. Sp. T.

Ein verbes, fast silberweißes, welches Metall, welches sich in Bleche schlagen läßt, wenig streckbar, bei 210° schmelzbar, nicht flüchtig ist und durch feuchte Luft nur wenig verändert wird. Spec. Gewicht = 7,291. Wenn man es biegt, läßt sich ein eigenes Geräusch hören.

Stannum pulveratum s. praeparatum s. granulum s. raspatum, Limatura Stanni, Orydulum Stanni, Pulvis Stanni philosophice praeparatus. (A. Am. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Sar. Suec. Wir. C. Fi. Sa. Sw.)

R. Stanni Anglior . . . quantum vis. Limae subtilis ope dimipus et pulverem cribratum ad usum serva (Am. Ba. Bor4. Br. Du. Fer. HassP. Pal. C. Sw.)

Li. antequam servetur, coquere in Aceto jñhet, donec hoc supremum a subcarbonate potassae non amplius praecipitatur.

R. Stanni puri . . . quantum vis. Fusum in pyxidem ligneam interne hispidam et creta detritam ingere, quam clausam vehementer agita; pulverem per cribrum trajice. (A. B. Gal. O. Pal. Sar. Suec. Wür. Fi.)

R. Limaturae Stanni . partes duas. Cretae pulveratae partem anam.

Contere in mortario. (R.)
 Sa. Stanni drachmas tres et Corallii unciam unam.

R. Stanni foliati,
 Sacchari albi,
 singulorum partes aequales.

Contere, per cribrum trajice, coque pulverem in Aquae magna copia et deinde sicca. (An.)

Bel. Sal culinare contundere jubet in mortario calefacto illi superfundere deinde stannum fustum, pistillum ce- leriter et fortiter agitando, donec massa sit bene pulverata, tunc lotam et sic- catam per cribrum trajicere.

R. Limaturae Stanni . partes duas.
 Oculorum Cancrorum

Contunde simul. (Ful.)

Pulvis vermifugus. (Ca.)

R. Stanni pulverati unciam unam.
 Aethiopsis mineralis scrupulos duos.
 In sechs Gaben in Syrup, Zherial und Honig, zwei Mal täglich zu nehmen.

Pulvis Stanni martiatus s. ferratus.
 (Au. Sa. Sw.)

R. Limaturae Stanni drachmas duas,
 Sulphatis Ferri grana quinque.
 Contrita in partes quinque divide. —
 Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Bolus e Stanno s. vermifugus. (Sa. Sw.)

R. Pulveris Stanni semiscrupulum.
 Conservae Corticum Aurantium scrupulum unum.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Electuarium vermifugum. (Ca. E. Pic. Ra.)

R. Stanni pulverati drachmas sex ad unciam unam.
 Mellis despumati uncias quatuor.
 Gabe, Morgens zwei oder drei Eßffel.

(E.)
 R. Stanni pulverati unciam unam.
 Extracti Artemisiae,
 Pulveris Jalapae,
 singulorum drachmam unam.

Syrupi Cichorii compositi quantum sufficit.

Auf zwölf oder fünfzehn Mal im einer halben Stunde Zwischenraum, indem man eine Tasse Kräuterbouillon dazu trinkt.

(Ra.)
 R. Stanni pulverati unciam unam.
 Radicis Filicis maris drachmas sex.
 Seminum Cinae semuno am.
 Jalapae,
 Sulphatis Potassae,
 singulorum drachmam unam.

Mellis quantum sufficit.

Gabe, Morgens alle halbe Stunden ei- nen halben Kaffeelöffel voll. (Au. Ca. Pic.)

Amalgama Stanni. (Am. His. Wür. C. Sa.)

R. Stanni uncias duas.
 Mercurii uncias tres.

Calefac mercurium in crucibulo, do- nec in vaporem converti coeperit, in- funde stannum seorsim igne liquatum et miscellam in mortario marmoreo agita, Salis communis pauxillum ad- dendo, abluo deinde bene et in lin- teo sicca. (His.)

Sa. conjungere simul jubet Mercurii drachmas tres et Stanni uncias duas et amalgama, trititando in mortario marmoreo, in pulverem redigere; — Am. et C. conjungere simul Stanni partes quinque et duas Mercurii et amalgama terere cum Gretaë praepa- ratae parte una, donec splendorem me- tallicum penitus amiserit; — Wür. Stanni et Mercurii, singulorum un- ciam unam commiscere et mixturam refrigeratam simul cum Concharum praeparatarum uncia una pulverare.

Pulvis vermifugus. (Sa.)

R. Amalgamatis Stanni semidrachmam.

Rhei pulverati,
 Antimonii diaphoretici non abluti,
 singulorum grana decem.
 Zweimal täglich.

Pilulae anthelminticae. (Sw)*

R. Amalgamatis Stanni quantum vis.
 Inter cineres calidos impone ut me- talla oxydentur adde

Extracti Absinthii quantum sufficit.
 Fiant pilulae granorum sex. — Gabe, Morgens vier, sechs oder acht Stück.

Electuarium joviale ad taeniam s. ver- mifugum. (Br. Wür. Ca. Sp. Vin.)

R. Stanni puri,
 Mercurii,

singulorum unciam unam.
 Fiat amalgama, quod cum
 Concharum praeparatarum

uncia una
 Conservae Absinthii uncias duas.
 Syrupi Menthae quantum sufficit

ut fiat electuarium. (Br. Wür. Ca. Sp.)
 Vm. loco subcarbonatis calcis (con- char.) Magnesium calcinatam et loco syrupi menthae illum Sacchari adhibet.

Gabe, zwei Drachmen täglich zwei Mal.

Unguentum empiricum Tlaki in tu- moribus haemorrhoidalibus s. antihae- morrhoidale. (B.)

R. Limaturae Stanni

Mercurii,

singulorum drachmas duas.
Fiat amalgama, cui adde
Unguenti rosati . unciam unam.
Præcipitati rubri drachmas duas.
Olei Menthae piperitæ
guttas viginti.

Misce trititando.

*Protoxydum Stanni, Suboxydum Stan-
ni, Stannum suboxydatum s. pulvera-
tum, Pulvis Stanni.* (B*. P.l. Sw. Vm.)

R. Stanni puri . . . quantum vis.
In fusione bene aëri aperto exposi-
tum, donec totum in pulverem grise-
um sit conversum, quem tritum cri-
bra. (Pal. Sw. Vm.)

R. Chlorureti Stanni in Aqua soluti
quantum vis.
Potassæ causticæ liquidae

quantum sufficit
ad præcipitandum et dissolvendum oxy-
dum; filtra solutionem et Acidum hy-
drochloricum infunde ut oxydum præ-
cipitetur. (B*.)

Burmwidrig, purgirend, besonders gegen
Bandwurm in Gebrauch, aber auch gegen
Augenschwindsucht gerühmt. — Gabe,
fünf bis sechs Gran.

*Antihæcticum Poterii, Bezoardicum jo-
viale.* (Sar. Wir. Sp. Vm.)

R. Reguli Antimonii partes quatuor.
Stanni subtilis

partes quinque cum dimidia.
Liquata igne in laminam metalli fri-
gidam effunde et cum

Nitri pulverati partibus quindecim
commisce; in crucibulum incandescens
ingere et mixta et fusa prope ignem
adhuc per aliquot tempus retine, tunc
refrigerata cum Aqua frigida ablue et
blando calore sicca. (Vm.)

Wir. et Sp. Reguli unciæ sex, Stan-
ni duas et Nitri viginti quatuor; —
Sar. Reguli sex, Stanni tantidem et
Nitri triginta sex.

Ehedem für geeignet gehalten, Blüt-
und Saamenflüsse zum Stillstand zu brin-
gen und colliquative Schweiß Schwind-
süchtiger zu mindern. — Gabe; eine halbe
Drachme Morgens und Abends.

*Persulphuretum Stanni, Oxydum Stan-
ni hydrosulphureum, Stannum sulphu-
ratum, Stannum præparatum cum Sul-
phure, Protosulphuretum Stanni, Sulphu-
retum Stanni, Aurum mosaicum.* (An.
B*. Fer. Br. Ca. Fi. Sw*. T. Vm.)

R. Stanni pulverati . . . uncias tres.
Sulphuris sublimati unciam unam.
In crucibulum supra carbones ar-
dentes ingesta calefac, donec flamma
vivacissima appareat, ab igne remove,

obtege crucibulum et massam refrige-
ratam porphyrisa et cribra. (An. Fer.
Br. Ca. Fi. T.)

Vm. Calcinare simul jubet Oxydi
Stanni partes septem et Sulphuris in
baculis quatuor cum dimidia.

R. Chlorureti Stanni quantum vis.
Infunde Hydrosulphatæm Potassæ li-
quidum, donec nullum amplius enas-
catur præcipitatum, quod siccatum ad
ruborem usque calefac. (Sw*. Vm.)

R. Stanni partes duodecim.
Mercurii . . . partes tres.
Florum Sulphuris partes septem.
Salis Ammoniaci . . . partes tres.

Tere lenteque calefac, quamdiu Gas
acidum sulphuricum evolvatur, calcina
deinde fortiter, donec massa squamosa,
splendens flava remaneat. (B*.)

Pulvis vermifugus. (Sw*.)

R. Persulphureti Stanni partes tres.
Mercurii . . . partem unam.

Tritura ad mercurii extinctionem us-
que. — Besonders bei Bandwurm em-
pfohlen. Gabe, von zwei Drachmen bis
eine halbe Unze, Morgens, in Wermuthcon-
serve.

*Chloruretum Stanni, Liquor fumans
Libavii, Butyrum Stanni, Murias su-
peroxygenatus Stanni, Deutomurias Stan-
ni, Deutohydrochloras Stanni, Murias
Stanni s. Oxyduli Stanni.* (B*. Ba. Vm.)

R. Stanni . . . partem unam.
Acidi hydrochlorici concentrati

partes tres.
Dissolve caloris ope et crystallisa-
tioni subijce.

Ein heftiges Purgirmittel. — Gabe,
zwei Gran.

Ba. dilutum cum Aquæ partibus no-
vem us reagens ad detegendum auri
præsentiam indicat.

*Liquor Stanni muriatici, Murias Oxy-
duli Stanni liquidus* (HassP. sec. Ba.)
Lunaturæ drachmas tres, Acidi Salis
sex calore 30° vel 40° solvatur, liquo-
rem saturatum, a reliquo stanno defun-
de et cum Aquæ destillatæ duplo di-
lutum, clarum serva. — Ut reagens.

Stützlobium.

Stützlobium pruriens, P. Rührgras,
juçende Raseln; Pois à gratter (Gal.);
Copenhage (Ang.); Kosambiliwail, De-
wipughura (Cy.); Klaende baenne (D.);
Kaumhkuri kebenge (Duk); Kiwach
(Hin.); Jeukboontjes (Bel.); Dolico
pizzicaule (L.); Rawe (Ja.); Kapikach-
lin (Sa.); Punaykalie (Tam.); Piliadu-
kugaila (Tel.).

D. Du. Ed. Fer. Lon. Sax. Suec.
Wir. A. Be. C. M.

Ein Strauch (Diadelphia Decandria, L.; Legum. nosae, J.) Südamerica's. (Desc. Fl. Ant. t. 49.)

Man wendet die Frucht (Siliqua hirsuta) an, eine zwei bis vier Zoll lange, fast fingerdicke, ledrige, gebogene, überall mit steifen, spröden, stehenden, leicht loszumachenden, glänzenden, braunrothen Borsten (Stitzolobium, setae s. lanugo Siliquae hirsutae) besetzte Hülse.

In America betrachtet man es als wurmwirrig. — Gabe, drei bis sechs Gran in einem Syrup.

Electuarium vermifugum. (E.)

R. Setarum Siliquae hirsutae drachmam unam.
Mellis . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll für ein Kind von zwei bis drei Jahren.

Stoechas.

Unter diesem Namen werden drei verschiedene Pflanzen in den Pharmacopöden angeführt:

1) *Lavandula Stoechas*, L.; Stöckas; *Stoechas d'Arabie* (Gal.); *Stoechas* (Bel. D. Suec.); French lavender (Ang.); *Cantnosa* (His.); *Stecade* (I.); *Rosmarinko* (Lus.).

Ams. An. B. Br. Fer. His. Wir. Be. Br. Fi. G. M. Sp.

Ein kleiner Strauch (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) des südlichen Europa's (Zorn 1c. pl. t. 485.)

Man wendet die Blüten (flores *Stoechadis purpureae* s. *Arabicae*) an; sie sind dunkelpurpurroth und bilden eine gedrängte eirundstämmige Kehre, über welcher ein Büschel gefärbter Blätter steht. Sie haben, besonders gerieben, einen angenehmen, kampherartigen Geruch; ihr Geschmack ist gewürzhalt und bitter.

2) *Helichrysum arenarium*, Gärtin.; gelber Stöckas; *Stoechas citrina* (Gal.).
Br. Gal. Wir. Wür. Be. M. Sp.

3) oder 4) (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantherea, Cass.) Eine Europäische Pflanze. (Zorn 1c. pl. t. 352.)

Man wendet die Blüten (flores *Stoechadis citrinae* s. *Germanicae* s. *Amaranthi lutei* s. *Helichrysi*) an, welche strahlige, eiförmige, citron- oder goldgelbe Köpfe bilden. Sie haben fast gar keinen Geruch und einen schwach syphtischen Geschmack.

Pharmacopoea universalis. II.

3) *Helichrysum Stoechas*, Cand; meines Ruhrkraut; *Stoechas de Naples* (Gal.); Eternal flower (Ang.).

Gal.
Eine Südeuropäische Pflanze. (Zorn Hist. pl. p. 92. t. 279.)

Man wendet die Blüten (flores *Stoechadis Neapolitanae*) an; sie bilden strahlige, fast walzenförmige, etwa zwei Linien lange Köpfe und sind gelb und geruchlos.

Syrupus de Stoechade. (Gal. T.)

R. *Spicarum Stoechadis Arabicae* unciam unam.
Aquae destillatae Stoechadis libras duas.

Digere in balneo Aquae per duas horas et colaturae adde

Sacchari albi duplum.
Liqua in balneo aquae et cola per pannum.

Syrupus de Stoechade s. *de Stoechade compositus.* (Gal. Wir. Vm.)

R. *Cinnamomi* partem unam.
Zingiberis,
Calami, singulorum partes duas.
Polygonum recentium Foeniculi,
— *Rutae*,
— *Rorismarini*,
— *Salviae*,
— *Thymi*,

Stoechadis, singulorum partes octo.
Aquae partes quingentas.

Destillent partes septuaginta, cum quibus et
Sacchari albi

partibus centum viginti octo
syrupum in balneo aquae para. (Vm.)

R. *Spicarum siccarum Stoechadis* uncias tres.

Summitatum florescentium et siccatarium Thymi

unciis quatuor cum dimidia.

— *Salviae*,
— *Rorismarini*,
singulorum drachmas sex.

Seminum Rutae,
— *Foeniculi*, singulorum drachmas quatuor cum dimidia.

Cinnamomi,
Zingiberis,

Calami, singulorum drachmas duas.
Aquae communis . . . libras octo.

Macera per duos dies in vase tecto, tunc liquidi destillatione abstracti semilibrae adde

Sacchari albi . . . libram unam.
Residuum exprimendo coletur; colaturae adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.
Fiat coquendo syrupum; syrupum

utrumque refrigeratum commisce. (Gal.)

R. *Stoechadis Arabicae* uncias duas.

Florum Rorismarini
drachmas duas.

Calaminthae montanae,
Origani,
Thymi, singulorum drachmas tres.
Betonicae,
Salviae, singulorum drachmas duas.
Seminum Anisi,
— Paeoniae, singulorum drachmas duas cum dimidia.

Calami,
Zingiberis,
singulorum drachmam unam.

Aquae bullientis . libram unam.
Macera per dies duos in loco calido,
cola exprimendo et colaturae uncias
novem adde

Sacchari albi . uncias sedecim.
Solve semel ebulliendo et cola. (Wir.)
Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Storax.

Styrax solidus, *Styrax Resina*, *Styracis Balsamum*; Storax, Judenweihrauch; *Στυράξ*; Storax, *Styrax solide* (Gal.); Storax (*An. D. Suec.*); Usteruk (*Ar.*); Estoraque (*His. Lus.*); *Styrax* (*Bel.*); *Storaçe* (*I.*).

A. Ams. An. B. Ba. Br. D. Du. Ed. Penu. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. Hasp. His. Lon. Lus. O. Suec. Wir. Wür. A. B. Br. C. Fi. G. M. Pfd. Sp, Z.

Man unterscheidet 1) *Styrax granulata* s. in granis; Storax in Körnern oder Tropfen; Storax en grains, en larmes (Gal.), in kleinen, durchsichtigen, glänzenden, etwas fettigen, unter den Zähnen sich erweichenden Körnern von angenehmem Geruch und harzigem Geschmack; 2) *Styrax in massis*; Storax in Stücken; Storax en pains (Gal.); in röhlichen, wohlriechenden, bisweilen erweichten und eine honigartige Flüssigkeit gebenden Massen von angenehmem Geruch und bitterem, harzigem Geschmack. Die erstere Varietät ist heutzutage sehr selten; den Alten war sie unter dem Namen *Styrax Calamita* oder *canulata*, *Calamites vera* bekannt, welchen seitdem auch die zweite führt. Diese nennt man Mandelstorax (*Storax amandé*), wenn die Stücke die Größe einer Mandel haben.

Dieser Balsam soll von *Styrax officinale*, L., kommen, einem Baume (*Docandria Monogynia*, L.; *Ebenaceae*, J.) des südlichen Europa's und des Orient's. (*Plenck* t. 341. *Lam. Ill.* t. 369. *Encycl. méth.* t. 369.) Vielleicht kommt er von *Liquidambar orientalis*, *Link.*

Reizend. — Gabe, von zehn Gran bis zu einer halben Drachme.

Strychninum.

Strychnina, *Strychna*; *Strychnin*; *Strychnine* (Gal.).

B*. Fer. Gal. Ca. Fi. Ma. T.

R. Extracti alcoholici Nucis vomicae
quantum vis.

In Aqua dissoluto adde liquori Acetatem Plumbi liquidum, donec nihil amplius praecipitetur; plumbum ope torrentis Gasis acidi hydrosulphurici separa, filtra, coque cum Magnesia, praecipitatum cum Aqua frigida ablue et in Alcohole dissolve; solutionem ad siccum consume.

T. proponit ad obtinendum strychninum magis album et purum, illud in Aqua cum Acido nitrico leviter acidulata fervida solvere, adhuc bulliens per carbonem animale filtrare, evaporatione et refrigeratione obtentum strychninum nitricum denuo in Aqua solvere et solutioni Ammonium causticum infundere; praecipitatum exentum in Alcohole solvere et vaporando in crystallos redigere.

Ein heftiges Reizmittel und sehr starkes Gift, von welchem schon ein Viertelgran oft einen heftigen Einbruch auf den Menschen macht. Man wendet es bei Lähmungen an, indem man mit einem Sechszehntelgran anfängt und allmählig steigt.

Pilulae Strychnini. (B*. Fer. GalF. GalH. B. Bo. Ca. E. Ma. Pie. Ra.)

R. Strychnini . . . grana duo.
Conservae Rosarum . . . semidrachmam.

Fiant pilulae viginti quatuor, argento obducendae. (B* Fer. GalF. GalH. Bo. Ca. E. Ma. Pie. Ra. T.)

B. Strychnini semigranum ad grana sex, Micae Panis, Mellis despumati et Pulveris Liquiritiae quantum sufficit ut fiant pilulae quatuor; — Gabe, Morgens alle zwei Stunden ein Stück. Wahrscheinlich ist die Formel falsch.

Tinctura Strychnini. (B*. Fer. GalF. Bo. Ma. Pie. Ra. T.)

R. Strychnini . . . grana tria.
Alcoholis (36°) . . . unciam unam.

T. Strychnini purissimi semiscrupulum, Alcoholis 36° uncias quatuor.

Gabe, sechs bis zwanzig (T.) bis sechzig Tropfen.

Potio stimulans. (GalF. Ma. Pie. Ra.)

R. Strychnini . . . granum unum.
Aquae destillatae . . . uncias duas.

Sacchari albi . . . drachmas duas.
Acidi acetici . . . guttas duas.

Empfohlen Morgens und Abends.
Pulvis Strychnini. (B.)

R. Strychnini . . . partem grani sedeoimam.

Aethiopsis martialis . grana sex.
Sacchari . . . semidrachmam.
Morgens und Abends zu nehmen.

Strychninum nitricum, *Niras Strychnini* s. *Strychninae*; salzsaures Strychnin. (Bor4. T.)

R. Nucum vomicarum . libras octo.
Spiritus Frumenti libras sedecim.

Decoque in vesica destillatoria, donec dimidia pars fluidi destillata fuerit, tum nucas colando separatae siccantur et pulverentur; pulverem h s terve digere cum Spiritus Frumenti quantitate sufficiente, post digestionem semper exprimendo; tincturae destillationi subjiciantur et quod remanet, tum fluido a decocto residuo ad remanentium librarum duodecim evaporet; adde Plumbum aceticum depuratum in Aquae destillatae s. q. solutum, quamdiu praecipitatum efficitur; liquor filtrato, quantum fieri potest, separatim leni igne ad dimidium evaporet, refrigeratum misce cum Magnesiae usque unciis duabus et seponere per triiduum, sedimentum filtratum edulcoratur, siccatur et in pulverem tritum cum Spiritus Vini alcoholisati sextuplo bis terve digeratur, tincturae destillat ad unciarum aliquot remanentiam; strychninum instar pulveris albi conspicuum, filtratone separatim bis terve Spiritu Vini rectificato cum Aquae communis quantitate aequali diluto ad separationem lixivii adhaerentis usque lava et cum Acidi nitrici dilutionis quantitate sufficiente neutralisa. Liqueorem filtra et blandissimo calore in crystallis redige caute dispensandas.

7. Obtinetur, infundendo per vices Acidum nitricum 36° B. cum Aquae pondere quintuplo vel sextuplo dilutum in solutionem Strychnini aquosam, videndo ut sit baseos excessus, evaporare deinde et seponere ut crystalli deiciantur.

Ist noch giftiger als das Strychnin.

Strychnos.

Strychnos colubrina, L.; Schlangenholz; Bois de couleuvre (Gal.); Snake-wood (Ang.); Kuchila-luta (Beng.); Mahapenala (Cy.); Widero-pait (Jav.); Modira caniram (Mal.).

Br. Gal. His. Pal. Wir. A. Br. G. M. Sp.

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Apocynaceae, J.), welcher auf den Molucken wächst. (Rumph Amb. 2. c. 46. t. 87. Blackw. t. 403. Plenck. t. 118.)

Man vendet die Wurzel (Lignum colubrinum) an; sie besitzt, wenn sie alt ist, eine sehr große Bitterkeit. Es sind schwarze,

etwas gelblichweiße, mit einer bräunlichen, runzligen, höckerigen Rinde bedeckte Stücke, welche gar keinen Geruch haben.

Pelletier und Caventou haben Strychnin darin gefunden.

Man hält sie für ein specifisches Mittel gegen den Biß giftiger Thiere; jetzt ist sie in Vergessenheit gekommen, müßte aber ohne Zweifel mit großer Vorsicht angewendet werden. Boerhaave rühmte sie gegen Wechselfieber.

S t y r a x .

Styrax Liquidambar, *Styrax liquida*, *Styrax liquidus*, *Ambraliquida*; flüssiger Storax; *Styrax liquida*, *Liquidambar* (Gal.); *Liquide storax* (Ang.); *Tekaucy sstyra* (r.); *Estoraque*; *Liquido* (His.); *Vloejende storax* (Bel.); *Storax rzadki* (Pol.).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer Gal. GalM. Han. HassP. His. O. Pol. Sax. Suec. Wir. WW. Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.

Man unterscheidet zwei Balsame dieses Namens:

1) Den Storax von Louisiana, Copalmbalsam, Copalmdöl (Copalme, Baume ou Huile de Copalme, Copalme de la Louisiane), von honigartiger Consistenz, durchsichtig, röthlichgelb mit der Zeit dunkel- oder schwärzlichroth werdend, von sehr angenehmem Geruch und scharfem, gewürzhaftem Geschmack, und zu einem braunen, schwärzlichen und brüchigen Harz verhärtend.

2) Den gemeinen Storax (Styrax commun), von der Consistenz einer dicken Salbe, röthlich, graulich oder bräunlich, kaum durchscheinend, von starkem, angenehmem Geruch und scharfem und bitterem Geschmack.

Dieser Balsam fließt aus dem *Styraxbaum*, *Liquidambar styraciflua*, L., einem Baume (Monocotyledon Polyandria, L.; Armentaceae, J.) Mexico's. (Blackw. t. 485. Plenck t. 676. Schk. t. 807. Lam. t. 783. Fl. méd. VI. 331.)

Bonastre hat darin einen eigenthümlichen harzigen und crystallisirbaren Stoff, welchen er *Styracin* (*Styracinum*) *Styracine* nennt, entdeckt.

Reisend, fast ausschließlich zum äußern Gebrauch.

Unguentum Styracis resinosum s. *Styrace compositum*. (An. B. Bel. Br. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. Sar. Wir. Wür. Ca. Sp. Vm.)

R. Olei Juglandis partes trecentas

Styracis . . . partes octo.
Liqua blando calore, subinde agitando; seponere, cola et adde

Colophonii partes quadringentas octoginta.

Elemi,
Cerae flavae, singulorum partes centum nonaginta duas.

Cola per liuteum. (Gal. GalM.)
Gen. Sar. et Sp. Olei Juglandis libram unam, Styracis semilibram, Colophonii libram unam, Elemi et Cerae, singulorum semilibram.

℞. Olei Olivarum
uncias duas et dimidiam.

Styracis,
Elemi,
Cerae flavae, singulorum uncias septem et dimidiam.

Colophonii . . . uncias duas.

Liqua simul. (B*. Br. Han. Wir.)
Wür. et Vm. Olei, Styracis, Elemi, Cerae, singulorum partem unam et duas Colophonii; — Suc. Olei unam cum dimidia et reliquarum substantiarum, singularum septem; — HassP. Elemi, Cerae, singulorum drachmas quindecim, Colophonii semunciam, Styracis drachmas quindecim, Olei uncias septem cum dimidia.

℞. Terebinthinae uncias quindecim.
Olei Juglandis . . . uncias undecim.
Elemi,
Cerae flavae,
singulorum uncias septem.

Liqua leni calore et ab igne remotis adde
Styracis . . . uncias septem.
Evaporet liquidum blando calore. (Au. Bel.)

℞. Axungiae,
Colophonii,
singulorum libram unam.
Oli Juglandis uncias quindecim.
Elemi,
Cerae flavae, singulorum uncias sex.
Massae igne liquatae adde
Styracis . . . uncias septem.
Misce sedulo. (Ca)

Emplastrum Styracis stomachicum s. de Styrace. (His.)

℞. Cerae flavae,
Olibani, singulorum libras duas.
Terebinthinae . . . libras tres.

Mixtis et liquatis adde
Styracis,
Mastichis,
Ladani, singulorum uncias tres et dimidiam.
Benzoës uncias duas et scrupulos duos.

Piperis Jamaicensis
uncias quatuor cum dimidia.
Olei Menthae,
— Absinthii,
singulorum drachmas duas.

Misce exacte.

℞. Cerae flavae libras duas cum dimidia.
Terebinthinae . . . libras tres.
Tacamahacae
libras duas et dimidiam.

Styracis,
Mastichis,
Ladani, singulorum uncias quatuor cum dimidia.

Benzoës,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae, singulorum drachmas octodecim.

Olei Menthae,
— Absinthii,
singulorum drachmas duas.

Styracem mollefactam cum ladano contunde, cerae paucillum addendo, liqua cum cera et terebinthina, cola, tum adde pulveres et olea
Unguentum digestivum. (Ra.)

℞. Unguenti de Styrace libram unam.
Olei Olivarum . . . semilibram.

Misce.
Unguentum antiscorbuticum. (Sm.)

℞. Unguenti de Styrace
uncias quinque.

Balsami Fioravanti unciam unam.

Misce.
Balsamum ad loricandum cadaver conditum. (Sp.)

℞. Balsami Peruviani,
— Copaivae,
Styracis, singulorum uncias viginti quatuor.

Olei Nucis moschatae uncias octo.
— Lavandulae . . . uncias duas.
— Thymi . . . semunciam.

Liqua blando igne.

S u c c i n u m .

Succinum album et citrinum, Electrum, Ambra flava; "Ηλεκτρον; Aigtstein, Bernstein; Succin, Ambre jaune, Karabé (Gal.); Yellow amber (Ang.); Kernulbehr (Ar.); Hambar (Ba.); Ambar (Cy. Mal.); Beegsteen (D.); Karuha (Duk. Pc.); Sucino (His.); Kepur (Hin.); Barnsteen (Bel.); Ambra gialla, Succino, Carabe (I.); Barsztyn (Pol.); Alumbre (Lus.); Jantar (R.); Bernsten (Succ.); Umbir (Tam. Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suc. Wir. Wür. WW A. C. Fi. G. Pid. Sp. T.

Ein fester, mehr oder weniger dunkelgelber, weißer, rother, bisweilen rötlichbrauner, fast schwarzer, durchsichtiger, durchscheinender oder undurchsichtiger, bisweilen wolkig

ger Körper mit muscheligen, glänzendem Bruche, welcher sich poliren läßt, nicht sehr hart ist, leicht bricht, erwärmt einen schwachen Geruch verbreitet, erzieht electrisch wird und mit gelber und grünlicher Flamme brennt, indem er einen dicken Rauch und einen starken, durchbringenden, nicht unangenehmen Geruch verbreitet.

Succinum praeparatum. (Fi.)

Succinum pulveratum in mortario porphyreo cum Aqua laevigatur et in pastam tenerrimam redigitur inter charitam siccandam.

Pulvis fumalis s. ad suffiendum s. pro suffimigo s. pro suffimento. (BorC. Br Li. RC. T.)

℞. Olibani,

Succini, singulorum partes aequales.

Grossiuscule pulvera. (BorC.)

RC. Substantiarum dictarum, singularum partes tres, Florum Lavandulae Spicae partem unam.

℞. Baccarum Juniperi,

Mastichis,

Succini, singulorum uncias quatuor.

Cascarillae . . . unciam unam.

Fiat pulvis grossus. (Li.)

T. Benzoës, Succini, Cascarillae, Coffeae tostae, Sacchari albi, pulveratorum singulorum partes aequales.

℞. Succini . . . uncias viginti.

Olibani . . . uncias decem.

Mastichis . . . uncias quatuor.

Ladani,

Benzoës,

Storacis,

Ligni Rhodii,

Santali citrini,

singulorum uncias duas.

Petalorum Rosarum rubrarum

uncias quatuor.

Florum Lavandulae uncias tres.

Baccarum Juniperi

uncias duodecim.

Fiat pulvis grossus. (Er.)

Tinctura Succini aetherea s. balsamica. (B. Sax. Suec. Wir. Wür. Sw. T. Vm.)

℞. Succini flavi . . . uncias duas.

Aetheris sulphurici . . . libras duas.

Digere per dies quatuor super arenae balneo, blando calore, et cola. (Wür.)

T. Succini drachmas duas, Aetheris sulphurici 56° Ar. unciam unam macerare per duos dies et sepositione clarificata decanthare.

℞. Succini pulverati et leviter tosti

uncias duas.

Alcoholis

uncias septem cum dimidia.

Post aliquot dies digestionis in vase tecto, filtra et adde

Aetheris sulphurici

uncias duas cum dimidia.

Serva. (B*)

℞. Succini pulverati et leviter tosti unciam unam.

Liquoris anodyni mineralis

uncias quinque.

Digere per dies quatuor in vase tecto et cola. (Sw.)

℞. Succini grossiuscule pulverati partem unam.

Liquoris anodyni mineralis

partes tres.

Macera frigide per dies octo, saepius agitando et filtra. (Sax. Vm.)

Succ. Succini unciam unam et Liquoris quatuor; — Wir. Succini unciam unam et Liquoris tres cum dimidia; — Ful. Succini partem unam et Liquoris sex.

Reizend, krampfstillend, nerveustärkend, anticatarthalsch und auf den Uterus wirkend. — Gabe, funfzehn bis dreißig Tropfen auf Zucker oder in einem Glase Wasser.

Tinctura s. Essentia Succini s. alcoholica, Alcohol cum Succino. (Ams. An. Bel. Bor. Borä. Br. Gal. Gen. Han. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. Fi. T. Vm.)

℞. Succini albi pulverati

unciam unam.

Alcoholis (38°) . . . uncias sex.

Digere blando calore per tres dies, decantha et residuo infunde

Alcoholis (38°) . . . uncias duas.

Post duos dies digestionis cola, colaturas misce et filtra. (An.)

℞. Succini albi . . . partem unam.

Alcoholis (32°) . . . partes octo.

Digere frigide per dies decem, cola exprimendo et filtra. (Bel.)

Ams. Succini partem unam, Alcoholis (0,835) octo et octo dies digestionis blando calore; — Wir. Succini sesquunciam, Alcoholis concentrati uncias sex et aliquot dies frigidae digestionis; — Pal. Succini unciam unam, Alcoholis concentrati octo et aliquot dies digestionis blando calore; — Br. et Li. Succini unciam unam, Alcoholis libram unam et octo dies digestionis leni calore; — Gal. Succini unam, Alcoholis (26°) sedecim et sex dies digestionis, tunc sepositionem per dies sex; — Gen. Succini unciam unam, Alcoholis decem et octo dies digestionis.

℞. Succini pulverati et leviter in pelvi ferrea tosti partem unam.

Alcoholis concentrati

partes quatuor.

Post aliquot dies digestionis blando calore in vase clauso et subinde agi-

tando, filtra. (Bor. Bor4. Br. Han. O. Pol. Sax. Vm.)

Fi. T. Succini flavi pulverati uncias tres, Alcoholis 30° libram unam digerere in retorta vitrea foramine parvo instructa, subinde agitando et blando calore, et post sex dies filtrare.

Edwach reizend, gegen Catarrh, balsamisch, nervenstärkend und Mundmittel. — Gabe, fünfzehn bis dreißig, vierzig bis sechzig Tropfen.

Julep s. Julapium succinatum. (Gen.)

℞. Tincturae Succini drachmas duas. Sacchari unciam unam. Aquae uncias sex. Misce.

Tinctura s. Essentia Succini alcalisata. (Br. Sar. Wir. Sp.)

℞. Succini pulverati uncias duas. Subcarbonatis Potassae liquidi semunciam.

Fiat pasta, cui siccatae infunde Alcoholis uncias octo vel quantum satis, ut trium vel quatuor digitorum crassitiem tegatur. Post aliquot dies digestionis super arena tepida filtra. (Br. Sar.)

℞. Succini uncias quatuor. Subcarbonatis Potassae uncias sex. Tritura simul et infunde Aquae Vitae uncias sedecim.

Post aliquot dies macerationis destillent liquidi ciroiter unciae octo; evaporent reliqua ad siccum, residuo infunde spiritum primo obtentum et post sufficientem digestionem liquorem filtra. (Wir.)

℞. Pulveris Succini, Subcarbonatis Potassae, singulorum uncias duodecim. Alcoholis concentrati uncias viginti quatuor.

Spiritui destillato per octo dies in balneo aquae infunde pulverem e Succini unciis octo. Olei Tartari per deliquium quantitate sufficiente ut fiat pasta quae deinde siocetur. Filtra. (Sp.)

Reizend, nervenstärkend, gegen Catarrh und auflösend. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Resina Succini. (Li.)

℞. Suocini libras duas. Alcoholis libras quatuor.

Post tres dies digestionis in arena balneo decantha et residuum itidem cum novo Alcoholo tracta, donec hio non amplius coloretur; tincturae commixtae destillent, resina abluta lente sicceetur.

Oleum Succini crudum. (Bor4.)

In officinis chemicis paratur. Pond. spec. = 0,886.

Oleum Succini aethereum, Oleum Succini rectificatum s. depuratum, Oleum Succini, Aethereolum s. Pyroleum Succini. (Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. H's. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. Br. C. Fi. Fid. Sw. T. Vm.)

℞. Succini contusi quantum vis. In retortam arenaceam luto obturatam immitte, quae tubi ope cum vasto recipiente tubulato communicat; tunc destillationem, igne gradatim aucto, continua, donec nihil amplius prodeat, quo facto oleum infundibuli ope separetur.

*RC. Oleum a liquore acido separatum e retorta vitrea Aquae sextuplo addito, destillet, donec trientes duo aquae prodierint; — *Fi. Oleum in paratione Salis volatilis succini obtentum, separatum pluries cum Aqua calida lavare, donec omnis saporis aciduli expers sit, et iterum destillare, donec dimidia pars ponderis prodierit.**

Man wendet dieses Del nur rectificirt an. Es giebt dazu mehrere Verfahrensweisen.

℞. Olei empyreumatici Succini quantum vis.

In retortam infunde ad dimidium usque inde replendam, destillent, levi sub bullitione, donec oleum magis colore tinctum prodire coeperit. (Ba. GalH. Pal. Br. Vm.)

Lon. LonN. duas rectificationes successivas; — Pal. tres; — Gen. et Wir. quatuor.

℞. Olei Succini partem unam. Cinerum Lignorum partes duas. Destillent lente. (Br. Fer. Hass. Li. Pal. Wir. Pid.)

℞. Olei Succini, Carbonis Lignorum s. vegetabilis, singulorum partes aequales. Destillent in retorta vitrea. (Fenn. Ful. HassP. Succ.)

℞. Olei Succini, Carbonis Lignorum, singulorum partem unam. Aquae partes sex. Destillent lente. (O.)

Sar. Cretam puram vel Cornu Cervi calcinatum; — T. Oleum cum mixtura e Pulvere Carbonum et Calcois ad aërem extinctae in globulos redigere, hos cum Aquae quadruplo vel quintuplo olei adhibiti in retortam tubula-

tam ingerere et in balneo arenas moderato calore destillare.

℞. Olei Succini . . . partem unam.
Aque partes sex.

Destillent partes quatuor et oleum ab aqua separetur. (Am. B. Bel. Bor. D. Du. Ed. Han. Sax. C. Sv.)

Bor4. Oleum Succini crudum cum Aquae fontanae octuplo destillet, ita ut tertia pars prioris remaneat.

℞. Olei Succini . . . libram unam.
Aque libras sex.

Destillent lente unciae quatuor, quo facto recipiente mutato denuo unciae quinque destillent, quae cum Aqua redestillentur, ita ut unciae tres abstractantur; commisce productum secundum cum priore et totum denuo cum Aqua destillet. (Ams.)

His destillationem Olei cum Aquae partibus duodecim repetere jubet, nec illud perfecte liquidum sit.

Reizend, krampfstillend, nervenstärkend, auflösend, schweiß- und harntreibend, Monatsfluß befördernd. — Gabe, fünf bis fünfzehn Tropfen. — Man braucht es nur wenig.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Succini. (Pal. Wir.)

℞. Sacchari albi . . . unciam unam.
Olei Succini . . . guttas sedecim.
Misce trititando.

Balsamum Succini. (Wir.)

℞. Olei Succini drachmam unam.
— Nucis moschatae drachmas duas cum dimidia.

Misce. — Außerlich bei Hysterie und Kopfschmerz angewendet.

Moschus artificialis, Resina Succini balsamica, Oleum Succini oxydatum, Succinum oxygenatum. (Am. B. Li. O. R. C. Suc. Br. C. Vm.)

℞. Olei Succini . . . partes duas.
Acidi nitrici . . . partes sex.

Stent in reactione per horas viginti quatuor, tunc cum Aqua frigida lava. (B. Li.)

Am. et C. Olei partem unam et duas Acidi; — O. Olei duas et Acidi quinque; — Vm. Olei unam et tres Acidi; — Suc. et Br. Olei unam et quatuor Acidi; — R. C. Olei rectificati drachmam unam, Acidi nitrico-nitrosi drachmas tres cum dimidia.

Reizend, als Ersatzmittel des wahren Moschus empfohlen.

Tinctura Moschi artificialis s. Resinae Succini s. Succini balsamica. (B. Li. Suc. Vm.)

℞. Moschi artificialis partem unam.

Alcoholis concentrati partes octo. Dissolve blando calore. (B. Li.)

Suc. Moschi partem unam et septem Alcoholis; — Vm. Moschi unam et Alcoholis sedecim.

Reizend, bei Epilepsie empfohlen. — Gabe, vierzig Tropfen.

Tinctura Succini foetida. (Fer.)

℞. Olei Succini rectificati drachmas duas.

Subcarbonatis Potassae,
Saponis medicinalis,

singulorum drachmam unam.
Alcoholis uncias quatuor.

Post aliquot dies filtra.
Hujus liquoris guttas aliquot Ammoniaco infundendo, aquam *Aquae Lucae* (Eau de Luce) aliquanto s milern obtines.

Potio expectorans. (E.)

℞. Olei Succini . . . guttas octoginta.
Gummi Arabici,

Sacchari, singulorum semunciam.
Tincturae Balsami Tolutani

drachmas duas.
Aque uncias quatuor.

Gabe, ein Eßlöffel alle zwei oder drei Stunden, bei krampfhaftem Husten.

Liquor succinicus anodynus s. anodynus succinatus. (Sw.)

℞. Spiritus Succini oleosi rectificati sesquidrachmam.

Acidi sulphurici concentrati semilibram.

Destillet in retorta vitrea libra una. — Gegen Epilepsie in Deutschland gerühmt. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen in Wermuth- oder Nünzensyrup.

S u l p h u r.

Θειον; Schwefel; Soufre (Gal.); Sulphur (Ang.); Kahlrit (Ar.); Lew (C.); Gundaka (Cy.); Svolv (D.); Gunduck (Duk.); Azufre (His.); Gundhuk (Hin.); Schwavel (Bel.); Zolfo (I.); Gunduk (Mah.); Blerong (Mal.); Gowgird (Pe.); Siarka (Pol.); Enxofre (Lus.); Sura (R.); Gandhaka (Sa.); Skafvel (Succ.); Gendagum (Tam.); Ghendagum (Tel.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Penn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HussP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. R. C. Sax. Suc. Wir. Wür. WW. A. C. Fi. G. Par. Pid. Sa. Sp. T.

Ein berber, citrongelber, beim geringsten Stoß sehr zerreiblicher Körper mit glänzendem Bruch, welcher in Nadeln oder

Octaëdern crySTALLISIRT, sich schmelzen, verflüchtigen und entzünden läßt, geschmack- und geruchlos ist, gerieben jedoch einen schwachen Geruch verbreitet. Man findet ihn im Handel unter zwei Formen.

1) als Stängenschwefel (Sulphur citrinum s. in baculis), Soufre en canon (Gal.), in walzenförmigen, mehr oder weniger schmutzig- oder graulichgelben Stücken, welche fast immer in ihrer Mitte nadelförmige Crystalle enthalten.

2) als Schwefelblüthen (Flores Sulphuris) Fleurs de soufre, Soufre sublimé (Gal.), in sehr feinem, schön gelbem Pulver.

An. Br. Fer. Ful. Hass. HassP. His. Pal. Sar. Wir. Wür. *Pi. Pid. Sw. T. et Vm.* Flores Sulphuris pharmaceutam ipsam praeparare jubent, sublimando Sulphur venale vel solum, vel antea cum Aerenae lotae certa (aequali) quantitate mixtum. Abluere illos deinde bene jubent, ut ab Acido sulphuroso forte inhaerenti liberentur.

Reliquae pharmacopaeae quae Flores Sulphuris venales indicant, illos antequam adhibeantur abluere jubent. Nomen deinde accipiunt: *Sulphur depuratum s. lotum, Flores Sulphuris loti s. depurati.*

Alius, Sulphur purum obtinendi modus, quod deinde *Sulphur praecipitatum, Lac s. Magisterium Sulphuris, Hydras Sulphuris*; Schwefelmilch; Soufre précipité, Magistère de soufre, Hydrate de soufre (Gal.) nominatur (An. B. Ba. Bel. Bor. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Li. Lon. LonN. O. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Pid. Sp. Sw*. T. Vm.*), in eo constat, ut solutio aquosa Sulphureti Potassae vel Sodae (An. T.), vel Sulphureti Calcis (Lon. C.) Aceti destillati vel Acidi hydrochlorici ope decomponatur et praecipitatum sedulo ablutum sicceatur; — Bor4. et HassP. Liquorem e Solutione saturata Sulphuris depurati in Liquore Kali caustici cum Aquae calidae triplo mixtum per horas viginti quatuor seponere, tunc decantatione et filtratione depurato instillare Acidi sulphurici diluti quantum ad praecipitandum sulphur requiritur, praecipitatum Aqua tepida ablutum sicca.

Ein Reizmittel, welches je nach der Gabe, und besonders nach dem Subject, als aufregendes, Auswurf beförderndes, Schweiß und Harn treibendes und als Purgirmittel wirkt. Es ist eins der kräftigsten und schätzbarsten Agentien der Materia medica; auch wendet man es unter einer großen Anzahl verschiedener Formen und zur Er-

füllung mannichfaltiger Indicationen an. — Gabe des Pulvers, zwölf bis zwanzig Gran, zwei oder drei Mal täglich, als Reizmittel, eine bis zwei Drachmen und mehr als Purgirmittel.

Carburetum Sulphuris.

Alcohol Sulphuris (Vm.)

℞. Sulphureti Ferri pulverati partes quinque cum dimidia.

Carbonis

partem unam cum dimidia. Miscere diu triturando, imple partem quartam retortae et distillationem institue ad incandescentiam usque calefaciendo; liquidum in fundo aquae in recipiente contentae existens seponere. Man hat mit dieser Substanz einige Versuche gemacht; sie scheinen aber keinen Erfolg gehabt zu haben.

Pulvis dentifricius. (Pic.)

℞. Florum Sulphuris unciam unam. Laccæ pulveratae

quantum sufficit.

Fiat pulvis tenerrimus.

Pulvis contra scabiem s. antipsoricus. (Ham. Wür. Au. Ca. Sw*.)

℞. Sulphuris,

Radiciis Liquiritiae,

singulorum drachmas sex.

Gamphorae semidrachmam.

Gabe, eine halbe Drachme zwei Mal täglich. (Au.)

℞. Sulphuris sublimati,

Carbonis Lignorum,

Lateris contusi,

singulorum partes aequales.

Fiat pulvis. (Ca.)

℞. Florum Sulphuris,

Antimonii crudi,

singulorum semunciam.

Magnesiae drachmas duas.

Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Florum Sulphuris,

Aethiopsis antimonialis,

— mineralis,

singulorum unciam unam.

Fiat pulvis tenerrimus. (Wür.)

℞. Nitri,

Sacchari,

singulorum drachmas duas.

Cremonis Tartari drachmas sex.

Florum Sulphuris sesquiunciam.

Fiat pulvis. (Sw*.)

Das zweite dieser Pulver dient nur äußerlich, mit etwas Del vermischt. Die beiden folgenden können sowohl äußerlich, als innerlich angewendet werden. Das letzte wird nur innerlich benützt.

Pulvis diaphoreticus. (Huf. Sm.)

℞. Florum Sulphuris

drachmas quatuor.

Camphorae . scrupulum unum.
Fiant doses duodecim. — Gabe, ein
oder zwei Stück täglich in einer Tasse
Thee. (Sm.)

℞. Sulphuris puri . drachmas duas.
— aurati Antimonii,
Camphorae,
singulorum grana octo.
Sacchari . scrupulos duos.
Gabe, eine halbe Drachme, drei oder vier
Mal täglich. (Huf.)

*Pulvis pleuraticus Mynsichti s. anti-
pleureticus.* (Wir.)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Dentium Apri,
Maxillarum Lucii piscis,
singulorum unciam unam.
Florum Papaveris . semunciam.
Gabe, von einem Scrupel bis zur hal-
ben Drachme.

Pulvis laxans. (E. Ra.)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari,
singulorum unciam unam.
Sacchari albi . quantum sufficit.
Misce. (Ra.)

E. Sulphuris semunciam et Cremo-
ris Tartari unciam unam.

Man vermischt dieses Pulver mit Honig
und giebt Kindern etwa einen Kaffeelöffel
voll vier oder fünf Mal täglich.

Empfindliche Magen vertragen eine Mi-
schung von Sulphur praecipitatum und
Magnesia, singulorum partes aequales
besser; man läßt davon täglich vier oder
fünf Mal einen Löffel in Milch nehmen.
(E.)

Pulvis Sulphuris sublimati compositus.
(RC.)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari,
singulorum partes duas.
Pulveris Zingiberis vel
— aromatici, vel
Elaeosacchari Carvi, vel
— Foeniculi . partem unam.

Bei Kräfte, Hautkrankheiten, Verschlei-
mung der Lunge, Hämorrhoiden. — Gabe, eine
bis zwei Drachmen bei Schlafengehen, mit
Syrup.

Pulvis antiasthmaticus s. incisivus. (Gal.
GalM.)

℞. Sacchari albi . . . partes tres.
Florum Sulphuris . partes duas.
Scillae siccatae . partem unam.

Pulvis antidysentericus. (Vm.)

℞. Florum Sulphuris . partes octo.
Foeniculi . . . partem unam.
Gummi Arabici,

Sacchari albi,
singulorum partes sedecim.

*Pulvis catharticus absorbens s. purgans
absorbens.* (Sw.)

℞. Subcarbonatis Calcis,
Florum Sulphuris,
singulorum unciam unam.
Gabe, zehn bis zwanzig Gran für Kin-
der; eine halbe bis ganze Drachme für Er-
wachsene.

*Pulvis sulphureosus s. sulphureus s. ca-
tarrhalis s. anticatarrhalis.* (BorC. Ful.
Ham. Ca. Huf.)

℞. Florum Sulphuris,
Liquiritiae pulveratae,
singulorum drachmas sex.
Camphorae . . . semidrachmam.

Fiat pulvis. (BorC.)

℞. Florum Sulphuris,
Nitri purificati,
Radices Liquiritiae,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. (Ful.)

Ham. eandem formulam, sed loco
nitri Sal Ammoniacum.

℞. Florum Sulphuris drachmas duas.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Sulphuris aurati Antimonii
grana quindecim.

Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Sacchari . . . uncias tres.
Radices Iridis Florentinae
scrupulos novem.
Florum Sulphuris
scrupulos quatuor.

Croci . . . drachmam unam.

Gummi Arabici,

Amyli,

Liquiritiae,

singulorum scrupulum unum.

Fiat pulvis. (Ca.)

℞. Florum Sulphuris sesquiunciam.
Foeniculi,
Iridis Florentinae,
Liquiritiae,
singulorum unciam unam.

Foliorum Sennae drachmas sex.

Fiat pulvis. (Huf.)

Gabe, eine oder zwei Drachmen.

Pulvis pectoralis resolvens. (Br. Pal.
Wir.)

℞. Specierum diaereos simplicium,
— diatragacanthae frigidarum,
singularum semunciam.

Liquiritiae,

Althaeae,

singularum drachmas tres.

Boli Armenae,

Florum Sulphuris,

singulorum drachmas duas.

Terrae sigillatae sesquidrachmam.
Sacchari crystallisati (Candis) albi
uncias sex.

Fiat pulvis. (Pal.)

℞. Radicis Ari,
— Iridis Florentinae,
Antimonii diaphoretici,
Florum Sulphuris,
Cinnabaris nativi,
Oculorum Cancrorum,
singulorum semunciam.

Fiat pulvis. (Br. Wir.)

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis pectoralis s. pectoralis balsamicus s. expectorans. (B*. Br. Wir. Bo. Ca. Pie. Sp. Sw.)

℞. Radicis Liquiritiae unciam unam.
— Iridis Florentinae
drachmas duas.
Florum Sulphuris . . . semunciam.
— Benzoës scrupulum unum.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Olei essentialis Anisi,
— Foeniculi,
singulorum guttas decem.

Fiat pulvis. (B* Br. Wir.)

Sp: Liquiritiae, Iridis, singularum drachmas sex, Sulphuris unciam unam, Acidi benzoici drachmam unam, Sacchari uncias duas et Oleorum, singularum guttas decem; — Ca. et Sw. Liquiritiae, Iridis, singularum drachmas duas, Sulphuris semunciam, Acidi benzoici scrupulum unum, Sacchari uncias duas et Oleorum, singularum guttas decem.

℞. Aoidi benzoici . . . grana sex.
Florum Sulphuris . . . grana decem.
Cascarillae . . . grana duodecim.
Sacchari crystallisati grana viginti.

Fiat pulvis. (Pie.)

Das letztere ist auf eine Gabe.

Pulvis di gambello. (Fi.)

℞. Muriatis Sodae,
Sulphuris,
Cinerum Vegetabilium non maritimorum,
singulorum partes aequales.

Pulverata seorsim commisce. — Mit Wasser vermischt, zum Waschen der Hände.

Bolus Sulphuris. (GalM.)

℞. Sulphuris loti . . . grana octo.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiat bolus.

Bolus Sulphuris compositus. (GalM.)

℞. Sulphuris loti,
Anisi pulverati,
singulorum grana octo.

Foliorum Sennae pulveratorum
grana quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.

Fiat bolus.

Bolus diaphoretici. (Ca.)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari, singularum scrupulum unum.
Resinae Guajaci . . . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant boli duo. — Ein Stück Morgens, das andre Abends, bei Hautkrankheiten und chronischen Rheumatismen.

Bolus in cystitide lenta. (B.)

℞. Florum Sulphuris drachmam unam.
Terebinthinae Venetae
scrupulos duos.

Fiant boli sex. — Gabe, alle drei Stunden ein Stück. — Diese Bissen sollen sich vorzüglich nützlich beweißen, wenn eine Hautkrankheit entweder als Ursache oder als Complication vorhanden ist.

Bolus antiasthmatici. (Ca)

℞. Conservae Apii,
Extracti Inulae,
singulorum drachmam unam.
Florum Sulphuris,
Gummi Ammoniaci,
singulorum semidrachmam.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Fiant boli granorum decem. — Gabe, ein, zwei oder drei Stück fünf oder sechs Mal täglich.

Bolus antihaemorrhoidales. (Ca. Sa. Sm.)

℞. Florum Sulphuris
scrupulos quatuor.
Electuarii catholici scrupulos octo.
Fiant boli quatuor. (Ca. Sm.)
℞. Florum Sulphuris scrupulos duos.
Electuarii lenitivi drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici
quantum sufficit

ut fiant boli duo. (Sa.)
Gabe, Morgens ein Stück.

Rotulae pectorales, Trochisci e Sulphure, Tabellae pectorales s. e Sulphure. (Ans. Br. Gal. Au. Ca. Fi. Pie. Sm. Sw. T. Vm.)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Sacchari albi . . . partes octo.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit

ut fiant tabellae. (Gal.)

Pie. Sulphuris partem unam, Sacchari sex; — Ams. Pie. et Sm. Sulphuris unam et duas Sacchari; — T. Quantitates non indicat.

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Sacchari albi . . . partes duodecim.
Tere sulphur cum sacchari parte

Drachmen Agaricus piperatus hinzuzusetzen, um es wirksamer zu machen.

Looch expectorans. (Han. Bo. Pic. Sm.)

℞. Florum Sulphuris drachmam unam.
Sacchari pulverati drachmas duas.
Olei Lini unciam unam.
Syrupi balsamici . sesquiunciam.
Misc. (Han.)

℞. Syrui Violarum . sesquiunciam.
Oxymellis simplicis unciam unam.
Florum Sulphuris semidrachmam.
— Benzoës grana quindecim.

Misce. (Bo. Pic.)

℞. Mellis Narbonnensis,
Pulpae Uvarum,
singulorum uncias duas.
Florum Sulphuris,
— Benzoës,
singulorum drachmam unam.
Syrupi Erysimi quantum sufficit.

Misce. (Pic.)

Sm. eandem formulam sed loco pulpae uvarum illam Pomorum Renetiorum adhibet.

Mixtura Sulphuris praecipitati, Potio sulphurata. (Au.)

℞. Sulphuris praecipitati drachmas duas.

Aquae Foeniculi . . . uncias tres.

— Cinnamomi unciam unam.

Syrupi Opii semunciam.

Gabe, alle zwei Stunden einen Eßffel, bei zuckerartiger Harnruhr und Mercurialfrankheit.

Tinctura Sulphuris. (Wir.)

℞. Sulphuris sesquiunciam.
Liqua lenti ignis ope in patina fictili et adde sensim

Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Ignem auge, ut massa magis liquecat, tunc illam in mortarium calidum effunde et pulveratae infunde

Alcoholis concentrati uncias decem.

Post sufficientem digestionem cola. —

Reizend: bei Brustfrankheiten, Kräfte und scorbutischen Geschwüren empfohlen. — Gabe, fünfzig bis sechzig Tropfen in einen passenden Behälter.

Balsamum Sulphuris simplex, Oleum sulphuratum, Oleum Lini sulphuratum, Corpus pro Balsamo Sulphuris, Linimentum e Sulphure. (Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Ful. Han. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pal. Sar. Sax. Wir. Br. Ca. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Olei Amygdalarum dulcium

partes sex.

Digere in balneo arenae per aliquot dies et decantha. (Sar. Wir.)

Sp. easdem quantitates, sed loco olei amygdalarum illud Juglandum adhibet; — An. Bel. Bor. D. Fer. Han. O. Sax. et Vm. Sulphuris partem unam et quatuor Olei Lini; — Bor4. Sulphuris citrini partes duas, Olei Lini partes octo; — Br. Sulphuris unam et quatuor Olei Amygdalarum dulcium; — Ful. et C. Sulphuris unam et quatuor Olei Olivarum; — His. et Pid. Sulphuris unam et quatuor Olei Juglandis; — Li. Sulphuris unam et quatuor Olei Lini; — Ca. Sulphuris unam et tres Olei Juglandis; — Br. Sulphuris unam et Olei Lini duas; — HassP. Florum Sulphuris uncias tres, Olei Lini sesquibram; — Ams. Ed. Lon. LonN. Br. et Sw. Sulphuris unam et octo Olei Olivarum; — Sw. Sulphuris et Olei Olivarum, singulorum partes aequales; — T. Florum uncias tres, Olei Juglandis vel Amygdalarum dulcium viginti: (Balsamum Rulandi.) Olei octodecim. (Fi.)

℞. Florum Sulphuris . uncias duas.
Olei Papaveris . . . sesquilibram.
Vini generosi . . . semilibram.

Post octo dies digestionis coque ad humidi consumptionem usque. (Pal.)

Balsamum Sulphuris anisatum. (An. B*. Br. D. Gal. His. Li. Pal. Sar. Wir. Ca. Fi. Pic. T. Vm.)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Olei essentialis Anisi

partes quatuor.

Digere ex arenae balneo. (An. Br. Gal. His. Ca. Fi. Pic. T. Vm.)

Pal. Sar. et Wir. Sulphuris partem unam et sex Olei.

℞. Balsami Sulphuris simplicis partem unam.

Olei essentialis Anisi partes quinque.

Misce sedulo. (B*. D. Li.)

Emulsio cum Balsamo Sulphuris anisato (Vm.)

℞. Gummi Arabici drachmas duas.
Balsami Sulphuris anisati

drachmam unam.

Mellis Narbonnensis unciam unam.

Aquae Hyssopi . . . uncias octo.

Balsamum Sulphuris succinatam. (His. Sar. Vm.)

℞. Olei Succini rectificati partes sex.
Florum Sulphuris partem unam.

Digere super arena. (Sar. Vm.)

His. Olei partem unam et quatuor Sulphuris; — Fi. Florum unciam unam, Olei quatuor.

Balsamus Vitae Rulandi, Balsamum Sulphuris terebinthinatum, Oleum Terebinthinae sulphuratum. (An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Hau. His. Li.

O. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. Ca. Pid. T. Vm.)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Essentiae (Olei) Terebinthinae partes quatuor.

Dissolve in balneo arenae. (Fer. His. Fi. Vm.)

Br. et Wür. Sulphuris partem unam et Essentiae quinque; — Pal. Sar. Wir. et Ca. Sulphuris unam et Essentiae quinque; — T. Florum unam, Olei octo.

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Olei Lini . . . partes sex.

Dissolve et solutionis partibus tribus adde

Essentiae Terebinthinae partes octo,

Misce. (Suec.)

Am. B. Bel. Bor. Han. et C. Balsami Sulphuris simplicis partem unam et tres Essentiae; — Pid. Balsami unam et quatuor Essentiae; — D. Balsami unam et Essentiae octo; — Li. Balsami unam et Essentiae quinque; — Feg. Balsami tres et Essentiae triginta duas; — Bor4. Olei Lini sulphurati partem unam, Terebinthinae partes tres.

℞. Sulphuris . . . uncias duas.
Essentiae Terebinthinae uncias tres.
Olei Lini . . . libras duas.

Liqua sulphur in oleo, adde essentiam et digere blandissimo calore. (Br. Wir.)

Reizend, ehedem für harntreibend gehalten. — Gabe, sechs bis zwölf Tropfen.

Balsamum aethereum. (Au.)

℞. Balsami Sulphuris terebinthinati, Aetheris sulphurici, singulorum semidrachmam.

Olei animalis Dippelii guttas sex. Von Buching bei colica pituitosa von Anonie des Magens empfohlen. — Gabe, zwei bis zehn Tropfen, täglich drei Mal, auf Zucker oder in etwas Wasser.

Ceratum e Sulphure. (Ra. Sw.)

℞. Florum Sulphuris uncias quatuor.
Cerati . . . libram unam.

Misce. (Ra.)

℞. Florum Sulphuris, Baccarum Lauri, singulorum unciam unam.

Butyri recentis quantum sufficit.
Misce triturando. (Sw.)

Unguentum Sulphuris s. e Sulphure s. sulphuratum simplex s. ad scabiem, Pomatum Sulphuris s. sulphuratum simplex s. antipsoricum. (Am. Ba. Bor. BorC. Bor4. Du. Ed. Ham. Han. Lon. LonN. Lus. RC. Sax. Au. C. Ca. Ra. Sw. T.)

℞. Florum Sulphuris partem unam.

Axungiae Porci . . partes duas.
Misce triturando. (Bor. BorC. Bor4. Han. Sax. Ra. Sw.)

Ba. Sulphuris partem unam et tres Axungiae; — Am. Du. Ed. Lon. RC. et C. Sulphuris unam et quatuor Adipis; — LonN. Sulphuris sublimati uncias tres, Adipis praeparatae libram dimidiam; — Ham. Sulphuris unam et Axungiae octo; — Au. Sulphuris unciam unam et Axungiae quantum sufficit; — T. Florum uncias sex, Axungiae octo, Sebi quatuor.

℞. Sulphuris . . . partem unam.
Unguenti rosati . . partes duas.

Contere. (Lus.)

℞. Olei Juglandis . . semilibram.
Florum Sulphuris . uncias duas.

Dissolve in balneo aquae et adde

Axungiae Porci . . semilibram.
Cerae flavae . . unciam unam.
Alcannae . . quantum sufficit
ad colorandum. Cola per linteum. (Ca.)

Linimentum psoricum, Pomatum sulphuro-saponaceum s. antipsoricum. (B*. DD. GalH. Au. Ra.)

℞. Florum Sulphuris,

Saponis albi,

singulorum partem unam.

Aquae pure . . . partes tres.

Dissolve saponem in Aqua, per cribrum trajice et adde sulphur, continue agitando. (GalH. Ra.)

℞. Subcarbonatis Potassae

uncias duas

Aquae bullientis unciam unam.

Olei Olivarum . uncias quatuor.

Fiat sapo, cui continue terendo, sensim adde

Florum Sulphuris uncias quinque.

Misce bene. (Ra.)

℞. Saponis nigri . . . partes duas.

Florum Sulphuris partem unam.

Misce triturando. (DD.)

B*. Sulphuris et Saponis nigri, singulorum partes aequales cum Aquae sufficientem quantitate.

℞. Florum Sulphuris,

Saponis mollis,

singulorum semilibram.

Rad'icis Hellebori albi uncias duas.

Nitri . . . drachmam unam.

Axungiae . . . sesquilibram.

Misce. (Au.)

Lotio sulphuro-saponacea. (Ra.)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.

Aquae . . . libras quindecim.

Solutioni adde

Sulphuris pulverati uncias tres.

Unguentum sulphuratum s. Sulphuris s. sulphuris compositum s. antipsoricum s. contra scabiem s. ad scabiem, Po-

matium Sulphuris compositum, Pomatum s. Unguentum antipsoricum Jasseri. (A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Ful. Gal. GalM. Han. His. Li. Lon. LonN. Pol. R. Sar. Sax. WW. Au. Bo. Br. C. Ca. Pid. Pie. Ra. Sa. Sm. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. *Florum Sulphuris* . partes duas.
Subcarbonatis Potassae

partem unam,

Axungiae Porci . . partes octo.

Misce triturando. (Gal. Ca. Sv.)

Sa. *Sulphuris* uncias duas, Subcarbonatis semunciam et *Essentiae Citri* semiscrupulum; — D. *Sulphuris*, *Baccarum Lauri*, singulorum unciam unam, *Radici Inulae* uncias duas, Subcarbonatis semunciam et *Axungiae* uncias decem.

℞. *Florum Sulphuris*,
Sulphatis Zinci,

singulorum partes sex.

Axungiae Porci partes sedecim.

Contere. (WW.)

D. et R. *Sulphuris* partes duas, *Sulphatis* unam et duodecim *Axungiae*.

℞. *Florum Sulphuris* . partes duas.
Oxydi Zinci

partem unam cum dimidia.

Olei Lauri . . . partes tres.

Axungiae Porci . . partes sex.

Misce simul. (Vm.)

℞. *Florum Sulphuris*,
Sulphatis Zinci,

Olei Lauri,

singulorum partem unam.

Axungiae Porci . . partes sex.

Contere. (Sax.)

His. *Sulphuris* partes duas, *Sulphatis* tantidem, *Olei Lauri* quatuor et quatuor *Axungiae*; — B. Bel. et Li. *Sulphuris* duas, unam *Sulphatis*, *Olei Lauri* tres et *Axungiae* sex; — Sw. *Sulphuris*, *Sulphatis* et *Olei Lauri*, singulorum partes aequales absque *axungia*; — Ful. *Sulphuris* partes duas, *Sulphatis* unam et sex *Axungiae* absque oleo; — Bor. Bor4. et Pol. *Sulphuris*, *Sulphatis*, singulorum duas, et octo *Axungiae* absque oleo; — A. *Sulphuris* sesquiunciam, *Sulphatis* tantidem et *Unguenti simplicis* libram unam.

℞. *Florum Sulphuris*,
Sulphatis Zinci,

Baccarum Lauri,

singulorum partem unam.

Unguenti rosati partes quatuor.

Misce bene. (Han.)

Sm. *Sulphuris*, *Sulphatis*, *Baccarum Lauri*, singulorum unciam unam et *Olei Lini* quantum sufficit.

℞. *Florum Sulphuris* . uncias duas,
Cerussae pulveratae semunciam.

Præcipitati albi drachmas duas.
Axungiae cum Aqua Rosarum ablutae . . . libram unam.

Misce bene. (Sar.)

℞. *Radici Lapati aquatici* uncias octo.
Foliorum Fumariae,

— *Lauri*,

— *Nicotianae*, singulorum manipulum dimidium.

Aquae . . . quantum sufficit.

Coque, postea contunde, cola per cribrum et unciis sex pulpa adde

Florum Sulphuris . semunciam.

Salis marini decrepitati

drachmas sex.

Axungiae Porci . . uncias tres.

Misce triturando. (Bo.)

℞. *Florum Sulphuris* . partes duas.
Salis marini decrepitati

partem unam.

Axungiae Porci . . partes octo.

Pulveres cum axungia liquata comisce. (GalM.)

℞. *Florum Sulphuris*,

Salis marini decrepitati,

singulorum uncias quatuor.

Adipis sulli praeparati

sesquilibram.

Sevi bovilli . . . uncias sex.

Olei essentialis Lavandulae drachmas duas.

Fiat l. a. unguentum. (Pi.)

T. *Florum libram unam*, *Salis uncias sex*, *Axungiae libras tres*, *Sebi unam*, *Olei Lavandulae* semunciam.

℞. *Florum Sulphuris* partes sedecim.

Salis Ammoniaci partem unam.

Axungiae Porci partes triginta duas.

Commisce bene. (Pid.)

Ams. et B*. *Sulphuris* partes octo, *Salis Ammoniaci* unam et *Axungiae* sedecim; — Ra. *Sulphuris* uncias duas,

Salis Ammoniaci drachmam unam, *Axungiae* uncias quatuor et *Essentiae Citri* scrupulum unum; — Pie. *Sulphuris* uncias duas, *Salis Ammoniaci* drachmas duas, *Axungiae* uncias duas et *Olei essentialis* *Florum Aurantium* quantum sufficit; — Au. *Sulphuris* uncias tres, *Salis Ammoniaci* drachmas duas et *Axungiae Porci* quantum sufficit ut fiat unguentum.

℞. *Florum Sulphuris* partes sexaginta.

Salis Ammoniaci,

Aluminis,

singulorum partes quatuor.

Misce. (Gal.)

℞. *Florum Sulphuris* unciam unam.

Pulveris Hellebori albi

drachmas duas.

Axungiae Porci . . uncias duas.

Commisce. (An.)

℞. *Florum Sulphuris*,

Sapont, singulorum semilibram,
 Radicis Hellebori nigri uncias duas.
 Axungiae libras duas cum dimidia.
 Miscē sedulo. (Sax.)
 ℞. Sulphuris semilibram.
 Radicis Hellebori albi uncias duas.
 Nitri drachmam unam.
 Saponis mollis vel nigri semilibram.
 Axungiae Porci sesquilibram.
 Miscē. (Man. HassP. Lon. LonN.)
 ℞. Sulphuris libram unam, Hellebori albi uncias tres, Nitri sesquiunciam, Saponis libram unam et Axungiae libras tres.
 ℞. Florum Sulphuris unciam unam.
 Praecipitati albi,
 Acidi benzoici, singulorum drachmam unam.
 Olei essentialis Citri unciam unam.
 Acidi sulphurici grana sedecim.
 Nitri drachmas duas.
 Axungiae semilibram.
 Axungiae liquatae reliquas substantias, continue ad refrigerationem usque agitandae, admisce. (Am. C.)
 ℞. Axungiae Porci uncias octodecim.
 Olei rosati uncias sex.
 Florum Sulphuris uncias novem,
 Pulveris Caryophyllorum,
 — Granorum Paradisi,
 — Zingiberis, singulorum sesquiunciam.
 Miscē bene. (Sp.)
 ℞. Axungiae Porci libram unam.
 Extracti Fellis Tauri uncias duas.
 Florum Sulphuris,
 Aloës hepaticae,
 Colocythidis, singulorum semunciam.
 Olei Absinthii drachmas tres.
 Axungiae leni igne liquatae, admisce reliqua. (Br.)
 ℞. Succis Elaterii partem unam.
 Coagulet blandi caloris ope, tunc faeculam separatam et exstillatam commisce cum
 Olei Olivarum parte dimidia.
 Butyri partis quadrante,
 et supra ignem relinque, donec humidum consumptum sit; contunde deinde et adde
 Cerae partis decimum.
 Extracti Fellis,
 Galbani, singulorum partis nonagesimum.
 Massae semiconcretae deinde adde Scammonii,
 Aloës,
 Colocythidis,
 Corticis Mezerei, singulorum partis quinquagesimum.

Euphorbia,
 Myrrhae,
 Piperis longi,
 Zingiberis, singulorum partis centesimum.
 Miscē bene. (Br.)
 Unguentum s. Pomatum antiherpeticum.
 (I'ie.)
 ℞. Florum Sulphuris drachmam unam.
 Pulpae Radicis Patientiae unciam unam.
 Axungiae Porci uncias duas,
 Succis Citri ophthalmia duo,
 Miscē sedulo.
 ℞. Florum Sulphuris,
 Benzoës, singulorum uncias duas.
 Butyri recentis quantum sufficit.
 Miscē triturando.
 Unguentum s. Pomatum contra tineam.
 (Bq.)
 ℞. Florum Sulphuris,
 Carbonis pulverati, singulorum uncias duas.
 Fuliginis pulverati,
 Chinae pulveratae, singulorum unciam unam.
 Cerati quantum sufficit.
 Contere et bene misce.
 Emplastrum resinose sulphuratum
 s. Guillermi servitoris s. sulphuratum.
 (His.)
 ℞. Resinae Pini,
 Colophontii, singulorum libras duas.
 Cerae flavae libram unam.
 Terebinthinae uncias octo,
 Mixturae liquatae adde
 Pulveris Zingiberis sesquiunciam.
 — Baccarum Lauri,
 — Sulphuris,
 — Anisi,
 — Pulegii,
 — Olibani;
 — Croci,
 — Mastichis, singulorum unciam unam.
 — Piperis Jamaicensis uncias duas,
 Miscē exacte.
 S w i e t e n i a .
 Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopden zwei Arten angezeigt:
 1) Swietenia Mahagony, L.; Mahagoniholz; Mahogon d'Amérique, Acajou à meubles (Gal.).
 D. Br. G. M.
 Ein großer Baum (Decandria Monogynia, L.; Meliaceae, J.) Südamerica's.

(Plenck t. 326. Hayne I. t. 19. Cat. Carol. II. t. 20.)

Man wendet die Rinde des Stamms und der Zweige (cortex ligni Mahagoni), an; es sind fast platte, fußlange, rauhe, graubraune Stücke; die von den Zweigen ist gerollt, handlang und kürzer, außen hellweißlichgrau, innen dunkelrothbraun; sie hat keinen Geruch, aber einen sehr abstringirenden, etwas bitteren Geschmack.

2) *Swietenia febrifuga*, Roxb.; Fieberbaum; Mahagon febrifuge (*Gal.*); Rohun (*Beng.*); Swamy (*Can.*); Patranga (*Sa.*); Schemmarum (*Tam.*); Soimido (*Tel.*).

D. Du. C. G.

Ein Baum der Rüste Coromandel. (*Roxb. Fl. Corom. I. t. 17. Hayne I. t. 20.*)

Man wendet die Rinde (cortex Soyimidae) an; sie kommt in Stücken von verschiedener Größe, von meist einem bis zwei Fuß Länge, auf einen bis acht Zoll Breite und von mäßiger Dicke vor, hat eine dünne, rauhe, aschgraue, einigermaßen punctirte Oberhaut und ist feuerroth, bricht leicht, ist aber übrigens hart und der Politur fähig. Sie hat einen angenehmen, schwach gewürzhaften Geruch und einen sehr bitteren, abstringirenden und etwas balsamischen Geschmack.

Fiebermittel. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel.

T.

Tacamahaca.

Zwei Harze führen in den Pharmacopöen diesen Namen:

1) *Tacamahaca*; Sacundtact, Takamahatharz; *Tacamahaca ordinaire* (*Gal.*); *Takamahaka* (*B.*); *Hak og tak* (*D.*); *Tacamaca* (*His.*); *Taccamacca* (*I.*).

Ams. An. B. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. O. R. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. M. Sp. T. Z.*

In unregelmäßigen Massen, welche aus aneinandertlebenden Stücken zu bestehen scheinen, von gelblicher oder grünlicher Farbe, innerlich halbburchscheinend, außen mit wellenförmigen, weißlichen, graulichen Binden; sie lassen sich leicht zerreiben und haben einen gewürzhaften, terpentinartigen Geruch und keinen besonders merkbaren, nach einiger Zeit scharf werdenden Geschmack.

Außer dieser Sorte, welche gemeiner Takamahat (*Tacamahaca communis* s. in sortis), *Tacamahaca commun* ou en sorte (*Gal.*), genannt wird, kennt man noch eine andre, *Tacamahaca sublimis* s. in testa, *Tacamahaca sublime*, *angelique* ou en coques, in Tropfen oder kleinen Körnern, außen von weißlichgrauer, innen von gelblicher oder röthlicher Farbe.

Dieses Harz fließt aus Einschnitten, welche man in die Rinde von *Fagara octandra*, L. (*Octandria Monogynia*, L.; *Terebinthaceae*, J.), einem Baume Südamerica's und, wie behauptet wird, auch *Mabagoascar's* (*Jacq. Arn. t. 71. fig. 1 — 3.*) macht. Man hat es fälschlich von *Populus balsamifera*, L., einem Baume (*Dioecia Octandria*, L.; *Amentaceae*, J.) des Nordens beider Continente (*Pall. Fl. Ross. I. t. 41. Plenck t. 714.*) her-

geleitet, welcher ein wohlriechendes Harz, den sogenannten Cocotbalsam oder das Nordamerikanische Takamahat. Baume cocot, *Tacamahaca de l'Amérique septentrionale*, liefert, wenn dieser nicht viel leicht, wie Einige meinen, von *Calophyllum inophyllum*, L., einem Baume (*Pentandria Monogynia*, L.; *Guttiferae*, J.), Ostindien's (*Rheede. Hort. Malab. 4. t. 38.*) kommt.

2) *Balsamum Mariae* s. *viride* s. *Calaba*, *Oleum Mariae*; Marienbalsam; *Tacamahaca de l'île Bourbon*, Baume vert, Baume Marie, Baume de Calaba (*Gal.*); *East indian balsam* (*Ang.*); *Balsamo de Maria* (*His.*).

His.

Eine weiche, klebrige, dunkelgrüne, starkriechende, salbenartige Masse, welche langsam an der Luft verhärtet.

Dieses Harz fließt aus Einschnitten, welche man in den Stamm und die Zweige von *Calophyllum Calaba*, *Jacq.*, einem Baume (*Polyandria Monogynia*, L.; *Guttiferae*, J.) der Antillen macht. (*Jacq. Amer. t. 165.*)

Reizend, aufstösend.

Oleum Tacamahacae. (Wir.)

℞. *Tacamahacae* . . . partem unam.
Arenae albae lotae

partem unam cum dimidia.

Destillent super balneo arenae, e retorta vitrea; oleum a liquore acido cum illo transeunte separatam rectificetur.

Emplastrum stomachicum s. *de Tacamahaca* s. *tacamahacinum* s. *de Crusta Panis.* (Br. Ful. Pal. Sar. Sax. Wir. Au. Fi. Sp.)

℞. *Tacamahacae* . . . uncias tres.

Gummi Carannae drachmas sex.
 Balsami Peruviani,
 Terebinthinae,
 singulorum sesquunciam.
 Liqua blando igne. (Sar.)
 ℞. Ceræ flavæ . . . uncias octo.
 Terebinthinae . . . unciam unam.
 Liqua et mixturae semirefrigeratae
 adde
 Pulveris Tacamahacæ
 uncias quatuor.
 — Balsami Peruviani,
 Olei essent'alis Menthae crispæ,
 singulorum drachmas duas.
 — — Caryophyllorum
 drachmam unam.
 Misce bene. (Sax. Wir. Sp.)
 Ful. Ceræ sesquilibram, Terebinthi-
 nae semilibram, Tacamahacæ, Nucis
 moschatae, singulorum uncias tres,
 Balsami Peruviani semunciam et Olei
 Menthae crispæ drachmas duas; —
 ℞m. Ceræ partes sexaginta quatuor,
 Terebinthinae octo, Tacamahacæ tri-
 ginta duas, Olei Caryophyllorum unam,
 Olei Nucis moschatae duas et Balsami
 Peruviani duas.
 ℞. Galbani,
 Tacamahacæ,
 Ceræ flavæ,
 Asae foetidae,
 Cumini,
 Terebinthinae,
 singulorum partes aequales.
 Fiat emplastrum. (Au.)
 ℞. Tacamahacæ . . . unciam unam.
 Mastichis,
 Storacis Calamita,
 singulorum semunciam.
 Macidis,
 Nucis moschatae,
 Caryophyllorum,
 singulorum drachmam unam.
 Balsami Peruviani drachmas duas.
 Olei essentialis Carvi,
 — — Menthae,
 singulorum guttas quinqt.
 Ceræ flavæ . . . uncias quatuor.
 Terebinthinae . . . uncias duas.
 Fiat emplastrum. (Br.)
 ℞. Crustæ Panis tostæ uncias duas.
 Tacamahacæ . . . unciam unam.
 Mastichis,
 Caryophyllorum,
 Nucis moschatae,
 Olei Menthae,
 singulorum semunciam.
 Ceræ flavæ . . . uncias sex.
 Terebinthinae,
 Olei Mastichis,
 — Cydoniorum,
 singulorum unciam unam.
 Fiat emplastrum. (Pal. Wir. Sp.)
 Pharmacopœa universalis. II.

Man legt dieses Pflaster auf die Ober-
 bauchgegend, um Erbrechen und Diarrhœe
 zu hemmen, auch um Luft fortzutreiben,
 und gegen Krankheiten, welche man von
 Schwäche des Magens abhängig glaubt.

Tamarindus.

Tamarindus indica, L.; Tamarinden-
 Sauerbattelbaum; Tamarinier (Gal.).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4.
 Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal.
 Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. Lon N.
 Lus. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür
A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sa.
Sp. Z.

Ein schöner Baum (Triandria Mono-
 gynia, L.; Leguminosae, J.) Ostindien's.
 (Blackw. t. 201. Lam. III. t. 25. Plenck
 t. 31. Descourt. Fl. méd. d. Aut. t.
 226. Düss. off. Pl. VII. t. 11. Pl. méd.
 VI. 338.)

Man wendet die Früchte

Tamarindi, Fructus *Tamarindorum*;
 Tamarinden, Sauerbattel; Tamarins
 (Gal.); Tamarind (Ang.); Umbile (An-
 Duk. Hin.); Tamaryndy, Indyanske
 daktyle (B.); Tamalaki (Band.); Cay-
 me (Co.); Mahasi ambala (Cy.); Ta-
 marin (D. Succ.); Tamarindo (His I.
 Lus.); Tamarinde (Bel.); Kamal (Ja.);
 Heghka (Mal.); Tumiri hindi (Pe.);
 Amlika, Tintili (Sa); Pullie (Tam.);
 Chinta pundo (Tel.)

an. Es sind längliche, etwas zusammenge-
 drückte, drei bis fünf Zoll lange, geschlos-
 sene Hülsen von graubrauner Farbe, wel-
 che mit einem dicken Fleisch angefüllt sind,
 in dem mehrere sehr große, glänzende,
 eckige und zusammengedrückte Samen lie-
 gen. Dieses Fleisch oder Mark ist von
 weicher, schlüpfriger Beschaffenheit, schwärz-
 lichbraun, und hat einen weinartigen Ge-
 ruch und einen angenehmen, mit der Zeit
 ekelerregenden Geschmack.

Es enthält, nach Bauquelin, Sä-
 mel, Zucker, Gallerte (pectische Säure),
 Schleimharz, Citronensäure, Weinsäure,
 Weinsäure und Kesselsäure.

Pulpa Tamarindorum. (Ams. An. B.
 Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ful.
 Gal. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pal.
 Pol. Sax. Succ. Wir. Wür. Fi. Pid. Sp.
 Sw. T. Vm.)

℞. Tamarindorum . . . quantum vis.
 Tritura cum Aqua ut in massam ho-
 mogeneam redigantur, quam deinde
 in dorso cribri setacei, dorsi spatulae
 ope tere, pulpam trajectam spatulae
 argenteae ope separa et in olla charta
 tecta serva. (An. B. Bel. Vm.)

Fi. Medullam cum seminibus Aquae paxillo humectatam per cribrum setaceum trajicere et consumere; — Ams. et Gal. Tamarindos cum Aqua bulliente triturrare jubent; — Lus. illos ante ebullitiones in Aqua mollescere.

℞. Tamarindorum . . . quantum vis.

Tritura cum Aquae bullientis paxillo, cola per cribrum setaceum, vaporando ad mellis consistentiam inspissa, adde Sacchari partem sextam et nova evaporatione ad consistentiam pulpae redige. (Bor. Han. O. Pol. Sax. Sw.)

Br. Hass. Pal. Wir. et Pid. Pulpae partes duas et unam Sacchari; — D. R. et Wür. Pulpae tres et unam Sacchari; — Sp. Pulpae quatuor et unam Sacchari; — Fenn. Pulpae viginti quatuor et unam Sacchari; — Bor4. HassP. Fructus in Aquae communis pari quantitate macerare et per cribrum trajicere, pulvem ad mellis consistentiam evaporare et unicuique librae addere Sacchari uncias duas.

℞. Tamarindorum contusorum . . . quantum vis.

Aquae . . . quantum sufficit. Coque per tempus aliquot, cola per pannum; singulis colaturae libris adde Limaturae Ferri semunciam, sepone per horas viginti quatuor, decantha partem limpidam, immerge laminam ferream politam et quando nulla cupri particula hujus superficiei adhaeret, liquorem ad mellis consistentiam consume; adde deinde pro libra una decocti Sacchari albi uncias tres et ad consistentiam pulpae consume. (Ful Li.)

Expirtend, kühlend, säufligwürdig, Alca-lien neutralisirend. — Gabe, von zwei Drachmen bis zwei Unzen.

Conserva Tamarindorum. (Lus. T.)

℞. Pulpae Tamarindorum . . . partem unam. Sacchari albi pulverati partes duas.

Misce exacte.

T. Pulpae libram unam, Sacchari uncias quatuor; vel; Pulpae uncias sedecim, Syrupi Violarum duodecim, Sacchari uncias tres.

Infusum Tamarindorum. (Ca.)

℞. Tamarindorum . . . unciam unam ad duas. Aquae bullientis . . . libras duas. Infunde per decem sexagesimas et cola absque expressione.

Potio laxans. (Ca.)

℞. Tamarindorum . . . uncias duas. Aquae bullientis . . . libras duas. Conmisce et colaturae adde Mellis despumati . . . unciam unam.

Infusum Tamarindorum compositum. (Br. Lus.)

℞. Pulpae Tamarindorum, Mannae, singularum sesquiunciam. Corticis Aurantiorum . . . drachmas duas.

Aquae bullientis . . . uncias octo. Digere ut pulpa et manna solvantur et cola. (Lus.)

℞. Tamarindorum a seminibus liberatorum . . . semilibram. Elaeosacchari Citri unciam unam. Succu Citri . . . semunciam. Cremoris Tartari drachmas duas. Aquae bullientis . . . libras octo. Infunde et cola. (Br.)

Expirtend.

Decoctum Tamarindorum. (An. B. Ful. Gal. Fi. T. Vm.)*

℞. Tamarindorum . . . uncias duas. Aquae communis . . . libras tres. Coque per horae quadrantem et cola.

(Ra.) T. Pulpae uncias duas, Aquae libras duas.

℞. Tamarindorum . . . unciam unam vel duas. Aquae communis . . . libras duas.

Coque per horae semiquadrantem; cola absque expressione et adde Syrupi Capilli Veneris . . . unciam unam.

Misce bene. (Gal. Fi.)

℞. Tamarindorum uncias duas, Aquae libras quatuor, coctionem ad trium remanent. et Syrupi Rubi Idaei sesquiunciam.

℞. Tamarindorum . . . unciam unam. Passularum minorum uncias duas.

Aquae . . . quantum sufficit ut colaturae unciae sedecim obtineantur; ebulliant aliquoties, tunc absque expressione colentur. (Vm.)

An. Tamarindorum uncias duas, Passularum uncias quatuor, Aquae libras duas cum dimidia, ut librae duae colaturae obtineantur.

℞. Pulpae Tamarindorum . . . uncias duas. Aquae . . . libras quatuor.

Coque ad quartae partis consumptionem et adde

Nitri . . . drachmas tres.

Roob Ribium . . . sesquiunciam. Miscé bene. (Ful.)

Glauweife.

Decoctum Tamarindi compositum. (Wür. Sw.)*

℞. Tamarindorum, Passularum minorum, . . . singularum uncias tres.

Aquae bullientis quantum sufficit ut ebulliendo librae tres colaturae obtineantur; adde

Tartari stibiati . . . semigranum.
 Syrupi Mororum sesquiunciam.
 Misce. (Sw*.)
 ℞. Tamarindorum . . . uncias sex.
 Cremoris Tartari drachmas tres.
 Aquae fontanae quantum sufficit
 ut ebulliendo libra una colaturae ob-
 tineatur, cui calidae adde
 Foliorum Sennae,
 Rhei, singulorum sesquidrachmam.
 Post horas quatuor digestionis in li-
 quore solve
 Mannae electae drachmas decem.
 Cola et adde
 Aetheris sulphurici . . . guttas sex.
 Misce bene. (Wir.)
 Gabe, stündlich zwei bis vier Unzen.
 Serum Lactis tamarindinum s. temp-
 rans. (Bor4. Han. Li. Au. B. Sw.)
 ℞. Lactis vaccini . . . libras duas.
 Tamarindorum . . . uncias duas.
 Coque et post coagulationem cola.
 (Han. Sw.)
 Li. et Au. coquere jubent Seri Lac-
 tis partes quatuor cum una Tamarin-
 dorum et colare; — B. Pulpae ses-
 quiunciam et Lactis quantum satis ad
 obtinendas duas colaturae libras; —
 Bor4. ut serum lactis dulcificatum sed
 loco tartari Pulpae unciam unam et
 absque conchis.
 Süerlich, angenehm fühlend und gelind
 lartend.
 Serum Lactis antiscorbuticum. (Pal. Bo.)
 ℞. Acetosellae,
 Betonicae,
 singularum manipulum unum.
 Caryophyllorum rubrorum
 manipulum dimidium.
 Tamarindorum . . . sesquiunciam.
 Seri Lactis clarificati libras tres.
 Infunde per horam unam, blando
 calore et adde colaturae
 Syrupi Limonum,
 — Violarum,
 singulorum sesquiunciam.
 Misce. (Bo.)
 ℞. Tamarindorum . . . semunciam.
 Acetosellae,
 manipulum unum cum dimidio.
 Betonicae,
 Cerefolii,
 singulorum manipulum dimidium.
 Seri Lactis . . . libras tres.
 Infunde blando calore per horam
 unam sed absque bullitione; cola ex-
 primendo et adde
 Syrupi Succii Citri,
 — Rubi Idaei,
 — Violarum,
 singulorum unciam unam.
 Misce. (Pal.)
 Gabe, eine Unze alle halbe Stunden.

Potio s. Mixture laxans, Potio pur-
 gans, Tisana laxans s. purgans. (Ful.
 Ham. B. Pie. Sm.)
 ℞. Tamarindorum . . . uncias tres.
 Aquae . . . uncias duodecim.
 Decoque ad unciarum decem reman-
 entiam et colaturae adde
 Mannae . . . uncias duas.
 Cola iterum. (Ham.)
 ℞. Pulpae Tamarindorum
 unciam unam.
 Aquae . . . quantum sufficit
 ut decocti unciae octo obtineantur,
 quarum colaturae adde
 Cremoris Tartari unciam unam.
 Auf zweimal zu nehmen. (B.)
 ℞. Pulpae Tamarindorum
 sesquiunciam.
 Sulphatis Sodae . . . unciam unam.
 Aquae bullientis uncias novem.
 Solutioni adde
 Syrupi Mannae . . . unciam unam.
 Misce bene. (Ful.)
 ℞. Pulpae Tamarindorum,
 Mannae, singularum uncias duas.
 Nitri . . . drachmas duas.
 Aquae . . . libras duas.
 Cola solutionem. (Ful.)
 ℞. Tamarindorum . . . unciam unam.
 Santali citrini drachmam unam.
 Mannae uncias duas cum dimidia.
 Aquae . . . uncias novem.
 Colaturae adde
 Tincturae Ipecacuanhae aquosae
 unciam unam.
 Misce. (Pie.)
 ℞. Cremoris Tartari drachmas sex.
 Salis Prunellae . . . drachmas duas.
 Tamarindorum uncias quatuor.
 Aquae . . . octarium unum.
 Coque per semihoram et adde cola-
 turae
 Syrupi Violarum . . . uncias duas.
 Misce sedulo. (Sm.)
 ℞. Tartari solubilis drachmas duas.
 Sennae mundatae drachmas tres.
 Tamarindorum . . . unciam unam.
 Liquiritiae . . . drachmas duas.
 Fructus Citri cum Cortice
 partem dimidiam.
 Cerefolii . . . manipulum unum.
 Scammonii Monspeliaci
 grana septem.
 Aquae bullientis octarium unum.
 Infunde per horas duodecim et cola
 cum expressione. (Pie.)
 Gladweise zu nehmen.
 Electuarium laxativum s. Tamarindo-
 rum. (Pal. Wir. Fi. Sw. Sy. Vm.)
 ℞. Pulpae Tamarindorum
 uncias quatuor.

— Uvarum,
 — Prunorum,

- Foliorum Sennae,
singulorum sesquiunciam.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Cinnamomi,
Foeniculi,
singulorum drachmas duas.
Olei essentialis Nucis moschatae
guttas decem.
Syrupi solutivi quantum sufficit.
Fiat electuarium. (Wir.)
- ℞. Foliorum Sennae . . . uncias sex.
Foeniculi . . . drachmas duas.
Vini albi,
Aquae, singulorum libras duas.
Decoque ad dimidii remanentiam,
exprime et adde
Pulpae Prunorum,
— Uvarum,
— Tamarindorum,
singularum semilibram.
Cremoris Tartari unciam unam.
Foliorum Sennae . . . uncias tres.
Olei essentialis Anisi,
— Nucis moschatae,
singulorum semidrachmam.
Misce sedulo. (Pal.)
- ℞. Cremoris Tartari drachmam unam.
Sennae . . . drachmas tres.
Mannae uncias tres cum dimidia.
Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
singularum sesquiunciam.
Syrupi Violarum quantum sufficit.
Misce. (Vm.)
- ℞. Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Foliorum Sennae sesquidrachmam.
Nitri,
Sulphuris,
singulorum drachmas tres.
Syrupi Corticium Aurantiorum
quantum sufficit.
Misce. (Sw.)
Sy eandem formulam indicat sed
absque senna.
- ℞. Pulpae Tamarindorum cum Sac-
chari aequali quantitate commix-
tae,
Cremoris Tartari,
singulorum libram unam.
Conservae Prunorum simplicis
libras duas.
Misce. (Fi.)
Gabe, eine halbe bis eine Unze.

T a m a r i x .

Von dieser Pflanzengattung findet man in den Pharmacopöden zwei Arten angeführt:

1) *Tamarix Germanica*, L.; Deutscher Tamariskenbaum; Tamaris d'Allemagne (Gal.).

Ams. Fer. Wir. Wür. Sp.

Ein Baum (*Pentandria Trigynia*, L.; *Portulacaceae*, J.) Deutschland's. (Pall. Fl. Ross. II. t. 80.)

Man wendet die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (*cortex Tamarisci* s. *Tamaricis*) des Stammes, und besonders der Wurzel, ist außen grau oder braungrau, innen gelb und rötlich, ungleich, rissig. Sie hat einen angenehmen balsamischen Geruch und einen sehr abstringirenden, etwas bitteren Geschmack.

Die Blätter sind fiedrig, linienlanzettförmig und bachziegelförmig.

2) *Tamarix Gallica*, L.; Französische Tamarisken; Tamaris de France (Gal.); French tamarisk (Ang.); Taray (Ar.); Franche tamarisk (Bel.); Tamarisco (I.); Tamarqueira (Lus.).

An. B. Br. Fer. Gal. His. Be. Br. G. M.

Ein Strauch des südlichen Europa's. (Zorn Ic. pl. t. 312.)

Man wendet ebenfalls die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (*cortex Tamarisci* s. *Tamarisci Gallici*) ist dünn, gerollt, außen braun, innen hellgelb und hat einen bitteren, etwas abstringirenden Geschmack.

Die Blätter sind lanzettförmig, sehr klein, spitzig, umfassend und bachziegelförmig.

Lonisch, aber jetzt wenig in Gebrauch, ebendem zu den eröffnenden Mitteln gezählt.

T a m u s .

Tamus communis, L.; Jungfernwurzel; Schmeerwurzel, Schmeerwurzschwarzrebe; Sceau de Notre Dame, Vigne noire, Bryone noire (Gal.); Common tamus (Ang.). Gal. G.

‡ (*Dioecia Hexandria*, L.; *Alismaceae*, J.) Eine in dem südlichen Europa wachsende Pflanze. (Blackw. Herb. t. 457. Lamk. III. t. 817. Schk. t. 327.)

Man wendet die Wurzel (*radix Tamni* s. *Tamni* s. *Bryoniae nigrae*) an; sie ist rund, höckerig, außen weiß schwarz, innen weiß. Ihr Geschmack ist scharf und etwas unangenehm.

Man betrachtet sie als harntreibend.

T a n a c e t u m .

Tanacetum vulgare, L.; Rainfarn; Tanaisie (Gal.); Tantaray (Ang.); Wratje (B.); Rheinfarn (D.); Tanaceto (His.); Tanaceto, Erba pennina (I.); Reinevaren (Bel.); Wratycz (Pol.); Tanasia (Lus.); Renfana (Suec.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
 Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful.
 Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass.
 HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec.
 Wir. Wür. WW. Be. Br. C. Fi. G. M.
 Pid. Sp. Z.

2 (Syngenesia Polygamia Superflua,
 L.; Synanthereae, Cass.) Eine Europä-
 ische Pflanze. (Blackw. t. 464. Plenck t
 611. Hayne II. t. 6. Düss. off. Pfl. t.
 12. Fl. méd. VI. 329.)

Man wendet das Kraut, die Blüthen
 und die Saamen an.

Das Kraut (herba Tanaceti s. Atha-
 nasiae) besteht aus einem gestreiften, wal-
 zenförmigen, ästigen Stängel und großen,
 abwechselnden, gestielten, ebenen, glatten
 Blättern, von denen die untern doppelt
 gefiederten, dreilappige, fast sitzende, schma-
 le, linienförmige, spizige, etwas herabtau-
 fende Blättchen besitzn. Der Geschmack
 ist gewürzhaft, brennend und bitter.

Die Blüthen (flores Tanaceti) bilden
 strahlige Köpfehen, sind glänzend gelb und
 haben einen balsamischen, bittern Geschmack.

Die Saamen sind klein, länglich, etwas
 gekrümmt, tief gefurcht und am obern brei-
 tern Ende mit einem kleinen Rande verse-
 hen. Ihr Geschmack ist bitter und kam-
 pherartig.

Der Geruch ist stark und balsamisch; der
 der Blüthen unangenehm, kampherartig
 und gewürzhaft.

Reizend, harntreibend, Barmittel. —
 Gabe des Pulvers, zwanzig bis vierzig
 Gran.

*Conserva Tanaceti, Confectio Florum
 Tanaceti sicca.* (Ful. Sar. Vm.)

℞. Foliorum Tanaceti contusorum
 partem unam.
 Sacchari albi . . . partes duas.
 Contere et in balneo aquae liquare
 fac. (Vm.)

Sar. Florum et Sacchari, singulo-
 rum partes aequales.

℞. Florum Tanaceti absque calycibus
 partem unam.

In sartagine cupream, lento igne,
 ingere, injice sensim

Sacchari ad plumam oocti
 partes duas.

Agita, donec massa bene sit siccata
 et hoc repete, donec flores penitus
 sint saccharo tecti. (Ful.)

Pulvis Tanaceti compositus. (Succ.)

℞. Summitatum Tanaceti,
 Seminum Cinae,
 Gummi Guttae,
 Nucis vomicae,
 Sulphatis Ferri,
 singulorum drachmam unam.
 Pulverata seorsim commisce.

Species nervinae pro cucuphis. (Hass.
 Pid.)

℞. Herbae Menthae piperitae,
 — Rutae,
 — Serpylli,
 — Majoranae,
 — Thymi,
 — Salviae,
 — Sabinae,
 — Melissaе,
 Baccarum Juniperi,
 singularum uncias duas.
 Florum Rosarum rubrarum,
 — Lavandulae,
 singulorum uncias tres.
 — Tanaceti uncias quatuor.
 Baccarum Lauri . . . uncias duas.
 Cardamomi minoris unciam unam.
 Anisi,
 Carvi, singulorum sesquiunciam.
 Macidis semunciam.
 Concisa et contusa misce.

Extractum Tanaceti aquosum. (Br. Ful.
 HassP. Li. Sar. Sax. Wir. T. Vm.)

℞. Herbae Tanaceti libram unam.
 Aquae fontanae . . . libras sex.
 Digere per dies quatuor in loco ca-
 lido, tunc coque parumper; cola ex-
 primendo et colaturam ad extracti con-
 sistentiam consume. (Br. Ful. Wir.)

Li. coquere jubet Herbae libram
 unam cum octo Aquae per horam
 unam et exprimere; residuo Aquae fri-
 gidae pauxillum superfundere et itidem
 exprimere, tunc colaturas amhas cora-
 mixtas consumere.

℞. Herbae Tanaceti . . . partem unam.
 Aquae communis . . . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor,
 tunc coque per horae quadrantem et
 cola fortiter exprimendo; residuum
 coquatur cum Aquae partibus quatuor,
 commisce amhos liquores et post vi-
 ginti quatuor horarum sepositionem ad
 aptam consistentiam consume. (Sax.)

℞. Herbae Tanaceti contusae
 libras octo.

Macera per tres dies in alembico,
 tunc destillando Aquae uncias circiter
 duas abstrahe; residuo infunde Aquae
 triplum et coquendo ad tertiam partem
 redige; liquorem clarificatum et cola-
 tum ad electuarii consistentiam consu-
 me, et huic nonnisi tepido Aquam de-
 stillatam affunde. (Sar.)

Fer. coquere jubet Herbae libram
 unam in Aquae tribus, colaturam Al-
 buminis ope clarificare et sufficienter
 consumere.

℞. Foliorum Tanaceti quantum vis.
 Contusa cum Aquae panrillo, diu te-
 rendo commisce; cola cum expressio-

ne et postquam coagulaverit, faeculam seponere; infunde deinde blando calore succum limpium cum residuo, cola exprimendo, iterum clarifica et liquorem vaporando ad extracti consistentiam redde, adde faeculam et denuo calefac, donec massa consistentiam necessariam acquiserit. (Vm.)

HassP. ut extractum cardui benedicti, centaurii minoris etc; — T. Tanacetum libram unam, Aquae bullientis octo per horas viginti quatuor infundere, colare leviter exprimendo, filtrare et ad extracti consistentiam inspissare.

Gabe, sechs bis zwanzig Gran.

Extractum Tanacetum alcoholicum. (Wür.)

℞. Summitatum Tanacetum,
Alcoholis, singulorum libram unam.
Aquae communis . . . libras octo.

Digere, blando calore, per tres dies, cola exprimendo, seponere et decantha liquorem, et alcoholi destillando separato, residuum ad aptam consistentiam consume.

Linimentum vermifugum. (Vm.)

℞. Faeculae viridis recentis Tanacetum
partem unam.

Axungiae Porci
partem unam cum dimidia.

Liqua leni calore, lava in Aqua calida, decantha et tunc iterum iterum que fundendo et decanthando Aquam quam fieri potest consume.

Infusum Tanacetum. (B*.)

℞. Herbae Tanacetum . . . semunciam.
Aquae bullientis . . . uncias decem.

Infunde et cola. — Ausbünstung befördernd. — Gabe, alle zwei Stunden eine Dasse. — Der Aufguß mit Milch in Klystir gegen Ascariden.

Enema ad ascarides, Clyster vermifugus. (Sw.)

℞. Herbae Tanacetum . . . semunciam.
Aquae uncias octo.

Coquendo ad unciam sex remanentiam consume.

Tinctura Tanacetum. (Ful.)

℞. Summitatum Tanacetum
partem unam.

Alcoholis . . . partes quatuor.
Post tres dies digestionis, blando calore, cola exprimendo. — Gabe, drei bis sechs Tropfen.

Essentia contra vermes s. vermifuga.
(Br. Vm.)

℞. Herbae Tanacetum,
— Absinthii,
— Centaurii minoris,
Radice Gentianae,
singulorum semunciam.
Florum Tanacetum,
Seminum Cinae,

Myrrhae electae,*
singulorum drachmas duas.
Spiritus Menthae . . . libram unam.
Digere, exprime et filtra. (Br.)
℞. Foliorum recentium Tanacetum
partem unam.

Radice recentis Inulae,
Rhei,
Santolinae, singulorum partes tres.
Vini Maderani . . . partes duas.
Aquae Vitae . . . partes viginti.
Infunde frigide per dies octo, cola exprimendo et filtra. (Vini.)

Oleum Tanacetum aetherium, Aethere-
oleum Tanacetum (A. Ams. An. B. Bel.
Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Han.
Hass. HassP. Li. O. R. Sax. Suec. Wür.
Br. Pid. Sw. T.)

℞. Herbae Tanacetum cum floribus
quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent. (Ams. B. Bel. Fenn. Fer.
R. Suec. Br.)

Ful et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — D. Herbae unam et Aquae sex; — Han. HassP. O. et Sax. Herbae unam et octo Aquae; — A. Herbae unam et duodecim Aquae; Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — An. Herbae tres et decem Aquae; — T. Herbae unam, Aquae bullientis pondus duplum.

℞. Herbae Tanacetum
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies macerationis destillent.
(Br. Hass. Pid.)

℞. Herbae Tanacetum . . . quantum vis.
Aquae destillatae Tanacetum
quantum sufficit.

Destillent. (Wür.)
Bor4. Oleum venale indicat. Pond.
spec. = 0,932.

Aqua Tanacetum. (A. Wür. Pid.)
℞. Herbae Tanacetum cum floribus
partem unam.

Aquae partes sex.
Destillent et oleum ab aqua separatur. (Wür.)

A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — Pid. Herbae partem unam et Aquae octo; destillent partes quatuor.

T a p i o k a .

Faecula Tapioka; Panis Cassaviensis; Cassavabrot, weißer Sago; Tapioca, Pain de Cassave, Sagou blanc (Gal.).
Am. Fer. His. C. G. T.
Eine stärkemehlartige, körnige, weiße

oder gummige Substanz in eckigen, unregelmäßigen Stücken von verschiedener Größe, an der Oberfläche etwas mehlig, aber durchsichtig oder halbdurchsichtig.

Es ist der ausgewaschene und getrocknete Saft des ausgepreßten Safts der Wurzel von *Jasphia Manihot*, K., einem Strauche (Monoecia Decandria, L.; Euphorbiaceae, J.) der heißen Gegenden America's. (Pluk. Alm. t. 205. fig. 1.)

Wird als nährendes Mittel, in Galle, te, mit Zuckerwasser oder Bouillon längere oder kürzere Zeit gekocht angewandt.

TARAXACUM.

Taraxacum Dens Leonis, Desf.; Schwanzahn, Pfaffenröhlein, Pappenkraut; Pissenlit (Gal.); Dandelion (Ang.); Plesska (B.); Laevetand (D.); Dente de leon (His.); Paapenkruid (Bel); Dente di leone (I.); Wolowe oczu, Swini mlecz (Pol.); Dente de leao (Lus.); Lejontand, Maskrosor (Suec.)

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Penn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. hr. C. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

♀ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Syanthereae, Cass.) Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Bull. t. 217. Blackw. t. 1. u. 501. Plenck t. 598. Schk. t. 219. Hayne II. 4. Düss. off. Pfl. II. 21 Zorn ic. pl. t. 69.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Taraxaci s. Dents leonis) ist walsig, lang, fingerdick, bisweilen ästig, behaart, außen schwarzbraun innen weiß und enthält einen Milchsaft. Sie hat keinen Geruch, aber einen bitteren, süßen und etwas salzigen Geschmack. Getrocknet verliert sie ihre Bitterkeit.

Das Kraut (herba Taraxaci) besteht aus einer Rose langer, wie benagelter, gezählener, glatter, hellgrüner Blätter ohne Geruch und von einem bitteren Geschmack.

Succus Taraxaci. (Hass. Sar. Wür. 1.)

℞. Herbae et Radicum recentium Taraxaci quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, et succum sepositum filtra. (Hass.)

Wür. addere jubet Sucoi librae cuique Alcoholis drachmam unam; — Sar. clarificare eum in balneo aquae.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Decoctum Taraxaci s. Leontodontis Taraxaci. (An. B*.)

℞. Radicis Taraxaci . . . unciis duas. Aquea libras duas.

Decoque ad dimidii circiter rema-

nentiam et liquorem sepositum decantha. (An.)

℞. Radicis sesquunciam, Aquae libras tres et decoctionem ad tertiae partis remanentiam.

Harntreibend, einschneidend. — Gabe, ein Pfund täglich.

Decoctum Taraxaci compositum s. res-solvens. (B*. DD. Sw.)

℞. Radicis Taraxaci unciis quatuor. Herbae Trifolii . . . semunciam. Aquae purae unciis quadraginta octoginta.

Decoque ad dimidii aquae remanentiam, exprime fortiter et colaturae refrigeratae adde

Salis Ammoniaci depurati drachmas duas, vel

— Sedlitzensis . . . unciam unam. Aetheris sulphurici drachmas duas.

Misce. (DD.)

Sw. Herbae et Radicis sesquil bram. Graminis tantidem, Aquae libras sex ad trium remanentiam et colaturae addere Oxymellis semilibram, Sulphatis Potassae drachmas sex et Aetheris sulphurici alcoholisati guttas viginti quinque; — B*. Graminis, Radicis Taraxaci, Radicis Gichorii, singularum unciis duas et dimidiam, Aquae quantum sufficit ut libra una colaturae obtineatur et huic addere Syrupi Quinque Radicum aperientium unciis tres, Sulphatis Potassae drachmas duas et Li-quoris anodini mineralis guttas viginti quinque.

Von Stoll in viertägigen rebellischen Wechselfiebern, Berstfungen der Unterleitsgeeweibe, Gelbsucht und Gallensteinen empfohlen. — Gabe, ein halbes Pfund vier bis sechs Mal täglich.

Decoctum resolvens s. aperiens. (Ful. Ham. Sm. Vm.)

℞. Radicis Taraxaci, — Graminis, singularum unciis duas.

Aquae libras tres.

Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et colaturae adde

Sulphatis Potassae . . . semunciam. Oxymellis unciis duas.

Misce. (Sm. Vm.)

℞. Radicis Taraxaci unciis quatuor. Aquae fontanae . . . libras duas.

Decoque ad dimidium et colaturae adde

Oremoris Tartari unciam unam. Boracis drachmas tres.

Mellis glyzyrrhizati unciis duas. Dissolve. (Ham.)

℞. Radicis Taraxaci . . . unciis duas. Aquae fontanae . . . libram unam.

Decoque ad dimidium et adde colaturae

Extracti Chelidonii majoris drachmas duas.
Tartari stihati . . . grana duo.

Dissolve. (Ham.)

℞. Radicis Taraxaci uncias quatuor.
Cremoris Tartari,
Boracis, siugulorum semunciam.
Aquaе . . . libras tres.

Decoque ad dimidii remanentiam et colaturae adde

Mellis despumati . . . uncias duas.
Misce bene. (Ful.)

Extractum s. Mellago s. Extractum liquidum Taraxaci s. Leontodontis Taraxaci. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HasP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wür. Br. C. Pid. Sw. Vm.)

℞. Herbae recentis Taraxaci quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, Aquaе pauxillum adspergendo; exprime succum et statim in balneo aquae sub finem spatulae ope continue agitando, inspissa. (Br. Gen. His. Lus.)

D. et Sw. contundere jubent Radicis et Herbae libras duas, addere Aquaе libras sex, exprimere succum et illum postquam semel ebullivit, ad syrupi spissi consistentiam consumere; — Bor4. Radicum libras duodecim contundere jubet, Aquaе libras novem sensim addendo, succum exprimere et subsidendo depuratum ad separationem substantiae albuminosae decoquere, tunc colatum ad mellis consistentiam redigere.

℞. Radicis Taraxaci,
Herbae Taraxaci,
singularum libras octo.

Contunde in mortario lapideo, exprime succum, coque sedimentum cum Aquaе duplo, exprime et ambos liquores commixtos, post horas duodecim sepositionis ad syrupi consistentiam consume. (Li.)

℞. Herbae et Radicis Taraxaci partem unam.

Aquaе bullientis . . . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquaе partibus quatuor et itidem coletur; liquores commixti post sufficientem sepositionem decantha et blando igne ad extracti consistentiam consume. (Han.)

Suec. Radicem cum Aquaе duplo paullulum, tunc cum nova Aqua coquere et ambos liquores vaporationi in balneo aquae subjicere; — Feun. et

Ful. eundem agendi modum indicant, sed primum cum Aquaе partibus sex et per horae quadrantem coquere jubent; — Br. priorem bullitionem per horas duas continuare; — HasP. Herbam et Summitates cum Aquaе sufficiente quantitate in pulvem redigere et in dolio per horas duodecim seponere etc. ut extractum cardui benedicti.

℞. Radicis et Herbae recentium Taraxaci . . . libram unam.
Aquaе purae . . . libras decem.

Coque per horas duas, cola exprimendo, liquorem sepone et per pannum colatum consume, donec massa non amplius digitis adhaereat. (Ams.)

R. coquere jubet Herbae et Radicis partem unam in Aquaе duabus vel tribus, colare exprimendo et liquorem filtratum sufficienter consumere; — Du. Hass. et Pid. coquere Herbae et

Radicis partem unam in Aquaе tribus, colare exprimendo et liquorem blando igne consumere; — A. Coquere Radicis et Herbae partes aequales in Aquaе sufficiente quantitate et decoctum decanthatum ad extracti liquidi consistentiam inspissare; — Bor. O. Pol. et

Sax. contundere Radicis libras duodecim, Aquaе libras sex postquam addendo, exprimere succum, illum postquam semel ebulliverit, per pannum colare et ad mellis consistentiam inspissare; —

His. Radicem coquere in Aquaе sufficiente quantitate et decoctum decanthatum, continue agitando lente consumere; — Wür. hullitionem per horam continuare et decoctum ad mellis spissi consistentiam redigere; — An.

coquere per horae quadrantem Radicis et Herbae libras duas in Aquaе decem et decoctum decanthatum inspissare; — Lon. LonN. et C. coquere post horas viginti quatuor macerationis Radicis libram unam in Aquaе octariis octo ad quatuor remanentiam et colaturam vaporando consumere; — Ba. coquere

Radicis et Herbae partem unam cum Aquaе sex per horae quadrantem et colaturam consumere; — Fer. coque

Radice libram unam cum Aquaе libris tribus et decoctum Albuminis ope clarificatum consumere; — Bor4. Taraxacum cum Aquaе fervidae decuplo per horas 36 infundere, liquorem exprimendo separare, residuum cum quintuplo Aquaе fervidae infundere, exprimere et liquores inspissare.

℞. Herbae et Radicis recentium Taraxaci . . . libras duas.
Aquaе bullientis . . . libras decem.

Digere per horas viginti quatuor,

tunc per unam coque; decantha post refrigerationem et herbam exprime, liquores amobos commixtos et sepositione depuratos ad aptam usque consistentiam consume. (B. Bel.)

℞. Radicis siccatae Taraxaci

quantum vis.

Macera in Aqua frigida, tunc bis digere in Aqua fervente, clarifica liquores commixtos Albuminis ope et ad extracti consistentiam consume. (Vn.)

HassP. Mellaginem cum Extracto et Aquae sufficiente quantitate ad syrapi spissioris consistentiam reductis parare jubet.

T. Succum cum Aquae modica quantitate commixtum Albuminis et caloris ope clarificare et inspissare.

Schwach reizend oder tonisch, bei Störungen im Unterleibe und Wasserfluchten sehr gerühmt. Das flüssige und syrupartige Extract wendet man zu einem Löffel mehrmals täglich an.

Pilulae resolventes. (Sm.)

℞. Extracti Taraxaci,

Saponis albi,

singulorum unciam unam.

Liquoris Terrae foliatae Tartari

quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. —

Gabe, vier bis sechs Stück täglich zwei Mal.

Elisir resolvens s. aperitivum. (Ful.

Ham.)

℞. Extracti Taraxaci drachmas tres.

— Chelidonii majoris

drachmas duas.

Aquae Menthae crispae uncias octo.

Dissolve. (Ham.)

Ful. Extracti Taraxaci drachmas sex,

Extracti Chelidonii majoris drachmas

duas, Aquae distillatae uncias sex et

duas Aquae Menthae piperitae.

Löffelweise.

Terebinthina.

Man belegt mit diesem Namen im Allgemeinen bloß folgende vier Harzsubstanzen:

1) *Terebinthina Cypria* s. *Chia* s. *picinacina*; Cypriſcher Terpentin; Terebinthine de Chio, de Scio, de Chypre ou de terebinthe (Gal.); Cyprian turpentine (Ang.); Terebinto di Cipro (I.).

Ba. Fer. Gal. GalM. Lon. LonN. Wir. Be. C. Fi. G. M. Par. Sa. Sp. T.

Eine sehr dicke, klebrige, durchsichtige Substanz von grünlichcitrongelber Farbe, angenehmem Geruch und einem balsamischen Geschmack ohne Bitterkeit und Schärfe.

Sie fließt von *Pistacia Terebinthus*, L., einem kleinen Baum (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, J.) des Archipels. (Blackw. Herb. t. 478. Plench t. 709.)

2) *Terebinthina communis* s. *Pini sylvestris* s. *pinca*; Balsamum nativum *Pini sylvestris*; gemeiner Terpentin; Terebinthine commune, de Bordeaux ou de pin (Gal.); Common turpentine (Ang.); Ratinge ruine (Ar.); Almindelig terpentin (D.); Trementina comun (His.); Gemeen terpentijn (Bel.); Trementina commune (I.); Kota (N.); Zungcharie (Pe.); Tjok terpentin (Suec.).

Am. An. B. Bel. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Pul. Gal. GalM. Ham. Han. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. s. B. C. G. M. Par. T.

Eine syrupartige, weißliche, trübe, consistente Flüssigkeit von unangenehmem Geruch und scharfem, bitterem und widerlichem Geschmack.

Dieses Harz kommt von *Pinus sylvestris*, L., einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, J.) des nördlichen Europa's (Blackw. t. 190. Plench, t. 677. Schk. t. 380. Fl. méd. V. 272.) und von *Pinus maritima*, Lam., einem andern Baume aus denselben Gegenden. (Duham. t. 28. no. 2. t. 29. no. 4. Zorn Ic. pl. t. 526.)

3) *Terebinthina laricea* s. *larigna* s. *laricina* s. *Veneta*; Balsamum s. *Resina liquida Pini Laricis*; Terebinthina s. Balsamum nativum; Venetianischer Terpentin; Terebenthine de melèze ou de Venise (Gal.); Venice turpentine (Ang.); Venedisk terpentijn (D. Suec.); Trementina de venecia (His. I.); Terpentyna modrzewowa (Pol. Lqs.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. Lus. O. Pal. R. RC. Suec. Wir. WW. B. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. T.

Dieses Harz ist sehr flüchtig, durchsichtig, etwas grünlich von Farbe, von starkem, nicht unangenehmem Geruch und brennendem, scharfem und bitterem Geschmack.

Man erhält es durch Abdöhren des Stamms von *Larix Europaea*, Cand., einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, J.), welcher auf den Alpen gemein ist. (Blackw. Herb. t. 477. Lamk. t. 785. Plench t. 681.)

4) *Terebinthina abiegna* s. *abietina* s. *Argentoratensis*; Straßburger Terpentin; Terebinthine de sapin ou de Strasbourg (Gal.); Strassburgh turpentine (Ang.); Trementina de abeto (His.); Olio d'Abrezzo (I.).

An. Gal. GalM. HassP. His. Li. Be. C. Fi. G. Par. Sp. T.

Ein sehr flüchtiges, durchsichtiges oder et-

was trübes Harz von starkem Geruch und scharfem, sehr bitterem Geschmack.

Man zieht es von *Abies pectinata*, *Cand.*, einem Baume (*Monoclea Monadelphica*, L.; *Coniferae*, J.), welcher in der Schweiz wächst. (*Blackw.* t. 203. *Plenck* t. 682. *Lam.* III. 785. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 528.)

Der Terpentin ist, wie alle Harze, ein kräftiges Reizmittel, dessen Wirkung beim innern Gebrauch, in gewisser nach den Individuen verschiedener Gabe, nicht auf die Verdauungsorgane allein sich beschränkt, sondern sich auf eine größere oder geringere Zahl anderer Organe verbreitet; je nachdem sie entweder durch Sympathie mit jenen in Verbindung stehen oder der Terpentin nach der Einsaugung wirkt. Zu diesen secundären Wirkungen gehören die auf die Urinwerkzeuge, aber auch, wie man erst später beobachtet hat, auf die Athmwerkzeuge und das Gefäßorgan oder die Nerven. Man wendet ihn beim Tripper, besonders chronischem, bei weißem Fluß, alten Blasen-cataracten, chronischen Brustcataracten und Nervenschmerzen an.

Der Terpentin besteht hauptsächlich aus zwei Substanzen, einem Harze und einem flüchtigen Oele. Die Wirkung ist verschieden, je nachdem beide mit einander vereinigt oder jede einzeln angewendet werden. Vorzüglich kräftig wirkt das Oel, dann der Terpentin, dann der harzige Stoff.

§. I. Präparate, welche den Terpentin in Substanz enthalten.

A. In einer alcoholischen Flüssigkeit aufgelöst.

Tinctura s. *Essentia Terebinthinae*, *Balsamum vulnerarium commune*. (*Gal. Vm.*)

℞. Terebinthinae clarae partem unam.

Alcoholis (36°) partes quatuor.
Digere per dies sex, subinde agitando, et cola.

B. Präparate, welche den Terpentin mit einer wässerigen Flüssigkeit vermischt enthalten.

Lac terebinthinaceum, *Emulsio terebinthinacea* s. *cum Terebinthina*, *Lac diureticum*. (B*. *Pie. Sa. Sw. Vm.*)

℞. Terebinthinae Chiaee sesquunciam.
Cum Aqua Vitae bene lotam in mortario marmoreo commisce cum

Vitello Ovi no. 1.
addendo sensim

Aquas Parietariae uncias duodecim ut fiat emulsio. (*Pie.*)

℞. Gummi Arabici drachmas tres.
Aquae quantum sufficit
ut fiat mucilago spissa, quam contere cum

Terebinthinae drachmis duabus
addendo sensim

Aquae purae uncias novem.
Syrupi Sacchari sesquunciam.
Fiat emulsio. (*Sw.*)

Vm. Gummi drachmam unam, Terebinthinae duas, Aquae uncias octo, Syrupi unam

℞. Terebinthinae Chiaee drachmas duas.

Contere cum Vitello Ovi sufficiente quantitate, addendo

Julapii communis uncias octo.
Misce bene. (*Sa*)

B*. Terebinthinae semunciam, Vitellos Ovorum duorum, Syrupi Althaeae uncias duas et Aquae vel Vini albi, pro arbitrio, uncias octo.

℞. Terebinthinae drachmas duas.
Mucilaginis Gummi Arabici semunciam.

Contere, sensim addendo

Mellis albi sesquunciam.
Aquae Juniperi uncias novem.
Spiritus Nitri dulcis

drachmam unam.
Misce. (*Sw.*)

Ein Reizmittel, welches man bei chronischen Blasen- und Harnröhrenkrankheiten gepriesen hat. — Gabe, täglich zwei bis vier Löffel.

Looch leniens balsamicum s. *terebinthinatum*. (*Sp.*)

℞. Pulveris Gummi Tragacanthae grana sedecim.

Tisanae communis semunciam.
Fiat mucilago, cui sub continua agitatione adde

Syrupi Althaeae,

Olei Amygdalarum dulcium, singulorum drachmam unam.

Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae scrupulum unum.

Tisanæ pectoralis uncias tres cum dimidia.

Potio s. *Aqua terebinthinata*. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae Venetae libras quatuor.

Myrrhae unciam unam.
Tritura, sensim addendo

Aquae libras viginti quatuor.
Sepone et liquorem decanthatum in lagenis duodecim serva.

In Krankheiten der Urin- und Respirationewege, Hautkrankheiten, beschwerlicher Menstruation, weißem Fluß, Hysterie, in der Eiterungsperiode der Blattern etc. empfohlen. — Man wendet diese Potion ebenso an, wie das Ephemerasse. — Bisweilen setzt man mit Vortheil eine Unze kohlensaure Potasche zu.

Mixtura diuretica. (Bo. Pic.)
 ℞. Terebinthinae drachmam unam.
 Vitellum Ovi no. 1.

Contere et adde sensim
 Aquae Petroselinii,
 — Fragariae,
 singularum uncias tres.

Mellis Narbonnensis semunciam.
 Syrupi Althaeae unciam unam.
 Edßfetweise täglich vier Mal. — Bar-
 thez benutzte diese Mirtur häufig.

Mixtura balsamica. (Bo.)

℞. Terebinthinae . drachmas duas.
 Vitellum Ovi no. 1.

Contere et adde
 Extracti Rhei,
 Salis Prunellae,
 singulorum drachmam unam.

Infunde sensim
 Infusi Liquiritiae uncias decem.
 Syrupi Althaeae unciam unam.

Boerhaave gab diese Mirtur bei Gonorrhöe. — Gabe, ein Edßfel alle halbe Stunden.

Mixtura terebinthinata. (B*. Sa.)

℞. Terebinthinae Argentoratensis
 drachmas tres.

Contere cum Vitelli Ovi sufficiente
 quantitate et adde sensim

Infusi spissi Seminum Lini
 libram unam.

Fiat emulsio. (Sa.)

℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
 Aquae destillatae . uncias octo.

Contere et adde
 Tincturae Benzoes drachmas duas.

Misce bene. (B*.)
 De Tharding empfahl letztere Einsprizung bei Schwerhörigkeit und Taubheit. Die andere wird bei weißem Fluß gerührt.

Clyster terebinthinatum, Enema terebinthinatum. (B*. GalM. RC. Sa. Sp. Sw.)

℞. Terebinthinae Venetae
 semunciam ad unciam unam.

Tere cum Vitelli Ovi vel Mucilaginis alicujus sufficiente quantitate et adde sensim

Aquae fontanae
 uncias sex ad octo.

Misce bene. (B*. GalM.)

℞. Terebinthinae Venetae
 unciam unam.

Contere cum Vitello Ovi unius et adde
 Decocti Hordei . . . uncias sex.

Misce sedulo. (Sw.)

℞. Terebinthinae Venetae
 quantum vis.

Vitelli Ovorum quantum sufficit.
 Decocti Hordei . . . uncias sex.

Mellis vel Electuarii lenitivi
 drachmas sex.

Fiat emulsio. (Sa.)

℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
 Decocti Hordei, vel
 Infusi Seminum Lini

uncias decem.
 Olei Lini unciam unam.
 Interdum Tincturae Opii guttae quin-
 quaginta adduntur. (RC.)

℞. Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae
 semunciam.

Decocti emollientis uncias decem.
 Olei Seminum Lini unciam unam.

Commisce terendo. (Sp.)

℞. Terebinthinae Venetae cum Vitello
 Ovi tritae drachmam unam
 ad semunciam.

Decocti emollientis libram unam.
 Olei Seminum Lini,

Syrupi Rhamni cathartici,
 singulorum unciam unam.

Misce bene. (Sw.)

Bei Verstopfung, Mercurenzündung, Hämaturie von Steinen, Nieren- und Bliescolik empfohlen.

Clyster leniens. (Au. Sm.)

℞. Terebinthinae drachmam unam.
 Vitellum Ovi recentis . . . no. 1.

Contere in mortario et adde
 Theriacae . . . drachmas quatuor.

Commisce deinde totum cum
 Lactis calidi . . . uncias quatuor.

Van Swieten wendet dieses Klyster an, um Koliken und Tenesmus, welche mit den Diarrhöen schwindfüchtiger verbunden sind, zu beruhigen. Auch hat man es mit Erfolg bei sogenannten Darmschwindfuchten, d. h. solchen, welche die Folge hitziger oder chronischer Darmentzündung sind, angewendet. (Sm.)

Au. Lactis uncias octo, Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae semunciam, Theriacae tantidem et Mellis rosati unciam unam.

Fi. *Clyster balsamicum cum Opio s. Enema terebinthinum cum Opio:* Opii puri granum unum, Terebinthinae semunciam, Lactis uncias sex, Vitellum Ovi unius, vel Gummi Arabici eandem quantitatem quam terebinthinae.

Clyster adstringens. (Sm.)

℞. Terebinthinae communis
 drachmas quatuor.

Olei Lini uncias duas.
 Vitelli Ovi recentis

drachmas duas.
 Tere in mortario, sensim addendo

Aquae Calcis uncias sex.

Von Bintringham in denselben Fällen verordnet, wie das vorige.
Clyster balsamicum adstringens. (Bo. Pic.)

℞. Florum Chamomillae
 manipulos duos,

Lactis . . . quantum sufficit.
Coque ad unciarum octo remanentiam et adde

Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae drachmas tres.

Mellis rosati . . . unciam unam.
Misce bene. (Bo.)

℞. Croci,
Hyperici,
singulorum pugillum unum.

Lactis . . . quantum sufficit.
Coque simul et colaturae adde

Terebinthinae cum Vitello Ovorum duorum tritaturae semunciam.

Theriaca . . . drachmas duas.
Misce. (Bo. Pie.)

Dieses Klystir kann in denselben Fällen nützlich seyn, wie die vorhergehenden.

Injectio terebinthinacea. (Au.)

℞. Terebinthinae . . . uncias duas.

Vitelli Ovi . . . unciam unam.

Mellis . . . uncias duas.

Alcoholis . . . semunciam.

Aquae . . . uncias novem.
Misce.

℞. Saponis medicinalis unciam unam.

Terebinthinae . . . semunciam.

Aquae . . . uncias octo.

Tincturae Benzoës drachmas tres.

Misce sedulo.

C. Präparate, welche den Terpentin mit fetten Körpern vermischt enthalten.

Mixtura adstringens. (B.)*

℞. Terebinthinae Venetae,
Balsami Copaivae,
Olei Succini rectificati,
singulorum partes aequales.

Bei Blennorrhöe und Pollutionen empfohlen. — Gobe, dreißig bis sechzig Tropfen, täglich drei Mal, mit einem Kaffeelöffel Zucker, indem man zugleich ein halbes Glas guten Wein trinkt.

Conditum nephreticum, Marmelada antinephritica. (Sw.)*

℞. Terebinthinae scrupulos quatuor.
Olei Amygdalarum dulcium uncias duas.

Contere et adde
Roos Juniperi absque saccharo uncias quatuor.

Oculorum Cancri porphyrisatorum semunciam.

Bei chronischer Nierenentzündung von Nutzen. — Gabe, zwei Drachmen mehrmals täglich.

Unguentum terebinthinatum. (A.)

℞. Unguenti simplicis uncias novem.

Terebinthinae . . . libras duas.
Liqua blando igne et agita ad refrigerationem usque.

Sparadrap commune. (A. GalM. Pal. T. Vm.)

℞. Terebinthinae . . . partem unam.
Olei Olivarum . . . partes quatuor.

Cerae flavae . . . partes octo.

Liqua simul in balneo aquae et supra fascias linteas extende. (GalM.)

Vm. Terebinthinae partem unam, Sebi vervecini unam cum dimidia et Cerae albae quatuor; — A. Cerae flavae uncias sex, Sebi vervecini duas, Axungiae unam cum dimidia et Terebinthinae tantidem; — Pal. Cerae albae semilibram, Sebi cervini uncias quatuor, Terebinthinae sesquiunciam et Olei Rosarum quantum sufficit; — T. Olei Amygdalarum dulcium unciam unam, Cerae albae duas, Terebinthinae Venetae drachmas duas.

Unguentum lenitivum s. emolliens. (Gen. Sw.)

℞. Mucilaginis alicujus libram unam.
Butyri recentis . . . libras duas.

Cerae flavae . . . semilibram.

Coque blando igne ad humidam consumptionem usque et adde

Terebinthinae Venetae unciam unam.

Adduntur interdum librae cuique hujus unguenti Essentiae Terebinthinae unciae tres et Opii drachma una. — Bei Milchnoten, Nierenschmerzen, Ischurie und Gelenksteifigkeit empfohlen.

Gen. Olei Olivarum libras tres cum dimidia, Cerae flavae libram unam, Colophonii semilibram et Terebinthinae uncias tres.

Diese Salbe hat große Nützlichkeit mit einigen der für die Bereitung des unguentum althaeae oder mucilaginis angeführten Formeln.

Charta ad cauterium. (Ca.)

℞. Terebinthinae purae,
Cerae albae,
singularum sesquiunciam.

Cetacei . . . drachmam unam.

Liqua in balneo aquae, tunc supra chartam bene laevigatam extende.

Pisa pro fonticulis. (B.)*

℞. Terebinthinae Venetae quantum vis.

Cerae flavae . . . sesquiunciam.

Pulveris Radicis Curcumae unciam unam.

— — Iridis semunciam.

Unguentum depilatorium. (Sw.)

℞. Terebinthinae Venetae drachmas decem.

Resinae Pini . . . unciam unam.

Liqua et in Aqua frigida serva. — Man nimmt davon etwas zwischen die befeuchteten Finger, fast die Haare und reißt sie in einem raschen Zuge aus.

Emplastrum Gratia Dei. (Vm.)

℞. Cerae flavae,
Resinae Pini,
singularum partes novem.

Liqua simul et adde
Terebinthinae . . partes quinque,
tunc momento, quo massa concresecere
coepit
Pulveris Olibani . . partes tres.

Unguentum terebinthinatum s. Balsami et Olei Laricis, Balsamum Frahmii, Linimentum digestivum. (B. Ba. Sw. Vm.)*

℞. Cerae flavae . . partem unam
Liqua blando igne et adde, mixta
seorsim

Terebinthinae Venetae,
Essentiae Terebinthinae,
singularum partem unam.

Misce bene. (B*. Ba. Vm.)
Sw. Essentiae partem unam, Terebinthinae et Cerae, singularum quatuor.
Bei alten Fußgeschwüren viel gerührt.

Linimentum antihæmorrhoidale. (Ca.)

℞. Terebinthinae Venetae,
Mellis Narbonnensis,
Olei Olivarium,
singularum unciam unam.
Misce trititando.

Digestivum liquefactum. (Sp.)

℞. Terebinthinae clarae uncias duas.
Vitelli Ovi . . unciam unam.

Tere, sensim addendo
Mellis uncias duas.
Aquaе fontanae uncias quatuor.
Alcoholis uncias sex.

Bon Plend in Einspritzungen bei Histen angewendet.

Unguentum s. Pomatum leniens et balsamicum. (Sm.)

℞. Aquaе Vitae,
Amyli triticeae,
Sacchari albi,
Albuminis Ovi recentis,
Terebinthinae,
Olei Olivarium,
Mellis albi,
singularum unciam unam.

Melli et terebinthinae mixtis adde
deinde sensim, continue agitando, reliquas substantias,

Bei Geschwüren, Ercoriationen und Wunden, welche heftige Schmerzen verursachen, empfohlen.

Balsamum Arcaei, Unguentum Amyridis

elemiferæ s. Arcaei s. balsamicum s. digereus balsamicum s. basilicum s. digestivum flavum s. Elemis. Elemi compositum s. Elemi et Terebinthinae s. Resinae flavae s. Resinae Elemi s. Sebi Arcaei s. de Terebinthina et Adipibus. (Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Br. Ca. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.)

℞. Terebinthinae . . uncias sedecim.
Elemi libras duas.
Resinae Pini

libras duas cum dimidia.

Olei Olivarium . . sesquilibrium.
Cerae flavae . . uncias quatuor.

Liqua simul. (Fer.)

℞. Terebinthinae Venetae,
Elemi,
Sevi cervini,

singularum uncias duas.
Olei Hyperici . . unciam unam.

Ligni Santali rubri
drachmam unam.

Liqua igne lenissimo elemi in terebinthina, adde sensim sebum et oleum simul liquata et admisce lignum pulveratum. (Sar. Wir.)

℞. Terebinthinae,
Elemi, singularum partes sex.
Liquefac blando igne, saepius agitando; remove ab igne et adde sensim Sebi cervini ad ignem liquati

partes sex.
Olei Hyperici . . partes duas.

Per pannum laneum (Stanell) transmissa in mortario ad perfectam refrigerationem ostiae tere. (Li.)

A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. HassP. O. Pol. et Sax. Terebinthinae, Elemi, Axungiae et Sebi vervecini, singularum partes aequales; — Lus. et C. Terebinthinae uncias decem, Elemi libram unam, Olei uncias duas et Sebi libras duas; — Gal. Galm. Fi. et T. Terebinthinae, Elemi, singularum partes tres, Axungiae duas et Sebi quatuor; — His. Terebinthinae, Elemi, Axungiae, singularum quinque et Sebi sex; — R. Terebinthinae, Elemi, singularum sex, Axungiae octo et Sebi quatuor; — Terebinthinae, Elemi, singularum unam cum dimidia, Axungiae unam et duas Sebi; — Ful. Hass. et Pid. Terebinthinae, Elemi, Sebi cervini, singularum tres et Olei Hyperici duas; — Sp. Terebinthinae, Elemi, singularum sex, Sebi cervini novem et duas Olei Hyperici; — Br. et Pal. Terebinthinae, Elemi, singularum sex, Sebi hircini duas et Olei Hyperici, singularum unam.

℞. Terebinthinae,

Elemi, singulorum partes sex.
 Sebi vervecini . . partes decem.
 Liqua simul. (Lon. Br.)
 An. Terebinthinae, Elemi, singulo-
 rum partem unam et Sebi vervecini
 duas; — Gen. Terebinthinae quatuorde-
 cim, Elemi duodecim et Sebi vervecini
 viginti quatuor; — Lon. Terebin-
 thinae vulgaris, Elemi, singulorum un-
 cias decem, Sebi libras duas, Olei Oli-
 varum uncias duas.
 ℞. Terebinthinae Venetae uncias sex.
 Olei Olivarum . . drachmas sex.
 Adde mixturae liquatae ex
 Elemi,
 Sebi vervecini, singulorum uncias sex.
 Cerae flavae . . drachmis sex.
 Misce bene. (Du.)
 Reizend, in der chirurgischen Praxis sehr
 in Gebrauch und eine der besten Salben.
 — Die zweite Formel ist die des Erfinders.
 Balsamum vulnerarium. (B*. Wir.)
 ℞. Terebinthinae Venetae
 Elemi sesquiunciam.
 Mixturae liquatae adde semunciam.
 Olei Hyperici sesquiunciam.
 — Cerae scrupulos duos.
 Misce. (Wir.)
 ℞. Terebinthinae Venetae,
 Elemi, singulorum sesquiunciam,
 Sebi hircini uncias duas.
 Balsami Tolutani unciam unam.
 Fiat unguentum. (B*.)
 Gebrauch, wie bei der vorübergehenden
 Salbe und kaum davon in der Wirkung
 verschieden.
 Unguentum Terebinthinae camphoratum.
 (GalM.)
 ℞. Balsami Arcaei
 partes centum quinquaginta.
 Camphorae partem unam.
 Contere sedulo.
 Balsamum Arcaei liquidum, Digestivum
 Plenckii. (Ca. Sp. Vm.)
 ℞. Balsami Arcaei,
 Vitelli Ovi,
 singulorum unciam unam.
 Tritura bene et adde
 Aquae Vitae uncias octo.
 Misce et serva. (Sp.)
 ℞. Terebinthinae clarae,
 Mellis communis,
 singulorum uncias duas.
 Vitelli Ovi unciam unam.
 Alcoholis uncias sex.
 Aquae uncias quatuor.
 Misce triturando. (Ca.)
 ℞. Balsami Arcaei partes duas.
 Petrolei rectificati partem unam.
 Contere. (Vm.)
 Zeitigend. — Man kann diesen Balsam
 in Einspritzungen anwenden.

Unguentum digestivum s. digestivum
 simplex s. luteum, Unguentum Terebin-
 thinae s. de Terebinthina s. de Tere-
 binthina et Ovorum Vitellis, Balsamum
 terebinthinatum. (BorC.D. Ful. Gal. Hass.
 HassP. Li. R. WW. Br. Fi. Pid. Ra. T.)
 ℞. Terebinthinae Venetae
 libram unam.
 Vitellos Ovorum no. 80.
 Misce. (R.)
 ℞. Terebinthinae Venetae libram unam.
 Vitellos Ovorum no. 12.
 • Misce bene et adde
 Mellis rosati semilibram.
 Serva. (WW.)
 ℞. Terebinthinae semilibram.
 Vitellos Ovorum no. 14.
 Tritura et adde
 Olei Hyperici sesquiunciam.
 Misce bene. (Hass. Pid.)
 HassP. Terebinthinae Venetae semi-
 libram, Vitellos Ovorum duorum, Olei
 Hyperici cocti uncias duas; — Gal.
 Terebinthinae partes duas, Vitelli Ovi
 unam et Olei Hyperici infusi quantum
 sufficit ut unguentum diffuens obti-
 neatur; — Li. Terebinthinae libram
 unam, Vitellos Ovorum no. 8 et Olei
 Olivarum uncias tres; — T. Terebin-
 thinae uncias quatuor, Vitellos no. 4,
 Olei Hyperici quantum sufficit.
 ℞. Terebinthinae Venetae,
 Olei Olivarum,
 singulorum libram unam.
 Cerae albae semilibram.
 Liqua et ad perfectam refrigeratio-
 nem usque agita. (Br.)
 Fi. Olei, Terebinthinae, singulo-
 rum libras duas cum dimidia, Cerae
 albae, libram unam et uncias octo;
 — BorC. Cerae partes duas, Terebin-
 thinae tantidem et Axungiae Porci sex.
 ℞. Terebinthinae Venetae
 drachmas duas.
 Cerae flavae sesquidrachmas.
 Liqua blando calore et adde
 Essentiae Terebinthinae
 drachmas duas.
 Misce bene. (D.)
 ℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
 Mellis rosati unciam unam.
 Olei Hyperici drachmas tres.
 Vitellum Ovi no. 1.
 Misce bene. (Ful.)
 ℞. Balsami Arcaei unciam unam.
 Cerati uncias duas.
 Vitellum Ovi no. 1.
 Misce. (Ra.)
 Reizend, zum Verbinden der Wunden
 und Geschwüre, zur Belebung der Vitali-
 tät der Oberfläche.
 Unguentum digestivum aloëticum s.
 myrrhatum s. digestivum animatum s.

digestivum compositum. (Bor. Bor4. Br. Ful. Han. Li. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. *Pid. Ra. Sp. Sw. Vm.*)

1) $\text{Mit Xio}\ddot{\text{e}}$.

℞. Aloës partem unam.
Mellis rosati . . partes quatuor.
Contere et adde

Terebinthinae clarae (Venetae)
partes duodecim.

Olei Hyperici . . . partes tres.
Misce bene. (Bor. Han. *Vm.*)

Bor4. eandem formulam sed loco olei hyperici Oleum Olivarum.

℞. Terebinthinae Venetae semilibram.
Mellis crudi . . . uncias quatuor.
Tincturae Aloës . . . uncias tres.
Vitellos Ovorum . . . no. 4.

Misce exacte. (Pol.)

℞. Terebinthinae . . . uncias duas.
Olei Hyperici . . . semunciam.

Misce et tunc cum

Vitello Ovi no. 1

in emulsionem redige, cui sensim adde
Tincturae Aloës,
— Myrrhae,
singularum sesquidrachmam.

Misce bene. (*Vm.*)

2) $\text{Dhne Xio}\ddot{\text{e}}$.

℞. Terebinthinae Venetae semilibram.
Vitellos Ovorum . . . no. 4.

Tritura simul et adde

Pulveris Myrrhae drachmas sex.

Olei Olivarum . . . sesquiunciam.

Misce bene. (Suec.)

℞. Terebinthinae Venetae
uncias novem.

Olei Myrrhae . . . sesquiunciam.

Adde

Vitellos Ovorum . . . no. 2.

Misce sedulo. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae Argentoratensis
uncias octo.

Vitellos Ovorum . . . no. 4.

Tritura simul et adde

Olei Hyperici . . . sesquiunciam.

Pulveris Olibani,

— Myrrhae,

singularum drachmas tres.

Misce bene. (Br. Wir. *Pid. Sp.*)

Pal. Terebinthinae libram unam, Vitellos Ovorum no. 3, Olei Hyperici uncias tres et Pulverum amborum, singularum semunciam; — Sax. Terebinthinae partes quatuor, Vitelli Ovi sufficientem quantitatem, Olei Hyperici partem unam et Pulverum amborum, singularum partis octantem; — T.

Unguento digestivo simplici Myrrham, Olibanum et Masticem, singularum scrupulos quatuor addere jubet.

℞. Terebinthinae . . . semilibram.

Vitellos Ovorum . . . no. 4.

Tere exacte et adde

Olei Hyperici . . . sesquiunciam.
Pulveris Myrrhae,

— Olibani,

singularum drachmas tres.

Croci in Alcohole macerati

quantum sufficit

ut massa colorem flavescentem praebeat. (O.)

℞. Balsami Arcaei . . . uncias duas.

Vitellos Ovorum . . . no. 2.

Olei Olivarum . . . uncias duas.

Commisce bene. (*Ra.*)

℞. Balsami Arcaei,

Unguenti Styrciaci,

singularum drachmas duas.

Vitellos Ovorum . . . no. 2.

Essentiae Terebinthinae

unciam unam.

Misce sedulo. (*Ra.*)

Ful. Unguento digestivo simplici Myrrhae et Olibani, singularum drachmas duas addere jubet; — Li. Unguenti simplicis drachmae cuique Myrrhae et Olibani, singularum grana quatuor addit. — Vis deterensiva unguenti augetur, addendo Unguentum aegyptiacum (Gal.) vel Aeruginem (*Sw.*)
Unguentum digestivum opiaceum. (*Ra.*)

℞. Unguenti digestivi simplicis
uncias quatuor.

Landani liquidi Sydenhami
unciam unam.

Commisce bene. — Loco laudani Opii pulverati drachmas duae addi possunt.

Balsamum Locatelli s. Italicum s. Italicum rubrum. (Ans. B. Br. Ful. GalH. Gen. Li. Pal. Sar. Sax. Wir. *Fi Sp. T. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . . . libram unam.

Terebinthinae,

Cerae flavae,

singularum semilibram.

Ligni Santali rubri unciam unam.

Liqua ceram in olei pauxillo, adde reliquum olei et terebinthinae, tunc lignum pulveratum et agita ad refrigerationem perfectam usque. (Gen.)

℞. Terebinthinae . . . partes quatuor.

Ligni Santali rubri partem unam.

Digere per horam unam super cinere calido in vase tecto; tunc liqua seorsim

Cerae flavae . . . partes sex.

Adde

Olei Olivarum partes duodecim tunc lignum et resinam. Prope ignem relinque iterum per horae quadrantem, cola fortiter exprimendo et momento quo massa refrigerare coepit, adde

Balsami Peruviani partem unam.

Agita, donec balsamum concreverit. (*Vm.*)

- ℞. Cerae flavae . . . uncias quatuor.
 Olei Olivarum . . . uncias sex.
 Ligua blando igne et adde
 Terebinthinae Venetae uncias sex.
 Ligni Santali rubri . semunciam.
 Cola et adde
 Balsami Peruviani drachmas duas.
 Serva. (B.)
 Ams. Cerae uncias quatuor, Olei et
 Terebinthinae, singulorum sex, Ligni
 et Balsami, singulorum unam; — Pal.
 Cerae uncias sex, Olei novem, Tere-
 binthinae quinque, Ligni quantum suffi-
 cit et Balsami drachmas sex.
- ℞. Olei Olivarum . . . uncias sex.
 Cerae flavae . . . uncias quatuor.
 Vini Maderani . . . uncias quinque.
 Coque blando igne ad consumptio-
 nem humidam usque et adde
 Terebinthinae Venetae uncias sex.
 Balsami Peruviani drachmas duas.
 Ligni Santali rubri . semunciam.
 Serva. (Wir. Sp. T.)
 GalH. Fi. Cerae uncias sex, Olei no-
 vem, Vini Hispanici duas, Terebinthinae
 novem, Ligni Santali rubri unam et
 Balsami Peruviani (drachmam?) unam
 cum dimidia.
- ℞. Olei Olivarum . . . libras duas.
 Vini Maderani . . . libram unam.
 Terebinthinae Venetae uncias octo.
 Coque blandissimo igne ad humidi
 consumptionem usque et adde
 Balsami Peruviani,
 Sanguinis Draconis,
 Storacis Calamita,
 singulorum unciam unam.
 Agita ad perfectam refrigerationem
 usque. (Sar.)
- ℞. Cerae flavae . . . partem unam.
 Olei Olivarum
 partem unam cum dimidia.
 Mixturae liquatae adde
 Terebinthinae Venetae
 partem unam cum dimidia.
 Adde ab igne removendo
 Balsami Peruviani nigri
 partis sedecimum.
 Kino . . . partis duodecimum.
 Serva. (Br. Sax.)
- ℞. Olei Olivarum . . . uncias quatuor.
 Cerae flavae . . . sesquiunciam.
 Ligua lente et adde
 Terebinthinae . . . uncias tres.
 Ab igne remove et adde, continue
 agitando,
 Balsami Copaivae . . . semunciam.
 Kino . . . drachmas tres.
 Serva. (Ful. Li.)
 Außertlich als balsamisches, austrocknen-
 des und Wundmittel. Heutzutage braucht
 man es nur noch wenig.
- Balsamum Genovense, Unguentum Te-
 rebinthinae camphoratum.* (Gal. Ca.
 Fi. Vm.)
 ℞. Vini rubri,
 Olei Olivarum,
 singulorum libras tres.
 Cerae flavae,
 Aquae Rosarum,
 singularum semilibram.
 Ligni Santali rubri uncias duas.
 Coque per horam dimidiam, spathu-
 lae lignae ope agitando et adde
 Terebinthinae Venetae libram unam.
 Commisce exacte et massae paullu-
 lum refrigeratae adde
 Camphorae pulveratae uncias duas.
 Cola et post aliquot horas sepositio-
 nis exprime. (Ca.)
- ℞. Cerae flavae . . . semilibram.
 Olei Olivarum . . . libram unam.
 Ligua et mixturam per horam unam
 prope ignem relinque cum
 Ligni Santali rubri uncis duabus.
 Adde deinde
 Terebinthinae . . . libram unam.
 Cola fortiter exprimendo et massae
 fere refrigeratae adde
 Camphorae pulveratae
 drachmas duas.
 Agita ad perfectam refrigerationem
 usque. (Vm.)
- ℞. Olei Olivarum . . . partes trecentas
 octoginta quatuor.
 Cerae flavae
 partes sexaginta quatuor.
 Ligni Santali rubri
 partes quatuordecim.
 Terebinthinae
 partes centum viginti octo.
 In digestionem relinque leni calore et
 paulo antequam refrigerint, adde
 Camphorae . . . partes duas.
 Misce bene. (Gal.)
 Fi. Olei libras quatuor, Cerae un-
 cias octo, Santali duas, Terebinthinae
 sedecim, Camphorae drachmas duas.
 Man empfahlt diese Salbe ehedem bei ge-
 rissenen Wunden, Geschwüren und selbst
 Brand.
- Balsamum Chironis.* (GalH.)
 ℞. Olei Olivarum . . . uncias sex.
 Terebinthinae . . . uncias duas.
 Cerae flavae . . . unciam unam.
 Radicis Alcanthae quantum sufficit.
 Calefac, tunc succedentim adde
 Balsami Peruviani nigri
 sesquidrachmam.
 Camphorae pulveratae
 grana duodecim.
 Ist wenig von dem vorigen verschieden
 und heutzutage eben so vergessen.
Balsamum pectorale. (Sp.)
 ℞. Terebinthinae

Olei Amygdalarum dulcium, singulorum drachmas octodecim.
 — Hyperici . . . uncias duas.
 Cetacei . . . semunciam.
 Sanguinis Draconis,
 Extracti Opii aquosi,
 Balsami Peruvianii,
 singulorum drachmas duas
 Butyri . . . sesquiunciam.

Misce sedulo.

Reibom ließ bei drohender Lungen-
 schwindsucht zehn bis fünfzehn Tropfen
 täglich nehmen; ob er das Uebel verhütet
 hat?

Sparadrap de Emplastris. (Gal.)

℞. Emplastri communis,
 — Diachyli gummosi,
 — Ceræ flavæ,
 singulorum partes quindecim.

Liquata simul in balneo aquæ supra
 fascias e tela textas extende.

Emplastrum ad s. contra apoplexiam.
 (Wir. Sp.)

℞. Terebinthinae Venetæ
 drachmas tres.

Galbani,
 Opopanacis,
 singulorum drachmas duas.
 Radicis Pyrethri,
 Piperis longi,
 Castorei,
 singulorum drachmam unam.
 Olei Succini . . . scrupulum unum.

Fiat emplastrum. (Wir.)

℞. Olei Juglandis uncias duodecim.
 Terebinthinae,
 Resinae Pinj,
 singulorum uncias quatuor.
 Colophonii . . . uncias duodecim.
 Ceræ flavæ
 uncias sexaginta quatuor.

Liquatis simul adde

Pulveris Succini,
 — Tacamahacæ,
 — Gummi Carannæ,
 — Sandaracæ,
 singulorum sesquiunciam.
 — Olibani,
 — Mastichis,
 — Storacis,
 — Benzoës,
 singulorum unciam unam.
 — Radicis Cyperi rotundi,
 — — Pyrethri,
 — — Angelicæ,
 — — Iridis Florentinae,
 singulorum semunciam.

Misce bene et massæ semirefrigera-
 tæ adde

Axungia Castoris,

Pharmacopœa universalis. II.

Camphoræ,
 singulorum drachmas duas.

Olei essentialis Macidis,
 — — Majoranae,
 — — Caryophyllorum,
 — — Ligni Rhodii,
 — — Lavandulæ, singu-
 lorum scrupulos duos.
 — — Salviæ,
 — — Rorismarini,
 — — Chamomillæ,
 — — Succini,

singulorum guttas duodecim.

Misce sedulo. (Sp.) — Ehehem wählte
 man dieses Pflaster bei Schlagfluß und
 Eßmung auf den abgehornen Kopf an.

Balsamum viride. (Pal.)

℞. Herbae Lavandulæ cum floribus,
 — Salviæ,
 — Hyssopi,
 — Majoranae,
 — Thymi,
 — Carvi cum semine,
 — Menthae aquaticæ,
 — — crispæ,
 — Plantaginis,
 — Rorismarini,
 — Leontopodii,
 — Virgaureæ,
 — Florum Chamomillæ,
 — Rosarum rubrarum,
 singulorum semunciam.
 Olei Olivarum,
 — Rosarum,

singulorum libras duas.

— Lini . . . libram unam.

Infunde seorsim et adde deinde

Terebinthinae,
 Sagapeni, singulorum libram unam.
 Olibani . . . semilibram.
 Digere in balneo aquæ, cola forti-
 ter exprimendo et massæ semirefrige-
 ratae adde

Olei Lavandulæ,
 Essentiæ Terebinthinae,
 Petrolei,

singulorum uncias quatuor.

Post aliquot dies decantha. — Ehe-
 hem innerlich und äußerlich als reizendes,
 reinigendes und zusammenlebendes Mittel.

D. Präparate, welche den Ex-
 pentin mit trocknen Substanzen
 gemischt enthalten.

*Pilulae cum Terebinthina s. diureti-
 cæ s. balsamicæ aperientes.* (DD. Gen.
 Ca. E. Pie. Sm. Sw.)

℞. Guajaci . . . drachmam unam.
 Terebinthinae . . . quantum sufficit
 ut fiant pilulae quindecim. — Gabe,
 ein Stück täglich drei Mal. (E.)

℞. Terebinthinae . . . semidrachmam.

Balsami Tolutani scrupulos duos.
 Oculorum Canceri quantum sufficit.
 Fiant pilulae trium granorum. (Gen.)
 R. Terebinthinae communis,
 Rhei pulverati,
 singulorum drachmas duas.
 Fiant pilulae granorum duorum.
 (DD.)

Gabe, fünf Stück auf einmal.
 R. Gummi Arabici . . . semunciam.
 Aquae . . . quantum sufficit
 ut fiat mucilago, cui adde
 Terebinthinae . . . drachmas sex
 ut fiat emulsio spissa; adde
 Pulveris aperientis quantum sufficit
 ut fiat pilulae quinque granorum.
 (Sw*.)

Gabe, drei Stück täglich vier Mal. —
 Man kann nöthigenfalls statt des Terpen-
 tins Copaivabalsam nehmen.

R. Terebinthinae . . . drachmas duas.
 Liquiritiae pulveratae
 quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. (Ca.
 Sm.)

Diese verschiedenen Pillenmassen, von denen die dritte von de Haen ist, sind vorzüglich als harntreibend gepriesen worden.

Boli antigonorrhoeici. (Pie. Sm.)

R. Terebinthinae Venetae
 scrupulum unum ad duos.
 Contere cum Vitello Ovi unius et
 adde

Pulveris Liquiritiae quantum sufficit
 ut fiat boli quatuor. — Gabe, ein
 Stück alle sechs Stunden. — Diese Pillen unterscheiden sich von den vorhergehenden Pillen nach de Haen's Formel nicht. — Sie sind von Astruc

Pilulae adstringentes. (Sm.)

R. Terebinthinae Venetae uncias duas.
 Extracti Rhei . . . drachmas tres.
 Camphorae . . . drachmas duas.
 Fiant pilulae quatuor granorum. —
 Gegen Leukorrhoe und Blennorrhoe. —
 Gabe, neun Stück täglich auf drei Mal.

Pilulae traumaticae. (Ful.)

R. Terebinthinae Venetae,
 Succu Liquiritiae,
 Extracti Millefolii,
 singulorum drachmam unam.
 Pulveris Mastichis,
 — Olibani,
 singulorum semidrachmam.
 Fiat massa pilularis. — Gabe, zehn
 bis zwanzig Gran.

Pilulae balsamicae. (Ca.)

R. Terebinthinae Chiae,
 Cetacei, singulorum semunciam.
 Myrrhae . . . drachmas duas.

Olibani pulverati quantum sufficit.
 Fiant pilulae trium granorum. —
 Gabe, ein Stück alle drei Stunden bei
 Lungenschwindsucht.

Pilulae balsamicae terebinthinatae. (Fi.)

R. Terebinthinae coctae unciam unam.
 Olibani,
 Mastichis,

singulorum drachmas duas.
 Cum terebinthina liquata reliqua
 commisce ut fiat pilulae granorum
 sex; quae pulvere Liquiritiae consper-
 gantur. — Gabe, ein Scrupel bis Drachme.

Pilulae resolventes. (Pie. Sm.)

R. Terebinthinae . . . guttas viginti.
 Extracti Liquiritiae drachmas duas.
 Saponis albi . . . drachmas quatuor.
 Syrupi quinque Radicum

quantum sufficit.
 Fiant pilulae granorum quatuor.
 (Pie. Sm.) — Gabe, drei Stück auf ein-
 mal, täglich drei Mal, bei Gallensteinen.

R. Terebinthinae . . . scrupulos duos.
 Extracti Rhei . . . drachmam unam.
 — Taraxaci

drachmas quatuor.
 Saponis albi . . . drachmas duas.
 Syrupi Quinque Radicum

quantum sufficit.
 Fiant pilulae granorum quatuor.
 (Sm.) — Gabe, wie bei der vorigen For-
 mel, in Unterleibsstockungen

Beide Formeln sind von Tronchin.

Pilulae contra s. ad taeniam. (Au.)

R. Terebinthinae Venetae
 drachmam unam.
 Saponis jalapini . . . semidrachmam.
 Extracti Hyoscyami grana quatuor.
 Mercurii dulcis . . . grana octo.
 Fiant pilulae granorum duodecim. —
 Hufeland ließ davon alle drei Stunden
 vier Stück nehmen und zwei oder drei Tage
 damit fortfahren.

Trochisci Cyphoeos, Cyphoides Galli.
 (Pal. Sp.)

R. Terebinthinae Chiae drachmas sex.
 Pulpae Uvarum
 uncias duas cum dimidia.

Bdellii semunciam.
 Myrrhae,
 Ligni Aloës,
 Croci,
 Cinnamomi,
 Nardi Indicae,
 Cassiae lignae,

singulorum drachmam unam.
 Schoenanthi . . . drachmas tres.
 Calami aromatici drachmas duas.
 Mellis uncias quinque.
 Vini Graeci . . . quantum sufficit.

Misce sedulo. (Sp.)

℞. Uvarum Passarum,
Terebinthinae coctae,
singularum uncias tres.

Schoenanthi,
Myrrhae, singulorum sesquiuunciam.
Calami aromatici drachmas novem.
Cinnamomi, drachmas quatuor.
Bdellii,
Nardi Indicae,
Gassiae lignae,
Cyperi rotundi,
Baccarum Juniperi,
singularum drachmas tres.

Asphalti
drachmas duas cum dimidia.
Crocii drachmam unam.
Mellis,
Vini Cretici,
singularum quantum sufficit.

Dissolve bdellium, myrrham et terebinthinam in vino, redige liquorem ad mellis consistentiam, commisce residuum et mel cum uvis diu simul trituratis et adde reliquas substantias subtilissime pulveratas, trochiscos in loco umbroso sicca. (Pal.) — Diese Trochisken kommen mit zum Nithridat.

§. II. Präparate, welche ausschließlich oder doch vorzüglich Terpentindöl enthalten.

Aethereoleum s. Spiritus s. Alcohol s. Oleum Terebinthinae, Oleum volatile s. aethereum Pini s. Laricis, Spiritus Olei Terebinthinae aethereus, Essentia Terebinthinae, Oleum essentielle s. Epyretum Terebinthinae.

1) Wie man es im Handel findet.
Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. GalM. HassP. Li. Lon. LonN. R. RC. Suec. C. G. M. Par. Sp.

Eine farblose Flüssigkeit von unangenehm, sehr starkem Geruch und scharfem, brennendem Geschmack. Speciv. Gewicht 0,870.

Man erhält von Pinus Mughus ein ähnliches Product, aber grünlich von Farbe und angenehmem Geruch, das Oleum templinum.

Rectificatur s. depuratur Oleum venale distillationis cum Aqua ope ab An. Ba. Fenn. et Br. Olei partem unam et duas Aquae; — HassP. Olei unam et Aquae tres; — Du. Ed. Lon. LonN. et C. Olei unam et quatuor Aquae; — Fi. Olei unam, Aquae sex; — Bor4. Olei unam, Aquae octo; destillent ad tertiae olei partis remanentiam.

Ban Mons bemerkt, daß bei seiner äh-

lichen Rectification ein Theil des Oels zerfällt wird, daß sich Essigsäure erzeugt, mehr oder weniger Rückstand bleibt und daß das Oel immer weniger in Alcohol aufsteiglich wird.

2) Durch den Apotheker bereitet:

A. An. Bor. Br. Du. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. C. Fi. Pid. Sw. Vm.

℞. Terebinthinae Venetae,
Aquae communis,
singularum pondus aequale.

Immitte in cucurbitam vitream supra arenae balneum; luto affixâ galeâ destillent et oleum ab aqua separetur. (Vm.)

A. Bor. Han. O. Pol. R. et Sw. Aquae et Terebinthinae quantitatem relativam non indicant; — Am. et C. Terebinthinae partes quinque et quatuor Aquae; — Hass. Suec. Wür. et Pid. Terebinthinae unam et tres Aquae; — Ful. Li. Pal. Sax. et Wir. Terebinthinae unam et quatuor Aquae; — Br. Gen. Sar. et Fi. Terebinthinae unam et Aquae sex; — Lus. Terebinthinae quinque et Aquae sex; — His. Terebinthinae unam et Aquae quadraginta.

Implendo per duas partes retortam vitream lutatam cum Terebinthina liquefacta et ignis reverberarii ope destillando, primo prodibit phlegma acidum (Acetum vel Spiritus Terebinthinae), tunc Oleum volatile, nova distillatione depurandum et in fine Oleum densum empyreumaticum. (Fi.)

Das Terpentindöl ist reiner als der Terpentin selbst, und wird unter denselben Umständen empfohlen und angewendet.

A. Präparate, welche das Terpentindöl in Aether aufgelöst enthalten.

Aether terebinthinatus. (Ca. Sw*. Vm.)

℞. Acidi sulphurici,
Alcoholi rectificati,
singularum partes aequales.

Misce sensim et aethereum distillando separâ; infunde ei
Essentiae Terebinthinae

quantum sufficit
ad saturandum; agita bene, per unum diem sepone et distillationi subijce. (Vm.)

℞. Alcoholis libras duas.
Essentiae Terebinthinae
semilibram.

Misce et adde sensim
Acidi nitrici concentrati
libras duas.

Destillet blando calore dimidia pars.
(Ca. Sw*.)

Sowohl äußerlich als innerlich bei Gallensteinen, Gelbsucht, Leberverstopfungen, Rheumatismen. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen, oder in einem mit Zucker versetzten Eigelb.

Linimentum Terebinthinae aethereum.
(Vm.)

R. Essentiae Terebinthinae
quantum vis.

Spiritus Nitri dulcis
quantum sufficit
ad oleum agitationis ope solvendum.
Gebrauch, wie bei'm vorigen.

Mixtura resolvens. (B*. DD. Au. Ca.
Pie.)

R. Essentiae Terebinthinae
partem unam.

Aetheris sulphurici partes tres.
Dissolve. (B*. Au.)
DD. et Ca. Essentiae partem unam
et duas Aetheris; — Pie. Essentiae
duas et Aetheris tres; — Ca. praete-
rea Essentiae unam et Aetheris qua-
tuordecim.

Von Durande gegen Gallensteine em-
pfohlen. — Gabe, von zwei Scrupel bis
eine Drachme täglich, in Molken oder
Fleischbrühe.

Mixtura diuretica. (Ca.)

R. Essentiae Terebinthinae
unciam unam.

Alcoholis Cochleariae semunciam.

Acidi hydrochlorici,

— nitrici alcoholisati,
singulorum drachmas tres.

— succinici,

Elixir proprietatis,
singulorum drachmas duas.

Gabe, vier bis fünfzehn Tropfen in wei-
sem Wein, mehrere Tage hintereinander.

B. Präparate, welche das Ter-
pentinöl in alcoholischen Flüssig-
keiten aufgelöst oder mit ih-
nen gemischt enthalten.

Vinum diureticum. (Pie.)

R. Essentiae Terebinthinae
drachmas duas.

Succi Citri . . . unciam unam.

Vini albi . . . uncias quatuor.

Auf einmal zu nehmen.

Spiritus antiictericus. (B*. Gen. Au.)

R. Essentiae Terebinthinae
sesquiunciam.

Alcoholis . . . semilibram.

Destillent blando calore et oleum
producto supernatans separatim ser-
vetur. — Gabe, fünf Tropfen auf Zucker.

Lotio terebinthinata. (B*.)

R. Essentiae Terebinthinae,
Alcoholis,
singulorum uncias quatuor.

Camphorae
uncias (drachmas) quatuor.

Geberden und Riemann rühmen sie
bei phthiriasis alter Leute.

*Liquor vulnerarius, Essentia s. Tin-
ctura vulneraria Stahlii, Balsamum vul-
nerarium.* (B*. Ful. Wir. Sp.)

R. Essentiae Terebinthinae
partem unam.

Tincturae Myrrhae partes duas.

— Succini partes quatuor.

Digere in loco calido.

Obdem in Einspritzungen bei Behandlung
fistulöser Geschwüre und zum Verbinden
von Wunden und Geschwüren sehniger
(blanches) Theile. — Kann das balsa-
mum Commendatoris sehr gut ersetzen.

*Balsamum Fioravanti, Alcohol tere-
binthinatum compositum.* (B. Gal. GalM.
Br. Fi. Sp. T. Vm.)

R. Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis,
singulorum partem unam.

Myrrhae,

Galbani,

Styracis liquidae,
singulorum partes duas.

Baccarum Lauri partes tres.

Terebinthinae Venetae
partes quatuor.

Alcoholis (10°),

Aquae, singulorum partes ducentas
sedecim.

Destillent partes centum et octo et
productum servetur. (B.)

R. Baccarum recentium Lauri
uncias quatuor.

Elemi,

Tacamahacae,
singulorum unciam unam.

Galbani,

Olibani,

Myrrhae,

Gummi Hederae,
singulorum uncias tres.

Styracis liquidae . . . uncias duas.

Ligni Aloës . . . uncias tres.

Galangae minoris,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Nucis moschatae.

Zedoariae,

Zingiberis,

Dictamni albi,

Aloës Socotrinae,

Succini, singulorum unciam unam.

Alcoholis uncias nonaginta sex.
Digere per dies aliquot, tunc ad 1/2

Terebinthinae . . . uncias sedecim.

Destillent. — Spiritus transiens nomen Balsamum Fioravanti spirituosum gerit. Residuum, leni igne in retorta destillatum, oleum flavum suppedit, Balsamum Fioravanti oleosum. Augendo ignem, magna nigrum et empyreumaticum, Balsamum Fioravanti nigrum obtinetur. (Sp.)

℞. Terebinthinae uncias sedecim, Elemi, Tacamahacae, Succini, Galbani, Myrrhae, singulorum uncias tres; Aloës Socotrinae unam, Styrcis liquidae duas, Baccarum Lauri recentium quatuor, Galangae, Zedoariae, Zingiberis, Cinnamomi, Caryophyllorum, Nucis moschatae, singulorum sesquunciam, Foliorum Dictamni cretici unam, Alcoholis 24° libras octo; destillent fluidi librae sex cum dimidia; — Balsamum oleosum et nigrum ut antea obtinentur.

℞. Terebinthinae partes quingentas et sedecim.

Elemi,
Tacamahacae,
Succini,
Galbani,
Myrrhae, singulorum partes nonaginta sex.

Styrcis liquidae partes sexaginta unam.

Foliorum Dictamni,
Aloës, singulorum partes triginta duas.
Baccarum Lauri recentium partes centum viginti octo.

Galangae,
Zedoariae,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae, singulorum partes quadraginta octo.

Alcoholis (22°) partes tricies nulle.
Macerare per dies sex, tunc in balneo aquae destillent partes bis mille quingentae. (Gal. GalM.)

℞. Terebinthinae . . . partes octo.

Baccarum Lauri, Myrrhae, singulorum partes tres.

Styrcis liquidae . . . partes duas.

Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Cinnamomi,

singulorum partem unam.
Aquae Vitae partes ducentas et sedecim.

Destillet quarta circiter pars. (B*. Br. Vm.)

Reizend, ehem sehr berühmt, als anaesthetisches, nervenstärkendes, gegen Nierenleiden wirksames, harntreibendes, giftwidriges, antihysterisches, Wund- und blutungstreibendes Mittel betrachtet.

Aqua Anhaltina, Spiritus Anhaltinus. (B*. Br. Han. Pal Sar. Wir. Ca. Sp. Vm.)

℞. Terebinthinae . . . semilibram.

Olibani . . . unciam unam.

Ligni Aloës pulverati uncias tres.

Granorum Mastichis,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Cubeborum,
Cinnamomi,

singulorum drachmas sex.

Croci Austriaci drachmas duas cum dimidia.

Seminum Foeniculi,
Baccarum Lauri,

singulorum semunciam.

Alcoholis . . . libras quinque.

Post sex dies digestionis destillent in balneo aquae. (Pal.)

Sp. Oleum producto supernatans separare jubet et pro arbitrio Moschi grana quindecim in nodulo inclusa immergere.

℞. Foliorum Rorismarini . . . unciam unam.

Herbae Rutae,
Seminum Foeniculi,
Baccarum Lauri,

singulorum semunciam.

Caryophyllorum,
Cubeborum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,

singulorum drachmas sex.

Mastichis . . . uncias duas.

Terebinthinae Venetae semilibram.

Alcoholis rectificati libras quinque.

Post sex dies digestionis adde Aquae fontanae . . . libras duas.

Destillent in balneo aquae librae quinque. (Br.)

℞. Radicis Galangae minoris,
Florum Rorismarini,

singulorum drachmas sex.

Seminum Foeniculi,
Baccarum Lauri,

singulorum unciam unam.

Caryophyllorum,
Cubeborum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Mastichis,

singulorum drachmas sex.

Olibani . . . unciam unam.

Terebinthinae Venetae semilibram.

Alcoholis rectificati . . . libras sex.

Post sex dies digestionis adde
 Aquae purae . . . libram unam.
 Destillent in balneo aquae librae
 quinque (Ham. Sar. Wir.)

℞. Baccarum Lauri,
 Seminum Foeniculi,
 singulorum semunciam.

Cinnamomi,
 Cubeborum,
 Galangae minoris,
 Caryophyllorum,
 Mastichis,
 Nucis moschatae,
 Rorismarini,
 singulorum drachmas sex.

Olibani . . . uncias quatuor.
 Aquae Vitae uncias nonaginta sex.
 Aquae
 uncias ducentas octoginta octo.

Destillent spiritus unciae octoginta
 et hoc productum denuo destilletur
 cum

Terebinthinae . . . unciis quatuor.
 Aquae . . . unciis centum sexaginta
 ut spiritus unciae sexaginta obtinean-
 tur. (Vm.)

Die Formel von Ca. ist falsch und wird
 daher hier übergangen.

Dieses Wasser unterscheidet sich kaum
 von dem balsamum Fioravanti und hat
 dieselbe Wirkung, wie dieser. Es ist ein
 magenstärkendes, blähung- und urintreibendes
 Mittel. Man wendet es ebenfalls äußerlich
 in Einreibungen auf den Unterleib, um Er-
 brechen und Diarrhöe zu stillen, oder in
 die Glieder bei Lähmung, an. — Gabe,
 sechszig Tropfen und mehr.

Balsamus Schauerianus. (B*. Br. Sp.)

℞. Terebinthinae Venetae
 sesquiunciam.

Galbani . . . drachmas novem.

Ra icis *Consolidae majoris*,
 — *Fraxinellae*,
 singulorum drachmas sex.

— *Imperatoriae*,

Mastichis, singulorum semunciam.

Radicis Calami aromatici,

— *Galangae*,

Storacis Calamita,

Olibani,

Zingiberis,

Cinnamomi,

Benzoës,

singulorum drachmas tres.

Nucis moschatae,

Cubeborum,

Caryophyllorum,

Santalii albi,

Cardamomi minoris,

Camphorae,

Ligni Aloës,

singulorum drachmas duas.

Radicis Caryophyllatae,

— *Inulae*,

Aloës hepaticae,

singulorum drachmam unam.

Myrrhae . . . semidrachmam.

Radicis Angelicae

grana quindecim.

Alcoholis concentrati libras octo.

Post sufficientem digestionem destil-
 lent in balneo aquae ad siccum.

Auch dieser Balsam hat Kechnlichkeit mit
 dem Fioravanti'schen, und ist ebenfalls rei-
 zend, auflösend, schmelzend und Blundmit-
 tel. Ehedem rühmte man ihn besonders
 bei Quetschungen und Ecthymosen, in Ein-
 reibungen.

Balsamum vitae album, *Spiritus balsa-
 micus.* (Wir.)

℞. Olibani,

Myrrhae,

Galbani, singulorum uncias tres.

Ligni Aloës,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Nucis moschatae,

Galangae,

Zedoariae,

Zingiberis,

singulorum unciam unam.

Baccarum Lauri uncias quatuor.

Terebinthinae Venetae

uncias duodecim.

Alcoholis . . . libras duodecim.

Post sufficientem digestionem destil-
 lent in balneo aquae. — Dieser Bal-
 sam, welcher nicht viel von dem Fioravan-
 ti'schen verschieden ist, gilt für magenstär-
 kend, harn-, blähungtreibend, nervenstär-
 kend, sowohl äußerlich als innerlich; im
 legtern Falle ist die Gabe vierzig bis sechs-
 zig Tropfen.

Aqua contra gonorrhoeam. (Wir.)

℞. Terebinthinae venetae

uncias decem.

Radicis Iridis Florentinae

uncias duas.

Herbae siccatae Menthae piperitae

uncias tres.

— — *Dictamni Cretici*

unciam unam.

Seminum Agni casti,

— *Rutae*, singulorum uncias

duas et dimidiam.

Vini albi . . . libras decem.

Destillet in balneo aquae dimidia
 pars. — Dieses Wasser hat ebenfalls Kechn-
 lichteit mit dem Fioravanti'schen Balsam.
 Hoffmann gab es bei Gonorrhöe und
 Leukorrhöe zu vier Löffel täglich, auf zwei
 Mal.

Elisir aromaticum adstringens. (Bo.)

℞. *Florum Lamii albi* libram unam.

Florum Rosarum pallidarum . . . unciās duas.
 Summitatum Rorismarini . . . unciām unam.
 Seminum Urticae . . . unciās octo.
 Foliorum Plantaginis . . . unciās duas.
 Glandes Quercus . . . no. 24.
 Radicis Bistortae . . . unciās duas.
 Vini albi . . . libras octo.
 Post horas viginti quatuor infusio-
 nis adde

Terebinthinae Venetae . . . unciās quatuor.
 Destillant in balneo aquae ad sic-
 cum, producto adde
 Subcarbonatis Potassae . . . unciām unam.

Roob Sambuci . . . unciās quatuor.
 Sacchari albi . . . libram unam.
 Reizend, gegen Leukorrhöe gerühmt. —
 Gabe, Morgens nüchtern zwei oder drei
 Unzen.

C. Präparate, welche das Ter-
 pentinöl oder Essenz mit wässe-
 rigen Flüssigkeiten vermischt ent-
 halten.

Clyster terebinthinatus, Enema terebin-
 thinatum. (B*. E. Ra.)

℞. Essentiae Terebinthinae . . . unciām unam.

Contere cum Vitello Ovi unius, sen-
 sim addendo

Aquae fontanae . . . unciās octo.
 Misco bene. (B*) — Von Groß ge-
 gen Katariden gerühmt.

℞. Essentiae Terebinthinae . . . unciām unam.

Vitellum Ovi . . . no. 1.
 Decocti Caputum Papaveris . . . unciās octo.

Von Récamier bei nervösem Leiden-
 weh gerühmt. (Ra.)

℞. Essentiae Terebinthinae . . . sesquiunciam.

Vitellos Ovorum . . . no. 2.
 Solutionis Gummi Arabici . . . octarium unum.

Misce. (E.)

Linimentum diureticum. (B*. Han. Ca.)

℞. Essentiae Terebinthinae . . . semunciam.

Tere cum Vitello Ovi unius et adde
 sepsim

Aquae Menthae piperitae . . . unciās sex.

Misce bene. (B*. Han.)

Ca. Essentiae unciām unam et Aquae
 Menthae tres.

In Einreibungen auf die Inguinalge-
 gend bei sogenannter trampschaffer Schärle.

Julep diureticum. (Bo. Pic.)

℞. Essentiae Terebinthinae . . . guttas quindecim.

Millepedum pulveratorum . . . semidrachmam.

Succi Summitatum Asparagi . . . unciām unam.

Decocti Asparagi,
 Aquae Hernariae, . . . singulorum unciās tres.

Syrupi Capilli Veneris . . . drachmas sex.

Bei Scharie, Rheumatismus und Gicht.
 — Auf zwei Mal, Morgens und Abends.

Looch terebinthinatum. (Ra.)

℞. Essentiae Terebinthinae . . . drachmas tres.

Vitellum Ovi . . . no. 1.
 Contere et adde

Syrupi Menthae . . . unciās duas.
 — Florum Aurantiorum,
 — Aetheris, . . . singulorum unciām unam.

Tincturae Cinnamomi . . . semidrachmam.

Von Récamier bei Nervenschmerzen
 angewendet. — Gabe, täglich drei Löffel.

— Zuweilen setzt man, zur Verhütung
 des Erbrechens, eine Drachme Laudanum
 zu. (Ra.)

Potio contra taeniam. (Ca.)

℞. Essentiae Terebinthinae unciās tres.
 Mellis . . . drachmas sex.

Aquae destillatae Menthae . . . drachmas tres.

Auf drei Mal den Tag über.

Emulsio terebinthinata. (B*. Vm.)

℞. Essentiae Terebinthinae . . . drachmam unam.

Contere cum Vitello Ovi unius vel
 cum Mucilaginis Gummi Arabici drach-
 mis duabus et adde sensim

Aquae communis unciās sex ad octo.
 Misco bene. (B*)

℞. Essentiae Terebinthinae . . . semunciam.

Gummi Arabici . . . drachmas duas.
 Aquae . . . quantum sufficit.

Fiat emulsio, cui adde
 Mellis albi . . . unciās duas

et Aquae quantum satis ut fiat potio
 unciarum sex. (Vm.)

Gabe, ein Löffel täglich mehrmals.

Aqua cosmetica. (Pal.)

℞. Albuminis Ovorum recentium in
 Aqua ad duritiem cocti . . . libras duas.

Terebinthinae Venetae semilibram.
 Mellis . . . unciās octo.

Styracis . . . unciām unam.

Benzoës . . . drachmas duas.
 Aquae Rosarum pallidarum
 unciās decem.
 Destillent in balneo aquae ad siccum.

Potio diuretica. (E.)

℞ Essentiae Terebinthinae
 guttas centum.

Gummi Arabici,
 Sacchari albi,
 singulorum drachmam unam.
 Aquae Menthae unciās quatuor.
 Gabe, vier oder fünf Eßffel täglich.

Potio stimulan. (E.)

℞. Essentiae Terebinthinae
 guttas centum viginti.

Gummi Arabici,
 Sacchari,
 singulorum drachmas duas.
 Tincturae Opii guttas sexaginta.
 — Lavandulae compositae
 drachmas duas.
 Aquae Menthae unciās quinque.
 Gabe, ein Eßffel alle zwei Stunden.

D. Präparate, welche das Ter-
 pentinöl mit zuckerhaltigen Kör-
 pern vermischt enthalten.

Pulvis terebinthinatus, Elaëosaccharum
s. Oleosaccharum Terebinthinae. (B.*
Au.)

℞. Essentiae Terebinthinae
 scrupulum unum.
 Acidi pyrotartarici grana decem.
 Sacchari albi . . . quantum sufficit
 ad saturandum. Tere ut fiat pulvis.

Von Goeze gegen Bandwurm geprie-
 sen. — Gabe, drei Mal täglich, in kal-
 tem Wasser. — Man führt dann mit
 Gummi Gutti ab.

Electuarium s. Opium terebinthina-
tum. (Gen. Ra.)

℞. Essentiae Terebinthinae
 drachmas duas.

Pulveris Gummi Arabici
 sesquinciām.
 Sacchari pulverati . . . semunciām.
 Syrupi Florum Aurantiorum
 unciām unam.

Von Récamier bei Neuralgien ange-
 wendet. — Gabe, den dritten Theil täg-
 lich, auf drei Mal, zwischen zwei Oblaten.
 (Ra.)

℞. Essentiae Terebinthinae
 semunciām.

Mellis . . . unciām unam.
 Liquiritiae pulveratae
 quantum sufficit.

Misce exacte. (Gen.)

Conditum febrifugum, Marmelada fe-
brifuga. (Sw)*

℞. Essentiae Terebinthinae
 drachmas duas.

Terebinthinae purae sesquinciām.
 Misce triturando cum Vitello Ovi
 unius et adde

Terebinthinae . . . unciās duas.
 Gegen Bandwurm. — Gabe, ein Kas-
 seelöffel, Morgens und Abends.

Bolus antiarthriticus. (Sar.)

℞. Essentiae Terebinthinae
 guttas viginti quatuor.

Mellis electi granai triginta sex.
 Misce.

Linctus Olei Terebinthinae, Mel te-
rebinthinatum. (B. E. Ra. Sw.)*

℞. Essentiae Terebinthinae
 semunciām.

Contere cum Vitello Ovi unius et
 adde

Mellis albi . . . unciās tres.
 Misce. (Sw.)

℞. Essentiae Terebinthinae
 drachmas duas.

Mellis crudi . . . unciām unam.
 Misce. (B*. E.)

Von Home bei rheumatischem Lenden-
 weh empfohlen; von Récamier in allen
 Neuralgien angerathen; letzterer nimmt, statt
 des reinen Honigs, Rosenhonig zu einer bis
 vier Unzen. — Gabe, drei Eßffel täglich.

E. Präparate, welche das Ter-
 pentinöl mit fetten Körpern ge-
 mischt enthalten.

Potio vermifuga. (E.)

℞. Essentiae Terebinthinae
 drachmas duas.

Olei Juglandis . . . sesquinciām.
 Auf eine Gabe

℞. Essentiae Terebinthinae
 drachmas quinque.

Olei Juglandis . . . unciās tres.
 Auf eine Gabe.

Oleum anthelminticum. (B.)*

℞. Olei Terebinthinae partes quatuor.
 — Cornu Cervi partem unam.

Destillent mixturae trientes duo.

Neurohr will dieses Del zu zehn bis
 hundert Tropfen mit Erfolg gegen Band-
 wurm angewendet haben.

℞. Olei Terebinthinae partes tres.
 — Cornu Cervi partem unam.

Destillent tres quadrantes.

Shabert ließ es zu einem bis zwei
 Kaffeelöffel Morgens und Abends, oder in
 Klystir und zu zwei Kaffeelöffeln in einer
 schleimigen Abführung nehmen. Bremser
 gab es Morgens und Abends zu zwei Kas-

Acidī hydrochlorici,
singulorum unciam unam.
Aquae Vitae camphoratae
uncias sex.

Misce.

Resolvens s. Fundans Richardi. (Vm.)

℞. Essentiae Terebinthinae,
Acidi hydrochlorici concentrati,
singulorum partem unam.

In retortam immitte, agita saepius
mixturam et post unum vel duos dies
infunde

Alcoholis partes octo.
Destillent partes octo; in producto
solve

Camphorae . partem dimidiam.

*Balsamum ad s. contra pernioles. (GalH.
Bo. Ra.)*

℞. Balsami Fioravanti uncias quatuor.
Acidi hydrochlorici

guttas triginta duas.

Misce exacte.

Ra. Olei Olivarum uncias duas, Bal-
sami Peruviani drachmam unam, Ce-
taeci, Ceræ albae, Acidi hydrochlori-
ci, singulorum drachmas duas et Aquae
puræ drachmas sex.

℞. Olei Olivarum . partes quinque.
— Terebinthinae . partes duas.

Acidi sulphurici partem dimidiam.
Misce. (Ca.)

GalH. Olei partes centum sexaginta,
Essentiae sexaginta quatuor et sedecim
Acidi.

In Einreibungen Morgens und Abends
auf Theile, wo Frostbeulen entstehen wol-
len.

G. Präparate, welche das Zer-
pentindl mit Alkalien verbunden
enthalten.

*Sapo Starkeyanus s. tartareus s. che-
micus pro casu externo s. Potassae te-
rebinthinaceus s. tartareus Starkeyi, Cor-
rector Starkeyi s. Opii, Sapo Olei vola-
tilis Terebinthinae et Potassae. (Br. Fer.
Ful. Gal. Hass. His. Li. Sar. Wir.
Wir. Au. Fi. Pie. Sp. Sw.)*

℞. Subcarbonatis Potassae
quantum vis.

Calcina fortiter, massam adhuc cali-
dam in mortarium calefactum immit-
te, pulvera et ei infunde, bene tritu-
rando, Terebinthinae Venetae pauxil-
lum; addere terebinthinam per par-
tiunculas drachmae circiter unius con-
tinua, donec absorberi cessaverit; dis-
solve deinde massam in Alchole con-
centrato, sepone et filtra liquorem,
qui tunc lente evaporat. (Ful. Li.)

Br. Sar. et Wir. calcinare jubent
Subcarbonatam Potassae per horam

unam vel duas, pulverase, infundere
deinde guttatum Essentiae Terebinthi-
nae quantum sufficit, evitando ne aer
accedat, totum deinde in cavam sapo-
nere, addere post aliquot tempus
Olei calidi pauxillum et ita continuare,
donec alcali absorberit Essentiae cir-
citer pondus triplum.

℞. Subcarbonatis Potassae sicci,
Essentiae Terebinthinae,
Terebinthinae Venetae,
singulorum partes aequales.

Tritura sal in mortario marmoreo
pistilli vitrei ope, addendo primum es-
sentiam et deinde resinam; mixturam,
apta consistentia acquisita, porphyrisa.
(Gal. Fi.)

℞. Terebinthinae communis
unciam unam.

Liqua in vase fictili et adde
Potassae causticae liquidae
semunciam.

Agita subinde, donec mixtura sapo-
nis consistentiam acceperit. (His.)

Pie. Potassae siccae uncias tres,
Aquae duas et quatuor Essentiae Te-
rebinthinae.

℞. Potassae causticae unciam unam.
Liquatae blandissimo igne adde

Essentiae Terebinthinae uncias tres.
Agita bene ut perfecte commisceantur.
(Hass. Wür. Sp.)

Fer. et Sw. Potassae partes decem
et octo Essentiae.

℞. Terebinthinae . unciam unam.
Essentiae Terebinthinae

semunciam.

Olei Amygdalarum dulcium,
Lixivii Saponariorum,
singulorum unciam unam.

Misce. (Au.)

Diese Seife verdankt ihren Namen dem
Vermögen, welches ihr zugeschrieben wur-
de, die schädlichen Eigenschaften des Opiums,
der Nieswurz und anderer ähnlicher Sub-
stanzen zu verbessern. Balsamisch, reizend,
eröffnend, harntreibend, krampfstillend, be-
sonders bei Gonorrhöe und Wasserfuchten
empfohlen. — Gabe, acht bis zwölf Gran,
in einem wässerigen Vehikel oder in Pillen.

H. Präparate, welche das Zer-
pentindl mit Seife verbunden ent-
halten.

*Balsamum saponaceum terebinthina-
tum s. vitae externum, Linimentum sti-
mulans, Sapo terebinthinatus s. ex Oleo
Terebinthinae volatilī et Potassa, Spiri-
tus Saponis compositus, Balsamum Te-
rebinthinae, Balsamum Saponis.*

1) Ohne Alchohol.

℞. Saponis Veneti sicci
partes sedecim.

Essentiae Terebinthinae
partes triginta duas.

Solutioni adde
Subcarbonatis Potassae liquidi partes tres.

Misce bene. (BorC. Ful. Hass. Li. Wür.)

Br. Saponis, Essentiae, singulorum partes viginti quatuor et unam Subcarbonatis; — B*. Bor. Bor4. D. Han. HassP. et Sax. Saponis, Essentiae, singulorum sex et unam Subcarbonatis; — B* secundum Theden, Saponis octodecim, Essentiae quindecim et unam Subcarbonatis; — Sp. Saponis novem, Essentiae octodecim et unam Subcarbonatis; — Sw. Saponis quatuor, Essentiae octo et unam Subcarbonatis.

℞. Saponis rasi . . . partes duas.
Olei Terebinthinae . . . partes tres.
Triturando dissolve et adde
Potassae causticae calcinatae
partem unam cum dimidia
dissolutae in
Aquae . . . parte dimidia.
Misce bene. (Vm.)

℞. Saponis albi . . . partes quatuor.
Camphorae . . . partem unam.
Contere, sensim addendo
Essentiae Terebinthinae
partes sedecim.

Solutionem serva.

2) Mit Alcohol.

℞. Saponis Medullae partes quatuor.
Terebinthinae . . . partem unam.
Tincturae Sodae partes quatuor.
Dissolve in balneo aquae tepido, in vase clauso et cola. (Vm.)

℞. Saponis albi,
Essentiae Terebinthinae,
singulorum partem unam.
Contere et adde
Alcoholis . . . partes octo.
Digere in Aqua tepida, sepone per dies aliquot et soluta filtra. (Hass. Li. Wir. Pid. Vm.)

Solutio Saponis in Essentia, seorsim praeparata a pluribus pharmacopoeis (Hass. Pid.) Corpus pro Balsamo Saponis appellatur.

℞. Camphorae pulveratae
partem unam.
Alcoholis rectificati
partes sedecim.

Solutioni adde
Saponis albi rasi partes quatuor.
Digere blando igne et adde
Essentiae Terebinthinae
partem unam.
Misce agitando. (DD.)

℞. Subcarbonatis Potassae
sesquiunciam.

Aquae fontanae
uncias viginti quatuor.

Solutioni adde
Essentiae Terebinthinae
uncias tres.
Saponis Veneti . . . uncias duas.
Spiritus Juniperi . . . uncias duas.
Olei Culilaban . . . uncias tres.

Misce bene. (Sp.)

℞. Saponis,
Essentiae Terebinthinae,
singulorum semilibram.

Solutioni adde
Alcoholis Serpylli libras quatuor.
Ammoniaci liquidi
uncias duas ad octo.

Misce bene. (Sw.)

Sa. Saponis unciam unam, Essentiae semilibram, Alcoholis Serpylli uncias quinque et Ammoniaci drachmas duas ad unciam unam.

℞. Saponis Medullae partem unam.
Alcoholis ammoniacalis
partes quatuor.
Essentiae Terebinthinae
partes octo.

Spiritus Serpylli
partes sexaginta quatuor.

Solutionem filtra. (Vm.)

Mehrere dieser Formeln haben Aehnlichkeit mit dem Opodeldoß, dem übrigen hinsichtlich der Wirkungs- und Anwendungsart der balsamus vitae externus sehr nahe steht. — Reizend, schmelzend, auflösend. — Aeußerlich bei Eruptionen und zur Vertreibung mancher Geschwülste.

Fomentatio resolvens. (Ful. Ham. Li. Sp.)

℞. Balsami vitae externi
partem unam.
Aquae communis
partes viginti quatuor.

Dissolve.

Balsamum Barvillianum. (B*. Au.)

℞. Essentiae Terebinthinae
uncias tres.
Subcarbonatis Potassae
sesquiunciam.
Saponis Alicantini rasi uncias duas.
Aquae destillatae sesquiunciam.
Spiritus Juniperi . . . uncias duas.

Dieser Balsam ist kaum von dem balsamus vitae externus verschieden, besonders wenn dieser nach Sp.'s Formel bereitet ist. Noch weniger unterscheidet er sich von dem folgenden.

Liquor nervinus Pereboomii. (B*. Han. Vm.)

℞. Subcarbonatis Potassae partes tres.
Saponis Alicantini partes quatuor.

Contere et humecta cum
 Aquae purae . partibus duabus.
 Admisce sensim
 Essentiae Terebinthinae
 partes sex.
 Olei Cajeput . . partem unam.
 Adde deinde pluribus vicibus
 Aquae tepidae

partes quadraginta sex.
 Post plures dies filtra. (Vm.)
 B*. et Han. Subcarbonatis Potassae
 partes tres, Saponis quatuor, Aquae
 quadraginta, Essentiae sex, Olei Cajepu-
 t unam et Spiritus Juniperi quatuor.
 Reizend, äußerlich bei Lähmung ange-
 wendet.

Linimentum antiarthriticum. (Ca.)

B. Camphorae . scrupulum unum.
 Essentiae Terebinthinae
 drachmas duas.

Solutioni adde
 Saponis nigri . . unciam unam.
 Unguenti nervini . . semunciam.
 Cumini pulverati drachmas duas.
 Salis Cornu Cervi succinati
 grana quindecim.

Von Home in Einreibungen bei lang-
 wierigen rheumatischen Affectionen, beson-
 ders ischias, empfohlen.

§. III. Präparate, welche den harzi-
 gen Theil des Terpentins aus-
 schließlich oder vorzugsweise ent-
 halten.

Der harzige Bestandtheil des Terpentins
 stellt sich unter verschiedenen Formen dar,
 welche im Allgemeinen von seiner größern
 oder geringern Reinheit abhängig sind und
 unter denen einige von verschiedenen Phar-
 macopden in ihre materia medica gestellt
 werden. Die letztern sind:

1) *Pix s. Resina Burgundica, Resina*
s. Pix alba; Burgundisches, weißes Pech
 oder Harz; Poix blanche, Poix de Bour-
 gogne (Gal.).

A Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.
 BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenu. Ful. Gal.
 GalM. Gen. Han. Hass HassP. His.
 Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax.
 Suec. Wir. Wür. WW. B. Fi. G. M. Par.
 Pid. Sp. T.

Man erhält es, wenn man den gemeinen,
 an der Oberfläche der Einschnitte verhärteten
 Terpentin schmelzt und so geschmolzen
 durch ein Strohhütt filtrirt.

2) *Resina Pini s. communis*; gemei-
 nes Pech, Fichtenharz; Poix résine, Ré-
 sine commune (Gal.).

HassP.

Man bereitet es, indem man das vorher-

gehende schmelzen oder geschmolzenes Colo-
 phonium stark mit einem Viertel weißem
 Pech in Wasser kochen läßt, wodurch es
 seine Durchsichtigkeit verliert und eine schmuz-
 zigelbe Farbe erhält. Es unterscheidet
 sich kaum vom vorigen und wird fast in
 allen Pharmacopden damit verwechselt.

3) *Colophonium, Resina flava s. Resina*
Pini fusa, Pix graeca; Colopho-
 nium, Weigenharz, griechisches Pech; Co-
 lothane, Arcanson, Poix seöhe (Gal.).

Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer.
 Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP.
 His. Li. Lus. O. Pol. B. RC. Sax. Suec.
 Wir. Wür. WW. Be. Fi. G. M. Pid. Sp. T.
 Der Rückstand, welcher nach der Destil-
 lation des gemeinen Terpentins, um ihn
 zu rectificiren, erhalten wird, welchen man
 dann schmelzen und ruhig wieder erkalten
 läßt.

4) *Terebinthina cocta, Resina flava*;
 gekochter Terpentin, gelbes Harz; Téré-
 benthine cuite (Gal.).

A. Bor. Bor4. Br. Du. Gal. GalM. Gen.
 Han. Hass. HassP. His. O. Pal. Pol.
 Sax. Wir. Wür. Br. Sw*. Vm.

Er unterscheidet sich vom Colophonium
 nur dadurch, daß er Wasser enthält und
 von dem gemeinen Pech durch die größere
 Menge desselben, welche in ihm enthalten ist.
 Man gewinnt ihn, indem man entweder das
 bei der Destillation des Terpentins mit Was-
 ser, um das Del zu bereiten, in dem Kol-
 ben Zurückbleibende sammelt oder einen
 Theil Terpentin mit drei Theilen Wasser
 kochen läßt, bis die Masse, in kaltes Was-
 ser gegossen, einen etwas weichen Teig
 darstellt.

Gal. in pilulas granorum sex, in Aqua
 servandas redigere jubet.

5) *Pix solida s. atra s. nigra s. na-*
valis s. vegetabilis, Resina Pini empy-
reumatica solida, Palampissa; schwarzes
 Pech, Schiffspech; Poix noire (Gal.).

Ams. B. Ba. Bor4. Br. D. DD. Du.
 Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han.
 Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus.
 R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. C. Fi.
 G. M. Par. Pid. Sp. T.

Man erhält es durch abwärtsgehende
 Verbrennung des Strohs, welches zum
 Filtriren des gemeinen Terpentins benutz
 wurde.

Es ist zum Theil durch das Feuer ver-
 ändertes und mit Kohle vermishtes Harz,
 hat also Verwandtschaft mit dem Theer;
 es ist aber weit unreiner und scheint keine
 Essigsäure zu enthalten.

Innerlich wendet man nur den gekochten
 Terpentin an; er gilt als balsamisches und
 harntreibendes Mittel, welches, besonders
 bei rebellischer Gonorrhöe, Sticht und hart-

nächtigen Rheumatismen, zu einer halben Drachme, mehrmals täglich, in Gebrauch ist. Die übrigen Arten dienen besonders zum äußern Gebrauch.

A. Präparate, welche gekochten Serpentin enthalten.

Conditum corroborans, Marmelada adstringens. (Sw.)*

℞. Terebinthinae coctae

unciam unam.
Misce in mortario calefacto exaete cum

Balsami Copaivae . . . semuncia.
Adde deinde

Mucilaginis Gummi Arabici
unciam unam.

Conservae Rosarum rubrarum
uncias quatuor.

Gabe, zwei bis drei Drachmen, täglich drei Mal, bei veralteten Gonorrhöen.

Pilulae e Terebinthina s. diureticae roborantes s. stimulantes ad gonorrhoeam. (B. BorC. Sar. Wir. Au. Sp. Sw. Sm.)*

℞. Terebinthinae coctae

drachmas duas.
Pulveris Rhei drachmam unam.

Fiant pilulae triginta. (Sy.) — Gabe, vier bis sechs Stück, Morgens und Abends.

℞. Terebinthinae coctae uncias duas.
Rhei pulverati . . . unciam unam.

Syrupi balsamici quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (Sw.)

— Gabe, wie bei den vorhergehenden.

℞. Terebinthinae coctae,

Saponis,
singulorum drachmam unam.

Pulveris Rhei . . . semunciam.
Fiant pilulae granorum duorum. (B*.

BorC.) — Gabe, zehn bis fünfzehn Stück, Morgens und Abends.

Au. Terebinthinae coctae, Saponis,
singulorum semidrachmam, Rhabarbari
drachmam unam.

℞. Terebinthinae coctae

unciam unam.
Rhei . . . drachmas duas.

Succini albi,
Mastichis,
Liquiritiae,
Ossis Sepiae,

singulorum drachmam unam.

Terebinthinae Venetae
quantum sufficit.

Fiat massa pilularis. (Sar.)

℞. Terebinthinae coctae

sesquiunciam

Succini,
Mastichis,
Olibani

Succi Liquiritiae,

Rhei,
Ossis Sepiae,
Boli Armenae,
singulorum drachmas duas.
Fiat massa pilularis. (Wir.)

℞. Terebinthinae coctae

sesquiunciam.
Boli Armenae,
Ossis Sepiae,

singulorum semunciam.

Succini,
Mastichis,

singulorum drachmas duas.
Rhei . . . drachmam unam.

Syrupi balsamici quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Sp.) — Die

drei letzten Formeln sind mit Recht verlassen. — Gabe, ein Scrupel, täglich drei Mal, bei Tripper.

Pilulae adstringentes. (Sm.)

℞. Terebinthinae coctae,

Sanguinis Draconis,
singulorum drachmas duas.

Terebinthinae clarae
quantum sufficit.

Fiant pilulae quatuor granorum. — Gabe, drei Stück täglich, auf drei Mal, bei Gonorrhöe.

℞. Terebinthinae coctae

drachmas quatuor.
Succini . . . drachmas duas.

Ossis Sepiae . . . drachmam unam.
Resinae Guajaci scrupulos quatuor.

Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiant pilulae centum quinquaginta.

— Gabe, zwölf Stück täglich auf drei Mal, bei Leucorrhöe und Gonorrhöe.

Pilulae balsamicae Junckeri. (B. Au. Sp.)*

℞. Mastichis,

Myrrhae,
singulorum partem unam.

Terebinthinae coctae,
Succini flavi, singulorum partem

unam cum dimidia.

Jalapae pulveratae . . . partes tres.
Extracti Fumariae,

— Cardui benedicti,
— Absinthii,
— Cochleariae,

singulorum partes duas.
Fiat massa pilularis. (B*.) — Diese

von Juncker mitgetheilten Pillen wurden ehedem für emmenagogisch angesehen.

℞. Terebinthinae coctae semunciam.

Saponis rasi . . . unciam unam.
Resinae Jalapae,

Extracti Aloës aquosi,
— Centaurii minoris,
— Gentianae,

singulorum drachmas tres.
Fiant pilulae granorum duorum. (Sp.)

— Man gab ehedem bis zu vierzig Stück.

- Unguentum contra perniones.* (Sw.)
 ℞. Terebinthinae coctae,
 Butyri Cacao,
 singularum uncias tres.
 Liquatis simul, blando igne, adde
 Balsami Peruviani semidrachmam.
- Ceratum oleo-resinosum.* (Sw*.)
 ℞. Ceræ albae,
 Terebinthinae coctae,
 singularum partem unam.
 Olei Olivarum . . . partes duas.
 Liqua leni igne, cola et ad perfectam
 usque refrigerationem agita. — Zum
 Verbinden leichter Excoriationen von Nuz-
 zen.
- Sparadrap adhaesivum.* (Vm.)
 ℞. Terebinthinae coctae,
 Ceræ albae,
 singularum partes aequales.
 Liqua et super telam vel chartam
 extende.
- ℞. Terebinthinae coctae
 partem unam.
 Emplastri simplicis . . . partes tres.
 Liqua et ut antea extende.
- Balsamum Fourcroyi.* (Ca.)
 ℞. Olei Olivarum . . . libras quatuor.
 Pulveris Radicis Angelicae,
 — — Scorzonerae,
 — Hyperici,
 — Baccarum Hederæ,
 singularum uncias duas.
 Coque blandissimo igne, macera per
 noctem, altero mane ad ignem repone
 et oleo bullire incipienti adde
 Theriacae,
 Croci,
 Extracti Juniperi,
 singularum drachmas duas.
 Aloës . . . drachmam unam.
 Coque, cola, per aliquot horas sepo-
 ne, et ad ignem repositis adde
 Terebinthinae . . . uncias decem.
 Coque, donec nullus terebinthinae
 amplius odor exhalatur; ab igne dein-
 de remove et adde
 Pulveris Olibani,
 — Storacis,
 — Benzoës,
 singularum sesquidrachmam.
 Misce, donec penitus refrigerint, per
 duos vel tres dies sepone ut subside-
 ant, cola per pannum gossypinum (Ger-
 viette) et in lagenâ serva. — Gegen
 Hautrisse, Geschwüre, Frostbeulen, Rheu-
 matismen und Verrentungen, in Einrei-
 bungen oder Umschlägen.
- B. Préparatè, zu denen das ei-
 gentliche Parz kommt.
Fumigatio resinosa. (Sm.)
 ℞. Resinae communis,

- Ceræ flavæ,*
 singularum partes aequales.
 Immitte in vas fictile craticulae im-
 positum vel supra lampadem a spiritu
 vini alitum.
 Diese Räucherung hat man bei Lungens-
 chwindfucht empfohlen. — Bei manchen
 chronischen Catarrhen mit reichlichem et-
 terartigen Auswurf.
- Unguentum contra tineam.* (GalH. Ca.)
 ℞. Farinae Trïtici partes quinque.
 Aceti . . . partes quadraginta.
 Fiat pasta; adde mixturam igne liqua-
 tam et colatam de
 Picis Burgundicae,
 — nigrae,
 singularum partibus quatuor.
 Misce exacte. (GalH.)
 Ca. Farinae partes quinque, Picis
 Burgundicae et nigrae, singularum
 tantidem et Aceti partes triginta.
 Auf ein Stück Leder gestrichen auf den
 kranken Theil gelegt und nach zwölf Stun-
 den wieder abgenommen.
- Cera arborea, Ceratum citrinum s. ni-
 grum s. Resinae s. Resinae Pini s. Re-
 sinae Pini Burgundicae resinorum, Em-
 plastrum adhaesivum s. commune attra-
 hens s. cereum s. Ceræ s. citrinum s.
 Ceræ terebinthinatum s. Picis s. pice-
 um s. adhaesivum s. Picis navalis s.
 sticticum s. simplex s. roborans, Un-
 guentum flavum s. Resinae albae s. resi-
 nosum s. simplex.* (A. Am. Ams. B. Bor.
 Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer.
 Ful. Han. Hass. HassP. Li. Lon LonN.
 O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. C.
 Huf. Pid. Sp. Sw. Vm.)
- ℞. Resinae Pini . . . partem unam.
 Sevi ovilli . . . partes duas.
 Ceræ flavæ . . . partes tres.
 Liquata simul cola. (Vm.)
- Ed. et C. Resinae albae partes duas,
 Sebi duas et Ceræ tres (*Emplastrum
 simplex*); — Am. Ed. et C. Resinae
 albae partes quinque, Axungiae octo
 et Ceræ flavæ duas (*Unguentum s.
 Ceratum resinorum*); — Lon. LonN.
 Wür. C. et Sw. Resinae flavæ partem
 unam, Sevi et Ceræ flavæ, singulo-
 rum tres (*Emplastrum commune s. Ce-
 ræ*); — Sp. Resinae, Ceræ flavæ,
 singularum duas et Sevi unam (*Empla-
 strum attrahens*); — Du. Resinae al-
 bae duas, Axungiae quatuor et Ceræ
 unam (*Unguentum Resinae albae*); —
 Sw. Resinae sedecim, Sevi unam et
 Ceræ sex, vel Resinae sedecim, Sevi
 unam et Ceræ decem (*Emplas. rum ad-
 haesivum s. roborans*); — Bor4. Re-
 sinae Burgundicae, Ceræ flavæ, sin-

golorum libram dimidiam, Adipis suilli
libras octo (*Unguentum Resinae Pini
Burgundicae*).

℞. Axungiae Porci . . . libras octo.
Radiciſ Curcumae pulveratae

uncias duas.

Aquae quatuor.

Coque lente ad humidi usque con-
sumptionem et adde

Cerae flavae,

Resinae Pini,

singularum semilibram.

Liquefacta cola. (Bor. Sax., *Unguen-
tum flavum*).

℞. Resinae Pini . partes octodecim.

— Burgundicae

partes viginti octo.

Cerae flavae . . . partes viginti.

Liqua leni igne. (B.)

Vm. Piciſ nigrae partes quatuor cum
dimidia, Resinae Pini quinq̄ue et Ce-
rae flavae sex; — *Ams.* Resinae Pini
duodecim, Piciſ Burgundicae quatuor-
decim et Cerae decem; — *Sax.* Resi-
nae Pini novem, Piciſ Burgundicae
quatuordecim et Cerae decem. (*Em-
plastrum Piciſ s. piceum*).

℞. Resinae Pini . partes quatuor.

Cerae flavae . partem dimidiam.

Terebinthinae . partes duas.

Liqua simul. (*Vm.*) *Unguentum sim-
plex s. Ceratum Resinae*.

Sw. Piciſ Burgundicae partes trigin-
ta duas, Cerae et Terebinthinae, sin-
gularum unam (*Emplastrum piceum*);
— *Vm.* Resinae Pini partem unam cum
dimidia, Cerae flavae tres et unam
Terebinthinae (*Emplastrum citrinum*).

℞. Resinae Pini . unciſ sedecim.

Cerae flavae . . . unciſ decem.

Terebinthinae . . . unciſ tres.

Massae liquatae adde

Pulveris Curcumae drachmas tres.

Misce bene. (*Sp.*) *Emplastrum citri-
num*.

℞. Resinae Pini,

Cerae flavae,

Piciſ nigrae,

singularum partes duodecim.

Sevi hircini

partem unam cum dimidia.

Liqua et cola. (D. DD. Wür.) *Em-
plastrum piceum s. sticticum*.

Li. Resinae Pini, Piciſ Burgundicae,
singularum partes sex, Cerae flavae
quatuor et Sevi cervini duas (*Empla-
strum piceum s. adhaesivum*).

℞. Resinae Pini

partes viginti quatuor.

— nigrae . partes sedecim.

Cerae flavae . . . partes octo.

Terebinthinae . partes quatuor.

Liqua simul. (Fenn. Suec) *Empla-
strum Piciſ*.

Vm. Resinae Pini partes sex, Piciſ
nigrae duodecim, Cerae flavae tres et
Terebinthinae unam. (*Ceratum nigrum*).

℞. Resinae Pini . . . partes octo.

Cerae flavae . . . partes quatuor.

Sevi partes duas.

Terebinthinae . partem unam.

Liqua et cola. (Ful. Hass. *Li. Pid.*)

*Emplastrum citrinum s. cereum s. at-
trahens, Ceratum citrinum s. Resinae
Pini*; — *HassP.* Resinae albae libram
unam, Cerae citrinae libras duas, Sevi
vervecini, Terebinthinae Venetae, sin-
gularum semilibram.

A. Bor. et Bor4. Resinae Pini partes

duas, Cerae flavae quatuor, Sevi et Te-

rebinthinae, singularum unam (*Han-*

atum s. Emplastrum citrinum), — *Cer-*

et Sax. Resinae Pini partes duas, Cerae

quatuor, Sevi unam et unam Terebin-

thinae (*Ceratum s. Emplastrum citri-*

num, Cera arborea); — *Vm.* Resinae

Pini partes quatuor, Cerae tres, Sevi

et Terebinthinae, singularum unam

(*Ceratum adhaesivum*); — *Huf.* Resi-

nae partes sex, Cerae quatuor, Sevi

duas et unam Terebinthinae (*Empla-*

strum citrinum); — *Fer.* Cerae sedec-

im, Resinae quatuordecim, Sevi duo-

decim et tres Terebinthinae (*Ceratum*

citrinum).

℞. Resinae Pini

partes viginti quatuor.

Cerae flavae . . . partes sedecim.

Sevi ovilli . . . partes octo.

Terebinthinae . partes quatuor.

Liqua et adde

Pulveris Radiciſ Curcumae

partem unam.

Misce bene. (Bor. Br. O. Pal. R.

Wir. Wür.) *Emplastrum s. Ceratum citri-*

num.

℞. Piciſ navalis,

Resinae Pini,

Sevi ovilli,

Terebinthinae,

singularum partes duas.

Cerae flavae . . . partes tres.

Liqua simul. (B*) *Emplastrum Piciſ*

navalis s. sticticum Hamburgense.

℞. Cerae flavae . . . libram unam.

Resinae Pini . . . semilibram.

Sevi ovilli . . . unciſ quatuor.

Olei Olivarum,

Terebinthinae,

singularum unciſ duas.

Radiciſ Curcumae pulveratae

drachmas duas.

Liqua et cola. (Fenn.) *Emplastrum*

Cerae terebinthinaum s. citrinum.

Einige dieser Formeln haben viel Aehn-

lichkeit mit der Basilicumsalbe, entweder in Ansehung der Beschaffenheit und der Zahl der Bestandtheile oder in Ansehung der verhältnißmäßigen Menge derselben zu einander.

Emplastrum Picis compositum, Unguentum Abbatiae du Bec. (Lon. LonN. C. Ca. Vm.)

℞. Resinae Burgundicae libras duas.
Olibani . . . libram unam.
Resinae Pini,
Cerae flavae,
singularum uncias quatuor.
Olai Nucis moschatae
unciam unam.

Liqua picem, ceram et resinam et adde olibanum, tunc oleum. (Lon. C.)

Vm. Picis Burgundicae partes quatuor, Resinae Pini duodecim, Picis nigrae tantidem, Cerae flavae quatuor et Olei Nucis moschatae unam; — Ca. Axungiae, Picis Burgundicae, singularum libram unam, Cerae flavae uncias decem, Resinae Pini, Picis navalis, singularum quinque et Olibani drachmas decem; — LonN. Picis libras duas, Abietis Resinae libram unam, Resinae flavae, Cerae flavae, singularum uncias quatuor, Olei Myristicae expressi unciam unam, Olei Olivarium, Aquae, singularum fluiduncias duas; picis, resinae et cerae simul liquefactis primum abietis resinam, dein olea et aquam adjice, misce et ad idoneam crassitudinem decoque.

Emplastrum defensivum viride. (Br. Wir.)

℞. Cerae flavae . . . libram unam.
Resinae Pini . . . uncias duas.
Sevi hircini . . . uncias sex.
Terebinthinae . . . unciam unam.
Pulveris Herbae Leontopodii
uncias sex.

Misce. — Addere potes, ut colorum magis saturatum obtineas, librae cuique Indigo pulverati scrupulum unum.

Br. Leontopodio Rutam substituit.

Emplastrum contra rachitidem. (B.)

℞. Resinae Pini . . . unciam unam.
Cerae flavae . . . semunciam.
Olei empyreumatici Tartari
drachmam unam.

Liqua simul. — Man will dieses Pflaster bei Rachitis der Kinder mit Erfolg gebraucht haben; es wird auf das Rückgrat gelegt.

Sparadrap resinosum. (Vm.)

℞. Resinae Pini,
Terebinthinae,
singularum partem unam.

Cerae albae . . . partes quatuor.
Liqua simul et supra pannum e tela vel chartam extende.

Emplastrum Andreae a Cruce s. Resinarum glutinans s. Picis et Resinae. (GalM. His. Ca. Vm.)

℞. Picis albae . . . partes octo.
Elemi . . . partes duas,
Terebinthinae,
Olei laurini,

singularum partem unam.

Liqua et cola. (GalM. Ca. Vm.)

His. Picis partes sedecim, Elemi quinque, Terebinthinae, Olei Olivarium, singularum duas et Cerae albae unam.

Emplastrum maturans. (Sw.)

℞. Resinae Pini . . . semilibram.
Emplastri de Gummi-Resinis
libram unam.

Liqua simul.

Unguentum basilicum s. tetrapharmacum s. Picis s. Picis empyreumaticum s. piccum compositum s. regium s. Terebinthinae resinosum s. Picis et Cerae s. Terebinthinae et Picis.

1) *Unguentum basilicum flavum s. pallidum, Unguentum Resinae flavae, Ceratum Resinae, Unguentum emolliens s. aureum s. citrinum.* (Ams. Bor. Bor4. D. DD. Fenn. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Sw. Vm.)

℞. Colophonii,
Cerae flavae,
singularum partem unam.
Olei Olivarium . . . partes tres.

Liqua simul. (Ams.)

Lus. Trium substantiarum partes aequales; — Lon. LonN. Resinae flavae, Cerae flavae, singularum libram unam et Olei octarium unum.

℞. Olei Palmae,
— Lini,
singularum libras duas,
Cerae flavae . . . semilibram,
Resinae flavae . . . sesquiunciam.

Liqua lente. (Ams.) — *Unguentum emolliens.*

℞. Colophonii,
Cerae flavae,
singularum partem unam.

Axungiae Porci,

Olei Olivarium,

singularum partes quatuor.

Liquefac blando igne. (Ful.)

Sw. Colophonii, Cerae, singularum partem unam, Axungiae et Olei, singularum sex.

℞. Colophonii,
Resinae Pini,

Cerae flavae,
Sevi hircini,
singulorum partes duas.
Olei Olivarum partes tres.
Liqua simul et cola. (His.)
Sw. et Vm. Quatuor priorum substantiarum partem unam et Olei duas.
R. Resinae Pini,
Cerae flavae,
Terebinthinae,
singulorum partem unam.
Olei Napi partes duas.
Liqua lente et cola. (DD.)
R. Colophonii,
Cerae flavae,
Sevi ovilli,
singulorum partem unam.
Axungiae Porci partes tres.
Liqua et adde, ab igne removendo,
Terebinthinae partem dimidiam.
Misce bene. (Bor. D. Hass. O. Pol. Sax.)
Bor. HassP. loco axungiae Oleum Olivarum; — R. Colophonii, Cerae, Sevi, Terebinthinae, singulorum partem unam et quatuor Axungiae; — Fenn et Suc. Colophonii, Cerae, Sevi, Terebinthinae, singulorum tres et Olei duodecim; — Li. Resinae Pini, Cerae, Sevi, Terebinthinae, singulorum unam et quingque Olei; — Gen. Colophonii, Picis Burgundicae, Cerae flavae, singulorum partes duodecim, Terebinthinae uncias tres et Olei Olivarum quatuordecim.
R. Olei Olivarum libras duas.
Terebinthinae libram unam.
Cerae flavae,
Colophonii,
singulorum uncias septem.
Mastichis,
Olibani, singulorum uncias duas.
Croci drachmas duas.
Liqua ceram, colophonium, mastichem, terebinthinam in oleo et mixturae semirefrigeratae adde olibanum et crocum pulverata. (Sar.)
Wir. Olei libras duas cum dimidia, Cerae flavae semilibram, Terebinthinae uncias duas, Colophonii, Resinae Pini, singulorum semunciam, Mastichis, Olibani, singulorum et Croci drachmam unam.
2) *Unguentum basilicum nigrum s. Resinae nigrae.* (Ams. An. B. Ba. Bel. Br. Gal. GalM. HassP. His. Lon. LonN. Pal. Sar. Wir. Br. Sp. Sw. Vm.)
R. Picis nigrae,
Colophonii,
Cerae flavae,
singulorum partem unam
Olei Olivarum partes quatuor.
Pharmacopoea universalis. II.

Liqua simul picem et colophonium, adde ceram et oleum et per linteum trajice. (Ams. B. Ba. Bel. Gal. GalM. Sar. Sp.)
Lon. LonN. Picis uncias novem, Colophonii, Cerae, singulorum tantidem et Olei octarium unum.
R. Picis nigrae,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
Axungiae Porci,
singularum partem unam,
Olei Olivarum partes duas.
Liqua simul. (Au. Sw. Vm.)
His. Quatuor priorum substantiarum partes duas et Olei tres.
R. Picis nigrae,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
Terebinthinae,
singulorum partem unam
Olei Olivarum partes octo.
Liqua simul. (Br.)
Br. praeterea Picis nigrae, Colophonii, Terebinthinae et Olei, singulorum partes aequales; — Ft. Quatuor priorum substantiarum et Sevi ovilli, singulorum partem unam, Olei duas.
R. Cerae flavae,
Sevi varvacini,
Colophonii,
Picis nigrae,
Terebinthinae,
singulorum uncias tres.
Olei Olivarum libram unam.
Liqua et adde
Pulveris Olibani sesquunciam.
Misce bene. (Br. HassP. Wir.)
Sw. Picis nigrae, Colophonii, Cerae flavae, singulorum semilibram, Olei libram unam cum dimidia, Terebinthinae uncias tres et Olibani unciam unam.
R. Cerae flavae uncias duas.
Croci scrupulos duos.
Mastichis,
Myrrhae,
Picis navalis,
Sevi,
Olibani,
singulorum drachmas duas.
Colophonii,
Terebinthinae,
singulorum semunciam.
Olei Olivarum uncias tres.
Fiat unguentum. (Pal.)
Unguentum fuscum. (Br. Wir.)
R. Olei communis sesquilibram.
Cerae flavae uncias quatuor.
Colophonii,
Picis navalis,
singulorum uncias duas
Mastichis

Terebinthinae,
 singularum unofam unam.
 Ligua et colaturae refrigeratae adde
 Pulveris Galbani, •
 — Sagapeni,
 — Olibani,
 singularum unciam unam.
 — Aristolochiae rotundae •
 semunciam.

Misce sedulo.

Emplastrum adhaesivum s. simplex
agglutinans s. glutinans Lithargyri s.
Oxydi Plumbi semivivrei cum Resina s.
cum Resina Pini s. resinosum s. com-
mune s. cum Resina s. Resinae s. po-
lychrestum s. cochine adhaesivum s.
simplex s. lithargyricum cum Resina
Pini, Ceratum resinorum. (Am. Ams.
B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed.
Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass.
His. Lon. LonN. Lus. Pol. R.C. Sax.
Suec. WW. Au. Br. C. Fi. Fid. Sw. T. Vm.)

R. Olei Olivarum . . . libras duas.
 Lithargyri . . . libram unam.
 Cerussae . . . uncias quatuor.

Coque lente, continue agitando et
 subinde Aquae paucillum affundendo,
 ad consistentiam emplastri; adde deinde

Cerae flavae . . . uncias octo.
 Terebinthinae communis
 uncias duas.

Misce bene. (Fenn. Suec.)

Ba. coquere jubet Lithargyri partes
 octo in Axungiae duodecim et addere
 Resinae Pini partes sex et Picis nigrae
 tres.

R. Emplastri simplicis partes sex.
 Ligua blando calore et adde
 Picis albae (Resinae flavae Lon.)
 partem unam.

Misce exacte. (Ams. B. Bel. Gal. Gen.
 Lon. LonN. Lus. Vm.)

R. Emplastri partes octo et unam
 Resinae; — Am. Ed. R.C. et C. Em-
 plastri quinque et Resinae unam; —
 R. Wir. et Sp. Emplastri duas et unam
 Resinae; — Bor4 Emplastri Lithar-
 gyri simplicis partes duas, Terebinthi-
 nae coctae unam, liqua et misce; —
 Du. Emplastri partes septem et unam
 Terebinthinae coctae; — Vm. Empla-
 stri quinque et Terebinthinae coctae
 unam; — Fer. Emplastri simplicis sex,
 Emplastri Cerussae unam et Resinae
 Pini tantidem; — Fi. Cerati diapal-
 mae libram unam, Cerati Cerussae,
 Resinae Pini, Terebinthinae, singulo-
 rum uncias duas; — Au. Emplastri
 Picis et Colophonii, singulorum partes
 aequales.

R. Emplastri simplicis
 partes viginti quatuor.
 Picis Burgundicae . . . partes sex.

Terebinthinae . . . partem unam.

Liqua. (Hass.)

Bor. Han. Polj et Vm. Emplastri
 partes viginti quatuor; Picis duodecim
 et unam Terebinthinae; — HassP.
 Terebinthinae partem dimidiam, cae-
 terum ut Bor4 Sw. Emplastri se-
 decim, Picis quatuor et unam Tere-
 binthinae; — Sax. Emplastri duode-
 cim, Picis sex et unam Terebinthinae;
 — Ful. Emplastri quatuor, Resinae se-
 decim et quatuor Terebinthinae; —
 Pid. Emplastri sex, Resinae duodecim
 et Terebinthinae quatuor.

R. Emplastri simplicis libras duas.
 Resinae Pini . . . libram unam.

Cerae flavae . . . sesquinciam.

Liqua. (WW.)

R. Emplastri simplicis
 partes triginta octo.
 Cerae flavae . . . partes sedecim.

Liqua et adde

Terebinthinae . . . partes tres.

Axungiae Porci . . . partem unam;

Misce bene. (Vm.)

R. Emplastri simplicis sesquilibrium;
 Unguenti Althaeae,
 Olei Olivarum,

singularum unofam sex;

Terebinthinae . . . uncias tres.

Cerae flavae . . . uncias duas;

Misce bene. (Br.)

R. Emplastri simplicis libras sex.

Ichthyocollae in Aquae Vitae un-

ciis duabus dissolutae semunciam.

Ossypi . . . uncias quatuor.

Resinae Pin,
 Cerae flavae,

singularum unofam quatuor.

Terebinthinae . . . semilibram.

Liqua simul resinam, ceram et tere-
 binthinam, adde emplastrum Hydratum,
 tunc oesspum cum ichthyocolla ritum
 et ad humidum totius evaporationem ca-
 lesfac. (His.)

Unguentum Lithargyri resinosum mar-

tile s. agglutinans martiale. (Sux.)

R. Colophonii . . . partes sex.

Terebinthinae . . . partes quatuor.

Liqua et adde.

Pulveris Mastichis partes duas.

Grocii Martia . . . partem unam.

Malaxa cum

Emplastri simplicis

partibus duodecim.

Emplastrum roborans s. stypticum. (Ful.)

R. Emplastri adhaesivi (Ful.)

uncias duas.

Liqua et adde

Camphorae pulveratae,

Olei essentialis Carvi,

singularum drachmam unam.

Misce sedulo.

Teucrium.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen neun Arten angeführt:

1) *Teucrium chamaedryos*, L.; *Gamander*; *Gamanberlein*; *Germansyrdre*; *Commune*, *péit Chêne* (*Gal.*); *Garmander* (*Ang.*); *Kamanderle*, *Ozanka menessj* (*B.*); *Camedrio* (*His. Lus.*); *Gamanderlyn* (*Bel.*); *Camedrio*, *Erba Querciola*, *Calmandrina* (*I.*); *Ozanka* (*Pol.*); *Ekegræs* (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. BorC. Br. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Li. Lus. R. Sax. Wir. Wür. WW. *Be. Er. Fi. G. M. Sp. Z.*

2) (*Djydynamia Gymnospermia*, L.; *Labiatae*, J.) Eine Pflanze des gemäßigten und südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 180. *Plenck.* t. 477. *Hayne* VIII. 4. *Fl. méd.* III: 183.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Chamaedryos* s. *Trissaginis* s. *Querculae minoris*) an; es besteht aus einem vieredigen, dünnen, behaarten Stängel mit entgegengesetzten gestielten, eirunden, glatten, oben graugrünen, unten bläulichen, tiefgefärbten Blättern und 2 oder 3 purpurrothen, kurzgestielten, in den Achseln der obern Blätter entspringenden Blüthen. Es hat einen sehr schwachen, gewürzhaften Geruch, welcher sich durch Trocknen verliert, und einen mäßig bitteren, etwas styptischen Geschmack.

Reizend.

2) *Teucrium flavum*, L.; *Selber Gamander*; *Germandree jaune* (*Gal.*); *Yellow flowered shrubby gamander* (*Ang.*).

His.

3) Eine Pflanze Spaniens und Italiens. (*Lob. Icon.* 490. 1.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Teucrii flavi*) an; es besteht aus einem behaarten Stängel mit eirunden, unten gefärbten, an der Spitze ganzen Blättern und gelben, seitenständige Trauben bildenden Blüthen. Es hat einen bitteren Geschmack.

Reizend.

Extractum Chamaedryos. (*Gal. GalM. Sar.*)

R. Summitatum Chamaedryos

quantum vis.

Aquae bullientis quantum sufficit. *Infunde*, *cola* et *hlando igne* ad *extracti consistentiam* consume. (*Gal. GalM.*)

R. Herbae Chamaedryos recentis et contusae *libras octo.*

Macera per tres dies in *alembico* et

destillatione unciæ circiter duas aquae abstrahæ; *residuo infunde Aquæ triplum* et post sex horas *digestionis* *coquendo* ad *tertiæ partis remanentiam* consume; *tertiæ liquoris* et *cola*; tunc ad *electuarii consistentiam* evaporato tepido solum *aquam destillatam* adde. (*Sar.*)

Decoctum Chamaedryos amarum. (*His.*)

R. Summitatum Chamaedryos semunciam.

— *Absinthii*,

— *Centaurii minoris*,

singulorum drachmas duas.

Aquæ *libras duas.*

Decoquæ ad *dimidii remanentiam* et *sub finem* adde

Florum Chamomillæ

drachmas duas.

Foliorum Sennæ *sesquunciam.*

Man läßt oft die Senna, durch welche die sonst bittere und tonische Abkochung laxirend wird, weg. — Gabe, vier bis sechs Unzen.

Infusum Chamaedryos. (*Gal. GalM. Sp.*)

R. Herbae Chamaedryos

unciæ unam.

Aquæ bullientis *octarium unum.*

Infunde. (*GalM. ParC.*)

R. Foliorum recentium Chamaedryos

unciæ unam.

Aquæ bullientis . *libras duas.*

Infunde et *colaturæ* adde

Syrupi Capilli Veneris aut *Mellis unciæ unam.*

Misce. (*Gal.*)

3) *Teucrium chamaepitys*, L.; *Schlagkraut*; *Felbypresse*; *Erwelschrauch*; *Ivette commune* (*Gal.*); *Ground pine* (*Ang.*); *Ywa*, *Polnj cypris* (*B.*); *Camepiteos*, *Pinillo oloroso* (*His.*); *Veldcypress* (*Bel.*); *Camepizio* (*I.*); *Iwiuka*, *Piznowa* (*Pol.*); *Chamepite* (*Lus.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. Per. Ful. Gal. Gen. His. Li. R. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. G. M. Sp. Z.*

4) Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 523. *Plenck* t. 475. *Hayne* VIII. 1. *Zorn Ic.* pl. t. 120.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Chamaepitys* s. *Ivae arthriticae* s. *Chamaemori*) an; es besteht aus einem ästigen, behaarten Stängel mit bis über die Hälfte in drei linienförmige Lappen getheilten Blättern und einzelnen, gelben, stiellosen, in den Achseln der obern Blätter sitzenden Blüthen. Es hat einen harzigen und schwach balsamischen Geruch, welcher sich beim Trocknen verliert. Der Geschmack ist scharf, bitter und styptisch.

Tonisch, magenstärkend.

4) *Teucrium Iva*, L.; Bismaginsel; Ivette musquée (Gal.).

Gal.

⊙ Eine Pflanze des mittägigen Euro-pa's. (Cav. II. t. 120.)

Man wendet das Kraut (herba Ivae s. Ghamaepityos Monspelianae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit ganzen, bloß an der Spitze mit zwei Zähnen versehenen Blättern. Es hat einen starken, harzigen, etwas moschusartigen Geruch, besonders bei großer Hitze, und einen bittern Geschmack.

Extractum Ivae (Sar.)

Rx. Herbae Ivae (arthriticae) recentis et contusae libras octo.

Digere per tres dies in alembico, tunc distillationis in balneo aquae ope aquae unoias duas abstrahé; residuo infunde Aquae triplum et coctione ad tertiae partis remanentiam consume, clarifica et cola liquorem, cui ad electuarii consistentiam evaporato et non nisi tepido aquam adde.

5) *Teucrium Marum*, L.; Amberkraut, Raufenkraut; Marum (Gal.); Lathymum (Ch.); Kocij korenj (B.); Maro cortuso (His.); Maro, Erba gatta (L.); Ambrowe ziele (Pol.); Katgraes (Suec.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

⊙ Eine Pflanze, welche im südlichen Europa und in der Levante wächst. (Blackw. t. 47. Plencz t. 674. Hayne VIII. 2. Zorn Ic. pl. t. 60.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Mari veri s. Syriaci) an; es besteht aus dünnen, filzigen Keften mit kleinen, eirundlanzettigen, gestielten, oben graulichgrünen, unten weißfilzigen Blättern und purpurrothen, einzeln in den Achseln der obern Blätter, aber genähert stehenden und so eine lange, nach einer Seite gewendete Traube bildenden Blüthen. Es hat einen sehr gewürzhaften und durchdringenden Geruch und einen brennenden, scharfen, gewürzhaften, etwas bitteren Geschmack.

Reizend, Ausbünstung befördernd, harn-treibend, emmenagogisch, Brust- und Niesmittel. — In Pulver, zehen bis dreißig Gran.

Tinctura Mari veri aetherea. (B*. O.)

Rx. Herbae Mari, Liquoris anodynini mineralis, singulorum unciam unam.

Alcoholis concentrati uncias tres.

Digere per dies quatuor temperatura depressa in vase tecto, saepius agitan-

do et filtra. Reizend, bei Lähmungen gerühmt und da anwendbar, wo der Auf-guß der Pflanze Effect erregt. — Gabe, vierzig Tropfen.

Aqua vulneraria s. styptica Clementina s. aromatica composita cum Acido acetico, Aqua del carcerato di Roma. (Fer. Fi.)

Rx. Succu Majoranae,
— Saniculae,
— Verbenae,
— Sedi majoris,
— Pimpinellae albae,
— Millefolii,
— Bryoniae,
singulorum uncias tres.

Mari uncias quatuor.

Salis culinaris,

Subcarbonatis Potassae,

singulorum uncias sex.

Cremoris Tartari uncias quatuor.

Aloës sesquunciam.

Aceti libram unam.

Post horas viginti quatuor digestio-nis destillent ad siccum, residuum pul- veratum producto adde, novae destilla- tionis subjice et sic ter repete.

Fi. Succu Saniculae, Verbenae, Beto-nicae, Sedi majoris, Millefolii, singulo-rum uncias septem, Mari, Serpylli, sin-gulorum uncias tres, Cremoris quatuor, Aloës unam, Aceti libram unam; pro- ductum tribus distillationibus obtentum per pulverem carbonis recens paratum filtra.

Gabe, bis zu einer halben Unze.

6) *Teucrium Creticum*, L.; Gretischer Samander; Polium de Crète (Gal.).

Gal. Wir. Be. M. Sp.

⊙ Eine Pflanze Creta's und Aegypten's. (Abp. Exot. p. 103. t. 102.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et summitates Teucree s. Poli Cre-tici s. Korismarini stoechadis facie) an; es besteht aus einem vierkantigen Stän-gel mit sitzenden, ganzen, lanzettförmigen Blättern und violetten, gestielten zu je drei in achselständigen Trauben vereinigten Blüthen. Es hat einen starken, gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen sehr bitteren Geschmack.

7) *Teucrium montanum*, L.; Bergpo-lei; Polium de montagne (Gal.).

Gal.

⊙ Eine Pflanze des südlichen Europa's. (Zorn Ic. pl. t. 362.)

Man wendet die Spigen (summitates Poli montani) an; sie bestehen aus weißfilzigen Zweigen mit lanzettförmigen, ganzen, an den Rändern eingerollten, un- ten filzigen Blättern und weißlichen ober gelblichen, fast sitzenden Blüthen, welche

fast eine unabhängige runde Traube bilden Sie haben einen sehr angenehmen Geruch und einen bitteren Geschmack.

3) *Teucrium Scordium*, L.; Knoblauchsgamander, Scordée d'eau, Echtenknolauch; Gamander (Eng.); Plany neb wodnj cesnek (B.); Scordio, Erba d'odor d'aglio (I.); Laegsurt (D.); Scordio (His.); Waterbock (Hel.); Czosnkowe ziele (Pol.); Escordio (Lus.); Gamander (Succ.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Pul. Gal. Galm. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. He. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

4) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Blackw. t. 475. Bull. t. 205. Plenck, t. 476. Hayne VIII. 3. Zorn Ic. pl. t. 36.)

• Man wendet das Kraut (herba Scordii s. Chamaedrys aquatica) an; es besteht aus einem behaarten, ästigen Stängel und eirunden; länglichen, sitzenden, gefleckten oder gezähnten Blättern. Gerieben hat es einen knoblauchartigen und balsamischen Geruch, welcher nach dem Trocknen weniger merklich ist und einen bitteren, scharfen und etwas styptischen Geschmack.

9) *Teucrium Scorodonia*, L.; falsches Scorbienkraut; Scordium faux (Gal.) Gal. Wir. G.

4) Eine Europäische Pflanze. (Bull. Herb. t. 301.)

Man wendet das Kraut (herba Scorodoniae s. Sabinae kraust herba Agrostis) an; es besteht aus gestielten, herzförmigen, gezähnten und gerunzelten Blättern.

Reizend, tonisch, Ausdünstung befördernd.

Conserva Scordii. (His.)

℞. Foliorum recentium Scordii

partem unam.

Contunde in mortario marmoreo, cum pistillo ligneo, addendo sensim

Sacchari pulverati partes duas.

Extractum Scordii. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae Scordii . . . libram unam.

Aquae fontanae . . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque, cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam consume. (Br. Pal. Wir.)

℞. Herbae Scordii . . . libras octo.

Digere per tres dies in alembico, destillando deinde uncias circiter duas abstraha, residuo triplum Aquae infunde, coquendo partes duas consume, clarifica et cola liquorem, ad electuarii consistentiam consume et huic non-

nisi tepido Aquam destillatam adde. (Sar.)

Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Aqua Scordii. (Br. Gal. Pal. Sar.)

℞. Herbae Scordii florescentis

partem unam.

Aquae . . . partes quatuor.

Destillet d'india pars et denuo supra novam herbam destilletur. (Sar.)

Gal. Herbae partes quinque et Aquae viginti; destillent partes decem; — Br. Herbae partem unam et Aquae tres; destillet dimidia pars; — Pal. Herbae partem unam, Aquae quatuor; destillet dimidium.

Gabe, eine bis drei Unzen.

Syrupus Scordii s. de Scordio. (Gal. Wir. Fi.)

℞. Herbae Scordii uncias quatuor.

Aquae bullientis . . . libram unam.

Infunde per noctem; exprime deinde, clarifica et in novem uncias colaturae solve

Sacchari albi . . . uncias sedecim.

Fiat syrupus. (Wir.)

℞. Herbae siccatae Scordii

unciam unam.

Aquae destillatae Scordii

libras duas.

Digere in balneo aquae per horas duas in vase tecto, cola, filtra et colaturae adde

Sacchari albi . . . duplum.

Liqua in balneo aquae et cola per pannum. (Gal. Fi.)

Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Infusio anthelmintico- incitans, *Infusum vermifugum*. (B.)

℞. Foliorum Scordii . . . semunciam.

Aquae . . . quantum sufficit ut unciae octo infusi obtineantur. Colaturae adde

Aetheris sulphurici semidrachmam.

Essigtwaise.

Mixtura anthelmintico- incitans, *Potio vermifuga*. (B.)

℞. Helminthochortos drachmas duas.

Foliorum Scordii . . . semunciam. Aquae . . . quantum sufficit ut unciae decem infusi obtineantur; colaturae adde

Aetheris sulphurici semidrachmam.

Syrupi Cinnamomi semunciam.

Allmältig zu nehmen.

Decoctum antisepticum. (Ca.)

℞. Foliorum Scordii,

— Alliariae,

— Marrubi albi,

singulorum uncias duas.

Aquae uncias quatuor.
 Coque et adde
 Oxy mellis scillitici semilibram.
 Aceti theriacalis unciam unam.
 Nitri drachmas tres.
 Reizend, bei fauligen Krankheiten mit
 beschwerlicher Expectoration empfohlen.

Fomentum aromaticum. (Au.)

℞. Herbae Scordii,
 Florum Chamomillae,
 singularum unciam unam.
 Aquae bullientis . . . libras tres.
 Coque parumper et adde colaturae
 Aquae Vitae camphoratae
 uncias quatuor.

Tinctura s. Essentia Scordii. (Br. Pal. Wir.)

℞. Herbae Scordii . . . uncias tres.
 Alcoholis uncias sedecim.
 Post tres dies digestionis colaturam
 infunde in
 Herbae Scordii . . . uncias duas.
 Macera denuo per aliquot tempus,
 exprime et filtra. (Pal. Wir.)
 Br. digerere jubet Scordii unciam unam
 in Alcoholis concentrati quatuor.

Reizend, für giftvibrig und Ausdün-
 sung befördernd gehalten. — Gabe, sechs-
 zig Tropfen.

Essentia alexipharmaca Stahl. (Br. Li. Pal. Wir. Ca. Sp.)

℞. Radicis Pimpinellae albae,
 — Vincetoxici,
 — Carlinae,
 singularum sesquiunciam.
 — Angelicae,
 — Imperatoriae,
 — Inulae,
 singularum unciam unam.

Herbae Scordii . . . uncias tres.
 Alcoholis libras duas cum dimidia.

Digere, exprime et filtra. (Br. Wir.)

Pal et Sp. Pimpinellae sesquiunciam,
 Vincetoxici tantidem, Carlinae semun-
 ciam, Angelicae, Imperatoriae, Inulae,
 singularum unciam unam; sed Sp.
 Scordii uncias sex et Alcoholis libras
 duas, Pal. Scordium omittens, Alcoho-
 lis libram unam indicat.

Die Formel von Ca. ist verstümmelt und
 wird daher nicht besonders angeführt.

℞. Radicis Angelicae,
 — Imperatoriae,
 — Inulae,
 singularum semunciam.
 — Carlinae . . . drachmas duas.
 — Vincetoxici,
 — Pimpinellae albae,
 singularum drachmas tres.
 Herbae Scordii . . . uncias duas.

Alcoholis libram unam.
 Post duos dies digestionis, blando
 calore, cola exprimendo.
 Reizend, tonisch, magenstärkend, blühungs-
 treibend, harntreibend und Ausdün-
 sung befördernd. — Gabe, vierzig bis fünfzig
 Tropfen.

Essentia alexipharmaca temperata Stahl. (Wir. Sp.)

℞. Radicis Pimpinellae albae,
 — Vincetoxici,
 singularum uncias tres.
 Herbae Scordii . . . uncias duas.
 Alcoholis libras tres.

Post sufficientem extractionem filtra,
 spiritus trientem destillando in balneo
 aquae abstrahere et reliquum serva. (Wir.)

℞. Tincturae Pimpinellae albae,
 — Vincetoxici,
 singularum unciam unam.
 — Scordii . . . uncias duas.

Misce. (Sp.)

Reizend, weniger kräftig als das vor-
 hergehende. — Gabe, vierzig bis sechzig
 Tropfen.

*Essentia de Scordio composita, Dia-
 scordium liquidum, Tinctura Scordii
 composita. (Sax. Wir. Vm.)*

℞. Herbae Scordii . . . uncias duas.
 Corticis Citri . . . unciam unam.
 Myrrhae electae,
 Radicis Gentianae,

singularum drachmas sex.
 — Angelicae,
 — Vincetoxici,
 — Levistici,
 — Zedoariae,
 — Contrayervae,
 — Tormentillae,
 — Valerianae,
 singularum semunciam.

Succini,

Ligni Aloës,

singularum drachmas tres.

Croci drachmas duas cum dimidia.

Florum Sambuci drachmas duas.

Opii drachmam unam.

Fiat a toto pulvis, cui infunde

Spiritus Juniperi . . . libras tres.

Digere blando calore, in vase clauso,
 et filtra. (Wir.)

℞. Herbae siccatae Scordii
 partem unam.

— Cardui benedicti
 partem dimidiam.

Radicis Angelicae
 partem quadrantem.

Alcoholis partes octo.

Post dies octo digestionis in vase te-
 cto, cola exprimendo et filtra. (Sax.)

℞. Foliorum Scordii partes quatuor.

Holozum Cardui benedicti
partes duas.

Radices recentis Angelicae
partem unam.

Aquae Vitae partes triginta duas.
Infunde frigide per plures dies, cola
exprimendo et filtra. (Pm.)

Reizend, giftwidrig, schmerzstillend und
magenstärkend. — Eine Unze enthält etwa
zwei Gran Opium.

Elizir balsamicum spirituosum Hoff-
manni. (Br. Wir. Sp.)

R. Herbae Scordii . unciam unam.
— Centaurii minoris,

Corticis Aurantiorum,
Myrrhae electae,
singulorum sesquiunciam.

Radices Zedoariae,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas tres.

Ligni Aloës . sesquidrachman-
Crocii . . . drachmam unam.

Succint . . . drachmas tres.
Alcoholis . . . sesquilibram.

Post sufficientem digestionem coia
exprimendo, filtra liquorem et adde

Olei Cardamomi,
— Caryophyllorum,
singulorum guttas decem,
dissolutas in

Alcoholis ammoniacalis uncia una.

Reizend, eheben als giftwidrig, antica-
tarrhalisch, magenstärkend gerühmt und be-
sonders von Hoffmann bei chronischen
Diarrhöen empfohlen. — Gabe, sechs-
zwei Tropfen, täglich zwei Mal.

Thalictrum.

Thalictrum flavum, L.; Wiesenraute;
heilblatt, Wiesenrautewurz; Pigamon ju-
ne, Rue des prés, Fausse rhubarbe,
Rhubarbe des pauvres (Gal.); Com-
mon meadow rue (Ang.); Kneppanden
(D.); Waterruid (Bel.); Wrzodowiec
(Pol.); Torraeackgraes (Suec.).
Br. Gal. Gen. Br. M. Sp.

♂ (Polyandria Polygynia, L.; Ra-
nunculaceae, J.) Eine in Europa auf Wie-
sen sehr gemeine Pflanze. (Zorn 1c. pl.
t. 406.)

Man wendet die Wurzel (radix Thali-
ctri flavi s. magni s. Rhabarbari pau-
perum) an; sie ist frisch hellbraun, nach
dem Trocknen dunkelbraun, inwendig gelb
und voll eines süßlichen, hintennach bitter
und scharf schmeckenden Saftes. Speichel,
Excremente und Urin werden dadurch gelb
gefärbt.

Purgirend. — Gabe, eine bis zwei
Unzen.

Thapsia.

Thapsia Asclepium, L.; Schmalblättrige
Thapsie; Thapsie Asclepien (Gal.); Nar-
row leav'd carrot (Ang.); Tapsia, Co-
mino rostico (His.).

His.
♀ (Pentandria Digynia, L.; Umbel-
liferae, J.) Eine Pflanze des mittägigen
Europa's. (Mor. Hist. t. 18.)

Wurzel und Samen, welche man an-
wendet, sind reizend und gelten für auf-
lösend.

Oleum Thapsiae antirheumaticum, (His.)

R. Radicis Thapsiae,
Foliorum Rorismarini,
Viui rubri,
singulorum libram unam.

Olei Olivarum . libras quatuor.
Post quatuor dies digestionis coque
ad consumptionem humidi usque et
cola.

Thea.

Thea viridis, L.; Thee; Thee (B.
Bel. Suec.); Tea (Ang.); Chu (Ar. G.
Duk. Pe.); The (D.); Te (His. I. Lus.);
Tjao (Ja.); Fjcha (R.).

Br. Fer. Gal. His. A. Be. Br. Fi. G.
M. Sp. Z.

Ein Strauch (Polyandria Monogynia,
L.; Atrantiaceae, J.) China's. (Blackw.
t. 352 et 51. Plenck t. 427 et 26. Hayne
VII. t. 23 29. 27. Düss. off. Pl. VIII.
t. 2. 1. 3. Bert. Bild. I. 46. f. 2. Fl.
méd. VI. 339.)

Die Blätter, welche man anwendet, sind
grün, etwas glänzend, hart, glatt, eirund-
lanzettförmig oder elliptisch, am obern Theile
mit Sägezähnen versehen, am Grunde ganz,
mit mittelmäßig langen Stielen, getrocknet
und eingerollt, entweder der Länge nach
oder mehr auf sich selbst; bisweilen, wenn
sie geschnitten sind, zeigen sie sich in klei-
nen, länglichen oder runden, grünen,
runzligen Stücken von sehr angeneh-
mem, gewürzhaftem Geruch und einem
bittern, etwas kryptischen Geschmack.

Im Handel kommen viele Sorten Thee
vor, von denen die vorzüglichsten den Na-
men Papsan, Schulsang, Persthee, poudre
à canon, sot-chaoon oder Bouy und
Pekaothee führen; die beiden letztern sind
weniger geschätzt und kommen von Thea
Bohea, L., welche man als eine bloße Wa-
rietät von viridis betrachtet.

Reizend, Ausdünstung befördernd. —
Gabe, eine oder zwei Drachmen auf die
Pinte kochendes Wasser.

Thlaspi.

Wir führen hier folgende drei Arten die-

ser Gattung, welche in den Pharmacopöden angezeigt sind, an:

1) *Thlaspi campestre*, L.; Feldtäfelkraut; *Thlaspi champêtre* (Gal.).

Gal.

♂ (*Tetradynamia Siliculosa*, L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. Herb. t. 409.)

Man wendet den Saamen (semen *Thlaspeos*) an, er ist rundlich, platt, dunkelbrun und von scharfem, brennendem Geschmack.

2) *Thlaspi arvense*, L.; Bauernsenf, Aertstäfelkraut; *Thlaspi des champs* (Gal.); Penny cress (Ang.); Penzjek aneb sedlska horvice (B.); Pengeurt (D.); Wilde mosterd (Bel.); Penninge graes (Suec.).

Br. Gal. Wir. Be. Br. M. Sp. Z.

Man wendet den Saamen (semen *Thlaspeos*) an; er ist sehr klein, rundlich und etwas platt und hat einen starken, knoblauchartigen Geruch und einen etwas scharfen und bitteren Geschmack.

3) *Thlaspi Bursa pastoris*, L.; Lächelkraut, Taschenkraut, Hirtentafel, Hirtentäfelkraut; Bourse à pasteur (Gal.); Shepherd's burse (Ang.); Bolsa de pastor (His.); Bearsjes kruid (Bel.).

Br. Gal. Gen. His. Wir. Be. M. Sp.

⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 5. Plenk t. 516. Zorn Ic. pl. t. 138.)

Man wendet das Kraut (*herba Bursae pastoris* s. *Cancri* s. *Sanguinariae*) an; es besteht aus einem Büschel fiederförmiger Wurzelblätter und hat einen faden, etwas kohlsartigen Geruch und einen scharfen, abstringirenden Geschmack.

Ein schwach abstringirendes Mittel, welches nur wenig in Gebrauch ist.

Thymus.

Unter den Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöden besonders folgende vier angeführt:

1) *Thymus Alpinus*, L.; Alpenthymian, Alpenquendel; Thym des Alpes (Gal.); Alpine thyme (Ang.).

Br.

2) (*Didynamia Gymnospermia*, L.; Labiatae, J.) Eine auf den Alpen wachsende Pflanze. (Jacq. Flor. Austr. I. t. 97.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Clinopodii montani*) an; es besteht aus einem rundlichen, ästigen Stängel mit gestielten, rundlichen, stumpfen, etwas sägezahnigen und höhlen Blättern und hat ei-

nen sehr angenehmen, gewürzhaften Geruch und Geschmack.

2) *Thymus mastichina*, L.; Mastichthymian; Thym cilié, Marjolaine sauvage (Gal.); Mastic thyme (Ang.); Majorana silvestre (His.).

His.

♂ Eine Pflanze Spanien's und Italien's. (Blackw. Herb. t. 134.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Mastichinae Gallorum* s. *Mari vulgaris*) an; es besteht aus einem walzigen Stängel mit kurzgestielten, eirunden, ganz kurz sägezahnigen, auf beiden Seiten glatten Blättern und wirtelförmig gestellten weißen Blüten. Es hat einen angenehmen Geruch und Geschmack.

3) *Thymus vulgaris*, L.; gemeiner Thymian; Thym commun (Gal.); Garden thyme (Ang.); Wlaska neb kzjmska materj dauska (B.); Thymian (D.); Tomillo (His.); Gemeen thym (Bel.); Timo (I.); Tymian, Szmer wloski (Pol.); Tomilho (Lus.); Timjan (Suec.).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. G. M. Pid. Sp. Z.

♂ Eine Pflanze des südlichen Europa's. (Blackw. t. 221. Plenk t. 489. Zorn Ic. pl. t. 458.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba et flores Thymi vulgaris* s. *hortensis*) an; es besteht aus einem walzigen, wenig ästigen, sehr behaarten Stängel, an welchem kleine gegenüberstehende, stiellose, an den Rändern etwas zurückgerollte, schmale, fast stumpfe, unten etwas behaarte, oben grau-grüne Blätter sitzen; die purpurrothen, gebrängte, von Deckblättern begleitete Köpfe oder Köhren an der Spitze der Zweige bildenden Blüten haben einen angenehmen, starken, gewürzhaften Geruch und einen brennenden, gewürzhaften Geschmack.

4) *Thymus Serpyllum*, L.; Quendel, Feldkümmel, wilder Thymian; Serpolet (Gal.); Mother of thyme (Ang.); Materj dauska (B.); Wild thymian (D.); Serpol (His.); Wild thym (Bel.); Sermolina, serpillio (I.); Maciezanka (Pol.); Serpao (Lus.); Schadownik (R.); Backtimian (Suec.).

A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Pul. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. Wür. WW. Be. Br. G. M. Pid. Sp. Z.

♂ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Blackw. t. 418. Plenk t. 490. Fl. inéd. VI. 326.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Serpylli) an; es besteht aus einem ästigen, etwas behaarten Stängel mit kleinen, fast sitzenden, an den Rändern behaarten, eitrunden oder lanzettförmigen Blättern und sehr kurzen, achselständigen, gestielten, büschelweise stehenden Blüten, welche in sehr kurze Ähren und oft auch in eine Art endständigen Kopf vereinigt sind. Der Geruch ist angenehm, der Geschmack bitter und balsamisch.

Infusum Thymi. (GalM.)

℞. Summitatum Thymi,
Liquiritiæ rasæ,
singulorum drachmas duas.
Aquæ bullientis quantum sufficit
ut colaturæ octarius (litre) obtineatur.

Oleum Thymi aethereum s. essentielle,
Aethereolum Thymi. (Ba. Bor4. Br.
D. Gal. Han. HassP. Pal. Sar. Sax.)

℞. Herbae florecentis Thymi
partes quinque.
Aquæ . . . partes septem.
Destillant. (Gal.)

D. Florum partem unam et Aquæ
sex; — Han. HassP. et Sax. Florum
unam et octo Aquæ; — Ba. Florum
unam et novem Aquæ.

℞. Herbae florecentis Thymi
partes viginti quinque.
Aquæ partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies fiat destillatio. — Ga-
be, zwei bis vier Tropfen.

Bor4. Oleum venale. Pond. spec. =
0, 902.

Oleum Serpylli aethereum, Aethereo-
leum Serpylli. (A. Ba. Br. Han. Pal.
Sax.)

℞. Herbae florecentis Serpylli
partem unam.
Aquæ puræ . . . partes octo.
Destillant. (Han. Sax.)

Nov. Serpylli partem unam et Aquæ
viam; — A. Serpylli unam et Aquæ
duodecim.

℞. Herbae florecentis Serpylli
partes viginti quinque.
Aquæ partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies macerationis, fiat de-
stillatio. (Br. Pal.)

Aqua Thymi. (Gal. Wür.)

℞. Herbae florecentis Thymi
partes quinque.
Aquæ . . . partes viginti.
Destillant partes decem. (Gal.)
Wür. Herbae partem unam et Aquæ
sex. — Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Serpylli. (Sar.)

℞. Herbae florecentis Serpylli
partem unam.
Aquæ . . . partes quatuor.
Destillata parte dimidia denuo de-
stillent supra novam herbam.

Spiritus s. Alcohol Thymi. (Br.)

℞. Herbae florecentis Thymi libram
unam et uncias duas.
Aquæ Vitæ . . . libras octo.
Destillent tres quadrantes. — Gabe,
eine halbe bis eine Drachme.

Spiritus aromaticus. (Li.)

℞. Herbae Thymi . . . uncias tres.
— Mari . . . unciam unam.
Radiciæ Zedoariæ,
Carvi, singulorum uncias duas.
Alcoholis . . . uncias octo.
Post horas viginti quatuor macera-
tionis adde

Aquæ . . . libras octo.
Destillent lente librae octo.

Spiritus Serpylli. (A. Bor. Bor4. Br.
D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Pal.
Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. Pid. Sw.)

℞. Herbae florecentis Serpylli
partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post tres dies destillet dimidia pars.
(Bor. Br. Han. Hass. Pal. Pol. Sax.
Wir. Pid.)

Li. Herbae partem unam et sex Al-
coholis; destillet dimidia pars; — D.
et Ful. Herbae partem unam et sex
Alcoholis; destillent trientes duo et
denuo supra partem novæ herbae di-
midiam destilletur; — Sar. Herbae
sequilibrum et decem Alcoholis; pro-
ductum supra uncias tres novæ herbae
denuo destilletur; — A. Herbae par-
tem unam et quatuor Alcoholis; de-
nuo supra novam herbam destilletur.

℞. Herbae recentis Serpylli
partem unam.
Alcoholis (0,910)
partes quatuor cum dimidia.

Aquæ . . . partes sex.
Post horas viginti quatuor destillent
partes quatuor. (0, 913). (A.)

Vm. Serpylli partem unam, Aquæ
Vitæ quatuor, Aquæ duodecim; de-
stillent partes tres cum dimidia; —
Sw. Herbae partes duodecim, Alcoho-
lis sex et Aquæ duas; destillent partes
sex; productum supra partes duodecim
Herbae recentis, cum Aquæ duabus
infunde et destillando partes sex ab-
strahe; — Bor4. HassP. Serpylli li-
bram unam, Spiritus rectificati qua-
tuor, Aquæ quantum satis; post ma-

cerationem per viginti quatuor horas destillent librae quatuor.

Aqua benedicta Serpylli s. Serpylli composita. (Sar. Wir. Sp.)

℞. Herbae florescentis Serpylli manipulos quatuor.

Florum Chamomillae,
Summitatum Saturejae,
— Thymi,
singulorum manipulum unum.

Vini libras sex.

Post tres dies macerationis destillet dimidium; in producto infunde

Calami aromatici,
Cassiae lignae,
Cinnamomi,
Macedis, singulorum semunciam.

Post horas viginti quatuor destillent ad siccum. (Sar.)

℞. Herbae florescentis Serpylli libras duas,

— — Saturejae,
— — Thymi,

Florum Chamomillae,
singulorum uncias duas.

Cinnamomi uncias tres.

Macedis semunciam.

Vini albi libras octodecim.

Stent in digestionem per duos dies, tunc lente librae octo destillent. (Wir.)

℞. Radicis Zedoariae,

— Galangae,
singularum drachmam unam.

— Paeoniae sesquiniunciam.

Herbae Serpylli manipulos sex.
— Poeniculi manipulos quatuor.

— Verbenae,
— Melissae,

Florum Tiliae,
— Liliorum Convallium,

— Lavandulae,
— Rorismarini,
singulorum manipulos duos.

Cubebarum drachmam unam.

Cinnamomi semidrachmam.

Macedis,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas duas.

Visci querui sesquiniunciam.

Vini generosi uncias centum nonaginta duas.

Destillent. (Sp.)
Kopfschmerz lindernd, herzstärkend, bluttreibend, Menstruation befördernd. — Gabe, eine halbe bis eine Unze.

T i l i a .

Tilia Europaea, L.; Eide; Tilleul (Gal.); Limetree (Ang.); Ljpa (B.);

Lind (D. Suec.); Linde (Bel.); Tilio (His.); Tiglio (I.); Lipo (Pol.).

Ams. An. Ba. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. HaasP. His. O. Pal. Sax. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.

Ein Baum (Polyandria Monogynia, L.; Tiliaceae, J.), welcher in ganz Europa wächst. (Hayne III. 47. 48. Blackw. t. 469. Plenck t. 424. Düss. off. Pl. IV. t. 18. Bert. Bild. V. 68. f. 1. Zorn Ic. pl. t. 287.)

Man wendet die Blüten (flores Tiliae) an; sie sind gelblich und haben einen sehr angenehmen, beim Trocknen sich größtentheils verterkenden Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack.

Krampfstillend, schwach die Ausdünstung befördernd, besonders wenn viel wässriges und sehr warmes Schmelz genommen wird.

Conserva Florum Tiliae. (Sar.)

℞. Florum Tiliae partem unam.
Sacchari ad plumam cocti partes tres.

Serva.

Infusum Tiliae. (Gal. GalM. ParC. Ra.)

℞. Florum Tiliae drachmas duas.

Aquae bullientis libras duas.

Infunde et cola. (GalM. Ra.)

℞. Infusi Florum Tiliae libras duas.

Aquae Florum Aurantiorum uncias duas.

Misce. (Ra.)

℞. Florum Tiliae drachmas duas.

Aquae bullientis libras duas.

Post infusionem per horae quadrantem cola et colaturae adde

Syrupi Althaeae unciam unam.

Misce bene. (Gal.)

ParC. Florum, Liquiritiae, singulorum drachmas duas et Aquae bullientis octarium unum.

Schwach krampfstillend. Gemeinlich setzt man zum ersten dieser Aufgüsse etwas Sauerkonig oder Syrupus tartaricus und versüßt ihn mit Gummitrup, bisweilen auch mit syrupus diacodion. Der zweite wird von Chausfier bei nervösen Affectionen mit hysterischem Krampf empfohlen. Ost setzt man zwei Drachmen liq. Hoffm. zu. Beide müssen heiß genommen werden.

Aqua Tiliae, Aqua Florum Tiliae. (Ful. Gal. Gen. O. Pal. Sar. Sax. Wür. Fi. Sw.)

℞. Florum Tiliae partes duas.

Aquae quantum sufficit.

Destillent partes viginti. (Sw.)

Pal. Florum partem unam et Aquae tres; destillet pars una cum dimidia;

— Gal. et Sar. Florum partem unam et Aquae quatuor; destillet dimidia

partes; — Wür. Florum partem unam et Aquae sex; — Sax. Florum partem unam et Aquae viginti; destillent trientes duo; — O. Florum partem unam et Aquae triginta; destillent partes viginti; — Gen. Florum partes quatuor et Aquae quantum sufficit; destillent partes sex; — Fi. Florum tres, Aquae quindecim; destillent partes sex.

R. Florum Tiliae . . . partes tres, Aquae . . . partes duodecim. Floribus in saccum cucurbitae medio ita suspensum ut aquam non attingat immisis, destillent absque bullitione aquae, partes sex.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

T o r m e n t i l l a .

Tormentilla erecta, L.; Tormentillwurzel, Blutkraut, Feigwarzkrout, Siebenschingerkraut; Tormentille (Gal.); Tormentil (Ang. Bel. D.); Natrzrnjk, Trzene korenj (B.); Tormentilla (His. I. Lus.); Korze ziele pepawy (Pal.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be Br. C. Fi. G. M. Par. Sp. Z.

4 (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, J.) Eine Pflanze Europa's (Hayne II. 48. Blackw. t. 445. Plenck. t. 411. Schk. t. 136. Ditts. off. Ph. VI. t. 2. Zorn Io. pl. t. 358.)

Man wendet die Wurzel (radix Tormentillae sylvestris s. Heptaphylli s. Septifolii) an; sie ist knotig, fingerdick, länglich, mit zahlreichen Fasern besetzt, außen rotbraun, innen bläulich oder gelblichbraun, bisweilen gestreift und geruchlos; ihr Geschmack ist stark abstringierend und etwas bitter.

Abstringierend. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis eine Drachme.

Pulvis Tormentillae compositus s. adstringens. (Gen.)

R. Terrae sigillatae . . . uncias sex.
Cinnamomi . . . uncias quatuor.
Tormentillae,
Gummi Arabici,

singulorum uncias tres.

Piperis longi . . . semunciam.

Notwendigenfalls setzt man den acht und vierzigsten Theil Opium zu.

Extractum Tormentillae. (A. Ams. An. B. Ba. Br. His. Li. Lus. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. Fi.)

R. Radicis Tormentillae . . . libram unam.

Aquae fontanae . . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque; cola ex-

primendo et colaturam ad aptam consistentiam consume. (Br. Pal. Wir.)

Sar. Liquoris coquendo tertiam partem consumere, colare et evaporando inspissare.

R. Radicis Tormentillae . . . partem unam.

Aquae communis . . . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, tunc liquore commixti, per horas viginti quatuor sepositi ad aptam consistentiam evaporent. (An. Li.)

B. Horas viginti quatuor digestionis et duas bullitionis cum Aquae partibus decem, deinde novam bullitionem cum Aquae partibus octo; — Ams. Coctionem primam cum viginti, secundam cum quindecim partibus Aquae, quae vice ad dimidii remanentiam; — His. Digestionis horas viginti quatuor et duas bullitionis primum oim partibus decem, deinde cum nova quantitate Aquae ad dimidii remanentiam.

R. Radicis Tormentillae quantum vis. Aquae . . . quantum sufficit.

Radice pluribus ebullitionibus sequentibus penitus extracta, liquore commixti post decanthationem ad extracti consistentiam evaporent. (A.)

Wür. solum unam bullitionem per horas duas indicat; — Ba. Radicis partem unam post horas viginti quatuor macerationis coquere jubet primum cum octo, deinde cum quatuor partibus Aquae; — RC. Radicis quantum vis, Aquae octuplum ad dimidium decoquere, exprimere, filtrare et ad mellis spissioris consistentiam redgere; — Fi. duas bullitiones, primam cum Aquae sextuplo, secundam cum nova Aqua, donec decoctum superis expers evadat.

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pilulae adstringentes. (Ca.)

R. Extracti Tormentillae . . . drachmam unam.
Mastichis . . . drachmas duas.
Gummi Arabici . . . semunciam.
Terebinthinae coctae . . . quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. — Von Quartin am Ende von Conorrhoe empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück Morgens und Abends.

Aqua Tormentillae. (Pal.)

R. Radicis Tormentillae . . . partem unam.

Aquae . . . partes duas.

Destillet pars una cum dimidia.

Essentia traumatica. (Wir. Sp.)

℞. Radicis Tormentillae,
Herbae Saniculae,
singulorum semunciam.
— Roris Solis,
Florum Hyperici,
— Rosarum rubrarum,
singulorum drachmas duas.
Sanguinis Draconis,
Murmiae Aegyptiacae,
Catechu,
Myrrhae,

singulorum drachmas tres.
Santali rubri . drachmas duas.
Nucis moschatae drachmam unam.
Alcoholis . . . uncias sedecim.

Post tres dies digestionis blando calore, exprime et filtra. (Wir.)

℞. Radicis Tormentillae semunciam.
Florum Rosarum rubrarum,
— Hyperici,
singulorum drachmas duas.
Ligni Santali rubri,
Murmiae Aegyptiacae,
Sanguinis Draconis,
singulorum unciam unam.

Catechu,
Myrrhae, singulorum semunciam.
Nucis moschatae drachmam unam.
Alcoholis . . . uncias viginti.

Post sufficientem digestionem filtra. (Sp.)

Abstringend, zur Stillung von innern Blutflüssen und Diarrhöen empfohlen. — Gabe, fünfzig bis sechzig Tropfen.

Tinctura Tormentillae. (Bel.)

℞. Radicis Tormentillae . . . partem unam.
Alcoholis (15°) . . . partes octo.
Macera frigida per dies sex, colatura exprimendo et filtra. — Abstringend.

Decoctum Radicis Tormentillae. (B*.)

℞. Radicis Tormentillae semunciam.
Aqueae fontanae . . . sesquilibram.
Coque et cola. — Abstringend. — Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßffel.

Decoctum adstringens. (Sar. Fi. Sw. Vm.)

℞. Radicis Tormentillae,
Corticis Quercus,
— Granati,
singulorum drachmas duas.

Aqueae,
Lactis, singulorum libram unam.

Coque per horae quadrantem, sub finem addendo

Cinnamomi . . drachmas duas,
Postrefrigerationem cola. (Fi. Sw. Vm.)

℞. Radicis Tormentillae,
Florum Granati siccatorum,
Corticis Granati,
singulorum semunciam.

Chinae unciam unam.

Aqueae fontanae quantum sufficit ut post ebullitionem librae duae colaturae obtineantur. (Sar.)

Bei Diarrhöe und Blennorrhöe empfohlen. — Gabe, zwei Unzen, drei oder vier Mal täglich. — Wenn man den Zimmt wegläßt, so kann die Abkochung auch als Klystir oder Einspritzung angewendet werden.

Tisana adstringens. (Ca. Pic. Sp.)

℞. Radicis Tormentillae . . . drachmas sex.
Aqueae fontanae libras duodecim.
Coque per semihoram, in fine addendo
Radicis Consolidae majoris . . . drachmas sex.
— Liquiritiae . . . semunciam.

Cola. (Sp.)

Pic. Tormentillae uncias tres, Aqueae libras triginta quatuor, Consolidae uncias tres et Liquiritiae uncias duas.

℞. Radicis Tormentillae,
— Graminis,
singulorum semunciam.

Corticis Granati,
Berberidis,
Rhois, singulorum drachmas duas.
Rasurae Cornu Cervi . . . drachmas tres.

Aqueae octarios tres.

Decoque ad duorum octariorum remanentiam et colaturae adde

Mellis uncias duas.
Cola. (Pic.)

℞. Aqueae bullientis . . . libras duas.
Petalarum siccorum Rosarum rubrarum . . . semunciam.
Radicis Tormentillae,
— Bistortae,
singulorum unciam unam.

Coque radices, petala solum infundendo, cola et colaturae adde

Syrupi Granati . . . sesquiunciam.
— Gummi . . . unciam unam.

Acidi sulphurici tenuis . . . guttas viginti.

Misce. (Ca.)

Gargarisma adstringens. (Sa.)

℞. Radicis Tormentillae uncias duas.
Aqueae quantum sufficit

ut post semihoram bullitionis colaturae libra una obtineatur, cui adde

Mellis rosati . . . sesquiunciam.
Spiritus Sulphuris per campanam . . . guttas decem.

Tragacantha.

Tragacanthae Gummi; Τραγάκανθα; Traganth, Tragant; Gomme adragant

(Gal.); Tragant (Bel. D.); Gom of goatstorn, Tragacanth (Ang.); Kasira, Samraghulkatad (Ar.); Kattira (Duk. Hin.); Tragacanto; Alquitira (His.); Dragante (I.); Guma dragant (Pol.); Alcatraria (Lus.); Vadomocottay pisin (Tam.).

Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Penn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par. Pid. Sp. Z.

In bünnen, gebrehten und wurmförmigen Fäden oder in zusammengerohten Fasern. Es ist graulichweiß, undurchsichtig, etwas zähe, schwer zu pulvern, ohne Geruch und von einem faden und schleimigen Geschmack.

Es stieft von mehreren Arten Astragalus, wie A. verus, Otho, Voy. d. Pemp. Othom. t. 44. Düss. off. Pl. XL t. 256.; A. gummifer, Lab., und A. Gresticus, L., Bert. Bild. I. 99. f. 2., welche sämtlich im Orient wachsen, aus.

Es besteht, nach Suibourt, aus einer in Wasser löslichen, aber ganz vom Arabischen Gummi verschiedenen und noch einer andern unlöslichen Substanz.

Man wendet es fast nur an, um Pulver mit Wasser zu mischen, oder manchen Präparaten die Form zu geben.

Pulvis mucilaginosus s. Tragacanthae compositus. (Gen. Lon. LonN. C.)

℞. Gummi Tragacanthae semunciam, Amyli, Sacchari albi, singulorum drachmas duas. Divide in partes octo. (Gen.)

℞. Gummi Tragacanthae, — Arabici, Amyli, singulorum sesquiunciam. Sacchari unciās tres. Fiat pulvis. (Lon. LonN. C.)

Mucilago Astragali Tragacanthae s. Gummi Tragacanthae s. Tragacanthae. (A. Ams. An. Ba. Bel. Du. Ed. Ful. HassP. Li. Lus. Sar. Sax. Br. C. Fi. Sw. Vm.)

℞. Gummi Tragacanthae partem unam. Aquae frigidae partes octo. Digere per horas duodecim, tere et cola. (Ful. Lus.)

Li. Aquae partes duodecim; — C. viginti; — D. triginta duas; — An. triginta sex; — Ba. et Sax. sexaginta; — Sw. et Vm. sexaginta duas; — A. ducentas quadraginta; — Sar. quantum sufficit; — HassP. Gummi unam, Aquae quadraginta octo.

℞. Gummi Tragacanthae partem unam.

Aquae hullientis partes quatuordecim. Contere. (B. Bel.)

Ams. Aquae partes sedecim; — Ed. triginta duas; — Br. quantum sufficit; — Fi. Tragacanthae drachmas duas, Aquae tepidae unciās tres cum dimidia.

Potio gummosa. (Sp.)

℞. Gummi Tragacanthae grana decem. Aquae unciās quatuor. Solutioni adde Syrupi Sacchari unciām unam. Solutio mucilaginoso. (Sw.)

℞. Mucilaginis Gummi Tragacanthae unciās duas ad tres. Aquae bullientis libram unam. Syrupi Althaeae unciām unam. Gabe, drei bis vier Unzen, täglich mehrmals, bei Husten, Dysurie, Nierenentzündung, Gonorrhöe.

Liquor ophthalmicus anodynus. (Pal.)

℞. Gummi Tragacanthae drachmas duas. Mucilaginis Seminum Paylli drachmas tres. Aquae Rosarum, — Plantaginis, singularium quantum sufficit ut fiat liquor mediocris consistentiae.

Potio oleosa. (Ra.)

℞. Olei Amygdalarum dulcium semunciam. Gummi Tragacanthae grana decem. Aquae unciās duas. Syrupi Sacchari unciām unam. Misc.

℞. Olei Amygdalarum dulcium, Syrupi Sacchari, singulorum sesquiunciam. Gummi Tragacanthae grana quindecim. Aquae Florum Aurantiorum drachmas quatuor. — Lactuae unciās quatuor. Misc.

Electuarium diatragacanthae s. Gummi Tragacanthae. (Sp.)

℞. Aquae Paeoniae unciās duas, — Menthae, — Melissae, Syrupi Rhoeados, Sacchari pulverati, singulorum unciām unam Gummi Tragacanthae pulverati drachmas duas.

Zur Stillung von Kopfschmerzen bei Kindern.

Linctus leniens, Looch simplex. (Gal.
Ra. Sm. Sp.)

℞. Gummi Tragacanthae grana sex.
Emulsionis Amygdalarum dulcium
uncias quatuor.

Syrupi Sacchari unciam unam.
Contere. (Ra.)

℞. Gummi Tragacanthae
semidrachmam.
Sacchari pulverati unciam unam.
Infusi Rhoeados unciæ sex.
Contere et adde
Aquæ Florum Aurantiorum
unciæ unam.

Misce bene. (Sm.)

℞. Gummi Tragacanthæ pulverati
grana sedecim.
Olei Amygdalarum dulcium
semunciam.
Sacchari puri unciam unam.
Aquæ puræ unciæ tres.
— Florum Aurantiorum
drachmas duas.

Misce triturando. (Gal.)

℞. Gummi Tragacanthæ
grana sedecim.
Tisanæ communis semunciam.
Fiat mucilago, cui, agitando, conti-
nue, adde

Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Althæae,
singulorum unciam unam.
Tisanæ pectoralis
unciæ tres cum dimidia.

Misce bene. (Sp.)

Looch crocatum s. viride. (Gal. Vm.)

℞. Syrapi Violarum unciam unam.
Tincturæ Croci grana viginti.
Aquæ communis unciæ quatuor.
Pistaciarum siccarum
drachmas sex.

Fiat emulsio, quam sensim infunde
in mixturam e

Pulyeris Gummi Tragacanthæ
granis sedecim.
Olei Amygdalarum dulcium
semuncia.

Diu tritura, sub finem addendo
Aquæ Florum Aurantiorum
drachmas duas.

Misce bene. (Gal.)

℞. Croci grana sex.
Aquæ fervidæ quantum sufficit
ut infusi unciæ sex obtineantur; cola
exprimendo et adde

Gummi Tragacanthæ
grana sedecim.
Olei Amygdalarum dulcium
semunciam.

Amygdalas excorticatas no. 15.
Syrupi Violarum sesquunciam.
Fiat emulsio. (Vm.)

*Species diatragacanthæ præparatæ, Pul-
vis gummosus s. Specierum diatragacan-
thæ s. Tragacanthæ compositus.* (Ams.
An. B. Ba. St. Fuh Li. Lon. LonN.
Lus. O. Pal. Sar Wir. Fi. Pid. Sp. Vm.)

℞. Gummi Tragacanthæ,
— Arabici,
Sacchari albi,
singulorum partes æquales.

Fiat pulvis. (B. Bel.)

℞. Gummi Tragacanthæ,
Radici Althææ,
Sacchari albi,
singulorum unciæ duas.

Fiat pulvis. (Pid.)

℞. Gummi Tragacanthæ,
— Arabici,
Amyli, singulorum unciam unam,
Sacchari albi unciæ duas.

Fiat pulvis. (Ams. Lon. Lus.)
LonN. Cujusque trium priorum sub-
stantiarum sesquunciam, Sacchari un-
ciæ tres.

℞. Gummi Arabici unciæ duas.

— Tragacanthæ,
Radici Liquiritiæ,
singulorum semunciam,
Sacchari albi unciæ duas.

Fiat pulvis. (O.)

℞. Gummi Tragacanthæ
unciæ unam,
— Arabici, semunciam,
Amyli drachmas duas.

Liquiritiæ drachmam unam.
Sacchari albi sesquunciam.
Fiat pulvis. (An.)

Sar. Gummi Tragacanthæ unciam
unam, Amyli, Liquiritiæ, singulorum
drachmas duas, Gummi Arabici drach-
mas quinque et si necesse videtur drach-
mæ cuique pulveris addere Seminum
Papaveris albi grana decem et Semi-
num Cucumeris tantidem; — Li. Gum-
mi Tragacanthæ unciæ duas, Gummi
Arabici unam, Liquiritiæ et Amyli,
singulorum semunciam; — Fi. Gum-
mi Tragacanthæ unciæ duas, Gummi
Arabici unam, Amyli, Radici Liqui-
ritiæ, singulorum drachmas sex, Sac-
chari albi unciæ tres.

℞. Sacchari crystallisati flavi
drachmas duas.

Radici Althææ,
Gummi Tragacanthæ,
Amyli,

singulorum drachmam unam.

Olei essentialis Anisi guttas sex.
Misce. (Ful.)

℞. Radici Liquiritiæ
partem dimidiam.
Amyli partem unam.
Amygdalarum dulcium excortica-
tarum,

- Gummi Arabici,
singulorum partes tres.
— Tragacanthae
partes quatuor cum dimidia.
Sacchari crystallisati
partes septem cum dimidia.
Fiat pulvis. (Vm.)
R. Pulveris Gummi Tragacanthae,
— Arabici,
— Saochari albi,
singulorum partes duas.
— Liquiritiae partem unam.
Misce. (Sa.)
R. Gummi Tragacanthae uncias duas.
— Arabici drachmas decem.
Amyli semunciam.
Liquiritiae drachmas duas.
Fiat pulvis. (Br. Wir. Sp.)
R. Gummi Tragacanthae uncias duas.
— Arabici drachmas decem.
Amyli semunciam.
Liquiritiae drachmas duas.
Quatuor Seminum frigidorum ma-
jorum,
singulorum drachmas duas.
Seminum Papaveris drachmas tres.
Fiat pulvis. (Pal.)
Gabe, zwei Scrupel. für einen Erwach-
senen.
Bolus pectoralis. (Sa.)
R. Specierum diatragacanthae
scrupulum unum.
Cetacei semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Bolus pectoralis adstringens. (Sa.)
R. Specierum diatragacanthae,
Electuarii Scordii,
singulorum semidrachmam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.
Tabellae diatragacanthae s. gummosae.
(Sar.)
R. Specierum diatragacanthae
sesquunciam.
Sacchari albi libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiant tabellae.
Trochisci bechici rubri. (Pal. Wir.)
R. Specierum diatragacanthae,
Boli Armenae,
singulorum unciam unam.
Sacchari albi libram unam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae
quantum sufficit.
Fiant trochisci.
Pulvis anonymus. (Wir.)
R. Seminum Papaveris albi
drachmas duas.
— Portulaccae,

- Seminum Cydoniorum,
— Malvae
— Gossypii,
singulorum sesquidrachmam.
— Ciceris . semidrachmam.
Cinnamomi,
Gummi Tragacanthae,
Amyli, singulorum drachmas duas.
Succi Hypocistidis,
Boli Armenae,
Cornu Cervi usti,
Rasurae Eboris,
singulorum semidrachmam.
Sacchari crystallisati uncias sex.
Misce ut fiat pulvis.
Gabe, eine bis zwei Drachmen bei alten
Katarrhen.

Tragopogon.

Tragopogon pratense, L.; Wodsbart,
Biesenwodbart; Salsifis, Barbe de bouc
(Gal.); Salseli (Ang.); Salsifi (His.);
Salsifica (I.); Sersifim (Lus.).
Br. Fer. Gal. Wir.
♂ (Syngenesia Polygamia Aequalis,
L.; Synterreae, Cass.) Eine in Europa
liberal auf Wiesen wachsende Pflanze.
(Bull. t. 209. Schk. t. 214. Plenck t.
589. Zorn Ic. pl. t. 179.)
Man wendet die Wurzel (radix Trago-
pogi s. Harbae hirci) an; sie ist lang,
walgig und weißlich, und hat einen süßen
Geschmack.
Statt ihrer nimmt man oft die voh
Tragopogon porrifolius, L. (Oed. Fl.
Dan. t. 797), porreblättriger Wodsbart;
Salsifis cultivé, Salsifis blanc.
Sie kommt bisweilen mit zu Brustab-
schwungen,

Trapa.

Trapa natans, L.; Wasserfuß; Macre
flotante, Châtaigne d'eau; Noix d'eau
(Gal.); Water caltrops (Ang.); Svaem-
mende hornnoet (D.); Castana de aqua
(His.); Waternooten (Bel.); Tribulo aqua-
tico (I.); Orzahi wodoe (Pol.); Abrolho
dos charcos (Lus.); Vatnoet (Succ.).
Wir. Be. M. Sp.
© (Tetrandria Monogynia, L.; Ona-
grariae, J.) Eine in stillen Wassern Eu-
ropa's gemeine Pflanze.
Man wendete ehemals die Früchte als
abstringirendes und die Blätter als aufstö-
sendes Mittel an. Beide sind aber heute
zubereit nicht mehr in Gebrauch.

Tremella.

Tremella Auricula Judae, Pers.; Gold-
berschwämmchen, Judasohr; Oreille de

Judas (*Gal.*); Jew's ear (*Ang.*); Bezowa hauba (*B.*); Judasoor (*Bel.*).

Br. Gal. Lus. Wir. Wür. *Be. M. Sp. Z.*
Ein Pilz, (*Auricula Judae s. Fungus Sambuci*), welcher an faulen Bäumen wächst. (*Zorn Ic. pl. t. 500.*)

Er hat eine ohrförmige Gestalt und eine grünlichgraue Farbe.

Ehedem wendete man ihn, in Milch oder Weinessig gekocht, gegen Bräune an.

Trifolium.

Unter diesem Namen werden besonders folgende beide Pflanzen angeführt:

1) *Trifolium pratense, L.*; rother Wiesenflee; Trèfle des prés (*Gal.*); Purple trifoil (*Ang.*); Raedklever (*D.*); Roedkaepling (*Succ.*).

Gal. Wir.

4 (*Diadelphia Decandria, L.*; *Leguminosae, J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn Ic. pl. t. 98.*)

Man wendet das blühende Kraut (*herba cum floribus Trifolii pratensis s. purpurei*) an; die Blätter desselben sind dreiblättrig, die Blättchen eiförmig, ganz, behaart, oft mit einem weissen oder schwarzen Flecke gezeichnet; die Blüthen roth und bilden rundliche, stumpfe, von häutigen Deckblättern umgebene Köhren.

Wird für etwas laxirend gehalten.

2) *Menyanthes trifoliata, L.*; Wasserflee, Fieberflee, Bitterflee; Trèfle d'eau, Trèfle des marais (*Gal.*); Common back-bean (*Ang.*); Horky, Wodnj getel (*B.*); Bukkeblade, Beskeklæver, Gedeklov (*D.*); Trifolio palustre (*His.*); Water drieblad (*Bel.*); Trifoglio fibrino, aquatico (*I.*); Vidra fu (*M.*); Troglust (*Pol.*); Trevo d'agua (*Lus.*); Trilistnik (*R.*); Vattukloefver (*Succ.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.*

4 (*Pentandria Monogynia, L.*; *Lysimachiae, J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Bull. t. 181. Blackw. t. 474. Plenck t. 87. Hayne III. 14. Bert. Bild. VII. 27. f. 2. Fl. méd. V. 234.*)

Man wendet das Kraut (*herba Trifolii s. Trifolii fibrini s. aquatici s. palustris s. paludosi s. antiscorbutici*) an; es besteht aus einem Büschel langstieliger, je aus drei glatten, eiförmigen, stumpfen, ganzen, am Stange etwas wellenförmigen Blättchen gebildeter Wurzelblätter. Es hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich bitteren Geschmack.

Bitter, tonisch, magenstärkend, die Menstruation befördernd. Besonders hat man

es gegen Scorbut, Sicht und Wechselstieber angewendet.

Conserva Trifolii fibrini. (Ful.)

℞. Foliorum Trifolii fibrini contusorum et per cribrum trajectorum partem unam.

Sacchari albi pulverati partes duas. Contere simul.

Thea amara, Species pro thea amara. (D. DD. Vm.)

℞. Rasurae Ligni Guajaci, Baccarum Juniperi, Foliorum Sennae,

— Trifolii fibrini, singulorum partes aequales.

Concisa et contusa misce. (*D. Vm.*)

℞. Foliorum Trifolii fibrini,

— Sennae, Radicis Bardanae, Baccarum Juniperi, sitgulorum unciam unam.

Concisa et contusa misce. (*DD.*)

Succus Trifolii fibrini. (Hass. Sar.)

℞. Herbae Trifolii aquatici recentis quantum vis.

Contunde in mortario lapideo, Aquae paxillo humectando, exprime fortiter, sepone succum et filtra.

Sar. clarificare in balneo aquae juret. — Gabe, zwei bis drei Unzen.

Syrupus de Menyanthe trifoliata s. Trifolio fibrino. (Gal.)

℞. Succu Trifolii fibrini bullitione clarificati et colati,

Sacchari albi,

singulorum partes aequales.

Coque, blando igne, ad syrupi consistentiam.

Syrupus de Menyanthe s. Trifolio compositus. (Br.)*

℞. Succu Trifolii fibrini recenter expressi . . . partes duas.

Succorum recenter expressorum Lactucae, Sonchi, Cichorii et Nasturtii,

singulorum partem unam.

Post aliquot horas sepositionis ut faecula desideat, commisce, clarifica, filtra et adde liquori

Sacchari albi . . . duplum.

Liqua in balneo aquae.

Extractum Trifolii fibrini aquosum, Succus concretus Trifolii. (A. Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. Fi. Pid. T. Vm.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini quantum vis.

Succum expressum et clarificatum in balneo aquae ad consistentiam extracti vaporando consume. (Gal. Lus.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini quantum vis.

Contunde in mortario et exprime succum, qui absque despumatione in tantum evaporet, donec quarta pars Foliorum Trifolii fibrini siccatorum sufficiat ad ei extracti spissitudinem praebendam. (B.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini libras duodecim.

Contunde in mortario ferreo, sensim addendo Aquae libras sex et exprime succum, qui semel ebulliat et tunc colatus leni calore ad mellis consistentiam evaporet. (Han. O.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini libram unam.

Aquae frigidae . . . libras decem.

Macera per duos dies, subinde agitando; cola, sepone et decantha liquorem, tunc vaporando ad consistentiam requisitam inspissa. (Pol.)

℞. Foliorum Trifolii fibrini partem unam.

Aquae communis . . . partes octo.

Macera per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuo deinde cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores ambos commisce et post horas viginti quatuor sepositionis ad aptam consistentiam vaporando inspissa. (Sax.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini, Aquae frigidae, singulorum partem unam.

Macera per horas duodecim, tunc adde

Aquae bullientis . . . duplum ponderis massae totius. Post refrigerationem cola, clarifica Albuminis ope, supra ignem impone et simulac liquor spissescere coepit, per pannum cola et continue agitando, probe consume. (Vm.)

℞. Foliorum Trifolii fibrini libram unam.

Aquae fontanae . . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, coque parumper, cola exprimendo et colaturam vaporando ad extracti consistentiam inspissa. (Br. Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Trifolii fibrini libram unam.

Aquae putrae . . . libras decem.

Coque per horas duas, cola exprimendo, sepone liquorem et per pannum colatum vaporando in tantum consume, donec massa non amplius digitis adhaereat. (Ams. Gen.)

Pharmacopoea universalis. II.

Hass. et Pid. coquere jubent Trifolii partem unam in Aquae sex, exprimendo colare et liquorem post sepositionem per horas viginti quatuor decanthatum vaporationi subjicere; — Wür. coquere Folia per horam unam in Aquae sufficiente quantitate et liquorem decanthatum ad mellis spissi consistentiam consumere; — An. coquere per horae quadrantem Foliorum libras duas in Aquae decem et liquorem decanthatum consumere; — Fer. coquere Herbae partem unam in Aquae tribus et decoctum Albuminis ope clarificatum consumere.

℞. Herbae Trifolii fibrini partem unam.

Aquae bullientis . . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum denuo coque in Aquae partibus quatuor et itidem cola; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti consistentiam evaporent. (Bor. D. Han.)

A. Herbam pluribus coctionibus sequentibus penitus extrahere, liquores commiscere et decanthatos in balneo aquae vaporando consumere; — Feun. coquere illam per horae quadrantem cum Aquae partibus sex, tunc secundo cum nova Aqua et liquores ambos commixtos in balneo aquae vaporando consumere; — Borá. Herbam cum Aquae fervidae decuplo per horas triginta sex seponere, liquorem exprimendo seponere, residuum cum Aquae fervidae quintuplo infundere, post refrigerationem exprimere, liquores consumere; — T. ut extractum sennae.

℞. Foliorum Trifolii fibrini contusorum . . . libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc destillando uncias circiter duas Aquae abstrahere, residuo infunde Aquae triplum, coquendo ad trientis remanentiam redige, clarifica et cola liquorem, vaporando ad electuarii consistentiam inspissa et huic nonnisi tepido Aquam destillatam adde. (Sar.)

HassP. ut extractum cardui benedicti etc.; — Fi. ut extractum cichorii. Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme. Extractum Trifolii fibrini alcoholicum. (Ful.)

℞. Herbae Trifolii fibrini, Aquae Vitae, singularium libram unam.

— purae . . . libras octo. Post tres dies digestionis cola exprimendo, destillando alcoholalem abstrahere et reliqua probe inspissa.

Extractum amarum. (RC.)

℞. Herbae Absinthii,
— Trifolii fibrini,
Radiceis Gentianae,
singularum quantum vis.
Coque, exprime et consume. — Ga-
be, zehen bis dreißig Gran; — Stärkend,
Verdauung befördernd.

Elixir amarum vinosum. (Ham.)

℞. Extracti Trifolii fibrini
semunciam.
Vini albi uncias duas.
Dissolve.

Elixir antiscorbuticum. (Ful.)

℞. Extracti Trifolii fibrini,
— Fumariae,
— Graminis,
singularum semunciam.
Aeque Chamomillae uncias decem.
— Cochleariae compositae
uncias quatuor.
Acidi sulphurici semidrachmam.
Eßfelweise zu nehmen.

Mixtura Trifolii aquatici foetida, Potio hydragoga. (Au.)

℞. Extracti Trifolii fibrini semunciam.
Aceti scillitici . . . uncias duas.
Tincturae Asae foetidae
semunciam.

Gabe, zwanzig Tropfen täglich drei Mal.

Infusum Menyanthis s. Trifolii fibrini. (GalM. Sa. Sw.)

℞. Foliorum Trifolii fibrini
unciam unam.
Aeque bullientis . libram unam.
Macerata per horas duas et cola. —
Bitter, tonisch. — Gabe, vier Unzen zwei
Mal täglich.

Infusum ad s. contra hemicraniam. (Sm.)

℞. Foliorum Trifolii fibrini scrupulos
duos ad drachmam unam.
Aeque bullientis uncias duodecim.
Infunde per horas duodecim, cola
et colaturae adde
Syrupi Valerianae . uncias duas.
Täglich auf drei Gläser zu nehmen.

Vinum Trifolii fibrini s. excitans. (Au.)

℞. Herbae recentis Trifolii fibrini
semunciam.
Seminum Sinapis unciam unam.
Vini rubri libras tres.
Post sufficientem digestionem filtra.
— Glasweise, bei Verdauungsbeschwerden
und Wasserfuchten.

Tinctura s. Essentia Menyanthis s. Trifolii fibrini. (Br. D, DD. Ful. Han. Li. Wir. Pid. Sw.)

℞. Herbae siccatae Trifolii fibrini
partem unam.

Alcoholis . . . partes quatuor.

Post tres dies digestionis exprime et
filtra. (D. DD. Ful. Li.)

Pid. Herbae partem unam et Alco-
holis quinque; — Han. Herbae unam
et sex Alcoholis.

℞. Herbae Trifolii fibrini
uncias quatuor.

Alcoholis libras duas.
Post sufficientem digestionem cola
exprimendo et liquorem infunde supra
Herbae Trifolii fibrini uncias duas.
Digere denuo, exprime et filtra. (Br.
Wir.)

℞. Herbae Trifolii fibrini
libram unam.

Spiritus Trifolii fibrini libras tres.
Macerata per dies duos et cola expri-
mendo. (Sw.)

℞. Spiritus Trifolii fibrini libras tres.
Extracti Trifolii fibrini
sesquidrachmam.

Dissolve.

Bitter, magenstärkend, antiscorbutisch,
fieberswidrig. — Gabe, fünfzig bis sechs-
zig Tropfen.

Tinctura diuretica. (DD.)

℞. Aceti scillitici . . . semunciam.
Essentiae Trifolii fibrini
drachmas duas.

Misce.

Piderit Extracti semunciam, Aceti
scillitici uncias duas, Tincturae Au-
rantiorum vel Juniperi semunciam.
Reizend, bitter, harntreibend. — Gabe,
sechzig Tropfen.

Tinctura s. Essentia amara. (B*. Br. Li.)

℞. Herbae Trifolii fibrini,
— Tanaceti,
singularum semunciam.

Radiceis Angelicae,

— Pimpinellae albae,

— Gentianae,

Gummi Hederae,

Succini flavi,

singularum drachmam unam,

Aeque Vitae . uncias duodecim.

Macerata per dies aliquot et cola. (B*.
Br.)

℞. Herbae Trifolii fibrini,
— Scordii,
— Tanaceti,

singularum uncias quatuor.

Aeque bullientis . sesquilibram.
Post horas duodecim digestionis tra-
jice per linteum, abjice aquam et fae-
cibus infunde

Alcoholis libras duas.

Adde deinde

Fructuum Aurantii viridium con-
tusorum unciam unam.

Digere per dies quatuor, exprime leviter et filtra. (Li.)

Bitter, tonisch. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen.

Spiritus Trifolii fibrini. (Wir. Sw.)

R. Herbae recentis Trifolii fibrini partes sex.

Aquae Vitae . . partes quatuor.

— purae . . partem unam.

Destillet pure una cum dimidia et denuo supra novam herbam destilletur. (Wir.)

Sw. miscere Herbae libras duodecim, Alcoholis sex et Aquae tres et destillare jubat libras sex, productum infundere supra Herbae recentis libras duodecim, addere Aquae libras duas et denuo destillando libras sex elicere.

Triosteum.

Triosteum perfoliatum, L.; Bastardbrechwurzel; Trioste perfolié (Gal.); Feverroot, Bastard ipecacuanha, Tinkerweed (Ang.).

Am. Br. C.

♂ (Pentandria Monogynia, L.; Caprifoliaceae, J.) Eine Pflanze Nordamerica's. (Dill. Elth. t. 293. f. 378.)

Die Rinde der Wurzel, welche man anwendet, bewirkt Purgiren und bisweilen Erbrechen.

Tripela.

Tripolitana terra; Trippel, Trippel-erde; Tripoli (Gal.).

Br. Wir. G. Sp.

Eine harte, rauh und trocken anzufühlende Substanz von weißer, gelber, rother, grüner oder brauner Farbe. Die geschäufte Tripel-erde, die sogenannte Venetianische, kommt von Corfu; sie ist schieferartig, durchsichert und gelblichroth.

Turpethum.

Convolvulus Turpethum, L.; Turpethumrinde; Turbith (Gal.); Square stalked bind-weedroot, Indian Jalap (Ang.); Turbit (B. His.); Teori (Beng.); Trasta walu (Cy.); Tikura (Duk.); Dudh-kulmi, Niswut (Hin.); Turbith (Bel.); Tassia (J.); Athapsia (Lus.); Triputu (Sa); Schevadie vayr (Tam.); Tegadu vayru, Tella tagada vayru (Tel.).

Ams. An. Br. Fer. Gal. His. Wir. A. Be. Br. G. M. Sp. Z.

♀ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.) Eine Pflanze Ceylan's und Malabar's. (Blackw. Herb. t. 397. Plenck, t. 105.)

Man wendet die Wurzel (radix Turpethi albi s. vegetabilis) an; sie ist lang, dick, holzig, ästig, von der Dicke eines Fingers und darüber. Sie hat eine dicke, derbe, außen grauliche, innen weißliche Rinde, unter welcher eine weiße, mehr lederartige Substanz liegt. Sie kommt in vier bis fünf Zoll langen Stücken zu uns. Bloß die Rinde ist wirksam, das Mark besitzt fast gar keine Kräfte. Sie hat keinen Geruch; der Geschmack ist anfangs fast unmerklich, wird aber dann sehr stark widerlich.

Ein drastisches Purgirmittel, welches selten für sich allein angewendet wird.

Extractum Turpethi. (Wir.)

R. Radicis Turpethi libram unam. Alcoholis libras quinque ad sax.

Post rufficientem extractionem cola exprimendo; macera et tunc parumper coque residuum in Aquae libris tribus, clarifica decoctum Albuminis ope, liquores ambos commisce et alcohole destillando separato, quod reliquum est ad extracti consistentiam inspissa.

U.

Ulmus.

Man wendet in der Medicin zwei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Ulmus fulva*, Mich.: raubbälttrige Ulme; Orme d'Amérique (Gal.); Rough leav'd elmtree, red elm, slippery elm (Ang.).

Am. C.

Ein Baum (Pentandria Digynia, L.; Amentaceae, J.) Nordamerica's.

Man wendet die innere Rinde, welche schleimig und erweichend ist, an.

2) *Ulmus campestris*, L.; Ulme, Rüster; Orme pyramidal (Ghl.); Elm (Ang.); Alm (D. Suec.); Olmo (His. I. Lus.); Olm (Bel.); Korawiazowa (Pol.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Br. C. Sp.

Ein großer Baum Europa's. (Schk. t. 57. Plenck t. 72. Lam. Ill. t. 185. Hayne III. 15.)

Man wendet die innere Rinde der Zweige (cortex Ulmi interior) an; sie ist

glatt, blass, röthlichbraun und geruchlos und hat einen bitteren, abstringirenden, etwas scharfen und sehr schleimigen Geschmack, wenn man sie länger kaut. Man hat sie bei Hautwasserfucht, Hautkrankheiten, Scropheln, Scorbut und Wechselstiebern gerühmt.

Extractum Ulmi. (A.)

R. Corticis Ulmi interioris
quantum vis.

Aquae . . . quantum sufficit.

Corticem pluribus coctionibus successivis penitus extrahe; liquores commisce, decantha et vaporando in balneo aquae consume.

Infusum Ulmi. (Am. B. C.)*

R. Corticis Ulmi concisi
unciam unam.

Aquae bullientis octarium unum.

Macera per horas duodecim, in vase tecto, saepius agitando et cola.

Decoctum Ulmi campestris. (B. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. RC. C. Sa. Sv. Sy. T.)*

R. Corticis Ramorum Ulmi interioris
uncias quatuor.

Aquae libras (octarios) quatuor.
Coque ad dimidii remanentiam.

RC. Corticis unciam unam, Aquae libram ad sesquilibrium; — T. Corticis uncias tres, Aquae libras quatuor, ad dimidii remanentiam.

Bei Ausfluß und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, vier bis acht Unzen zwei oder drei Mal täglich.

Decoctum diaphoreticum. (B.)

R. Corticis Ulmi interioris
uncias duas.

Patientiae . . . unciam unam.

Aquae . . . quantum sufficit
ut librae tres colaturae obtineantur. —
Bei chronischen Exanthemen in Gebrauch.

Urtica.

In den Pharmacopden werden drei Pflanzen dieser Gattung angezeigt:

1) *Urtica urens, L.*; kleine Brennnessel; Eiternessel; Ortie brûlante (*Gal.*).

An. Ba. Br. Fer. Gal. Li. Br. M.

⊙ (*Monoecia Tetrandria, L.*; *Urticeae, J.*) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Oed. Fl. Dan. t. 739. Bull. t. 233. Plenck t. 661.*)

Man wendet das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Das Kraut (*herba Urticae minoris*) besteht aus einem ästigen Stängel mit eiförmigen, tiefgezähnten und mit sehr stehenden Haaren besetzten Blättern. Es hat einen bitterlichen Geschmack.

Die Blüthen sind grün und in kurze, achselständige, fast sitzende Trauben vereinigt.

Der Saame ist eiförmig, glänzend und hellbraun.

2) *Urtica dioica, L.*; große Brennnessel; Ortie dioique (*Gal.*); Common nettle (*Ang.*); Koprucza puliwa neb wettsj (*B.*); Stor braendeneldé (*D.*); Ortiga mayor (*His.*); Groote brandenatol (*Bel.*); Ortica (*I.*); Pokrzywa (*Pol.*); Ortiga major (*Lus.*); Braennaetsla (*Succ.*).

Ams. Ba. Br. D. Fer. Gal. Gen. Hass. His. Wir. Wür. Be. M. Sp. Z.

⊙ Eine Europäische Pflanze. (*Zorn Ic. pl. t. 465.*)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an. Die Wurzel (*radix Urticae majoris*) ist lang, linienförmig, ästig, außen bräunlich, inwendig weißlich.

Das Kraut besteht aus einem vierteligen Stängel mit gestielten, herzförmigen, spitzigen, fahgeähnlichen, mit vielen sehr stehenden Haaren besetzten Blättern.

3) *Urtica pilulifera, L.*; römische Brennnessel; Ortie romaine (*Gal.*).

Bel. Wir. M. Sp.

⊙ Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Blackw. Herb. t. 321.*)

Man wendet den Saamen (semen *Urticae Romanae s. piluliferae*) an; er ist rundlich, platt, schwärzlichbraun, dem Feinfaamen ähnlich, aber kleiner.

Succus Urticae. (T.)

Herbam contundendo in mortario lapideo in pulmentum redige et succum exprime.

Inspissamentum Urticarum, Extractum Urticae. (His.)

R. Foliorum et stipitum Urticae
quantum vis.

Contunde in mortario marmoreo et exprime succum, qui separatione depuratus in balneo aquae ad spissimam consistentiam evaporet.

T. Succum cum Aqua dilutum et albuminis calorisque ope clarificatum ad extracti consistentiam inspissare.

Syrupus de Urtica s. Urticarum. (Gal. His.)

R. Succis Urticae coctione depurati et colati,

Sacchari albi,
singulorum partes aequales.

Coque blando calore ad syrapi consistentiam (*Gal.*)

His. Succis Urticae et Sacchari albi partes aequales cum Aquae sufficiente quantitate clarificare et coquere ad consistentiam syrapi.

Dieser Syrup wird als harntreibend betrachtet.

Uva Ursi.

Arbutus Uva ursi, L.; Bärentraube; Bousserole, Raisin d'ours (*Gal.*); Tral-

ling bearberry (*Ang.*); Mialnebaer, Mealbär-riis (*D.*); Gayuba, Uba de orso (*His.*); Beerendruif (*Bel.*); Uva d'orzo (*I.*); Niedzwiedzego, Grona, Borowkowe (*Pol.*); Uva de orso (*Lus.*); Mialonris (*Succ.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Feun. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Ll. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. M. Par. Pid. Sp. Z.*

Ein Strauch (*Decandria Monogynia*, L.; *Ericineae*, J.), Europa's. (*Oed. Fl. Dan. t. 33. Hayne IV. 20. Blackw. t. 592. Plenck t. 340. Bigel. I. t. 6.*)

Man wendet die Blätter (*folia s. herba Uvae Ursi*) an; sie sind kurzgestielt, eirundlänglich, stumpf, glatt und ledrig. Sie haben einen schwachen, balsamischen Geruch und einen bittern und angenehmen Geschmack.

Ein reizendes und harntreibendes Mittel, dessen Arzneikräfte ganz besonders übertraben worden sind. — Gabe des Pulvers, ein bis zwei Scrupel.

Pulvis anticalculosus. (B*.)

℞. Olei essentialis Corticis Aurantiorum guttas sex.
Sacchari albi semunciam.
Fiat elaeosaccharum, cui adde
Pulveris Uvae Ursi semunciam.
— Gummi Arabici
drachmas duas.

Gummi Jalapae drachmam unam. Gabe, eine Drachme täglich oder alle zwei Tage. — Bon Quarin bei Nierenkolik empfohlen.

Pulvis Uvae Ursi s. diureticus. (Au.)
℞. Herbae Uvae Ursi

scrupulum unum.

Elaeosacchari Foeniculi

grana quingue.

Divide in doses duodecim. — Gabe, drei oder vier Stück täglich.

Pulvis lithontripcticus. (E.)

℞. Herbae Uvae Ursi,

Chinae, singulorum drachmas duas.

Opii grana tria.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück drei oder vier Mal täglich und zwei Unzen Ralkwasser hinterdrein.

Decoctum Foliorum Uvae Ursi. (B* Au.)

℞. Foliorum Uvae Ursi semunciam.

Aquae fontanae uncias decem.

Decoque ad unciarum octo remanentiam. — Gabe, alle zwei Stunden zwei Löffel. (B*.)

℞. Foliorum Uvae Ursi semunciam.

— Theae drachmam unam.

Gummi Senegalensis

unciam unam.

Aquae uncias sex.

Coque et adde colaturae

Mellis drachmas sex.

T. ut decoctum ulmi.

Gabe, ein Löffel vier bis sechs Mal täglich.

V.

Vaccinium.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen drei Arten angeführt:

1) *Vaccinium Myrtillus*, L.; Heidelbeere; Airelle, Myrtille, Raisin des bois (*Gal.*); Common blue berry (*Ang.*); Myrtus, Gahody cerne, Wranj oka (*B.*); Blaebær (*D.*); Mirtillo, Arandano (*His.*); Blaaw bessen (*Bel.*); Mirtillo (*I.*); Borowkiczarna (*Pol.*); Blabeer (*Succ.*).

Ams. Br. Fenn. Ful. Gal. His. Ll. R. Suec. Wir. *Be. Br. M. Pid. Sp. Z.*

Ein kleiner Strauch (*Octandria Monogynia*, L.; *Ericineae*, J.) des nördlichen Europa's. (*Blackw. t. 463. Plenck t. 298. Hayne II. t. 7. Düss. off. Fl. VI. t. 11. Zorn Ic. pl. t. 81.*)

Man wendet die Früchte, Beeren (*baccae Myrtilli*) an; sie sind von der Größe einer Erbse und enthalten einen dunkelro-

then Saft. Ihr Geschmack ist süß, sauer und etwas adstringierend.

Sie sind schwarz kryptisch, kühlend und antischorbutisch.

2) *Vaccinium Oxycoccus*, L.; Moosbeere; Canneberge des marais (*Gal.*); Cranberry (*Ang.*); Tranebaer (*D.*); *Vacernia lagonusa* (*His.*); Veen bessen (*Bel.*); Ossicocos (*I.*); Canaberga (*Lus.*).

D. Fenn. Gal. R. RC. Suec. Wir. *Be. M. Sp.*

Ein kleiner Strauch des nördlichen Europa's. (*Oed. Fl. Dan. t. 80. Hayne IV. t. 18.*)

Man wendet die Beeren (*baccae Oxycocci*) an; sie sind eiförmig, roth, purpuroth punctirt, mit einem rothen Saft angefüllt und von sehr saurem Geschmack.

Kühlend, antischorbutisch.

3) *Vaccinium Vitis Idaea*, L.; Preiselbeere, Nehlbeere, rothe Bernbeere;

Canneberge ponctuée (Gal.); Red bilberry (Ang.); Tyttabaer (D.); Arando-na de frato encarnado (His.); Vosse-bersen (Bel.); Vite del monte Ida (I.); Lingon (Suec.).

D. Ful. Gal. Li. R. Suec. Be. G.

Ein kleiner Strauch des nördlichen Eu-ropa's und der Alpen. (Hayne IV. t. 19. Düss. off. Pfl. V. t. 14. Zorn Ic. pl. t. 87.)

Man wendet die Früchte (baccae Vitis Idaeae) an; es sind runde, schön rothe Beeren von saurem und etwas bitterem Geschmack.

Die Blätter gatten lange Zeit als lithontripticum und werden noch heutzutage den harntreibenden Mitteln beigezählt. Sie sind schwach adstringirend.

Succus e baccis Myrtillosum. (Ful. Pid. T.)

℞. Baccharum Myrtillosum maturorum quantum vis.

Contusas per aliquot dies in cavam sepone; exprime deinde succum et ad huc per aliquot dies in cava relinque, cola et in lagenis longicollibus penitus replendis a strato olei tectum in loco frido serva.

T. Baccas inter manus conterere, succum ad locum frigidum seponere, filtrare, cuique librae Sulphitis calcarei grana sex addere et servare.

Edüerlich, zu einigen Unzen als Zusatz zu Mixturen; statt des Weinessigs zu gebrauchen.

Succus e baccis Oxycocci s. Oxycocci. (B*. Suec.)

℞. Baccharum Oxycocci quantum vis. Sacchari albi . . . libras duas.

Fiat blando calore syrupus.

Succus Oxycocci cum Nitrate Potassae. (R.C.)

℞. Nitratiss Potassae unciam unam.

Succi Oxycocci . . . libram unam.

Misce solvendo. — Si libet, duas vel tres uncias Tincturae Calami utiliter addes. — Gabe, eine Unze bis ein halbes Pfund in getheilten Dosen täglich; bei Scorbut und scorbutischer Ruhr.

Roob Myrtillosum s. Vaccinii Myrtilli. (Ful. Li. Sw.)

℞. Baccharum Myrtilli quantum vis.

Contunde in mortario, sepone per dies aliquot, exprime succum et eum, igne ardente, cum Sacchari quadrante ad mellis consistentiam usque consume.

Im nördlichen Europa statt des roob mororum gebraucht.

Roob Oxycocci s. Vaccinii Oxycocci. (R. Sw.)

℞. Baccharum Oxycocci quantum vis.

Contunde in mortario, sepone per tres dies et exprime succum, qui cum Sacchari quadrante blando igne ad consistentiam mellis coquatur. (Sw.)

R. R.C. Sacchari libram unam pro sex Succis.

Edüerlich, kühlend; statt des roob mororum zu gebrauchen. — Gabe, bis eine Unze.

Roob baccharum Vitis Idaeae s. Vitis Idaeae. (Ful. Li. Sax. Sw.)

℞. Baccharum Vitis Idaeae quantum vis.

Contunde in mortario, sepone per tres dies, exprime succum et sepone, qui decanthatus, blando igne cum Mellis quadrante ad consistentiam mellis coquatur. (Ful. Li. Sw.)

Sax. Sacchari partem unam et sedecim Succis.

Edüerlich, kühlend, kann ebenfalls statt des roob mororum denuht werden.

Syrupus Myrtilli s. Myrtillosum. (Br. Ful. His. Pal. Suec. Wir. Wür. Pid.)

℞. Succi Baccharum Myrtillosum recens expressi . . . libram unam.

Sacchari albi . . . libras duas.

Dissolve blandi caloriss ope. (Suec.)

His. Succi libras duas et uncias duas, Sacchari libras quatuor; — Br. Pal.

Wir. Wür. et Pid. Succi uncias decem, Sacchari sedecim; — Ful. Cujusque partes aequales.

Syrupus adstringens Jouberti. (Pic.)

℞. Baccharum Myrtillosum drachmas triginta.

— Berberidis,

Foliorum Rhois,

Balaustiorum,

singulorum drachmas viginti.

Fructuum Mespili,

— Sorbi immaturorum,

singulorum uncias tres.

Succi Granati,

— Cydoniorum,

singulorum libras duas.

Coque simul et colaturae adde Sacchari albissimi libras quinque.

Adde

Santali citrini . . . semunciam, vel

Cinnamomi . . . drachmas duas.

Syrupus baccharum Oxycocci. (B*. Suec.)

℞. Succi Oxycocci . . . libram unam.

Sacchari albi . . . libras duas.

Fiat blando calore syrupus.

Valeriana.

Wir führen hier besonders zwei Arten dieser PflanzenGattung an:

1) Valeriana Phu, L.; großer Valerian; Grande valeriane (Gal.); Garden valerian (Ang.); Kozltjk velsij (B.); Storbaldrian (D.).

Br. D. Fer. His. Suec. Wir. Be. G. M.

4 (Triandria Digynia, L.; Valeriana, J.) Eine Pflanze der gemäßigten Theile Europa's. (Blackw. Herb. t. 260. Plenk t. 28. Hayne III. t. 35.)

Man wendet die Wurzel (radix Valerianae majoris) an; sie ist dick, lang, runzelig, faserig, außen braun, innen weißlich, und hat einen widerlichen Geruch und einen unangenehmen, bitteren und scharfen Geschmack.

2) Valeriana officinalis, L.; gemeiner Balbrian; Valériane sauvage (Gal.); Official valerian, Wild valerian (Ang.); Kozlik obecky (B.); Baldrian, Aeienrod valerian, Vildnardus, Valandsrod, Venderod, Vendmosrod (D.); Valeriana (His. J. Lus.); Wilde valerian (Hel.); Kozliki, Koztkowy (Pol.); Balderjan (R.); Ulvenderiot (Suec.).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Gal. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. Be. Br. C. G. M. Par. Pid. Sa. Sp. Z.

4 Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Hayne III. 52. Blackw. t. 271. Plenk t. 27. Diss. off. Pl. VII. t. 10. Lam. III. t. 24. fig. 1. Fl. méd. VI. 343.)

Man wendet die Wurzel (radix Valerianae minoris s. sylvestris) an; sie ist außen gelblich, innen weißlich, besteht aus vielen länglichen Fäserchen, ist frisch fast geruchlos, bekommt aber nach dem Trocknen einen übeln, durchbringenden, eigenthümlichen Geruch und hat einen scharfen und bitteren Geschmack.

Sie enthält, nach Trommsdorf, ein flüchtiges, kampherartiges, grünliches Del, Schleimharz, Sagmehl, Harz und einen eigenthümlichen Stoff.

Ein sehr kräftiges Reizmittel, welches besonders auf das Nervensystem wirkt und welches man vorzüglich in Nerventränkungen anwendet; auch hat man es als Fiebermittel benutzt. — Gabe des Pulvers, eine halbe Drachme bis eine Unze und selbst mehr, zwei oder drei Mal täglich.

§. I. Präparate, welche den Balbrian in Substanz enthalten.

Species antispasmodicae. (Wür. Huf. Pid.)

℞. Radicis Valerianae unciās tres.
Foliorum Aurantiorum unciās duas.
Herbae Millefolii unciām unām.

Oncisa misce. (Wür. Pid.)

℞. Radicis Valerianae,
— Caryophyllatae,
Herbae Menthae piperitae,
Foliorum Aurantiorum,
singulorum partes aequales.

Oncisa misce. (Huf.)

Gabe, zwei Kaffeelöffel zum Aufguss.

Pulvis nervinus s. antispasticus s. epilepticus s. roborans antispasmodicus s. antispasmodicus s. Valerianae aromatics. (B. BorC. DD. Ful. GalM. Ham. Au. B. Huf. Sm.)

℞. Radicis Valerianae,
Foliorum Aurantii,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. (Ful.)

℞. Radicis Valerianae partes viginti.
Cinnamomi . . . partes tres.

Fiat pulvis. (GalM.)

Au. Valerianae drachmas duas, Cinnamomi scrupulum unum et Elaeosacchari Valerianae sesquidrachmam.

℞. Radicis Valerianae unciām unām.
Ligni Quassiae . . . semunciam.

Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Radicis Valerianae scrupulum unum.
Camphorae . . . granum unum.
Pulvera. (DD.)

℞. Radicis Valerianae semidrachmam.
Cinnamomi . . . grana quinque.
Elaeosacchari Valerianae

scrupulum unum.

Fiat pulvis. (BorC.)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Sacchari albi,
singulorum drachmas duas.

Olei Valerianae . . . guttas sex.
Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Oculorum Canceri,
Rasurae Cornu Cervi,
Radicis Valerianae,
Visci querni,
singulorum partes aequales.

Fiat pulvis tenerimus. (B. Huf.)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
— Paeoniae drachmas duas.
Rasurae Cornu Cervi drachmas tres.

Olei Nucis moschatae grana tria.
Sacchari . . . unciās tres.

Fiat pulvis. (Sm.)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Tartari tartarisati,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. (Ful.)

℞. Radicis Valerianae drachmam unām.

- Foliorum Aurantii scrupulum unum.
 Salis Ammoniaci grana duo.
 Olei Cajeput guttas quatuor.
 Fiat pulvis. (B*.)
 R. Valerianae semidrachmam.
 Subcarbonatis Magnesiaë,
 Salis Ammoniaci,
 singulorum grana tria.
 Olei Cajeput guttas duas.
 Fiat pulvis. (B*. Au.)
 R. Valerianae drachmam unam.
 Iridis Florentinae sesquidrachmam.
 Liquiritiæ drachmas duas.
 Anisi semidrachmam.
 Croci grana octo.
 Subcarbonatis Magnesiaë
 drachmam unam.
 Fiat pulvis. (Au.)
 R. Valerianae unciam unam.
 Florum Zinci scrupulum unum.
 Moschi grana decem.
 Fiat pulvis. (B.)
 Sm Allgemeinen ist die Gabe aller dies-
 ser Pulver zwanzig Gran.
 Pulvis anthelminticus. (Au.)
 R. Radicis Valerianae drachmas duas.
 Jalapae,
 Sulphureti Mercurii nigri,
 singulorum drachmam unam.
 Gabe, von Zeit zu Zeit einen Kaffeelöffel.
 Pulvis ad epilepticos s. Valerianae.
 (GalM. Ra. Sa. Sw.)
 R. Radicis Valerianae partes decem,
 Cinnamomi partes tres.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Fiat massa. (GalM.)
 R. Radicis Valerianae semidrachmam.
 Syrupi Sacchari sesquidrachmam.
 Commisce. (Sa.)
 Sw. Syrupum Florum Aurantium
 adhibet. — Si requiritur, Castorei grana
 decem, vel Oxydi Ferri nigri septem
 adduntur.
 R. Radicis Valerianae grana viginti,
 Sulphatis Potassae grana duo.
 Syrupi Corticium Aurantium
 quantum sufficit.
 Misce bene. (Ra.)
 Pilulae antispasmodicae s. antiepilepti-
 cae. (Ca. Ra. Sm.)
 R. Valerianae drachmas sex
 Galbani,
 Sagapeni,
 singulorum sesquidrachmam.
 Asae foetidae drachmam unam.
 Fiat pilulae trium granorum. (Ca.)
 R. Valerianae grana triginta.
 Castorei grana quatuor.
- Oxydi Zinci grana viginti.
 Syrupi Sacchari quantum sufficit.
 Fiat pilulae tres. (Ra.) — Bon Du-
 puytren angewendet.
 R. Butyri Cacao drachmas quatuor.
 Acetatis Potassae,
 Valerianae,
 singulorum drachmas duas.
 Castorei drachmam unam.
 Cinnabaris scrupulum unum.
 Syrupi Florum Aurantium
 quantum sufficit.
 Fiat pilulae trium granorum. (Sm.)
 R. Valerianae unciam unam.
 Limaturae Ferri,
 Catechu,
 Cascariillae,
 singulorum drachmas duas.
 Syrupi Chinae quantum sufficit.
 Fiat pilulae trium granorum. (Sm)
 Conditum epilepticum, Electuarium
 antispasmodicum s. antiepilepticum. (Fi.
 Sm. Sw*.)
 R. Radicis Valerianae uncias duas.
 Subcarbonatis Magnesiaë
 drachmas duas.
 Syrupi Paeoniae quantum sufficit.
 Misce. (Sm.)
 R. Radicis Valerianae,
 Foliorum Aurantii,
 singulorum drachmas sex.
 Syrupi Absinthii quantum sufficit.
 Misce. (Sw*.)
 Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei
 Mal täglich.
 R. Pulveris Chinae,
 — Valerianae,
 — Foliorum Aurantii,
 singulorum unciam unam.
 Mellis despumati uncias novem.
 Gabe, von zwei bis vier Drachmen. (Fi.)
 Electuarium anthelminticum. (B*. Ham.
 Han. R. WW.)
 R. Sulphatis Potassae,
 Radicis Jalapae,
 — Valerianae,
 singulorum drachmam unam.
 Oxymellis scillitici uncias quatuor.
 Misce. (B*. R.)
 R. Radicis Valerianae drachmas duas.
 — Jalapae scrupulos duos.
 Seminis Cinae drachmas duas.
 Mellis Liquiritiæ uncias tres.
 Misce. (Ham.)
 R. Seminis Cinae unciam unam.
 Valerianae,
 Jalapae,
 singulorum drachmas duas.
 Sulphatis Potassae semunciam.
 Oxymellis scillitici uncias quinque.
 Misce. (Han.)

WW. Valerianae sesquidrachmam, Jalapae drachmam unam, Seminis Cinnae semunciam, Sulphatis drachmas duas, Oxymellis scillitici drachmas sex et Mellis despumati sufficientem quantitatem.

Gabe, eine bis zwei Drachmen für Kinder, eine halbe Unze für Erwachsene, täglich vier Mal.

Linctus vermifugus, Looch vermifugum.
(Sa.)

℞. Pulveris Valerianae drachmam unam.

Olei Olivarum . unciam unam.

Subige bene.

Potio antiepileptica. (Bo.)

℞. Aquae Cerasorum nigrorum,
— Tiliae,
— Florum Aurantiorum,
singulorum uncias duas.

Pulveris de guttata,
— Valerianae,
singulorum semidrachmam.

Syrupi Kermetis vegetabilis drachmas tres.

Auf zwei Mal zu nehmen.

Potio excitans et antispasmodica. (Pic.)

℞. Radicis Valerianae grana viginti quatuor.

Liquoris anodyni Hoffmanni guttas triginta.

Aquae Menthae,
— Cinnamomi hordeatae,
singularum uncias duas.

§. II. Präparate, welche nur den wirksamen Stoff des Baldrians enthalten.

A. Zugzug durch Wasser.

Infusum Valerianae. (Am. B. BorC.*

Du. Ham. GalM. RC. WW. C. Huf. ParC. Ra. Sa. Sw.)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.

Aquae bullientis uncias septem.

Digere per horam unam et post refrigerationem cola. (Am. Du. C.)

℞. Radicis unciam unam et Aquae libras duas; — B*. DD. et RC. Radicis unciam unam et Aquae libram unam (interdum adduntur Aetheris sulphurici alcoholici drachmas duas, vel Tincturae aromaticae, vel Tincturae Calami semuncia RC.); — Ham. Radicis unciam unam et Aquae quantum satis ut colaturae unciae octo obtineantur; — BorC. et WW. Radicis sesquidrachmam et Aquae sesquidrachmam; — ParC. Valerianae, Liquiritiae, singularum drachmas duas et Aquae octarium unum; — Huf. Valerianae semunciam et Aquae quantum satis ut unciae octo infusi obtineantur.

Reizend, nervenstärkend, Ausdünnung befördernd. — *Gabe, alle Stunden einen bis zwei Eßffel.*

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Post duas horas macerationis colaturae adde

Spiritus Lavandulae compositi drachmas sex, vel
Tincturae Valerianae ammoniatae drachmas tres.

Misce. (Sa. Sw.)

Syrupus Valerianae s. Valerianae Radicis. (Han. T.)

℞. Radicis Valerianae uncias octo.
Aquae bullientis . . . libras tres.
Infunde per horas aliquot, cola et colaturae uncias viginti adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.
T. Aquae bullientis libras duas, horas duodecim infusionis et Sacchari libras quatuor.

Infusum Valerianae compositum s. tonico-nervosum. (DD. Au.)

℞. Radicis Valerianae,
— Calami,
singularum unciam unam.

Florum Arnicae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Digere ad refrigerationem usque, cola fortiter exprimendo et colaturae adde

Essentiae Trifolii fibrini drachmas tres.

Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misc bene. — *Gabe, eine halbe Unze.*

(DD.)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas ad sex.

Aquae bullientis . . . uncias octo.
Infunde et colaturae refrigeratae adde

Aquae Cinnamomi simplicis uncias duas.

Liquoris Hoffmanni drachmas duas.
Syrupi cujuslibet unciam unam.

Misce. (Au.) — *Gabe, alle zwei Stunden oder selbst stündlich einen Eßffel.*

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
Aquae bullientis unciam unam.

Infunde et colaturae adde.

Aquae Cinnamomi unciam unam.
Millepedes viventes . . . no. 50.

Post horas duodecim digestionis super arenae balneo, cola exprimendo et adde

Syrupi Corticum Aurantiorum unciam unam.

Tincturae Opii . . . guttas sex.

Misce et momento quo uteris adde
Gas hydrogenii puri pollucem cubicum. — *Man hat diesen Trank bei Amaro-rose empfohlen. (Au.)*

Infusum nervinum. (Sa.)

- ℞. Radicis Valerianae sesquiuunciam.
Decocti Chinae . . . libras duas.
Infunde et colaturae adde
Syrupi Chamomillae sesquiuunciam.
Camphorae cum Mucilage Gummi Arabici tritae grana viginti.
Misce.

Clyster anthelminticus, Enema anthelminticum.

- ℞. Herbae Absinthii,
Radicis Valerianae,
singularum unciam unam.
Tanacetii,
Corticis Aurantiorum,
singulorum semunciam.

Man gießt auf zwei Eßlöffel dieses Pulvers ein Pfund kochendes Wasser, läßt es eine Nacht lang ziehen und seigt und drückt es dann aus. Dieß ist für zwei Klystire, zu deren jedem man einen Eßffel Hirschhornl. setzt. — Von Bremsen gerühmt.

Potio antispasmodica. (Sm.)

- ℞. Visci querni,
Radicis Valerianae,
— Paeoniae,
singulorum drachmas duas.
Foliorum Aurantii pugillum unum.
Aquae octarium unum.
Decoque ut quarta pars consumatur.

Potio excitans. (GalM. Au. B.)

- ℞. Valerianae
drachmas duas cum dimidia.
Aquae quantum sufficit
ut decocti unciae quatuor obtineantur;
colaturae adde
Syrupi Sacchari unciam unam.
Tincturae Cinnamomi
grana decem.

Misce. (GalM.)

- ℞. Valerianae . . . drachmam unam.
Decocti Chinae quantum sufficit
ut infusi unciae octo obtineantur; colaturae adde
Aetheris sulphurici semidrachmam.
Tincturae thebaicae
guttas triginta.

Misce bene. (B.)

- ℞. Camphorae . . . scrupulum unum.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Solutiioni adde
Extracti Valerianae drachmas sex.
Aquae Menthae piperitae
uncias sex.
Laudani Sydenhami
drachmam unam.

Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen halben Eßffel.

Extractum Valerianae aquosum s. frigide paratum. (A. An. B. Ba. Bor. Bor.)

Br. Du. Ful. Gal. Han. His. Li. Sax. Suec. Fi. Pid.)

- ℞. Radicis Valerianae quantum vis.
In pannum laneum involutae Aquam fervidam infunde, donec haec saporis expers prodeat; liquorem deinde lente ad extracti consistentiam consume.
(Ful.)

- ℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aquae partes sex.

Macera per horas viginti quatuor et cola exprimendo; sepone per horas duas, decantha et ad consistentiam requisitam inspissa. (Ba.)

- ℞. Radicis Valerianae libram unam.
Aquae frigidae . . . libras quatuor.

Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; residuum itidem cum nova Aqua maceratum coletur; tunc colaturae commixtae ad extracti consistentiam evaporent. (Gal.)

Bor. Han. et Sax. duos dies macerationis in Aquae partibus duodecim, evaporationem ad sextam usque partem, filtrationem et evaporationem in balneo aquae; — Bor4. Radicis libram unam, Aquae destillatae quantum satis ut aqua ad pollicem usque emineat, macerare per horas quadraginta octo saepius agitando et liquorem exprimere, hanc operationem bis terve repetere, liquores etc. ad mellaginis consistentiam inspissare, massam refrigeratam Aquae destillatae ea quantitate diluere ut filtrari possit, tunc liquorem in balneo vaporis iterum ad mellaginis consistentiam inspissare.

- ℞. Radicis Valerianae libram unam.
Aquae fontanae . . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque, cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Br.)

Pid. coquere jubet Radicis libram unam in Aquae octo et dimidium consumere.

- ℞. Radicis Valerianae pulveratae
uncias sex.

Aquae bullientis . . . libras tres.

Post horas viginti quatuor digestionis in loco calido. cola exprimendo et liquorem ad aptam consistentiam consume. (Du.)

- ℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aquae bullientis . . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur; tunc liquores ambos commisce, post sufficientem sepositionem decantha et ad extracti consistentiam consume. (An. Fer. C.)

A. Radicem pluribus coctionibus re-
petitis penitus extrahere, liquores com-
miscere, post sufficientem digestionem
decanthare et in balneo aquae consu-
mere; — Succ. Valerianam cum Aquae
duplo, tunc secundo cum nova Aqua
decoquere et liquores ambos commix-
tos in balneo aquae consumere; — B.
digerere illam per horas viginti quatuor
et per duas coquere in Aquae partibus
decem et residuum denuo coquere per
horas duas cum Aquae novae partibus
decem; — Ams. coquere illam primo
cum viginti, deinde cum quindecim
partibus Aquae, qualibet coctione ad
dimidias partes redigendis; — His.
digerere Radicem per horas viginti
quatuor et tunc coquere per duas cum
Aquae partibus decem et residuum cum
nova Aquae quantitate, ad dimidium
decoquere; — Fi. Radicis libram unam
cum Aquae pluvialis duodecim in alem-
bico per horam coquere, post refrige-
rationem colare et exprimere, fluidum
clarissimum decanthare et ad remanen-
tiam partis sextae, tunc ad extracti
consistentiam consumere.

T. ut extractum trifolii fibrini; —
Extractum siccum (T.) ut extractum
siccum chinae.

Gabe, von einem Scrupel bis eine
Drachme.

B. *Kuszug durch Bier.*

Cerevisia antispasmodica. (Vm.)

R. Radicis Valerianae partes quinque.
Foliorum Rorismarini,
— Salviae, singulorum partem
unam et dimidiam.
Serpentariae Virginicae
partem unam.

Cerevisiae partes
partes centum viginti octo.

Post octo vel decem dies maceratio-
nis cola.

Cerevisia cephalica. (Ca. Sa.)

R. Radicis Valerianae unciam unam,
Sinapis . . . drachmas sex.
Rori-marini . . . drachmas quatuor.
Serpentariae Virginicae
drachmas tres.

Cerevisiae . . . octarios octo.
Macerata per duas dies et cola. (Sa.)

Ca. Valerianae uncias decem, Sina-
pidem sex, Rorismarini tres, Salviae tant-
idem, Serpentariae duas et Cerevisiae
octarios quadraginta.

C. *Kuszug durch Wein.*

Infusum Valerianae vinosum, Vinum
Valerianae. (B.)

R. Radicis Valerianae unciam unam.
Vini albi . . . libram unam.
Digerere per horas viginti quatuor et

cola. — Gabe, alle Stunden ober zwei
Stunden einen Eßffel.

D. *Kuszug durch Alcohol.*

*Tinctura s. Essentia Valerianae syl-
vestris s. officinalis.* (A. Am. Ams. An.
Bel. Bor. Bor4. Br. DD. Du. Ful. Han.
HassP. Lon. LonN. Pol. Sax. Br. Huf.
Sw. Vm.)

R. Radicis Valerianae sylvestris sicca-
tae et in frustula concisae
uncias duas.

Alcoholis (0,910) libram unam.
Post sufficientem digestionem filtra.

(A. Ams. Huf.)

Au. Valerianae partem unam et Al-
coholis 20° sex; — B. et Bel. Radicis
unam et Alcoholis 15° sex; — Am.
Du. Lon. LonN. et C. Radicis uncias
quatuor et Alcoholis (0,930) octarios
duos; — Vm. Radicis partem unam
et sex Aquae Vitae; — Br. Radicis
unam et quinque Alcoholis; — Bor.
Bor4. Han. et Pol. Radicis uncias quin-
que et Alcoholis (Spiritus Vini rectifi-
catissimi) libras duas; — Sax. Radicis
partem unam et quatuor Alcoholis; —
DD. et Sw. Radicis unam et sex Alco-
holis; — HassP. Radicis uncias qua-
tuor, Spiritus Vini rectificati libras
duas; — T. easdem quantitates, sed
Alcoholem 25° et digestionem per octi-
duum.

R. Radicis Valerianae uncias duas.
Aquae Chamomillae uncias sex.
Alcoholis . . . uncias duas.

Post sufficientem infusionem cola ex-
primendo. (Ful.)

Reizend, krampsstillend, nervenstärkend,
wurmtreibend und Ausdünstung befördernd.
— Gabe, dreißig bis sechzig Tropfen.

Extractum Valerianae alcoholicum. (B.
D. HassP. Li. Pol. Wür.)

R. Radicis Valerianae,
Alcoholis, singulorum libras duas,
Aquae communis libras novem.

Digerere per horas duodecim, cola ex-
primendo, alcoholem destillando sepa-
ra et residuum ad aptam consistentiam
consume. (Pol.)

B. HassP. Radicis partes duas, Al-
coholis tres et novem Aquae; — D.
Radicis partem unam, Alcoholis duas
et quatuor Aquae.

R. Radicis Valerianae quantum vis.
Alcoholis . . . quantum sufficit
ut quatuor digitorum crassitiem tega-
tur. Digerere in loco calido et decan-
tha; coque per horam unam in Aqua
et cola exprimendo; tincturam consu-
me ad mellis consistentiam usque, co-
laturam in fine addendo et continue
agitando, ut massa sit homogena ne-
que grumosa. (Li. Wür.)

Tinctura Valerianae cumphorata. (Ham.)

℞. Radicis Valerianae sylvestris
 uncias duas.
 Camphorae . . . drachmam unam.
 Alcoholis . . . uncias octo.
 Digere ad perfectam extractionem
 usque et cola.

Tinctura s. Essentia Valerianae composita. (Br. Wir. *Pid.* *Vm.*)

℞. Radicis Valerianae,
 — Serpentariae Virginicae,
 singularum unciam unam.
 Camphorae . . . drachmam unam.
 Alcoholis . . . uncias octo.
 Post sufficientem digestionem exprime
 et filtra. (Br. Wir. *Pid.*)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
 — Serpentariae Virginicae
 semunciam.

Aquae Vitae . . . uncias octo.
 Infunde, tunc exprime, filtra et colaturae adde

Camphorae . . . drachnam unam.
 Solutionem serva. (*Vm.*)

Reizend, giftwidrig, auf den Uterus und
 gegen Epilepsie wirksam. — Gabe, vierzig
 bis sechzig Tropfen.

Tinctura antispasmodica et tonica. (Pic.)

℞. Radicis Valerianae,
 Pulveris Chinae,
 singularum drachmas duas.
 — Ipecacuanhae grana triginta.
 Decocti bullientis Capitum Pape-
 veris albi contusorum
 uncias sedecim.

Infunde per horas viginti, quatuor in
 vase tecto et adde deinde

Syrupi Hederae terrestris

 unciam unam
 Reizend. — Gabe, ein Eßlöffel täglich
 drei Mal.

Tinctura nervina (nervalis) et ionica.
(*Ca.* *Vm.*)

℞. Radicis Valerianae,
 Herbae Menthae piperitae,
 singularum sesquiunciam.
 Castorei . . . unciam unam.
 Croci . . . semidrachmam.
 Essentiae Menthae
 drachmam unam.

Alcoholis . . . libras duas.
 Digere, cola exprimendo et filtra.

(*Ca.*)
 ℞. Castorei . . . partes duas.
 Croci . . . partem unam.
 Aquae Vitae,
 — Menthae piperitae,
 singularum partes viginti.

Infunde frigide per plures dies et
 adde

Radicis Valerianae partes duas.
 Post aliquot dies exprime fortiter et
 filtra. (*Vm.*)

Reizend, bei Leiden von Schwäche und
 Magenkrampf. — Gabe, zwanzig bis drei-
 ßig Tropfen.

Tinctura s. Essentia Valerianae ammoniata s. volatilis. (Am. An. B*. Bor.
 Bor4. D. Du. Ed. Gen. Han. Lon.
 LonN. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec.
 Wür. C. Sw. *Vm.*)

℞. Radicis Valerianae sylvestris
 partem unam.

Alcoholis ammoniacalis partes sex.
 Digere frigide per plures dies in va-
 se tecto, subinde agitando et cola de-
 inde. (B*. Bor. Bor4. D. Gen. Han. O.
 Pol. RC. Sax. Wür. *Sw.*)

Du. Radicis unciās duas et Alcho-
 lis ammoniacalis octarium unum; —
 Ed. Radicis unciās quatuor et Alcho-
 lis ammoniacalis octarios duos cum
 dimidio; — *Vm.* Radicis partem unam
 et octo Alchohis ammoniacalis.

℞. Radicis Valerianae unciās quatuor.
 Tincturae aromaticae ammoniatae
 octarios duos.

Post quatuordecim dies frigidae ma-
 cerationis cola. (Am. Lon. LonN. C.)

Lus. Radicis unciās quatuor, Tinctu-
 rae libras duas cum dimidia et octo
 dies macerationis.

℞. Radicis Valerianae pulveratae
 unciās duas.

Solutionis Subcarbonatis Ammo-
 niaci alcoholicae libram unam.

Macera per dies octo, vas saepius
 agitando et cola. (Suec.)

℞. Valerianae grossiuscule pulveratae
 sesquiunciam.

Alcoholis (30°) unciās quatuor.
 Ammoniaci liquidi (19°)

 unciās duas.

Macera per dies sex in vase tecto,
 subinde agitando, tunc cola frigide et
 filtra. (An.)

Ein Reizmittel, welches man in meh-
 reren kramphhaften Krankheiten, besonders
 bei Epilepsie und Hysterie empfohlen hat.
 — Gabe, eine bis drei Drachmen in einem
 passenden Vehikel, z. B. Milch oder Ha-
 fergrüge. — Niemann schlägt als ein
 milderes Mittel eine Mischung aus Sub-
 carbonatis Ammoniaci liquidi pars una,
 Tincturae Valerianae alcoholicae simp-
 licis partes duae, vor.

Tinctura ammoniacea Valerianae composita. (Pic. *Vm.*)

℞. Radicis Valerianae unciās duas.
 Olei essentialis Citri

 drachmam unam.

Caryophyllum semidrachmam.
Spiritus Salis Ammoniaci

semunciam.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Digere in balneo aquae per duos vel tres dies et filtra. (Pie.)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Caryophyllum,
Macidis,
singulorum drachmam unam.
Corticis recentis Citri

sesquidrachmam.
Tincturae aromaticae ammoniacalis
uncias viginti quatuor.

Post aliquot dies frigidae reactionis exprime et filtra.

Reizend, gegen Epilepsie empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen in einem Baldrianaufguss.

Aqua acustica Ludovici. (Pal. Sp.)

℞. Radicis Valerianae,
— Levistici,
Herbae Rorismarini,
Florum Lavandulae,
singulorum semunciam.

Baccarum Lauri,
Castorei,
Camphorae,
singulorum drachmas duas.

Spiritus Juniperi libram unam.

Post quatuor dies macerationis adde Ammoniaci liquidi . semunciam.
Olei Juniperi . semidrachmam.

Man bringt einige Tropfen davon auf Baumwolle in den Gehörgang ein.

E. Auszug durch Aether.

Tinctura Valerianae aetherea s. anodyna, Tinctura antispasmodica Keupii. (B*. Bor. Bor4. Fenn. Ham. Han. Haas. HassP. Li. O. Pol. RC. Sax. Suec. WW. Au. Br. Ca. Pie. Sw. T. Vm.)

℞. Radicis Valerianae grossiuscule pulveratae . . . unciam unam.
Liquoris anodynini mineralis

uncias octo.

Digere frigide per dies tres in vase tecto et filtra. (B*. Bor. Bor4. Fenn. Han. Pol. Sax. Sw.)

Hass. Valerianae uncias duas et Liquoris anodynini libram unam; — Pie. Radicis uncias octo, Liquoris sesquilibram; — Vm. Radicis partem unam et decem Liquoris; — Br. Radicis uncias tres, Liquoris libram unam et digestionem blando calore; — Ham. Li. O. et Ca. Radicis partem unam et quatuor Liquoris; — HassP. Valerianae unciam unam, Liquoris sex; — RC. Radicis unam et Aetheris sulphurici octo; — T. Valerianae drachmas duas et Aetheris 56° unciam unam per duos dies macerare.

℞. Radicis Valerianae pulveratae . . . unciam unam.
Alcoholis concentrati uncias sex.

Digere blando calore in vase tecto et colaturae filtratae adde

Aetheris sulphurici drachmas duas.
Commisce bene. (Suec. WW.)

Au. Valerianae uncias sedecim, viginti Alcoholis et Acidi sulphurici duodecim.

Reizend, bei sogenannten nervösen Krankheiten, insbesondere Convulsionen, Krämpfen und Hysterie, empfohlen. — Gabe, ein bis vier Scrupel drei oder vier Mal täglich in einer Tasse Meissen- oder Pfeffermünzthee.

Tinctura Valerianae camphorata s. Valerianae aetherea camphorata. (Au.)

℞. Camphorae . . . semidrachmam.
Tincturae Valerianae aetherae

drachmas tres.

Gabe, fünf und zwanzig bis dreißig Tropfen in anomaler Dosis.

Tinctura anodyna. (B*.)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Corticis Aurantii Curassavici
drachmas duas.

Aetheris sulphurici uncias quatuor.

Digerantur blandissimo calore per dies octo et sub finem leviter ebulliant. — Reizend, krampfstillend. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen.

Tinctura antispasmodica. (B*.)

℞. Radicis Valerianae,
Herbae Mari,
singulorum unciam unam.
Liquoris anodynini mineralis

uncias sex.

Post sex dies digestionis filtra.

Niemann hat diese Formel auf folgende Weise verändert:

℞. Radicis Valerianae,
Herbae Mari,
singulorum semunciam.

Alcoholis . . . uncias quatuor.

Acidi sulphurici Aqua diluti
drachmam unam.

Digere blando calore per horas quatuor.

Reizend, krampfstillend, gegen Epilepsie. — Gabe, ein Kaffeelöffel in Wein.

Elisir antispasmodicum. (Ful. Siv*. Vm.)

℞. Tincturae Valerianae uncias duas.
Liquoris anodynini mineralis
drachmas duas.

Misce et in illis dissolve
Camphorae pulveratae
drachmam unam.

Serva. (Vm.)

℞. Radicis Valerianae,

Radicis *Serpentariae Virginicae*,
singularum unciam unam.
Alcoholis . . . uncias duodecim.
Post sufficientem infusionem cola
exprimendo, filtra et adde
Aetheris sulphurici uncias duas.
Camphorae . . . drachmam unam.
Dissolve. (Sw*.)
℞. Camphorae . . . drachmam unam.
Aetheris sulphurici uncias duas.
Solutioni adde
Extracti Valerianae unciam unam.
Aeque Chamomillae . . . uncias sex.
Misce. (Ful.)
Gabe, ein bis zwei Scrupel täglich mehr-
mals.

F. Auszug durch Destillation.
Oleum Valerianae aethereum, Aethereoleum Valerianae. (A. Ba. Bel. Bor.
Bor. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol.
R. Sax. Sw. T.)

℞. Radicis Valerianae quantum vis.
Aeque . . . quantum sufficit.
Destillent. (Bel. R.)

Sw. T. Radicis partem unam et quatuor
Aeque (T. post macerationem per
unum diem dimidium destillando abstrahere
et super novam materiam cohobare); —
Bor. Bor. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Radicis
partem unam et Aeque octo; — Ba. Radicis
unam et novem Aeque; — A. Radicis unam
et Aeque duodecim.

℞. Radicis Valerianae partes quatuor.
Aeque . . . partes sedecim.
Post tres dies macerationis adde
Salis culinariae . . . partem unam.
Destillent. (Hass.)

℞. Radicis Valerianae . . . libras sex.
Alcoholis . . . libram unam.
Post duos dies adde
Aeque . . . libras octodecim.
Destillent. (Li.)

Oleosaccharum s. Elacosaccharum Valerianae.
(A. Bor. Bor. Han. HassP.)
℞. Sacchari albi drachmam unam.
Olei essentialis Valerianae
grana tria.

Tritura simul. (A.)
Bor. Bor. et Han. Sacchari unciam
unam et Olei guttas viginti quatuor;
— HassP. Sacchari drachmas duas,
Olei guttas tres.

Aqua Valerianae. (A. B*. Ba. Br.
Gal. Han. Hass. HassP. Li. Pol. Sax.
Fl. Vm.)

℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aeque . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor destillent
sex (Hass.) vel septem (Han.) partes.

Br. Radicis partem unam et tres
Aeque; destillet dimidia pars; — Gal.
Fl. Radicis partem unam et quinque

Aeque; destillent partes duae; — Vm.
Radicis partem unam et Aeque decem;
destillent partes duae; — A. Radicis
partem unam et Aeque duodecim; de-
stillent partes quatuor; — Pal. et Sax.
Radicis partem unam et Aeque duode-
cim; destillent partes novem; — B*.
et Ba. Radicis partem unam et Aeque
octodecim; destillent partes decem; —
HassP. Valerianae libras tres, Aeque
quantum sufficit; destillent librae vi-
ginti quatuor.

℞. Radicis Valerianae libras duas.
Aeque . . . libras duodecim.
Radicem in saccum include, medio
cucurbitae ita suspensum ut aquam
non attingat et destillando libras sex
abstrahere. (Li.)

*Aqua Valerianae composita, Spiritus
Valerianae compositus.* (Pid.)

℞. Radicis Valerianae uncias novem.
— Levistici . . . uncias tres.
Herbae Pulegii . . . uncias duas.
— Sabiniae . . . unciam unam.
Aeque fontanae,
Alcoholis, singulorum libras octo.
Post duos dies digestionis destillent
librae octo.

Valerianella.

Valerianella olitoria, Dufr.; Gemüsetapuzzel; Doucette, Mache (Gal.).

Gal. Be.
© (Triandria Monogynia, L.; Valerianaceae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze.

Man wendet das Kraut an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit länglichen, sitzenden, ganzen oder kaum gezähnten Blättern, welcher aus einer Rose ähnllicher, ausgebreiteter Wurzelblätter hervorkommt. Der Geschmack ist fade.

Erweichend.

Vanilla.

Vanilla aromatica, Sw.; Vanille; Vanille (Gal.); Vanilla (Ang.); Wanylie (B.); Vagnilla (His.); Banilje (Bel.); Vaniglia (I.); Tlixachitl (Me.); Waniilia (Pol.); Vanilj (Succ.).

An. Ba. Bel. Bor. Bor. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Han. HassP. His. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. Br. Fl. G. M. Pid. Sp. Z.

Eine ranfende Schmarogerpflanze (Gynandria Diandria, L.; Orchideae, J.) Südamerica's. (Blackw. t. 590. Plenck t. 646. Fl. méd. VI. 345.)

Man wendet die Früchte (siliquae Vanillaee s. Vanilliae s. Vanigliae s. Banillae s. Araci aromatici) an; es sind

vier bis acht Zoll lange, zwei bis drei Linien breite, gerade, am Grunde gekrümmte, walzenförmige, gefurchte, glänzende, zusammengehörte, in eine Art gestieltes Wäzchen endigende Shooten von schwärzlichbrauner Farbe, mit zwei bis drei, leicht brechen, obgleich nicht besonders weichen Klappen, welche in einem weichen braunen Mark sehr viele rundliche, schwärzliche, glänzende Samen enthalten. Der Geruch ist stark und angenehm, der Geschmack brennend und heißend.

Reizend. — Gabe des Pulvers, von fünfzehn Gran bis zu einer Drachme.

Pulvis Vanillaes. (Gal. GalF. GalH.)

℞. Vanillaes in frustula parva concisae partem unam.

Sacchari albi . . . partes duas.
Contundendo in mortario ferreo in pulverem subtilissimum redige, quem per cribrum setaceum trajice; quod supra cribrum remanet, denuo contunde, donec cribrari possit.

GalF. et GalH. Sacchari partes quatuor.

Wakaka Indorum. (Ca.)

℞. Sacchari pulverati uncias quatuor. Cacao mundati pulverati

sesquiunciam.

Sacchari Vanillaes scrupulati semunciam et drachmas duas.

Pulveris Cinnamomi,
— Orleanae,
singulorum drachmam unam.

Misce. — Gabe, ein Eßlöffel in Milch, Chocolate oder Suppe.

Syrupus Vanillaes. (Br*. Vm.)

℞. Vanillaes pulveratae partes quatuor.

Gummi Arabici . . . partem unam.

Aquae . . . partes sex.

Tritura simul ut fiat emulsio, cola fortiter exprimendo et colaturae adde syrupum refrigeratum e

Sacchari albi partibus viginti duabus.

Aquae . . . partibus duodecim.

Liqua blando calore in mixtura

Sacchari albi partes viginti duas.

℞. Vanillaes electae . . . uncias duas.

Sacchari albi uncias septemdecim.

Aquae fluvialis . . . uncias decem.

Alcoholis (21°) . . . drachmas sex.

Vanillam in frusta minora concisam porphyrisa, saccharum et alcoholem sensim addendo ut fiat pasta mollis et homogenea; in retortam immitte cum reliquo sacchari et aquae; adde Albumen Ovi unius, balneo aquae immitte per horas octodecim vel viginti,

subinde agitando, sepone deinde per unum diem et per pannum cola.

Tinctura Vanigliae s. Vanillaes. (Br*. HassP. Sax.)

℞. Vanillaes . . . partem unam.

Alcoholis . . . partes decem.

Digere blando calore per dies octo. (Sax.)

Br*. secundum Pfaff Vanillaes partem unam et Alcoholis sex; — HassP. Vanillaes unam et Spiritus rectificati octo; digere per quadriduum; tinctura pondus unciarum sex habeat.

Reizend, nervenstärkend und analeptisch. — Gabe, vierzig Tropfen in Wein.

Alkermes liquidum, Alcohol cum Coccionella compositum. (Fi. Vm.)

℞. Ambræ griseae scrupulum unum. Caryophyllorum semidrachmam.

Cinnamomi . . . drachmas duas.

Vanillaes,

Coccionellae,

singularum semunciam.

Aquae Vitae . . . libras tres,

Infunde per dies duos in balneo aquae tepido, filtra deinde et in liquore balnei aquae ad 60° R. ope calefacto solve mixturam e

Sacchari albi . . . libris tribus.

Mellis Narbonnensis libris sex.

Syrupum postquam clarus prodiit, decantha et per pannum laneum cola.

Fi. Caryophyllorum, Vanillaes, singularum drachmas duas, Cinnamomi, Coccionellae, singularum semunciam, Aluminis de Rocca scrupulum unum, Alcoholis 24° libras tres cum dimidia, Aquae Florum Aurantiorum libras duas, Aquae Cinnamomi lacteae libram unam, Sacchari libras quinque.

Aqua Vanillaes. (Br*)

℞. Vanillaes . . . libram unam. Subcarbonatis Potassae uncias tres.

Aquae . . . libras duodecim.

Post horas viginti quatuor digestionis destillet dimidia pars.

Spiritus Vanillaes. (Br*) . . .

℞. Vanillaes . . . uncias sex. Subcarbonatis Potassae

sesquiunciam.

Alcoholis . . . libras sex.

Post horas viginti quatuor macerationis adde

Aquae . . . libras sex.

Destillent lente librae sex.

Variolaria.

Variolaria orcina, Ach.
Von dieser Pflanze, doch besonders von

Rocella tinctoria, *Cand.*, einem *Eryptogam*, welches auf den Felsen der Canarischen Inseln, des grünen Borgebirgs und des Archipels wächst (*Pluk Alm.* t. 255. f. 6), bereitet man die Orseille, *Rocella*; *Orseille* (*Gal.*).

Ba. Du. *Gal. Sc. C. G. M.*
einen festen, dunkelviolettrothen Färbeteig von starkem unangenehmem Geruch; der von der zweiten Pflanze ist von besserer Qualität.

Veratrinum.

Veratria, *Veratrina*; *Veratrin*; *Veratrine* (*Gal.*).

Fi. Ma. T

R. Granorum Sabadilla quantum vis. Alcoholis bullientis ope penitus extrahe, filtra statim et post refrigerationem denuo filtra; colaturam ad consistentiam extracti consume, in Aqua solve, solutionem filtra et vaporando lente consume; praecipitatum inde exortum separa, colaturae Acetatem Plumbi liquidum infunde, praecipitatum nova filtratione separa, torrentem Acidi hydrocyanici per liquorem transmittet, denuo filtratum vaporatione concentra, per Magnesiam tracta, praecipitatum formatum Alcohole bullientis penitus extrahe et tincturas alcoholicas vaporando ad siccum consume.

Ein heftiges Reizmittel und fürchterliches Gift, welches in der Gabe zu einem Viertelgran purgirt.

Solutio Veratrina. (Ma.)

R. Sulphatis Veratrinae granum unum. Aquae destillatae . . . uncias duas.

Tinctura Veratrina. (Ma.)

R. Veratrinae . . . uncias quatuor. Alcoholis . . . unciam unam.
Gabe, zehn, fünfzehn, zwanzig und fünf und zwanzig Tropfen in einer Portion. — Außerlich in Einreibungen bei Sicht, Hautwasserfucht, innerer Wasserfucht und Leukophlegmatie.

Pilulae Veratrinae. (Ma.)

R. Veratrinae . . . semigranum. Gummi Arabici, Syrupi Gummi, singulorum quantum sufficit.
Fiant pilulae sex grani unius. — Gabe, anfangs eine, bis auf drei Stück täglich gestiegen.

Unguentum s. Pomatum Veratrinae. (Ma.)

R. Veratrinae . . . grana quatuor. Axungiae Porci . . . unciam unam.
In Einreibungen, bei chronischen Rheumatismen, Hautwasserfucht und Sicht.

Verbascum.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen zwei Arten angeführt.

1) *Verbascum Thapsus*, L.; Wollkraut, Königsfergentraut; Bouillon blanc (*Gal.*); Great mullein (*Ang.*); Diwizna (*B.*); Kongelys (*D.*); Gordolobo (*His.*); Wollekruid (*Bel.*); Verbasco (*I.*); Driewanna ziele (*Pol.*); Verbasco branco (*Lus.*); Kungsljss (*Succ.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Succ. Wir. Wür. WW. Be. Br. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

♂ (Pentandria Monogynia, L.; Solanaceae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 3. *Schk.* t. 42. *Plenck* t. 109. *Zorn Ic.* pl. t. 197.)

Man wendet die Blätter und die Blüten an.

Die Blätter (folia s. herba Verbasci albi) sind lanzettförmig, auf beiden Seiten stark filzig, gezähnt und weich. Sie haben einen angenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bitteren und schwach styptischen Geschmack.

Die Blüten (flores Verbasci) sind gelb, sehr groß, und haben einen angenehmen Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack.

Erweichend.

Man kann statt desselben auch das *Verbascum phlomoides*, L. (*Gal.*), eine Europäische Pflanze (*Lob. Ic.* 560. 661.), nehmen, dessen Blätter eiförmig, spitzig, die untern in einen gestülpten Stiel verbündet, die obern herzförmig ausgerandet, und dessen Blüten gelb oder weiß sind.

Nach Morin's Analyse gaben die Blüten ein gelbliches ätherisches Oel, einen fetten, der Delsäure ähnlichen Stoff, Phosphorsäure, Kesselsäure, uncrystallisirbaren Zucker, Schleimartz, Chlorophyll, gelbes Oxyd und Salze.

2) *Verbascum nigrum*, L.; schwarze Königsferge, schwarzes Wollkraut; Bouillon noir (*Gal.*).

Gal. M.

♀ Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Zorn Ic.* pl. t. 25.)

Man wendet die Wurzel und die Blüten an.

Die Wurzel (radix Verbasci nigri) ist ästig, wenig behaart, außen hellbraun, innen wenig gelblichbraun.

Die Blüten sind gelb, sehr klein, geruchlos und von schleimigem Geschmack.

Erweichend.

Extractum Verbasci (albi). (*Wir.*)
R. Florum siccum Verbasci quantum vis.

Alcoholis . . . quantum sufficit.
Digere blando calore, in vase tecto, et decantha liquorem; novum Alcoholē adde, donec non amplius tingatur; tincturis commixtis trientes duo in balneo aquae destillent et reliqua ad mellis consistentiam evaporent.

Decoctum Verbasci (albi) anodynum s. compositum, Fetus anodynus.

℞. Foliorum Verbasci albi,
— Malvae,
singulorum sesquiunciam.
Seminum Lini . . . uncias duas.
Capitum Papaveris albi
scrupulum unum.

Aquae libras quatuor.
Coque per horae quadrantem. —
Besonders äußerlich in Waschungen angewendet.

Oleum Verbasci (albi). (Br. Wir. Wüir.)
℞. Florum Verbasci albi

partem unam.
Olei Olivarium . . . partes duas.
Digere per tres dies igne leni, tunc ad humidam consumptionem coque et exprimendo cola. (Ful. Wüir.)
Br. et Wir. Florum et Olei partes aequales et octo dies digestionis.

Eindernd, schmerzstillend, in Fällen von Hämorrhoiden und Frostbeulen empfohlen.

Verbena.

Man findet von dieser Pflanzengattung zwei Arten in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Verbena officinalis, L.*; Eisenhart, Eisenkraut; Verveine commune (Ga.); Vervaine, Holy herb (Ang.); Wrbynka (B.); Ma-pien-tsac (C.); Jernurt (D.); Verbena (His. I. Lus.); Yzerhard (Bel.); Zeletnik (Pol.); Schelesnik (R.); Jaern-aert (Succ.).

An. Fer. Gal. Gen. His. Li. Wir. Wüir. Br. G. M. Sp. Z.

♂ oder ♂ (Diandra Monogynia, L.; Verbenaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Fl. méd. VI. 346.)

Man wendet das Kraut (herba Verbenae) an; es besteht aus einem vierseitigen, harten, einfachen oder in einige gegenüberstehende, sehr ausgebreitete Zweige getheilten Stängel mit entgegengesetzten, gestielten, eirundlänglichen, etwas runzligen, mit einigen kurzen Haaren besetzten, tief in ungleiche, stumpfe, ganze Lappen, von denen der Endlappen größer ist, getheilten Blättern. Es hat keinen Geruch und einen etwas bitteren und adstringirenden Geschmack.

2) *Verbena triphylla, L.*; dreiblättrige Pharmacopoea universalis. II.

ges Eisenkraut; Verveine citronelle (Gal.); Yerba luisa (His.).

Fer. Gal. His. Br.

♂ Decandria Monogynia, L.; Verbenaceae, J.) Eine Pflanze Ghil's.

Man wendet die Blätter (folia Aloysiae) an; sie sind dreizellig und verbreiten einen angenehmen, citronenähnlichen Geruch.

Extractum. (T.) E succo expresso cum aquae modica quantitate diluto et evaporato.

Veronica.

Fünf Arten dieser Pflanzengattung finden sich in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Veronica Beccabunga, L.*; Bachbungen, Bachbohnen, Wasserbungen; Grand Beccabunga, Véronique cressonée (Gal.); Brooklime (Ang.); Lemmike, Ledmyc, Bekbung (D.); Becabunga (His.); Backebom (Bel.); Becabunga (I.); Patocznik (Pol.); Beccabunga (Lus.); Bae-kabunga (Succ.).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. His. RC. Wir. Br. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sp. Z.

♀ (Diandra Monogynia, L.; Rh-antheae, J.) Eine in Europa an dem Ufer von Bächen wachsende Pflanze. (Fl. méd. II. 60.)

Das Kraut (herba Beccabungae) besteht aus einem walzenförmigen, unten rötlichen, oben grünen, saftigen Stängel mit entgegengesetzten, kurzgestielten, eirunden, glatten, etwas fleischigen, fl. in gezähnten Blättern. Man wendet es nur frisch an. Reizend, antiscorbutisch.

2) *Veronica Anagallis, L.*; Wasserliesbender Ehrenpreis; Petit Beccabunga (Gal.); Long leav'd brooklime (Ang.). Gal. His.

♀ Eine Europäische Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 903.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Anagallidis aquaticae) an; es besteht aus einem aufrechten Stängel mit lanzettförmigen, spitzigen, gezähnten Blättern und seitlichen blauen Büschentrauben. Es hat keinen Geruch, aber einen bitteren, scharfen Geschmack.

Reizend

Man giebt beide Pflanzen im Aufguss, eine bis zwei Hände voll auf die Pinte Wasser.

3) *Veronica officinalis, L.*; Ehrenpreis; Véronique officinale, Véronique mâle (Gal.); Male speedwell (Ang.); Weronyka (B.); Oerenpriis (D.); Veronica (His. I. Lus.); Gemeene eerenpriis (Bel.); Przelacznik (Pol.); Ernpris (Succ.).

A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. Lon. LonN. Lus. O. Pol.

R. Sax. Suec. Wir. Wür. Bc. Br. Fi. G. M. *Pid. Sp. Z.*

4) (*Diandria Monogynia*, L.; *Pediculariae*, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. VI. 345.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Veronicae*) an; es besteht aus einem walzenförmigen, behaarten Stängel mit gegenüberstehenden, ziemlich kurzgestielten, eirunden, stumpfen oder etwas spitzigen, am Grunde verschmälerten, rauhen, behaarten, wie Hagrinartigen, sägezahnigen Blättern. Es hat keinen Geruch; der Geschmack ist etwas bitter und schwach styptisch.

Schwach tonisch, antiscorbütisch. — Gabe des Castes, eine bis zwei Unzen.

4) *Veronica Teucrium*, L.; *Brusttheekraut*, *Erdbathengel*; *Véronique teucriete* (Gal.).

4) Eine Europäische Pflanze. (Lob. Ic. t. 478.)

Man wendet das blühende Kraut (*herba Veronicae teucriifoliae*) an: es besteht aus eirunden, runzligen, gezähnten, stumpfen, von einem runden, behaarten Stängel getragenen Blättern und hellblauen, lange Trauben bildenden Blüten. Es hat keinen Geruch, aber einen bitteren, adstringirenden Geschmack.

5) *Veronica Virginica*, Willd., *Virginischer Ehrenpreis*; *Véronique de Virginie* (Gal.).

Am. C.

Man wendet die Wurzel an, deren Arzneikräfte noch nicht genau bekannt sind.

Conserva Beccabungae. (Wir. T.)

R. *Herbae Beccabungae cum floribus* partem unam.

Sacchari albi pulverati partes duas.

Contunde bene simul.

T. *Herbam recentem cum Sacchari parte aequali in pulpam redigere et hanc cum Sacchari in dimidio pondere Aquae cocti libris duabus commiscere.*

Conserva Veronicae. (Wir.)

R. *Herbae Veronicae recentis et contusae* partem unam.

Sacchari partes duas.

Contere.

Succus Beccabungae. (Wür. T.)

R. *Herbae Beccabungae quantum vis.*

Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, sepone succum, decantha et in lagenis serva, cuique librae liquoris Alcoholis drachmam unam addendo.

Sucus Veronicae. (T.) Simili modo ut succus beccabungae paratur.

Species pectorales s. pro Thea s. pro Thea. (Li. R. Ca. *Pid.*)

R. *Radicis Graminis* sesquinciunciam. *Herbae Millefolii* . unciat duas.

Herbae Veronicae . unciat tres.

Concisa misce. (*Pid.*)

R. *Herbae Parfarae*,
— *Veronicae*,
singulorum unciat quatuor.

Radicis Liquiritiae,
— *Polypodii*,
singulorum unciat duas.

— *Althaeae* . unciam unam.

Poeniculi drachmas sex.

Concisa et contusa misce. (Li.)

R. *Foliorum Veronicae*,
— *Hederae terrestris*,
— *Tussilaginis*,
— *Scabiosae*,
singulorum unciat tres.
— *Melissae*,
— *Salviae*,
singulorum semunciā.

Concisa misce. (Ca.)

R. *Florum Chamomillae vulgaris*,
Herbae Veronicae,
singulorum partes sex.
Foliorum Salviae . partes duas.

Concisa misce. (R.)

Aqua Beccabungae. (A. Sar.)

R. *Herbae Beccabungae contusae* partem unam.
Aquae partes duas.
Destillant trientes duo. (Sar.)

R. *Succi depurati Beccabungae* quantum vis.

Destillant fere ad siccum. (A.)

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Veronicae. (Gal. Pal. T.)

R. *Herbae Veronicae partes quinque*,
Aquae partes viginti.
Destillant partes decem. (Gal.)

Pal. *Herbae partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — T. Herbae partem unam, Aquae quatuor; destillet dimidium.*

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Veronicae vinosa. (Br. Wir. Sp.)

R. *Herbae Veronicae cum floribus* libras tres.
Vini albi libras octo.

Post aliquot dies macerationis destillet dimidia pars.

Infusum Veronicae. (GalM. Ra.)

R. *Florum Veronicae* . semunciā.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola. (Ra.)

R. *Florum Veronicae partes centum*.
Liquiritiae rasae . partes octo.

Aquae bullientis quantum sufficit.

Infunde et cola. (GalM.)

Extractum Beccabungae. (Sar.)

R. *Herbae recentis Beccabungae* quantum vis.

Contunde in mortario, exprime succum et in balneo aquae ad extracti consistentiam inspissa.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Extractum Veronicæ. (Br. Sar. Wir. T.)

R. *Herbae Veronicæ* libram unam.

Aquæ fontanae . . . libras sex.

Macera per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper, cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Br. Wir.)

R. *Herbae Veronicæ recentis et contusæ* . . . libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc distillatione in balneo aquae uncias circiter duas Aquae abstrahæ; residuo triplum Aquae infunde, coque ad tertiæ partis remanentiam, clarifica et cola liquorem, ad electuarii consistentiam vaporando redige et illi non nisi tepido Aquam destillatam adde. (Sar.)

T. ut extractum verbenæ.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Syrupus de Veronica. (Wir.)

R. *Herbae Veronicæ* . . . uncias sex.

Aquæ Veronicæ alcoholicæ destillatæ . . . libram unam.

Infunde in loco calido, cola fortijter exprimendo et in liquore solve

Sacchari albi uncias sedecim.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus pectoralis. (Li.)

R. *Specierum pectoralium* (Li.) . . . uncias octo.

Caricarum . . . uncias quatuor.

Aqtæ . . . libras quinque.

Coquendo tertiam partem consume, cola exprimendo et colaturæ adde

Sacchari albi . . . libras quatuor.

Solutionem, postquam semel vel bis ebulliverit, cola.

Vicia.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung sind in den Pharmacopden angeführt:

1) *Vicia sativa*, L.; Fütterwicke; Vesce communis (Gal.).

Gal.

⊙ (*Diadelpbia Decandria*, L.; *Leguminosæ*, J.) Eine ursprünglich in der Levante einheimische, in ganz Europa gebaute Pflanze. (Oed. Fl. Dan. t. 522)

Man wendet den Saamen (semen *Viciae*) an; er ist schwarz und zusammengebrüht.

2) *Vicia Ervilia*, Cand; Erve; Ers (Gal.); *Ervilia*, Tara (Ang.); Erve (D.); Erven (Bel.); Erwa (Succ.).

Fer. Wir. Br. M. Sp.

⊙ Eine in Europa wachsende Pflanze. (Blackw. Herb. t. 208. f. 3.)

Man wendet den Saamen (semen *Erviæ* s. *Orobi*) an; er ist etwas platt, braun,

geruchlos und von einem unangenehmen, etwas bitterm Geschmack.

Das Wehl wird bisweilen zu erweichenden Breiumschlägen genommen.

Vinca.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopden angeführt:

1) *Vinca major*, L.; großes Sinngrün; *Pervenche majeure*, Grande *Pervenche* (Gal.).

Gal.

⊙ (*Pentandria Monogynia*, L.; *Apo-cynææ*, J.) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (Nouv. Duh. t. 14.)

Man wendet das Kraut an; es besteht aus eckunden, am Rande schwach behaarten am Grunde herzförmig ausgerandeten Blättern.

2) *Vinca minor*, L.; Sinngrün; *Pervenche mineure*, petite *Pervenche* (Gal.); *Small pervinche* (Ang.); *Vingraen* (D.); *Pervinca* (His. I. Lus.); *Vinkoorde* (Bel.); *Barwinck* (Pol.).

Br. Gal. His. Wir. Be. M. Vid. Sp.

⊙ Eine in einem großen Theile Europa's gemeine Pflanze. (Zorn lc. pl. t. 67.)

Man wendet das Kraut (*herba Vincæ* s. *Pervincæ* s. *Clematidis* s. *Daphnoidis*) an; es besteht aus einem dünnen und rankenden Stängel mit eirundlänglichen, glatten, glänzenden, kurzgestielten Blättern. Es hat keinen Geruch; der Geschmack ist bitter und abstringirend.

Beide Pflanzen sind schwach abstringirend.

Vinum.

Olvos; Wein; *Vin* (Gal.); *Wine* (Ang.); *Khumar* (Ar.); *Winuy* (B.); *Scherab unghury* (Duk.); *Vino* (His. I.); *Drachka mud* (Hi.); *Mey* (Pe.); *Wino* (Pol.); *Winho* (Lus.); *Mada*, *Madira* (Sa); *Win* (Succ.).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Galm. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. Lus. O. Pol. RC. Sax. Succ. A. Be. C. M. Par. Sa. T.

Eine rothe oder weiße Flüssigkeit, welche man durch Gährung des Weintraubensafts oder Weinmosts erhält.

Der Wein besteht aus Wasser, Alcohol, Schleim, Essigsäure, Weinsteinalkali, weinsteinsäurem Kalk und färbenden Stoffen, deren verschiedene Mengenverhältnisse zu einander die fast unzähligen Verschiedenheiten dieser Flüssigkeit hervorbringen, welche man im Handel antrifft.

Die Wirkungsart des Weines auf den Organismus ist sehr verschieden, je nachdem Alcohol, Zucker, Essigsäure oder Kohlen-

säure in demselben vorherrscht. Da man aber in der Therapie nur solche Weine anwendet, welche viel Alcohol oder mehr oder weniger herbes Wesen besitzen, wie der Bordeauxwein (Vinum Bordegalense), der Burgunder (V. Burgundicum), der Madera (V. Maderanum), der Alicantwein (V. Alicantinum), der Xeres (V. Xerense), der Malagawein (V. Malacense s. Hispanicum), der Ungarische (V. Hungaricum), der Rheinwein (V. Rhenanum), der rothe und weiße Franzwein (V. Gallicum rubrum et album), so wirken sie meist zugleich tonisch und erregend. Doch wendet man den Wein selten für sich allein an, sondern er dient in den meisten Fällen als Vehikel anderer Substanzen, deren Wirkung kräftiger ist oder dafür gehalten wird.

Cataplasma exsicicans. (Fer. Fi.)

R. Farinae Lupini . . . uncias octo.

— Secalis . . . uncias quatuor.

Vini albi . . . libras quatuor.

Coque sufficienter.

Lotio vinosa, Fomentatio vinosa.

(GalM. Ra.)

R. Vini rubri . . . libram unam.

Mellis . . . uncias duas.

Dissolve. (Ra.)

R. Tincturae aromaticae partem unam.

Vini rubri . . . partes viginti.

Misce. (GalM.)

Balsamum Samaritanum. (Ca. Pie. Sp.)

R. Vini generosi,

Olei Olivarum,

singulorum partes aequales.

Misce exacte.

Posca Galeni, Potio s. Linonada vino-

sa. (E. Ka. Sm. Sp.)

R. Vini . . . partes tres.

Aquae . . . partes duas.

Leviter coque. (Sp.)

R. Vini Hispanici,

Aquae fontanae,

Syrupi Ribium,

singulorum drachmas duas.

Misce. (Sm)

R. Vini albi,

Aquae, singulorum libram unam.

Alcoholis,

Syrupi tartarici,

singulorum unciam unam.

Misce. (Ra.)

R. Glaciei contusae mensuram (Unter-

tasse) dictam.

Vini Maderani

cochlear majus (Eßlöffel).

Aquae Cinnamomi hordeatae

cochlear minus (Kaffeelöffel).

Sacchari pulverati quantum vis.

Misce. (Sm.)

R. Vitellum Ovi . . . no. 1.

Olei Cinnamomi guttas viginti.

Vini albi,

Aquae Cinnamomi,

singulorum guttas tres.

— purae . . . uncias duas.

Sacchari . . . drachmas duas.

Misce. (E)

Man giebt von letzterer Potion drei Eß-

sel auf einmal.

V i o l a .

In den Pharmacopöen werden vorzüglich folgende drei Arten dieser Pflanzengattung angeführt:

1) *Viola odorata*, L.; Märzveilchen; Violette de Mars (Gal.); Sweet violet (Ang.); Manischor (Arm.); Viola woina neb modra (B.); Kiet-tuong-hoa (C.); Martsfioler (D.); Violetta (His. Lus.); Tamme viool (Fet.); Viola (I.); Fiolki (Pol.); Par hutschja (R.); Aekta fioler (Succ.).

Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. His. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür. Be. Br. C. Fi. G. M. Sp. Z.

¶ (Syngenesia Monogamia, L.; Violaceae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Fl. méd. VI. 369.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut, die Blüten und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Violariae s. Martiae) besteht aus vielen büscheligen Fasern und hat einen scharfen, widerlichen Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem Strauß herzförmiger, fein gefalteter, grüner, graugrüner, stumpfer oder etwas spitziger Wurzelblätter. Es ist geruchlos und hat einen trauartigen, schleimigen, etwas bitteren Geschmack.

Die Blüten besitzen die ihnen eigenthümliche blaue Farbe, verlieren bei'm Trocknen ihren angenehmen Geruch und haben einen bitteren, etwas schleimigen Geschmack.

Der Saame ist klein, rundlich und weißlich.

Die ganze Pflanze ist mehr oder weniger reizend, Ekel und Erbrechen erregend.

2) *Viola canina*, L.; Hundsvielschen; Violette sauvage (Gal.); Dog's violet (Ang.); Wilde fioler (D.); Wilde Viool (Bel.); Skogfioler (Succ.).

Gal. M.

¶ (Pentandria Monogynia, L.; Violaceae, J.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (Curt. Fl. Lond. t. 103.)

Die Wurzel (radix Violae caninae) ist scharf und Ekel erregend.

3) *Viola pedata*, L.; Violette digitée (Gal.).

Am. C.

¶ Eine Nordamerikanische Pflanze. (Pa. Fl. Amer. p. 171.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem Büschel handförmiger, farnförmig gezählter, mit Nebenblättern versehener Blätter.

Aqua Violarum. (Fer. Pal. Sar.)

℞. Florum Violarum partem unam.

Aquae . . . partes quatuor.

Post horas sex destillent partes duae. (Sar.)

Pal. Florum partem unam et Aquae tres; destillet pars una cum dimidia; — Fer. Florum partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo.

Julapium Violarum, Julap. violatum.

(Pal. Wir. Sp.)

℞. Sacchari albi

libras duas cum dimidia.

Aquae Violarum uncias viginti.

Ebulliant semel, tunc colentur.

Emulsio violata s. Violarum. (Wir. Sp.)

℞. Amygdalarum dulcium

unciam unam.

Seminum Violarum drachmas duas.

— Papaveris albi semidrachmam.

Aquae Violarum,

— Nymphaeae,

— Lactuae,

singulorum uncias tres.

Emulsioni adde

Syrupi Violarum unciam unam.

Succus Violarum. (H. S. Sar.)

℞. Florum Violarum a calicibus liberatorum . . . quantum vis.

Contunde in mortario fictil, cola exprimendo, succum in locum frigidum sepone et post aliquot tempus partem limpidam decantha.

Tabellae violatae s. Violarum. (Sar.)

℞. Succu Violarum . . . uncias tres.

Sacchari pulverati . . . libras duas.

Pulveris Iridis Florentinae

unciam unam.

Fiant tabellae.

Conserva Violarum. (His. Pal. Sar. Wir. Fi. T.)

℞. Florum recentium Violarum

partem unam.

Sacchari albi . . . partes duas.

Contere simul. (Pal. Wir.)

Sar. Fi. Petalorum partem unam cum Sacchari pauxillo tritorum in Sacchari clarificati partes tres injicere et unam ebullitionem jubet; — His. Contundere Petalorum partem unam, addere Syrupi spissi partes duas et lente ad aptam consistentiam usque evaporari; — T. ut conservam rosarum, praeterea et *Conservam siccam* cum Petalorum siccorum parte una, Sacchari quinque et Aquae Violarum q. s. confer. cons. rosar.

Infusum Violarum. (Sar. Par. C. Ra. T.)

℞. Florum Violarum drachmas duas.

Aquae bullientis . . . libras duas.

Infunde et cola. (Ra.)

℞. Florum Violarum . . . libras duas.

Aquae bullientis . . . libras octo.

Digere per horas octo et cola leviter exprimendo; operationem novies cum novis floribus repete. (Sar.)

T. 1) easdem quantitates, sed digestionem per horas duodecim; — praeterea 2) Aquae pondus duplum, digestionem per horas 24 et his repetere infusionem cum novis floribus.

℞. Florum Violarum,

Liquiritiae,

singulorum drachmas duas.

Aquae bullientis octarium unum.

Post refrigerationem cola. (Par. C.)

Bei Brustentzündungen empfohlen.

Mel Violarum. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Florum Violarum mundatorum,

Aquae bullientis,

singulorum libras sex.

Macera per horas viginti quatuor, cola exprimendo et colaturae adde

Mellis albi . . . libras sex.

Coque despumando ad syrupi spissi consistentiam. (Pal. Wir.)

℞. Succu depurati Violarum,

Mellis communis,

singulorum partes aequales.

Coque simul, despuma, cola et ad syrupi consistentiam redige. (Sar.)

Chedem wendete man diesen Honig besonders in Kistfir, zu anderthalb bis zwei Unzen, an.

Syrupus Violarum s. Viola odoratae

s. Petalorum Violarum. (Ams. An. B.

Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fer. Ful.

Gal. Gen. Han. Hass. His. Li. O. Pal.

Pol. R. Sar. Wir. Wtir. C. Fi. Sw. T. Vm.)

℞. Petalorum recentium Violarum

uncias octo.

Aquae bullientis uncias sedecim.

Digere per horas viginti quatuor, blando calore; cola levissima expressione et partibus octo liquoris adde

Sacchari albi partes quindecim.

Fiat syrupus. (Ams.)

B. et Bel. Petalorum uncias octo,

Aquae bullientis viginti, horas sex macerationis et Sacchari libras tres; —

Sar. Infusi partes duas et unam Sacchari; — Ba. Petalorum partem unam,

Aquae tres, duodecim horas infusionis et colaturae parti uni addere Sacchari partes duas; — Gal. Petalorum libras quatuor,

Aquae octo, horas duodecim infusionis et Sacchari duplum colaturae;

— Sw. Petalorum partem unam, Aquae duas, infusionis horas viginti quatuor

et Sacchari partes quinque pro tribus colaturae; — His. Petalorum libram

unam, Aquae duas, octo horas infusionis et quatuor libras Sacchari; — Hass.

Petalorum uncias octo, Aquae viginti, horas sex infusionis et Sacchari libras tres; — Bor. et Han. eandem quantitates, sed horas duodecim infusionis;

Bor. O. et Pol. Petalorum uncias octo, Aquae libras duas, duodecim horas macerationis et pro uncis viginti colaturae Sacchari libras tres; — Wüir. Violarum libram unam, Aquae tres et septem Sacchari; — Ed. C. Violarum partes duas, Aquae octo, horas viginti quatuor macerationis et Sacchari partes quindecim; — Du. libras duas Violarum, Aquae quinque et Sacchari uncias viginti novem; — R. Violarum libram unam, Aquae tres et Sacchari duplum colaturae; — Ful. Violarum uncias duodecim, Aquae bullientis uncias octodecim et duodecim horas digestionis; alias horas duodecim macerationis liquoris expressi cum uncis sex Petalorum recentium et Sacchari contusi uncias duodecim; — Fer. Fr. Violarum libram unam, Aquae tantidem, duos dies digestionis et Sacchari libras duas; — T. Infusum [T. 1]] cum Sacchari libris quindecim ad syrupi consistentiam redigere.

His. *Syrupus Violarum communis*: Violarum libram unam, Aquae bullientis libras quatuor, infunde per horae quadrantem et in colatura solve Sacchari libras sex.

℞. Sacchari albi . libras quatuor.

Aquae fontanae quantum sufficit. Coque ad syrupi spissi consistentiam et infunde in

Petalorum recentium Violarum libras duas.

Macera per tres dies in vase tecto, coque deinde leviter et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

℞. Petalorum Violarum recentium et mundatorum . libram unam.

Contere in mortario lapideo et infunde

Aquae bullientis uncias octodecim.

Post horas viginti quatuor digestionis cola exprimendo et colaturae uncis viginti adde

Sacchari albi uncias triginta duas, Coque lente. (Br. Pal. Wir.)

An. Violarum in pastam redactarum libram unam, Aquae libras duas, viginti quatuor horas digestionis et Sacchari libras tres cum dimidia; — Li. Florum libram unam contundere, calidae digestionis subjicere per horas duodecim in Aquae libris tribus, et cum libra una hujus infusi et Sacchari pulverati uncis viginti syrupum parare.

℞. Petalorum Violarum quantum libet. Aquae frigidae q. s

Macera per horas quatuor, sicca de-

inde flores, in linteo fortiter movendo, contunde et in pastam redactis infunde Aquae frigidae pondus illisaequale; tunc

Aquae bullientis aequale pondus.

Post refrigerationem cola leviter exprimendo, sepone, decantha et partibus quatuor colaturae adde

Sacchari albi . partes septem.

Dissolve absque hullitione. (Vm.)

Syrupus Violarum solutivus. (Wir. T.)

℞. Florum Violarum mundatorum uncias quatuor, Foliorum Sennae mundatorum uncias duas.

Aquae fontanae bullientis libram unam.

Digere per noctem in loco calido; altero mane exprime et colaturae uncis novem adde

T. *Syrupum solutivum cum Infuso* [T. 2] parare jubet.

Sacchari albi . uncias sedecim.

Oleum Violarum. (Br. Sar. Wir.)

℞. Florum Violarum mundatorum partem unam cum dimidia.

Olei Olivarum . partes tres.

Post duos dies digestionis in balneo aquae cola exprimendo et digestionem cum novis Floribus repete. (Sar.)

℞. Florum Violarum,

Olei Olivarum, singulorum partes aequales.

Coque lente ad humidam consumptionem usque et cola exprimendo. (Br. Wir.)

Virga aurea.

Solidago Virgaurea, L.; *Golbruthe*, *Heidenwundkraut*; *Verge d'or* (Gal.); *Saracens woundwort* (Ang.); *Swalnjik prostednj*, *Wysokytraus* (B.); *Heiden-sche wondkruid* (Bel.).

A. Ams. Br. Du. Ful. Gal. Gen. His. Li. Wir. Wüir. Be. C. M. Pid. Sp. Z.

♀ (*Syngenesia Polygamia Superflua*. *Synantheraeae Cass.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 383.)

Das Kraut (herba *Virgae aureae* s. *Consolidae saracenicae* s. *Solidaginis saracenicae*) besteht aus einem behaarten, ästigen Stängel, dessen untere Blätter elliptisch, die obere lanzettförmig sind. Es hat einen bitteren, stypfischen und etwas gewürzhaften Geschmack.

Harntreibend.

Extractum Virgae aureae. (Wüir.)

℞. Herbae *Virgae aureae* quantum vis.

Coque per horam unam in Aquae communis sufficiente quantitate, cola exprimendo, sepone et decantha liquo-

rem, qui ad mellis spissi consistentiam evaporet.

V i s c u m.

Viscum album, L.; Mistel; Gui blanc (Gal.); Mistel (Ang. Suec.); Dubowe melj (B.); Fuglelim (D.); Visco (His.); Marentakken (Bel.); Viscchio (I.); Jemiel (Pol.); Visgo (Lus.).

A. Ams. Ba. Bor. Br. Fer. Gal. Gen. Han. His. Li. O. Pol. Sax. Wir. Wür. Be. Br. Fi. G. M. Sp. Z.

Ein Schwarzelebskraut (Dioecia Tetrandria, L.; Lorantheae, J.), welcher in ganz Europa wächst. (Blackw. t. 184. Plenck t. 703. Hayne IV. t. 24. Düss. off. Pfl. II. t. 14. Zorn Ic. pl. 1. 54.)

Man wendet die Stängel (*Viscum quernum* s. *quercinum* s. *lignum Visci*) an; sie sind holzig, walzenförmig, fast vom Grunde an in zahlreiche Gabelzweige getheilt, von hellgrüner oder schwach gelblicher Farbe. Der Geruch ist schwach und eigenthümlich unangenehm; der Geschmack widerlich, etwas herbe und schleimig; beide verlieren sich beim Trocknen.

Abstringirend, Ekel und Brechen erregend, seit lange gegen Epilepsie berühmte. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis ganze Drachme, drei oder vier Mal täglich, in Syrup. Colbath verbindet es mit Stinklabran, Sufeland und Lissot mit Balbrian.

Pulvis antispasmodicus infantum. (Au. Huc.)

R. Oculorum Cancrorum,
Cornu Cervi raspati,
Radix Valerianae,
Visci albi,

singulorum partes aequales.

Bei Diarrhöe, Erbrechen und schwerem Schlaf der Kinder empfohlen. — Gabe, ein halber Scrupel. (Huf.)

R. Visci perni,

Radix Quercinae,

— Fraxinellae, singulorum drachmas duas cum dimidia.

Ligni Aloës,

Oculorum Cancrorum,
singulorum drachmam unam.

Succini albi . . . semidrachmam.

Cornubis . . . drachmas duas.

Extractum Visci albi aquosum. (Fer.)

R. Stiptum Visci querni

libram unam.

Aquae libras tres.

Coque, cola exprimendo, colaturam Albuminis ope clarifica et lentae vaporationi subijce.

Extractum Visci albi vinosum. (Sar.)

R. Stiptum Visci . . . libram unam.

Vini albi generosi

libras quinque ad sex.

Post tres dies digestionis super arenae balneo cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum novi Vini sufficiente quantitate ad dimidii usque consumptionem, quo facto liquores ambo commixti lente ad extracti consistentiam evaporent.

Decoctum Visci albi. (B*. T)

R. Visci . . . unciam unam ad duas.

Aquae fontanae . . . octarios duos.

Decoque ad dimidiae partis remanentiam. T. Visci uncias tres, Aquae l bras quatuor — Bei Epilepsie empfohlen.

Decoctum antivenereum Musitani (Fi.).

Sarsaparillae unciam unam, Ligni Visci, Cornu Cervi raspati, Antimonii crudi, Pumicis, singulorum unsemunciam, Aquae communis libras tres ad dimidium decoquere. Gabe: auf ein n Tag in kleinen Quantitäten.

Decoctum del Pomponaccio (Fi.). Sarsaparillae, Ligni Visci, singulorum uncias duas, Sulphureti Antimonii, Pumicis pulv., singulorum sesquunciam, Aquae communis libras 24. Antimonium cum pumice in nodulum inclusam cum reliquis substantiis in Aquam demersa coquantur ad dimidium et colentur. Gabe, sechs Unzen bis ein Pfund.

V i t i s.

Vitis vinifera, L.; Weinstock; Vigno (Gal.); Vine (Ang.); Inub (Ar.); Otrik (Arm.); Kmen winny (B.); Pu-tao (C.); Sur medan (Ca.); Well mudika gheddie (Cy.); Wuntrae (D.); Ungur (Duk. Pe.); Vid (His.); Dakh (Hin.); Wyngaard (Bel.); Vite (I.); Buangur (Ma.); Winna macica (Pol.); Videira (Lus.); Winegrad (R.); Drakscha (Sa.); Winstock (Suec.); Kodimundrie pullum, Dividatsi pullum (Tam.); Draohupundu (Tel.).

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L., Viniferae, J.), welcher wahrscheinlich aus Asien stammt. (Blockw. t. 155. Schk. t. 49. Jacq. Io. rar. t. 50. Zorn Ic. pl. t. 276.)

Man wendet die Weinranken mit den Blättern und die Früchte an.

Die Blätter sind groß, anfangs oberhaarig, unten filzig und weiß, dann fast glatt, am Grunde herzförmig, mit drei oder fünf eingeschnittenen spitzigen Lappen. — Man hält sie für stärkend.

Die Früchte,

Uvae; Weintrauben, Rosinen; Raisin (Gal. Ang.); Zibib (Ar. Mal.); Vebitoba mudika gheddie (Cy.); Kischmisch (Duk. Hin.); Passas (His.); Rozynen (Bel.); Mewur (Pe.); Uvas passadas (Lus.); Russin (Suec.); Dividatsi palavutti (Tam.).

E. G. M.

sind bekannt genug. Die unreifen heißen *Omphacium*, *agresta*: Verjus (*Gal.*). Sie haben dann einen sauren und abstrinzirenden Geschmack. Man wendet sie selten an, und stets in Fällen, wo säuerliche Mittel angezeigt zu seyn scheinen.

Reif ist ihr Geschmack süß und zuckerig. Der ausgepreßte Saft giebt den Most, Mustum; Most (*Gal.*). Unter dieser Gestalt gehören sie weniger der eigentlichen Medicin an. Häufiger bedient man sich ihrer in der Sonne getrocknet. Man unterscheidet zwei Sorten getrockneter Weinbeeren:

1) *Passulae majores*, *Uvae passae*, *Zibebae*; große Rosinen, Zibeben; gros raisins, Raisins de casse (*Gal.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gen. Ham. Hass. H. s. Lon. Lus. R. Sax. Suec. Wir. Wür. Be. C. G. M. Pid. Sp.

Man findet davon mehrere Varietäten.

A. Smyrnaer oder Damascener Rosinen; Raisins de Smyrne, de Damas (*Gal.*); fast so groß, wie kleine Pflaumen, länglich, zusammengebrückt, runzlich, bräunlichgelb.

B. Französische oder Spanische; Raisins de France, d'Espagne (*Gal.*); kleiner und dicker und von bräunlicher Farbe.

C. Calabrische; Raisins de Calabre (*Gal.*), dick, dunkelgefärbt und etwas klebrig.

2) *Passulae minores* s. *Corinthiacae* s. *Corinthinae*; kleine Rosinen, Corinthen; petits raisins, Raisins de Corinthe (*Gal.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gen. Ham. Hass. Lus. R. Sax. Suec. Be. G. M. Pid. Sp.

Sie sind schwarz, von der Größe kleiner Eisen und ohne Kerne.

Die getrockneten Weinbeeren oder Rosinen sind erweichend.

Pulpa Passularum. (Br. Pal. Wir. Wür. T.)

℞. *Passularum minorum* quantum vis. *Aquae* . . . quantum sufficit.

Coctione mollefactis passulis, pulpam per cribrum e crinibus confectum trajice, adde aquam decocti et totum ad aptam consistentiam vaporando consume. (*Gal. T.*)

Br. Pal. et Wir. *Pulpae* addere jubent *Sacchari dimidium*; — Wür. *Sacchari trientem*.

Roob s. *Sapa Uvarum*. (*Gal. Sar. Wür.*)

℞. *Succi Uvarum* . . . quantum vis.

Coque modico igne, ad mellis consistentiam. (*Gal. Sar.*)

℞. *Succi Uvarum* depurati
libram unam.

Sacchari albi . . . uncias tres.
Coque simul ad mellis consistentiam.
(Wür.)

Decoctum Passularum majorum. (B*. Au.)

℞. *Passularum minorum* lotorum et enucleatorum uncias quatuor.

Aquae fontanae . . . libras tres.

Coquendo tertiam partem consume et cola. (B*.)

℞. *Passularum minorum*
uncias quatuor.

Hordei mundati,

Liquiritiae, singularum semunciam.

Aquae . . . libras sex.

Coque et colaturae refrigeratae adde

Syrupi Succi Citri uncias duas.

Misce. (Au.)

Syrupus Uvarum. (A.)

℞. *Succi Uvarum* recenter expressi
libras centum.

Coque in vase cupreo stanno obducto, donec spuma nulla amplius prodect, tunc ab igne removendo et continue agitando, sensim adde

Cretae pulveratae libram unam

vel quantum satis ad saturandum acidum. Sepone per horas duodecim in loco frigido, decantha succum clarum

et coque, despumando, ad syrapi spissitudinem.

Species bechicae. (Br. Pal. Wir. Sp.)

℞. *Passularum minorum*
unciam unam.

Siliquae dulcis,

Jubarum,
singularum drachmas sex.

Dactylorum . . . uncias duas.

Caricarum pinguium,

Hordei mundati,
singularum unciam unam.

Liquiritiae,

Capilli Veneris Mospeliaci,
singularum semunciam.

Hyssopi . . . drachmas duas.

Concisa misce. (Br. Wir. Sp.)

Pal. eandem formulam sed loco siliquae *Sebestenas* indicat.

Succus Agrestae, Omphacium. (*Gal. His. Sar. T.*)

℞. *Omphacii* . . . quantum vis.

Contunde in mortario porphyreo, cola per pannum, sepono succum, decantha et in lagena longicollis sub strato olei serva.

T. ut succum myrtillorum. — Unguentum sauer, in allen Fällen, wo säuerliche Mittel angezeigt sind.

Syrupus Agrestae s. de Agresta. (*Gal. His. Lus. Sar. Wir. T.*)

℞. *Succi Agrestae* recentis, depurati et filtrati . . . libras duas.

Sacchari libras tres cum dimidia.

Liqua blando calore. (Gal.)

Wir. Succis sesquilibram et Sacchari libras duas; — Pal. Succis libras quinque et tres Sacchari; — His. Succis libram unam et duas Sacchari; Suesc. Succis et Syrupi communis quantum sufficit ut fiat vaporazione in balneo aquae syrupus; — T. Succis libras quatuor, Sacchari septem et si placet addere Oleosacchari Limonum vel de Cedro pauxillum.

Unguentum s. Pomatum adstringens. (Bo.)

℞. Omphacii uncias octo.
Unguenti rosati libram unam.
Cerae flavae uncias quatuor.

Coque ad liquidi aquosi consumptionem, post refrigerationem faeces separa, denuo liquefac et Essentiam Rosarum adde.

Extractum Vitis Pampinorum. (Bor4.)
Ut extractum aconiti, calendulae etc.

X.

Xanthium.

Xanthium strumarium, L.; Kropfflette, Kropfbutterlauch, Klissen; Lampourde, Petit Glouteron, Petite bardane (Gal.); Lesser burdock (Ang.); Gaaseskreppe (D.); Lampazo pequeno (His.); Kleine Klissen (Bel.); Lappola minore (I.); Bardane menor (Lus.); Spetshorre (Suec.).

Br. Gal. Lus. Wir. M. Sp.

⊙ (Monoecia Pentandria, L.; Synanthreae, Cass.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Zorn Ic. pl. t. 269.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Xanthii s. Bardanae s. Lappae minoris) besteht aus einem kantigen, ästigen Stängel, abwechselnden, gestielten, fast rundlichen, herzförmigen, gezähnten, bucktigen, etwas lappigen, behaarten, scharf anzufühlenden, am Grunde dreinervigen Blättern.

Der Saame ist klein, länglicheirund, an beiden Enden spitzig, auf einer Seite eben, auf der andern gewölbt, röthlich und steckt in einer festen, länglichen, an der Spitze eingeschnittenen, außen mit Spigen besetzten Hülle.

Der Geruch ist unangenehm, der Geschmack scharf und bitter.

Ehedem wendete man den Saft zu sechs Unzen gegen Kropf an.

Z.

Zantorrhiza.

Zantorrhiza apiifolia, L'Her.; Gelbwurzt; Zanthorrhize à feuilles d'ache (Gal.); Yellow root, Parsley leav'd yellow root, Shrub yellow root (Ang.).

Am. C.

Ein kleiner Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Ranunculaceae, J.) Wirginien's. (L'Her. St. nov. p. 79. t. 38.)

Die Wurzel ist länglich, von der Stärke des kleinen Fingers, mit vielen kleinen Fasern besetzt und gelb. Sie hat einen bittern Geschmack.

Zanthoxylum.

Zanthoxylum clavatum, L.; Zahnweibholz; Clavialier à feuilles de frêne, Frêne épineux (Gal.); Prickly ash, Toothach-tree (Ang.).

Am. C.

Ein Baum (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, J.) der Antillen.

Die Rinde, welche man anwendet, ist braun und scharf; sie dient gegen Zahnschmerzen. Die Tinctur benützt man in America bei chronischen Rheumatismen.

Z e a.

Zea Mays, L.; Mais, Türktischer Weizen; Mais, Blé d'Espagne, Blé d'Inde, Blé de Turquie (Gal.); Indian korn (Ang.); Tyrkisk korn (D.); Mais (His.); Mays (Bel.); Gran turco (I.); Maiz, Milho de Turquia (Lus.); Turkisk korn (Suec.)
Gal.

⊙ (Monoecia Triandria, L.; Gramineae, J.) Eine in America einheimische Pflanze. (Blackw. Herb. t. 547.)

Man wendet den Saamen (semen Mays) an; er ist rundlich, eckig, von der Größe

einer gewöhnlichen Erbse, außen goldgelb, innen weiß und glänzend.
Mehlig, nährend.

Zedoaria.

Radix Zedoaria; Bitterwurzel, Bitterweringer, Bitterwurzel; Zédoaire (*Gal.*); Zedoary (*Ang.*); Judwar, Bar (*Ar.*); Bhuchampa, Junglie huldie, Bun huldie (*Beng.*); Cycwar (*B.*); Nagaimio (*Ca.*); Kaha, Wulkaha (*Cy.*); Ambie huldie (*Duk.*); Zedoaria (*His.*); Nirbisi (*Hin.*); Bokzedoar (*Bel.*); Matan kua (*Malab.*); Cytwar (*Pol.*); Bhu champaka, Nirvischa, Vanaharidra (*Sa.*); Sittwer (*Succ.*); Castarie munjel (*Tam.*); Castorie passapu (*Tel.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. His. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Pid. Sa. Sp. Z.

Man unterscheidet zwei Sorten Bitterw.

1) *Zedoaria longa*, langer Bitterw., einige Zoll lang, fingerdick, runzlig, knotig, außen graulich, imwendig bräunlich.

2) *Zedoaria rotunda*, runder Bitterw., einen Zoll lang mit rauher, runzlicher, mit Fasern bedeckter Oberfläche.

Der Bitterw. kommt in harten, weißlichen, von der Oberhaut entblößten Stücken zu uns. Er ist gewürzhaft, scharf und beißend.

Er enthält viel Sagmehl und ein weisses kampherartiges Del.

Der lange Bitterw. wird allgemein für die Wurzel von Amomum Zedoaria, *Willd.*, angesehen, einer Pflanze 2 (Monandria Monogynia, L.; Amomeae, J.) Ostindiens (Fl. méd VI. 349.). Was den runden anlangt, so sind einige Schriftsteller, unter andern Ainslie und Guibourt, der Meinung, daß er von Kaempferia rotunda, L., abstamme. Andere, z. B. M é r a t, glauben, beide seyen bloße Spielarten der Wurzel einer und derselben Pflanze, durch Dertlichkeit und Art des Wachstums bedingt.

Reizend, tonisch, magenstärkend. — Gabe des Pulvers, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Extractum Zedoariae. (Br. Pal. Sar. Wir. T.)

℞. Radicis Zedoariae libram unam.
Alcoholis . libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo; residuum digere, tunc coque parumper cum Aqueae libris tribus, clarifica decoctum Albuminis ope; liquores commisce et alcohol destillando separato, residuum lenta vaporazione consume. (Br. Pal. Wir.)

℞. Zedoariae . . . libram unam.
Vini albi generosi

libras quinque ad sex.
Digere per tres dies super arenae balneo, tunc residuum coque cum novi Vini sufficiente quantitate ad dimidii remanentiam; liquores commixti lente ad extracti consistentiam evaporent. (Sar.)

T. Zedoariae libram unam, Aqueae bullientis octo, infunde per horas 24, filtra et consume.

Tinctura s. Essentia Zedoariae. (Ams. Br. Han.)

℞. Radicis Zedoariae partem unam.
Alcoholis (0,907) . partes octo.
Digere per dies octo et filtra (Ams.)
Br. Radicis partem unam et quinque Alcoholis; — Han. Radicis uncias quinque et Alcoholis libras duas.

Reizend. — Gabe, sechszig Tropfen täglich zwei Mal.

Tinctura Zedoariae composita, Essentia carminativa Wedelii. (B*. Br. Han. Pal. Sax. Wir. Ca. Sp.)

℞. Radicis Zedoariae uncias quatuor.

— Carlinae,
— Calami,
— Galangae,
singularum uncias duas.

Florum Chamomillae Romanae,

Seminum Anisi,

— Carvi,
singularum unciam unam.

Caryophyllorum,

Baccarum Lauri,

singularum drachmas sex.

Macidis semunciam.

Corticis Aurantiorum unciam unam.

Spiritus Corticis Citri

libras quatuor et dimidiam,

— Nitri dulcis

uncias duas cum dimidia.

Infunde per dies sex, exprime et filtra. (B*. Br. Han. Sax. Wir. Sp.)

℞. Radicis Zedoariae unciam unam.

— Carlinae,

— Galangae,
singularum semunciam.

Corticis Aurantiorum,

Seminum Anisi,

— Carvi,

Florum Chamomillae Romanae,

Caryophyllorum,

Baccarum Lauri,

Acori veri,

singularum sesquidrachman.

Macidis drachmam unam.

Spiritus Corticis Citri libras duas.

Acidi nitrici semunciam.

Post sufficientem digestionem filtra.

(B*. Pal.)

℞. Radicis Zedoariae unciam unam.
 — Carlinae,
 — Calami aromatici,
 — Galangae,

singulorum semunciam
 Florum Chamomillae,
 Seminum Anisi,
 — Carvi,
 Corticis sicci Aurantii,
 singulorum drachmas duas
 Baccarum Lauri,
 Caryophyllorum,
 singulorum sesquidrachmam.

Macidis . . . drachmam unam.
 Spiritus Citri . . . libram unam.
 Acidi nitrici drachmas quinque.
 Reizend, magenstärkend, blähungtreibend,
 Menstruation befördernd und harntreibend.
 — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Tinctura bezoardica. (Pal. Wir. Sp.)

℞. Radicis Zedoariae,
 — Serpentariae Virginicae,
 — Angelicae,
 — Pimpinellae albae,
 Herbae Scordii,
 — Dictamni Cretici,
 Baccarum Juniperi,
 Corticis Citri,
 Myrrhae, singulorum drachmas sex.
 Spiritus Florum Sambuci rectifi-
 cati libram unam.

Post sufficientem digestionem cola
 exprimendo et liquori adde

Spiritus Tartari . . . uncias sex.
 — Vitrioli . . . uncias duas.

Camphorae semunciam.
 Digere, filtra et serva. (Pal. Wir.)

℞. Radicis Zedoariae . uncias duas.
 — Angelicae,
 — Pimpinellae albae,
 — Valerianae,
 — Vincetoxici,
 — Calami aromatici,
 — Costi Arabici,
 singulorum unciam unam.

Corticis Citri recentis,
 Baccarum Juniperi,
 singulorum uncias duas.

Myrrhae uncias tres.

Herbae Scordii . . . sesquunciam.

— Melissae,
 — Millefolii,
 — Rutae, singularum uncias
 septuaginta duas.

Camphorae unciam unam.

Theriaca libram unam.

Alcoholis libras sex.
 Post octo dies digestionis adde

Aquae fontanae . . . libras duas.
 Destillentur, tunc

℞. Hujus Spiritus . . . libras duas.
 Spiritus Tartari . . . semilibram.

Acidi sulphurici . uncias tres.
 Misce, Succum Baccarum Paridis ad
 colorandum adde et filtra. (Wir. Sp.)
 Reizend, ehebem bei fauligen Fiebern em-
 pfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme.

Oleum Zedoariae aethereum, Aethe-
 reoleum Zedoariae. (Br. Pal. Wir. T., 1)

℞. Zedoariae partes sex.
 Aquae partes triginta sex.

Salis culinaris . . . partem unam.

Post quatuor vel quinque dies mace-
 rationis destillatio fiat et oleum in fun-
 do recipientis subsidens eximatur.

T. ut oleum valerianae.

Aqua Zedoariae vinosa. (Br. Wir.)

℞. Zedoariae partem unam.
 Vini generosi . . . partes duodecim.

Destillet dimidia pars. (Wir.)

℞. Zedoariae uncias sex.
 Vini libras tres.

Alcoholis,
 Aquae, singulorum sesquilibram.

Destillent librae quatuor. (Br.)

Aqua Zedoariae anisata. (Pal. Sar. Wir.
 Pid.)

℞. Zedoariae uncias sex.
 Anisi uncias tres.

Corticis Citri uncias duas.
 Alcoholis libras sex.

Destillet dimidia pars. (Pid.)

Pal. Sar. et Wir. Zedoariae uncias
 sex, Anisi uncias tres, Corticis Citri
 unciam unam et Vini albi libras octo;

post octo dies infusionis destillet di-
 midia pars.

Z i b e t h u m.

Zibetha; Zibeth; Civette (Gal.); Ci-
 vet (Ang.); Zibeto (His.); Sivet (Bel.);
 Zibetto (I.).

Br. Gal. His. Wir. Br. G. Pid. Sp. T.

Eine halbflüssige, falbenartige, weißliche
 oder gelbliche, an der Luft braun und sehr
 dick werdende Substanz von sehr starkem

Geruch, welche von Drüsen abgesondert
 und in einem zwischen After und Geschelechts-

theilen des Zibeththiers, Viverra Zibetha,
 L., eines nagenden Säugethiers Asien's und

Africa's, befindlichen Beutel abgeseigt wird.

Reizend, krampfstillend. — Gabe, fünf
 bis sechs Gran.

Z i n c u m.

Stannum indicum; Zink; Spiauter;
 Zinc (Gal.); Zinc (Ang.); Pisyuen (C.);

Sungbusrie (Duk.); Zinco (I. Lus.);
 Cynk (Pol.); Spiagter (R.); Tutuna-

gum (Tam.).
 A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor.

Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O. Poi R. RC. Sax. Suec. Wür. A. C. Fi. Pid. Sp. T.

Ein dertes, bläulichweißes, blättriges, sehr streckbares, aber eher zu Blechen zu schlagendes als zu Draht ziehbares Metall, welches die Feile fettig macht und daher nicht sehr hart, schon bei Rothglühhöhe schmelzbar ist, sich verflüchtigen läßt, mit sehr heller Lichtentwicklung brennt und auf feuchte Luft nur eine sehr schwache Wirkung ausübt. Specif. Schw. = 6,8 — 7,1.

Zincum purum; reines Zink. (HassP.)

Vel laminatum vel fundendo et moduli ferrei anrichalce canalicati infusorii ope in cylindros formatum.

Chloruretum Zinci.

Murias s. Butyrum Zinci. (B.)*

℞. Acidi hydrochlorici puri

uncias tres.

Injice sensim Zincum granulatum donec nihil amplius dissolvatur, solutionem uncias tribus Aquae dilue, filtra liqoreum et ad siccum consume.

Abstringirend, Brechen erregend.

Aether Zinci, Solutio Murialis s. Hydrochloratis Zinci aetherea. (B. Vm.)*

℞. Hydrochloratis Zinci sicc

semunciam.

Alcoholis absoluti unciam unam.

Aetheris sulphurici uncias duas.

Post aliquot dies decantha. — Krampfstillend. — Gabe, vier bis acht Tropfen, täglich zwei Mal.

Cyanuretum Zinci, Hydrocyanas Zinci. (B. Ma.)*

℞. Hydrocyanatis Potassae

quantum vis.

Injice solutioni salis hujus Sulphatem Zinci, donec nullum amplius praecipitatum provocetur, quod siccatum ad ruborem usque obscurum calcina.

Das Product ist ein Gemisch von blausaurem Zink und Potassium. — Man hat es bei nervöser Carbialgie gerühmt. — Gabe, von einem Viertel bis zu anderthalb Gran in einem Trank, öftelweise.

Pulvis antispasmodicus. (Ma.)

℞. Cyanureti Zinci granum dimidium. Magnesia calcinatae

grana quatuor.

Cinnamomi grana tria.

Alle vier Stunden zu nehmen.

Protoxydum Zinci, Oxydum s. Oxodas Zinci s. zincicum, Zincum oxydatum.

A. Wie man es im Handel findet.

1) *Nihil album*; weißes Zinkoryb.

B. BorC Br. Fenn. Sax. Suec. Wir. Wür. Par. Sp. T.

In wolligen, sehr weißen und leichten, geschmack-, geruchlosen und in Wasser unlöslichen Klotten, welche sich beim Verbrennen des Zinks in freier Luft bilden.

2) *Tutia, Tuthia, Tutia Alexandrina, Boirytis, Cadmia, Cadmia facit'a, Nihilum griseum, Oxydum zincicum griseum*; Tutie, graues Zinkoryb; Cadmie des fourneaux (Gal.).

Am. An. B. Bel. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. Hass. HassP. His. Lon. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Wür. C. Fi. Sp. T.

In dicken, berben, schweren, aschgrauen, harten, schwer brechenden, narbigen und rauhen Schuppen, welche sich in den Rauchfängen der Oefen erzeugen, wo man Bleierze, die Schwefelzink enthalten, schmilzt. Es ist das Protoryb, mit fremden Stoffen gemischt.

Tutia praeparata, Protoxydum Zinci impurum. (Fi.) Tutiam exandescentem in Aquam frigidam injice; bis vel ter repetendo, pulvera et cum Aqua laevigatam in pastam redige, quam sicca.

3) *Calamina, Calaminaris Lapis, Carbonas Zinci impurus s. impura, Carbonas zincicum terrestre s. Oxydi Zinci, Oxydum Zinci nativum, Zincum terrestre, Cadmia fossilis, Zincum oxydatum calaminare (H.), Hydrosilicas Zinci (B.); natürliches Zinkoryb, Galmeistein; Calamine, Cadmie fossile, Pierre calaminaire, Zinc oxyde calaminaire (H.), Hydrosilicate de zinc (B.).*

Am. Ams. An. B. Bel. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonV. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Wür. C. G. Pid. Sp. T.

In unregelmäßigen, schweren, weißlichen, graulichen oder röthlichen Stücken Neubant's Benennung ist sehr bezeichnend, da es in der That ein Wasserstoffzinksilicat ist, welches zuflüssig Eisenoryb, Mauererde und kohlensauren Kalk beigemischt enthält.

Oxycarbonas Zinci impuri praeparatus, Lapis calaminaris praeparatus (RC.) torrefaciendo Oxycarbonatem impurum, ut carbonas calcis paratur.

B. Im Ganzen bereitet.

1) Auf trockenem Wege. *Flores Zinci, Nihil album, Pompholix, Lana philosophica, Oxydum zincicum s. Zinci s. Zinci album s. Zinci per se, Oxodes Zinci album, Calx Zinci, Zincum oxydatum album.*

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN.

Læs. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir.
Wir. Br. C. Fi. Fid. Sp. Sw. T. Vm.

℞. Zinci quantum vis.
In crucibulum amplum et profundum
immitte, prunis superponendum, igne
nem ad fusionem metalli et donec
flammas emittat auge; crucibulum
deinde alio, obverse imposito tege et
floccos in hoc crescentes collige.

2) Auf feuchtem Berge. *Magisterium Zinci, Zincum praecipitatum, Zincum oxydatum via humida paratum; Zinkpräcipitat; Magistere de zinc (Gal.).*
Ams. Bor. Bor4. D. Fer. Gal. Han
Li. O. Sax. Fi. T. Vm.

℞. Sulphatis Zinci quantum vis.
Dissolve in Aquae sufficiente quantitate et in solutionem sensim infunde Subcarbonatem Potassae vel Sodae, donec non amplius eliciatur praecipitatum, quod lotum siccetur.

Das Product ist Zinksubcarbonat; Gal. spricht zweimal davon als *Oxydum Zinci per praecipitationem* und *Carbonas Zinci*. Durch viertelstündiges Calciniren des Präcipitats, welches Sax. anwendet, wird es gelb und nicht völlig rein.

℞. Zinci sulphurici siccati

partes novem.
Kali nitrici partem unam.

Mixta in crucibulo ure donec portunculae exemptae solutio filtrata additis tinctura gallarum et liquore ammonii caustici praecipitatum album nec tempore in colorem violaceum vergens demittat. Post refrigerationem massam remanentem a crucibulo separatam et tritam cum

Aquae fervidae decuplo
miscere saepius agitando digere, ut solubile solvatur et ferrum separetur. Filtra et liquori limpido adde

Natrum carbonicum depuratum in

Aquae communis q. s. solum
quamdiu praecipitatum producit, quod bene edulcoratum et siccatum excandescat in crucibulo tecto, donec portunculae cum aqua mixtae acidum quodlibet affusum nullam efficiat effervescentiam, tum adhuc calidum in vitrum ingestum serva. (Bor4.)

Das Zinkoxyd wird äußerlich als abstrigendes, innerlich als krampfstillendes und Brechmittel angewendet. Man empfiehlt es bei Epilepsie, Hysterie und Neuralgien. — Gabe, von sechs Gran bis eine halbe Drachme. — Man giebt es auch in Pillenform.

Pulvis Zinci oxydati albi s. antispasmodicus. (Ful. Au.)

℞. Florum Zinci grana duodecim.
Sacchari drachmam unam.

Divide in sex partes. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück, bei Keuchhusten und convulsivischen Krankheiten der Kinder. (Au.)

℞. Florum Zinci granum unum.
Laudani Sydenhami guttam unam.
Sacchari scrupulum unum.

Alle drei Stunden, bei Krämpfen der Kinder. (Au.)

℞. Florum Zinci drachmam unam.
Opii grana decem.
Chinae,
Foeniculi,

singulorum unciam unam.
Divide in partes quinquaginta. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück, bei Keuchhusten. (Au.)

℞. Florum Zinci grana tria.
Scillae pulveratae,
Sulphuris aurati Antimonii,
singulorum semigranum.
Subcarbonatis Magnesiae

drachmam unam.

Divide in partes sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei rheumatischem krampfhaftem Asthma. (Au.)

℞. Florum Zinci grana duodecim.
Opii grana tria.
Extracti Chinae flavae aquosi

drachmam unam.
Elaeosacchari Anisi drachmas duas.

Pulvera et divide in partes duodecim. (Ful.)

Pulvis stomachicus. (B.)

℞. Florum Zinci granum unum.
Magnesiae calcinatae
scrupulum unum.

Alle zwei Stunden, bei Verdauungsbeschwerden.

℞. Florum Zinci grana quatuor.
Colombo grana triginta.

Divide in partes quatuor. — Gabe, alle drei Stunden ein Stück.

Collyrium siccum. (Ca. Ra.)

℞. Tutiae,
Sacchari crystallisati,
singulorum semidrachmam.

Fiat pulvis tenerrimus. (Ra.)

℞. Tutiae,
Iridis Florentinae,
Sacchari crystallisati,
singulorum partes aequales.
Fiat pulvis tenerrimus. (Ca.)

Pulvis cephalicus niger. (Li.)

℞. Florum Zinci drachmam unam.
Pulveris Visci,

— Carbonis,
singulorum unciam unam.

Gabe, fünfzehn bis zwanzig Gran für ein Kind von einem Jahre.

Pulvis antistrumosus. (Au. Sm.)
 ℞. Oxydi Zinci . . . uncias quatuor.
 Ossis Sepiae,
 Testarum Ovorum,
 singulorum uncias duas.
 Telae laneae scarlatinae (drap d'écarlate) . . . sesquiunciam.
 Combure simul in vase clauso et residuum pulvera. (Sm.)
 Au. Oxydi semunciam, Testarum drachmas duas et Telae sesquidrachmam.
 Gabe, achtzehn Gran, täglich zwei Mal für einen Erwachsenen. — Dieses Mittel wird von Dehaen empfohlen.
Boli diaphoretici sedantes. (B.)
 ℞. Florum Zinci,
 Extracti Aconiti,
 singulorum grana quatuor.
 Sulphuris Antimonii aurati
 grana duo.
 Liquiritiae pulveratae,
 Mellis,
 singulorum quantum sufficit.
 Fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei Hüftweh, Weitsitz, Hysterie, Rheumatismen und chronischer Gicht.
Pilulae lenientes s. sedantes. (Gen. B. E.)
 ℞. Florum Zinci . . . scrupulos duos.
 Conservae Cynorrhodontis
 quantum sufficit
 ut fiant pilulae viginti quatuor. (Gen. E.)
 ℞. Florum Zinci . . . grana octo.
 Extracti Aconiti . . . grana sex.
 Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle vier Stunden. (B.)
 Diese Pillen werden bei Epilepsie, Weitsitz und chronischen Exanthemen empfohlen.
Collyrium astringens. (Sw.)
 ℞. Florum Zinci . . . drachmam unam.
 Mucilaginis Seminum Cydoniorum
 cum Aqua Rosarum praeparati
 uncias decem.
 Contere simul.
Lotio e Zinco et Cupro composita s. adstringens. (Au. E. Sp. Sw.)
 ℞. Florum Zinci . . . grana duodecim.
 Sulphatis Cupri
 grana tria ad quatuor.
 Mellis rosati . . . drachmam unam.
 Aquae Calcis . . . uncias duas.
 Zum Verbinden venerischer Geschwüre empfohlen. (E. Sp. Sw.)
 ℞. Florum Zinci . . . unciam unam.
 Aquae Florum Sambuci
 sesquiunciam.
 Thue sfinz rühmte dieses Präparat bei pustulösem Erysipelas. (Au.)
Collyrium resolvens. (Pie. Sp.)
 ℞. Tutiae . . . semidrachmam.

Aloës . . . drachmam unam.
 Aquae Rosarum,
 — Foeniculi,
 — Euphrasiae,
 singulorum unciam unam.
 Misce. (Pie.)
 Sp.'s folgende Formel, welche er unter dem Namen *Aqua ophthalmica* anführt, enthält sicher kein Atom Zink.
 ℞. Tutiae praeparatae,
 Caryophyllorum,
 Sacchari crystallati,
 singulorum unciam unam.
 Camphorae,
 Aloës, singulorum sesquidrachmam.
 Vini Hispanici
 uncias quadraginta octo.
 Aquae Rosarum albarum
 uncias sex.
 — Chelidonii,
 — Foeniculi,
 — Euphrasiae,
 — Rutae,
 singularum uncias duas.
 Post quatuordecim dies maceratio-
 nis in sole, decantha.
Aqua ophthalmica usualis. (Br.)
 ℞. Aquae Rosarum,
 — Foeniculi,
 singularum uncias quinque.
 Tutiae praeparatae drachmas sex.
 Acetatis Plumbi sesquidrachmam.
 Camphorae . . . drachmam unam.
 Sulphatis Zinci scrupulos duos.
 Misce exacte et serva.
Ceratum Calaminae s. calaminare s. epuloticum s. e Zinco, Collyrium Nihili s. zincicum s. e Zinco, Unguentum calaminare s. Lapidis calaminaris s. e Lapide calaminari s. Carbonatis Zinci impuri s. Oxycarbonatis Zinci impuri s. Oxydi Zinci s. Oxydi Zinci impuri s. nativi s. de Nihilo s. Tutiae s. Zinci s. griseum s. Nihili ad oculos s. ophthalmicum album s. diapompholigos, Pomatum Oxydi Zinci. (Am. Ams. B. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. HasP. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. RC. Sax. Au Br. C. Ca. E. Fi. Huf. Pie. Sp. T. Sw.)
 ℞. Olei Olivarum . . . partes duas.
 Ceruae flavae . . . partem unam.
 Liguatis et mixtis adde
 Calaminae pulveratae
 partem unam.
 Agita ad refrigerationem usque. (Am. B*. Han Lon. Lus. C. Sw.)
 Ful. Olei partes duodecim, Ceruae sex, et Calaminae quatuor cum dimidia; — Ams. Olei duas, Ceruae unam et Calaminae unam cum dimidia; — Ca. Olei sex, Ceruae albae unam et unam Calaminae; — RC. Adipis sulli

semilibram, Cerae flavae, Calaminæ, singulorum unciam unam, Olei Napi semunciam; — LonN. Calaminæ, Cerae flavae, singulorum semilibram, Olei Olivarum octaniam unum.

℞. Axungiae Porci

partes triginta duas.

Gerae albae . . . partem unam.

Liquatis adde

Tutiae . . . partes octo.

Misce exacte. (Lus.)

℞. Cerati . . . partes octo.

Oxydi Zinci . . . partem unam.

Tere et sedulo misce. (B. Bor. Han.

HassP. O. Pol. Sax.)

Du. Cerati partes duodecim et Oxydi Zinci unam cum dimidia; — Du. Ed. et C. Cerati quinque et unam Oxydi; — Gen. Cerati duodecim et Oxydi unam; — Au. Oxydi drachmas duas et Unguenti rosati unciam unam; — Bor4. Zinci oxydati drachmam unam, Unguenti simplicis drachmas novem.

℞. Axungiae Porci . . . partes sex.

Oxydi Zinci . . . partem unam.

Misce trititando. (Fenn. Lon. C.)

Pie. Axungiae partes duas et unam Oxydi; — Pal. Adipis aserini duas et unam Oxydi; — Ham. Axungiae tres et unam Oxydi; — Ful. Butyri tres et unam Oxydi; — Br. et Sw. Axungiae quatuor et unam Oxydi; — Pie. Butyri quatuor et Oxydi unam; — Am. Br. et C. Axungiae quinque et Butyri unam; — An. et Bel. Axungiae octo et Oxydi unam; — Li. Axungiae tres, Butyri recentis sex et unam Oxydi; — Huf. Axungiae octo et Oxydi unam; — E. Butyri sex et unam Oxydi.

℞. Oxydi Zinci . . . partem unam.

Butyri cum Aqua Rosarum loti,

Unguenti rosati,

singulorum partes duas.

Misce exacte. (Gal.)

℞. Axungiae Porci

partes viginti quatuor.

Matris Perlarum,

Coralii rubri,

singulorum partem unam.

Tutiae,

Nihili albi,

singulorum partes duas.

Misce sedulo. (Sp.)

Fi. T. Cerae flavae, Olei Rosarum, singulorum uncias sex, Cerasse uncias duas, Tutiae porphyrisatae unam, Sulphureti Plumbi tantidem, Olibani semunciam. (Unguentum Tutiae.) Si loco tutiae Flores Zinci vel potius Carbonatem Zinci per praecipitationem adhibes, Unguentum vel Ceratum diapompholigos nominatur.

Unguentum Nihili s. Nihili ad oculos s. ophthalmicum s. Zinci, Pomatum Oxydi Zinci camphoratum. (Br. D; Pal. Wir. Sw. Vm.)

℞. Oxydi Zinci . . . unciam unam.

Camphorae . . . scrupulum unum.

Axungiae Porci . . . uncias sex

Misce trititando. (D.)

℞. Axungiae . . . uncias sex.

Olei Amygdalarum dulcium

uncias tres.

Cerae albae . . . uncias duas.

Liquatis adde

Oxydi Zinci . . . uncias tres,

Camphorae cum Oleo tritae

drachmas tres.

Misce exacte. (Sw*.)

Vm. Olei Amygdalarum dulcium unciam unam, Axungiae, Cerae, singulorum semunciam, Calaminæ sesquiunciam, Tutiae drachmas duas et Camphorae semidrachmam.

℞. Tutiae praeparatae,

Nihili albi,

singulorum unciam unam.

Gorallii rubri,

Nacrae Perlarum,

singulorum semunciam.

Camphorae . . . drachmam unam.

Axungiae Porci . . . libram unam.

Misce trititando. (Br. Pal. Wir.)

Unguentum s. Pomatum antihaemorrhoidale, Unguentum desiccativum, Ceratum Hufelandi, Pomatum contra intertriginem. (R*. Au. Ca. Pie.)

℞. Florum Zinci,

Pulveris Lycopodii,

singulorum drachmam unam.

Cerati . . . semunciam.

Contere. (Au. Pie.)

B*. Oxydi, Lycopodii, singulorum drachmam unam et Unguenti rosati uncias quatuor; — Ca. Oxydi, Lycopodii, singulorum grana triginta sex et Cerati Cetacei albi unciam unam.

℞. Florum Zinci,

Pulveris Lycopodii,

singulorum grana quindecim.

Axungiae Porci . . . semunciam.

Aquae Rosarum,

— Plantaginis,

singulorum quantum sufficit.

Trititando exacte misce. (Pie.)

Ceratum s. Unguentum exsiccans s. ophthalmicum s. ad ambusta: (B*. Han. Bo. Ca.)

℞. Olei Olivarum . . . uncias octo.

Cerae flavae . . . sesquiunciam.

Liquatis adde

Boli Armenae . . . unciam unam.

Florum Zinci . . . semunciam.

Misce bene. (Han.)

℞. Olei Olivarum . uncias quatuor.
Cerae albae,
Calaminae,
singularum unciam unam.
Acetatis Plumbi drachmas duas.
Fiat ceratum. (Bo.)

℞. Tutiae,
Acetatis Plumbi,
Calaminae,
singularum scrupulos duos.
Camphorae . . . grana quatuor.
Unguenti rosati quantum sufficit.
Tritura simul. (B*.)

Unguentum ophthalmicum Sloani s. rubrum. (Sp)

℞. Tutiae unciam unam.
Haematitis scrupulos duos.
Aloës grana duodecim.
Margaritarum praeparatarum
grana quatuor.
Axungiae Viperarum
quantum sufficit

ut fiat unguentum.

Unguentum oculare Keiseri s. ophthalmicum viride. (Ams.)

℞. Tutiae semunciam.
Camphorae drachmam unam.
Aeruginis grana duodecim.
Axungiae Porci uncias duas.
Misce.

Unguentum oculare album s. ophthalmicum album. (Vm.)

℞. Oxydi Zinci drachmas tres.
Mercurii dulcis semidrachmam.
Camphorae scrupulum unum.
Cerae albae drachmas duas.
Butyri Cacao,
Olei Amygdalarum dulcium,
singularum unciam unam.

Misce triturando.

Emplastrum griseum s. de Lapide calaminari s. consolidans, Pamphilus Chirurgorum. (Ams. B. Bor4. Br. D. DD. Ful. Han. Li. Pal. Sax. Suec. Wir. Wür. Sp Vm.)*

℞. Calaminae libram unam.
Lithargyri semilibram.
Olei Olivarum sesquilibram.
Coque, continue agitando. (B*. Ful.)
℞. Emplastri simplicis sesquilibram.
Cerae flavae,
Olei Olivarum,
singularum uncias novem.

Liquatis adde

Calaminae pulveratae sesquilibram.
Misce bene. (Ams.)

℞. Emplastri simplicis,
Calaminae pulveratae,
singularum sesquilibram.
Cerae flavae uncias sex.
Sevi hircini,

Terebinthinae,
singularum sesquunciam.
Liquefac et misce exacte. (D.)

Suec. et Vm. Emplastri simplicis,
Calaminae, singularum libras duas,
Cerae uncias quinque, Sevi sesquunciam et Terebinthinae tantidem.

℞. Emplastri simplicis . uncias sex.
Liqua et adde

Calaminae pulveratae uncias duas.
Pulveris Mastichis,
— Olibani,
singularum drachmam unam.
Misce bene. (Sax.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.
Olei Olivarum . uncias quinque.

Liqua et adde

Pulveris Calaminae uncias quatuor.
— Myrrhae,
— Olibani,
singularum drachmas duas.

Misce exacte. (Han.)

Li. Emplastri simplicis uncias decem, Olei Olivarum octo, Calaminae sex, Mastichis unam et Olibani dimidiam.

℞. Olei Napi uncias octodecim.
Calaminae uncias duodecim.
Lithargyri uncias sex.
Cerae flavae unciam unam.

Liqua et exacte misce. (DD.)

℞. Calaminae,
Lithargyri,
Cerussae, singularum semilibram.
Olibani semunciam.
Mastichis unciam unam.
Olei Olivarum quantum sufficit.
Fiat emplastrum. (Wür.)

Bor4. Emplastri Cerussae, Emplastri Lithargyri simplicis, singularum uncias duodecim; Lapidis calaminaris, Olibani, Mastichis, singularum semunciam.

℞. Cerae uncias tres.
Sevi cervini uncias quatuor.
Terebinthinae sesquunciam.

Liqua et adde

Pulveris Calaminae,
— Lithargyri,
singularum sesquunciam.

— Tutiae,

— Mastichis,

— Olibani,

singularum semunciam.

Camphorae cum Olei paxillo tritae drachmam unam.

Misce sedulo. (Sp.)

Br. et Wir. Cerae uncias tres, Sevi quatuor, Terebinthinae unam cum dimidia, Calaminae unam, duas Lithargyri, Tutiae, Mastichis, Olibani, singularum dimidiam, Myrrhae drachmas duas et Camphorae drachmam unam cum dimidia; — Pal. Cerae, Sevi, sin-

gulorum uncias octo, Terebinthinae sex, Calaminae quatuor, Lithargyri, Cerussae, singulorum tres, Tutiae, Mastichis, Olibani, Myrrhae et Camphorae, singulorum semunciam.

Emplastrum Diapompholigos s. zinci-plumbicum. (Ams. B*. Br. Fenn. Han. Sax. Suec. Wir. Sp. Vm.)

℞. Emplastri grisei partes sedecim
Plumbi usti . . . partem unam.

Liqua et misce bene. (Sax.)

℞. Olei Solani partes triginta quatuor.
Cerussae . . . partes decem.

Coque et adde

Cerae . partes triginta quatuor.
Plumbi usti . . . partes sex.

Pompholigis,

Olibani, singulorum partes quatuor.

Misce exacte. (Sp.)

Br. et Wir. Olei Solani libras duas cum dimidia, Cerussae sesquiunciam, Cerae albae uncias triginta, Plumbi usti sesquiunciam, Pompholigis et Olibani, singulorum quatuor; — Vm. Olei Olivarium partes sex, Cerussae decem, Cerae octo, Resinae Pini unam, Plumbi usti duas, Pompholigis et Tutiae, singulorum tantidem.

℞. Olei Olivarium . . . semilibram.
Cerae flavae . . . libram unam.

Liqua et adde

Plumbi usti . . . semilibram.
Cerussae . . . uncias quatuor.

Pompholigis . . . uncias tres.
Olibani . . . sesquiunciam

Misce sedulo. (Fenn. Suec.)

Bl Olei partes septem, Cerae duodecim, Plumbi usti sex, Cerussae quatuor, tres Pompholigis et Olibani unam cum dimidia; — Ams. Olei triginta, Cerae triginta sex, Plumbi usti duodecim, Cerussae octo, Pompholigis sex et Olibani duas cum dimidia; — Han. Olei quindecim, Cerae sedecim, Plumbi usti, Cerussae, singulorum tres, Pompholigis, Olibani, singulorum duas.

Emplastrum saturninum, Emplastrum saturninum Mynsichti. (Pal. Wir.)

℞. Sevi hircini,

Cerae albae, . . . singulorum sesquiunciam.

Terebinthinae . . . drachmas sex.

Liqua et adde

Pulveris Plumbi usti uncias duas.

— Calaminae,

— Cerussae,

— singulorum semunciam.

— Nihili albi,

— Tutiae,

— singulorum drachmas duas.

— Myrrhae,

Pulveris Mastichis,

Pulveris Olibani,

— singulorum drachmam unam.

— Aloës,

— Camphorae,

— Nitri,

— singulorum semidrachmam.

Misce. (Pal.)

Wir. Sevi, Cerae flavae, singulorum uncias quinque, Terebinthinae, Plumbi usti, singulorum duas, Calaminae, Cerussae, singularum semunciam, Pompholigis, Tutiae, singulorum drachmas duas, Myrrhae, Mastichis, Olibani, Aloës, Nitri, singulorum drachmam unam et Camphorae semidrachmam.

Unguentum Diapompholigos s. Pompholigis s. exsicicans s. ad ambusta s. Lapidis calaminaris. (Br. O. Pal. Sar. Wir. Sp. T. Vm.)

℞. Unguenti nutriti

— uncias triginta duas.

— Calaminae pulveratae

— uncias quatuor

Misce exacte. (O.)

℞. Camphorae . . . drachmam unam.

Cerussae . . . semunciam.

Cerae flavae,

— Calaminae, singulorum uncias duas.

Olei Olivarium . . . uncias quinque.

Tere cerussam et calaminam cum olei pauxillo, adde reliquum olei ceram in solutione tenens, tunc camphoram cum olei pauxillo tritam et ad refrigerationem usque agita. (Vm.)

℞. Olei Solani . . . uncias sedecim.

Cerae . . . uncias quinque.

Liqua lente et adde

Pulveris Cerussae . . . uncias duas.

— Pompholigis,

— Plumbi usti,

— Olibani,

— singulorum unciam unam.

Misce. (Sp.)

T. Cerae flavae, Olei rosati, singulorum uncias sex, Cerussae duas, Florum vel Carbonatis Zinci unam, Plumbi usti unam, Olibani dimidiam.

℞. Olei rosati . . . libras duas.

Succi baccarum Solani

— uncias quatuor.

Coque ad humidam consumptionem et adde

Cerae albae . . . uncias sex.

Pulveris Cerussae . . . uncias duas.

— Plumbi usti,

— Tutiae,

— Olibani,

— singulorum unciam unam.

Misce exacte. (Sar.)

Br. et Wir. Olei rosati uncias sex, Succi Solani, Cerae, singulorum quatuor, Plumbi usti, Pompholigis, Olibani, singulorum unam — Pal. eisdem

quantitates, sed Ceræ uncias tres et loco plumbi usi Cerussæ uncias duas.

Unguent. exsiccans (Dulk): Olei Olivarum libras tres, Ceræ flavæ unam, Boli Armenæ, Calaminæ, singularum semilibram, Lithargyri, Cerussæ, singulorum uncias sex, Camphoræ drachmas sex, fiat s. a. ung.

Unguentum Calaminæ compositum s. exsiccans rubrum Acrelii. (Fenn. Suec.)

Rx. Calaminæ,
Lithargyri,
Cerussæ, singulorum semilibram.
Minii,
Acetatis Plumbi,
singulorum uncias tres.
Sevi hircini . . . libram unam.
Olei Lini . . . uncias octo.
Liqua sebum, adde oleum, tunc pul-
veres et massæ refrigeratæ
Camphoræ pulveratæ
drachmas tres.

Ammoniu retum Zinci. (Vm.)

Rx. Acetatis Zinci liquidi quantum vis.
Infunde sensim Ammoniacum liqui-
dum, donec nullum amplius provoca-
tur præcipitatum, quod lotum et sic-
catum in Ammoniaci quam minima
quantitate solve, filtra, lente consume
et crystallisationi subijce.

*Vitriolum album s. Goslariense s. Zinci, Sulphas Zinci s. zincicum, Zin-
cum oxydatum sulphuricum s. sulphuri-
cum, Gilla Vitrioli s. Theophrasti, Sal
vomitorium Vitrioli, Chalcantum album;*
weißer Vitriol, Zinkvitriol.

1) Wie man ihn im Handel fin-
det.

*Vitriolum album s. Zincum sulphuri-
cum venale, Sulphas zincicus venalis.*
Am. Ams. B. Bel. BorC. Bor4. Br.
D. DD. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM.
Gen. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lus.
R. Suec. Wir. Wür. WW. C. Fi. Par.
Pid. Sa. Sp. T.

2) Reinigung des käuflichen.

Rx. Vitrioli albi . . . quantum vis.
Calcina tum in Aqua dissolve et plu-
ribus crystallisationibus subijce. (Gal.)
Wir. eundem agendi modum indicat,
calcinationem tamen omittens; — Ful.
Li. et Wür. dissolvere Salis libram
unam in duabus Aquæ bullientis, li-
quorem in digestionem relinquere per
sex horas cum Zinci granulati drach-
mis sex, tunc consumere et crystalli-
sationi subijcere.

3) Bereitung.

A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du.
Ed. Fenn. Fer. Han. HassP. His. Lon.

LonN. O. Pol. RC. Sax. Suec. R. G.
Fl. Sw. T. Vm.

Rx. Acidi sulphurici (20°)

quantum vis.

In capsula vitrea balneo arenæ im-
mitte, calefac leviter, adde sensim Zin-
cum granulatum, liquorem Aquæ pau-
xillo dilue, satura, consume et in cry-
stallos coge.

Bor4. Acidum sulphuricum crudum
cum Aquæ communis partibus quin-
que dilutum indicat; — *Fi. et T.* Acidi
concentrati partem unam et Aquæ
sex vel septem; — LonN. Zinci un-
cias quatuor, Acidi uncias sex, Aquæ
destillatæ octarios quatuor; misce, fi-
nita effervescentia cola, coque ad pel-
liculam et sepone ut fiant crystalli; —
HassP. Zinci Indici in frustula com-
minuti vel granulati libram unam in
Acidi Vitrioli sufficiente quantitate dis-
solvere, liquorem saturatum filtrare et
vaporationi subijcere, donec vitriolum
album secerni incipiat, addere deinde
Acidi Nitri uncias duas, et post aliquot
ebullitiones admiscere Florum Zinci
sesquiuunciam; liquorem tunc cum
Aquæ destillatæ partibus quatuor di-
luere, denuo per semihoram coquere,
filtrare, ad pelliculam consumere et in
crystallos cogere, quod toties repeten-
dum est, quoties crystalli formantur,
quas loco tepido cito siccatas serva.

Man wendet dieses Salz theils äußerlich
als abstringirendes, theils innerlich als to-
nisches und abfringirendes Mittel zu ei-
nem bis fünf Gran, zwei oder drei Mal
täglich, und als Brechmittel zu zehn bis
zwanzig Gran in destillirtem Wasser an.

Pitulae expectorantes. (E. Par.)

Rx. Sulphatis Zinci semiscrupulum.
Conservæ Rosarum

quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein
Stück täglich drei Mal, bei Reuchhusten
und Lungenentzündung. (E.)

Rx. Sulphatis Zinci . . . grana decem.
Myrrhæ . . . sesquidrachmam.

Confectionis Rosarum

quantum sufficit.

Fiant pilulae viginti. — Wie die vo-
rigen, bei Reuchhusten von Nutzen. (E.
Par.)

Solutio Sulphatis Zinci aquosa simplex.
(Am. B. RC. Au. C.)

1) Zum internen Gebrauch.

Rx. Sulphatis Zinci . . . grana duo.
Aquæ Chamomillæ uncias tres.
Dis. olve. — Gabe, ein Eßfel täglich
zwei oder drei Mal.

Wplie wendet bei dösartigen Fiebern
alle zwei oder drei Stunden einen Eßfel
einer Auflösung von neun Gran schwefel-

faurem Bist in sechs Unzen Aqua Sambuci an. Dofely empfiehlt ebenfalls gegen chronische Stenotische Ruhr eine Auflösung von drei Drachmen schwefelsaurem Bist und zwei Drachmen Klau in einer halben Unze Lavendelgeift und einer Pinze Wasser, zu vier bis sechs Drachmen in Wasser gegeben, und dieses selbst bisweilen nach drei Stunden wiederholt.

Am. und C. haben eine ähnliche Formel:
 ℞. Ligni Quassiae drachmam unam.
 Sulphatis Zinci . . . grana octo.
 Aquae semioctarium.
 Post duodecim horas macerationis cola.

2) Zum äußern Gebrauch.

A. In Gestalt von Collutorium.
 ℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
 Aquae destillatae . . . uncias sex.
 Solutioni adde
 Mellis crudi . . . unciam unam.
 Misc. (8°.)
 ℞. Sulphatis Zinci grana quin ecim.
 Infusi Salmiae . . . uncias sex.
 Dissolve. (Au.)
 ℞C. Sulphatis scrupulum unum,
 Aquae ferventis sesquium.

B. In Gestalt von Collyrium.

Aqua ophthalmica s. ophthalmica adstringens s. viiriolica s. e Vitriolo Zinci, Aqua Vitrioli albi, Solutio Sulphatis zinci, Mixtura Zinci Sulphatis, Collyrium vitriolicum s. e Zinco sulphurico s. e Vitriolo albo s. Zinci, Collyrium adstringens s. detergens s. detersivum. (Am. B°. BorC. DD. Ed. Gal. GalM. Ham. Lus. RC. Sar. Suec. WW. Au. Bo. C. Ca. ParC. Ra. Sa. Sp. Sw. T.)

℞. Sulphatis Zinci . . . partem unam.
 Aquae partes ducentas quadraginta.
 Dissolve. (BorC. DD. WW.)
 GalM. Salis partem unam et Aquae ducentas; — Lus. Suec. et Sp. Salis unum et Aquae nonaginta sex; — DD. Salis unam et Aquae sexaginta quatuor; — Am. et C. Sulphatis grana duodecim et Aquae semioctarium; — ParC. Sulphatis grana quatuor ad sex et Aquae uncias sex.

℞. Sulphat's Zinci . . . partem unam.
 Aquae partes ducentas quadraginta.
 Dissolve. (B°.)

Man kann das Doppelte Wasser nehmen und nöthigenfalls zwei Drachmen Quittenscheit zusetzen.

Ham. Salis partem unam et Aquae trecentas viginti; — Ra. Salis unam et Aquae centum viginti; — Ra. et Sw. Salis partem unam, et Aquae nonaginta sex; — Sa. et Sw. Salis partem unam et Aquae quadraginta octo;

— Au. Salis granum unum, Aquae Rosarum unciam unam et Mucilaginis Seminum Cydoniorum drachmam unam.
 ℞. Sulphatis Zinci scrupulum unum.
 Infusi Sambuci . . . libram unam.
 Dissolve. (Ra.)

Ra. praeterea Sulphatis granum unum et Aquae Plantaginis unciam unam; — Am. et C. Sulphatis drachmas duas, Spiritus Lavandulae uncias duas et Aquae uncias sex (Mixtura Zinci Sulphatis (C)); — Sar. Vitellum Ovi coctione concreti exiuvare, Sulphatem Zinci ingerere et liquorem post aliquot tempus profluentem commiscere cum Aquae Rosarum et Plantaginis, singularum uncias sex; — Au. Sulphatis grana tria dissolvere in Aquae Rosarum cum Albumini ovi unius subactae sesquium.

℞. Sulphatis Zinci grana quinque.
 Aquae Plantaginis uncias quatuor.
 Mucilaginis Seminum Cydoniorum semunciam.

Dissolve. (Ca.)
 ℞. Sulphatis Zinci grana sedecim.
 Aquae uncias octo.
 Acidi sulphurici Aqua diluti guttas sedecim.
 Dissolve sal in aqua et adde acidum.

(Ed. RC. C.)
 ℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
 Aquae Rosarum . . . libras duas.
 Alcoholis 22° . . . unciam unam.
 Dissolve. (Gal.)

T. Sulphatis, Sacchari raff., singularorum scrupulum unum, Aquae Rosarum uncias quatuor, Spiritus Vini guttas quatuor vel sex.

℞. Sulphatis Zinci . . . grana sex.
 Camphorae . . . graua quatuor.
 Aquae Euphrasiae,
 — Rosarum,
 — Plantaginis,
 singularum unciam unam.

Dissolve. (Bo.)
 ℞. Sulphatis Zinci . . . grana sex.
 Aquae destillatae . . . uncias sex.
 Mucilaginis Cydoniorum unciam unam.

Aquae Vitae camphoratae guttas duodecim.

Misce. (Sw.)
 C. In Gestalt non Bähung oder Aufdünng. (E°. Au. Sw. Sy.)

℞. Sulphatis Zinci . . . grana duo.
 Aquae destillatae uncias quatuor.
 Dissolve. (Sy.)

B°. Sulphatis drachmam unam et Aquae unciam unam; — Au. Sulphatis drachmas tres et Aquae unciam unam.

℞. Sulphatis Zinci,

- Aquae Vitae camphoratae,**
singulorum semunciam.
— bullientis . . . libras duas.
Dissolve. (Sw. Sy.)
D. In Einspritzung. (B*. DD.
His. Sw. Sy.)
℞. Sulphatis Zinci . . . granum unum.
Aquae . . . unciam unam.
Dissolve. (B*.)
B*, praeterea Salis grana triginta
quinque et Aquae uncias quatuor; vel
Salis scrupulum unum ad semidrachmam
et Aquae unciam unam.
℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae camphoratae uncias duas.
purae . . . libras duas.
Dissolve. (Sw. Sy.)
- Injectio adstringens. (B.)**
℞. Aquae Plantaginis . . . uncias sex.
Laudani Sydenhami guttas triginta.
Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Mucilaginis Gummi Arabici
unciam unam.
- Bei Blennorrhöe. (B.)**
℞. Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Boli Armenae . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici . . . drachmas duas.
Aquae . . . uncias octo.
- Bei Gonorrhöe. (E.)**
℞. Sulphatis Zinci . . . grana decem.
Gummi Arabici . . . drachmas duas.
Tincturae Opii drachmam unam.
Aquae . . . uncias octo.
- Bei Gonorrhöe. (E.)**
Gargarisma adstringens. (E.)
℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Mellis . . . semunciam.
Tincturae Myrrhae,
Aquae Vitae,
singulorum unciam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
**Fomentatio adstringens, Fomentum
tonico-adstringens. (B.)**
℞. Decocti Granati Corticis
libras quatuor.
— Chinae . . . libras duas.
Sulphatis Zinci sesquidrachmam,
Tincturae Opii . . . unciam unam.
**Bei äußern Hämorrhoiden und Blennor-
rhöe der Scheide.**
**Collyrium resolvens, Liquor ophthal-
micus deterisivus. (Pal. Ca. Sm.)**
℞. Radicis Iridis Florentinae pulveratae
drachmas tres.
Sulphatis Zinci sesquidrachmam.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis,
singulorum sesquilibram.
Digere per dies duos et cola. (Pol.)
℞. Iridis Florentinae,
Sulphatis Zinci,
singulorum semidrachmam.

Sacchari crystallati

- scrupulos duos.
Aquae Rosarum . . . libram unam.
Digere per tres dies et cola. (Ca.
Sm.)
℞. Vitellos Ovorum recentium no. 2.
Aquae Rosarum . . . libram unam.
Tritura simul et adde
Sulphatis Zinci grana duodecim ad
viginti quatuor.
Dissolve. (Sm.)
Injectio sedativa adstringens. (Ca. Sy.)
℞. Sulphatis Zinci . . . grana sex.
Oxydi Plumbi grisei grana viginti.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce agitando. (Ca)
Sy. Sulphatis grana octodecim, Pul-
veris Cerussae compositi grana sexa-
ginta et Aquae Tiliae vel Rosarum un-
cias duodecim.
Collyrium adstringens. (Au. B. C. Pic.)
℞. Sulphatis Zinci . . . grana viginti.
Tutiae . . . semidrachmam.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis,
singulorum uncias tres.
Misce. (Pic.)
℞. Aquae Rosarum . . . uncias tres.
Sulphatis Zinci . . . grana tria.
Laudani Sydenhami
scrupulum unum.
Misce. (B.)
℞. Sulphatis Zinci,
Boli Armenae,
singulorum uncias duas.
Camphorae . . . semunciam.
Man vermischt eine Drachme dieses Pul-
vers mit vier Unzen Rosenwasser. (Au. C.)
Aqua ophthalmica. (Sp.)
℞. Sacchari crystallati albi
unciam unam.
Radicis Iridis Florentinae
drachmas tres.
Tutiae praeparatae,
Sarcocollae,
Sulphatis Zinci,
Aloës,
singulorum drachmam unam.
Caryophyllorum scrupulum unum.
Aquae Euphrasiae,
— Foeniculi,
— Rosarum,
singulorum uncias octo.
Vini Hispanici
uncias viginti quatuor.
Post quatuordecim dies infusionis so-
lis calore, decantha.
Aqua 3. **Liquor s. Insectio adstrin-
gens s. Sulphatis Zinci aluminosa, Li-
quor Aluminis compositus, Solutio Zinci
aluminosa, Insectio ad leucorrhoeam,
Aqua aluminosa s. Batiava
Solutio vitriolica, Aqua styptica, Erhi-**

num *hagmastaticum*. (DD. Fer. His. Lon. LonN. Lus. RC. Au. B. Ca. E. Pic. Sa. Sw*.)

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis calcinati,
singulorum semunciam.

Aquae purae

libras duas (octarios duos).

Dissolve. (DD. Lon. LonN. RC. Au. Ca. Sw*.)

Ca. praeterea, Salium, singulorum quantitatis antea dictae dimidium; — Fer. et Lus. Salium, cujusque semunciam et Aquae bullientis libras duas cum dimidia; — Sa. Salium, singulorum drachmam unam et Aquae libram unam; — E. Sulphatis sesquidrachmam, Aluminis semidrachmam et Aquae bullientis semioctarium.

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis, singulorum semunciam.
Aquae Rosarum . . . libram unam.

Solutionem filtra. (His.)

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis,
singulorum drachmam unam.
Succi Urticae . . . uncias quatuor.

Dissolve. (Pic.)

℞. Sulphatis Zinci semidrachmam
Aluminis . . . drachmam unam.
Boracis . . . grana quatuor.
Aquae Rosarum . . . uncias sex.

Dissolve. (Pic.)

℞. Decocti Corticis Quercus
uncias decem.

— Cynorrhodontis uncias sex.

Sulphatis Zinci drachmam unam.

Aluminis . . . sesquidrachmam.

Solutioni adde

Alcoholis . . . drachmas duas.

Tincturae Opii aquosae
semidrachmam.

Misce. (B.)

Abstringend, äußerst gegen Echy-
mosen, leichte Blutflüsse und chronische
Ehleinflüsse. — Wobei, ein Effect für
einen Erweichsen, Morgens nächtern.

Collyrium tonicum. (Bo.)

℞. Rutae recentis,
Florum Arnicae,
singulorum manipulum dimidium.
Baccarum Juniperi drachmas duas.
Ipecacuanhae . . . grana triginta.
Vini albi . . . uncias duodecim.

Stent in infusione pro horas viginti
quatuor inter cineres calidos; tunc
adde colaturae

Sulphatis Zinci . . . grana viginti.

Salis Ammoniaci grana triginta.

Aqua d'Alibour. (Ca. Sm. Vm.)

℞. Sulphatis Zinci uncias duas et drach-
mam unam cum dimidia.

Sulphatis Cupri drachmas quinque.
Camphorae

drachmas duas cum dimidia.

Croci . . . drachmam unam.

Post horas viginti quatuor digestio-
nis filtra. (Ca.)

Ca. praeterea sub titulo *Aquae ad
oculos d'Yvel*: Sulphatis Zinci drach-
mas tres, Sulphatis Cupri unam, Cam-
phorae scrupulos duos, Croci grana
viginti et Aquae octarium unum.

℞. Aquae . . . octarios duos.

Sulphatis Zinci . . . uncias duas.

— Cupri . . . drachmas quatuor.

Camphorae . . . drachmam unam.

Dissolve. (Sm.)

℞. Foliorum Rutae . . . partes sex.

Aquae fervidae

partes quatuordecim.

Post semihoram infusionis colaturae
adde

Sulphatis Zinci partes quatuor.

— Cupri . . . partem unam.

Aquae Vitae camphoratae

partis quadrantem.

Dissolve. (Vm.)

Vm. hanc formulam sub titulo: *Col-
lyrium de Saint-Jerneron* indicat.

Collyrium Stiernoronense s. *Decoctum
Rutae zincatum* s. *Aqua ophthalmica
Ohdelii*. (B* et Succ.) Rutae partes
duas, Aquae triginta sex, ad dimidium
redigendas et Colaturae uncias duode-
cim addere Sulphatis Zinci unciam
unam, Sulphatis Cupri drachmas tres
et Aquae Vitae camphoratae semidrach-
mam.

Lapis vulnerarius externus. (Ful.)

℞. Aluminis,

Sulphatis Zinci,

singulorum uncias sex.

Acetatis Cupri,

Salis Ammoniaci,

singulorum drachmam unam.

Misce triturando, liqua, prope ignem
relinque ad perfectam desiccationem us-
quo et sub cinere adde

Croci . . . semidrachmam.

Dieses Präparat ist zum Reinigen, Aus-
trocknen und Kräftigen von Geschwüren
empfohlen worden.

Unguentum ophthalmicum s. *ad oculi
defluxiones catarrhosas ex relaxatione,
Collyrium molle*. (Br. Ful. Pic.)

℞. Sulphatis Zinci . . . partem unam.

Butyri recentis . . . partes septem.

Cantere simul. (Ful.)

Br. Sulphatis partem unam et Bu-
tyri sex; — Pic. Sulphatis unam et
quatuor Butyri.

*Unguentum s. Pomatum virginale, Pa-
maum Comitissae*. (Ca.)

℞. Sulphatis Zinci drachmas quatuor.

Foliorum Myrti,
Rhois, singulorum drachmas tres.
Gallarum,
Nucum Cupressi,
Corticis Granati,

singulorum drachmas duas.

Unguenti rosati quantum sufficit.
Misce trititando.

Pulvis ad s. contra maculas corneae.
(Pic.)

Rx. Tutiae praeparatae,
Sacchari crystallisati,
Sulphatis Zinci,
— Cupri,
Acetatis Cupri,
Mercurii dulcis,
singulorum drachmam unam.
Fiat pulvis.

ulvis Cupressi restrictivus s. adstrin-
gens. (His.)

Rx. Boli Armenae,
Radici Bistortae,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Baccarum Myrti,
Nucum Cupressi,
Sulphatis Zinci,
Tutiae, singulorum unciam unam.
Fiat pulvis tenerrimus.

Acetas s. Acetis Zinci, Zincum acetatum
s. aceticum.

1) In fester Gestalt.

Rx. Florum Zinci . . . quantum vis.
Aceti destillati . . . quantum sufficit
ad solvendum caloris ope oxydum.
Filtrata et vaporationi subjice ut crystal-
los demittat.

2) In flüssiger Gestalt.

Am. B*. D. Ed. Br*. C. E. Sw. Sy.
Vm.

Rx. Sulphatis Zinci,
Acetatis Plumbi,
singulorum drachmam unam.
Misce in mortario vitreo et adde
Aquae bullientis . . . uncias tres.
Post refrigerationem filtra. (Sw.)
B*. commiscere jubet solutiones
duas, unam e Sulphatis Zinci granis
viginti in Aquae uncias tribus, alteram
Acetatis Plumbi granorum viginti in
Aquae aequali quantitate et filtrare; —
Am. et B*. Sulphatis Zinci grana duo-
decim, Acetatis Plumbi grana sedecim
et Aquae semioctarium (auch als Col-
lyrium Zinci Acetatis Am.): — B*. Ed. et
C. Sulphatis Zinci drachmam unam,
Acetatis Plumbi scrupulos quatuor,
Aquae uncias viginti, solve seorsim sa-
les quemque in Aquae uncias decem,
commisce solutiones et praecipitato de-
posito filtra.

Rx. Oxydi Zinci . . . quantum vis.

Acidi acetici . . . quantum sufficit,
ad solutionem oxydi. Solutionis gut-
tis viginti adde Aquae uncias quatuor.
(Sy.)

Man wendet die essigsaure Zinkflüssigkeit
in Gestalt von Collyrien oder Einsprün-
gen gegen Blennorrhoe an.

Vm. contere proposit Sulphatis
Zinci grana duodecim et Acetatis Plum-
bi semidrachmam et addere Aquae Ros-
arum uncias sex (Aqua ophthalmica);
— E. Collyrium adstringens: Sulphatis
Zinci, Subacetatis Plumbi, singulorum
grana sex, solve in Aquae Rosarum un-
ciis quatuor.

Besser würde es seyn, das trockne essig-
saure Salz unmittelbar in Rosenwasser,
z. B. einen Scrupel von demselben in acht
Unzen Wasser, aufzulösen.

Man findet bei Ellis eine abstringirende
Einsprünkung gegen Gonorrhoe, welche aus
acht Gran essigsaurem Zink und vier Un-
zen Rosenwasser besteht. Augustin führt
eine ähnliche Einsprünkung an, welche er,
nach den Engländern, in demselben Falle
rühmt; sie besteht aus einer Auflösung von
acht bis zehn Gran essigsaurem Zink in
vier bis sechs Unzen destillirtem Wasser.

Pic. ein Collyrium aus anderthalb Drach-
men schwefelsaurem Zink, zwei Scrupel es-
sigsaurem Blei, vier Unzen Aqua Planta-
genis und eben so viel Rosenwasser.

Aqua ophthalmica alba Danica s. anti-
ophthalmica. (Au. Sp.)

Rx. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Acetatis Plumbi semidrachmam.
Camphorae scrupulum unum.
Aquae Rosarum uncias duodecim.
Dissolve et filtra. (Sp.)

Au. Sulphatis Zinci scrupulum unum,
Subacetatis Plumbi semidrachmam,
Aquae Vitae camphoratae drachmas
duas et Aquae destillatae uncias duo-
decim.

Collutorium adstringens s. e Zinco com-
positum. (Sp, Sw.)

Rx. Trochiscorum alborum Rhazis
drachmam unam.
Sulphatis Zinci . . . semidrachmam.
Acetatis Plumbi . . . semiscrupulum.
Aquae Rosarum . . . uncias quatuor.
Misce. (Sp.)

Rx. Sulphatis Zinci . . . grana octo.
Acetatis Plumbi liquidi guttas octo.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce et adde si requiritur Aquae
camphoratae unciam unam. (Sw.)

Injectio ad blennorrhoeam s. adstrin-
gens. (Bo. Sy.)

Rx. Sulphatis Zinci . . . drachmas duas.
Acetatis Plumbi scrupulos quatuor.
Camphorae . . . sesquiscrupulum.

Extracti Opii aquosi
scrupulum unum.

Aquae Rosarum
libras duas ad quatuor.

Dissolve. (Sy.)

R. Sulphatis Zinci,
Acetatis Plumbi,
Aluminis,
singularum drachmam unam.
Camphorae . . . grana decem.
Aquae Rosarum,
— communis,
singularum uncias octo.

Dissolve. (Bo.)
Zwei- oder dreimal täglich einzuspritzen.

Tinctura Acetatis Zinci, Acetas Zinci
ditutum. (B. Du. C.)

R. Sulphatis Zinci,
Acetatis Potassae,
singularum unciam unam.

Contere et adde

Alcoholis . . . libram unam,
Macerare per hebdomadam, subinde
agitando et filtra.

In Collyrien und Einspritzungen bei
Blennorrhöe anzuwenden.

Z i n g i b e r.

Amomum Zingiber, L.; Zeyryßbeeg;
Ingwer, Imber, Ingber; Gingembre
(Gal.); Siowe (Amb.); Ginger (Ang.);
Zingebil (Ar.); Zazzor (B.); Jahetuh
(Ba.); Suki (Band.); Ada (Beng.); Son-
ty (Can.); Inghuru (Cy.); Ingever (D.);
Gensjibré (His.); Sont, Utruck (Hin.);
Gember (Bel.); Zenzero (I.); Jai aking;
Dachey (Jav.); Alia (Mal.); Zungebil
(Pe.); Jembier (Pal.); Gengivre (Lus.);
Sunthi, Andraka (Sa.); Ingefaera (Suec.);
Sukku, Injie (Tam.); Sonti, Ullum
(Tel.); Wurraka (Ternat.); Gora (Tidor).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorG.
Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful,
Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass.
HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O.
Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wüir.
WW. A. Be. Br. C. Fi. G. M. Par.
Pid. Sa. Sp. Z.

2) (Pentandria Monogynia, L.; Amo-
meae, J.) Eine Pflanze Ostindiens, wel-
che man auch in America baut. (Jacq.
Hort. Vind. Vol. I. t. 75. Rheede Hort.
Malab. XI. t. 12. Plench t. 1. Dict. d.
Se. nat. cah. VI. Rumph, Amb. V. t.
66. f. 1.)

Die Wurzel (radix Zingiberis s. Zin-
ziberis) erscheint unter zwei Varietäten
im Handel:

1) Als schwarzer oder gemeiner
Ingber (Zingiber commune s. nigrum
s. vulgare) Gingembre noir ou com-
mun (Gal.); er ist etwa zwei Zoll lang,

stark, fest, hornartig, äußerlich gelblichgrün
oder weißlich, innerlich röthlichgelb oder
bräunlich.

2) Als weißer Ingber (Zingiber
album) Gingembre blanc (Gal.); er hat
ein mehr holziges Ansehen, ist hockerig und
dick und hat äußerlich eine gelblichweiße
oder weißlichgraue, inwendig eine röthlich-
gelbe Farbe. Diese Verschiedenheiten hän-
gen von der Bereitungsart ab; die erste
Sorte wird in kochendem Wasser weich ge-
sotten und dann am Feuer oder in der
Sonne getrocknet, die zweite wird, nach
Abziehung der Oberhaut, bloß an der Luft
getrocknet. Der Geruch ist durchdringend,
angenehm und kampherartig, der Geschmack
gewürzhaft, scharf und brennend.

Der Ingwer enthält ein flüchtiges Öl,
einen stickstoffhaltigen Stoff, eine thierische,
mit dem Osmajom verwandte Substanz,
Essigsäure, essigsaures Kali, Saamehl,
Schleimharz zc.

Reizend, magenstärkend, blähungstreibend,
Speichelabsonderung befördernd. — Gabe
des Pulvers, von fünf Gran bis zu einer
halben Drachme.

Species Diamargaritae calidae. (Vir.)

R. Radicis Zingiberis . . . semunciam.
— Dronioi,
— Zedoariae,
— Behen albi,
— rubri,
singularum drachmas tres.
— Pyrethri drachmam unam.

Seminum Apii,
Cardamomi majoris et minoris,
Nucis moschatae,
Macidis,
Piperis longi,
— nigri,
singularum drachmas tres.

Cinnamomi drachmas quinque.
Mastichis,
Margaritarum orientalium,
singularum semunciam.
Fiat pulvis. — Gabe, von einem Scru-
pel bis zur halben Drachme.

Julep pectorale. (Pie.)

R. Mellis purificati cochlear majus
(Eßlöffel).
Zingiberis pulverati cochlearminus
(Kaffelölffel).

Commisce cum
Aquae cochlearibus
duobus vel tribus.

*Electuarium pectorale, Marmelada pe-
ctoralis. (Sm.)*

R. Zingiberis pulverati
cochlear minus.
Mellis Narbonnensis . . . uncias sex.
Misce. — Gabe, ein Kaffelölffel zwei

ober drei Mal täglich, bei Husten mit reichlichem Auswurf.

Confectio aromatica. (Vm.)

- ℞. Zingiberis conditi . partes sex.
Corticis Aurantiorum conditi . partes quatuor.
Nucis moschatae . partem unam.
Syrupi Caryophyllorum rubrorum quantum sufficit.

Opiatum stomachicum (Ca. Pic.)

- ℞. Zingiberis conditi . uncias duas.
Limonum conditorum,
Caryophyllorum conditorum,
singulorum unciam unam.
Opiati Salomonis . semunciam.
Nucum moschatarum conditarum,
Cinnamomi,
singulorum drachmas tres.
Cascarillae . semidrachmam.
Olei essentialis Caryophyllorum scrupulos duos.
— — Cinnamomi guttas decem.
Syrupi Caryophyllorum rubrorum quantum sufficit.

Aphrodisiacum. — Gabe, einen bis drei Ecrupeil.

Morsuli stimulantés. (Sm, Sp.)

- ℞. Zingiberis . drachmas duas.
Crocii orientalis drachmam unam.
Moschi,
Caryophyllorum,
singulorum semidrachmam.
Mastichis . drachmas tres.
Ambræ griseae grana duodecim.
Sacchari semilibram.
Fiant morsuli drachmae unius. (Sm.)
- ℞. Cinnamomi . . . drachmas duas.
Nucis moschatae drachmam unam.
Caryophyllorum scrupulos duos.
Macidis scrupulum unum.
Zingiberis drachmas sex.
Sacchari uncias sedecim.

Fiant morsuli. (Sp.)

Syrupus Zingiberis. (Am. Ams. B. Bel. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. Gen. Han. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Suec. Wür. C. Sw. T. Vm.)

- ℞. Zingiberis pulverati uncias duas.
Aquae bullientis libras tres.
Digere per horas viginti quatuor in vase tecto. Cola et adde

Sacchari albi libras sex.

Ad syrupi consistentiam redige. (B.)

Das Verfahren ist überall ganz oder doch fast dasselbe, jedoch wecheln die Mengenverhältnisse unendlich, nämlich:

Lus. Zingiberis uncias quatuor, Aquae libras quatuor, horas sex infusionis et Sacchari sufficientem quantitatem; — Bor4. Han. Zingiberis uncias duas, Aquae uncias sedecim,

horas quatuor infusionis et Sacchari libras duas; — Wür. Zingiberis uncias tres, Aquae libras tres et Sacchari libras septem cum dimidia; — Fenn. Suec. Zingiberis unciam unam, Aquae libram unam, horas sex infusionis et Sacchari sufficientem quantitatem; — Ed. Zingiberis drachmas sex, Aquae libram unam, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari uncias viginti duas; — Du. Zingiberis uncias quatuor, Aquae octarios tres, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari uncias viginti novem; — Lon. LonN. et C. Zingiberis uncias duas, Aquae octarium unum, viginti quatuor (quatuor) horas infusionis et Sacchari libras duas; — Ams. Zingiberis uncias tres, Aquae libras quatuor, viginti quatuor horas infusionis et pro colaturae libris quatuor Sacchari libras quindecim; — Gen. Zingiberis uncias quatuor, Aquae libras duas cum dimidia, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari libras quinque; — Sw. Zingiberis uncias tres, Aquae libras quatuor, viginti quatuor horas infusionis et Sacchari libras septem cum dimidia; — Vm. Zingiberis partem unam, Aquae tepidae octo et Sacchari duodecim; — Ful. et Li. Zingiberis unciam unam, Aquae bullientis libram unam et unam libram Sacchari; — Am. Zingiberis uncias tres, Aquae bullientia uncias quatuor et Sacchari libras septem cum dimidia; — RC. Zingiberis sesquunciam, Aquae bullientis libras duas, Sacchari puri libras tres cum dimidia et viginti quatuor horas macerationis; — T. Zingiberis uncias octo, Aquae bullientis libras duas, infusionem per horas duodecim et Sacchari libras quatuor.

Gabe, von einer Drachme bis zur halben Unze.

Tinctura Zingiberis s. Amomi Zingiberis. (B*. Du. Ed. Han. Lon. LonN. C. Sw. Vm.)

- ℞. Zingiberis uncias duas.
Alcoholis (0,930) octarios duos.

Post dies octo vel quatuordecim infusionis cola. (B*. Du. Lon. LonN.)

Ed. Radicis uncias duas et Alcoholis (0,930) libras duas cum dimidia; — C. Radicis uncias duas et Alcoholis (0,930) libras duas; — Sw. Radicis unciam unam et Alcoholis (0,930) libram unam; — Vm. Radicis partem unam et Spiritus Sacchari octo; — Han. Radicis uncias quinque et Spiritus rectificati libras duas.

Reigen, gewürzhaft. — Gabe, sechs bis

Tropfen täglich zwei Mal. — Auch soll diese Tinctur die Zahnschmerzen lindern, wenn man damit getränkte Baumwolle in die hohlen Zähne bringt.

Elisir de Mistid. (Ca.)

℞. Zingiberis semunciam.
Cinnamomi,
Piperis longi,
Galangae minoris,
singulorum drachmas duas.
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
singulorum drachmam unam.
Cardamomi minoris
scrupulum unum.
Alcoholis uncias sex.
Weißd., magenstärkend. — Gabe, zwei bis vier Drachmen.

Oleum Zingiberis aethereum, Aethereolum Zingiberis. (Br. Wir.)

℞. Zingiberis partes sex.
Aquaë parvae partes triginta sex.
Sulis culinaris . . . partem unam.
Digere per dies quatuor vel quinque,

destillationem institue et oleum in fundo subsidens collige.

Z i r c o n i u m.

Eine Substanz, welche man als ein Metalloryd betrachtet und wovon man in der Medicin nur folgende Zusammensetzung angewendet hat:

Silicas Zirconii, Hyacinthus, Opacanth; Hyacinthe (Gal.); Jacintho orientale (His.).

His. Wir. G. Sp.

Ein sehr harter, glasartiger, nicht schmelzbarer Stein von orangefarbener Farbe.

Quinque Lapides pretiosi. (Wir.)

℞. Granati,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Carneoli,
Smaragdi,

singulorum partes aequales.

Misce et pulvera. — Eine ganz wirkungslose Mischung, welche man schon seit lange aus allen rationellen Vorschriften verbannt hat.

Nachträge und Verbesserungen.

(Den Hauptartikeln nach in alphabetischer Ordnung. Das Register hierzu so wie Nachträge s. am Ende des Registers.)

Absinthium — *Elaeoscch.* (HassP.) ut elaeosci.

Acidum nitricum. — *Aqua Acidi nitrici diluti (RG):* Acidi diluti drachmas duas, Aquaë font. vel Decocti Hord. vel Dec. Furfuris vel Infusi Calami vel Infusi Chamomill. libras duas, Syrupi simpl. vel Mellis puri uncias duas. — Bei Cachexie, Chron. hepatitis, typhs. Fieb., asthen. Granth., herpetischen, syph. Geschwären, Krätze, Wassersucht, ansteck. Krankh. ic. Gabe, 1 bis 2 Pfund täglich mit- oder ohne Glasröhre zu nehmen.

Acidum nitrosolum. (Gal. GalH. T.) ℞. Limaturae Cupri partes sex immitte in lagenulam ostio duplici instructam, quorum alter tubo recurvato et infundibuliforme, alter alio tubo instructum est, qui lagenae immergit, Aque partes novem continenti et cum alia communicanti, in qua Acidi nitrici. (49°) partes quinque continentur, et ex qua tubus immergit in aquam, Cupro infundantur paulatim Acidi nitrici (18°) partes viginti. Operatione absoluta acidum nitrosolum 38° indicans et densitate 1,369 aequans lagenacula excipiens ad locum obscuram reponenda. — Vel ℞. Nitratis Plumbi crystallisati quantum vis, immitte in retortam bene siccata, ex qua tubus curvatus exiens in vas, mixtura refrigeranti circumdatum immergit; calore adhibito acidum in recipiente condensatum excipe. (GalH. T.) Durch dieses Verfahren erhält man eine wasserfreie Säure.

Gas oxydum nitrosolum (Murray mat. med.) obtinetur decompositione Nitratis Ammoniae caloris ope. Rein oder mit atmosphärischer Luft verdünt einzunehmen, bei Krankheiten von großer Schwäche ic., jedoch stets mit der größten Vorsicht.

Acidum oxalicum. Liqueur (HassP.) Acidi pars 1, Aq. dest. part. 9. solve. — Reagens.

Acidum pyrotartaricum, Liqueur pyro-tartareus s. pyrotartaricus, Spiritus Tartari s. Tartari rectificatus s. Tartari simplex. (Ams. Bor. Bor4. Han. Hass. HassP. O. Pal. Suec. Wir. Wir.) ℞. Tartari crudi quantum vis; immitte in retortam, pro duobus trientibus (ad dimidiam partem Bor4. HassP.)

implendam et distillationem primum igne leni, donec nubecula alba prodit, deinde vero sensim ad ruborem retortae usque aucto continua, donec nihil amplius prodit; liquorem deinde acidum ab oleo supernatante separa. P. spec. = 0,995 — 1,005. (Bor4.) — In operatione *Oleum Tartari foetidum* obtinetur.

Spiritus aperitivus Renoti, Spiritus Tartari vitriolatus (Wir.) praeparatum praecedenti simillimum obtinetur distillatione mixturae e Tartari albi sesquibra et Sulphatis Ferri ad alborem calcinati, antea in cavam posita ut deliquescat.

Die brenzliche Weinstein säure wirkt schweiß- und urintreibend. — Gabe, ein halber Stropfel bis halbe Drachme in Wasser.

Mixtura simplex s. simplex alba s. pyrotartarica s. Diatrion, Mixt. simplex ordinaria, Aqua s. Spiritus Diatrion s. detribus. (B*. Bor. Bor4. Br. Han. HassP. O. Pal. Sar. Sax. Wir. Wür. Sp. Vm.) R. Spiritus Tartari uncias duodecim, Acidi sulphurici uncias tres; destillatis ad siccum, producto adde Spiritus theriacalis camphorati uncias viginti. Serva mixturam in lagena obturata. (Pal. Wir.)

B*. Br. Wir. et Wür. Spiritus Tartari uncias tres, Acidi sulphurici unam et Spiritus theriacalis camphorati quinque (*Mixt. simpl. ordin.*); — Sp. Spiritus Tartari uncias sex, Acidi duas et Spir. th. camph. decem; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Sax. et Vm. Spiritus Tart. partes octo, Acidi unam et Spir. Angelic. comp. duodecim.

R. Solutionis Camphorae spirituosae uncias quinque, Spiritus Tartari uncias tres, Acidi sulphurici Aqua diluti unciam unam, Succu Baccarum Myrtilli quantum sufficit ad colorandum. (Succ.)

Schweißtreibend. — Gabe, 40 bis 50 Tropfen.

Mixtura simplex Ludovici, Guttae febrifugae, Tinctura febrifuga acida. (Wir. Sw.) R. Tincturae bezoardicae Ludovici uncias quinque, Spiritus Tartari uncias quatuor, Acidi sulphurici unciam unam, Camphorae scrupulos duos. Misce. (Wir.) — Sw. Spiritus Angelicae composita uncias duodecim, Acidi tartarici liquidi uncias octo, Acidi sulphurici unciam unam et si placet pro quaque hujus mixturae uncia Camphorae grana decem. — Schmerzstillend und schweißtreibend. — Gabe, vierzig bis fünfzig Tropfen. — *Spiritus carminativus detribus.* (Br. Wir.) R. Nitri crudi, Tartari albi, singulorum lbras duas; immitte in retortam cum recipiente Alcoholis libras duas continente communicantem et destillando ita procede ut nonnisi drachmae duae vel tres mixturae prodeant; productum quod excepisti, distillatione rectifica. (Wir.) — R. Spiritus Nitri fumantis unciam unam, Alcoholis concentrati uncias duodecim, Spiritus Tartari uncias sex. Misce et distillationi subjice. (Br.) — Gabe, dreißig bis sechzig Tropfen.

Acidum sulphuric. — Aq. Acid. sulph. diluti (RC.): Acidi unc. 1, Aquae vel Decoct. Hord. vel Inf. Calami lib. 2, Mellis vel Syr. unc. 2. — Gabe, 2 Drachmen bis $\frac{1}{2}$ Unze. — *Linim. sulphurico-terebinth.* (RC.) Ol. Tereb. unc. 2, Ol. Oliv. unc. 5, Acid. sulph. drachm. $1\frac{1}{2}$. Frostbeulen, Verbrennung, Quetschung, Entzündung von Insectenstichen etc. — Ung. Acidi sulph. (RC.) Adip. suill. unc. 1, Acid. gutt. 30. Misce. — Flechten, Krätze. — *Potus acid. min.* (RC.): Dec. Furf. vel Hord. vel Aq. Panis biscocct. lib. 2, Acid. sulph. dilut. drachm. 1, Mell. desp. unc. $\frac{1}{2}$ vel Syr. simpl. vel Roob Oxycocci unc. 1. — *Solutio styptica.* Cupri sulph., Aluminis, sing. part. 3, Aq. dest. part. 24, Acid. sulph. concent. part. 2.

Acidi tartarici s. Salis essentialis Tartari Liquor (HassP.): Salis ess. drach. 2, Aq. dest unc. 1. — Reagens.

Adeps s. Axungia cetaria, Wallfischthran: In Olyst. bei hartnäckigen Verstopfungen, äußerlich bei Hornhautflecken.

Aether. Spir. aceto-aethereus (Bor4.) ut spir. sulph.-aeth. sed ex Aethere acetico et Spir. Vini Gall. fortiori, coloris experti vel in hujus defectu e Spir. Vini rectificatissimo. Pond. spec. = 0,885 — 0,895. — *Aetheris sulphurici alcoholisati Potus* (RC.) Aeth. alcoholis. drachm. 1, Aq. fort. vel Dec. Furf. vel Hord. lib. 2, Sacch. puri unc. $\frac{1}{2}$ vel Mellis flavi unc. 1. Frigide misceantur.

Alcohol. Alcohol dilutum amarum (RC.): Extracti amari (RC.) unc. unam, Alcoholis diluti sesquibram. — Reizend, stärkend, bei Magen schwäche. — Gabe, zwei, drei unzen, täglich zwei Mal. — *Aqua cardiaca* (RC.) Alcoh. dilut. vel im-

purif. lib. 1, Aq. bulk lib. 4, Sacchari unc. 2 ad 4. Misce; interdum additur Succus Oxycocci vel Citri etc.

Allium. Cataplasma acre Kernellii. R. Saponis nigri unc. 3 Aq. fervid. unc. 2; ebulliant leni calore per momentam, tunc admisce Ceparum sub cinere assaturum et bene contasurum uncias 3, Farin. Semin. Sinap. unc. $\frac{1}{3}$ ebulliant massa denuo leni calore paulisper saepius agitando. — Zur Beseitigung syphtitischer Drüsen geschwülste.

Aloë. — Massa Pilular. contra obstruct. Halensium (Dulk): Extr. Rhei comp. unc. $\frac{1}{2}$, Aloës Socotr. drachm. 2, Limat. Ferri pulv. drachm. 1. — *Massa Pilul. polychrest. bals. (Dulk):* Extractorum Aloës, Absinthii, Centaurii minoris sing. unc. $\frac{1}{2}$, Extr. Helleb. nigri, drachm. 2, Myrrhae, Mastichis, Benzoës, sing. pulverat. drachm. 1, Ferobinth. Venet. drachm. 2. — *Massa Pilular. Raffii (Dulk):* Aloës Socotr., Gummi Ammoniaci, sing. unc. $\frac{1}{2}$, Myrrhae unc. $\frac{1}{2}$, fiant cum Succo Limonum (et Spir. Vini parva quant.) massa. — *Pilulae de Succino auctae (Wir.):* Massae Pil. de Succ. Graton. drachm. 9, Resin. Jalap. drachm. 3. Misce et ex una drachma pil. 60. forma.

Alumen. Electuarium dentifricium (Maury.) Mell. opt. lib. 2, Alum. ust. unc. 2, Extr. Chinae unc. 1, Ol. Menth. pip, Ol. Cinn. sing. unc. $\frac{1}{2}$, Ess. Ambrae o. Moscho et Ess. Ros. drach. 2; melli coctione ad trientes duos consumpto et cum Alcanua colorato extractum admisce et per pannum tenerem exprime; massae tepidae alumen et penitus refrigeratae essentias admisce. — *Aluminis Saccharum, Saccharum aluminatum (Bor4.)* Aluminis pulv., Sacch. albiss., sing. part aeq.

Ammoniacum. — Gargarisma Muriat. Ammoniac (RC.): Muriatis drachm. 1 ad 2, Infusi Spec. arom. vel Flor. Arnic. vel Chamom. vel Dec. Hord. lib. 1, Oxymell. simpl. unc. 1. — *Mistura ammonio-citrica.* Eine Tzt Potio Riverii mit tohlenfaurem Ammonium und selbst Pflanzensaft, worauf man Citronensaft nehmen thut, in besondern Fällen, wenn man mehr reizen und auf die Ausdünstung wirken will. — *Sapo superammoniacatus (Gondret)* Ammon. caust. et Azung. vervecin. part. aeq. Als Pflaster auf die Haut gelegt, macht sie diese binnen 12 Minuten roth, in zwei Stunden wirkt sie ätzend — *Fumigatio volatilis. Salis Ammoniaci part. 1, Calcis viv. part. 2.*

Liq. Ammonii oxalici (Dulk): Solutio Salis Acetos., Liquoris Ammon. caust. ope neutralisata et filtrata. — Reagens.

Ammonium muraticum. — Fomentum commune cum Muriate Ammoniac (RC.): Alcohol. dilut. lib. $\frac{3}{4}$, Acidi acet. dilut. libr. 1, Amm. muriat. drachm. 2, vel: Aq. bilibram, Acet. Alcoh. dil., sing. lib. 1, Amm. mur. unc. $\frac{1}{2}$. Tepide vel frigide admoventum. — *Solutio Muriat. Ammon. acetata (RC.):* Muriat. unc. 1, Aceti unc. 2, Aq. font. unc. 4. — Zu 1 Dr. bis $\frac{1}{2}$ Unze bis selbst 5 Drachmen.

Hustus Acetatis Ammoniac et Stibii (RC.): Acetat. liq. unc. 1, Tinct. Op. Vini stibiati gutt. 25, Syr. simpl. drachm. 2. — Schweißtreibend. — *Spir. Salis Amm. foeniculatus, Liq. Ammonii foen. (Dulk.)* ut spir. sal. amn. ant. sed cum Oleo foenic.

Andromeda mariana (Coco). Ablochung bei einem Fußgeschwür (toe-itche genannt) in America mit Rügen gebraucht. Das um die Blätterstiele und die Samen herum sitzende Pulver ist ein starkes Niesmittel.

Antimonium. Pulvis antarthrit. Wepfari (Wir.): Lumbric. terr. exsicc. unc. 1 $\frac{1}{2}$, Cornu C. philos. praep., Ras. Eboris, Ocul. Cancror., Cinnab., sing. drachm. 2, Antim. diaphoret. simpl. unc. $\frac{1}{2}$, Nitri cryst. drachm. 6, Sacch. alb. unc. 1 $\frac{1}{2}$, Ol. Nucist. scrup. $\frac{1}{2}$. Fiat. pulv. — *Sabe, 1, 2 Scrup. bis 1 Drachme. — Ung. Tartar. Stibii et Potassae (RC.)* Tart. emet. scrup. 1, Adip. suill. unc. 1; interdum additur Merco. dulc. vel M. solub. Hahnem. et Osmph., sing. scrup. 1. — *Sapo Antimonii resinosis cum Ammoniacb. Kaempffii* Hepar Antim., Natron, Jalappa et Ammoniacum.

Aqua. — Fomentum commune tepidum (RC.): Vesicabovilla vel suilla ad dimid. Aqua tepida repleta, vel pannus linteus porosus, Aquae fervidae immixtus, deinde expressus parti affectae admoveatur.

Argenti Nitras fusus. — Pilulae (RC.): Nitrat. gr. 5, Extr. Lign. scrup. 1 fiant. pil. 20. aeq. Epitoste. ia Anfangs eine bis zu sechs Unzen, oder bis 600 entsteht.

Arnica. Oleum Florum. Man erhält aus 100 Pfd. bloß eine Drachme und zehn Gran. Von Schneider bei veralteten Schlangen, apoplektischen Anfällen und

Verhärtungen im Unterleibe gerührt. In ersterer Krankheit 4 — 12 Tropfen alle 2 Stunden.

Arsenicum. — *Aqua toffana* (Cose): *Arsenici albi*, *Kali praep*, sing. part. aeq. *Aq. Cymbalariae* q. p. erzeugt Auszehrung. — *Kali arsenicosum* (Dulk), obtinetur tractando *Arsenicum album* cum *Solutione Kali carbon. calorisi* ope, filtrando et ad siccum evaporando. — *Natron arsenicosum*, *Hepar Arsenici minerale*. Coctione paratur *Acidi arsenicosi* cum *Lixivio minerali caustico*. *Isa quor Natri arsenicosi, Solutio arsenicalis natrosa* simili modo ut *Kali arsenicoso* Liquor parari potest.

Arundo Calamagrostis — kräftiges Diureticum; in Rußland gegen Wasser sucht und ihre Folgen. Aufguß 1 Hand voll mit 3 Tassen heißem Wasser übergossen.

Asa foet. *Massa Pil. visceral.* *Kaempfi* (Dulk): *Extr.* *Tarax.* unc. ʒ, *Extr.* *Millefolii*, *Cardui bened.*, *Arnicae*, sing. drachm. 2, *Gummi Amm.*, (*Asae foet.*), *Kali acet.*, *Gummi Hederac.*, sing. unc. ʒ, *Rhei pulv.* drachm. ʒ; fiat *massa* in pil. grau. 2 dividenda. — *Mist. vel Solutio* (R.G.): *As. foet.* drachm. 2, *Aq. font.* vel *Menth. crisp.* vel *Foenic.* unc. 8. Solve *Keuchhusten*, *Dyspepsie*, *Amenorrhoe*, *Blaisch.* u. — *Sabe*, 1 oder 2 Unz. 2 oder 6 mal täglich. *Si addas Acetat. Ammon.* liq unc. 4, *Tinct. Digit.*, *Tinct. arom.*, sing. unc. ʒ, habes *Mist. Rogerii*. Gegen *Wasser sucht*, *Asthma*, *Schleimwind sucht*, *Blutputzen*.

Asphalti oleum (Dulk) *destillatione sicca* obtinetur.

Athyrium Filix mas. — *Oleum Filicis*, *Extractum Filicis oleoso-resinosum* (*Ma. Dulk*) obtinetur *extractione Pulveris Filicis recentis Aetheris* (*Extractum Filicis aethericum*: *Radici pulv.* unc. 1, *Aeth. sulph. venalis* unc. 8; vas oclulum saponis, saepius agitando, donec liquidum colorem flavescenscentem acceperit, et liquido defuso, operationem repete. *Liquores commixti* et *colati* *destillatione aetheris* ad partem quartam *reducti* in *balneo aquae* ad *extracti consistentiam* redige.) vel *Alcoholis* ope; si per *alcoholem* extrahitur, *extractum alcoholicum* deinde cum *aethere* tractari potest. — In vielen Fällen von *Bandwurm* mit Nutzen angewendet. Man giebt die eine Hälfte der Dosis (30 — 35 Tropfen) Abends, die andre den folgenden Morgen und 2 Stunden nach dieser zwei Unzen *Ricinussöl*, um den *Wurm* abzuführen. Eine *Wiederholung* ist selten nöthig; sollte dieß der Fall seyn, so giebt man den nämlichen Abend und folgenden Morgen die erste Dosis. — *Massa Pilularum Schmidii contra taeniam* (Dulk). R. *Asae foet.*, *Extr. Gramin.*, sing. drachm. ʒ, *Gutti*, *Rad. Rhei*, *Jalap.*, sing. dr. 2, *Rad. Ipec. Herb.* *Digit.*, *Sulphur. aurat.*, sing. gr. 10, *Hydr. mur.* mit. scrup. 2, *Olei Filic. aeth.*, *Ol. Anisi*, sing. gutt. 15. F. pil. gr. 2. Zur *Vorbereitung* der *Cur* folgende *Mixtur*: R. *Rad. Valer.* dr. 6, *Fol. Senn.* dr. 2, *Para infusum*, *colaturae* unc. 6 adde *Natri sulph.* dr. ʒ, *Syr. Mann.* unc. 2, *Elaeosacch. Filicis* dn. 2. *Misce*.

Barium. — *Barytae aceticae Liquor* (HassP.): *Baryt. acet. pars 1*, *Aq. dest.* part. 8. — *Reagens*.

Betula. — *Oleum betulinum s. Rusci* (Dulk) e *Cortice* obtinetur *destillationis descendens* ope. Ist in Rußland ein seit langen Zeiten gebräuchliches Volksmittel, bei *Menorrhoe*, welches auch außerdem bei *Wärmern*, *Hämorrhoiden*, *chronischen Rheumatismen*, *venez. Geschwären*, *Krebs* u., sowohl äußerlich als innerlich angewendet wird. *Liebofschik* empfiehlt es neuerdings gegen *Wechselfieber*, zu 6 bis 10 Gran täglich dreimal in Pillen.

Bromum, *Brom*, ein einfacher, dem *Chlor* und *Jod* verwandter Stoff, wurde in der *Mutterlauge* der *Salsfoolen*, im *Meerwasser*, in vielen *Quellen*, in *Seegewächsen* und *Seethieren* und andern im *Meere* vorkommenden *Substanzen* gefunden. Hr. *Walarb*, der *Entdecker* desselben, gewinnt es auf die Weise, daß er einen *Strom Chlor* in die *Lauge* der *Salsfoolen* streichen läßt und oben auf die *Flüssigkeit* eine *Schicht Schwefeläther* gießt, welcher sich in *Brom* verwandelt. Schüttelt man den so mit *Brom* versetzten *Äther* mit *Kali*, so erhält man ein *Bromsalz*, welches, getrocknet, mit *Manganoxyd* vermischt und mit *verdünnter Schwefelsäure* behandelt, beim *Destilliren* rothgelbe *Dämpfe* ausstößt, die *verdichtet* das *Brom* geben. In *dünnen Schichten* und im *Refractionslichte* gesehen, ist es *hyacinthroth*, bei *reflectirtem Lichte* *schwarzlichroth*, sehr *flüchtig*, *verbreitet* einen *erstickenden*, dem des *Chloroxyds* ähnlichen *Geruch* u. Mit *Wasserstoff* bildet es die *sogenannte Hydromsäure* (*Acidum hydromicum*), welche mit *Wasser* verschiedene *Salze*, *Bromsäure*, liefert (*Henry* im *Journ. de Pharm. Ferr.* 1829.) Wir führen hier unter andern an:

Perbromuretum Ferri, 1 *Thl.* *Brom* und 1 *Thl.* *Eisenseite* gemischt und unter *Wasser* erhitzt, wenn die *Flüssigkeit* *grünlich* ist, *filtrirt*, *bis zur Trockenzzeit* *abgedampft*,

den röhrlischen Rückstand von neuem mit Wasser behandelt und abgedampft; ein getrocknetes, sehr leicht lösliches und zerfließendes Salz von sehr kryptischem Geschmack.

Bromuretum Potassii et Sodii erhält man durch Zerlegen des Eisenbromürs mittelst kohlensauren Kalis oder Natron's, Filtrirens und Abdampfens.

Magendie (Formulaire 1829) wendet die Präparate des Broms an 1) gegen Scrofeln, 2) zur Wiederherstellung der unterdrückten Menstruation, 3) gegen Hypertrophie des Herzens (des ventricules). Es finden sich am a. D. folgende Präparate:

1) *Potio cum Hydrobromate Potassii*. R. Aquae Lactuae uncias tres, Hydrobromatis Potassii grana duodecim, Syrupi Althaeae unciam unam; Gtöpfweise in 24 Stunden.

2) *Pilulae cum Bromureto Ferri*. R. Bromureti Ferri pulverati grana duodecim, Conservae Rosarum grana octodecim, Gummi Arabici grana duodecim, Misce sedulo ut L pil. no. 20. — Morgens und Abends 2 Stüd.

3) *Unguentum cum Bromo*. R. Axungiae unciam unam, Hydrobromatis Potassii vel Sodii grana triginta quatuor, Misce sedulo. — Eine halbe bis eine Drachme in Einreibung auf Scrofelgeschwülste.

4) *Unguentum cum Hydrobromate Potassae bromureto*. R. Axungiae purae unciam unam, Hydrobromatis Potassii grana viginti quatuor, Bromi liquidi drachmas sex ad duodecim, Misce. — In Einreibung.

Bucca. Folia, Buccublätter, von *Diosma crenata*, L. (Pentandria Monogynia, L. Rutaceae, J.), einem am Vorgebirge der guten Hoffnung wachsenden Strauche (Düss. off. Pl. XVIII. t. 8.) Sie stehen von den Zweigen ab, einander entgegen, sind 10 bis 12 Lin. lang und 3 bis 4 breit, turzgestielt, umgekehrt eiförmig-länglich, am Rande gleichförmig stumpf-sägezählig, ganz glatt, oben dunkelgelbgrün, glänzend, unten heller graulich matt und besonders auf der untern Fläche mit deutlichen Drüsen besetzt. Sie haben einen durchbringenden, eigenthümlichen, rauten- und kampferartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas stechenden, pfeffermünzartigen, nicht bitteren Geschmack. Sie sind bei Verdauungsbeschwerden, Sries, erhöhter Reizbarkeit der Blase u. angewendet worden. Der Kussus möchte wohl die zweckmäßigste Anwendungsform seyn. — Von *Diosma serratifolia*, Vent., (Düss. off. Pl. XVIII. 9.), einem ebenfalls Capischen Strauche, welcher von Einigen nur als Varietät des vorigen angesehen wird, kommen die langen Buccublätter.

Calamus aromaticus. *Rotulae*. ex Oleo Galami et Saccharo.

Calcariae Chloruretum (Ma.) — *Solutio antipsorica cum Chlorureto Calcariae*: Chlorureti Calcis uncias 3, Aquae dest. libram 1. Solve et filtra. Von Deschamps gegen scabies empfohlen. Man wäscht damit die Arme und Beine. Ged's bis acht Tage sind zur Heilung hinreichend. — *Solutio Chlorureti Calcis alcoholisata*: Chlorureti sicci drachmas tres, Aquae destill. uncias duas; chloruretum tere in mortario vitreo cum pistillo vitreo, adde partem aquae, sepone, decantha liquorem clarificatum, adde novam aquam, tritura, sepone et tertio cum Aqua reliqua ablue, decantha, liquores decanthatos commisce, filtra et adde Alcoholis 36° uncias duas et Olei essentialis cujuslibet aliquot guttas. — Von Chevallier zur Verbesserung des Athems. Man thut 1 Kaffeeßffel davon in ein Glas Wasser und düstet das Zahnfleisch mittelst einer Schwammbürste damit. Auch besser sie, um den Geruch vom Tabakstrauch zu benehmen. Dr. Angelot in Briangon giebt folgende Formel: Chlorureti grana 16 ad 80, Solutionis Gummi unc. 1, Syrupi Cort. Aurant. drachm. 4., welche er in Waschung gegen die so häufigen Geschwüre des Zahnfleisches bei Soldaten anwendet. — *Trochisci Chlorureti Calcis pro desinfectione halitus* (Chevallier): Chlorureti Calcis drachmas septem, Sacchari vanillati drachmas tres, Gummi Arabici drachmas quinque; fiant trochisci granorum 15 ad 18. Zwei oder drei Stüd sind hinreichend, den übeln Geruch nach Tabakstrauche zu benehmen. Weißere Trochisten erhält man: Chlorureti Calcis sicci grana 24; infunde sensim aquam ad solutionem necessariam, sepone, decantha et filtra et cum Sacchari pulverati uncia una, Gummi Tragacanthae drachmis duabus et hujus solutionis sufficiente quantitate fiat pasta, de qua formentur trochisci granorum 18 ad 20, nec oleum volatile quodlibet addatur. Ein oder zwei Stüd sind hinreichend. — *Trochisci cum Chlorureto* (Calcis) (Deschamps). Chlorureti Calcis sicci drachmas duas, Sacchari uncias octo, Amyli unciam unam, Gummi Tragac. drachmam unam, Carmini grana tria; fiant trochisci granorum trium. In denselben Fällen wie die vorigen, 5 bis 6 Stüd binnen zwei Stunden. — *Pulvis dentifricus* (Deschamps): Chlorureti Calcis sicci grana quatuor, Corallii rubri drachmas duas. Man taucht eine neue schwach befeuchtete Zah-

büßte in dieses Ölver und büßet damit die Zähne ab; nach wenigen Tagen bekommen sie ihre natürliche weiße Farbe wieder.

Calcium. Liq. Salis Ammoniaci fixi (Calcar. muriat.) (HassP.): Salis drach. 1, Aq. unc. 1. — Reagens. — *Mistura Carbonatis Calcis comp.* (RC.): Carbonatis praep., Gummi Arab. pulv., Sacch. puri, sing. drachm. 2, tritis adde sensim Vin. Ipec. drachm. 1½, Tinct. Op. 1, Tinct. arom. unc. 1½, Aq. font. vel Menth. crisp. unc. 8. Cobbrennen, Diarrhöe, Ruhr. — *Linimentum causticum*. Calc. ustae et Saponis, sing. part. aeq. Neuzerlich bei Warzen, Muttermälern etc. — *Conchae sulphuratae*. Concharum et Sulphuris depurati part. aeq.

Camphora. — *Linim. camphorato-ammoniatum* (RC.) Camph. c. Alcoholis ope pulv. part. 6, Adip. suill. part. 12, Ammon. liq. part. 1.

Carbo et China. Pulvis dentif. (Maury): Carbon Lign. albi unc. 8, Chinae unc. 4, Sacch. alb. unc. 8., Ol. Menth. aeth. drachm. 4., Ol. Cinnam. drachm. 2., Ess. Ambrae c. Mosch. et Ess. Ros. drachm. ½ Subtilissime pulv. misce.

Carbonis Pulvis acidulus (RC.): Carbonis Ligni scrup. 1, Acid. citr. concr. gr. 5. M. f. pulv. tenerrimus. — Bei übertriebenem Stuhlgang etc. Täglich drei Mal. — *Pulvis dentifricius niger* (Dulk) Myrrh. pulv., Sal. culin. decrepit. triti drachm. 1½, Irid. Flor. pulv. drachm. 2, Caryophyll. pulv. drachm. 1, Panis usti pulv., Pulv. Carbon., sing. unc. ½, Ol. Bergam., Ol. de Cedro, sing. gutt. 20.

Carbo Spongiae. Pulvis ad strumam (RC.): Muriat. Hydr. oxydul. gr. 1, Mur. Ferri ammoniacal. Ph. Ross. gr. 9, Pulv. Rhei gr. 4, Spong. ust. gr. 10, Pulv. Cassiae gr. 2. M. f. pulv. subtiliss. dent. dos. 12. Ein Stück 2 mal in der Woche mit etwas Syrup beim Schlafengehen. —

Cerasus. Aqua Cerasorum amygdalata (Dulk) R. Cerasorum acidorum siccatorum cum nucleis contusorum, Amygd. amar. contus., sing. lb. 1, Aquae font. quantum satis. Destillatione libras 24 elice. Erfordert wegen des größten Gehalts an Blausäure und wegen des ätherischen Bittermandelöls mehr Vorsicht als das Kirchwasser.

Chamomillae Oleum citratum (Bor4): Flor. Cham. libr. 60, in vesicam destillat. immissis adde Olei Cort. Citri uno 9 et Aq. font. q. s.; destillatione prodens oleum separatur.

Chenopodii oleum a Coxe indicatur, ut Ol. Anisi Juniperi etc. parandum.

China. Mist. Cinchonae offic. (RC.): Cort. pulv. unc. 1, Extr. Liquir. drachm. 1, vel Mucilag. G. Arab. unc. 2, Aq. font. lib. 1, Tinct. Cinch. off. unc. 1, vel Tinct. arom. unc. ½. Si opus, Acidi sulph. dilut. drachm. 2 addito.

Chinini Citras (Ma.) obtinetur solutione Chinini in Acido citrico; — *Syrupus Citratis acidi Chinini* (Ma.) Syrupi Sacchari perfecte clarificati libram unam, Citratis acidi, Chinini grana triginta sex. — Tonisch und antiseptisch, statt des Syrup. antiscorb. anzuwenden. — Gabe, 1 oder 2 Eßlöffel in 24 Stunden.

Chlorum. Balneum Chlori (Ma.) Peroxydi Manganis unc. 1, Salis marini unc. 1½, Acidi sulphurici unc. 1. — Man wendet diese Localbäder mittelst eines den Rücken, deren man sich sonst zu Dampfbädern bedient, ähnlichen Apparats an, indem man den Gasstrom unmittelbar auf die leidenden Theile gehen läßt. Die Temperatur kann 32 bis 36° R. betragen. Die Quantität der Substanzen kann allmählig bis auf das Dreifache gesteigert werden. Man hat sie besonders bei chronischen Leberkrankheiten nützlich befunden. Sie können mit Nutzen auch durch nitromuriatische ersetzt werden, welche Bernhardt (de utilitate acidi nitrici et muriatici etc. Lips. 1826.) nicht nur bei Leberkrankheiten, sondern auch gegen Bauch- und Brustwasser sucht, Flechten, syphilitische Nachkrankheiten und verschiedene Fälle von Menstruationsstörung empfiehlt. — *Gas Acidi muriatici oxygenati s. oxy muriatici s. Chlori* (Bor4) Natri Muriat. unc. 12, Mangani unc. 8, Acidi sulph. crudi unc. 10 cum Aq. comm. aequali quant. dilutas, infundatur sensim acidi solutio salibus in retortam ingestis excipulo et tubulo incurvato aqua hactenus repleto, ut retortae orificium infra hujus superficiem positum sit, instructam; gas infra superficiem aquae calidae apparatus pneumatici lagenis Aqua destillata repletis excipulo, donec haec expulsa sit.

Cinaesemen. Extractum Seminis Santonici aethereum. R. Semin. Cyn. contus. uncias quatuor, Aetheris sulphurici uncias sedecim, digere saepius agitando per dies tres ad quatuor, filtra et aethereum ad partem quintam usque destillando abstrahe; residuum calore lenissimo (balnei aquae) ad mollioris extracti consistentiam evaporatum serva. — Vom Apoth. Pech zu Geleke bereitet und von Dr Schupmann als sehr wirksames, gar nicht widertliches Wurmmittel empfohlen. —

Wafe für Kinder von 2 — 8 Jahren 1 bis 3 Gran, für Ältere nach dem Alter 4 bis 6, für Erwachsene 10 Gran. Die Dosis wird einige Morgen hinter einander wiederholt. (Gusfel. und Osann Journ. 1880. 1.)

Pulvis contra vermes s. anthelminticus (Dulk): Rad. Valer. drachm. 1, Rad. Jalap. drachm. 1, Cinæ unc. 1/2, Tart. natronat. drachm. 2. Pulverata misca.

Citrus. Oleum de Cedro rectific. (Dulk) ut. ol. succ. rectific. obtinetur. — **Acetum Naphæ.** Destillationis ope ut acet. rutæ.

Colchicum. Spirit. Semin. ammoniacus (Williams) Infus. vinos. c. Ammonio. **Tinctura Seminum (Williams).** Semin. unc. 2, Vini Hispan. lib. 2. digere per octo dies.

Convolvulus panduratus (Coxe); wild Potatoe vine (Delaware). Die Wurzel (Kussander oder Kassader genannt) in Pulver, Aufguß oder Abkochung in Nordamerika gegen Phlegmasie gebraucht.

Costus. Oleum costaticum (Wir.): Costi amari unc. 2, Majoranæ floresc. unc. 8, contusis superfunde Olei Oliv. albi recent. libr. 1 1/2. Vini albi unc. 2. Digere ad siccum, exprime et cola.

Croton. Alcohol Crotonis (Nimmo) Ol. gutt. 12. Alcohol. unc. 1/2. — **Gabe,** 1/2 Drachme in Emulsion.

Cucumis. Succus Cucumeris. (Hass.) R. Cucumerum maturorum quantum vis, putamine et seminibus semotis contunde in mortario, exprime fortiter et succum post repositionem filtratum in lagenis serva. — **Unguentum Cucumerum.** (Galf. GalH.) R. Cucumerum recentium quantum vis, Axungiae Porci partes quatuor, Adipis vitulinae partem unam; liquatis simul utraque adipe, adde Succu Cucumerum pondus earum medium, subige iteratum per horas viginti quatuor, decantha et adde Succu eandem quantitatem, quod sexies ita repete; cola liquidum, et adipe liquefacta, adde librae cuique drachmas quatuor duas amyli, quo facto seponatur. — **Oleum Seminis Cucumeris.** (Gal. Sar.) R. Seminum Cucumerum quantum vis; pellicula detracta contunde in mortario marmoreo pistilli lignei ope et pulpam in sacco e tela confecto inclusam frigido exprime. — **Semina frigida majora.** (Gal. Wir.) R. Seminum Cucumerum, Melonum, Cucurbitæ, Cucurbitæ Lagenaariae, singulorum partes æquales.

Cuprum. Vitrioli coerulei Liquor (Hass.P.): Vitrioli drachm. 1, Aq. dest. unc. 1. — **Reagens.** — **Solutio Subacetatis Cupri et Ammoniac (R.C.):** Acetat. Cupr. cryst. drachm. 1, Ammoniac liq. unc. 1. Bei syph. Geschwüren und dergl. Man fesselt einer Unze Wasser für 10 Tropfen davon zu — **Liquor Cupri ammoniato-muriatici cum Hydrargyro.** Xropfioni e. Calomell. drachm. 1 et Acidi muriat. unc. 1 additur sub agitatione assidua Liquoris Cupri ammoniato-muriatici tantum, donec mixtura turbida facta subito clarifata colorem viridem accipit. (unc. 2 circiter pro scrup. 16 solutionis). **Buchner** rath dafür lieber eine **Aqua antiinflammatica composita** zu bereiten, dadurch daß man der Aq. antim. simpl. bei jedesmaliger Verordnung die nöthige Menge Sublimat zusetzen läßt. Wird besonders bei inveterirter Lustseuche gerühmt. — **Aethiops Cupri** e Cupro carbonico digestionis o. Mercurio ope. — **Rach Pasquillati** gegen Epilepsie, soll nach Andern, heftige Zufälle erregen. —

Datura. Tinctura Scamonii ammoniata. Herbae unc. 4, Spir. Vin. aquos. unc. 15, Spirit. Ammoniac. unc. 1. Digerantur per dies quatuordecim. — **Gabe,** 12 — 14 Tropfen.

Digitalis. Pulv. Supertartrat. Potassæ et Digitalis (RC) Crem. Tart. scrup. 1, Pulv. Fol Dig. gr. 1, Pulv. Rad. Zing. gr. 10. Wasserzug, von 1/2 bis nach und nach 1/2 Drachmen zweimal täglich.

Eupatorium Ayapana, Vent; Aya-Pana; Aya-Pana (Gal.) A. (Fer. Br. C. G.) (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Syntheraeae Cass.) Eine Pflanze Brasiliens. (Venz. Jard. Malm.) — Man wendet die Wurzel, Zweige und Blätter an. Erstere ist dünn, stark behaart, saftig, außen hellgelb, inwendig weiß; die Zweige sind kantend und knotig; die Blätter brüchig, dünn, schmal, lanzettförmig und dunkelgrün. — Geruch gewürzhaft, Geschmack zugleich etwas abstringirend. — **Insumum Aya-Panae (Br.)** Foliorum no. 6. 1. Aq. bull. libr. 2. Infunde et decantha. — **Bon Albert** bei leichten scorbutischen Affectionen empfohlen.

Euphorbia. Extractum Eulae (Wir.): Radicia Eulae lib. 1, Aq. ferv. lib. 6, macerantur per triduum, tunc leniter ebulliant, expressæ et colatae leni igne ad extracti consistentiam evaporant.

Euphorbii Correctio (Wir.). Euphorb. triti unc. 4, Succo Citri depur. lib. 1, digestione solum cola per linteum et ad extr. consist. evapora. — Festig purgirend, bei Wasserfucht — Gabe 8 bis 15 Gran.

Ferrum. Vitrioli Martis Liquor (HassP.): Vitrioli recens part. drachm. 1, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — Attactu aëris diu exponendo fuscus redditur, tunc filtratus *Liquorem Vitrioli Martis oxydati* (HassP.) habes. — *Mistura Myrrhae ferrata* (Griffithii?) (RC.): Myrrh. pulv. drachm. 1, Carbonat. Ferri praecip. dr. $\frac{1}{2}$, Syr. Zing. unc. $\frac{1}{2}$, tere et adde Aq. Menth. pip. lib. $\frac{1}{2}$, Tinct. Cinch. comp. unc. $\frac{1}{2}$. Sacherie, Schwindsucht. Ein und eine halbe Unze 2 bis 3mal täglich. Statt derselben kann man anwenden: Tinct. Muriat. Ferri unc. 2, Tinct. arom. unc. $\frac{1}{2}$. 1 Drachme drei Mal täglich mit Chamillenthee. — *Opiatum antiapoplecticum* (Be.): Croci Mart. aper. unc. $\frac{1}{2}$, Croci, Rhei, sing. drachm. 1 $\frac{1}{2}$, Antim. diaphor., Salis Tamarisci, Terebinth., Sal. Ammon., Jalapae, Irid. Florent., sing. drachm. 1, Scammon., Extr. Helleb. nig., sing. scrup. 2, Syr. Ros. pall. q. s. — Gabe, 2 Drachmen Morgens nüchtern, mit Kräuterbouillon. — *Acetas ferricus, Ferrum acetic. oxydat.* Obtinetur diluendo solutionem Ferri oxydati muriat. vel sulph. cum Aq. dest. quantitate sextupla, addendo Lixiv. caust. quamdiu aliquid praecipitatur; praecipitatum pluries elotum et pressione inter chart. emporet. maxima parte humiditatis privatum, cum mixtura ex Acido acet. concentr. pond. sp. 1,030 et Aquae aeq. quant. contritum, massae in arena modice calefacta positae Acidi tantum affunditur donec omnia soluta sint. — Innerlich 2 — 4 Gran, auch äußerlich gegen Krebs. Deffeter benutzt in d. Klaproth'schen Eisentinct. — *F. oxydulatum arsenicicum*, arseniksaures Eisenoxydul. Von Carminael als Nahrungsmittel, äußerlich bei offenem Krebs, später benutzte er eine Salbe aus: Ferr oxydul. ars. drach. 1, Ferr. oxydul. phosphor. drachm. 2 et Ungt. Cetaeci drachm. 6, mittelst eines Pinsels aufzutragen, auch nicht auf die ganze Oberfläche anzuwenden, wenn sie sehr ausgebeht ist.

Fuligo. Emplast. aus gemeinem Harz und Kienruß; bei kalten Geschwülsten, vorzüglich Stiebschwamm.

Gadus Lota. Oleum jecinoris s. Liquor hepaticus Mustelae fluviatilis. Kalquappenlebertzhan. Die aus der eingeschnittenen fetten Leber des genannten Fisches erhaltene Flüssigkeit, welche als eine ränzige Festigkeit zu uns gebracht wird. De Haen gebrauchte sie gegen Hornhautflecke; Beer in einer Salbe mit rothem Präcipitat, wieweil Nitriol und ungefaltener Butter.

Galbanum. Massa Pilular. resolv. Schmuckeri (Dulk): Galbani, Sagapeni, Sapon. med. Pulv. Rhei, sing. drachm. 1 $\frac{1}{2}$, Tart. emet. in Aq. dest. solut. gr. 16; fiant pil. gr. iij.

Gas nitrosus, Aër nitrosus. Obtinetur infundendo in lagena bene obturata Cuprum vel Aurichalcum in fila ductum cum Acido nitrico diluto. Ist ganz irrespirabel, wird aber häufig in Büchern unrichtig mit dem Gas azoticum oxydatum verwechselt.

Gas sulphurosum, sulphuricum, Aër vitriolicus. Deflagratione lenta Sulphuris etc. obtinetur. In Ermangelung oder bei zu großer Kostbarkeit anderer saurer Gasarten zu Vertilgung von ansteckendem Krankheitsstoff benutzt.

Iodium. — *Aquae iodatae, Balnea iodata.* 1 u g l. runder mit Vortheil bei Scrofeln Jobwasser zu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ und 1 Gran auf die halbe Flasche oder ein Pfund Salzwasser auf's Bad an. No. 1.) Salis mariui purificati grammata (grammes) sexaginta sex, Tincturae Iodii (Iodii granum unum pro grammate) grammata quinquaginta, Aquae destillatae libras centum; — No. 2.) Salis marini gramm. 66, Tinct. Iodii gramm. 76, Aquae purae libras 100; — No. 3.) Salis mar. gramm. 66, Tinct. Iodii gramm. 100, Aquae purae libras 100. — *Aquae iodatae s. Balnea iodata cum Potassa iodica.* 1) Iodinae scrup. 2, Kali iod. sc. 4; 2) Iodinae scr. 2 $\frac{1}{2}$, Kali iod. scr. 5. 3) Iodinae scr. 3, Kali iod. scr. 6; 4) Iodinae scr. 4, Kali iod. scr. 8. Von 1 u g l. in denselben Fällen. Bei Erwachsenen fängt er mit der Flüssigkeit No. 2 an; bei Kindern ist, nach Erfahrung, der dritte Theil der Auflösung hinreichend. (Notigen der Nat. und Heilk. No. 579. S. 110.) — *Solutio atrophica* (Ma.): Aquae destill. Lactucae uncias octo, Aq. Menthae drachmas duas, Hydriodatis Potassae drachmas quatuor, Syrupi Althaeae unciam unam. — Ein Schlüssel Morgens und Abends in etwas Wasser, man kann bis auf 2 Schlüssel steigen. Bei Hypertrophie des Herzens, welche im Allgemeinen in kürzerer Zeit als einem Monat geheilt wurde. Ist bei dieser Hypertrophie, welche an einem starken Herzschlag und einem dumpfen Geräusch erkannt wird, zugleich die Bewegung des Herzens beschleunigt, so setzt Ma. die Tinct. Dig. hinzu: *Solutio atrophica:* Aqu. dest. Lactucae unc. 8, Aq. Flor. Aur. drachm.

2. Hydriodat. Potass. drachm. 4, Tinct. Dig. alcohol. drach. 1 ad 2, Syr. Alth. unc. 1½. Morgens und Abends 1 Eßlöffel in etwas Wasser oder genauer ½ Unze je desmal. — *Unguentum s. Pomata cum Hydriodate iodurato Potassae.* Eugol löst sie in drei verschiedenen Stärtegraden bereiten, 1) Iodureti Potassii gr. 64, Iodii 8, Axungiae 1000; 2) Iodureti 160, Iodii 22,4, Axungiae 100; 3) Iodureti 160, Iodi 25,6, Axungiae 1000. Er gebraucht sie so wie die oben angeführten Wasser im Subwig's-Spital bei Scrofeln, 3 B. Knoten, Augenentzündung, Nasengeschwüren, Geschwüren, behinderter Menstruation, weißen Scrofelgeschwülsten, wo sie sich sehr nützlich zeigten. — *Ioduretum Barii (Ma.)* obtinetur calefaciendo Hydriodatem Ferri cum excessu Carbonatis Barytae, evaporando ad siccum, redissolvendo in Aqua et crystallationi subijciendo. — *Pomatum s. Unguentum cum Iodureto Barii.* Iodureti grana 4, Axungiae unciam unam. Misce. Von Biett in einigen Fällen von Scrofelgeschwülsten angewendet. — *Ioduretum Arsenici (Ma.)* Obtinetur vel: calefaciendo in retorta vitrea mixturam Arsenici 16 et Iodi 100, vel: coquendo Arsenici pulverati gramm. 30, Iodi 100 in Aquae 1000, liquorem quum colorem perdidit, filtrando et ad siccum evaporando; sublimationi si necesse videtur, potest subijci — *Unguentum s. Pomatum cum Arsenici Iodureto:* Iodureti Arsenici grana tria, Axungiae unciam unam. Von Biett in einigen Fällen streifender tuberkulöser Flechten angewendet. — *Ioduretum Sulphuris (Ma.)* Iodi partes 4, Sulphuris sublimati part. 1; mixta et in vitrum medicamentis capiendis inseruiens (Medizinglas) introducta calefac leviter, quo facto excessus iodi separatur et ioduretum massae instar ad griseum vergenti, crystallos aciculares praebenti remanet. — *Unguentum Iodureti Sulphuris (St. Louis)* Iodureti Sulphuris partes quinque, Axungiae 96 2) Iodureti part. 8, Axungiae 144. — Von Biett seit einigen Jahren in Fällen tuberkulöser Hautkrankheiten angewendet.

Jacea. Unguentum. Extracti et Axungiae, sing. part. aeq. Von Stein mit Nutzen bei verschiedenen Hautkrankheiten.

Kadmium, Zincum Silesiacum, Cadmium. — *Oxydum Kadmii.* (B*) R. Zinci Silesiaci quantum vis, Acidi sulphurici tenuis quantum sufficit ad solvendum, caloris ope, minerale; per liquorem refrigeratum et filtratum transmittit torrentem Gas acidum hydrosulphuricum; praecipitatum elotum per Acidum hydrochloricum liquidum calidum tracta, et solutione fere ad siccum evaporata et residuo addita Aqua, Ammoniacum causticum affunde, praecipitatum lotum sicca — Scheint reizend und selbst in kleiner Gabe giftig zu wirken. — *Sulphas Kadmii (B* T.)* R. Oxydi Kadmii quantum vis, Acidi sulphurici quantum sufficit ad dissolutionem. Liquorem vaporando in crystallos coge — *Aqua ophthalmica.* (B*) R. Sulphatis Kadmii grana duo ad octo, Aquae destillatae unciam unam. — Von Gräse äußerlich bei chronischer Augenentzündung gerühmt.

Magnesium. Pulvis antacidus Vogleri. Magn. carb. drachm. 1, Ipec. gran. 3, Sacch. alb. drachm. 7 et Ol. de Cedro gutt. 6. — *Pulvis dentifricus (Maury):* Magnes. Anglic., Cremoris Tart., sing. lib. 1, Chinini sulph. drach. 3., Coccion. unc. 1½, Ol. Menth. crisp. drachm. 4., Ol. Cinnam. drach. 3., Ol. Neroli drachm. 2, Ess. Ambrac c. Mosch. et Ess. Rosar. drachm. 1. Magnesium cum essentia in vas infunde et simulac haec absorpta fuerit cum pulveribus commisce et per cribrum tenuerrimum trajice. — *Liq. Magnes. sulph. s. Salis amari (HassP.):* Salis drachm. 2, Aq. dest. unc. 1, solve et filtra. — Reagens. — *M. acetium* solutione oxydorum imperfectorum. Zur Auflösung in Wasser sind 3, 5 Theile in der mittlern Temperatur nöthig. 1 und mehrere Gran in Pulver und Pillen, theils in Auflösung. — *M. muriaticum oxydulatum* solutione Mangani et oxydorum in Acido muriatico. In Auflösung zu 1 und mehreren Granen. Außerlich von Rapp in Gerstendecoct mit Arab. Gummi und Honig zu Gurgelwassern bei scorbut. und syphil. Geschwüren im Munde und Halse empfohlen. — *M. sulphuricum oxydulatum* tractando Manganum et Oxyda ejus cum acido sulphurico. Zur Lösung der Crystalle sind drittehalb Theile Wasser von mittlerer Temp. nöthig. Innerlich bei syphil. Krankh. und chron. Hautauschl. am besten in wäss. Aufl. Außerlich bei Krätze in Caldenf. (1 Dr. auf 1 Unze frische ungefalzene Butter) wirkt aber langsamer als Schwefelsäben.

Mentha. Liquor philodonticus et antispasmodicus (Maury): Alcoholis 38° octarios (litres) duos, Ol. Menth. crisp. unc. 1, Ess. Cinnam. drachm. 2, Ol. Neroli drachm. 4, Ess. Ambrac c. Mosch. et Ess. Ros. drach. 1½, Aeth. sulph. drachm. ½. Liquori colorato et filtrato aetherem admisce.

Menthae crispae Tinctura (An. Vm.): Herb. part. 1, Alcoholis 20° part. 8. Digere per tres dies et filtra — Reizend.

Mercurius. — *Empl. Oxynitrat. Hydrarg. et Ammaniae s. mercuriale (RC.)*
 Empl. simpl. libr. 1, Oxynit. Hydr. et Amm. drach. 2 ad 3. — *Hydrargyri Phosphas (Coxe)* Acidi sulph. unc. 8, Aq. lib. 4, misce in vase vitreo capaci et adde Ossium ad alborem calcinat. unc. 14. Stent in digestionem calore 60° per tres dies, saepius hacilli vitrei ope agitata; filtra deinde et loco frigido ad aptam consistentiam evaporata crystallisationi subijce, crystallos (Potassa phosphorata) in Aqua destillata solutas decompone per solutionem supersaturatam Mercurii in Acido nitrico, residuum cum Aqua dest. edulcora, ad siccum evapora etc. (*Bergmanni* procedendi methodus) Parari etiam potest addendo Acidum phosphoricum solutum Solutioni Mercurii in Acido nitrico. — *Hydrargyrum oxydatum phosphoricum acidum, Mercurius phosphoratus Fuchsii* praeparatur infundendo Hydrargyri oxydati rubri subtilissime pulverati semunciae in phiala vitrea Solutionem Acidi phosphorici siccii puri unciarum duarum in Aquae unciis octo coquendo massam et continua agitatione ad perfectam siccitatem usque continuando. et si necesse, pulverem in Aquae eadem quantitate redissolvendo et evaporando, donec oxydum rubrum evanuerit etc. Massa ita obtenta in Aquae unciis octo soluta seponitur, donec omnia insolubilia praecipitata sint, quo facto liquor defusus bulliat, addendo de residuo, quamdiu aliquid solvitur. Liquidum hoc modo saturatum cum Aquae tanta quantitate solutum ut totum unciarum sit octo, quiete refrigeret, ut excessus hydrarg. phosph. subsideat vel idem ipsum sub nomine: *Liquor Hydrargyri oxydati phosphorici acidi servatur.* — In venerischen Uebeln kleiner Kinder, aber auch in andern Krankheiten, häutiger Bräune, chronischen Hautausschlägen zc. innerlich und äußerlich; in Auflösung zu 1 und mehreren Ständen. Ganz kleinen Kindern 3 Gran in 3 Unzen Wasser, theelöffelweise. — *Pulvis antiuenericus (Coxe)* Phosph. Hydr. gr 4, Cinnamomi pulv. gr 14, Sacch. albi drachm. ʒ. Misce, fiant pulv. 8. Morgens und Abends ein Pulver, bis Speichelfluss droht, wo es ausgelesen ist. Bei alten venerischen Geschwüren, besonders an den Geschlechtsstellen, venerischer Ophthälmie, Schanker, Rheumatismen zc. — *Massa Pilul. Hydragog. Janini (Dulk)* isdem substantiis ut pilul. II. 165. indicatae componitur, mutatis tamen quantitibus. — *Mercurius cinereus Blackii.* obtinebatur praecipitatione completa Solutionis Hydr. nitr. oxydul. per Ammon. carbonic. — *M. praecip. Saundersi:* Calomellis part. 1, cum Ammonii caust. part. 4 per horas aliquot agitatae. — *M. praecip. ruber* per se obtinebatur coquendo mercurium in phiala longicollis aperta ita ut vapores metallici cum oxygenio aëris nupti oxydum formarent. — *Unguent. Oxynitrat. Hydr. et Ammoniae* (Merc. solub. Hahn.) (RC.): Oxynitr. part. 1, Adip. suill. part. 12. — *Ung. comp. (RC.):* Oxynitr. Oxydi Zinci, sing. part. 1, Adip. suill. 4. — *Pilulae Suboxydi Hydrargyri (RC.):* Hydr. unc. 1, Terebinth. drachm. ʒ, tere ad globulorum disparit.; adde si opus, mucilag. G. Arab. et cum Pulv. Rad. Liq. vel Ainyli pil. 80 aeq. forma. Eine oder zwei Morgens und Abends. — *Ung. acre (HassP.):* Merc. subl. corros., But. Antim., sing. part 1, Ung. irritant. part. 4. — *Hydrargyrum oxydulatum nigrum purum, Oxydum hydrargyrosum.* R. Liquoris Hydrarg. nitrici oxydulati quantum lubet, instilla Kali caustici tantam quantitatem ut kali sufficienter praevaleat, praecipitatum filtri ope separatum cum Aqua destillata fervida bene ablue et leni calore sicca. (*Dulk*). — *H. glycyrrh., Succ. Liquir. mercurialis,* Hydr. et Succ. Liq. part. aeq. — *Hydrarg. terebinth., Merc. tereb. Hydr. part. 1, Terebinth. part 1 1/2* — Bei Wasser sucht in Pillen. — *Pilulae mercuriales Barbarossae:* Hydrarg. terebinth, Aloë, Agaric. alb. et Rheum. — *Mercurius Zinci.* Merc. terebinth. cum Oxydulo Zinci. In vener. und frampsh. Ueb. und Wurmkrankh. — *Aethiops min. aurat., Hydr. sibiato-sulphurat., aurant.* Merc. et Sulph. aurat. Antim., partes aeq. contrita in mortario vitreo calefacto.

Morphina. M. sulphurico. Morphinum in Acido sulphurico diluto solutum, ad certum gradum vaporatum et loco frigido crystallisationi subjectum. Löst sich in 2 Theilen Wasser. In ähnlichen Formen und Dosen, wie das essigsaure Morphin.

Moschus. Tinctura (Dulk). Moschi drachm. 1, Spir. Vini rectific., Aq. destill. sing. unc. 3. Digere ad perfectam moschi solutionem.

Mudarii Radix von Calotropis Mudarii, Browne (Asclepiadeae), einer in Hindostan wachsenden Pflanze. Die Wurzel ist gelblichbraun, 1/2 bis 1 1/2 Zoll dick. Man wendet die Rinde an. Die Wirkung hat Aehnlichkeit mit der der Ipecacuanha. In Hindostan ist es schon lange ein Volksmittel gegen Hautkrankheiten, besonders elephau-

tiasis und lepra Der Extractivstoff derselben oder das Mubarin bewirkt zu 1 Gran auf 3 mal genommen, schnelles und reichliches Erbrechen. (Notizen a. d. G. d. N. u. S. Bd. XXVI. S. 92.)

Mures marini a Wir. indicantur contra haemorrhoides coecae.

Nitrum. Pulvis leniens Thedenii (Dulk): Pulv. Nitr. depur., Conchar. praep., Natri sulph. sicc., Rad. Rhei, sing. part. aeq.

Nux vomica. Alcohol Nucis vomicae (Mag. ed. 7 1829) Alcoholis 36° unciam unam, Extracti Nucis vomicae sicci grana quatuor; — *Spiritus ad paralysis (Ma.)* Alcoholis nucis vomicae unciam unam, Ammoniaci concentrati drachmas duas. — In Einreibungen auf gelähmte atrophische Theile.

Oleum pyro-carbonicum Aus der Braunkohle durch trockne Destillation gewonnen. Von Lucas bei Sicht, Hysterie, Hypochondrie, Lähmung, Magenkrampf, Kolik, Lungensucht etc. empfohlen. Seine Pflastermasse besteht aus Ammoniakgummi, Galbanum, Guajacatz, Aloë, Seife aa 1 Unze und 2 Unzen Braunkohlendf.

Oleum Terrae a Wir. indicatur in nervorum affectibus externe adhibendum.

Opium. Elixir de Squire (Coze): 1) Opii unc. 4, Camph. unc. 1, Coccinellae tantidem, Ol. Foenic. drach. 2, Tinct. Serpent. octar. 1, Spirit. Anisi octar. 16, Aq. oct. 2, adde Auri musiv. unc. 6; 2) Rad. Liquirit. lib. 1, Kali pp. unc. 4, Coccin. unc. 1, Aq. oct. 12, coque ad octar. 8 reman., adde Tinct. Opii unc. 12, Camph. unc. 1, S. V. R. oct. 4, Aur. mus. unc. 12; 3) Opii unc. 1 et drachm. 4, Camph. unc. 1, Coccinell., Kali pp., sing. drachm. 1, Sacchari usti unc. 2, Tinct. Serpent. oct. 1, Spir. Anisi oct. 16, Auri mus. unc. 8. — *Hausum opiatum (RC.):* Tinct. Op. gutt. 25., Aq. font. unc. 1., Syrup simpl. drachm. 2. Si Vini st. b. guttas 30 addis, *Hausum opiato-sibiatum (RC.)* habes. — *Liquor Citraei Morphinae.* (Black densis) Opii puri unc. 4, Acid. citric. crystall. unc. 2, tere in mortario lapideo, sensim addendo Aq. destill. unc. 16, macera per horas 24 et cola. (Porter.) — *Liq. tartarisatus Morphinae.* Simili modo cum Acido tart.

Ovi Vitellus. Linimentum. Ol. Oliv. et Vitelli Ov. ut f. unq. Bei einfachen Wunden sehr empfohlen.

Paeonia. Pulvis antiepilepticus niger (Dulk): Radic. Paeon. pulv. unc. 1, Rad. Dictamni alb. pulv., Visci albi pulv., sing. unc. $\frac{1}{2}$, Sem. Paeon. pulv., Conchar. praep. sing. unc. 2, Succini praep. drachm. 2, Terrae sigill. rub. unc. $\frac{1}{2}$, Pulv. Carb. unc. 3, Auri fol. q. s.

Pinus. Alcohol dilutum antiscorbuticum. (RC.) Extr. amar., Extr. Tur. Pini (Extr. Pin. Tur. Turion. partem 1, Aquae 8 ad dimid. coct. et ad extr. consist. redact.), sing. semunc., Alcoh. diluti semilibram. Gabe wie beim vorigen. — *Spec. Turionum Pini comp. s. antiscorbuticae (RC.):* Turion. Pini, Herb. Millef., Fumar., Trifol. fibr., Rasur. Lign. Junip., Rad. Cal. arom., sing. part. aeq. *Decoctum* paratur e Specier. harum semunc. et Aq. purae lib. $1\frac{1}{2}$ ad lib. 1. colat. consumpt., cui, si libet, addes Acid. tart. drachm. $\frac{1}{2}$ vel Acid. sulph. drachm. 1 vel. Roob Oxycocc. vel Syr. Molass. vel Oxym. simpl. vel Succ. Citri unc. 1. Ein Pfund und mehr täglich.

Platinum. Liq. Platini muriatici (HassP): Platini laminati concisi q. s. neutralis quantum fieri potest, cum Aquae regiae q. s., liquorem cum Aq. dest. decuplo dilue et ad ebullitionem calefacto Sal. Amm. pulv. adde quamdiu praecipitatum flavum oritur, quod elotum et siccatum in crucibulo excandescat; residuum griseum metallicum in Aqua regia iterum solve et acido salis superfluo evaporato, liquorem cum quadruplo Aquae destill. dilue ac per chart. bibulam filtratum serva in vitro colore nigro obducto. — Reagens.

Plumbum. Empl. universale Waltheri (Dulk): Emplastro fusco adhuc molli adde pro libra quaque Aluminium usti, Succini praep., sing. drachm. 3. — *Ung. Superacetat. Plumb. comp. (RC.)* Ung. Acetat. Plumbi, Solut. Muriat. Hydr. oxyd. et Ammon., sing. part. aeq.; probe misceantur. — Flechten, Kopfgrind. etc. — *Plumbum hydrocyanicum (Dulk)* miscendo Saccharum plumbic. depuratum solvi. cum Lixivio Sanguinis ut pulvis in Aqua insolubilis praecipitetur. — *Plumb. phosphoricum, Saturnus phosphoratus (id.):* Oxydi Plumbi muriat. recen-

ter præcip. quantum vis, Aq. dest. ferv. quantum sufficit, solve et adde Natrum phosphoricum in Aqua dest. solutum, ut præcipitatum provocetur, quod cum Aqua bulliente ablutum filtri ope separa et in loco umbroso siccatum serva. — *Plumbi Acetatis cryst. Solutio fortior, Aq. vegeto-mineralis* (RC.): Acet. Plumb. cryst. scrup. 1, Aceti vel Acid. acet. dilut. drachm. 1, Aq. dest. vel font. unc. 5.

Potassium. — *Potassii Cyanuretum purum. Potio pectoralis* (Ma.): Aquae Lactucæ uncias duas, Cyanureti Potassii granum dimidium ad duo, Syrupi Althææ unciam unam. — *Kali oxalici Liquor* (HassP.): Kali pars 1, Aq. dest. part. 8, ut reag. — *Sal Tartari purissimum* (HassP.) ut sal sodæ puriss. sed e terra fol. Tart. cum Sale Tartari parata; lixivium elutriatione carbonis residui obtentum et filtratum ad siccum inspissetur et sal residuum servetur. — Reagens. — *Liquor* (HassP.) Salis drachm. 2, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — *Salis Tartari perfecte saturati Liquor* (HassP.): Salis drachm. 2, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — *Mixtura Nitratis Pot. s. nitrosa* (RC.): Nitratis drachm. 1, Aq. Menthæ pip. vel font. unc. 3, solutioni adde Aceti unc. 1½. Alle 3 — 4 Stunden 1 Unze. Bisweilen bei einzelnen Gaben 5 Tropfen Tinct. Op. jugel. — *Potio oxygenata* (RC.): Muriatis Potassæ drachm. 1, Aq. dest. lib. 3. — *Potus acidus vegetab.* (RC.): Decoct. Furfuris vel Hord. vel Aq. Panis hiscoct. lib. 2, Cremoris Tart. scrup. 4, Syr. simpl. vel Rob. Oxycocc. unc. 1, vel Mell. desp. unc. ½. — *Solutio saponacea Hahnemanni* (RC): Saponis part. 1, Aq. 4. Eawarm als Gegengift gegen Arsenik.

Prunus Virginiana (Coxe) wild Cherry Tree. Die Rinde (besonders der Wurzel) wurde bei Wechselfiebern heilsam befunden. Die wilden Amerikaner gebrauchen sie bei Syphilis. Auch hat man sie bei Dyspepsie, Lungenschwindsucht und Lendenabscess mit Nutzen angewendet.

Pyrothonid s. Liquor pyro-oleosus ex panno vegetabili paratus wird nach Ranque aus Leinwand, Hanfemem oder baumwollenem Zeuge durch Verbrennung hergestellt. Er wird äußerlich besonders bei chronischen Augenentzündungen, Mutterblutflüssen, weißem Fluß, Tripper und Frostbeulen in Einspritzungen, Waschwässern, Umschlägen etc. empfohlen.

Quercus. — *Ung. Autenriethii contra decubitus* (Dulk): Cort. Quercus quantum vis cum Aq. part. 8 ad dimid. dec., colat. et add. Aceti Plumb. quamdiu præcip. oriat, quod in colatorio charta empor. tecto impositum cum Aq. comm. sedulo elotum in tantum siccetur ut pulvem unguinosam præbeat, quæ loco frigido servanda est. — Ruß bald verbraucht oder besser jedesmal frisch bereitet werden.

Ratanhia. — *Extractum in Brasilia præparatur.* — *Elixir, tonicum ad dentes* (Maury): Rad. Ratanh. unc. 8, Aq. vulner. spirit. octarios (lit.) 4, Ol. Menth. drach. 2, Ol. Cort. Aur. drachm. 3. Radicem contusam per dies 8 in aq. vuln. macera, filtra tincturam et adde essentias, aptissime in Spir. Vin. rectificatis, unc. 4 solvendas.

Rheum. — *Charta Rhabbarari* (HassP.). Paratur ex Infuso Rhei aquoso (Pulv. unc. 1, Spir. Vin. rectific. unc. 6, digesta sec. art. et filtrata).

Rhododendron maximum (Coxe) bei chronischen Rheumatismen.

Sagapenum ut Ammoniacum etc. depuratur.

Salvia. — *Elaeosaccharum* (HassP.) ut elaeosaccharum anisi. — *Aqua de Herbis vulnerariis* (Gal.) Specier. vulnerar. (Gal.) partem unam, Aquae communis decem, destillent partes quatuor.

Senna. Pulv. pectoralis viridis (Dulk): Pulv. Folior Senn., Sacch. alb., sing. drachm. 6, Tart. depur. drachm. 2, Sem. Foenic. et Anisi, sing. drachm. 1. — *Pulv. stomachalis Dörflingensis* (Dulk): Rad. Inulæ, Calami, Pimpin., Zedoar., Liquir. et Zingib., sing. drachm. 2, Caryophyll., Cardam. min., Cass. cinnam., Piment., Anisi, Cumini, Foenic., Petroselin., Aloës, Rhei, sing. drachm. 3, Macid, Nuc. mosch., sing. drachm. 1, Tart. depurat. unc. 1½, Folior. Senn. unc.

2 $\frac{1}{2}$, Veronic., Centaur. min., Card. bened., Bacc. Junip., sing. scrup. 4, Conchar. praep. drachm. 2, Sacch. albi unc. 10. Pulverata misce sedulo.

Sodium. Linim. ad strumam (RC.): Fell. Tauri rec. unc. 1, Muriat. Sod. unc. $\frac{1}{2}$, solve in Aq. tep. unc. 1, adde Olei Oliv. unc. $\frac{1}{2}$ vel q. s. — *Liq. Natri hydroiodinici* (HassP.) Natri hydr. drachm. 1 $\frac{1}{2}$, Aq. dest. unc. 1, solutionem filtra. — Reagens. — *Natri muriatici s. Salis communis Liqueur* (HassP.) Acidi Salis puri q. libet, saturatur cum Liqueore Salis Sodae purissimi, fluidum filtratum vaporazione in crystallos redigatur, quarum pars unam in Aq. dest. part. 8 solvatur. — Reagens. — *Natri sulphurici s. Salis mirab. Glaub. Liqueur.* (HassP.): Salis depur. drachm. 2, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — *Sal Sodae purissimum* (HassP.): Terra fol. Tart. cryst. in Aq. dest. copia solvitur, solutio Liqueoris Barytae acet. et Arg. nitr. dilutioris ope depurata et filtrata ad siccum inspissatur et residuum in crucibulo platineo comburitur, carbo residuus c. Aqua dest. elutriatur et lixivium vaporando et refrigerando in cryst. cogitur, quae siccatae servantur. — Reagens — *Liqueur* (HassP.): Salis drachm. 3, Aq. dest. unc. 1. — Reagens. — *Murias Sodae s. Sal commune depuratum, Murias Sodae purus* (An. Bel. Gal. HassP.): Sal venale in Aq. comm. triplo solvitur et liquori fervido instillatur Sal Sodae depuratae in Aqua solutam, donec non amplius turbetur; sedimento sponteposito liqore per chartam bibulam filtra et crystallisationi subjice. — *Murias Sodae exsiccatas s. siccatum* (Du. Coxe). Uritur supra ignem in vase ferreo leviter tecto, donec decrepitare cessaverit. — *Natrum chloratum s. chlorinicum, Chlorum s. Chloratum Natrii* (Dulk). Paratur ut Kali muriat. oxygenat., intromittendo Gas Chlori in Solutionem Natri carbonici; in operatione formatur *Natrum muriat. oxygenatum*. — *Sal Thermar. Carolinarum* (Bor4.). Paratur evaporatione Aquae mineralis. Constat e Natro sulph. et carbonico. — *Natrum Succo Citri neutralisatum* ut Citras kalicus parari potest.

Succini Oleum reductum (Coxe): Ol. Succini lib. 1, Petrol. lib. 2.

Sulphur. S. iodatum, Iodetum Sulphuris. Massa sublimatione Vaporum Iodi et Sulphuris obtenta. Neuerbings bei chronischen Hautauschlägen (in Salbenform 1 bis 2 Scrupel auf die Unge Fett) besonders psoriasis, lepra vulgaris, favus mit Nutzen angewendet.

Taraxacum. Spec. viscer les pro clysinare Kaempfi (Dulk): Herb. Tarax., Rad. Tarax., Valerian., Gramin., Marrub. atb., Chamom. vulg., sing. unc. 1.

Terebinthina. — *Emplast. Thuris comp.* (Coxe) Picis Burg. lib. $\frac{1}{2}$, Sang. Drac. unc. 3, Empl. Litharg. lib. 3. — *Linimentum ammoniato terebinthinatum* (RC.) Ol. Oliv. part. 4, Ol. Terebinth., Aq. font., Ammoniae liq., sing. part. 1. Eöhmung, rheum. und Gelenkschmerzen. Interdum additur Solutionis Saponis aequa portio et Tinct. Canth. part. 2. — *Unguent. resinosum* (RC.) 1) Terebinth. part. 7, Coloph., Adip. suill., sing. part. 1. 2) Adip. suill., Coloph., Cerae flav., Ol. Oliv., sing. part. 1. 3) Adip. suill. part. 8., Coloph. part. 5, Cerae flav. part. 2. — *Linim. resinoso-terebinthinatum* (RC.) Ung. resinos., Olei Tereb. sing. part. aeq.

Tormentilla. Extracti Tinctura (RC.) ut Tinct. Kino II. 45.

Vaccae Stercus, Kuhmist; wird bisweilen als Cataplasma von dem gemeinen Manne empirisch gegen Hämorrhoiden angewendet. In der Pharmacie hat man davon die *Aqua Florum omnium* (Wir. Sp.) R. Vaccae Stercoris recentis et mense Junio collecti partem unam, Aquae partes tres; stercore in sacco linteo incluso, destillatio ita instituat ut pro libra quaque materiae stercoralis Aquae sesquilibra prodeat. — Außerlich als cosmetisches, innerlich als Gichtmittel, bei Kolik, Harnsteinen und Unterdrückung der Urinabsonderung empfohlen.

Valeriana. Pilulae. Rad pulv., Extract. Valerian., sing. drachm. 1, Olei Valer. gutt. 10. F. pil. gr. j. 5 bis 15 Etüct.

Vinum et Vitis. Spir. Vini Gallici (Bor4.). Eine gelbliche, aus Alcohol, Wasser und irgend einem ätherischen Princip bestehende Flüssigkeit, welche durch Destillation aus französischen Weinen und aus den der weinigen Gährung unterworfenen Weinrestern bereitet wird. Spec. Gew. = 0, 940 — 0, 950.

Zincum. Z. hydroiodicum oxydatum, Hydriodas zincicus. Iodi et Ziinci, sing. part. aeq. vel Ziinci, 20, 28 et Iodi 76, 52 — Collyrium Hydriodatis zincici: Hydriodatis gr. 15, Aq. dest. unc. 6. Von Proutet bei scorfulösen Augentzündungen empfohlen. — Unguent. ad strumam: Hydriodat. drach 1, Axung. unc. 1. Ein oder zwei Mal täglich einzureiben (Ure). — Liquor Ziinci muriatici s. Muriatis zincici paratur e Zinco Indico a ferro libero et Acido muriatico concent., addendo acido in vitro amplo contento prioris tantum, donec partuncula postrema, et vase calefacto, non amplius solvitur. Solutio cum Aquae aequali quantitate diluta colatur. Parari potest quoque liquor monitus solutione Ziinci chlorici (Butyri Ziinci) in Aqua. Heilmittel, mit 15 Theilen Wasser noch mehr verdünnt, als Waschwasser oder Salbe, als Hautreiz, wodurch ein Ausschlag entsteht, von P a p e n g u t h bei hartnäckigen scorfulösen Hohlgeschwüren; Hautle wandte beide Formen, nach Umständen, bei veralteten atonischen, syphil., scrof. und herpet. Geschwüren an.



R e g i s t e r.

(Um nicht durch ein besonderes französisches und englisches Register das Werk zu sehr auszudehnen, sind die Kunstnamen jener fremden Sprachen so genau wie möglich in's Lateinische übertragen worden, Acetate, Chlorure etc. durch Acetas, Chloruretum. Sollte indeß der Raum es gestatten, so werden einige der abweichendsten fremden Kunstnamen am Ende angehängt werden. Das Add. nach II. im Register selbst bezieht sich auf die Nachträge; nur der zweite Band ist mit II. bezeichnet)

A.

Abelmoschus, 1.
 Abies balsamea, 1. 2.
 — pectinata, 1. 2. II. 618.
 — picea, 1.
 Abrofanum foemin., 4. II. 514.
 — hortense, 4.
 — mas, 4.
 — montanum, 4. II. 514.
 Abrus precatorius, 4.
 Absinthium alpinum, 4. 277.
 — maritimum, 5.
 — Ponticum, 5.
 — Romanum, 5.
 — vulgare, 4.
 Acacia Aegyptiaca, 15.
 — Germanica, 15. II. 423.
 — Arabica-vera.
 — nostras, 15. II. 423. 424.
 — Catechu, 442.
 — vera, 15.
 — vulgaris, II. 423.
 Acaciae Gummi, 726.
 Acanthium vulgare, 417.
 Acanthus mollis, 15.
 Acemella, 59.
 Acetabularia Mediterranea, 741.
 Acetas Aluminae, 141.
 — ammoniacalis, 173.
 — Ammoniae, 173.
 — aquosus, 173.
 — dilutus, 173.
 — liquidus, 173.
 — solutus, 173.
 — dilutus, 173.
 Barytae, 318.
 — calcicus, 368.
 — Calcis, 368.
 — Calcii Protoxydi, 368.
 — Cinchonini, 524.
 — Cupri, 594.
 — cum baseos excessu, 692.
 — brutus, 592.

Acetas Cupri crudum, 592.
 — Deutoxydi, 594.
 — imperfectum, 592.
 — mellitus, 582.
 — neutrum, 594.
 — cupricus, 594.
 — cum Aqua, 594.
 — Ferri alcoholisatus, 659.
 — liquidus, 659.
 — Peroxydi, 659.
 — Protoxydi, 659.
 — Tritoxydi, 659.
 — Hydrargyri, II. 203.
 — hydrargyrosus, II. 203.
 — Kali, II. 398.
 — kalicum, II. 398.
 — kalicum II. 398.
 — Lixiviae, II. 398.
 — solutus, II. 399.
 — Morphei, II. 215.
 — morphicus, II. 215.
 — Morphii, II. 215.
 — Morphinae, II. 215.
 — natricus, II. 585.
 — cum Aqua, II. 585.
 — Oxydi Ferri liquidus, 660.
 — Plumbi, II. 339. 346. 347.
 — crystallisatus, II. 347.
 — in cryst. concret. II. 347.
 — acidulus siccus, II. 346.
 — solutus, II. 346.
 — cum baseos excessu, II. 340.
 — depuratus, II. 347.
 — liquidus, II. 339. 350.
 — cum Alcohole, II. 342.
 — neutrum, II. 346.
 — Protoxydi, II. 346.
 — solutus, II. 350.
 — plumbic. crystalli, II. 346.
 — crudus, II. 339.
 — cum Aqua depurat. II. 347.

Acetas Potassae, II. 393.
 — aquosus, II. 399.
 — liquidas, liquidus, II. 399.
 — Protoxydi Calcii, 368.
 — Potassii, II. 398.
 — Sodii, II. 585.
 — Sodae, II. 585.
 — crystallisatus, II. 585.
 — superplumbicum aquos., II. 339.
 — Zinci, II. 694.
 — dilutum, II. 695.
 Acetis Ammoniae, 173.
 — liquidus, 173.
 — Hydrargyri, II. 203.
 — kalicum s. kalicus, II. 398.
 — Lixiviae, II. 398.
 — Plumbi, II. 339. 346. 347.
 — liquida, II. 339.
 — Potassae, II. 398.
 — liquida, II. 399.
 — Sodae, II. 585.
 — Zinci, II. 694.
 Acetosa nostras, 15.
 — officinalis, 15.
 — pratensis, 15.
 — rotundifolia, 15.
 Acetosella, 16.
 Acetosellae Sal, II. 403.
 Acetum, 17.
 — acetosum, 17.
 — alliatum, 91.
 — Allii, 91.
 — compositum, 92.
 — antimephiticum, 92.
 — antisepticum, 92. 204.
 — Armoraciae, II. 439.
 — aromatic., 204. II. 20. 112. 478.
 — alliatum, 92.
 — Belladonnae, 297.
 — bezoardicum, 204. II. 112.
 — Sylvii, 202.
 — Calendulae Florum, 370.
 — camphoraum, 377.

- Acetum Capsici spirituosum, —
 — Caryophylli, 609.
 — chalybeatum, 659.
 — Coffeae, 550.
 — coffeae extemporan., 550.
 — Colchici, 552.
 — colchiticum, 552.
 — commune, 17.
 — concentratum, 20.
 — — Westendorffii, 20.
 — Convallariae majalis, 568.
 — crudum, 17.
 — Cyperi longi aromaticum, 601.
 — — destillat. — A. acet. ditut. —
 — — concentrat., 20.
 — Digitalis saccharat., 614.
 — Dracunculi, 277.
 — dulcificatum, 67.
 — — per frigus concentrat. —
 Acet. concent.
 — gelu concentrat., 17.
 — glaciale, 20.
 — Hellebori nigri, 741.
 — — albi, 741.
 — hystericum, 440.
 — Lavandulae, II. 58.
 — — compositum, II. 59.
 — laxans, II. 559.
 — laxativum, II. 559.
 — Lithargyri, II. 340. 341. 350.
 — lithargyrites, II. 341.
 — maravillianum, 92.
 — martiale, 659.
 — medicatum, 204.
 — Myrrhae, II. 230.
 — Nicotianae, II. 238.
 — odoratum, II. 112. 478.
 — odoriferum, II. 112.
 — opiaceum, II. 247.
 — Opii, II. 247.
 — Papaveris erratici, II. 308.
 — Piperis Jamaicaensis, II. 327.
 — — longi spirituos. II. 327.
 — Plumbi, II. 341.
 — — concentrat., II. 340. 341.
 — plumbicum, II. 340.
 — Primulae veris, II. 422.
 — prophylacticum, 204.
 — Pseudo-Narcissi, II. 232.
 — purificatum, 17.
 — pyrolignos. — Acid. pyrol.
 — purum concentrat., 17.
 — quatuor latronum, 92. II. 59.
 — — composit., 93.
 — radicaum, 19.
 — Rheados, II. 308.
 — Rorismarini, II. 478.
 — Rosae, II. 471.
 — Rosarum, II. 471.
 — — compos., II. 472.
 — Rubi Idaei, II. 488.
 — rutaceum, II. 491.
 — Rutae, 491.
 — — camphorat., II. 492.
 — — compos., 440.
 — Salviae, II. 502.
 — Sambuci, II. 509.
 — sambucinum, II. 509.
 — Saturni, II. 341.
 — — concentratum, II. 340.
 — saturninum, II. 340. 341.
 — Scillae, II. 540.
 — Scillites alcoholicum, 541.
 — scilliticum, II. 540.
 — Terebinthinae, 19. II. 627.
 — theriacale, II. 5.
 — tunicae, 609.
 — Veratri, 741.
 — Vini, 17.
 — — camphorat., 377.
 — — concentrat., 17. 19.
 — — destillat., 17.
 — — glaciale — Acet. concent.
 — — destillat. — A. acet. ditut. —
 — — concentrat., f. Acetum concent.
 — — debile s. dilutum, 17.
 — — impurum, 17.
 — — odoratum, II. 478.
 — — pur., f. Acid. acetic.
 — — cum Scilla, II. 540.
 — — scilliticum, II. 540.
 — — tenue, 17.
 — — camphoratum, 377.
 — — dilutum et vulnerarium, II. 502.
 — — Acetosellae, 49.
 — — acetosum, 17.
 — — — destill. — Acid. acet. dilut.
 — — — camphorat. — Acid. acet. camphorat.
 — — acetosum forte, 17.
 — — aëreum, 27.
 — — antimonicum, 215. 219.
 — — arsenicale, 273.
 — — arsenicosum, 270.
 — — — liquidum, 270.
 — — — vitreum, 270.
 — — Benzoës, 24.
 — — benzoicum, 24.
 — — boracicum, 26.
 — — Boracis, 26.
 — — borussicum, 34.
 — — boruss. alcoholic., 36.
 — — carbonicum, 271.
 — — carthamicum, 421.
 — — citricum, 30.
 — — — concretum, 31.
 — — cretaeum, 27.
 — — ellagicum, 678.
 — — formicicum, 671.
 — — hydriodicum, II. 8.
 — — hydro-carbonicum, 49.
 — — hydrochloricum, 31.
 — — hydrochloro-nitricum, 258.
 — — hydrocyanicum, 34.
 — — — Vauquelinii, 35.
 — — — alcoholic., 36.
 — — — dilutum, 37.
 — — — spirit. aquos., 37.
 — — — Harlesii, 37.
 — — — Kellersi, 36.
 — — hydro-iodicum, II. 8.
 — — hydro-sulphuratum, 42.
 — — hydro-sulphuricum, 42.
 — — hydrothionicum, 42.
 — — — liquidum, 42.
 — — iodicum, II. 8.
 — — kramerium, 442.
 — — laccicum, II. 47.
 — — Ligni pyro-oleos., 18.
 — — Lignorum, 18.
 — — Limonum, 30.
 — — muriaticum, 31.
 — — — alcoholisatum, 34.
 — — — concentratum, 31.
 — — — crudum, 31.
 — — — dephlogist., 509.
 — — — dilutum, Add.
 — — — liquid. — Acid. mur.
 — — — nitros. oxygenat., 258.
 — — — oxygenat., 509. 510.
 Acidum mur. oxygenat. ad contagia, 509.
 — — Nitri, 45. 46.
 — — — concentratum, 46.
 — — — fumans, 46.
 — — — nitrico-muriaticum, 258.
 — — — nitros. concentrat. 46.
 — — — — dilutum, 47.
 — — nitricum, 45.
 — — — alcoholisatum, 48. 71.
 — — — aromaticum, 47.
 — — — crudum, 46.
 — — — dilutum, 47.
 — — nitro-muriaticum, 258.
 — — nitroso-nitricum, 46.
 — — — oxymuriaticum, 258.
 — — nitrosium, 46. 47. et Add.
 — — — alcoholic., 71.
 — — — dilusum, 47.
 — — — liquidum, 46.
 — — oxalicum, 49.
 — — oxymuriaticum, 509. 510.
 — — Phosphori, 49.
 — — — fusum s. glaciale, 50.
 — — phosphoricum, 49.
 — — — depuratum, 50.
 — — — purum, 50.
 — — phosphorosum, 52.
 — — prussicum, 31.
 — — — medicinale, 35.
 — — pyrolignosum s. pyrolignosum crudum, 18.
 — — pyrolign. rectific., 19.
 — — pyrotartaric., II. Add.
 — — rheumaticum, II. 447.
 — — ricinicum, II. 463.
 — — sabadillicum, II. 493.
 — — Sacchari, 49.
 — — saccharinum, 49.
 — — Salis culinaris, 31.
 — — — dephlogist. — Acid. muriat. oxygen.
 — — — marini, 31.
 — — — oxygenat., 509. 510.
 — — sorbicum, II. 688.
 — — stearo-ricinicum, II. 463.
 — — stibiosum et stibicum, 215.
 — — Succini, 52.
 — — succinicum, 52.
 — — — crudum, 52.
 — — — depuratum, 52.
 — — sulphuricum, 52.
 — — — alcoholic. — Elixir acid. Hall.
 — — — alcoholisat., 55.
 — — — aquosum, 53.
 — — — aromat., 395.
 — — — concentrat., 53.
 — — — — rectific., 53.
 — — — crud. s. venale, 52.
 — — — dephlogisticat. s. depuratum s. defaecatum, 53.
 — — — dilutum, 53.
 — — — purum, 53.
 — — — purissimum, 53.
 — — — rectificatum, 53.
 — — — tenue, 53.
 — — Sulphuris volatile, 56.
 — — sulphurosus, 56.
 — — — aethereum, 76.
 — — Tartari, 57.
 — — — crystallis., 57.
 — — tartaricum, 57.
 — — tartarosum, 57.
 — — uricum, 59.
 — — Vitrioli, 53.
 — — — c. Alcoh. arom., 395.
 — — — alcoholisat., 55.
 — — — aromatic., 395.
 — — — defecat., 53.
 — — — dephlogisticat., 53.
 — — — depuratum, 53.
 — — — difutum, 53.
 — — — purissimum, 53.
 — — — rectificatum, 53.

- Album Cerussae, II. 336.
 — Ceti, 453.
 — graecum, 364.
 — de Krens, II. 336.
 — Plumbi, II. 336.
 Albumen aluminos., 139. II. 300.
 Ovi, II. Add.
 Alcahest Glauberi, II. 380.
 — ammoniacale, 159.
 Alcali ammoniacale spirit., 148.
 — Ammoniacum acetat., 173.
 — — caust., 144.
 — — fluid., 141.
 — — spirituos., 148.
 — — succinat., 179.
 — causticum, II. 371.
 — fixum tartarisat., II. 404.
 — — vegetabile impurum,
 II. 377.
 Lignorum depurat., II. 378.
 minerale, II. 577.
 — acetatum, II. 584.
 — crudum, II. 577.
 — crystall., II. 577.
 — depurat., II. 577.
 — fixum, II. 577.
 — perfecte saturatum,
 II. 579.
 — phosphorat., II. 582.
 — sulphuric., II. 583.
 — tartarisat., II. 412.
 — vitriolat., II. 583.
 phlogisticatum, 38.
 Tartari, II. 378.
 — Aceto saturatum, II. 398.
 vegetabile aërat., II. 377. 378.
 — — crud., II. 377.
 — — c. Aceto, II. 398.
 — — caust. — Alc. caust.
 — crystallisat., II. 384.
 — perfecte saturatum,
 II. 384.
 — salito-dephlogisti-
 catum, II. 397.
 — — vitriolat., II. 404.
 — — volatilis acetatum, 173.
 — — aëratum, 159.
 — — ammoniacale, 159.
 — — anisatum, 149.
 — — aquosum, 161.
 — — causticum, 144.
 — — concretum, 159.
 — — crudum, 159.
 — — depurat., 159.
 — — fluor, 144.
 — — nitratum, 169.
 — — purum, 144.
 — — ex Sale Ammoniaco, 159.
 — — siccum, 159.
 — — tartarisat., II. 413.
 Alcanna, 192.
 — — orientalis, II. 62.
 — — spuria, 192.
 — — vera, II. 62.
 Alcea, 80.
 — — aegyptiaca, 1.
 — — rosea, — Althaea rosea.
 Alces unguia, 682.
 Alchemilla, 81.
 — — major, 81.
 — — vulgaris, 81.
 Alchornea latifolia, 88.
 Alcis cornu, 364.
 Alcohol, 81. 85.
 — Absinthii — Tinct. Abs.
 — absolutum, 81. 83. 84. 85.
 — Aceti, 20.
 — aethereum ferrat., 665.
 — cum Albumine, II. 299.
 — — albuminosum, II. 299.
 — — alcalisatum, 83. II. 373.
 — cum Aloë perfoliata, 96.
 — — albuminosum, II. 299.
 — — ammoniacale, 148.
 Alcohol ammoniacale campho-
 rat., 150.
 — — ammoniacat aromatis., 151.
 — — Ammoniae anisatum, 149.
 — — et Guajaci, 712.
 — — ammoniat., 148.
 — — foetidum, 285.
 — — anisat., 149.
 — — aromatic., 151.
 — — aromatizat., 151.
 — — cum Guajaco, 712.
 — — Angelicae composit., 199.
 — — Anisi, 210.
 — — — composit., 210.
 — — Anthos composit., II. 484.
 — — antidontalgicum, 377.
 — — cum Aromatibus compo-
 situm, 393.
 — — — sulphuric., 395.
 — — aromaticum, 38. 393. II. 57.
 — — ammoniat., 151.
 — — sulphuric., 395.
 — — aromatizat. Colouiense, 438.
 — — Asae foet. etc., f. Essentia
 ober Tinctura.
 — c. Asa foetida et Opio, 287.
 — cum Aurantio, 634.
 — Aurantior. Cortic., 534.
 — balsamicum, 758.
 — c. Balsamo Peruviano, 308.
 — — Benzoeate Ammoniae,
 II. 259.
 — — Brucini, 334.
 — — Camphorae saponaceum,
 II. 418.
 — — — nitricatum, 377.
 — — camphoratum, 376.
 — — crocatum, 376.
 — — cum China compos. Hux-
 hami, 503.
 — — castoreatum, 436.
 — — Chinae comp. — Elix. rob.
 Whytt.
 — — Cinnamomi, 387.
 — — Citri compositum, 638.
 — — cum Coctionella compo-
 situm, 394. II. 671.
 — — c. Cochlearia et Lacca, 549.
 — — Cochleariae destill. — Spir.
 Cochl.
 — — commune, 84.
 — — — concentratiss., 85.
 — — concentratum, 85.
 — — crocatum, 376.
 — — c. Crotone Cascarilla, 428.
 — — depurat., — Spir. Vini
 rectificat. u. rectificatiss.
 — — cum Deutoiodureto Mer-
 curii, II. 188.
 — — dilutus, 82.
 — — dilutum, 83. 85.
 — — — amarum, II. Add.
 — — — ascorbut., II. Add.
 — — ferratum, 654.
 — — Formicarum destillat., 671.
 — — fortius, 82.
 — — cum Guajaco offic. ammo-
 niat., 712.
 — — Helonii — Tinct. Hel.
 — — — compositum, II. 484.
 — — Iodi, II. 7.
 — — Iodii, II. 7.
 — — Juniperi compos., II. 42.
 — — cum Lacca, II. 48.
 — — — Lavandula comp., II. 60.
 — — Lavandulae — Spir. Lav.
 — — Melissae comp., II. 110.
 — — Muriatis Oxyduli Ferri —
 Tinct. Ferri ammon.
 — — nitricatus Camphorae, 377.
 — — nitrico-aethereum, 71.
 — — nitricum aethereum, 71.
 — — odontalgicum, 377.
 — — opiatum, II. 253.
 — — Opii dilutum, II. 255.
 Alcohol cum Opio, II. 253.
 — — — aromaticum,
 II. 255.
 — — phosphoratum, II. 320.
 — — polyaromaticum, II. 503.
 — — Potassae, II. 373.
 — — purissimum — Alc. absolut.
 — — cum Ratanhia acetatus, 443.
 — — rectificatissimum, 85.
 — — rectificatus, 85.
 — — cum Rheo, 458.
 — — Resini balsamicis, 321.
 — — Rorismarini comp., II. 484.
 — — Salviae vulnerariae, II. 503.
 — — saponatum, II. 417.
 — — Serpylli composit., 150.
 — — cum Succino, II. 597.
 — — — Sulphate Ferri tarta-
 risatum, 666.
 — — sulphuricatum, 55.
 — — sulphurico-aethereum, 75.
 — — — Ferri, 655.
 — — sulphuricum aether., 75.
 — — — cum Ferro, 655.
 — — sulphuricus, 55.
 — — — acidus — Elix. acid.
 Hall
 — Sulphuris, II. 600.
 — — supercarbonatum, 376.
 — — cum Tartrate Potassae fer-
 ratum, 665.
 — — Terebinthinae, II. 627.
 — — terebinthinatum compos.,
 II. 628.
 — — Thymi, II. 619.
 — — venale, 81.
 — — Vini, 84. 85.
 — — — alcoholisatus, 85.
 — — — rectificatissimus, 83.
 — — — communis, 84.
 — — — rectificatus, 85.
 — — Vitae saponaceum, II. 418.
 Alcohol camphoratus — Alcohol
 camph.
 Alcoholatum de Cochlearia, La-
 vandula, Melissa comp.,
 Rosmarino, f. Spir. Coch-
 lear. etc.
 Alcornoco, 88.
 Aletris farinosa, 28.
 Alexiterium aceticum, 21.
 — — ammoniacale, 160.
 — — chloricum, 609.
 — — nitricum, 47.
 — — nitro-muriaticum, 258.
 Alimentatio antiscorbatica, 432.
 Alisma Plantago, II. 332.
 Alkali, f. Alcali.
 Alizarium, II. 485.
 Alkanna, 192.
 Alkekengi, 88.
 Alkermes liquidum, 394. II. 671.
 Alleluja, 16.
 Alliaria, 89.
 Allium, 89.
 — — alpinum, 93.
 — — Ascalonicum, 89.
 — — Cepa, 89.
 — — montan. latifol., 93.
 — — Porrum, 90.
 — — sativum, 90.
 — — Scorodoprasmus, 93.
 — — victoriiale, 93.
 Alnus glutinosa,
 — — nigra baccifera, II. 444.
 Aloë, 91.
 — — Barbadiensis, 93.
 — — caballina, 94.
 — — Capensis, 93.
 — — depurata, 94.
 — — hepatica, 93.
 — — insuccata, 94.
 — — linguaformis, 94.
 — — lota, 94.
 — — lucida, 93.

- Aloë pellucida, 93.
 — perfoliata, 91.
 — praeeparata, 94.
 — purificata, 94.
 — rosata, 94.
 — Socotrina, 93.
 — Socoterina, 93.
 — Socotrina, 93.
 — spicata, 94.
 — Succotrina, 93.
 — violata, 94.
 — vulgaris, 94.
 Aloysia, II. 673.
 Alpinia Cardamomum — Cardam. min.
 — Galanga, 676.
 Alsiue, 118.
 — media, 118.
 Althaea, 118.
 — officinalis, 118.
 Altigia rosea, II. 96.
 — coerulea et excelsa — Li-
 quidambar styraciflua.
 Altix, 290.
 Alumen, 134.
 — calcinatum, 131.
 — crudum, 134.
 — draconisatum, 135.
 — exsiccatum, 134.
 — igne exsiccatum, 134.
 — kinosatum, 135.
 — plumosum, 144.
 — a Rocca, 134.
 — rupei, 134.
 — rupeum, 134.
 — saccharinum, 136.
 — scissile, 366.
 — tinctum, 135.
 — — Mynsichti, 135.
 — ustum, 134.
 Alumina, 131.
 Aluminium, 131.
 Alveolaria lamellifera, 357.
 — corticifera, 357.
 Amalgama Stantii, II. 591.
 Amanita, 142.
 — muscaria, 142.
 Amara dulcis, 618.
 Amaranthus luteus, II. 593.
 Amaryllis Zeylanica, II. 531.
 Ambarum cineritum, 142.
 Ambarvalis, 609. II. 365.
 Amblutum, 609.
 Ambra, 142.
 — ambrosiaca, 142.
 — flava, II. 596.
 — grisea, 142.
 — liquida, II. 595.
 — vera, 142.
 Ambutus, 524.
 Amiantus, 144.
 Amidoa, 189.
 Ammi, 144.
 — Creticum, 144.
 — verum, 144.
 Ammonia, 144.
 — caustica, 144.
 — liquida, 144.
 — liquida, 144.
 — muriatica, 169.
 — praeeparata, 159.
 — pura, 144.
 — liquida, 144.
 Ammoniaca alcoholisata, 148.
 Ammoniacum, 144.
 — causticum, 144.
 — depuratum, 719.
 — Gummi, 718.
 — liquidum, 144.
 — Sal depuratum — Amm.
 mur. depur.
 — succinatum, 158.
 — volatile mite, 159.
 Ammoniae Phosphas etc. f. Ph.
 Ammon.
- Ammonium carbonicum, 159.
 — — crudum, 159.
 — — depurat., 159.
 — — pyro-oleos., 162.
 — citratum, 181.
 — hydrosulphurat. liq., 172.
 — hydrothionie. liquid., 172.
 — muriaticum, 169.
 — — crudum, 169.
 — — depurat., II. 169.
 — — ferruginosum, 657.
 — — martiale, 657.
 — — martiatum, 657.
 — oxalicum, 178.
 — subcarbonicum, 159.
 — — pyro-oleos., 162.
 — sulphuricum, 169.
 — tartaricum, II. 413.
 Ammoniuretum Cupri, 584-588.
 — 589.
 — — compos., 588.
 — Hydrargyri, II. 189.
 — Mercurii, II. 189.
 — Zinci, II. 690.
 Amomum, II. 326.
 — Cardamomum — Matonia.
 — Curcuma — Curcuma.
 — Galanga — Alpinia Galang.
 — Granum Paradisi, 706.
 — latifolium — A. Zedoaria.
 — maximum, 706.
 — racemosum, 476.
 — repens, 416.
 — Zedoaria, II. 682.
 — Zerumbeth, 431.
 — Zingiber, II. 695.
 Amorcium, II. 295.
 Amygdalae, 182.
 — amarae, 182.
 — dulces, 182.
 — excorticatae, 182.
 Amygdalus, 181.
 — communis, 181.
 — nana, 181.
 Amylum, 789.
 — Solani tuberosi, II. 587.
 — Hordei, 745.
 — Marantae — Arrowroot
 Amyris, 191. 319.
 — elemifera, 620.
 — Gileadensis, 307.
 — Kataf, II. 225. 244.
 — Opobalsamum, 191. 307.
 Anacardium longifolium, 191.
 — orientale, 191.
 Anacyclus officinar. u. Pyre-
 thrum — Anthemis Pyrethr.
 Anagallis aquatica, II. 673.
 — mas, 192.
 — phoenicea, 192.
 Anatron, II. 387.
 Anchusa, 192.
 — officinalis, 192.
 — tinctoria, 192.
 Andromeda mariana, II. Add.
 Andropogon Nardus, II. 233.
 — Schoenanthus, 193.
 Androsæmum, 767.
 Anemone, 193.
 — nemorosa, 193.
 — pratensis, 193.
 — Pulsatilla, 193.
 Anemoneum, 194.
 Anemoninum, 194.
 Anethum, 195.
 — Foeniculum, 195.
 — graveolens, 197.
 — hortense, 197.
 — ursinum, II. 207.
 Angelica, 198.
 — Archangelica, 198.
 — hortensis, 198.
 — sativa, 198.
 — sylvestris, 198.
 Anguis odoratus, 357.
- Anguillae hepar, 682.
 Anguria, 579.
 Angustura, 366.
 — ferruginea, 206.
 — spuria s. venenosa, 206.
 — vera, 206.
 Anima Rhabarbari, II. 451-452.
 — Rhei, II. 451-454.
 Anime, 726.
 Anisum, 207.
 — Sinense, 211.
 — stellatum, 211.
 — vulgare, 207.
 Anodynum specif. Paracelsi —
 Guttae nigrae.
 Anserina, II. 421.
 Antennaria dioica, 211.
 Anthemis Cotula, 458-
 — nobilis, 458.
 — Pyrethrum, II. 428.
 — tinctoria, 344.
 Anthophylli, 424.
 Anthora, 60.
 Anthos, 477.
 — sylvestris, II. 62.
 Antidotus mithridatica Damo-
 cratis, II. 275.
 Antihecticum Poterii, 592.
 Antimonii minera, 221.
 — Murias, 235.
 — Oxydum, 214.
 — — vitrificat., 214.
 — Sulphuretum praecip. 221.
 — Tartaris, 236.
 — Vitrum hyacinthin., 214.
 Antimonium, 211.
 — calcinat. cum Nitro, 219.
 — catharticum Wilsoni, 214.
 — chloratum liquidum, 235-
 crudum, 221.
 — — praeparatum, 221.
 — diaphoreticum ablut., 215-
 — Keupii, 215.
 — lotum, 214.
 — martiale, 215.
 — nitratum, 219.
 — non ablut., 219. 220.
 — rubrum, 212.
 — muriaticum, 235.
 — nativum, 221.
 — salinum, 235.
 — sulphuretum, 221.
 — tartarisatum, 236.
 — tartarizatum, 236.
 — ustum cum Nitro, 219.
 — vitrificatum, 214.
 Antiquarium, II. 165.
 Antirrhinum, 248. II. 73.
 — Linaria, II. 73.
 — majus, 248.
 Antophylli, 424.
 Aparine, 677.
 Apatites, 363.
 Apis mellifica, 248.
 Apium, 254.
 — graveolens, 254.
 — montanum, II. 547.
 — petraeum, 336.
 — Petroselinum, 254.
 — saxatile, 336.
 Apochylisma Berberum, 326.
 Apocynum androsaemifol., 258.
 Apozema aperitiv. ferrat., 256.
 — diureticum, 90. f. lib. De-
 coctum.
 Apri dentes, 364.
 Aqua Absinthii, 5.
 — — composita, 6.
 — Acaciae Florum, II. 424.
 — Acetatis s. Acetitis Ammo-
 niae, 173.
 — — superplumbici, II. 342.
 — Acetosae, 16.
 — Acetosellae et Succo, 16.
 — Acidi carbonici, 27.

- Aqua Acidi carbonici camphorata, 372.
 — nitrici diluti, II. Add.
 — sulphur dil., II. Add.
 acidula hydrosulphuros-45.
 acidulata, 27.
 — c. Acido carbon., 27.
 acustica, 167.
 — Ludovici, II. 669.
 adstringens, II. 692.
 aerata, 27.
 — alcalina, II. 384.
 Aeris fixi, 27.
 aetherea camphorata, 375.
 Agrimoniae, 80.
 Agralinae gasosa, II. 580.
 — oxymuriatica, II. 397.
 alexiteria acetica, 199.
 — simplex, 199.
 — spirituosa, 199.
 aloëtica mercur., II. 145.
 d'Albour, II. 693.
 Aluminis vitriolata, 140.
 aluminosa 138. II. 692.
 — Bateana, II. 692.
 — Batiana, II. 692.
 — Fallopii, 138.
 amara, II. 94.
 Ammoniae, 144. 161.
 — acetata, 173.
 — Acetatis, 173.
 — causticae, 144.
 — Carbonatis, 161.
 — diluta, 147.
 — purae, 144.
 Amygdalar. amar., 41.
 — — concent., 41.
 Anemones, 195.
 Anethi, 193.
 Angelicae, 199.
 Angelica Viennens., II. 100.
 Anhaltina, II. 629.
 Anisi, 209.
 anodyna, 150.
 Anthemidis, 460.
 Anthos, II. 483.
 — spirituosa, II. 483.
 — compos., II. 484.
 antiarthrica, 34.
 antiasthmatica, II. 3.
 antiherpet. Cardinalis de Lugnes, II. 186.
 — antihysterica Quercetani reformata.
 — antimelancholica, 571.
 antimiasmatica, 501.
 — composita, 591.
 — Koechlini, 590.
 antinephritica, II. 578.
 antiophthalmica, II. 694.
 antipsorica, II. 575. 236.
 antiscorbatica, 547.
 apoplectica, II. 484.
 Aquisgranensis artific., 45.
 aromatica, 388. II. 110. 595.
 — compos. cum Acido acet., II. 614.
 — Olei Citri comp., 538.
 — cum Opio, II. 251.
 — spirituosa, II. 223.
 d'Armagnac, 393.
 Armoraciae, II. 438.
 Artemisiae, 275.
 artificialis Bargaensis., 45.
 — Bonnensis, 45.
 Asae foetidae, 285.
 — composita, 286.
 Atriplicis foetidae, 470.
 Aurantii Florum, 527.
 — Foliorum, 527.
 — s. Aurantior. Cort. 527.
 — alcoholica, 528.
 — spirituosa, 528.
 — vinosa, 528.
 Barytae, 317.
 Aqua barytica, 316.
 — Beccabungae, II. 674.
 — Bellilucana, II. 577.
 — benedicta, II. 525.
 — composita, II. 25.
 — Rulandi, 239.
 — Serpylli, II. 650.
 benzoica, 321.
 Betulae artificialis, 86.
 Bonfermii, 393.
 Boraginis, 332.
 Borvonensis, II. 577.
 ad botium, 415.
 Bryoniae albae comp. 436.
 Buglossi, 192.
 Calami, 349.
 Calcariae, 352.
 — acidula, 363.
 — cum China, 353.
 — prima et secunda, 352.
 — sulphurato-stib., 234.
 — ustae, 351.
 Calcis, 352.
 — cum Cera, 154.
 — cerata, 251.
 — cum China, 353. 490.
 — composita, II. 525.
 — potassata, 352.
 — vivae, 352.
 — vulneraria, II. 333.
 Camphorae, 372.
 camphorata Bateana, 586.
 Caponis, 683.
 Carbonatis Ammon., 161.
 — Calcis acidula, 363.
 — Potassae acidula, 334.
 — cum Carbonate Potassae acidula, II. 384.
 — Sodae acidula, II. 580.
 carbonica, 27.
 — Ferri acidula, 647.
 Carbunculi s. contra carbunc., 390.
 — del carcer. di Rom., II. 644.
 cardiaca, II. Add.
 Cardui benedicti, 420.
 Carmelitana, II. 110.
 Carmelitarum, II. 110.
 carminativa, 529. 570.
 — simplex, 461.
 carminativa spirituos., 461.
 Carvi, 423.
 Cascariillae, 426.
 Caryophyllor. arom., 425.
 Cassiae lignae simpl., 380.
 — sine vino, 380.
 — spirituosa, 387.
 — vinosa, 387.
 Castorei vinosa, 434.
 catapultarum, II. 593.
 cathaeret. Plencii., II. 187.
 catarrhalis, 389.
 caustica, II. 187.
 — ad condylomata, II. 180. 201.
 Centaurii minoris, 448.
 cephalica — Ag. aromat.
 — Caroli Quinti, 389.
 Cerasorum, 40.
 — nigror., 40.
 — alcoholica, 40.
 Cerefolii, 457.
 chalybeata, II. 637.
 Chamaemeli, 460.
 Chamomillae, 450.
 — anisata, 462.
 — Florum vinosa, 461.
 Chelidonii, 468.
 Cichorii, 513.
 Cicutae, 517.
 Cinnamomi buglossat., 387.
 — cordialis, 386.
 — cydoniata, 388.
 — hordeata, 386.
 — simplex, 386.
 Aqua Cinnam. sine Vino, 386.
 — — spirituosa, 387.
 — vinosa, 387.
 Citreorum Corticum, 537.
 Citri s. Citri Aurantii, 527.
 — Aurantii Florum, 527.
 — medicae, 537.
 — totius, 538.
 Cochleariae, 647.
 coelestis, 591. 595.
 corulea, 591.
 Coloniensis, 538.
 communis, 680.
 confortativa, 41. 387.
 Convallariae, 568.
 — vinosa, 593.
 cordialis Colladoni, 540.
 — frigida, 387.
 — temporans s. tempere-
 rata Saxonica, 389.
 Coriandri, 570.
 Cornu Cervi citrata, 686.
 — Cortic. Aurant. — Ag. Au-
 rant. Cort.
 — cosmetica, 42. 185. 321. 631.
 II. 582. 145. 631.
 — Cupri ammoniaci, 591. 595.
 — ammoniati, 591.
 — ammon-muriat., 591.
 — vitriolati comp., 587.
 Cyani, 597.
 Cydoniorum, 599.
 dentifricia, II. 112.
 destillata, 680.
 Diatrion, II. Add.
 — diuretica, II. 438.
 — camphorata, II. 394.
 — ex nucleis, 42.
 divina Fernellii, II. 177.
 — mirabilis, 538.
 „Eau de javelle“ dicta,
 II. 575.
 — Ebulli, II. 511.
 embryonum, II. 595.
 emetica, 240. II. 439.
 Enulae, II. 3.
 epidemica Londinens., 201.
 epileptica Langii, 668.
 Euphrasiae, 628.
 exsiccans, II. 342.
 Falconeri, II. 384.
 Farfae, 630.
 ferrata, 614.
 Ferri aërata, 647.
 ferruginosa, 669.
 — cum Gummi, 650.
 — salina, 617.
 ferruginoso-gumm., 650.
 Florum Aurantiorum, 527.
 — omnium, II. Add.
 Foeniculi, 196.
 foetida, 285. 337.
 — antihysterica, 285.
 — Pragensis, 285.
 fortis, 47.
 Fragariae, 672.
 Fragorum, 572.
 fruct. Myrti Pimentae —
 Ag. Pimentae.
 — Fumariae, 675.
 — ad gangraenam, II. 195.
 gelatinosa, 685.
 — ad gingivas, 139.
 — contra gonorrh., II. 630.
 Goulardi, II. 342.
 Graminis, 704.
 grisea, II. 196.
 — Gohlrii, II. 196.
 gummosa, 728.
 Helenii, II. 3.
 — contra hemicraniam, 150.
 hepatica, 42.
 — acidulata, 43.
 — Hirundin. c. Castoreo, 434.
 — simplex, 166.

- Aqua hordeata c. Gummi, 746.
 — Hordei, 746.
 — Hungarica, II. 484.
 — Hydrarg. mur. corros. c.
 Opio, II. 186.
 — — mitis nigra, II. 143.
 — hydrocyanica vegetab., 42.
 — hydrosulphurata, 42.
 — — acidula, 43.
 — hydrosulphurica acida, 43.
 — — acidula, 43.
 — hydrothionica, 42.
 — Hyssopi, 762.
 — hysterica, 434. 438. 462.
 — immortalis, 570.
 — Jugland. Nucum, II. 34.
 — Juniperi, II. 41.
 — Kali, II. 330.
 — — caust., — Liq. Potass.
 — — puri, II. 370.
 — — sulphurati, II. 376.
 — — Sulphureti, II. 375.
 — kalino-aetherea, II. 381.
 — Lactucae sativae, II. 50.
 — Lauri Cassiae — Aq. Cass.
 — Laurocerasi, 39.
 — — cum Belladonna, 297.
 — Lavandulae, II. 59.
 — laxativa, II. 100. 410. 562.
 — — Viennensis, II. 562.
 — Ligni Rhodii, II. 71.
 — Ligustri, II. 72.
 — Liliorum, II. 72.
 — — Convallium, 568.
 — — vinosa, 568.
 — Limonum, 537.
 — — totorum, 538.
 — Lithargyrii Acetatis, II. 339.
 — — acetati, II. 339.
 — — compos., II. 342.
 — lithonotrica, II. 334.
 — Looch sani et experti, 387.
 — Luciae, 158.
 — Lupuli, II. 86.
 — Mad. Lavrilliere, 649.
 — magnanimitatis, 671.
 — — simplex, 671.
 — Magnesia, II. 91.
 — Majoranae, II. 296.
 — Malvae, II. 97.
 — marinae mar. artif., II. 576.
 — Marrubii, II. 103.
 — martialis, 669.
 — mastichina, II. 104.
 — Matricariae, II. 105.
 — medicinalis Hussoni, 551.
 — Melissa, II. 109.
 — — antihysterica, II. 110.
 — — composita, II. 110.
 — — spirituosus, II. 110.
 — — — compos., II. 110.
 — Mellis Andernaci, 249.
 — — odorata regia, 570.
 — Menthae alcohol., II. 119.
 — — composita, II. 120.
 — — crispae, II. 118.
 — — piperitae, II. 119.
 — — Pulegii — Aq. Puleg.
 — — spirituosus, II. 119.
 — — vinosa, II. 119.
 — — viridis, II. 119.
 — mephitica alcalina, II. 384.
 — — mercurialis, II. 185. 187.
 195. 198. 201.
 — — bals. Plenkii, II. 172.
 — — comp., II. 200.
 — — nigra, II. 143.
 — — simplex, II. 123.
 — — salina, II. 195.
 — — mercuriata, II. 201.
 — Mercurii alumin., II. 182.
 — — vivi cocta, II. 123.
 — — vitriolati, II. 182.
 — Millefolii, II. 209.
 Aqua mineralis, II. 584.
 — — acidulata, II. 576.
 — — cathartica, II. 93.
 — — ferrata, 647.
 — — sulphurata, II. 576.
 — — miraculosa, 587.
 — — mulsu, 249.
 — — muriatico-mercurialis ru-
 bra, II. 144.
 — — Muriatis Calcis, 367.
 — — — Ferri, 664.
 — — — composita, 654.
 — — Myrrhae, II. 231.
 — — Naphae, 527.
 — — — Florum, 527.
 — — Nasturtii aquat., II. 231.
 — — Neapolitana, 45.
 — — nephritica, II. 578.
 — — nigra, II. 143.
 — — Nucleum Jugland., II. 34.
 — — Nymphaeae, II. 242.
 — — odorifera, II. 62.
 — — ad oculos d'Yvel, II. 693.
 — — Ononidis, II. 245.
 — — ophthalmica, 170. 587. II.
 339. 341. 350. 686. 691. 692. 691.
 — — adstringens, 138. II. 691.
 — — — alba Danica, II. 694.
 — — — aluminosa, 138.
 — — — caerulea, 591. 595.
 — — — communis, 139.
 — — — Conradi, II. 186.
 — — — mercurial., II. 177. 178.
 — — — Ohdelii, II. 693.
 — — — resolvens, 246. II. 373.
 — — — usualis, II. 686.
 — — — vitriolica, II. 691.
 — — e Vitrioli Zinci, II. 691.
 — — Opii, II. 246.
 — — Origani, II. 296.
 — — Oryzae, II. 298.
 — — Oxycarbonat. aciduli Po-
 tassae, II. 384.
 — — oxygenata, 47. 510. II. 300.
 — — oxigeno-muriatica, 510.
 — — oxymuriatica, 510.
 — — — Chlori, 510.
 — — Paeoniae, II. 301.
 — — Panis, II. 306.
 — — Papaveris erratici, II. 307.
 — — paralyseos, II. 422.
 — — Parietariae, II. 313.
 — — perlata, 41.
 — — pestifentialis, 376.
 — — petalor. Rosae — Aq. Rosar.
 — — Petroselinii, 257.
 — — phagedaemica, II. 144. 145.
 177. 200.
 — — — alba, II. 201.
 — — — comp., II. 201.
 — — — comp., II. 178.
 — — — Grindelii, II. 180.
 — — — Pideritii, II. 178.
 — — physagoga, 210.
 — — picea, II. 330.
 — — Piceis, II. 330.
 — — — liquidae, II. 330.
 — — — Pimentae, II. 327.
 — — — vinosa, II. 327.
 — — Pimpin. Anisi — Aq. Anisi.
 — — Pini Turionum, 2.
 — — Piperis Jamaicaensis, II. 327.
 — — — vinosa, II. 327.
 — — — nigri, II. 327.
 — — Plantaginis, II. 332.
 — — Plumbi acetosi, II. 342.
 — — plumbica, II. 341.
 — — pontificalis, II. 210.
 — — Portulacae, II. 370.
 — — Potassae, II. 370.
 — — — purae, II. 370.
 — — — Carbonat. acidul., II. 384.
 — — — Supercarbonatis — Aq.
 Superc. Potass.
 — — Fragensis, 285.
 Aqua Primulae veris, II. 422.
 — — prophylactica, 202.
 — — Pruni Avium alcoholic., 40.
 — — — Laurocerasi, 39.
 — — — Padii, 41.
 — — Pulegii, II. 425.
 — — Pulsatillae nigric., 195.
 — — Pyramont. factit., II. 476.
 — — pura destill. vuln., II. 505.
 — — purgans c. Tartaro emet.,
 II. 584.
 — — purificata (filtrata vel co-
 cta et lit.),
 — — Rabelii, 56.
 — — Ranunculi albi, 195.
 — — regia, 238.
 — — Reginae Hung., II. 483. 484.
 — — Regis, 258.
 — — — resolvens, II. 584.
 — — Rhoeados, II. 307.
 — — roborans, II. 344.
 — — Rorismarini spirit., II. 483.
 — — Rosae, II. 472.
 — — — centifol., II. 472.
 — — Rosarum, II. 472.
 — — Rubi Idaei, II. 489.
 — — rubra, II. 177. 501.
 — — Rutae, II. 493.
 — — Sabinae, II. 41.
 — — c. Saccharo Saturni, II. 350.
 — — salina, II. 411.
 — — Salviae, II. 502.
 — — — composita, II. 502.
 — — — spirituosus, II. 502.
 — — Sambuci, II. 510.
 — — — Florum, II. 510.
 — — saphirina, 591. 595.
 — — Sassafras, II. 526.
 — — — compos., II. 526.
 — — Saturni, II. 312.
 — — saturnina, II. 311. 342. 350.
 — — Scabiosae, II. 527.
 — — sclopetaria, 23. II. 503.
 — — — aromatica, II. 503.
 — — Scordii, II. 645.
 — — — composita, II. 286.
 — — Sedlitz. artificialis, II. 93.
 — — Seldnerana, II. 570.
 — — Seminum Fbeniculi — Aq.
 Foenic.
 — — Serpylli, II. 649.
 — — — composita, II. 650.
 — — Sinapis, II. 572.
 — — sine pari, 538.
 — — Sodae, II. 580.
 — — — Supercarb. — Aq. Su-
 perc. Sodae.
 — — Solani nigri, II. 587.
 — — spermatis Ranarum, 692.
 — — Sperniolae, 692.
 — — spirit. Citri compos., 538.
 — — splenetica, 438.
 — — Stibitensis, II. 127.
 — — stibinata, 240.
 — — stomachica, II. 189. 579.
 — — styptica, 457. 587. 650. II. 692.
 — — de Moutte la Faveur, 650.
 — — Clementina, II. 644.
 — — Looßii, 664.
 — — Subacetat. plumb., II. 342.
 — — Subcarbonatis Kali, II. 380.
 — — — Magnes. carbonica,
 II. 94.
 — — Sulphatis Aluminae, 138.
 — — — Zinci aluminosa, II. 692.
 — — sulphurata acidula, 43.
 — — — acida, 43.
 — — Sulphureti Ammoniae, 172.
 — — — Kali, II. 375.
 — — — Potassii, II. 375.
 — — sulphureos, 44.
 — — — composita, II. 509.
 — — Superacetatis Plumbi li-
 quidi — Aq. vegeto-min.
 — — Supercarb. kalici, II. 384.

- Aqua Supercarb. Potass. II. 384.
 — Sodae, II. 580.
 — Swietenii, II. 178.
 — ad synovium, II. 196.
 — Tanacetii, II. 614.
 — Tenellorum Cornu Cervi composita, 166.
 — terebinthinata, II. 618.
 — Thedeniana, 23.
 — theriacalis, 200.
 — — calida, 200.
 — — composita, II. 286.
 — — frigida, II. 286.
 — — Romana, II. 286.
 — — simplex, II. 286.
 — Thymi, II. 640.
 — Tiliae. Tiliae Flor., II. 650.
 — tofana, II. Add.
 — Tormentillae, II. 651.
 — ad tormina infant., II. 121.
 — traumatica, II. 603.
 — — Thedenii, 23.
 — Travezii, II. 93.
 — de tribus, II. Add.
 — Typhor. Cervi comp., 166.
 — Valerianae, II. 670.
 — — composita, II. 670.
 — Vanillae, II. 671.
 — vegetabilis mineralis Gou-
 lardi, II. 342.
 — — vegeto-mineralis, II. 342.
 — — Bellii, II. 351.
 — — Goullardi, II. 342.
 — — de Pressavin, II. 205.
 — — Veronicae, II. 674.
 — — vinosa, II. 674.
 — violacea, II. 20.
 — Violarum, II. 677.
 — viridis, 595.
 — visceralis, 760.
 — Vitae, 81.
 — — Guajaci, 711. 712.
 — — mulierum, 389.
 — — purgans, II. 34.
 — — rectificata, 84.
 — — saponacea, II. 418.
 — — Vitrioli alba, II. 691.
 — — coerulea, 591.
 — — vitriolica coerulea, 587.
 — — vitulina, 693.
 — — vulneraria, 23. 56. II. 58.
 — — 333. 503. 644.
 — — acetosa, II. 502. 644.
 — — acida, 23.
 — — cum Alcohole — Aq.
 — — vuln. vinosa.
 — — aquosa, II. 505.
 — — camphorata, II. 351.
 — — Plenkii, II. 561.
 — — Romana, II. 210.
 — — spirituosa, II. 501. 503.
 — — Succorum vegetabi-
 — lium, II. 210.
 — — Thedenii, 23.
 — — vinosa, II. 502.
 — — Vulvariae, 470.
 — — Zedoariae anisata, II. 683.
 — — vinosa, II. 683.
 Aquifolium, 259.
 Aquila alba, II. 155.
 — — mitigata, II. 155.
 Aquilaria ovata, II. 69.
 Aquilegia, 259.
 — — vulgaris, 269.
 Aracus aromaticum, II. 670.
 Aralia, 259.
 — — nudicaulis, 259.
 — — spinosa, 259.
 Aranea domestica, 260.
 Arbor Vitae, 260.
 Arbutus Uva Ursi, II. 660.
 Arcanum Archideti, 355.
 — — bechicum Willisii, II. 377.
 — — corallinum, II. 145.
 — — cosmeticum, II. 95.
 Arcanum duplicatum, II. 385.
 — — — depurat., II. 385.
 — — — Myrsiciti, II. 385.
 — — Tartari, II. 398.
 Arctium Bardana et Lappa, 313.
 Areca Catechu, 442.
 Argel, II. 548.
 Argentaria, II. 421.
 Argenti Nitras — Arg. nitr. fus.
 Argentina, II. 421.
 Argentum, 260.
 — — cupellatum, 260.
 — — foliatum — Argentum.
 — — nativum, 260.
 — — nitratum, 260.
 — — nitricum, 260.
 — — — crystallisat., 260.
 — — — fusum, 261.
 — — purum, 260.
 — — sulphuricum, 263.
 — — vivum, II. 122.
 Argilla, 131.
 — — ferruginea rubra, 131.
 — — Kali sulphur. alcalisata, 134.
 — — pura, 131.
 — — sulphurica, 134.
 — — — alcalisata, 134.
 — — — usta, 134.
 Arguel, II. 548.
 Arisarum, 277.
 Aristolochia, 263.
 — — cava, 674.
 — — Clematitis, 263.
 — — Cretica, 263.
 — — fabacea, 674.
 — — longa, 263.
 — — Pistolochia, 263.
 — — polyrrhiza, 263.
 — — rotunda, 263.
 — — Serpentaria, 264.
 — — tenuis, 263.
 — — trilobata, 264.
 — — vulgaris, 263.
 — — — rotunda, 674.
 Armoracia, II. 437.
 Arnica, 265.
 — — montana, 265.
 — — Plauensis, 266.
 — — spuria, II. 2.
 — — Suedensis, II. 2.
 Arnoglossum, II. 331.
 Aroph Paracelsi, 657. 659.
 Arrowroot, 268.
 Arsenias Ammoniae, 274.
 — — Ferri, 275.
 — — Kali, 275.
 — — Potassae, 275.
 — — — alcoholisatus, 273.
 — — Sodae, 274.
 Arsenici Oxidum, 270.
 — — — sublimatum, 270.
 Arsenicum, 268.
 — — album, 270.
 — — — sublimatum, 270.
 — — antimoniatum, 271.
 — — crudum, 270.
 — — flavum, 269.
 — — rubrum, 269.
 Arsenidum Sodae liquidum, 274.
 Arsenis Potassae, 273.
 — — — aquosus, 273.
 — — — liquidus, 273.
 — — Sodae, 274.
 — — — liquidus compositus, 274.
 Artemisia, 275.
 — — alba, 275.
 — — Abrotanum, 4.
 — — Absinthium, 4.
 — — campestris, 277.
 — — Chinensis, 275.
 — — Contra, 620.
 — — Dracunculus, 277.
 — — glacialis, 277.
 — — glomerata — A. Contra.
 — — Judaica, 620.
 Artemisia Maderaspatana, 6.
 — — maritima, 5.
 — — Pontica, 5.
 — — rubra, 275.
 — — rupestris, 277.
 — — Santonica, 520.
 — — Vallesiana, 277.
 — — vulgaris, 275.
 Arthanita, 697.
 Arum, 277.
 — — Arisarum, 277.
 — — Dracunculus, 278.
 — — maculatum, 277.
 — — triphyllum, 278.
 Arundo, 279.
 — — Donax, 279.
 — — Phragmites, 279.
 — — saccharifera, II. 494.
 Asa, 279.
 — — dulcis, 320.
 — — foetida, 279.
 — — — depur. ut Ammoniac. dep.
 Asarum, 288.
 — — Canadense, 288.
 — — Europaeum, 288.
 Asbestus, 144.
 Asclepias, 289.
 — — decumbens — A. tuberosa.
 — — incarnata, 289.
 — — syriaca, 289.
 — — tuberosa, 290.
 — — Vincetoxicum, 290.
 Asellus, oleum jecoris, II. 216.
 Asparaginum, 290.
 Asparagus hortensis, 290.
 — — officinalis, 290.
 — — sativus, 290.
 Asperula odorata, 292.
 Asphaltum, 292.
 Asphaltus, 292.
 Asphodelus albus, 292.
 — — mas, 292.
 — — ramosus, 292.
 Aspidium coriaceum, 292.
 — — Filix Mas — Athyrium.
 — — Rhaeticum, 64.
 Asplenium, 293. 456.
 — — Adiantum nigrum, 65.
 — — Ruta muraria, 293.
 — — Trichomanes, 65.
 Asa foetida — Asa foet.
 Astacus fluviatilis, 359.
 Aster conyzoides, 622.
 — — inguinalis, 623.
 Astragalus Creticus, II. 653.
 — — escapus, 293.
 — — summiifer, II. 653.
 — — Fragacantha, II. 653.
 — — verus, II. 653.
 Astantia, 293. II. 1.
 — — major, 293.
 Athamanta Cretensis, 293.
 Athanasia, II. 613.
 Athyrium Filix mas, 293.
 Atriplex angustifolia, 294.
 — — foetida, 469.
 — — glauca, 294.
 — — hortensis, 294.
 — — odorata, 469.
 — — olida, 469.
 — — sativa, 294.
 Atropa, 295.
 — — Belladonna, 295.
 — — Mandragora, 297.
 Atropia, 295.
 Atropina, 295.
 Atropinum, Atropium, 295.
 Atinella, 59.
 Aurantiorum Poma, 525.
 Aurantium, 525.
 — — Curasavicum, 525.
 — — Hispalense, 525.
 Auricula Judae, II. 656.
 — — muris, 714.
 — — — major, 714.

Auridum Ammoniacae. 300.
 Auripigmentum, 269.
 Auris Ceti, 364.
 Aurum, 298.
 — divisum, 298.
 — per Saccharum, 298.
 — foliatum, 298.
 — fulminans, 300.
 — horizontale Zwingeri, 300.
 — mosaicum, II. 592.
 — muriatico-natricum, 299.
 — — praeparatum, 299.
 — muriaticum, 298.
 — — c. Chloreto Natrii, 299.
 — liquidum, 298.
 — natronatum, 299.
 — oxydatum, 300.
 — potabile, 299.
 — purum, 298.
 Avellana, 571.
 Avena, 301.
 — excorticata, 301.
 — nuda, 301.
 — orientalis, 301.
 — sativa, 301.
 Avicula margaritifera,
 Axungia, 62.
 — Anatis, 63.
 — Anquillae, 64.
 — Anseris, 64.
 — antispensorica, II. 134.
 — Ardeae, 64.
 — Aschiae, ibid.
 — Aschii, ibid.
 — Canis, 63.
 — Caponis, 63.
 — Castoris, 63.
 — Cati sylvestris, 63.
 — Ciconiae, 63.
 — composita, 64.
 — Coturnicis, 63.
 — Cuniculi, 63.
 — Equi e collo, 63.
 — — e juba, 63.
 — Erinaeei, 63.
 — Gallinae, 64.
 — Hominis, 63.
 — Leporis, 63.
 — Lucii Piscis, 64.
 — Lupi, 63.
 — Muris alpini, 63.
 — — montani, 63.
 — nitrica, nitricata, 48.
 — oxygenata, 48.
 — Pavonis, 64.
 — Phocae, 63.
 — Porci, 63.
 — — purificata, 63.
 — porcina, 63.
 — Serpentum, 64.
 — Suis Scrofae, 63.
 — suilla, 63.
 — pedum Tauri, 63.
 — Taxi, 63.
 — Thymalli piscis, 64.
 — Ursi, 63.
 — Viperarum, 64.
 — vulpina, 63.
 — Vulpis, 63.
 Ayapana, II. Add.
 Azarum, 288.
 Azedarach, 302.
 Azotum, 302.

B.

Baccae Jujubae, II. 36.
 — Norlandicae, II. 487.
 — Actes, II. 507.
 Bacilli Liquiritidis albi, II. 80.
 — — citrini, II. 80.
 Baetica sylvestris, II. 231.
 Balanus myrsepsica, II. 213.
 Balsanustia, II. 426.
 Ballota, 302.

Ballota lanata, 302.
 — nigra, 302.
 Balneum antisyphilitic., II. 178.
 — aromaticum, II. 478.
 — emolliens, II. 75.
 — — et antisepticum, II. 418.
 — incitans, 24.
 — resolvens, 171. II. 376.
 — sulphuratum, 44. II. 376.
 — — et gelatinos. Dupuytren., II. 376.
 — sulphurosum, II. 585.
 Balsamita mas, 302.
 — odorata, 303.
 Balsamum acetic. camph., II. 419.
 — acusticum, 90. 157.
 — adstringens, II. 633.
 — aegyptiacum, 307.
 — aethereum, II. 605.
 — anodynum, II. 258. 419.
 — antiarthriticum, II. 419.
 — antihystericum, 99.
 — antidontalgic., II. 271.
 — apoplecticum, II. 479.
 — Apparitii, 760.
 — Arcaei, II. 621.
 — aromaticum, 159. 178. 426.
 — — liquidum, II. 622.
 — — aethereum, 434.
 — arthriticum, II. 258.
 — ad aures, 90. 157. 310. 632.
 — Auri, 301.
 — Basvillianum, II. 635.
 — e Benzoe, 321.
 — Brasiliense, 303.
 — Calaba, II. 608.
 — Canadense, 1.
 — ad cancerum, II. 272.
 — Carpathicum, 303.
 — catholicum, 321.
 — — ex Vino, 757.
 — — cum Spiritu Vini, 758.
 — cephal. Saxonicum, II. 479.
 — chalybeatum, 652.
 — Chronis, II. 624.
 — Cinnamomi, 385.
 — Commendatoris, 321. 323.
 — de Condem., II. 221.
 — Copalibae, 303.
 — Copalivae, 303.
 — ad dentitionem, 131.
 — embryonum, II. 505.
 — Feuilleti, 593.
 — Fioravanti, II. 628.
 — — nigrum, II. 629.
 — — oleosum, II. 629.
 — — spirituosum, II. 629.
 — Fourcroyi, II. 638.
 — Frahmii, II. 621.
 — Genevevae, II. 624.
 — Gileadense, 307.
 — Goulardi, II. 348.
 — Guajaci, 716.
 — — saponaceum, 716.
 — guajacinum, 712.
 — Hoffmanni, 385.
 — Hungaricum, 303.
 — Hyperici compositum, 760.
 — Indicum, 308.
 — — album, 308.
 — — nigrum, 308.
 — — siccum, 308.
 — innocentianum, 757. 758.
 — ischaematicum, II. 633.
 — Italicum, II. 623.
 — Judaicum, 307.
 — Laricis nativum, II. 617.
 — Lavandulae, II. 601.
 — Lectoriensis, II. 221.
 — de Leictour, II. 221.
 — Liboschitzii, 403.
 — Locatelli, II. 623.
 — ad loricand. cadaver, II. 596.
 — Majoranae, II. 297.

Balsatum Mariae, II. 608.
 — de Mecca, 307.
 — Meccanense, 307.
 — Meccanense, 307.
 — mercuriale, II. 149. 107.
 — — Plenkii, II. 131.
 — Myroxylj peruiferi, v. Bals. Peruvian.
 — Myrrinae, II. 228.
 — narcoticum, II. 633.
 — nativum, II. 617.
 — nervinum, II. 479.
 — Nucistae, II. 224.
 — — expressum, II. 224.
 — Oleae, II. 243.
 — ophthalmicum, II. 149. 489.
 — — rubrum, II. 148.
 — — Yveanum, II. 149.
 — — St. Yves, II. 149.
 — Opodeldoc, 156.
 — orientale, 307.
 — palustre, II. 113.
 — petrale, II. 624.
 — persicum, 321.
 — ad s. contra perniones, II. 634.
 — Peruvianum, 308.
 — — album, 308.
 — — nigrum, 308.
 — — siccum, 308.
 — Pini sylvestris nativum, II. 617.
 — — Laricis, II. 617.
 — — liquidum, II. 617.
 — — sylvestris, II. 617.
 — — exsiccatum—Colophon.
 — pleureticum, 580.
 — Plumbi, II. 339.
 — Rakasira, 311.
 — resolvens, 310. II. 376.
 — Rulandi, II. 604.
 — Rumar, II. 492.
 — Samaritanum, II. 676.
 — saponaceum, II. 418.
 — — compos., II. 418.
 — — terebinthinat., II. 634.
 — Saponis, 156. II. 418. 634.
 — — compos., II. 418.
 — Saturni, II. 340. 341. 348.
 — — Goulardi, II. 340. 348.
 — saturninum, II. 344.
 — Schauerianum, II. 630.
 — Scherzeri, II. 479.
 — somniferum, II. 258.
 — stomachicum, II. 479.
 — Styracis, II. 591.
 — — Benzoini, 320.
 — Succini, II. 420. 599.
 — Sulphuris, II. 604.
 — — anisat., II. 604.
 — — simplex, II. 604.
 — — succinat., II. 604.
 — — terebinthinat., II. 604.
 — Syriacum, 307.
 — Terebinthinae, II. 634.
 — terebinthinatum, II. 623.
 — thebaicum, II. 258.
 — de Tolu, 311.
 — Toluiferae Balsami, 311.
 — Tolutanum, 311.
 — tranquillans, 754.
 — tranquillum, 754.
 — traumaticum, 321.
 — universale, II. 344.
 — verum, I. 307.
 — de Vincoquere, II. 221.
 — viride, II. 608. 625.
 — — Metensium, 593.
 — vitae, 385.
 — — album, II. 639.
 — — externum, II. 634.
 — — Hoffmanni, 385. II. 481.
 — — de Lelièvre, 116.
 — — Rulandi, II. 604.
 — vulnerarium, 321. II. 622. 628.

- Balsamum vulnerarium commune, II. 618.
 — Burrhus, 323.
 — minerale Dippe-
 III, 666.
 — de St. Yves, II. 149.
 — vegetabile, II. 210.
 Balsamus, f. Balsamum.
 Eamia moschata, 1.
 Banilla, II. 670.
 Baptiscula, 597.
 Barba Aronis, 278.
 — caprina, II. 589.
 — Hirci, II. 655.
 Barbarea, 623.
 Barbula caprina, II. 589.
 Bardana, 313.
 — minor, II. 681.
 Barilla, II. 377.
 Barium, 314.
 Barotes salitus, 314.
 Baryta, 317.
 — acetica, 318.
 — carbonica, 317.
 — fusa, 317.
 — muriatica, 314.
 — nitrica, 318.
 — pura liquida, 317.
 — sulphurica nativa, 317.
 Barytes, 317.
 — salitus, 314.
 Basilicum, 318.
 — citratum, 319.
 — majus, 319.
 — minimum, 319.
 Batrachites, 363.
 Bellidium, 319.
 Beccabunga, II. 673.
 Becetta, II. 47.
 Bechium, 630.
 Bedeguar, 319.
 Been, II. 213.
 Behen, 319.
 — album, 319.
 — nostras, 320.
 — rubrum, 320.
 Belladonna, 295.
 Belliculus marinus, 368.
 Bellis, 320.
 — hortensis, 320.
 — major, 511.
 — minor, 320.
 — perennis, 320.
 — pratensis, 511.
 Belzoinum, 320.
 Ben, II. 213.
 Benedicta sylvestris, 703.
 Benzoe, 320.
 — amygdaloides, 320.
 — in sortis, 320.
 Benzoin, 320.
 Benzoinum, 320.
 Berberis, 326.
 — vulgaris, 326.
 Bergamottae oleum, 526.
 Beta, 327.
 — Cyca, 327.
 — rubra, 327.
 — vulgaris, 327.
 Betel, 327.
 Betonica, 327.
 — aquatica, II. 645.
 — officinalis, 327.
 — purpurea, 327.
 Betula, 328.
 — alba, 329.
 — Alnus, 328.
 Bezoar, 369.
 — Coromandelianus, 369.
 — occidentalis, 369.
 — orientalis, 369.
 Bezoardicum animale, 681.
 — Curvi completum, II. 544.
 — incompletum, II. 544.
 — purgans, II. 544.
 Bezoardicum joviale, II. 692.
 — martiale, 215.
 Bicarbonas kalicus cum Aqua,
 II. 384.
 — natricus cum Aqua, II. 579.
 — Potassae, II. 384.
 — Protoxydi Ferri, 647.
 — Sodae, II. 579.
 Bichloretum Hydrargyri, II. 175.
 — venale, II. 175.
 — Mercurii, II. 175.
 Bichloruretum Calcis, 355.
 — Mercurii, II. 175.
 Bidens, 329.
 — cernua, 329.
 — tripartita, 59.
 Bilis bovina, 630.
 Binoxalas Potassae, II. 403.
 — kalicus cum Aqua, II. 403.
 Bisingua, II. 490.
 Bismalva, 119.
 Bismuthi Subnitrates, 329.
 Bismuthum, 329.
 — nitricum, 329.
 — praecipitatum, 329.
 — oxydulatum album, 329.
 — subnitricum, 329.
 Bistorta, 330.
 Bisulphas Cupri, 684.
 — kalicus, II. 388.
 — Potassae, II. 388.
 Bisulphuretum Hydrargyri, II.
 152.
 Bitartras kalicus cum Aqua cru-
 dus, II. 406.
 — depura-
 tus, II. 406.
 — Potassae, II. 406.
 Bitumen Asphaltum — Asphal-
 tum.
 — Judaicum, 292.
 — Petroleum — Petroleum.
 Bixa Orellana, II. 297.
 Blatta byzantina, 357.
 Boetica sylvestris, II. 231.
 Boletus, 331.
 — cervinus, 331.
 — fomentarius, 78.
 — ignarius, 78.
 — Laricis — Agaricus albus.
 — purgans, 78.
 — Salicis, 331.
 Boli adstringentes, 135. 307. 643.
 II. 12. 443. 448.
 — alterantes, 710.
 — amari, 605.
 — anthelmintici, 521.
 — et antispasmodici, II. 165.
 — anthelmintico-laxantes, II.
 174.
 — nervini, II. 159.
 — tonici, 742. II. 159.
 — antiarthritici, II. 632.
 — antiasthmatici, II. 602.
 — anticatarrhales, II. 215.
 — antichlorotici emmenagogi
 incitantes, 640.
 — — — — — tonici, 635
 — anticonvulsivi, 330.
 — antidysenterici, II. 12.
 — antifebriles, 509. 624.
 — antigonorrhoeici, 307. II. 626.
 — antinaemorrhoidales, II. 602.
 — antihysterici, 282.
 — antilactosi, II. 400.
 — antiscorbutici, 487.
 — antiscrophulosi, 415.
 — antispasmodici, 371. 645. II.
 218. 272.
 — et anticonvulsivi, 282.
 — antisyphilitici, 299.
 — — — — — resolventes, II. 143.
 — — — — — stomachici, II. 143.
 — antiveneri, II. 142.
 — aromatici, II. 223.
 Bolicum Camphora et Nitro, 371.
 — camphorati, 371.
 — — — — — cum Kermete, 372.
 — cardiaci, 566.
 — carminativi, 208.
 — cathartici, II. 24.
 — chalybeati, 645.
 — Chinae, 478.
 — — — — — aromatisati, 478.
 — — — — — opiatii, 478.
 — — — — — et aromatici, 478.
 — et Rhei, 478.
 — coerulei, II. 125.
 — contrastimulantes, 37. 39.
 — in cystidite lenta, II. 602.
 — deprimentes, II. 214.
 — — — — — ac nauseantes, 613.
 — — — — — cinnabarini, II. 154.
 — — — — — resolventes, 6:2.
 — diaphoretici, 218. II. 602. 154.
 270.
 — — — — — nauseantes, 228.
 — — — — — sedantes, II. 686.
 — ad diarrhoeam, II. 264. 448.
 — digestivi, II. 12.
 — de Digitale, 612.
 — Digitalis, 612.
 — diuretici et antispasmodici,
 613.
 — — — — — drastici, 722. II. 161.
 — — — — — emetici, II. 191.
 — emmenagogi, II. 38. 98. 159.
 — — — — — irritantes, 98. 111.
 — — — — — resolventes, 368. II. 8.
 — ad epilepticos, II. 664.
 — excitantes, 371. II. 428.
 — febrifugi, 478. 486. 509. 649.
 II. 328.
 — e Ferro compositi, 640.
 — ferruginosi, 640. 669.
 — hydragogi, II. 24.
 — ex Hydrargyro, II. 194.
 — — — — — oxydato rubro, II. 147.
 — incitantes, diaphoretici et
 expectorantes, 228.
 — — — — — emmenagogi, 609. 640.
 — — — — — stomachici, 640. 669.
 — kermatico-ammoniacal, 228.
 — lac pellentes, II. 400.
 — laxantes Chaussieri, II. 171.
 — laxantes, II. 214. 215.
 — lithonriptici, II. 415.
 — Magnesia crocat, II. 90.
 — martiales emmenagogi, 635.
 640.
 — Martis, 664.
 — mercuriales, II. 128. 194.
 — e Mercurio glyzyrrhizato,
 II. 127.
 — — — — — dulci, II. 159.
 — e Muriate Hydrargyri, II. 159.
 — Myrrhae, II. 227.
 — narcotici, 750.
 — e Narcotina, II. 232.
 — in necrosi syphilitica, II. 142.
 — nervini, 282. 433.
 — ad oedema pulmonum, II.
 532.
 — ad paralysis, II. 671.
 — pectorales, II. 655.
 — — — — — adstring., II. 665.
 — in pertussi, II. 160.
 — in pytalismo mercuriali, II.
 377.
 — purgantes, 555. II. 24. 167. 171.
 550.
 — — — — — irritantes, 722.
 — — — — — et tonici, II. 166.
 — in quartana, 478.
 — resolventes, II. 7. 24. 142.
 — et antisyphilitici, II. 143.
 — — — — — deprimentes, II. 8.
 — — — — — diaphoretici, 228.
 — — — — — et incitantes, II. 164.
 — et purgantes, II. 448.

- Boli e Rheo, II. 448.
 — sedativi, II. 448.
 — roborantes, 307.
 — ex Roremarino, 635.
 — rubri, II. 154.
 — ex Sabina, II. 159.
 — ad salivationem, II. 377.
 — saponacei, II. 415.
 — Scammoniaci compositi, II. 174.
 — scillitici, II. 532.
 — sedativi, 27. II. 270.
 — e Spongia, 415.
 — e Stanno, II. 591.
 — stibiaci, 221.
 — stimulant, II. 571.
 — et tonici, 266.
 — stomachici, 116. 459. 574. 635.
 — 640. 645. 669. II. 578.
 — contra strumas, 415.
 — Sulphuris, II. 602.
 — compositi, II. 602.
 — Tartari chalybeati, 669.
 — temperantes, 371.
 — tonici, 478. 487.
 — adstringentes balsami
 ci, 694.
 — sedativi cum Muriate
 Barytae, 316.
 — tonico-antiseptici, 232.
 — ad tussim, II. 395.
 — e Valeriana, II. 664.
 — vermifugi, 294. 742. II. 173.
 — 175. 591.
 — diaphoretici, 372.
 — vomitivi, II. 12.
 Bolus alba, 131.
 — Armenas. Armenia s. orient-
 talis s. rubra, 131.
 — rubra artificialis, 132.
 Bombax, 704.
 Bombyx Mori, II. 567.
 Bonifacia, II. 490.
 Bonplandia trifoliata — Angu-
 stura vera.
 Bonus Henricus, 469.
 Borago. f. Borrage.
 Boras Hydrargyri, II. 190.
 — Mercurii, II. 190.
 — Sodae, II. 580.
 — alcalescens, II. 580.
 — alcalinum, II. 580.
 — alcalinus, II. 580.
 — cum baseos excessu, II.
 580.
 — saturatus, II. 580.
 — supersaturatus, II. 580.
 — supersodicum, II. 580.
 Borassus flabelliformis, 319.
 Borax, II. 580.
 — crudus, II. 580.
 — natricus cum Aqua, II. 580.
 — officinalis, II. 580.
 — pura, II. 580.
 — raffinata, II. 580.
 — supersodicus, II. 580.
 — Venetus s. Veneta, II. 580.
 Borrage, 331.
 — officinalis, 331.
 Borussias Ferri, 669.
 — Hydrargyri, II. 189.
 — Potassae et Oxyduli Ferri, 38.
 Bos Taurus, f. Lac vaccinium,
 Fel Tauri.
 Boswellia serrata u. thurifera —
 Olibanum.
 Botrychium Lunaria, II. 85.
 Botrys ambrosioides, 469.
 — Mexicana, 468.
 Botrytis, II. 684.
 Bovista, 333.
 Bowdichia Virgilioides, 88.
 Branca ursina, 15. 333.
 Brassica, 333.
 — capitata alba, 333.
 Brassica capitata rubra, 333.
 — Bruca, 334.
 — marina, II. 587.
 — Napus, 334.
 — oleracea, 333.
 — oleifera, 334.
 — Rapa sativa, 334.
 — rubra, 333.
 Brœdium, f. Jus.
 — depurativum, II. 584.
 — diureticum, II. 543.
 — Rosarum, II. 467.
 Brontias, 363.
 Brucea ferruginea, 206.
 Bruca, 206. 334.
 Brucina, 206. 334.
 Brucinum, 206. 334.
 Brucium, 206. 334.
 Brunnella, II. 423.
 Bruscus, II. 490.
 Bryonia, 335.
 — alba, 335.
 — dioica, 335.
 — nigra, II. 612.
 Bubon, 336.
 — Galbannum, 336.
 — Macedonicum, 336.
 Bufones exsiccati, 681.
 Bufonites, 363.
 Bufonium lapis, 363.
 Buglossum, 192.
 — latifolium, 332.
 — urbanum, 332.
 — verum, 332.
 Bugula, 80.
 Bulbulus thrasus, 601.
 Bunias, 334.
 Bupthalmum, 334.
 Bupleurum rotundifolium, II.
 314.
 Bursa pastoris, II. 648.
 Bursera gummifera, 345. II. 44.
 Butas, 524.
 Butyrum, II. 46.
 — Amygdalarum dulcium, 182.
 — Antimonii, 235.
 — Cacao, 346.
 — Cerae, 251.
 — Majoranae, II. 297.
 — cum Oxydo Mercurii rubro,
 II. 148.
 — Rutae, II. 492.
 — Saturni, II. 344.
 — Stanni, II. 592.
 — Stibii, 235.
 — Zinci, II. 684.
 Buxus sempervirens, 345.
 C.
 Cabbagum, 701.
 Cacao, 345.
 — praeparata, 346.
 — tabulata, 346.
 Cachen laguen, 625.
 Cachinlagua, 625.
 Cactus coccinellifer, 544.
 — cochenillifer, 544.
 — Opuntia, 295.
 — Tuna, 544.
 Cadmia, II. 684.
 — fossilis, II. 684.
 — praeparata, II. 684.
 Cadmium, II. 684.
 Caeruleum Berolinense, 669.
 — Borussicum, 669.
 — montanum, 584.
 Caesalpinia echinata, II. 69.
 Caffaeinum, 550.
 Cahuchku, II. 444.
 Calagnala, 208.
 Calajuti Oleum, 347.
 Calamina, II. 684.
 — praeparata, II. 684.
 Calamintha, II. 108.
 Calamintha agrestis, II. 108.
 — humilior, 734.
 — montana, II. 108.
 — Pulegii odore, II. 108.
 Calamita, II. 594.
 Calamites vera, II. 594.
 Calamus, 348.
 — aromaticus, 348.
 — Asiaticus, 348.
 — Draco, II. 512.
 — odoratus, 348.
 — Rotang, II. 512.
 — Sancti, 348.
 — verus, 348.
 — vulgaris, 348.
 Calcarius lactiformis, 357.
 Calcarea carbonica, 356.
 — chlorinica, 355.
 — iodica, II. 8.
 — iodinica, II. 8.
 — muriatica, 367.
 — oxyphosphorica, 366.
 — phosphorica, 363.
 — pura, 351.
 — liquida, 352.
 — sulphurata, 354.
 — liquida, 355.
 — sulphurata-stibata, 234.
 — sulphurica, 366.
 — usta, 351.
 Calcis Phosphas etc. f. Phosphas
 Calcis etc.
 Calcitrapa, 351.
 — stellata, 351.
 Calcitrippa, 667.
 Calcium, 351.
 — sulphuratum, 354.
 Calculi, 369.
 Calendula, 370.
 — alpina, 266.
 — arvensis, 370.
 — officinalis, 370.
 Calendulae minerales, 657.
 Calendulinum, 370.
 Callicocca Ipecac. — Cephael. Ip.
 Calluna vulgaris, 622.
 Calmontana, II. 108.
 Calombo, 559.
 Calomel, II. 156.
 Calomelanos, II. 155.
 Calomelas, II. 156. 167.
 — ferruginosus, II. 167.
 Calophyllum Calaba, II. 608.
 — Inophyllum, II. 608.
 Caltha alpina, 266.
 — sativa, 370.
 Calumba, 559.
 Calx, 351.
 — acetata, 368.
 — Antimonii, 214.
 — elota, 215.
 — Hoffmanni, 234.
 — nitrata, 215. 219.
 — sulphurata, 234.
 — cum Sulphure, 234.
 — Arsenici alba, 276.
 — Bismuthi, 329.
 — citrata, 368.
 — Cupri viridis, 584.
 — extincta, 352.
 — Hydrargyri alba, II. 199.
 — rubra, II. 145.
 — Mercurii, II. 104.
 — cinerea, II. 102.
 — vitriolata, II. 191.
 — muriatica Bergmanni, 367.
 — oxymuriatica, 355.
 — phosphorata, 354.
 — Plumbi alba, II. 336.
 — recens usta, 351.
 — salita, 367.
 — Stibii cum Sulphure, 234.
 — sulphurica, 366.
 — usta, 351.
 — Vismuthi, 329.
 46 *

- Calx viva, 361.
 — Zinci, II. 684.
 Calyculi glandium Querc., II. 433.
 Calyptranthes Caryophyll., 380.
 Calystegia Soldanella, II. 587.
 Cambodium, 732.
 Cambogia Gutta — Garcinia
 Cambogia.
 Cambogium, 732.
 Cammarum, 60.
 Camphora, 370.
 — artificialis, II. 633.
 Camphorosma, 379.
 — Monspelica, 379.
 Cancanum, 726.
 Cancer Astacus, 359.
 — Pagurus, 359.
 Cancro Herba, II. 648.
 Cancro lapides s. lapilli, 359.
 — chelae, 359.
 Candela cereae, II. 353.
 — chirurgicae, II. 341.
 — fumales, 325.
 — mercuriales, II. 173.
 — mitigantes, II. 344.
 — resolventes, II. 344.
 — saturninae, II. 353.
 Capella, 379.
 — alba, 379.
 — Cubana, 380.
 — Malabarica, 380.
 — Zeylanica, 379.
 Canellinum, 379.
 Canis Vulpes, 681.
 Cannabina aquatica, 625.
 Cannabis, 393.
 — sativa, 398.
 Cantharides, 398.
 Cantharidinum, 399.
 Cantharis vesicatoria, 399.
 — vittata, 399.
 Capillus Veneris, 65.
 — Canadensis, 56.
 Capitulum Martis, 623.
 Capparis, 410.
 — spinosa, 410.
 Capra Aegagrus, 369.
 — Iber, sanguis, 682.
 Caprifolium, 411.
 Capsicinum, II. 325.
 Capsicum annuum, II. 325.
 — frutescens, II. 326.
 Capsina, II. 325.
 Capsinum, II. 325.
 Caput mortuum Vitrioli, 611.
 Caranna, 411.
 Carbo, 412.
 — animalis, 413.
 — Ligni, 413.
 — pilae marinae, 412.
 — praeparatus, 412.
 — purus, 412.
 — Spongiae, 412.
 — marinae, 412.
 — e vegetabilibus, 412.
 — vegetabilis, 412.
 — praeparatus, 412.
 Carbonas Ammoniacae, 159.
 — alcalin. liq., 161.
 — solutus, 161.
 — Cornu Cervi cry-
 stallisatus, 162.
 — Lumbrior. cry-
 stallisatus, 162.
 — Viperarum cry-
 stallisatus, 162.
 — Ammoniacae, 159.
 — alcalin. liquid., 161.
 — solidam, 162.
 — alcalinus, 169, 160.
 — solutus, 161.
 — pyro-animal., 162.
 — pyro-oleos., 162.
 — pyro-vinos. so-
 lutus, 163.
 Carbonas Ammoniacae crystalli
 satus, 162.
 — incompletus, 159.
 — pyro-animalis s. py-
 ro animale, 162.
 — s. fluidus, 163.
 — pyro-oleosus, 162.
 — liquidus, 163.
 — solidus, 160.
 — ammoniacus crudus, 162.
 — depuratus solidus s.
 crystallis, 163.
 — Sarytae, 317.
 — baryticus, 317.
 — calcareus, 356.
 — calcicus bituminat., 357.
 — Calcis, 356.
 — nativum, 356.
 — nativum pulverulen-
 tus, 356.
 — praeparatus, 356.
 — Ferri, 613.
 — oxydati, 613.
 — praeparatus, 613.
 — Hydrargyri, II. 190.
 — kalicus e Cineribus clavel-
 latis, II. 378.
 — crudus, II. 377.
 — e Tartaro, II. 378.
 — Lixiviae alcalinus, II. 377.
 — solutus, II. 350.
 — Magnesiae, II. 88.
 — purus, II. 88.
 — magnesianus, II. 88.
 — magnesicus e Aqua, II. 88.
 — venalis, II. 88.
 — natricus, II. 577, 579.
 — c. Aqua crud., II. 577.
 — venalis, II. 577.
 — depuratus, II. 578.
 — impurus, II. 577.
 — venalis, II. 577.
 — Oxydi Zinci, II. 684.
 — Plumbi, II. 336.
 — plumbicum, II. 336.
 — plumbicus, II. 336.
 — Potassae, II. 384.
 — alcalescens liquidus,
 II. 380.
 — alcalinum s. alcali-
 nus, II. 377.
 — completum, II. 384.
 — et Ferri liquid., 644.
 — et Ammoniaci, II. 385.
 — impurus, II. 377.
 — neuter, II. 384.
 — purissimus, II. 378.
 — venale s. venalis, II.
 377.
 — Protoxydi Potassii, II.
 384.
 — et Ammoniaci,
 II. 385.
 — Sodae, II. 577, 579.
 — alcalinum, II. 577.
 — alcalinum, II. 577.
 — completum s. comple-
 tus, II. 579.
 — crystallisatus, II. 579.
 — impurus, II. 577.
 — incompletus, II. 577.
 — neuter, II. 579.
 — venale s. venalis, II.
 577.
 — Sodii Protoxydi, II. 579.
 — superammoniacus, 159.
 — aquosus, 161.
 — pyro-oleosus, 162.
 — aquosus, 163.
 — superpotassicus depuratus,
 II. 378.
 — purus, II. 378.
 — Zinci, II. 685.
 — impura, II. 684.
 — impurus, II. 684.
 Carbonas Zinci Oxydi, II. 684.
 — praeparatus, II. 685.
 — zincicus terrestris, II. 684.
 Carbunculus, 131.
 Carburetum Ferri, 637.
 — nativum, 637.
 — Iodii, II. 10.
 — Sulphuris, II. 600.
 Cardamine, II. 234.
 — pratensis, II. 234.
 Cardamomum, 416.
 — Javanicum, 416.
 — longum, 416.
 — majus, 416.
 — Malabaricum, 416.
 — medium, 416.
 — minus, 416.
 — rotundum, 416.
 Cardamum majus, II. 233.
 Cardiaca, 417.
 Cardopatia, 421.
 Cardopatium, 421.
 Carduus, 417.
 — benedictus, 417, 418.
 — lacteus, 418.
 — Mariae, 418.
 — Marianus, 418.
 — sanctus, 418.
 — stellatus, 351.
 — tomentosus, 417.
 — Veneris, 617.
 — volutans aculeatus, 623.
 Carex arenaria, 420.
 Carica, 420.
 — pinguis, 420.
 Carlina, 421.
 — aculis, 421.
 — humilis, 421.
 — vulgaris, 421.
 Caro testudinum, 680.
 — Viperae, 681.
 — Vulpis, 681.
 Carponium lapides, 358.
 Carpopalsamum, 191.
 Carthamita, 421.
 Carthamus, 421.
 — lanatus, 421.
 — sativus, 421.
 — tinctorius, 421.
 Carum Carvi, 422.
 Carvum, 422.
 Caryophyllata, 380, 702.
 — aquatica, 703.
 Caryophylli, 424.
 — aromatici, 424.
 Caryophyllinum, 424.
 Caryophylloides, 680.
 Caryophyllus, 425.
 — aromaticus, 423.
 — ruber, 609.
 Cascarella, 425.
 Caseum, II. 46.
 Cassia, 423.
 — acutifolia, II. 548.
 — Caryophyllata, 380.
 — cinnamomea, 380.
 — elongata, II. 548.
 — pro clysteribus, 429.
 — cocta, 430.
 — Fistula, 429, 429.
 — fistularis, 429.
 — lanceolata, II. 548.
 — lignea, 380.
 — cum Manna, II. 100.
 — Marylandica, 429.
 — obovata, II. 548.
 — obtusata — Senna Tripolit.
 officinalis — Senna Tripolit.
 — potabilis, 431.
 — Senna — Senna.
 Cassumuniar, 431.
 Cassurium occidentale, 431.
 Castanea equiseta, 66.
 — pumila, 432.
 — Vesca, 431.

Castaneae, 432.
 Castor Fiber, 432.
 Castoreum, 432.
 — Canadense s. Anglic., 432.
 — Moscoviticum, 432.
 Castorina, 432.
 Castorium, 432.
 Castrengula, II. 646.
 Catalpa, 440.
 — arborea, 440.
 Cataplasma Acetatis Plumbi, II. 342.
 — acetatum, 2t. II. 306.
 — adstringens, 642. 652.
 — Althaeae, 127.
 — aluminosum, II. 209.
 — Amyli, 191.
 — ammoniacale, 167.
 — anodynum, 749. 752. II. 249. 264.
 — anthelminticum, 99.
 — anticancerosum, 272.
 — antiophthalmicum, 576.
 — antipneumaticum, II. 328.
 — antisepticum, 13. 414. 433. 434. 479. II. 408.
 — c. Camphora, II. 434.
 — c. Reussii, 479.
 — antispasmodicum, II. 271.
 — Aquae marinae, 268.
 — aromaticum, II. 107.
 — ad blennorrhagiam, 189.
 — ex Bryonia, 514.
 — ad cancrum, 272. 514. II. 249.
 — Cantharidum, 406.
 — Cicuta compositum, 514.
 — c. Concinno, II. 433.
 — et Camphora, II. 231.
 — e Conio s. Copii maculati ammoniatum, 514.
 — Crustae Panis acetos., 21.
 — Dauci, 607.
 — e Dauco, 514.
 — desiccativum, II. 676.
 — discutiens, 208. 721.
 — domesticum — C. emolliens.
 — emolliens, 127. 189. 576.
 II. 74. 97. 306.
 — epispasticum, II. 571.
 — fermentans, 632.
 — Fermenti, 632.
 — Panis theriac., II. 287.
 — ad ischias, 354.
 — contra ischuriam, 89.
 — Lini cum Galbano, 89.
 — maturans, 16. 89. 337. 632.
 II. 416.
 — Medullae Panis, 127.
 — c. Cicuta, 514.
 — de Mica Panis, II. 306.
 — Micae Panis anodyni, 576.
 — narcoticum, 749. 752.
 — Nicotianae, II. 237.
 — Nidi Hirundinis, 576.
 — Panis, Lactis et Malvae, II. 306.
 — cum Opio, II. 264.
 — Papaveris et Hyoscyami compos., 752.
 — pomaceum, 576.
 — Pradierii, 308.
 — pus maturans, II. 416.
 — resolvens, 89. 127. 458. 632. 721. II. 342. 416.
 — roborans, 669.
 — ad scirrhus, 514.
 — rubefaciens, II. 328.
 — saturninum, II. 342.
 — saponaceum, II. 470.
 — sedans, II. 254.
 — sedativum, II. 264.
 — Sinapae, II. 571.
 — Sinapinum acre, 572.
 — mite, 571.

Cataplasma Sinapis, II. 571.
 — ad singultum, II. 257.
 — stypticum, 652.
 — virosum, 749.
 — theriacale, II. 287.
 — vomitivum, 337.
 Catapotia ad catarrhos, II. 272.
 — minor, 441.
 Catapontia, 440.
 Cataria, 441.
 Catechu, 441.
 — depuratum, 442.
 Catelli, 681.
 Cathartina, II. 548.
 Catharticon, II. 548.
 Catharticon dupl. — Elect. cathol.
 Causticum alcalinum, II. 371.
 — ammoniacale, 154.
 — antimoniale, 236.
 — arsenicale, 271.
 — commune, II. 371.
 — fortius, II. 371.
 — mitius, II. 372.
 — lunare, 261.
 — potenziale, II. 371.
 — sakinum, II. 321.
 — vegetabile, 379.
 Causticum potenziale, II. 371.
 Ceanothus, 447.
 — Americana, 447.
 Cedria, II. 329.
 Cedromella, II. 108.
 Centaurea, Schreb., 319.
 — benedicta, 418.
 — febrifuga, 447.
 — lanata, 421.
 Centaureum minus, 447.
 Centaurium, 447.
 — majus, 447.
 — minus, 447.
 — officinale, 447.
 Centinodia, 450.
 Centummorbia, II. 88.
 Centummodia, 450.
 Cepa — Allium Cepa.
 Cephaelis Ipecacuanha, II. 11.
 Cera, 250.
 — alba, 250.
 — arborea, II. 638. 639.
 — citrina, 250.
 — cruda, 250.
 — depurata, 250.
 — flava, 250.
 — inaurata, 593.
 — ad labia, 454.
 — purificata, 250.
 — viridis, 593.
 Ceramium aegagropilum, 741.
 — albinum, 741.
 — cancellatum, 741.
 — catenatum, 741.
 — forcapatum, 741.
 — gracile, 741.
 — Helminthochortos — Helminthochortos.
 — incurvum, 741.
 — scoparium, 741.
 Cerasa acida, 450.
 Cerasi Gummi, 732.
 Cerasus, 450.
 — acida, 450.
 — Avium, 450.
 — Lappo-Cerasus, 451.
 — Mahaleb, 451.
 — niger, 450.
 — Padas, 450.
 — racemosa sylvestris, 450.
 — ruber acida, 450.
 — Virginiana, 451.
 — vulgaris, 450.
 Ceratonia, 452.
 — Siliqua, 452.
 Ceratum — Linimentum simpl.
 — Acetatis Plumbi, II. 349.
 — Plumbi, II. 344.

Ceratum adhaesivum, II. 639.
 — Aegyptiacum, 593.
 — Album, 453.
 — Ceti, 453.
 — simplex, 463.
 — de Althaea, 128.
 — ad ambusta, II. 687.
 — anodynum, II. 353.
 — antipericum, II. 140.
 — arsenicale, 272.
 — Arsenici, 272.
 — Axungiae, 261.
 — Baumei, II. 107.
 — Betonicae, 328.
 — Calaminae, II. 686.
 — calaminare, II. 686.
 — camphoratum, 358.
 — Cantharidis, 406. 408.
 — Cantharidum caughoratum, 408.
 — Carbonatis Zinci impuri, II. 686.
 — de Cerussa, II. 337.
 — Cerussae, II. 337.
 — compos., II. 364.
 Cetaeci, 453.
 — album, 453.
 — rubrum, 454.
 Ceti, 453.
 — cum China, 489.
 — Chinae camphorat., 493.
 — citrinum, II. 638. 639.
 — cosmeticum, 347. 464.
 — detergens, II. 151.
 — diaphoroligos, II. 687.
 — emolliens, 90.
 — epuloticum, II. 686.
 — exploratorium, II. 414.
 — exciccans, II. 173. 687.
 — Kirklandi, II. 345.
 — flavum, 262.
 — fuscum, II. 354.
 — Galepi, 252.
 — Goulardi, II. 348.
 — Hufelandi, II. 687.
 — Juniperi Virginian., II. 43.
 — ad labia, 252. 454.
 — labiale, 252. 347. 454. II. 245.
 — album, 453.
 — rubrum, 454.
 — Lapidis calaminar., II. 686.
 — Lithargyri, II. 344.
 — Lyttae, II. 405.
 — Melliloti simplex, II. 107.
 — Mercantini, II. 336.
 — mercurialis, II. 130. 134. 148.
 — Falckii, II. 151.
 — Minii, II. 335.
 — gummoso-resinosum, II. 336.
 — mundificans balsamicum, 455.
 — Nicotianae, II. 238. 1.
 — nigrum, II. 638. 639.
 — Norimbergense, II. 361.
 — oleo-resinosum, II. 638.
 — ophthalmicum, II. 687.
 — opiacum, II. 250.
 — opiatum, II. 257.
 — Oxy-carbonatis Zinci, II. 686.
 — Oxydi Plumbi samivitrei, II. 352.
 — Plumbi, II. 344.
 — Acetatis, II. 349.
 — compos., II. 349. 366.
 — Subacetae liquidi, II. 346.
 — Subcarbonatis comp., II. 364.
 — Superacetatis, II. 344.
 — e Plumbo, II. 344.
 — Pottii, II. 349.
 — de Resin cum Mercurio, II. 134.

- Ceratum de Réchoux**, 164.
 — refrigerans Galeii, 262.
 — Resinae, II. 638. 639. 640.
 — — Burgundicae, 128.
 — — flavae, II.
 — — Pini, II. 638.
 — — Burgund resinosa, II. 638.
 — resinosa, II. 638. 642.
 — — compos., II.
 — rubrum, II. 155. 335.
 — — camphoratum, II. 335.
 — Sabinae, II. 40.
 — saponaceum, II. 349.
 — Saturni, II. 344. 348.
 — — Goulardi, II. 344.
 — saturninum, II. 348. 353.
 — simplex, 251. 453.
 — Spermatis Ceti, 453.
 — Subacetae Plumbi medicatum, II. 349.
 — e Sulphure, II. 605.
 — tabacinum, II. 238.
 — viride, 593.
 — Zinci Carbonatis impuri, II. 686.
 — e Zinco, II. 686.
Ceranium, 358.
Cerberus triceps, 218.
Cerefolium, 456.
 — hispanicum, 456.
Cereoli communes, II. 344.
 — demulcentes, 254.
 — emollientes, 254.
 — exploratorii, 254. II. 353.
 — Falckii, II. 151.
 — cum Kali caustico, II. 373.
 — medicati, II. 344.
 — mercuriales, II. 133. 173. 197.
 — — dissolubiles, II. 686.
 — mitigantes, II. 344.
 — Plumbi Acetatis, II. 344.
 — Plumbici, II. 344.
 — Saturni, II. 344.
 — saturuini, II. 344. 346.
 — simplices, 254. II. 344.
Cerevisia, 453.
 — Absinthii, 8.
 — adstringens, II. 435.
 — amara, 4.
 — antihydrica, II. 30.
 — antijctericæ, II. 556.
 — antiscorbatica, 3. 547.
 — II. 438. 439. 546.
 — antispasmodica, II. 667.
 — aperiens, II. 572.
 — aperitiva, II. 572.
 — Armoraciae, II. 433.
 — aromatica, 301.
 — cephalica, II. 667.
 — Chinae, 499.
 — Cochleariae, 547.
 — Colocynthis, 557.
 — diuretica, II. 572.
 — ad hydropem, II. 30.
 — martialis, 660.
 — Pini compos., 3.
 — — Turionum, II. 439.
 — prophylactica, 499.
 — purgans, II. 30. 556.
 — quercina, II. 435.
 — stimulans, II. 572.
 — stomachica, 697.
Cerinum, 250.
Ceromel, 249.
Cerussa, II. 336.
 — acetata, II. 346.
 — alba Hollandica, II. 336.
 — — Norica, II. 336.
 — Antimonii, 215.
 — citrina, II. 334.
 — in lamellis — Ceruss. alb.
Cervaria alba — Gentiana alba.
 — nigra, II. 547.
Cervi cordis ossa, 364.
Cervi priapus, 682.
Cervus Alces, 682.
 — — Elaphus, 364.
Cetaceum, 453.
Ceterach, 456.
 — officinarum, 456.
Ceti auris, 364.
 — — priapus, 682.
Cetraria Islandica, II. 64.
Chacarilla, 426.
Chaerofolium, 456.
Chaerophyllum, 456.
 — odoratum, 456.
 — sativum, 456.
 — sylvestre, 456.
Chalcantem album, II. 690.
Chalcitis, 641.
Chalybs, 634.
 — — praeparatus, 632.
 — — tartaratus, 663.
Chamaeciste, II. 597.
Chamaeclema, 734.
Chamaedrys, II. 643.
 — — aquatica, II. 645.
Chamaeleagnus, 676.
Chamaeleo album, 421.
Chamaemelum nobile, 458.
 — — Romanum, 418.
 — — vulgare, 458.
Chamaemorus, II. 687. 643.
Chamaepithys, II. 643.
 — — Monspellica, II. 644.
Chamaecrops humilis, 319.
Chamomilla, 467.
 — foetida, 458.
 — nobilis, 458.
 — Romana, 458.
 — nostras, 458.
 — vulgaris, 458.
Chanca lagna, 625.
Charta ad catenterium, II. 620.
 — — cerata, 231.
 — — Curcumae, 596.
 — — exploratoria coeal., II. 48.
 — — — Intea, 596.
 — — — rubefacta, II. 49.
 — — — rubra, II. 49.
 — — Laccæ musci, II. 48.
 — — Rhabbarbari ex infuso Rhei aquoso, II. Add.
 — — vesicans, 604.
Cheiranthus Cheiri, 466.
Cheiri, 466.
Chelae Cancrorum, 359.
 — — praeparatae, 360.
Chelapa, II. 22.
Chelidonium, 467.
 — — Glaucium, 467.
 — — majus, 467.
 — — minus, 467.
Chelonites, 363.
Chenopodium, 468. 469.
 — — ambrosiacum, 468.
 — — ambrosioides, 468.
 — — anthelminticum, 468.
 — — bonus Henricus, 469.
 — — Botrys, 469.
 — — Vulvaria, 469.
Chermes Grana, 470.
Chimaphila corymbosa, 472.
 — — umbellata — Pyrola umbell.
China, 472. 473.
 — — Carthagensis, 474.
 — — coronae, 473.
 — — flava, 474.
 — — fusca, 473.
 — — orientalis, 472.
 — — ponderosa, 472.
 — — regia, 474.
 — — rubra, 472.
 — — vera, 472.
Chinachina, 473.
Chinina, 505.
Chininium, 505.
 — — sulphuricum, 506.
Chininum, 505.
 — — sulphuricum, 506.
Chinum, 505.
 — — sulphuricum, 506.
Centaureum — **Brythraea**
 — **Centaureum**.
Chloras Calcis, 355.
 — — kalicus depuratus, II. 397.
 — — venalis, II. 397.
 — — Potassae, II. 397.
 — — Protoxydi Potassii, II. 397.
Chloretum Auri cum Chloretum
 — **Natrii**, 299.
 — — Barii cum Aqua, 314.
 — — Calcariae, 355.
 — — Calcii, 367.
 — — Ferri, 653.
 — — Hydrargyri, II. 155.
 — — Natrii, II. 575.
Chlorina, 509.
Chlorinum, 509.
Chlorum, 509.
 — — Aqua solutum, 510.
 — — Calcariae, 355.
 — — liquidum, 510.
Chloruretum Antimonii, 235.
 — — Auri, 298.
 — — et Sodii, 299.
 — — — praeparatum, 299.
 — — Barii, 314.
 — — Calcii, 367.
 — — — oxydatum, 355.
 — — Calcis, 358.
 — — Magnesi, II. 94.
 — — Ferri, 652.
 — — Oxydi Calcii, 355.
 — — Flatinæ, II. 333.
 — — Plumbi, II. 333.
 — — Potassae, II. 397.
 — — Potassae oxydat., II. 397.
 — — Potassii, II. 398.
 — — — protoxydatum, II. 397.
 — — Sodae, II. 575.
 — — Sodii, II. 575.
 — — — Protoxydi, II. 575.
 — — Stanni, II. 592.
 — — Zinci, II. 684.
Chocolata alba, II. 497.
 — — aromatica, 346.
 — — antiveneræ, II. 182.
 — — Castaneæ, 432.
 — — Lichenis Islandici, II. 65.
 — — medica, 346.
 — — purgans, II. 171.
 — — simplex, 346.
 — — cum Vanilla praep., 346.
 — — Vanilla odor., 346.
Christophoriana, 62.
 — — americana, 62.
Chrysanthemum Leucanthemum, 511.
Chrysolithus, 133. 363.
Chrysoprasius, 133.
Cicer, 511.
 — — arietinum, 511.
Cichorium, 512.
 — — Endivia, 512.
 — — Intybus, 512.
Cicuta, 513.
 — — aquatica, 513.
 — — major, 514.
 — — terrestris, 514.
 — — virosa, 513.
 — — vulgaris, 514.
Cicutaria, 456.
 — — aquatica, 513.
Cicutina s. **Cicutinum**, 514.
Cina, 520.
Cinchona angustifolia, 474.
 — — Caribaea, 473.
 — — condensinae, 473.
 — — cordifolia — **C. lancifolia** et oblongif.
 — — grandifolia — **C. oblongif.**

- Cinchona floribunda**, 424.
 — lanceolata, 473.
 — lancifolia, 474.
 — nitida, 473.
 — oblongifolia, 474.
 — officinalis — China.
 — ovata, 473.
 — pallida — C. lancifolia.
 — purpurea — C. condami-
 — nea.
 — rubra — C. oblongif.
 — scrobiculata — C. conda-
 — minea.
Cinchonia, 522.
 — acetica, 524.
 — sulphurica, 523.
Cinchonina, 522.
 — acetica, 524.
 — sulphurica, 523.
Cinchoninum, 522.
 — aceticum, 524.
 — sulphuricum, 523.
Cinchonium, 522.
 — aceticum, 524.
 — sulphuricum, 523.
Cineres Animalium ustae, 359.
 — clavellati, 377-378.
 — depurati, 377-378.
Cincus marinus, 681.
Cinis Plumbi, 11. 334.
Cinnabaris, 11. 152.
 — artificialis, 11. 152.
 — factitia, 11. 152.
 — nativa, 11. 152.
 — praeparata, 11. 152.
Cinnamomum, 379.
 — acutum, 379.
 — Indicum, 380.
 — Magellanicum, 571.
 — Sinense, 380.
 — verum, 379.
 — Zeylonense, 379.
Cissampelos, 524.
 — Caapeba, 524.
 — Pareira, 524.
Cistus Creticus, 11. 51.
Citrus Ammoniaci, 181.
 — Ammoniacae, 181.
 — Calcariae animalis, 368.
 — calcicus, 368.
 — Calcis Protoxydi, 368.
 — Calcis, 368.
 — Ferri, 662.
 — kalicus, 11. 403.
 — kalinus, 11. 403.
 — Morphinae, 11. 216.
 — Morphini, 11. 216.
 — Potassae, 11. 403.
 — aquosus, 11. 401.
 — Potassii Protoxydi, 11. 403.
Citrullus, 579.
Citrus, 525-536.
 — acida, 536.
 — Aurantium, 525.
 — medica, 536.
Clareta aromatica, 210.
 — Fructum, 452.
 — ex sex seminibus, 570.
Clematis, 543. 11. 675.
 — crispa, 543.
 — erecta, 543.
 — Vitalba, 543.
Cleome dodecandra, 11.
Clinopodium montanum, 11. 648.
Clusia Eluteria — Cascarilla.
Clyasma antispasmodicum, 374.
 — 464. 11. 576.
 — antispasm. resolv., 11. 576.
 — adstringens, 679. 11. 428.
 — ad ascarides, 11. 493-570.
 — camphoratum, 374.
 — commune, 11. 76.
 — emolliens, 189. 11. 76.
 — — anthelmintic., 11. 464.
 — excitans, 494.
Clyasma grassum, 64.
 — incitans, 374.
 — — et sedans, 284.
 — involvens, 11. 76.
 — nutriens, 683.
 — oleosum, 11. 76. 243.
 — purgans, 11. 576.
 — refrigerans, 680. 11. 392.
 — resolvens, 11. 416.
 — Sabadillae, 11. 493.
 — sedans et adstring., 11. 291.
 — — et emolliens, 189. 11.
 — 299.
 — ad soporosos affectus, 248.
 — tonicum et antispasm., 284.
 — Vini antimonial. irrit., 248.
Clyssus Antimonii, 56.
 — Sulphuris, 56.
Clyster f. Knema.
Coacus benedictus, 147.
Coagulum aluminosum officinale, 11. 300.
Cobaltum, 543.
Coccinella, 544.
 — septempunctata, 544.
Coccinella, 544.
Coccognidium, 602.
Coccoloba uvifera, 11. 44.
Cocculus, 544.
 — Indicus, 544.
 — palmatus, 559.
 — suberosus, 544.
Coccus, 544.
 — baphica, 470.
 — Cacti, 544.
 — — coccinelliferi, 544.
 — cnidius, 602.
 — Ficus, 11. 47.
 — Ilicis, 470.
 — Laccae, 11. 47.
Cochlearia, 545.
 — Armoracia, 11. 437.
 — hortensis, 545.
 — officinalis, 545.
 — vulgaris, 545.
Cochlearium, 545.
Cochlearum folia, 358.
 — opercula, 358.
 — testae, 357.
Cocos butyracea, 243.
Coeruleum Berolinense, 647.
 — montanum, 644.
 — Parisiense, 669.
 — prussicum nativum, 647.
Codagapala, 560.
Coffea, 550.
 — Arabica, 550.
 — c. Cortice Peruviano, 474.
 — Glandium, 11. 436.
Coix Lacryma, 11. 49.
Colchicum, 551.
 — autumnale, 551.
 — illyricum, 744.
Colcothar, 641.
 — Vitrioli, 641.
Colla, 690.
 — Piscium, 580.
Collutorium acidul. — Lit. acid.
 — adstringens, 139. 11. 341-350.
 — 471. 581. 691. 694.
 — alcalinum, 11. 381.
 — aluminosum, 139.
 — antidontalgicum, 752. 11.
 — 247. 429.
 — antiscorbaticum, 540. 519.
 — 550. 608.
 — cum Borace, 11. 581.
 — Catechu saturnin., 11. 350.
 — detergens, 48. 587. 11. 471.
 — 230. 691.
 — — et adstringens, 54.
 — excitans, 11. 429. 573.
 — humectans, 541.
 — gingivale, 549.
 — mercuriale, 11. 185.
Collutorium opiatum, 255.
 — saturninum, 11. 342.
 — sialagogum, 11. 429.
 — Sinapi, 11. 572.
 — tonicum — Coll. aluminos.
 — e Zinco composit., 11. 694.
Collyrium Acetatis Ammoniacae liquidi, 176.
 — adstringens, 721. 11. 473.
 — 685. 692. 694.
 — aluminosum, 138.
 — anodynum, 676. 11. 255. 266.
 — boracicum, 11. 582.
 — de Brun, 96.
 — coeruleum, 591.
 — crocatum, 576.
 — cupratum, 589.
 — emolliens, 124.
 — exsiccans, 591.
 — Fernandezii, 11. 176.
 — ferruginosum, 649.
 — Gibernati, 11. 373.
 — ex Hydrargyri muriatico
 — corrosivo, 11. 185.
 — Hyosciami, 751.
 — de St. Jerneron, 11. 693.
 — Lanfranci, 11. 266.
 — leniens, 11. 259.
 — mercuriale, 11. 178.
 — molle, 11. 693.
 — ex Muriate Hydrargyri
 — oxygenato, 11. 177.
 — narcoticum, 11. 266.
 — Neumannii, 176.
 — Nihilii, 11. 686.
 — opiaceum, 11. 264.
 — plumbatum, 11. 341.
 — Plumbi Acetatis, 11. 341.
 — — et Opilii, 11. 342.
 — resolvens, 171. 576. 587. 592.
 — 595. 11. 341. 350. 685. 692.
 — roborans, 242.
 — rubrum, 96. 11. 383.
 — de Salibus igne fuis, 687.
 — saphirinum, 501.
 — saturninum, 11. 343.
 — — opiatum, 11. 342.
 — sedans, 11. 266.
 — sedativum, 576.
 — siccum, 11. 147. 172. 183. 685.
 — — ammoniacale, 144.
 — simplex, 351.
 — Stierncronense, 11. 693.
 — Supersulphatis Aluminiae
 — et Potassae, 138.
 — tenquianum, 11. 351.
 — tonicum, 11. 691.
 — vitriolicum, 11. 691.
 — e Vitriolo albo, 11. 691.
 — Zinci, 11. 686. 691.
 — — Acetatis, 11. 694.
 — — Sulphatis, 11. 691.
 — zincicum, 11. 686.
 — e Zinco, 11. 686.
 — — compositum, 11. 691.
 — — sulphurico, 11. 691.
Colocynthis, 553.
Colocynthinum, 553.
Colocythis, 552.
 — praeparata, 553.
Colomba, 559.
Colombo, 559.
Colophonium, 11. 636.
Color Indicus, 11. 1.
Colubrina, 264. 331.
Columbo, 559.
Colutea arborescens, 532.
Conchae, 357.
 — calcinatae, 355.
 — citratae, 368.
 — marinae, 357.
 — — praeparatae, 359.
 — Ostrearum, 357.
 — praeparatae, 359.
 — ustae, 352.

- Concremeta Astaci, 359.**
Conditum antiepilepticum, II.
 — 267.
 — Calami, 318.
 — catechucicum, II. 289.
 — corrobans, II. 637.
 — Cydoniorum, 597.
 — epilepticum, II. 664.
 — febrifugum, II. 632.
 — hydrargyro-unguinosum, II. 124.
 — Iridis saccharatum, II. 19.
 — muscarium, 142.
 — nephreticum, II. 620.
 — pectorale, II. 603.
 — purgativum, II. 449.
 — Satyrii, II. 406.
 — tamarindinaceum, II. 553.
 — ad vermes, II. 25.
 — vermifugum, II. 25.
Concina s. Cineinum, 514.
Confectio Alkermes, 470.
 — Amygdalae, 182.
 — Amygdalarum, 182.
 — Anisi laxativa, II. 25.
 — aromatica, 383.
 — Aurantiorum Corticum, 526.
 — Calami aromatici, 349.
 — Cassiae, 430.
 — — Fistulae, 430.
 — Chinae antiepileptica, 484.
 — — antimonialis, 482.
 — Cinae Seminis, 521.
 — Cinnamomi regia, 385.
 — communis, 384.
 — cordialis, 383.
 — Cynosbatos, II. 467.
 — Diaprunum, II. 550.
 — Discordii, II. 289.
 — Fistulae, 430.
 — Foeniculi, 195.
 — Hamech, 564.
 — hyacinthina, 575.
 — de Hyacintho, 575.
 — Japonica, II. 289.
 — Iridis, II. 19.
 — Margaritar. kermesina, 470.
 — opiatia, II. 278.
 — Opii, II. 278.
 — passulata, II. 550.
 — — cathartica, II. 550.
 — de Prunis, II. 550.
 — de Rebecha, II. 79.
 — Rosae, II. 466.
 — Rosarum, II. 466.
 — Rutae, II. 491.
 — Santalorum cordialis, 575.
 — Scammoniae, II. 529.
 — Sennae, II. 550.
 — Tanacetii sicca, II. 613.
 — vermifuga, 521.
Conium maculatum, 514.
Conserva Absinthii, 12.
 — Acetosae, 16.
 — Acetosellae, 16.
 — Amygdalarum dulcium, 183.
 — Angelicae, 198.
 — Anthon, II. 477.
 — antiscorbatica, 545. II. 234.
 — Apii, 256.
 — Arii, 278.
 — Aurantii, 526.
 — Aurantiorum Corticum, 526.
 — — Florum, 525.
 — Beccabungae, II. 674.
 — Bellidis minoris, 320.
 — Betonicae, 328.
 — Boraginis, 332.
 — Botryos ambrosioidiv, 470.
 — Buglossi, 192.
 — Calendulae Florum, 379.
 — Capilli Veneris, 65.
 — Cardui benedicti, 418.
 — Caryophyllorum rubrorum, 609.
Conserva Cassiae, 430.
 — de Cedro, 537.
 — Centaurii minoris, 447.
 — Cerefolii, 456.
 — Chamaemeli s. Chamomillae Florum, 458.
 — Cichorii, 512.
 — Cicutae, 514.
 — Citri, 537.
 — — Aurantii, 526.
 — Cochleariae, 545.
 — Consolidae majoris, 562.
 — Cornorum, 570.
 — Cydoniorum, 597.
 — Cynosbatos, II. 467.
 — Dactylorum, II. 318.
 — depectorans, 220.
 — Bruceae, 334.
 — Eryngii, 623.
 — Erysimi, 623.
 — Farfarae, 630.
 — Fumariae, 674.
 — Genistae, 693.
 — Hederae, 734.
 — Hyssopi, 761.
 — Inulae, II. 2.
 — Juniperi, II. 37.
 — Lauro-Cerasi, 451.
 — Lepidii, II. 63.
 — Liliorum Convallium Florum, 567.
 — — alborum Florum, II. 72.
 — Majoranae, II. 296.
 — Malvae, II. 97.
 — Marrubii albi, II. 102.
 — Melissaе, II. 102.
 — Melonum, 579.
 — Menthae s. Menthae Foliorum, II. 115.
 — Mesembryanthemi crystallini, II. 207.
 — Millepedum, II. 211.
 — Nasturtii, II. 234.
 — Nymphaeae, II. 242.
 — Orchidis, II. 496.
 — Paeoniae, II. 301.
 — Persicorum Florum, II. 315.
 — Plantaginis, II. 332.
 — Portulacae, II. 370.
 — Primulae veris, II. 422.
 — Prunorum, II. 424.
 — — leniens, II. 424.
 — resolvens et aperiens, II. 401.
 — Rhododendri Chrysanthi, II. 469.
 — Rhoeadis, II. 302.
 — Ribium nigror. Foliorum, II. 461.
 — Rorismarini, II. 477.
 — Rosae caninae fruct., II. 467.
 — — gallicae, II. 467.
 — Rosarum, II. 466.
 — — adstringens, II. 467.
 — — anthelmintica, II. 466.
 — — mercuriata, II. 466.
 — — sicca, II. 466.
 — — vitriolata, II. 466.
 — Rutae, II. 491.
 — Sabinae, II. 37.
 — Salviae, II. 590.
 — Scordii, II. 645.
 — Sorbi fructuum, II. 588.
 — spagyrica, II. 387.
 — Symphyti, 562.
 — Tamarindorum, II. 610.
 — Tanacetii, II. 613.
 — Tilliae, II. 960.
 — Trifolii fibrini, II. 656.
 — Veronicae, II. 674.
 — Violarum, II. 677.
 — — sicca, II. 677.
Consolida, 562.
 — major, 562.
 — media, 30.
 — minor, II. 423.
 — regalis, 607.
Consolida Saracenicca, II. 679.
Contryerva, 565.
 — alba, 565.
 — Germanica, 290.
 — major, 565.
 — Mexicana, 565.
 — nova, 565.
 — Virginiana, 264.
Convallaria majalis, 567.
Convulvulus arvensis, 568.
 — Jalapa s. Jalappa, II. 22.
 — major, 569.
 — Mechoacanna, II. 108.
 — minor, 569.
 — panduratus, II. Add.
 — Scammonia, II. 527.
 — scoparius, II. 71.
 — sepium, 569.
 — Turpethum, II. 659.
Conyza coerulea, 622.
 — major, 622.
 — media, II. 1.
 — minor, 622.
 — squarrosa, 569.
 — vulgaris, 569.
Copaiba, 303.
Copajifera officinalis, 303
Copal resina, 569.
Coptis trifolia, 569.
Corallina Corticana, 741.
 — officinalis, 741.
 — officinarum, 741.
 — rubens, 741.
 — rubra, 741.
Corallium album, 357.
 — praeparatum, 359.
 — rubrum, 357.
Cordia Myxa, fr. 237.
Cordiale nervinum de Brodm, 115.
Coreopsis bidens, 59.
Coriandrum, 569.
 — sativum, 569.
Cornina, 570.
Corninum, 570.
Cornu Alces, 364.
 — Cervi, 364.
 — — auratum, 360.
 — — praeparat. sine igne, 365.
 — — philosophice, 365.
 — — raspatum, 364.
 — — ustum, 365.
 — — praeparatum, 365.
Rhinocerotis, 364-682.
 — ustum, 365.
Cornus, 570.
 — circinnata, 570.
 — florida, 570.
 — mascula, 570.
 — sericea, 570.
Coronopus Ruellii, 570.
Corpus pro Balsamo Saponis, II. 635.
 — — Sulphur, II. 604.
Corrector Opii, II. 634.
Starkeyi, II. 634.
Cortex Chinae Carabicae, 473.
 — — Caribaeae, 473.
 — — Carolinensis, 473.
 — — flavus, 473.
 — — fuscus, 473.
 — — officinalis, 473.
 — — Piton, 474.
 — — reginae, 473.
 — — regius, 473.
 — — ruber, 474.
 — — rubrae, 474.
 — — St. Luciae, 474.
Citri, 536.
Conessi, 550.
Magellanicus, 571.
Peruvianus, 473.
 — — flavus, 473.
 — — fuscus, 473.
 — — officinalis, 473.

- Cortex Peruvianus regius**, 473.
 — ruber, 474.
 — Pocgereba, II. 364.
 — profluvii, 660.
 — regius, 473.
 — Winteranus, 571.
 — spurinus, 379-571.
Corylus, 571.
 — Avellana, 571.
Costa, 760.
Costus, 571.
 — amarus, 571.
 — Arabicus, 571.
 — corticosus, 379-571.
 — dulcis, 571.
 — hortorum, 303.
 — nostras, 760.
 — speciosus, 571.
Cotinus, II. 460.
Cotula — **Anthemis Cotula**.
 — aurea, 572.
 — foetida, 483.
Cotyledon lutea, 572.
 — Umbilicus, 572.
Coumarum odorata, 629.
Coutarea speciosa — **China flava**.
Cranium humanum, 364.
Crassula, 572.
 — major, 572.
Cremor, II. 46.
 — Cinnabaris, II. 152.
 — cosmeticus, 454.
 — Hordei, 748.
 — pectoralis, II. 38, 312-347.
 — Tartari, II. 406.
 — Borace solubilis, II. 411.
 — solubilis, II. 411.
Crepitus Lupi, 333.
Creta, 356.
 — alba, 356.
 — Gallica, II. 96.
 — Plumbica, II. 336.
 — plumbica, II. 336.
 — praecipitata, 359.
 — preparata, 359.
 — pura, 356.
 — Sodae, II. 577.
Crystallum und Crystallus, f. **Crystallum**.
 — maritimum, 572.
Crithmum, 572.
Crocus, 572.
 — Antimonii, 220.
 — autumnalis — **C. sativus**.
 — Ferri, 613.
 — Martis, 643.
 — adstringens, 641.
 — aperiens, 613.
 — aperitivus, 613.
 — — antimoniatum, 642.
 — rore majali paratus, 643.
 — sulphuratus, 642.
 — vitriolatus, 641.
 — metallorum, 220.
 — sativus, 572.
 — Solis, 300.
 — Veneris, 583.
Croton Cascaria, 426.
 — castaneifolium, II. 47.
 — Elguthera, 426.
 — Elixeria, 426.
 — lacciferum — **Lacca in ramulis**.
 — Tigium, 577.
 — tinctorium, II. 47.
Cruciata, 578.
Crysoprasius, 133.
Crystalli lunae, 260.
 — lunares, 260.
 — Tartari, II. 406.
 — pulverisati — **Cremor Tart.**
 — Veneris, 594.
Crystallum minerale, II. 300.
Crystallus mineralis, II. 300.
- Cubeba**, 578.
Cubebae, 578.
Cuculus, II. 234.
Cucumis, 579.
 — agrestis, II. 211.
 — asininus, II. 211.
 — Colocynthis, 552.
 — Melo, 579.
 — sativus, 579.
Cucurbita, 579-580.
 — Citrullus, 579.
 — Lagenaria, 580.
 — Pepo, 580.
Culen, 580.
Culilaban, 580.
Culilawan, 580.
Cuminum, 580.
 — Cuminum, 580.
 — nigrum, II. 239.
Capilla bulbula, II. 296.
 — sativa, II. 526.
Cupressinus officinalis, 626.
Cupressus, 581.
 — sempervirens, 581.
Cupri Sulphas etc., f. **Sulphas Cupri**.
Cupridum Ammoniacae liquidum, 595.
Cuprum, 582.
 — aceticum, 592-594.
 — Aceto corrosivum, 592.
 — aluminatum, 587.
 — ammoniacale, 583.
 — — vitriolicum, 583.
 — ammoniacum, 583.
 — ammoniato muriaticum, 590.
 — — sulphuricum, 588.
 — ammoniatum, 588.
 — Armenus, 584.
 — calcinatum, 584.
 — muriatico-ammoniacale, 590.
 — oxydatum sulphuricum, 584.
 — purum, 582.
 — — politum, 582.
 — subaceticum, 592.
 — sulphurico-ammoniat., 588.
 — sulphuricum, 584.
 — venale, 582.
 — vitriolatum, 584.
Cupulae Glandium Quercus, II. 438.
Curcuma, 596.
 — angustifolia, 268.
 — aromatica — **Zedoaria**.
 — longa, 596.
 — rotunda, 596.
 — Zedoaria — **Zedgaria**.
 — Zerumbet — **Zedoaria**.
Cuscuta, 595.
 — Epithymum, 596.
 — Europaea, 596.
 — major, 596.
Cusparia Angustura s. febrifuga — **Galipea Cusparia**.
Cyanetum Kalii et Ferri venale, 38.
Cyanuretum Ferri, 669.
 — hydrateum, 669.
 — Hydrargyri, II. 189.
 — Mercurii, II. 189.
 — Potassii, 38.
 — Zinci, II. 684.
Cyanus, 596.
 — segetum, 596.
Cycas circinalis, Sago.
Cyclamen Europaeum, 597.
 — officinale, 597.
Cydonia, 597.
 — communis, 597.
 — cotonea, 597.
 — vulgare, 597.
Cymbalaria, 600.
Cymbarum, 580.
Cyna, 580.
Cynanchum, 600.
- Cynanchum Arghel**, II. 548.
 — Monopeliacum, 600. II. 547.
Cyna Cardunculus, 600.
 — Scolymus, 600.
Cynifis Gallae tinctoriae, 678.
 — Quercus Folii, 678.
 — Rosae, 319.
Cynoglossa major, 601.
 — vulgaris, 601.
Gynoglossum, 601.
 — officinale, 601.
Cynomorium, 601.
 — coccineum, 601.
Cynorrhodum, II. 435.
Cynosbato, II. 465.
Cyperus, 601.
 — esculentus, 601.
 — longus, 601.
 — rotundus, 601.
 — odoratus, 601.
 — orientalis major, 601.
 — Romanus, 601.
Cyprus, II. 62.
Cyphoides Gallii, II. 626.
Cytinus Hypocistis, 761.
Cytiso-Genista, 693.
- D.**
- Dactyli**, 602. II. 318.
Dactylum, 602.
 — Idaeus, 358.
Daedalea suaveolens, 321.
Dalbergia monetaria, II. 512.
Daphne, 602.
 — Gnidium, 602.
 — Laureola, 602.
 — Mezereum, 602.
 — Thymelaea, 602.
Daphnoides, II. 675.
Datura, 604-605.
 — fastuosa, 605.
 — Fel, 604.
 — Stramonium, 604.
Daturia, 605.
Daturina, 605.
Daturinum, 605.
Daucus, 607.
 — Candianus, 293.
 — Carota, 607.
 — Creticus, 293.
 — cyanops, II. 323.
 — gummiifer, 319.
 — sativus, 607.
 — sylvestris, 607.
 — vulgaris, 607.
Decoctum adstring., II. 652.
 — album, 729. II. 305.
 — c. Gummi Mimosa, 686.
 — Sydenhami, II. 305.
Alcornoco Corticis, 88.
Aloes s. Aloes compositum, 110.
 — Althaeae, 123. 491.
 — officinal. — **Dec. Alth.**
 — cum Ammoniaco muriatico, 121. 171.
 — compositum, 123.
 — emolliens, 123.
 — amaro-aromaticum laxativum, II. 462.
 — amarum, 406. II. 432.
 — aetherium, 697.
 — alcoholisatum, 697.
 — antihelminthic. 529. 701.
 — antifebrile, 483.
Angustura, 207.
anthelminticum, 99.
 — — Rosensteinii, II. 123.
Anthemidis nobilis, II. 465.
 — antiarthriticum, II. 521.
 — antiastmaticum, 440.
 — anticachecticum, II. 567.
 — antidyentericum, 64.
 — antifebrile, 497.

Decoctum antihaemorrhoidale, II. 561.
 — antiherpeticum et tonic., 672.
 — antiictericum, 498. 672.
 — antilacteam, 677.
 — antiperiodicum et pectorale, 495.
 — antiphthisicum, 516.
 — antispasmodicum, 715.
 — antiscorbaticum, 546. 747.
 II. 441.
 — antisepticum, 267. II. 645.
 — antisiphiliticum nutritius, II. 519.
 — Pollini, II. 34.
 — Yvo Gaukes, 715.
 — antivenerum lax., II. 520.
 — Musitani, II. 679.
 — Passerini vel Salvadorii, II. 522.
 — Ulyssiponense, II. 522.
 — aperiens, II. 455. 615.
 — et tonicum, II. 245.
 — aperitivum, 267. 291.
 — nitratum, 291.
 — Arealiae nudicaulis, 260.
 — Arctii Lappae — Decoct. Bardanae.
 — Arnicae Florum, 267.
 — Asparagi, 291.
 — Astragali excuspi, 293.
 — Aurantii Corticis, 529.
 — Foliorum, 529.
 — avenaceum Lowerianum, 301.
 — Azedarach Corticis, 302.
 — Bardanae, 314.
 — Bignoniae Catalpae, 440.
 — Bistortae, 331.
 — Boraginis, 332.
 — Bryoniae, 335.
 — Carbonatis Potassae Absinthii, II. 387.
 — Caricium, 421.
 — carminativum, II. 100.
 — pro clystere, 196.
 — e Carne gallinaea, 463.
 — cum Carne pectorale, II. 68.
 — Carnis antispasmodicum, II. 301.
 — aperiens s. aperitivum, II. 486.
 — purificans, II. 5. 584.
 — Caryophyllatae, 703.
 — aetherum, 703.
 — cum Cascarella, 703.
 — cum Rheo, 703.
 — Cassiae Fistulae, 429.
 — Catechu, 445.
 — catholicum, II. 520.
 — Centaurii minoris, 448.
 — Cerasorum acid. siccor., 452.
 — Chamaedrys armar., II. 613.
 — Chamaemelis Chymomillae, 465.
 — Compositi, 465.
 — Chinae, 492.
 — radices, 472.
 — acidum, 495.
 — alcalinum, 498.
 — cum Alumine, 494.
 — antiseptic. purg., 498.
 — cum Arnica, 494.
 — cum Caryophyllata et Opio, 495.
 — cum Cascarella, 495.
 — c. China pulver., 498.
 — compositum, 497.
 — et laxans, 498.
 — facitivum, 67.
 — cum Lichene, 495.
 — nitratum, 493.
 — opiatum, 493.
 — cum Potassa, 493.

Decoctum Chinae c. Rheo, 496.
 — cum Senega, 496.
 — cum Serpenteria, 497.
 — cum Valeriana, 497.
 — Cichorii, 513.
 — Cinae, 520.
 — Cinchonae, 492.
 — cardiacum, 497.
 — lancifoliae, 492.
 — officinalis, 492.
 — Citri Mynsichti, 541.
 — Collae Piscium, II. 6.
 — Colombae s. Colombo, 561.
 — compositum, 561.
 — Colocynthis, 557.
 — commuue, II. 465.
 — Consolidae, 563.
 — Corallinae Corsicanae, 742.
 — Corni floridae, 570.
 — Cornu Cervi, 686.
 — citratum, 686.
 — compositum, II. 305.
 — Elaphi compositi, II. 305.
 — gummoso, 720.
 — cum Mica Panis, 305.
 — cervini, 729.
 — Corticis Mezerei, 602.
 — Peruviani, 492.
 — Cucumerum eum Extracto Nucis vomicae, II. 241.
 — Cydoniae, 599.
 — Cynae, 520.
 — Daphnes Mezerei, 602.
 — depurans et diuretic., 291.
 — et tonic., II. 584.
 — Daturae, 605.
 — diaphoreticum, II. 66. 714.
 — incitans, II. 519.
 — Digitalis, 613.
 — diureticum, 258. 714. II. 367. 442.
 — alcalinum, 706.
 — Hufelandi, II. 536.
 — Dulcamarae, 619.
 — compositum, 620.
 — emmenagogum, II. 367.
 — emolliens et carminans, 124.
 — Enulae, II. 5.
 — compositum, II. 5.
 — fetrifugum, 493. II. 381.
 — laxans, 496.
 — magistrale, 498.
 — et pectorale, 495.
 — purgans, 498.
 — salinum, 448.
 — et torificum, 496.
 — simplex, 68.
 — Ficum, 421.
 — Filicis maris, 204.
 — Foresti, 748.
 — ad fungos articulos, II. 351.
 — Furfuris, 676.
 — Tritici, 675.
 — Gallarum, 679.
 — Gei urbani, 703.
 — aetherum, 703.
 — Gentianae compositi, 606.
 — Geoffraeae inermis, 701.
 — Jamicensis, 701.
 — Surinamensis, 701.
 — Graminis, 705.
 — compositum, 705.
 — Granati Corticis, II. 327.
 — Rehmanni, II. 428.
 — Radicis, II. 327.
 — Gratiolae, 707.
 — Guajacis, 713.
 — compositi, 714. II. 518.
 — et purgans, II. 520.
 — Gummi Arabici, 728.
 — Haematoyli, II. 70.

Decoctum Helenii, II. 6.
 — compositum, II. 5.
 — Hellebori albi, 739.
 — foetidi, 739.
 — Helminthochorti, 742.
 — Hippocastani Corticis, 68.
 — hord. et amygdalin., 183.
 — Hordei s. per se, 745.
 — acidulatum, 747.
 — acidulum, 747.
 — cum Cera et Oleo, 7. 8.
 — citratum, 747.
 — compositum, 747.
 — decorticati, 745.
 — gummosum, 746.
 — integri, 745.
 — simplex, 745.
 — hydrargyricum, gr. II. 536.
 — Hydrargyri, II. 123.
 — Ichthyocollae compositi, II. 519.
 — incitans aromatic., II. 507.
 — nutritius, 755.
 — incrassans Fullerii, 728.
 — Epicaeanthae, II. 14.
 — Jaceae, II. 21.
 — Juglandis, II. 31.
 — compositum, II. 34.
 — Juniperi, II. 43.
 — Fructuum carminativum, II. 43.
 — Ligni, II. 43.
 — Kalmiae latifoliae, II. 44.
 — Lapatii, II. 490.
 — laxans, II. 584.
 — laxativum, II. 100.
 — Viennense, II. 562.
 — Leontodontis Taraxaci, II. 515.
 — Lichenis, II. 65.
 — Islandici, II. 65.
 — (amarum), II. 66.
 — compositi, II. 66.
 — lacteum, II. 66.
 — Ligni Campechensis, II. 70.
 — Campechanti, II. 70.
 — Lignorum, 714.
 — Lobeliae siphilitic., II. 84.
 — ad lupus sylvaticus, II. 351.
 — Lusitanicum, II. 521.
 — Malti, II. 95.
 — acidulum, II. 95.
 — per se, II. 95.
 — compositi, II. 95.
 — Malvae, II. 97.
 — compositum, II. 97.
 — Mannae purgans, II. 100.
 — mastichinum, II. 104.
 — mercuriale, II. 123.
 — Mercurialis, II. 121.
 — Mercurii, II. 123.
 — ad metrothragiam, 529.
 — Mezerei, 602.
 — compositum, 603.
 — mucilaginum, 729.
 — ex Myrtillis, 686.
 — narcoticum, II. 686.
 — newinum, 530.
 — Nicotianae, II. 236.
 — nigrum Allenii, 498.
 — ophthalmicum mucilaginosum, 123.
 — Orchidis Morionis aromaticum, II.
 — Oryzae, II. 298.
 — acidulatum, II. 298.
 — Papaveris s. Papaver. albi, II. 310.
 — Pareirae, 525.
 — Parietariae, II. 313.
 — Passulorum, II. 680.
 — pectorale, 747. II. 36. 83.
 — 298. 367.
 — corroborans, II. 397.

Decoctum pectorale et incisivum, II. 538.
 — nutritans, II. 66.
 — solutivum, II. 557.
 — et incitans, II. 66.
 — in phthisi, II. 318.
 Persicæ Foliorum, II. 315.
 Pini Turionum, 3. II. 325.
 — saponatos, 3.
 — vinos Hoffm., 3.
 Pollini, II. 31.
 Polygalæ amaræ, II. 366.
 — Virginicæ, II. 366.
 — Senegæ, II. 366.
 Pomorum, II. 369.
 del Pomponacæ, II. 679.
 Prunorum cum Senna, II. 561.
 Pruni Padi, 452.
 purgans, II. 566.
 — antiphlogistic., II. 424.
 Quassiae, II. 432.
 — compositum, II. 432.
 Quercus, II. 434.
 — cum Aceto, II. 435.
 — cum Alumine, II. 435.
 — aluminosum, II. 435.
 — Roboris, II. 434.
 Quinae comp. et lax., 498.
 Quinque Radicum, 291.
 Ratanhiae, II. 443.
 refrigerans Lieutaud, 748.
 resolvens, II. 615.
 — et diuretic., II. 395. 401.
 Rhabarbari, II. 452.
 Rhododendri chrysanthi, II. 459.
 Rubi villosi, II. 487.
 Rubiae, II. 486.
 — compositum, II. 486.
 Rutæ zincatum, II. 693.
 Sabinæ, II. 43.
 de Salep Radice, II. 496.
 Salicariae, II. 497.
 Salsicis, II. 499.
 — compositum, II. 499.
 Sambuci Corticis, II. 509.
 Santali citrini, II. 513.
 Saponariae, II. 515.
 Sarsae, II. 517.
 Sarsaparillæ, II. 517.
 — ex Callac, II. 522.
 — compos., II. 518. 521.
 — cum Mezereo, II. 521.
 saturninum, II. 339.
 Scillæ, II. 536.
 Scorzonææ bezoardicum, II. 544.
 — solutivum, II. 544.
 Secalis cornuti, II. 546.
 Seminum Cydonior., 599.
 Senegæ, II. 366.
 Serpentariae Virg., 265.
 Simarubæ, II. 570.
 Smilacis Sarsaparillæ, II. 517.
 Specierum guajacinarum, II. 515.
 — cum Rheo, II. 515.
 — cum Mezereo, II. 515.
 Spigeliae, II. 588.
 Spongiae ustæ, 415.
 Staphisagriae, stomachic. resolv., II. 392.
 strumale, 416.
 contra strumas, 416.
 Suberis Corticis, II. 434.
 sudosiferum, II. 518.
 sudorificum, 794.
 Sulphureti Caldas Hoffmanni, 234.
 syphiliticum robor., II. 35.
 — Yvo Gaukes, 715.

Decoctum Tabaci, II. 236.
 — Tamarindorum, II. 610.
 — composit., II. 610.
 Taraxaci, II. 615.
 — composit., II. 615.
 Tartari citratum, II. 410.
 — crystallorum, II. 409.
 temperans Lieutaud, 748.
 tonicum, II. 386.
 — et leniens, 498.
 Tormentillæ, II. 652.
 Ulmi, II. 660.
 — campestris, II. 660.
 Uvae Ursi Folior., II. 661.
 Veratri, 739.
 Verbasci anodyn., II. 673.
 vermifugum, 520. 742.
 — Violæ tricoloris c. Aqua, II. 21.
 — cum Lacte, II. 21.
 Visoi albi, II. 679.
 vomitivum, 289.
 Zittmanni, II. 522.
 Decoctura f. Decoctum.
 Delphia, 608.
 Delphinium, 608.
 Delphinium, 608.
 Delphinium, 607.
 — Consolida, 607.
 — Staphysagria, 608.
 Delphinus edenulus s. Orca, 453.
 Dens Leonis, II. 615.
 Dentales, 358.
 Dentalia, 358.
 Dentalium Dentalis, 358.
 — Dentalis, 358.
 Dentaria, 608. II. 428.
 — digitata, 608.
 — major, 609.
 — minor, 608.
 — pinnata, 609.
 Dentes Apri, 364.
 — Equi marini, 364.
 — Hippopotami, 364.
 — Monocerotis s. Unicornu marini, 361.
 Dentillaris, 609.
 Desmarestia aculeata, 741.
 Desvauxia fluitans, 609.
 Deutoacetos Cupri, 594.
 — Ferri, 659.
 — Mercurii, II. 205.
 — Sodii, II. 685.
 Deutocarbonas Potassii, II. 384.
 — Sodii, II. 579.
 Deutochloruretum Hydrargyri, II. 176.
 — Mercurii, II. 176.
 Deutohydrochloras Antimonii, 235.
 — Cupri, 590.
 — et Ammoniaci, 590.
 — Hydrargyri, II. 176.
 — Mercurii, II. 176. 177.
 — Stanni, II. 592.
 Deutoioduretum Mercurii, II. 198.
 Deutoioduretum Mercurii, II. 198.
 Deptomurias Antimonii, 235.
 — Hydrargyri, II. 176.
 — Mercurii, II. 176.
 — Stanni, II. 592.
 — Stibii, 235.
 Deutonitras Cupri, 599.
 — Hydrargyri solutus, II. 198.
 — Mercurii, II. 198.
 Deutoosphas Cupri, 584.
 Deutosulfas f. Deutosulphas.
 Deutosulfuretum Hydrargyri rubrum — Cinnabaris artific.
 Deutosulphas Cupri, 584.
 — et Ammoniae, 584.
 — Potassii — Kali sulphuric.
 — Sodii — Natrum sulphuric.

Deutosulphuretum Antimonii, 229.
 — Hydrargyri rubr., II. 152.
 Deutotartas Potassii, II. 404.
 — et Sodii — Tart. natronat.
 Deutoxycyanuretum Ferri hydrat., 669.
 Deutoxylum Antimonii, 214.
 — Ferri, 638.
 — Hydrargyri, II. 146.
 — nitrat. — Hydr. oxydat. rubr.
 — Hydrogenii, II. 300.
 — Mercurii, II. 134.
 — Plumbi, II. 331.
 — rubrum, II. 334.
 — Potassii — Kali caust. sicc. — liquidum, II. 370.
 — Zinci — Flores Zinci.
 Deutoxysulphuretum Sodii, II. 574.
 Diacaryon, II. 33.
 Diacodium liq. Mont., II. 311.
 Diacrydium, II. 527.
 — cydoniatum, II. 528.
 — glycyrrhizatum, II. 528.
 — Liquiritia edulcorat., II. 528.
 — rosatum, II. 528.
 — sulphuratum, II. 527.
 Diacydonium aromaticum, 598.
 — jalappinum, II. 29.
 — lucidum, 597.
 — jalappinum, II. 29.
 — simplex, 597.
 — solutivum pellucid., II. 29.
 — cum speciebus, 598.
 Diamoron cum Melle, II. 488.
 Dianthus Caryophyllus, 609.
 Dianthia, II. 512.
 Diastordium liquidum, 289. 646.
 Diastannum album, 610.
 — Creticus, II. 295.
 Diervilla, 610.
 — Tournefortii, 610.
 Digestivum liquefactum, II. 621.
 — Plenkii, II. 622.
 Digitalinum, 616.
 Digitalis, 610.
 — ferruginea, 610.
 — purpurea, 610.
 Diospyros, 617.
 — Ebenum, 617.
 — Virginiana, 617.
 Dipsacus Fullonum, 617.
 — sylvestris, 617.
 Diptannum officinale, 610.
 Dolichos pruriens, — Strobilobium.
 Doronicum Germanicum, 266.
 — latifolium, 617.
 — officinale, 617.
 — Pardalianches, 617.
 — plantagineum, 617.
 — Plantaginis folio, 266.
 — Romanum, 617.
 Dorstenia Contrayerva, 656.
 Dracaena Draco, II. 512.
 Draco mitigatus, II. 155.
 Dracocephalum Moldavica, II. 108.
 Draconium, II. 512.
 Draconis Sanguis, II. 571.
 Dracontia minor, 278.
 Dracontium foetidum, 617.
 Draconculcus esculentus, 277.
 — hortensis, 277.
 Drageae vermifugae, II. 160.
 — Keyseri, II. 204.
 Dropax antiparalyticum, II. 329.
 Drosera, 617.
 — longifolia, 617.
 — rotundifolia, 618.
 Drymis Winteri, 571.
 Dryobalanops Camphora, 371.

Dulcamara, 618.
Dulcichinum, 601.

E.

Ebulus, II. 507.
Ebur, 364.
— fossile, 364.
— ustum album, 365.
Echioglossum, II. 245.
Echium vulgare, 620.
Eclegma album, 187.
— amygdalinum, 187.
— gummoso-oleosum, 187.
Elaeocarpus copallifera, 569.
Elaeoscaccharum Absinthii, II. Add.
— Anisi, 207.
— Aurantii s. Aurantiorum, 527.
— — Florum, 527.
— Cajeputi, 347.
— Calami, 349.
— Carvi, 423.
— Caryophyll. arom., 425.
— Cassiae cinnam., 385.
— Chamaemeli, 460.
— Chamomillae, 460.
— Cinnamomi s. Cinn. acuti, 385.
— Citri, 537.
— Crotonis, 577.
— Foeniculi, 196.
— Juniperi, II. 41.
— Macidis, II. 224.
— Menthae crispae, II. 117.
— — piperitae s. piperitidis, II. 117.
— Myrrhae, II. 226.
— Salviae, II. Add.
— Sassafras, II. 526.
— Succini, II. 599.
— Terebinthinae, II. 632.
— Valerianae, II. 670.
Elais Guineensis, II. 632.
Elatarium, II. 211.
Elatium, II. 212.
Elatinum, II. 211.
Electrum, II. 596.
Electuarium de Acoro, 349.
— adstringens, 444. 480. 481.
— 586. II. 45. 430. 443. 286. 291.
— — Duhaumi, II. 137.
— — Fullerii, II. 407.
— — alcalino-ferratum, 641.
— — Aloës compositum, 104.
— — Hydrarg. mur. et Ferri, 636.
— — alterans, II. 139.
— — anodynum pro infantibus, II. 91.
— — antacidum, II. 91.
— — antihelminthicum, 521. II. 175. 304. 664.
— — Heisteri, II. 138.
— — Vogleri, II. 175.
— — antiarthriticum, II. 155.
— — anticachecticum, II. 328.
— — antiscorbuticum, 480.
— — antidyseritic, 207. II. 449.
— — antiepilepticum, 451. 482. II. 604.
— — antifibrile, 480.
— — Masdevalli, 480.
— — antihæmorrhoidale, II. 100. 328. 553.
— — antihæmorrhoidale, 244. 248. II. 142. 182.
— — antihydrophobicum, II. 33.
— — antihysicum, II. 113.
— — antirheumaticum, II. 603.
— — antiscorbuticum, 545. II. 571.
— — antiscrophulos., II. 401. 402.
— — antispasmodicum, 482. II. 664.

Electuarium antisiphiliticum, II. 184.
— — aperiens, II. 535. 550.
— — aphrodisiacum, 472. II. 497.
— — Arnicae Florum, 266.
— — aromatico-opiatum, II. 278.
— — aromaticum, 83. 458.
— — bechicum, II. 99.
— — Boleti suaveolentis, 331.
— — cum Carbone, 414.
— — cardiacum, 383.
— — caryocostinum, II. 529.
— — Cassiae, 430.
— — — Fistulae, 430.
— — — lenitivum, 430.
— — — Sennae, II. 550.
— — — tamarindinum, 430.
— — Catechu, II. 289.
— — — compositum, II. 289.
— — catholicum, II. 551.
— — — commune, II. 550.
— — — duplicatum, II. 554.
— — ceratum, 251.
— — chalybeatum, 636. 646.
— — e Chamæmelo, 458.
— — cum Chamomilla, 458.
— — Chinae, 481.
— — — alcalinum, 480.
— — — antimoniatum, 482.
— — Cochleariae c. Calamo, 545.
— — Contrayervae, 566.
— — cordiae, 575.
— — Cremoris Tartari, II. 407.
— — demulcens, 251.
— — dentifricum, 363. II. 408.
— — desobstruens, II. 535.
— — detergens, II. 228.
— — diacatholicon, II. 554.
— — diaphoenix, II. 529.
— — diaprunum, II. 550.
— — ad diarrhoeam, 444.
— — diasiatum, II. 497.
— — diascordium, II. 289.
— — diastartareum, II. 553.
— — diatragacanthae, II. 653.
— — diureticum, II. 39. 535.
— — ad dysenteriam, II. 449.
— — eecoproticum, II. 550.
— — excitans, II. 429.
— — febrifugum, 67. 265. 479. 480.
— — — et aperiens, II. 402.
— — ad flatus, 444.
— — Florum Arnicae, 266.
— — foetidum, 437.
— — gingivale, 137. 443. II. 228. 408.
— — ad gingivas, II. 228.
— — de Graphite, 637.
— — ad hæmoptysin, 749.
— — ad herpetem, II. 142.
— — hierae picrae, 104.
— — hydragogum, II. 24. 29. 529.
— — Hyoscyamiopiatum, II. 293.
— — pro infantibus, II. 91.
— — ingrassans, II. 68. 309.
— — Ipecacuanhaemoschaum, II. 13.
— — joviale, ad taeniam, II. 551.
— — de Junipere, II. 38. 39.
— — Lauri Baccarum, 67.
— — cum Lauro-Cerasi Conserva, 451.
— — laxans et emmenagog., 98.
— — laxativum, 430. II. 611. 622.
— — lenitivum, II. 409. 550. 555.
— — cum Sulphure, II. 551.
— — Limaturae Ferri Garzonii, 636.
— — de Manna, II. 99.
— — martiatum, 636.
— — Mimosae Catechu compositum, II. 289.
— — — contra morsum canis rabidi, II. 113.

Electuarium mithridaticum, II. 91. 275.
— — mundificans, 718. II. 554.
— — — pauperum, 718.
— — — Werlhofii, 718.
— — Myrrhae compositum, 443.
— — opiatum, II. 278.
— — — ad dentes, 137.
— — — polypharmacum, II. 278.
— — Opii compositum, II. 278.
— — pro pecoribus, II. 228.
— — pectorale, II. 365. 603. 695.
— — — laxans, II. 29.
— — piperinum, II. 328.
— — Polygalae amarae, II. 365.
— — purgans, II. 24. 155. 499. 529. 554. 603.
— — purificans, II. 112.
— — ad rabiem, II. 113.
— — refrigerans, II. 419.
— — requies Nicolai, II. 293.
— — resolvers antihæpeticum, II. 135.
— — — martiale diureticum, 641. II. 535.
— — resumptivum, 630.
— — de Rhabbaro, II. 554.
— — Rhei compositum, II. 554.
— — roborans, 486.
— — de Roccamore, 526.
— — sanans, 251.
— — Scammomi, II. 529.
— — Scordii, II. 289.
— — — Fracastoris, II. 289.
— — — opiacum, II. 289.
— — — opiatum, II. 289.
— — e Scordio, II. 289.
— — ad scrophulas, II. 401. 402.
— — sedativum et adstringens, 444.
— — de Senac febrifugum, 481.
— — e Senna, II. 530.
— — — cum Carbone, II. 554.
— — Sennae, II. 550.
— — — compositum, II. 550.
— — — cum Pulpis, II. 550.
— — contra stomacacem, 137.
— — stomachic., 349. 526. II. 449.
— — alterans, II. 328.
— — Tamariindorum, II. 550. 611. 622.
— — temperans, II. 391.
— — terebinthinatum, II. 632.
— — thebaicum, II. 278.
— — Theriaca, II. 278.
— — theriacale magnum, II. 278.
— — tonico-resolvens, 641.
— — tonicum 480. 641.
— — Tragacanthae, II. 653.
— — traumaticum, 323. II. 467.
— — ad vermes, II. 25.
— — vermifugum, II. 25. 175. 591. 591.
— — vomitivum, II. 13.
Elemi, 620.
— — occidentale, 620.
— — orientale, 620.
Elemintochoctou, 741.
Eletinum, 620.
Elettaria Cardamomum, 416.
Eleutheria, 426.
Eleichrysum montanum, 211.
Elixir acido-aromaticum, 395.
— — acidum, 55.
— — Hallerii, 55.
— — — Dalleri, 55.
— — adstringens, II. 71.
— — ad longam vitam, 114.
— — Alkermes, 394.
— — Aloës saponaceum, 109.
— — anarum, 109. 114. 420. 535.
— — II. 406.
— — aquosum, II. 529. 536.
— — Peyrilhe, 699.

Elixir amarum vinosum, 69.
 — Americanum Courcellesii, II. 61.
 — ammoniato-opiatum, II. 84.
 — antispasmodicum, 353. II. 432.
 — antihelminticum Subocum, II. 31.
 — antiapoplecticum Jacobi-normani, 395.
 — antiarthriticum cum Acornito, 61.
 — — caribaeum, 712.
 — antiarthriticum, II. 284.
 — — Lamort, II. 280.
 — antipollinum crocatum, 106.
 — antifebrile, 505.
 — antihypocondriacum, 604.
 — antihystericum, II. 437.
 — — officinale, 287. 438.
 — antispasmodicum, 60.
 — antidontalgicum, II. 429.
 — antipodagricum, 16.
 — antiscorbaticum, II. 68.
 — — amarum, 649.
 — — Sperhaavii, 648.
 — Selli, 649.
 — antiscrophulorum Peyrille, 699.
 — antisepticum, 605.
 — antispasmodicum, 751. II. 669.
 — antisyphiliticum, 304.
 — antihæmorrhæum, 304.
 — aperiens, II. 406.
 — aperitivum, 405. II. 617.
 — Clanderii, 109.
 — cum Aqua Calcariae ustae, II. 432.
 — aromaticum, 210. 390. 393.
 — — acidum, 395.
 — — adstringens, II. 630.
 — asthmaticum, II. 288.
 — Aurantiacum compos., 532.
 — aureum, 655.
 — balsamicum, 631. 632.
 — — Hoffmanni, 631. 632.
 — — pector. toluatum, 612.
 — — purificans, II. 183.
 — — spirituosum Hoffmanni, II. 646.
 — — Werhoffs, 602.
 — de Cedro, 490.
 — cholagogum, 109.
 — Citri, 640.
 — — purgans, II. 41.
 — cordiale Esomachicæ, 106.
 — Croci & Castoreo, 438.
 — Dauryi, II. 699.
 — Duboisii, 600.
 — dulce Rhei, 71. 408.
 — ferriugum, 69. 504.
 — foetidum, 470.
 — Gambogiae aloatica, 733.
 — Glycyrrhizæ, II. 83.
 — Guaiaci volatile, 712.
 — Guaiacinum, 712.
 — — volatile, 712.
 — Hippocratiæ Extracti, 67.
 — Jalapae composit., II. 31.
 — Jermatzi, 712.
 — juniperinum, II. 40.
 — — meliviticum, II. 40.
 — mastichinum, II. 104.
 — Masticis, II. 104.
 — de Mittie, II. 67.
 — Myrrhae, II. 230.
 — Papaveris, II. 248.
 — paraveris, II. 257. 258. 259.
 — pectorale, 308.
 — — anghicum, II. 640.
 — — dulces, II. 83.
 — — Elsenri, II. 83.
 — — Regis Danor., s. Danicae, II. 83.

Elixir pectorale simplex, II. 84.
 — — Weidmanni, 178.
 — polychrestum Halense, II. 630.
 — purgativum, II. 659.
 — proprietas, 168.
 — c. Koldo, Boerhavi, Paracelsi, 168.
 — — sine Acido, 105.
 — album Helmontii, 106.
 — antiscorbaticum, 108.
 — — aquosum, 109.
 — — Sulce, 106.
 — Paracelsi, 108.
 — Rhabarbarinum, 115.
 — c. Rhabbarbo, 115.
 — — Rhei, 115.
 — — Stahlii, 109.
 — Radolfii, 114.
 — Rawlini, II. 459.
 — — resolvers, II. 403. 407. 617.
 — Rhabarbari, II. 458.
 — Rhei amarum, II. 457.
 — — compositum, II. 457.
 — — dulces, II. 457. 468.
 — Ringelmanni, II. 83.
 — roborans, 604. 657.
 — — acidum, 428.
 — — Whytti, 604.
 — sacrum, 113.
 — scabrum, II. 657.
 — scorbaticum, 545.
 — — Semae, II. 650.
 — de spina, 110.
 — de Squize, II. Add.
 — stomachicum, 114. 292. 308. 631. 632. 608.
 — — amarum, 608.
 — — aquosum, 608.
 — — dulcificatum, 112.
 — — spirituosum, 604.
 — — temperatum, 632.
 — — Viennense, 631.
 — de Stouglifon, 115.
 — e Succo Glycyrrhizæ, II. 83.
 — — Liquiritiæ, II. 83.
 — sudoriferum, II. 259.
 — — Lactosi, II. 259.
 — sudorificum Willisii, II. 17.
 — — sudicum, 112.
 — — sulphurico-acidum, 56.
 — — tolicum, 113.
 — traumaticum, 321.
 — uterinum, 287.
 — — Crollii, 438.
 — — verumifug. de Reginbeau, 116.
 — — viscerale, II. 631. 532. 630.
 — — Hoffmanni, 632.
 — — Rosensteini, 632.
 — — vitae Matthioli, 320.
 — — mullerum, II. 606.
 — Vitrioli, 303.
 — — uti. 28. aromatic., 305.
 — — aromaticum, 305.
 — — dulce, 305.
 — — Saffuranseium, 305.
 — — Myrsinæ, 305.
 — — c. Tinctura aromati-
 — ca, 305.
 — — Weidm., II. 686.
 — — Whytti, 604.
 — Elleborus, 730.
 — Eluteria, 405.
 — Embracatio ammoniacalis, 157.
 — — refrigerans, 77.
 — — resolvens, 172. 178.
 — — Saponis tuberculati, 403.
 — Emetina, 607. II. 11.
 — Emetinum, 621. II. 11.
 — Empetrum, 720.
 — Emplastrum adhaesivum, 600.
 — — II. 618. 600. 612.
 — — Anglicum, 600.

Emplastrum adhaesiv. Wood-
 roffi, 600.
 — adstringens, II. 354.
 — album Pocium, II. 364.
 — de Althæa, 728.
 — Ammoniaci, 338. 724.
 — — c. Hydrargyro, II. 133.
 — — c. Mercurio, II. 133.
 — de Ammonio, 338. 724.
 — — c. Mercurio, II. 133.
 — ammoniacum galbanicum, 338.
 — — mercurale, II. 137.
 — Ammonii c. Camphora, 168.
 — Andréæ & Crute, II. 635.
 — Anglicanum, 690.
 — Anglo-saxonicum, II. 362.
 — Anglicum, 690.
 — anodynum, II. 272. 274. 353.
 — antiarthriticum, II. 362.
 — anticancrosum, II. 362.
 — anticolicum, 343.
 — antihæmorrhoidale, II. 287.
 — antihystericum, 343. 724.
 — antipodagricum, II. 105.
 — antispasmodicum, II. 271.
 — antistruale, 244.
 — ad s. contra apoplexiam, II. 625.
 — aromaticum, 384. 424. 726.
 — Asae foetidae, 724.
 — — c. Ammoniaci, 724.
 — — compos., 724.
 — — matricale, 333.
 — Asae foetidae — Empl. Asae foetidae.
 — atrahens, II. 628. 639.
 — Balsamicum, II. 364. 421.
 — — Schiffhausii, II. 133.
 — Becholzii, 110.
 — Belladonnae, 297.
 — benedictum, II. 364.
 — Betonicae, 328.
 — ad bubones venereos, II. 134.
 — calefaciens, 408.
 — camphoratum Stahlii, II. 262.
 — — c. Cantharidibus epispast. solidus, 408.
 — Cantharidis, 405.
 — — perpetuum, 409.
 — — vesiculosum, 408.
 — — vesicatoriae, 405.
 — — compos., 409.
 — Cantharidum, 405.
 — — camphorat., 408.
 — — cereum, 405.
 — — cum Euphorbio, 409.
 — — organatum, 405.
 — — perpetuum, 409.
 — — resinosum, 405.
 — Capnicum, 627.
 — Carbonatis Plumbi astum, II. 304.
 — — catagnaticum, 666.
 — cephalicum, II. 284.
 — — Cerae, 282. II. 638.
 — Cerae teresbinthinatam, II. 638. 639.
 — — cereum, II. 638. 639.
 — — Ceratæ, II. 303.
 — — compositum, II. 304.
 — — Cetaeæ, 453.
 — — album, 453.
 — — de Creta, 453.
 — — album Ammoniaco, 518.
 — — composit., 518.
 — — Cicutæ s. de Clivia, 617.
 — — citrinum, 218. 129. II. 638.
 — — ad clavos pedum, 159.
 — — ad colicam, II. 274.

Emplastrum Collae ad herniam, II. 357.
 — commune, II. 352. 353. 638.
 — — adhaesivum, II. 642.
 — — attrahens, II. 638.
 — — gummatum, 338.
 — — cum Resina, II. 642.
 — confortativum Vigonis, II. 355.
 Conii, 517.
 — maculati, 517.
 e Conio, 517.
 consolidans, II. 668.
 — vegetabile, 444.
 corrosivum, II. 181.
 Croci compositum, 341.
 de Crusta Panis, II. 608.
 Gummi, 581.
 — compositum, 581.
 — saponaceum, II. 420.
 e Cumino, 581.
 defensivum, 612.
 — rubrum, 642. II. 335. 355.
 — viride, II. 640.
 detergens rubrum, II. 335.
 diabolatum Blondelli, II. 359.
 diachalciteos, II. 355.
 diachylon s. diachylum, II. 352.
 — — compos., 338.
 — — c. Gummatibus, 338.
 — — gummatum, 338.
 — — c. Gummi, 338.
 — — c. Gummi - Resinis, 338.
 338. — simplex, II. 352. 353.
 — diapalmae, II. 353.
 — diapoenix, II. 353. 529.
 — diaphoreticum Mynsichti, 338.
 — diapompholigos, II. 689.
 — diaspulphur. Rulandi, II. 228.
 Digitalis, 616.
 divinum, II. 358.
 ad dolores dentium, II. 105.
 de Doyen, II. 362.
 emolliens, 128.
 epispasticum, 406.
 — — camphoratum, 405.
 epuloticum, II. 353.
 Euphorbii, 409.
 de Euphorbio, 409. 627.
 Ferri, II. 355.
 filii, 338.
 — Zachariae, 252.
 flavum, 128. II. 299.
 Foenu graeci s. e Foenu graeco, 721.
 foetidum, 343. 724.
 ad fonticulos, 252. II. 335.
 ad fracturas, 565.
 — — et luxationes, 565.
 frigidum Riedlini, 130.
 fundans, II. 129. 336.
 ad fungos articulo., 627.
 fuscum, II. 351.
 Galbani, 338.
 — — camphorat., 338.
 — — compositum, 338.
 — — crocat., 341.
 — — roborans, 343.
 — — saturninum, 338.
 — — simplex, 338.
 de s. e Galbano, 338.
 — — crocatum, 341.
 — — ad ganglia, 725.
 — — glutinans Lithargyri, II. 642.
 — — glutinosum, 690.
 de Graphite, 637.
 Gratia Dei, II. 621.
 griseum, II. 363. 668.
 — — coctum, II. 363.
 Guillermi servitor., II. 607.

Emplastrum c. Gummatib., 338.
 — — resinosus, ibid.
 — — gummatum, 338.
 — — cum Gummi, 338.
 — — gummi - resinosum, 724.
 — — c. s. e Gummi Resinis, 338.
 — — gummosum, 338. 724.
 — — composit., 340.
 — — ad hernias, 564.
 — — — Baumé, 564.
 — — pro herniosis, 564.
 — — Hjerneri, II. 355.
 — — Hydrargyri, II. 132.
 — — — cum Conio, II. 134.
 — — — et Opio, II. 134.
 — — hydrargyricum, II. 132.
 — — ex Hydrargyro, II. 132.
 — — Hyoscyami, 753.
 — — de Hyoscyamo, 753.
 — — Ichthyocollae telae indu-
 ctum, 690.
 — — imperiale, II. 357.
 — — incognitum, II. 513.
 — — irritans, 405.
 — — ischiadicum, 344. 627.
 — — Janini, 409.
 — — Juchii, II. 132.
 — — labiale album, 453.
 — — Ladani, II. 51.
 — — compos., II. 51.
 — — de Lapide calaminari, II. 688.
 — — Lauri Baccarum, 57.
 — — Lithargyri, II. 352.
 — — — cum Resina Pini, II. 642.
 — — — composit., 338.
 — — — glutinans, II. 642.
 — — — c. Hydrargyro, II. 132.
 — — simplex, II. 352. 353.
 — — lithargyricum cum Resina, II. 642.
 — — Lithargyrii simpl., II. 352.
 — — ad lupiam, 594.
 — — Lythargyrii f. Empl. Litharg.,
 — — Lythae vesicatoriae, 405.
 — — magneticum, 270.
 — — malactic. c. Gummi, 130.
 — — sine Gummi, 130.
 — — mamillare, 455. II. 362. 420.
 — — ad mammillas, 455.
 — — mastichinum, II. 105.
 — — matricale, 343.
 — — Matris, II. 361.
 — — maturans, II. 640.
 — — Meliloti, II. 106.
 — — — camphorat., II. 107.
 — — Meloë vesicatorii, 405.
 — — — compos., 409.
 — — mercuriale, II. 132. et Add.
 — — — gummosum, II. 133.
 — — — resolvens, II. 132.
 — — Mercurii cum Conio et Opio, II. 134.
 — — Minii adustum, II. 361.
 — — — camphorat., II. 361.
 — — miraculosum, II. 362.
 — — moschatum, II. 218.
 — — de Mucilagibus, 724.
 — — mucilaginosum, 128.
 — — de Nicotiana, II. 238.
 — — nigrum, 344.
 — — — Becholzii, 344.
 — — — sulphuratum, 344.
 — — Norimbergense, II. 361.
 — — Noricum, II. 361.
 — — odontalgicum, 408. II. 274.
 — — opiatum, II. 274.
 — — Opii, II. 268.
 — — Opodeldoc, II. 357.
 — — oxycroceum, 341.
 — — Oxydi Ferri rubri, 642.
 — — — s. exOxydo Plumbidia-
 botanum, II. 359.

Emplastrum Oxydi Plumbi epu-
 loticum, II. 353.
 — — — mucilagineum, II. 352.
 — — — rubri camphorat., II. 361.
 — — — rubrum, II. 355.
 — — — semivitrei, II. 352.
 — — — c. Resina, II. 642.
 — — — Pini, II. 642.
 — — — composit., II. 420.
 — — — gummos., 338.
 — — — resinos., II. 642.
 — — — c. Sulphate Ferri calcinato, II. 355.
 — — — plumbici, II. 352.
 — — Oxyduli Plumbi semivitrei, II. 352.
 — — — gummo-
 sum, 338. — — adust., II. 361.
 — — Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniaae, II. Add.
 — — perpetuum, 409.
 — — peruvianum, 309.
 — — picuum, II. 638. 639.
 — — Picis, II. 638. 639.
 — — composit., II. 640.
 — — liquidae, II. 331.
 — — navalis, II. 638. 639.
 — — nigrae regium, 564.
 — — et Resinae, II. 640.
 — — solidae, II. 638. 639.
 — — piperitum, II. 329.
 Plumbi, 352.
 — — gummi-resinos., 338.
 — — gummosum, 338.
 — — nigrum, II. 333.
 — — Protoxydi fusi, II. 352.
 — — — fuscum, II. 354.
 — — simplex, II. 352.
 — — Subcarbonatis comp., II. 364.
 — — e Plumbo compos., II. 363.
 — — polychrestum, II. 642.
 — — Porri, II. 352.
 — — Prioris ad hernias, 561.
 — — Pyrethri, II. 429.
 — — — contra rachitidem, II. 640.
 — — Ranarum simplex, II. 359.
 — — de Ranis sine Mercurio, II. 359.
 359. — — regale, II. 275.
 — — e Resina elastica, II. 444.
 — — cum Resina, II. 642.
 — — Resinae, II. 639. 642.
 — — Resinar. glutinans, II. 640.
 — — resinosum, II. 642.
 — — — Cantharidum, 405.
 — — — sulphuratum, II. 607.
 — — resolutivum, II. 359.
 — — resolvens, 172. 529. 724. 725. II. 123. 134. 335. 336. 349. 370.
 — — — anmoniacat., 168.
 — — — et anticancrosum, II. 376.
 — — — composit., II. 134.
 — — — c. Mercurio, II. 134.
 — — — opiaceum, II. 361.
 — — — e quatuor fundantib. s. ex mixtis quatuor resolventibus, II. 134.
 — — — Raistingii, II. 357.
 — — — c. Sapone et Camphora, II. 421.
 — — — Schmuckeri, 724.
 — — Rhei composit., 118.
 — — roborans, 642. II. 354. 355. 638. 642.
 — — rubefaciens, 405. 408. 627.

Emplastrum rubefians, 406
 — rubrum, 341. II. 336
 — contra rupturam, 584
 — santalinum, II. 513
 — saponaceo-plumbicum, II. 355
 — saponaceum, II. 420
 — de Barbette, II. 363
 — saponatum, II. 420
 — camphoratum, II. 421
 — de Saponis, II. 420
 — Saponis, II. 420
 — ammoniaci, 172
 — camphorat., II. 421
 — saturninum, II. 689
 — Mynsichti, II. 689
 — Scammonii et Turpethi compos., II. 529
 — de Scrophularia, 593
 — Sevi anodynum, II. 353
 — Siliquarum, II. 355
 — imperiale, II. 357
 — simplex, II. 357 353 638 642
 — agglutinans, II. 642
 — glutinans, II. 642
 — de Spermate Ceti composi-
 situm, 338
 — Ranarum, II. 363
 — Spermatis Ceti, 453
 — splenicum, 726
 — stibiatum, 244
 — sticticum, II. 355 638 639
 — Hamburgense, II. 639
 — stomachicum, II. 51. 287.
 329. 608.
 — ad strumam, 244
 — stypticum, 642. II. 355 642
 — de Styrace, II. 506
 — Styracis stomach., II. 506
 — Subcarbonatis Plumbi, II.
 363.
 — compos.,
 II. 361.
 — sulphurat., 341. II. 228. 607.
 — suppurativum, 336
 — Tabaci, II. 238
 — de Tacamahaca, II. 608
 — tacamahacinum, II. 608
 — ad temporā, II. 274
 — Thuris compos., II. Add.
 — ad terminā ventris, II. 274
 — Trifolii Meliloti, II. 106
 — tripharmacum, II. 361
 — universale, II. Add.
 — ad verrucas, 694
 — vesicatorium, 405
 — Janini, 409
 — Monspellacum, 409
 — ordinarium, 405
 — perpetuum, 409
 — Janini, 409
 — Vigonis sine Mercurio, II.
 359
 — c. Mercurio, II. 133
 — viride, 593
 — compositum, 593
 — volatile, 166
 — zincico-plumbic., II. 689
Emulsio Acaciae Arabicae, 183
 — adstringens, 133. II. 436
 — Ammoniaci Gummi, 719
 — Amygdalarum, 183
 — camphorata, 184
 — composita, II. 91
 — c. Manna, 185
 — Amygdali communis, 183
 — amygdalina, 183
 — hordeata, 183
 — anthelmintica, II. 295
 — anticatarrhalis, II. 318
 — antihysterica, 284
 — antimonialis camphorata,
 244.
 — antirheumatica, 731
 — Arabica, 183.

Emulsio c. Bals. Sulphuris anis.
 II. 604
 — Balsami Copaivae, 304
 — balsamica, 311
 — Barthelii, II. 393
 — bechica, II. 313
 — Bruneri, 721
 — de Cadet, 304
 — Cafeputi, 347
 — Camphorae, 374
 — camphorata, 374
 — c. Nitro, 375
 — cannabina, 398
 — Cantharidum, 404 410
 — ad catarrhum, II. 318
 — cerea, 250
 — Chinae, 490
 — Citri Seminum, 541
 — Cornu Cervi usi, 729
 — cosmetica, 368
 — diuretica, 400 721
 — emetica, 228
 — excitans, 347
 — febrifuga, 450
 — Ferri composita, 644
 — Guajaci Resinae, 719
 — guajacina, 716
 — Gummi Arab., 183 189 731
 — gummosa, 189 731
 — hordeata amygdalina, 183
 — Jalapae, II. 29
 — kermetica, 228
 — laxans, II. 29
 — leniens, 73. 185. 188. 579.
 II. 316.
 — ad lumbaginem, II. 382
 — Myrrhae Griffithii, 644
 — narcotica, 751. II. 252
 — nitrosa, II. 393
 — c. Nucis vomicae, II. 241
 — e nucleis Persicae externa,
 II. 316.
 — oleosa, II. 243
 — — yplattis, 166
 — phosphorata, II. 320
 — Pineae nucleorum, II. 325
 — Pini s. Turionum Pini, 4
 — Pistaciarum, II. 320
 — purgans, II. 26. 99. 101. 463.
 530.
 — refrigerans, II. 388. 394
 — salina, II. 405
 — sedativa, 751
 — — simplex, II. 216
 — Sublimati corrosivi, II. 180
 — temperans, II. 309
 — c. Terebinthinae, II. 619
 — terebinthinacea, II. 618
 — terebinthinata, II. 631
 — vermifuga, 42. II. 530
 — Violarum, II. 677
 — violata, II. 677
Emys lularia, 680
Endivia, 512
Enema cum Acido sulphurico, 54
 — acetosum, 21
 — acidum, 51
 — adstringens, 331. 444. 679.
 II. 488. 619.
 — c. Opio, 670
 — et toxicum, 267
 — amylicum, 191
 — Amyli, II. 254
 — anodynum, 751. II. 254. 310
 — anthelminticū, II. 669
 — antispasmodicum, 402
 — antispasmodicum, 493
 — antispasmodico-resolvens,
 II. 676
 — antispasmodicum, II. 221.
 254. 676
 — antispasmodicum, II. 761
 — antisyphilitic., 178
 — ad ascarides, II. 493. 676. 614.

Enema balsamic. adstringens,
 II. 619.
 — c. Opio, II. 619.
 — Belladonnae, 297
 — camphoratum, 377
 — — Chinae c. Asa, 284
 — carminativum, 210. II. 53
 — catharticum, 94. II. 93
 — Chamomillae, 465
 — Chinae, 492
 — — c. Opio, 487
 — ad clavos pedum, 594
 — commune, II. 410
 — emolliens, 124. II. 76. 97.
 — foetidum, 284
 — grassum, 64
 — Hyoscyami, 751
 — involvens, II. 76
 — irritans, II. 237
 — laxans, II. 690
 — — et leniens, 429
 — leniens, 675. II. 365. 310. 619.
 — ad lupinam, 594
 — mannatum, II. 160
 — mercuriale, II. 168. 169. 177.
 — Nicotianae, II. 237
 — oleosum, II. 26
 — opiacum, II. 264
 — opiatum, II. 265
 — oxymellicum, 22
 — Papaveris, II. 310
 — purgans, 241. 707. II. 93. 121.
 560. 576. 584
 — refrigerans, 580. II. 392
 — resolvens, 465. 694. II. 416.
 — roborans, 465
 — Sabadillae, II. 492
 — sedans, II. 264
 — sedativum, II. 249. 251. 254.
 — stibiatum, 248
 — tabacinum, II. 237
 — Tanacetii, 284
 — temperans, 675
 — terebinthinatum, II. 619. 631.
 — — c. Opio, II. 619
 — toxicum, 487
 — vermifugum, 374. II. 464.
 578. 614.
 — ad verrucas, 694
Ens Martis, 657
Enula, 358
Enulia, II. 2
 — Campana, II. 2
Epidendrum Vanilla, Vanilla
 — aromatica.
Epithema antiarthriticum, II. 205
 — antihystericum, 208
 — rubefaciens, 108. II. 328
 — vermifugum, 67
Epithymum Orepticum, 596
 — officinarum, 596
Equi marini dentis, 344
 — testes, 682
Equisetum, 611
 — arvense, 611
 — fluviatile, 622
 — humile, 622
 — majus, 622
 — minus, 622
 — palustre, 622
Erica, 622
Erigeron, 622. II. 547
 — acre, 622
 — Canadense, 622
 — Philadelphicum, 622
 — viscosa, 622
Eriacus combustus, 359 413
 — Europaeus, 359
Erioxylon, 704
Erodium moschatum, 702
Erthinum adstringens, II. 334
 — contra ozanem, 199
 — haemastaticum, II. 692
Eruca, 334. II. 670.

ErUCA nigra, II. 570.
 Ervum, II. 675.
 — Lens, II. 62.
 Eryngium, 622.
 — aquaticum, 622.
 — campestre, 622.
 — maritimum, 623.
 — maritimum, 623.
 Erysimum Alliaria, 89.
 — Barbara, 623.
 — officinale, 623.
 — vulgare, 623.
 Erythraea Centaurium, 447.
 — Chilensis, 626.
 Erythrodaninum, II. 485.
 Erythronium Americanum, II. Add.
 — flavescens, 626.
 — Indicum, II. 531.
 Esox Lucius, 364.
 Essentia Absinthii, 9.
 — amara, 10.
 — composita, 10.
 — totius, 10.
 Aconiti, 62.
 Agallochi Ligni, II. 69.
 alexipharmaca StahlII, II. 646.
 — temperata, II. 646.
 Aloës, 96.
 — amara, 448. 609. II. 658.
 — Halensis, 11.
 — Ambræ composita aetherea, 143.
 — Hoffmanni, 143.
 — liquida, 143.
 — Mindereri, 143.
 — sicca, 142.
 Amomi repentis, 416.
 Angelicae, 282.
 Anaguratae, 207.
 anodyna Ludovici, II. 257.
 — officinalis, II. 256.
 antarthritica Hoffmanni c. Opio, 437.
 — sine Opio, 437.
 — antihydrica Hoffmanni, 102.
 — antihysterica, 287. 434. 438.
 — Antimonii, 239.
 — antiscorbatica, 398.
 — antiseptica Huxhami, 503.
 — Aristolochiae Serpentariae, 265.
 — aromatica, 393.
 — Asæ foetidae, 286.
 — — aetherea, 286.
 — — kalica, 287.
 Aurantii, 534.
 — dulcis, 535.
 — immaturi, 535.
 — sicca, 527.
 Aurantiorum Cortic., 534.
 — — vinosa, 530.
 — Pomorum immaturorum, 535.
 — Balsami Canadensis roborans, I.
 — — mundificans, II. 183.
 — Copajvae kalica, 304.
 — Peruviani, 308.
 balsamica, 540.
 Belladonnae, 297.
 Benzoes, 321.
 Benzoini, 321.
 bezoardica Halensis, 203.
 Bonplandiae, 207.
 Brycae, 207.
 Calami, 260.
 Canelae albae, 392.
 Cantaridii, 401.
 Cardamomi, 416.
 Cardui benedicti, 419.

Essentia carminativa, 394.
 — Trillei, 536.
 — Wedelii, II. 683.
 Caryophyllatae, 703.
 Cascarillae, 428.
 Cassiae cinnamomeae vel lignae, 392.
 Castorei, 436.
 — Canadensis, 436.
 — carminativa, 440.
 — Moscovitici, 436.
 — opiata, 437.
 — thebaica, 437.
 — vulgaris, 436.
 Catechu, 446.
 — Terrae, 446.
 catholico-purgans Rothii, II. 31.
 — de Cedro, 537.
 — Centaurae benedictae, 419.
 — Centaurii minoris, 448.
 cephalica, 351.
 Chinae, 502.
 — alexipharmaca, 503.
 — antiseptica Huxhami, 503.
 — composita, 503.
 — Heliwigii, 503.
 Cicutae, 517.
 Cinchonae, 502.
 — lancifoliae, 502.
 Cinnamomi, 392.
 — composita, 393.
 Citri sicca, 537.
 Cochleariae, 547.
 Conii, 517.
 Corticis Peruviani, 502.
 — alexipharmaca Huxhami, 503.
 — composita 504.
 — Winterani, 571.
 Corticum Winteranorum, 571.
 — cosmetica, 321.
 — simplex, 321.
 Croci, 574.
 Cullitaban, 580.
 Digitalis, 615.
 — purpureae, 615.
 dulcis, II. 402.
 emetica Helvetii, 214.
 Fuliginis Clauderi, 178.
 Galbani, 337.
 Gei urbani, 703.
 Gentianae, 698.
 — rubrae, 698.
 Glechomae hederacel, 736.
 Guajaci, 711.
 Gummi Ammoniaci, 720.
 — kalina, 720.
 haemato-cathartica, 178.
 — et alexipharmaca Clauderi, 178.
 Hederæ, 736.
 Hyoscyami, 752.
 — nigri, 752.
 Hyperici, 758.
 — hysterica, 438.
 Jasmini, II. 38.
 Juglandis cortic. virid., II. 34.
 Lactucæ virosae, II. 50.
 Levistici, II. 72.
 Ligni Aloës, II. 69.
 — Guajaci, 711.
 Eignorum, 711.
 Liquiritiae, II. 83.
 Lyttæ vesicatoriae, 402.
 Macidis, II. 223.
 Macia, II. 223.
 Malti, II. 95.
 — matris aperitiva, 652.
 — Martis aperiens, 632.
 — aperitiva, 652.
 Mastiches, II. 102.

Essentia mastichina, II. 102.
 — Melissa composita, II. 119.
 — Menthae piperitae, II. 119.
 — Menyanthis, II. 668.
 — Millefolii, II. 209.
 — Millepedum, II. 211.
 — Mimosa Catechu, 446.
 — Moschi, II. 221.
 — moschata, II. 221.
 Myrrhae alcalisata, II. 229.
 — — alcoholica, II. 229.
 — nigra Anglica, II. 247.
 — Nucum Corticis viridis, II. 34.
 — Jugland. Cort. virid., II. 34.
 — Papaveris, II. 248.
 — Paredrae bravae, 525.
 — Pimpinellae albae, II. 322.
 — — kalica, II. 324.
 — Pini, 2.
 — Riperis, II. 326.
 — polycresta Gundelsheimeri, II. 326.
 — Populi, II. 349.
 — — oculorum, II. 360.
 — — vulneraria, II. 360.
 — Rorismarini, II. 479.
 — Sabinae, II. 30.
 — Sassafras, II. 525.
 — composita, II. 525.
 — scillitica Keupii, II. 402.
 — Scordii, II. 646.
 — de Scordio composita, II. 646.
 — Senegae, II. 366.
 — Serpentariae, 205.
 — Spicae indicæ, II. 233.
 — splenetica StahlII, 758.
 — Stibii, 239.
 — stomachica, 532.
 — polycresta Gundelsheimeri, II. 326.
 — Stramonii, 606.
 — Succii, II. 597.
 — — alcalisata, II. 598.
 — — alcoholica, II. 597.
 — Terebinthinae, II. 618.
 — Terrae Catechu, 446.
 — Japonicae, 446.
 — theriacalis, 109. II. 287.
 — traumatica, II. 652.
 — Trifolii fibrini, II. 652.
 — Valerianae, II. 667.
 — ammoniata, II. 668.
 — composita, II. 668.
 — volatilis, II. 668.
 — contra vermes, II. 614.
 — vermifuga, II. 614.
 — Vincetorici, 290.
 — vulneraria simplex, II. 105.
 — — Stralii, II. 628.
 — Zedoariae, II. 632.
 Esula minor, 626.
 Eucalyptus resinifera, II. 44.
 Euchariora Potassae, II. 397.
 Eugenia Caryophyllata, 423.
 Eupatorium, 625.
 — Ayapana, II. Add.
 — cannabinum, 625.
 — Mesuae, 622.
 — perfoliatum, 625.
 — purpureum, 625.
 — tetracitium, 625.
 — veterum, 80.
 Euphorbia, 616.
 — Antiquorum, 626.
 — Canariensis, 626.
 — corollata, 626.
 — Cyperis, 41. 626.
 — Helioscopia, 626.
 — Ipecacuanha, 626.
 — Lathyris, 440.

Euphorbia officinarum, 626.
 — **palustris**, 626.
 — **Peplus**, 626.
 — **sylvatica**, 626.
Euphorbii correctio, II. Add.
Euphorbium, 626.
Euphrasia, 628.
Euphrasia, 628.
 — **officinalis**, 623.
Evonymus, 628.
 — **Eurypaeus**, 628.
Excoecaria Agallocha, II. 69.
Erosetema angustifol. — **Cinchona angustif.**
Extractum Absinthii, 7.
 — **alcoholicum**, 9.
 — **Acetosellae**, 17.
 — **Aconiti**, 60. 61.
 — **Herbae recentis**, 60.
Agallochi Ligni, II. 69.
Agarici aquosum, 79.
 — **alcoholicum**, 79.
 — **oleoticum**, 555.
Agrimoniae, 30.
Aloës, 95.
Acido sulphurico correctum, 95.
 — **gummosum**, 95.
 — **aqueosum**, 95.
 — **Poëneri**, 95.
 — **purificatum**, 95.
 — **resinosum**, 95.
amarum, II. 85.
Angelicae, 202.
Angusturae, 202.
anodynum, II. 263.
Anthemidi, 462.
 — **nobilis**, 462.
Aristolochiae, 265.
Arnicae alcoholicum, 266.
 — **aqueosum**, 267.
Artemisiae, 276.
Asari, 299.
Aurantii Foliorum, 529.
Aurantior. Cort. aquos., 529.
 — **alcoholicum**, 535.
Bardanae, 318.
Beccabungae, II. 674.
Belladonnae, 295.
 — **Herbae recentis**, 295.
Betulae, 329.
bezoardic. Camerarii, 203.
Bilis, 631.
 — **bovinæ**, 631.
Bistortae, 331.
Boraginis, 332.
Bryoniae, 335.
Calami, 350.
 — **aromatici alcoholicum**, 350.
 — **gummoso-resinosum**, 350.
 — **vinosum**, 360.
Calendulae, 370.
 — **Herbae recentis**, 370.
Campechianensis Ligni, II. 70.
Cantharidum, 309.
Cardui benedicti, 418.
 — **tomentosi**, 418.
Carnis, II. 208.
Caryophyllatae, 703.
Cascarillae alcoholicum, 427.
 — **aqueosum**, 427.
 — **gummosum**, 427.
 — **resinoso-gummosa**, 427.
 — **resinosum**, 427.
Cassiae, 430.
 — **Fistulae**, 430.
 — **Sennae**, II. 555-556.
Castorei, 437.
Catechu, 442.
catharticum, 565.
causticum, 565. II. 461.
Pharmacopoea universalis, II.

Extractum Centaurae benedictae, 418.
 — **Centaurii minoris alcohol.**, 450.
 — **aqueos.**, 449.
 — **spirit.**, 450.
Cerefolii, 457.
 — **hispanicis**, 457.
Chacarrillae cort., 427.
Chaeerophylli, 457.
Chamaedryos, II. 643.
Chamaemelii, 462.
Chamomillae, 462.
 — **vulgaris**, 462.
Chelidonii majoris, 467.
 — **Herbae recentis**, 467.
Chinae alcoholico-aquos., 486.
 — **alcoholicum**, 486.
 — **aqueosum**, 483-484.
 — **emulsum**, 484.
 — **irigide paratum**, 483.
 — **fuscae et regiae irigide parat**, 483.
 — **gummosum**, 483.
 — **resinosum**, 486.
 — **spirituosum**, 486.
 — **vinosum**, 485.
Cichorii, 512.
Cicutae, 515.
 — **virosae**, 515.
Cinchonae, 483.
 — **aqueosum**, 483.
 — **gummosum**, 483.
cinco-pharmacum, II. 451.
Cocculi, 514.
Cochleariae, 515.
Colchici, 515.
Colocynthis, 555.
 — **compositum**, 555.
Colombo, 561.
Columbo, 561.
Conii, 515.
 — **maculati**, 515.
 — **Herbae recentis**, 515.
Contrayervae, 566.
Convallariae, 568.
Convolvuli Jalapae, II. 26.
Corticis Peruviani alcoholico-aquosum, 486.
 — **alcoholicum**, 486.
 — **aqueosum**, 483.
 — **irigide parat.**, 483.
 — **gummosum**, 483.
 — **cum Resina**, 486.
 — **resinos.**, 486.
 — **spirituosum**, 486.
 — **vinosum**, 485.
Salicis, f. Extr. Salicis.
Croci alcoholicum, 573.
 — **aqueosum**, 573.
Dauci, 607.
 — **Carottae**, 607.
 — **Radicis**, 607.
Digitalis Herb. recent., 613.
Dipsacurpurae, 613.
Dulcamarae, 618.
Elaterii, II. 212.
Enulae, II. 4.
 — **alcoholicum**, II. 6.
Enulae, II. Add.
Feltis, 631.
 — **Tauri**, 631.
Ferri, 659-660.
 — **cydoniatum**, 661.
 — **potomatum**, 660.
 — **cum Tartaro**, 664.
Flammulae Jovis, 643.

Extractum Fumariae, 674.
Gallarum, 679.
Genistas, 693.
Gentianae, 694.
 — **alcoholicum**, 695.
 — **aqueosum**, 694.
Geoffraese, 701.
Glechomae hederac., 734.
Glycyrrhizae, II. 77.
Gouldardi, II. 341.
Graminis, 704.
 — **liquidum**, 704.
Gratiolae, 706.
 — **alcoholicum**, 707.
 — **Herbae recentis**, 706.
Guaiaci, f. Extr. Ligni Guaiaci etc.
Harmatoxyli, II. 70.
Hederae terrestris, 734.
Helenii, II. 4.
 — **alcoholic.**, II. 6.
Hellebori nigri, 737.
 — **alcoholicum**, 738.
 — **secundum Bacheri methodum**, 738.
 — **vinosum**, 738.
Hippocastani, 67.
 — **spirituosum**, 67.
Humuli, II. 81.
Hyoscyami alcohol., 752.
 — **aqueosum**, 750.
 — **Herbae recentis**, 750.
Japerici, 757.
Jaceae, II. 21.
Jalapae gummosum, II. 26.
 — **alcoholicum**, II. 26.
 — **aqueosum**, II. 26.
 — **resinosum**, II. 26.
Junulae, II. 4.
Ipecacuanhae, II. 14.
Iridis Florentinae ei nostrat., II. 19.
Juglandis, II. 33.
Juniperi, II. 38.
Ivae, II. 644.
Lacticae sativae, II. 50.
 — **virosae**, II. 49.
Lapathi, II. 493.
Lauocerasi, 452.
Leontodontis Taraxaci, II. 616.
Levistici, II. 72.
Lichenis Islandici, II. 65.
Ligni Albes., II. 69.
 — **Campechianis**, II. 70.
 — **Campechianis**, II. 70.
Guaiaci alcoholicum, 709.
 — **aqueosum**, 708.
 — **resinosum**, 709.
Haematoxyli, II. 70.
Ligustici, II. 72.
Ligium Convallariae, 568.
Liquiritiae crudum, II. 77.
 — **depuratum**, II. 77.
 — **siccum crudum**, II. 77.
 — **Succi**, II. 77.
Lupuli, II. 86.
 — **alcoholicum**, II. 86.
Malatis Ferri, 660.
marocotinum, 102.
Marrubii albi alcoholic., II. 103.
 — **aqueosum**, II. 103.
Martis, 659-660-663.
 — **aceticum**, 659.
 — **aperiens Lemary**, 662.
 — **Mynsiatis**, 663.
 — **cydoniatum**, 661.
 — **potomatum**, 660.
 — **c. Succo Pomerum**, 660.
 — **cum Tartaro**, 664.
Masticariae, II. 106.
 48

Extractum Melampodii, 737.
 — Melissa, II. 108.
 — Millefolii alcohol., II. 209.
 — aquos., II. 209.
 Momordicæ Klaterii, II. 213.
 Myrrhæ aquos., II. 225.
 — composit., II. 225.
 — graminat., II. 226.
 — gummos., II. 225.
 — resinosa., II. 226.
 Narcissii pratensis, II. 232.
 Nasturtii, II. 234.
 Nicotianæ, II. 236.
 — mitigat., II. 236.
 c. Nucæ vomicæ, II. 240.
 Nuclei vomicæ alcoholic., II. 240.
 — aquos., II. 240.
 — siccum, II. 241.
 Nucum, II. 33.
 — Juglandis, II. 33.
 — Juglandum, II. 33.
 — vomicæ, II. 240.
 — spirit., II. 240.
 Opii, II. 260.
 — acetos., II. 247.
 — alcoholic., II. 253.
 — aquos., II. 260.
 — Narcotina privat., II. 262.
 — cinnabarin., II. 155.
 — crocat., II. 262.
 — cydoniat., II. 262.
 — Diestii, II. 262.
 — per fermentationem, II. 262.
 — glycyrrhizat., II. 263.
 — gummos., II. 260.
 — siccum, II. 246. 262.
 — thebaic., II. 260.
 — vinos., II. 248.
 Paeoniae, II. 301.
 panchymagog., II. 451.
 — Crollii, 555.
 — Quercetani, 555.
 Papaveris albi, II. 310.
 — erratici, II. 307.
 — Rhoeadis, II. 307.
 — somniferi, II. 310.
 Patientiæ, II. 419.
 Peucedani, II. 317.
 phlegmagogum Quercetani, II. Add.
 Pimpinellæ albæ, II. 323.
 Pini alcoholic., 2.
 — aquos., 2.
 Plantaginis, II. 332.
 Plumbi, II. 341.
 Podophylli, II. 314.
 Polygalæ amaræ, II. 366.
 — Virginicæ, II. 366.
 Pomorum ferrarium, 660.
 — liquid., 661.
 Pulsatillæ alcoholic., 191.
 — aquos., 191.
 — Herbae recentis, 191.
 — nigricantis, 191.
 Quassiae alcoholic., II. 431.
 — aquos., II. 431.
 — Ligni, II. 431.
 Quercus Corticis, II. 434.
 Ratanbæ, II. 442.
 Ratanhiæ, II. 442.
 — siccum, II. 443.
 Rhabarbari alcoholicum, II. 451.
 — aquos., II. 450.
 Rhapontici, II. 446.
 Rhei alcoholic., II. 451.
 — aquos., II. 450.
 — composit., II. 451.
 Rhoeados, II. 307.
 Rhois radicantis, II. 460.
 — Toxicodendri, II. 460.
 Rorismarini, II. 478.
 Rubiæ alcoholic., II. 485.

Extractum Rubiæ aquos., II. 485.
 — Rutæ alcoholic., II. 491.
 — aquos., II. 491.
 — Sabinae alcoholic., II. 39.
 — aquos., II. 39.
 — Salicis aquos., II. 493.
 — spirituos., II. 498.
 — Salviæ, II. 501.
 — Sambuci, II. 508.
 — Saponariæ, II. 514.
 — Sarsaparillæ, II. 517.
 — Sassafras, II. 525.
 — Saturni, II. 340. 341. 350.
 — Scillæ, II. 535.
 — Scordii, II. 645.
 — Scorzonerae, II. 544.
 — Senegæ, II. 366.
 — Radicis, II. 366.
 — Sennæ alcoholic., II. 556.
 — aquos., II. 555.
 — Siliquæ dulcis, 453.
 — solutivum, II. 556.
 — Stramonii, 605.
 — Herbae recentis, 605.
 — a seminibus, 605.
 — Tabaci, II. 276.
 — Tanacetii alcoholic., II. 614.
 — aquos., II. 613.
 — Taraxaci, II. 616.
 — liquid., II. 616.
 — thebaicum, II. 260.
 — ammoniacale, II. 84.
 — theriacale, II. 286.
 — Tormentillæ, II. 651.
 — Trifolii fibrini alcoholic., II. 657.
 — aquos., II. 656.
 — Tritici repentis, 704.
 — Tririonum Pini aquos., 2.
 — alcoholic., 2.
 ibid., 667.
 — Turpethi, II. 659.
 — Ulmi, II. 660.
 — Urticæ, II. 660.
 — Valerianæ alcoholic., II. 667.
 — aquos., II. 666.
 — frigide parat., II. 666.
 — siccum, II. 667.
 — Verbasci, II. 672.
 — Verbenæ, II. 673.
 — Veronicæ, II. 675.
 — Vincetoxicis, 290.
 — Virgæ aureæ, II. 679.
 — Visci aquos., II. 679.
 — vinos., II. 679.
 — Vitis Pampinorum, II. 681.
 — Zedoariæ, II. 682.
 Exuviae Serpentum, 682.
 F.
 Faba, 628.
 — alba, 628.
 — fabriuga, 629.
 — St. Ignatii, 629.
 — Indica, 629.
 — marina, 358.
 — Pichurim, 629.
 — major et minor, 629.
 — Tanka, 629.
 — vulgaris, 628.
 Fabæ f. Fabæ.
 Fabaria, 672.
 Faecula amygdalæ, 189.
 — Ari, 278.
 — Arrowroot, 268.
 — Belladonnae, 295.
 — Bryoniae, 335.
 — Cicutæ, 515.
 — Cucumeris agrestis, II. 212.
 — Hippocastani fruct., 67.
 — Hyoscyami, 750.
 — Ileos, II. 19.
 — Marantæ, 268.
 — Paeoniae, II. 301.

Faecula Sagu, II. 495.
 — Solani tuberosi, II. 587.
 — Stramonii, 605.
 — Tapiocæ, II. 614.
 Faecula octandra, II. 608.
 Fagopyrum, 629.
 Fagus, 629. 630.
 — sylvatica, 629.
 Farfara, 609.
 Farina Hordei, 745.
 — amygdalata, 745.
 — praeparata, 745.
 — fossilis, 357.
 — Secalis, II. 545.
 Farinæ emollientes, II. 71.
 — resolventes, 671. II. 515.
 Febrifugum Crauii, 212.
 — salum, II. 381.
 Fecula f. Faecula.
 Fel bovinum, 630.
 — Tauri, 630.
 — inspissat., 631.
 — Terræ, 447.
 — Vitri, II. 387.
 Fenem f. Foenum.
 Feroulum commune, 745.
 — Saxonicum, 715.
 Fermentum Cerevisiæ, 632.
 — Panis — Panis.
 Ferraria — Scrophularia aquat.
 Ferri Carbonas, 643.
 — Murias, 652.
 — Ramenta s. Scobs, 632.
 — Limaturæ purificatae, 632.
 — Orydi squamæ, 638.
 — Oxydum, 638. 641.
 — nigrum, 638.
 — Rubigo s. Subcarbonas, 643.
 — Squamæ purificatae, 638.
 — Sulphas, 648.
 — Tartarum, 664.
 Ferrocyanas Potassæ, 38.
 Ferrum, 637.
 — ammoniacale, 657.
 — ammoniacat., 657.
 — ammoniat., 657.
 — Borussic., 659.
 — carbonic., 643.
 — Haematitidis, 641.
 — hydraticum, 643.
 — hydrocyanic., 669.
 — hydroiodic., II. 10.
 — magnetic. compact., 638.
 — muriatic., 652.
 — oxydat., 652.
 — — crystallis., 653.
 — oxydulat., 652.
 — nitric., 652.
 — oxydat., 643.
 — carbonic. fuscum, 643.
 — fuscum, 643.
 — hydratic., 643.
 — hydrocyanic., 669.
 — oxydulat. magnetic., 638.
 — nigrum, 638.
 — rubrum, 611.
 — et oxydulatum hydrocyanicum, 669.
 — sulphuric., 648.
 — phosphoricum, 647.
 — potabile, 663.
 — praeparat., 637.
 — pulveratum, 632.
 — purum politum, 633.
 — select., 632.
 — salit., 632.
 — sidero-zooticum, 669.
 — subcarbonicum, 643.
 — sulphuric., 637.
 — sulphuric., 648.
 — — crystallisat., 643.
 — — oxydulat., 648.
 — tartarizat., 663.
 — vitriolat., 648.
 — exsiccata., 648.

- Ferrum vitriolat. ustum**, 641.
 — zootic., 669.
- Ferula Ammon** — Gummi Amm. Ferulago — Gummi Ammon.
 — Ass. s. Assa foetida, 279.
 — Opoponax — Opopanax.
 — orientalis, 718.
 — persica, II. 496.
- Festuca fluitans** — Desvauxia.
 Ficarica, 467. II. 545.
- Ficus Carica**, 420.
 — Indica, II. 47.
 — infernalis, II. 239.
 — passae, 420.
 — religiosa, II. 47.
Filicula dulcis, II. 368.
- Filipendula**, II. 589.
- Filix**, 294.
 — mas, 294.
- Flammula**, II. 437.
 — Jovis, 543.
- Flavedo Cortic. Aurantior.**, 625.
 — Citri, 536.
- Flores Aeris**, 594.
 — Antimonii argentei — Stibium oxydat. griseum.
 — Auri, 657.
 — bechici, II. 97.
 — Benzoes, 24.
 — Boracis, 26.
 — Cassiae, II.
 — martiales, 657.
 — Salis Ammoniaci, 169.
 — — haematizati, 657.
 — — martiales, 657.
 — — volatiles, 160.
 — Armoniaci, 169.
 — Sulphuris, II. 600.
 — compositi, 104. 110.
 — depurati, II. 600.
 — loti, II. 600.
 — Viridis Aeris, 594.
 — Zinci, II. 674.
- Foeniculum**, 106.
 — aquaticum, II. 318.
 — dulce, 195.
 — Lusitanicum, 144.
 — marinum, 572.
 — porcinum, II. 317.
 — ursinum, II. 207.
 — vulgare, 195.
- Foenum camelorum**, 193.
 — Graecum, 670.
- Folia Cochlearum**, 358.
- Folliculi Sennae**, II. 548.
- Fomentatio acetosa camphorata**, 377.
 — adstringens, 138. 353. 650. 679. II. 332. 344. 428. 434. 435. 692.
 — ammoniacalis camphorata, 166.
 — anodyna, 126. II. 310.
 — antihelmintica, 205.
 — antihæmorrhoidalis, 91. II. 97.
 — antiphlogistica, II. 417.
 — antipleuretica, II. 310.
 — antiæptica, 435. 493. 495.
 — aromatica, 424.
 — Brunningshauseni, II. 373.
 — camphorata, 377.
 — contra colicam, 465.
 — cum Concinno, II. 434.
 — communis, 23.
 — deterfiva, II. 295.
 — discutiens, 37.
 — diuretica, 172.
 — emmenagoga, 336.
 — emolliens, 125. II. 76.
 — — et laxativa, 125.
 — excitans, 258. II. 251. 405.
 — frigida Schmuckeri, Richter, II. 394.
 — incitans, 376. II. 405.
- Fomentatio lavans et antispasmodica**, II. 416.
 — leniens, II. 298. 299. 310. 351.
 — narcotica, II. 204.
 — nitrica, 48.
 — contra perniones, 511.
 — c. Quercus cortice, II. 434.
 — refrigerans, II. 313. 394.
 — — Schmuckeri, II. 394.
 — resolvens, 172. 176. 178. II. 343. 350. 635.
 — saturnina, II. 350.
 — saponacea, II. 417.
 — sedans, II. 255. 351.
 — c. Tannino, II. 434.
 — vinosa, II. 676.
- Fomentum Acidi phosphor.**, 50.
 — adstringens, 353.
 — aluminosum — Aqua alium ammoniacale — camphoratum, 165.
 — aromaticum, II. 479. 616.
 — Belladonnae ammoniat., 176.
 — calcareum c. Myrrha, 353.
 — camphoratum, 377.
 — commune, 23.
 — — c. Muriate Ammoniacæ, 172 et II. Add.
 — — per se, 23.
 — — tepidum, II. Add.
 — detergens, II. 295.
 — discutiens, 23.
 — excitans, II. 501.
 — frigidum Schmuckeri, II. 394.
 — nitricum, 48.
 — ad perniones, 511.
 — ad pustulas favendas, 258.
 — quercinum, II. 434.
 — refrigerans, II. 313.
 — resolvens, 464. II. 510.
 — Saponis composit., II. 417.
 — — ammoniat., II. 417.
 — saturninum, II. 360.
 — — c. Opio, II. 344.
 — siccum, II. 510.
 — Specier. aromat., 459.
 — tonico-adstringens, II. 692.
 — — antisepticum, 285.
 — vulnerarium acidum, 23.
- Formica**, 671.
 — fusca, 671.
 — nigra, 671.
 — rufa, 671.
- Formicæ**, 671.
 — c. acervo, 671.
- Fotus adstringens**, II. 435.
 — anodynus, 673.
 — antisepticus, II. 435.
 — aromaticus, 8.
 — ex Bryonia, 335.
 — communis, 8.
 — discutiens, 23. 172. 466.
 — frigidus, 23.
 — — Schmuckeri, Richter, II. 394.
 — ad gangraenam, 495.
 — refrigerans, 23. II. 394.
 — — et deprimens, 23.
 — resolvens, II. 510.
- Fraga**, 672.
- Fragaria**, 672.
 — Vesca, 672.
- Fragum**, 672.
- Frangula**, II. 444.
- Fraxea Carolinensis**, 650.
 — Walteri, 560.
- Fraxinella**, 610.
- Fraxinus**, 673.
 — argentea, II. 99.
 — excelsior, 673. II. 99.
 — Ornus, II. 99.
 — parviflora, II. 99.
 — pumila, 610.
- Fraxinus rotundifolia**, II. 99.
 — subruscensis, II. 99.
- Frontale anticephalic.**, 376.
 — hypnoticum, 719.
Fructus Cardamomi, 416.
 — pectorales, 421. II. 35.
- Fruentii Spiritus** — Spir. Frum.
Fruentum, II. 515.
- Fucus**, 673.
 — barbatus, 741.
 — ericoides, 741.
 — fasciatus, 711.
 — Helminthochortos, 741.
 — plumosus — Fuc. Helminthochortos.
 — purpureus — Fuc. Helmint.
 — saccharatus — Iodum.
 — sedoides, 741.
 — vesiculosus, 673.
- Fuligo**, 673.
 — Ligati, 673.
 — splendens, 673.
- Fumaria**, 674.
 — bulbosa, 674.
 — officinalis, 674.
- Fumigatio Acidi nitrici**, 47.
 — antioimica Gambii, 258.
 — antiseptica, 47.
 — Chlori, 509.
 — desinfectans, 47. 258.
 — Guyton-Morveauiana, 509.
 — hygienica, 509.
 — muriatico-orygenata, 509.
 — nitrica Smithiana, 447.
 — nitrosa, 47.
 — oxy-muriatica, 509.
 — resinosa, II. 638.
 — Smithiana, 47.
- Fumigationes f. Fumigatio.**
Fumifera, 674.
- Fundans Lassone**, II. 411.
 — Richardi, II. 614.
 — Rotrou, 219.
 — Ruhlandi, 220.
- Fungus Bedeguar**, 319.
 — chirurgorum, 78. 333.
 — Cynosbati, 319.
 — Læricis, 78.
 — Melitensis, 601.
 — quercinus, 78.
 — Salicis — Molet. suav.
 — Rosae, 319.
 — Sambuci, II. 656.
- Furfur**, 675.
 — Amygdalarum, II. Add.
- G.**
- Gadus Lota**, 364.
 — Morrhuæ, II. 216.
- Gagates**, 676.
- Galanga**, 676.
 — major, 676.
 — minor, 676.
 — spuria, 676.
- Galbanetum Paracelsi**, 337.
- Galbanum**, 336.
 — depuratum, 336.
 — in grani, 336.
 — in lacrymis, 336.
 — in massis, 336.
- Galbuli Cupressi**, 531.
- Gale**, 676.
- Galega**, 676.
 — officinalis, 676.
 — Virginiana, 677.
- Galeopsis**, II. 52.
- Galipæ Cusparia**, 206.
 — febrifuga, 206.
- Galium**, 677.
 — album, 677.
 — Aparine, 677.
 — cruciatum, 578.
 — luteum, 677.
 — Mollugo, 677.
 — verum, 677.

Galla, 677.
 — alba, 678.
 — de Aleppo, 677.
 — nigra, 678.
 — quercina, 677.
 — finctoria, 677.
 — turcica, 677.
 Gallae, 677. f. Galla.
 Gallato-Carbonas Potassae, II. 378.
 Gallinae stercus, 59.
 — ventriculus, 682.
 Galliriche, II. 500.
 Gambogia, 732.
 Gambogium, 732.
 Garcinia Cambogia, 732.
 Gardenia gummifera, 620.
 Gargarisma aceticum, 23.
 — acetosum, 171.
 — acidulum, 23.
 — acidum, 51.
 — adstringens, 34. 139. 176. 375. 679. II. 342. 428. 443. 573. 652. 692.
 — aluminosum, 139. II. 509.
 — ammoniacale, 147. 164.
 — ammoniatum, 147. 164.
 — in angina maligna, 21.
 — antidontalgicum, II. 429.
 — antiphlogisticum, 73.
 — antiscorbuticum, 34. 549. 550. II. 96. 439.
 — antisepticum, 171. 492. 497. 511. II. 435.
 — anti-sphiliticum, II. 178. 179. 190.
 — antivenerum, II. 158.
 — ad apthas, 446. II. 587.
 — Belladonnae cum Hydrargyro, II. 183.
 — — mercuriale, II. 183.
 — e Borace, II. 581.
 — boraxatum, II. 581.
 — camphoratum, 375.
 — chloricum, 511.
 — Cochleariae, 550.
 — commune, 748. II. 391. 471. 472.
 — cupratum, 586.
 — detergens s. detersivum, 31. II. 230. 471. 509.
 — emolliens, 124. 663.
 — excitans, II. 328. 329. 429.
 — leniens, 124. II. 97. 340. 311.
 — mercuriale, II. 178. 180.
 — Muriatis Ammon., II. Add. — Hydrargyri oxydati, II. 200.
 — nitrosium, II. 392.
 — opiacum, II. 254.
 — piperitum, II. 329.
 — refrigerans, II. 392.
 — resolvens, 171. II. 350.
 — salitum, 176.
 — Salviae cum Acido muratico, 34.
 — e Scilla, II. 542.
 — saturinum, II. 350.
 — sedans, II. 310. 350.
 — sedativum, II. 284.
 — sialagogum, II. 429. 573.
 — stimulans, 603. II. 501.
 — stypticum, II. 312.
 — Subboratis Sodae, II. 581.
 — tonicum, 500.
 — in ulceribus veneris, II. 178.
 — viride, 583.
 Garrus — Eliz. cord. et stom.
 Gas Acidi carbonici, 27.
 — — muriat. oxygenat., II. Add.
 — — oxymuriatici, II. Add.
 — acidum carbonicum, 27.
 — azoticum, 302.
 — — oxygenatum, 302.

Gas Chlori, II. Add.
 — hepaticum, 42.
 — hydrocarbonatum, 660.
 — Hydrogenium, 660.
 — — carbonatum, 660.
 — — percarbonatum, 660.
 — — sulphuratum, 42.
 — hydrosulphuratum, II. 42.
 — inflammabile — Hydrogenium.
 — Oxygenium, II. 300.
 — Oxidum nitrosum, II. Add.
 Gascarilla, 426.
 Gaultheria procumbens, 660.
 Gaz, f. Gas.
 Gelappium, II. 22.
 Gelatina, 680.
 — Amyli, 191.
 — ex Amylo Solani tuberosi, II. 687.
 — — analeptica, 669.
 — — animalis, 690. 688.
 — — Brassicae rubrae, 334.
 — — e carne quadrupedum. v. latilium, 688.
 — — cum China, 491.
 — — Chinae, 472.
 — — Collae, 687.
 — — Cornu Cervi, 688.
 — — — acida, 688.
 — — — citrata, 688.
 — — e crure bubulo, 688.
 — — Cydoniorum, 597.
 — — aromatica, 598.
 — — Ichthyocollae, 687.
 — — Helminthochorti, 742.
 — — laxans, II. 99.
 — — leniens, 687. 688.
 — — Lichenis cum China, II. 68.
 — — — Islandici, II. 67.
 — — — opiate, II. 68.
 — — Liquiritiae, II. 78.
 — — Paris, II. 305.
 — — purgans, II. 29.
 — — Ribesiorum nigror., II. 461.
 — — Ribium, II. 402.
 — — Sagu, II. 495.
 — — Saleb s. Salep, II. 490.
 — — Testudinum, 687.
 — — vitulina, 688.
 Genepi album, 277.
 — — spurium, 692.
 — — verum, 692.
 Genicella, 692.
 Geniculata, 692.
 Genista, 692.
 — — angulosa, 693.
 — — Canariensis, II. 71.
 — — juncea, 693.
 — — sagittalis, 692.
 — — scoparia, 693.
 — — tinctoria, 692. 693.
 Genistella, 692.
 Gentia, 693.
 Gentiana, 693.
 — — alba, II. 52.
 — — Catesbaei, 693.
 — — Centaurium — Brythraea Cent.
 — — Chiragita, 318.
 — — cruciata, 578.
 — — lutea, 693.
 — — major, 693.
 — — minor, 578.
 — — nigra, II. 647.
 — — purpurea — G. lutea.
 — — rubra, 693.
 — — veterum, 693.
 Gentianeina, 693. 700.
 Gentiana, 700.
 Gentianina, 693. 700.
 Gentianinum, 693. 700.
 Geoffraea, 700.
 — — inermis, 700.

Geoffraea Jamaicensis, 700.
 — — Surinamensis, 701.
 Geoffroya Jamaicensis, 701.
 Geranium, 702.
 — — batrachoides, 702.
 — — maculatum, 702.
 — — moschatum, 702.
 — — pratense, 702.
 — — Robertianum, 702.
 — — rotundifolium, 702.
 — — sanguineum, 702.
 Germanica, 333.
 Geum, 702.
 — — rivale, 702.
 — — urbanum, 702.
 Ghitta Jemoco, 732.
 Gialappa, II. 22.
 Gigartina Helminthochorton, 741.
 — — plicata, 741.
 Gilla, 642.
 — — Theophrasti, II. 690.
 — — Vitrioli, II. 690.
 Gillena, 703.
 — — trifolia, 703.
 — — trifoliata, 703.
 Ginseng, II. 304.
 Glacies Mariae vulgaris, 366.
 Gladiolus coeruleus, II. 17.
 — — communis, 703.
 — — luteus, II. 18.
 Glandes Quercus, II. 433.
 — — — tostae, II. 435.
 Glans unguentaria, II. 213.
 Glastum, II. 21.
 Glaucium corniculatum, 467.
 Glechoma hederacea, 734.
 Glecoma hederacea, 734.
 Glessum — Succinum.
 Globularia, 704.
 — — vulgaris, 704.
 Globuli bezoardici, 664.
 — — carminativi, 661.
 — — chalybeati, 664.
 — — ad erysipelas, II. 337.
 — — ad infectionem, 511.
 — — Ferri tartarisati, 664.
 — — martiales, 661.
 — — — soluti, 661.
 — — martiati, 661.
 — — Molsheimi, 665.
 — — moschati, II. 219.
 — — — fubri, II. 210.
 — — de Nancy, 664.
 — — Tartari ferruginosi, 664.
 — — — martiales, 664.
 — — — martiati, 661.
 — — Tartrat. Ferri et Lixiv., 664.
 Gluten pectorale, II. 78.
 Glycine scandens, 4.
 Glyzyrrhiza, II. 76.
 — — echinata, II. 77.
 — — glabra, II. 76.
 — — lucida, II. 78.
 Glyzyrrhizina s. Glyzyrrhizinum, II. 77.
 Gnaphalium dioicum, 211.
 Gossypina, 704.
 Gossypium, 704.
 — — herbaceum, 704.
 Gramen, 704.
 — — album, 704.
 — — caninum, 704.
 — — majus, 420.
 — — Manna, 609.
 — — orientale, 193.
 — — rubrum, 420.
 Grana Actes, II. 507.
 — — Cnidia, 602.
 Grana Kermes s. tinctorum, 470.
 — — Moluccae, na, 677.
 — — moschata, 1.
 — — Paradisi, 706.
 — — Sago s. Sagu, II. 495.
 — — Tiglia, 577.
 — — Tiglli, 577.

Grana Walk. 377.
 — Vinea Mesmes, 103.
Granatum, 133.
Graphites, 637.
 — depuratus, 637.
 — hydrargyratus, II. 136.
Gratia Dei, 706.
Gratiola, 706.
 — officinalis, 706.
Gutium, 301.
Guajacina, 708.
Guajacum, 707.
 — officinale, 707.
Gualtheria procumbens, 680.
Gullandina Moringa, II. 71.
Gummi Acaciae, 726.
 — adstringens Fothergilli, II. 41.
 — Aloes, 93.
Ammoniacum, 718.
 — alcalisatum, 726.
 — amygdaloides, 718.
 — electum, 718.
 — in granis, 718.
 — in lacrymis, 718.
 — in massis, 718.
 — in panibus, 718.
 — placentis, 718.
Amryidis Katali — G. Olibanum.
Anime, 726.
Arabicum, 726.
Asae foetidae, 279.
Astragali Tragacanthae, II. 652.
 — Bdellii, 319.
 — Benzoes, 320.
 — Benzoinum, 320.
Bubon Galbani — G. Galbani.
Carannae, 411.
Cerasi, 732.
Cerasorum, 732.
Copal, 509.
elasticum, II. 444.
Elemi, 620.
Euphorbii, 626.
Ferulae Ammon. — G. Ammoniacum.
 — Asae foet. — G. As. foet.
Galbani s. Galbanum, 336.
Gamandra, 732.
Gamba, 732.
Gambiense, II. 44.
de Goa, 732.
Guajaci, 708.
Gutta, 732.
Guttae, 732.
 — Americanum, 732.
 — Cambogium, 732.
 — Siamense, 732.
 — spurium, 732.
 — verum, 732.
Zeylanicum, 732.
Gutti, 732.
Hederae, 734.
Hymenaeae Courbaril — G. Anime.
de Jemu, 732.
Juniperi, II. 511.
Kikekumalo — Kikekun.
Kino, II. 44.
Lacca, II. 46.
 — in ramulis, II. 46.
Ladanum, II. 51.
L. Myrrhae — G. Myrrhae.
Ligni sancti, 708.
Mastiches, II. 103.
Mimosae, 726.
 — niloticae, 726.
Myrrhae, II. 225.
nostrae, 732.
Oleae, II. 243.
Olibani s. Olibanum, II. 244.
Panacis, II. 294.

Gummi Sagapentum, II. 495.
 — Sanguinis Draconis, II. 611.
 — Sarcocollae, II. 516.
 — Senegal s. Senegaleense, 732.
 — Serapionis, 736.
 — serapiinum, II. 495.
 — Stalagmitidis cambogioi-
 dis — G. Guttae.
 — Tragacanthae, II. 622.
Gummi-resina Euphorbii, 626.
 f. Strigosa Gummi.
Gutta Gambir — Catechu.
Guttae Abbatis Rousseau, II. 254.
 — acidae tonicae, 251.
 — amarae, 631. II. 241.
 — Anglicae ophalicae, II. 61.
 — Anglicanae cephalicae, 105.
 — anodynae acidae, II. 260.
 — antihelminthicae, II. 34.
 — antihystericae, 287.
 — ad arthrodynamiam, 181.
 — ad blennorrhoeam, 304.
 — cordiales Warneri, II. 558.
 — e Cipro, 584.
 — deprimentes, II. 215.
 — excitantes, 347.
 — ferratae, 952.
 — Generalis La Motte, 301.
 — Jenanae, 115.
 — lenientes, II. 215.
 — martiales, 622.
 — nervinae, 625.
 — nigrae, II. 247.
 — resolventes, 316.
 — stomachicae, 447.
 — uterinae, 287.
 — — Reginae Hispan., II. 241.
Guttaefera s. Guttifera vera — Gutti.
Gutti, 732.
Guttulae albae Wardii, II. 198.
 — diureticae, II. 237.
 — phosphoratae, 51.
Gypsum, 350.

H.

Haematium, II. 70.
Haematium, 611.
Haematoxylinum, II. 70.
**Haematoxylinum s. Haematoxy-
 lum Camptochianum**, II. 70.
Halcynium rotundum, II. 322.
Halicacabum, 88.
Haloindium oxygenatum, II. 397.
Hamamelis, 733.
 — Virginiana, 733.
Hastula Regis, 292.
Hautus Acetatis Ammoniacae et
Stibii, II. Add.
 — Acidum carbon. evolvens,
 II. 29. 30.
 — adstringens, II. 255. 570.
 — anodynus, II. 257.
 — antiemeticus, 28.
 — balsamicus, 311.
 — ad blennorrhagiam, 304.
 — camphoratus, 373.
 — catharticus pro infantibus,
 II. 450.
 — oleosus, II. 464.
 — salinus, II. 92.
Collae animalis, 685.
Crotonis purgans Nimmo,
 578.
 — diaphoreticus resolvens 61.
 — diureticus Milmanni, II. 452.
 — emeticus, 240.
 — guajacinus, 710.
 — incitans diaphoreticus, 176.
 — — nervinus, 376.
 — — resolvens, II. 452.
 — oleosus laxans, II. 558.
 — ex Olibano, II. 244.
 — opiato-stibiatum, II. Add.
 — opiatum, II. 265. et Add.

Hautus peccoralis imitans, II.
 307.
 — — resolvens, 620.
 — salinus efferves., II. 29. 30.
 — saponaceus, II. 29. 30.
 — sedans narcoticus, 751. II.
 245.
 — stomachicus, II. 432.
 — terebinthinatus, 304.
 — tonicus adstringens, II. 251.
 — — martialis, 662.
Hedera, 733.
 — arbores, 733.
 — Helix, 733.
 — — terrestris, 734.
Hedysarum Alkagi, II. 99.
Helium, II. 2.
Helianthus tuberosus, 735.
Helichrysum, II. 593.
 — arenarium, II. 593.
 — Stoechas, II. 593.
Heliotropium Europaeum, 735.
Helix Pomatia, 661.
Helleboraster, 736.
Helleborus, 735. 736.
 — albus, 735.
 — foetidus, 736.
 — niger, 736.
 — orientalis, 736.
 — viridis, 736.
Helminthochortus, 741.
Helminthochortos, 741.
Helmintocortos, 741.
Helxine, II. 313.
Hepar Anguillae, 682.
 — Antimonii, 220. 235.
 — Canis rabidi, 681.
 — Lupi, 681.
 — Sulphuris, II. 375.
 — — alkalinum, II. 375.
 — — calcareum, 354.
 — — salinum, II. 376.
 — — volatile, 172.
 — — vulgare, II. 375.
Hepatica, 743.
 — alba, 743.
 — fontana, 743.
 — nobilis, 743.
 — stellata, 392.
 — triloba, 743.
H. patorium, 80.
Hepatophyllum, II. 651.
Heracantha, 421.
Heracleum gummiferum, 712.
 — lanatum — H. Sphondyli.
 — Sphondylium, 333.
Herba aegyptiaca, II. 106.
 — Britannica, II. 489.
 — Cancri, 735. II. 648.
 — Ignis, II. 63.
 — ophthalmica, 628.
 — paralyseos, II. 422.
 — Ruperti, 702.
 — Sardoae, II. 437.
 — Trinitatis, II. 21.
 — Ventis, 193.
Herbae aromaticae, II. 500.
 — vulnerariae, II. 500.
Hermodactyli, 744.
 — spurii, 744.
Herniaria, 744.
 — glabra, 744.
 — hirsuta, 744.
Heuchera Americana, 744.
Hevea Guianensis — Siphonia
 — Cahuchu.
Hibiscus, 110.
Hibiscus Abelmoschus, 1.
Hiera picra, 104.
Hieracium murorum, 744.
 — Pilosella, 744.
Hippocrasinum, 66.
Hippocastanum, 447.
Hippopatum, II. 447.
Hippopotami dentes, 304.

- Hirci sanguis**, 462.
Hirudo officinalis, medicinalis, 745.
Hirudines, 745.
Hirundinaria, 200.
Hirundines combustae, 369-413.
Hirundinum nidi combusti, 369.
Hirundo rustica, 359.
Hispidula, 211.
Histrifx cristatus, 370.
Hordeum, 745.
 — crudum, 745.
 — decorticatedum, 745.
 — distichon, 745.
 — excorticatum, 745.
 — hexastichon, 745.
 — integrum, 745.
 — mundatum, 745.
 — perlatum, 745.
 — praeparatum, 745.
 — vulgare, 745.
Horminum, II. 500.
Humulus Lupulus, II. 85.
 — foemina, II. 85.
Hyacinthus, II. 607.
Hydragogum Boylei, 266.
Hydrargyri Acetas, II. 203.
 — Murias, II. 175.
 — nitrici Oxyd., II. 145.
 — nitrico-oxydum, II. 145.
 — cinereum, II. 142.
 — rubrum, II. 145.
 — Oxydum per Acidum nitricum, II. 145.
 — Oxyurias, II. 175.
 — Permurias, II. 175.
 — Phosphas, II. 190 et Add.
 — Submurias, II. 155.
 — ammoniatus s. ammoniatum, II. 190.
 — Subnitras, II. 145.
 — Sulphulphas flavus, II. 191.
 — Sulphuretum nigr., II. 138.
 — rubrum, II. 152.
 — sublimat., II. 152.
Hydrargyrum, II. 122.
 — acetatum, II. 203.
 — aceticum, II. 203.
 — ammoniato-muriaticum, II. 199.
 — bichlorat. c. Oxydo et Ammonio muriat., II. 199.
 — bicyanatum, II. 189.
 — Borussicum, II. 189.
 — chloratum, II. 155.
 — cum Creta, II. 127.
 — depuratum, II. 122.
 — haloidatum, II. 175.
 — hydrochloricum, II. 175.
 — hydrocyanicum, II. 189.
 — cum Magnesia, II. 127.
 — muriaticum corrosivum, II. 175.
 — venale, II. 176.
 — mite, II. 155.
 — praecipitatum, II. 199.
 — nitricum, II. 194.
 — oxydatum nigrum, II. 192.
 — muriaticum ammoniat., II. 199.
 — rubrum (praeparat.), II. 145.
 — venale, II. 145.
 — oxydulatum nigrum, II. 142.
 — nitrico-ammoniatum, II. 192.
 — perchloratum, II. 175.
 — phosphorum, II. 190.
 — phosphoreum, II. 190.
 — phosphoric., II. 190 et Add.
 — praecipitatum album, II. 199.
 — purificatum, II. 122.
 — purum, II. 122.
Hydrargyrum rubrum praeparat., II. 145.
 — saccharat., II. 126.
 — stibiato sulphurat., II. 140.
 — sulphuratum nigr., II. 138.
 — sulphuretum nigr., II. 138.
 — rubrum, II. 152.
 — tartarisatum, II. 205.
 — virgineum, II. 122.
 — zooticum, II. 189.
Hydrargyrum, II. 122.
 — acetatum, II. 203.
 — calcinatum, II. 145.
 — corrosivum album, II. 175.
 — cum Creta, II. 127.
 — Magnesia, II. 127.
 — muriaticum ammoniacalis fortior, II. 199.
 — dulcis, II. 155.
 — oxydulatum, II. 155.
 — muriatum, II. 175.
 — corrosivum, II. 175.
 — dulcis, II. 145.
 — mitis, II. 165.
 — oxydulatum, II. 155.
 — nitratum ruber, II. 145.
 — oxydulatum, II. 155.
 — praecipitatum album, II. 199.
 — ruber, II. 145.
 — purificatum, II. 122.
 — sulphuratum nigr., II. 138.
 — ruber, II. 152.
 — cum Sulphure, II. 138.
 — vitriolatum, II. 191.
Hydras Calcareae, 352.
 — ferricum s. ferricus, 643.
 — kalicum s. kalicus, II. 371.
 — kalicus et kalicus fustus, II. 371.
 — Potassae, II. 371.
 — fusae, II. 371.
 — purae fusae, II. 371.
 — Potassii Protoxydi, II. 371.
 — Sulphuris, II. 600.
Hydrastis Canadensis, 748.
Hydratum Sulphuris, II. 600.
Hydriodas Ferri, II. 10.
 — Potassae, II. 8.
 — ioduratum, II. 10.
 — Potassii Protoxydi, II. 8.
Hydrocarbonas Cupri coeruleus, 584.
 — viridis, 584.
Hydrochloras Ammoniacae, 169.
 — Ammoniaci, 169.
 — cupricus, 590.
 — et Ferri, 657.
 — ammonicus depuratus, 169.
 — cum Oxydo hydrargyrico, II. 199.
 — cum Sesquichloreto Ferri, 657.
 — Argenti et Ammoniaci — Liq. Argenti muriat. ammoniat.
 — Auri — Liq. Auri muriat. et Sodae — Aurum muriat. natronat.
 — Barytae — Liq. Terrae pond. salit.
 — Cupri Deutoxydi, 590.
 — Ferri, 652-653.
 — Magnesia, II. 94.
 — Magnesii, II. 98.
 — Mercurii et Ammoniaci, II. 198.
 — ferrati, II. 167.
 — natricus, II. 675.
 — Potassae, II. 397.
 — Potassii Protoxydi, II. 397.
 — Sodae, II. 675.
 — Sodii Protoxydi, II. 675.
Hydrochloratum Ammonii crudum, 169.
 — depurat., 169.
Hydrochloratum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico, II. 199.
 — cum Subbichloreto Ferri, 657.
 — Deutoxydi Hydrargyri, II. 165.
Hydrochlorinas Ferri, 653.
 — natricus, II. 575.
Hydrocyanas Ferri, 669.
 — Tritoxydi, 669.
 — Mercurii, II. 189.
 — Potassae, 38.
 — et Ferri, 38.
 — ferruginosus, 38.
 — medicinalis, 38.
 — Potassii Protox., 38.
 — Protoxydi Potassii, 38.
 — Zinci, II. 684.
Hydrogale, II. 46.
Hydrogenium, 680.
 — azoticum, 144.
 — oxydatum, 680.
Hydrogeno-Sulphuretum Ammoniac liquidum, 172.
Hydroiodas ioduratus Potassae, II. 10.
 — kalicus, II. 8.
 — Potassae, II. 8.
 — Potassii, II. 8.
 — Protoxydi, II. 8.
 — Sodae, II. 10.
Hydrojapathum, II. 489.
Hydronel, 249.
 — antiasthmaticum, 614.
 — anticatarrhale, II. 68.
 — asthmaticum, 614.
 — compositum, II. 5.
 — simplex, 249.
 — vinosum, 86.
Hydropiper, II. 316.
Hydroselinum, 254.
Hydrosilicas Zinci, II. 684.
Hydrosulphas Ammoniacae, 172.
 — Ammoniaci, 172.
 — sulphuratus, 172.
 — Antimonii sulphurat., 229.
 — Calcii Protox., 366.
 — Calcis, 366.
 — antimoniatus, 234.
 — compactus, 366.
 — lenticularis, 366.
 — Potassae, II. 368.
 — Protoxydi Calcii, 366.
 — Sodae, II. 583-585.
Hydrosulphoanas Potassae, 39.
Hydrosulphuretum ammoniacale aquosum, 172.
 — Ammoniacae, 172.
 — liquidum, 172.
 — ammonicum, 172.
 — Antimonii rubrum, 223.
 — liquidum, 43.
 — luteum Oxydi Stibii sulphurat., 229.
 — Oxyduli Stibii sulphurat., 229.
 — Oxydi Stibii aurantiac., 229.
 — — fusum, 223.
 — — rubrum, 223.
 — Oxyduli Stibii, 223.
 — sulphurat., 229.
 — Potassae, II. 375.
 — rubrum Stibii sulphurati, 223.
 — Stibii, 223.
 — sulphurati rubrum, 223.
 — stibiosum, 223.
 — cum Sulphure, 229.
Hydroxydum Ferri-Ochraluteae,
 — globularis-Ae-tites.
Hymenaea Courbaril, 726.
Hyosciamus, f. **Hyoscyamus**.
Hyoscyama, 749.
Hyoscyamina, 749.

Hyocyaminum, 749.
Hyocyamus, 748-749.
 — albus, 748-749.
 — niger, 749.
Hypercarbonas Potassae venalis,
 II. 377.
 — Sodae, II. 577.
Hypericum, 757.
 — Androsaeum, 757.
 — bacciferum, 732.
 — Cayennense, 732.
 — perforatum, 757.
 — quadrangulare, 757.
Hyperoxalae Potassae, II. 403.
Hyperoxodes Ferri nigrum, 638.
 — Hydrargyri, II. 146.
Hyperoxydum Arsenici, 270.
Hyperprototartas Potassii boraxatus, II. 411.
 — cum Bo-
 — rate Sodae, II. 411. **Protox.**
 II. 406.
Hypersulphas Aluminae et Po-
tassae, 134.
Hypertartas Potassae, II. 406.
 — Potassii Protoxydi, II. 406.
Hypoboras Sodae, II. 530.
Hypocarbonas Ammoniae, 159.
 — liquidus, 161.
 — pyro- anima-
 — le s. pyro- animalis, 162.
 — liquidum
 s. liquidus, 163.
 — Magnesia, II. 88.
 — Potassae liquidum, II. 330.
 — pyro-oleosus liquidus, 163.
 — Sodae, II. 577.
Hypochaeris maculata, 760.
Hypocistis, 761.
Hypoglossum, II. 490.
Hypophosphis Potassae, II. 385.
 — Sodae, II. 585.
Hyposulfites Mercurii et Am-
moniaci s. Ammonii, II. 192.
 — et Potassae, II.
 — 192. — et Sodae, II. 192.
 — Potassae, II. 389.
 — Sodae, II. 585.
Hyposulphas Antimonii, 214.
Hyposulphites s. Hyposulphis,
 f. Hyposulfites.
Hypoxodes Ferri — Ferr. oxy-
dul. nigrum.
Hyssopus, 761.
 — officinalis, 761.
Hystrix, f. Hystrix.

I.

Iberis, II. 63.
Ichthyocola, 660.
Icica Caranna, 412.
 — Icariba, 620.
Ictodes foetidus — Dracontium
 foet.
Ignatia amara, 629.
Ilex Aquifolium, 259.
 — vomitoria, II. 1.
Illecebrum majus, 572.
 — vermiculare, II. 546.
Illicium anisatum, 211.
Imbricaria parietina, II. 64.
Imperatoria, 1.
 — Astruthium, 1.
Indigofera Anil, II. 1.
 — argentea, II. 1.
 — tinctoria, II. 1.
Indigotina, II. 21.
Indigotinum, II. 1. 21.
Indum — Malabathrum.
Infusio anthelmintico-tonica,
 561, f. Infusum.

Infusio — Cooctum Salicis, II.
 499.
Infusum Absinthii, 6.
 — nitratum, 6.
 — Acaciae Catechu, 445.
 — adstringens, II. 668-692.
 — alexiterium, 265.
 — Althaeae, 123.
 — amarum, 419. 696.
 — alcalisatum, 696.
 — Edinburgense, 695.
 — cum Natro, 696. II.
 579.
 — et Rorismaripi, 696.
 — vinosum, 697.
 — Angelicae, 202.
 — Angusturae, 206.
 — Anisi, 210.
 — anthelmintico-incitans, II.
 645.
 — tonicum, 561.
 — anthelminticum, 742. II. 538.
 — Anthelmis, 463.
 — antihydricum, II. 441.
 — antiscorbaticum, 546.
 — Armoraciae, II. 441.
 — compositum, II. 441.
 — Arnicae Florum, 266.
 — compositum,
 267. — vinosum, 267.
 — Artemisiae Absinthii — Inf.
 Absinth.
 — Astragali erescapi, 203.
 — Aurantii compositum, 529.
 — Aurantium Folior., 529.
 — Baccarum Juniperi — Inf.
 Junip. Bacc.
 — bechicum, II. 97. 308.
 — Belladonnae, 297.
 — Boraginis Florum, 332.
 — Bruceae, 206.
 — Buglossi, 193.
 — Bynes, II. 95.
 — Calami aromatici, 349.
 — cum Acido
 — muriatico oxygenato, 511.
 — Calcia cinchonatum, 490.
 — Calombae, 550.
 — Cannabis, 398.
 — Cantharidum, 400.
 — Capilli Veneris, 65.
 — cardiacum, 265.
 — acetatum, 265.
 — Cardui benedicti, 419.
 — carminans, 464.
 — Caryophyllorum, 424.
 — Cascarillae, 428.
 — Cassiae Pistulae, 429.
 — Marylandicae, 430.
 — Catechu s. Catechu com-
 — positum, 446.
 — cathartico-anodynum, 461.
 — Centaurae benedictae, 419.
 — Centaurii minoris, 448.
 — Cerasorum-pedunculorum,
 462.
 — Ceterach Foliorum, 456.
 — Chamaedryos, II. 643.
 — Chamomillae, 463.
 — compositum, 464.
 — cum Subcarbonate Po-
 — tassae, 464.
 — Chenopodii ambrosioidis,
 460.
 — Chimaphilae, 472.
 — Chinae cum Aqua Calcis,
 490.
 — calidum, 490.
 — compositum, 492.
 — s. sine calore, 489.
 — potassatum, 490.
 — cum Succo Limonum,
 492.
 — Ciceris Seminum, 512.

Infusum Cigucae, 565.
 — ad cinctices, II. 494.
 — Ginchonae eum Aqua Cal-
 — cis, 490.
 — aquosum compos., 491.
 — sine calore, 489.
 — frigidum, 489.
 — cum Magnesia, 490.
 — cum Succo Limonum,
 492.
 — Cinnamomi, 391.
 — Cochleariae armorac. —
 — Inf. Armor.
 — Colombo, 560.
 — Colombo, 560.
 — Colombo, 560.
 — Conii maculati, 516.
 — Corticis Peruviani vino-
 — sum, 494.
 — Croci, 578.
 — Cuspariae, 206.
 — Digitalis, 613.
 — purpureae, 613.
 — diureticum, 258. 614.
 — Dulcamarae, 619.
 — emmenagogum, 606.
 — Eupatorii perfoliati, 626.
 — Extracti Mimosaecatechu,
 446-
 — cum Opio, 445-
 — Katchu, 445-
 — cum Opio,
 445-
 445-
 — Flammulae Jovis, 543-
 — Galii lutei, 677.
 — Gallium, 679.
 — Gentianae compos., 605.
 — Glycyrrhizae, II. 82.
 — Gratiolae, 707.
 — haemastaticum, II. 458.
 — Hederae terrestris, 734.
 — Hellebori nigri, 739.
 — Hoffmanni,
 739.
 — Helminthochorti, 742-
 — ad hemicranium, II. 658.
 — ad hydriopicos, II. 441.
 — Hyssopi, 761.
 — Imperatoriae, II. 1.
 — Ipecacuanhae, II. 14.
 — vinosum, II. 16.
 — Jaceae, II. 21.
 — Japonicum, 445.
 — Juglandis compositum,
 — Juniperi Baccarum, II. 42.
 — compositum,
 II. 43.
 — Kali carbonici cum Scilla
 — vinosum, II. 638.
 — Lauro-Cerasi Foliorum,
 462-
 462-
 — Lavandulae, 58.
 — laxativ. Mannagettae, II.
 — 563-
 — sedans, II. 462.
 — simplex, II. 662.
 — Viennense, II. 662.
 — Ledi, II. 62.
 — palustris, II. 62.
 — Lepidii, II. 63.
 — Lichenis Islandici, II. 65.
 — Lini, II. 74.
 — cathartici, II. 75.
 — compositum, II. 74.
 — usitatissimi, II. 74-
 — Liquiritiae, II. 82.
 — Lupuli, II. 86.
 — Malti, II. 95.
 — Malvae, II. 107.
 — Melissa, II. 109.
 — Menthae, II. 115.
 — compositum, II. 115.
 — crispae, II. 115.
 — Millepedum, II. 211.

Infusum Menyantis, II. 658.
 — nervinum, II. 666.
 — aethereum, 268.
 — martiale, 268.
Nicotianae, II. 236.
Nymphaeae, II. 242.
Opii aquosum, II. 260.
Orchidis, II. 496.
Origani, II. 206.
Paeoniae petalorum, II. 301.
Papaveris erratici, II. 307.
 — ad paralysis, II. 441.
 — paralyticum, II. 441.
Pareirae bravae, 524.
Pastae Althaeae, 730.
pectorale, 123, 734.
Persicorum s. Persicorum
Florum, II. 315.
 — **Ficis empyreum. liquidae**,
 II. 330.
 — **liquidae**, II. 330.
Pimpinellae, II. 323.
Pini turionum, 3.
Piperis Cayemensis, II. 329.
Polygalae amarae, II. 360.
Pulsatillae, 195.
purgans, II. 30.
Quassiae, II. 432.
 — excelsae, II. 432.
I
 — cum Natro, II. 670.
 — et Sulphatis z. cum
Sulphatis Zinci, II. 432.
Quercus Glandium tota-
rum, II. 436.
Raphani, II. 441.
Rhabbarbari, II. 451.
Rhei, II. 451, 454.
 — **alcalisatum**, II. 454.
 — **alcoholisatum**, II. 455.
 — **amarum**, II. 452.
 — **agnosum**, II. 454.
 — **boraxatum**, II. 455.
 — **palmatici**, II. 451, 454.
 — **salinum**, II. 455.
 — **cum Subcarbonate Po-**
tassae, II. 451.
Rhododendri, II. 459.
Rhoeados, II. 307.
robora, 692.
Rorismarinii, II. 478.
Rosae, II. 497.
Rosarum, II. 467.
 — **acidulum**, II. 468.
 — **compositum**, II. 468.
Sabinae, II. 42.
 — **cum Acido phospho-**
rico, 50.
 — **Salep cum adstringenti-**
bus, II. 581.
Salviae, II. 501.
 — **acidulum**, II. 501.
 — **vinosum**, II. 501.
Sambuci, II. 509.
 — **cum Tartaro stibiato**,
 242.
Sanguinariae, II. 511.
Santonici seminis, 520.
Sassafras Ligni, II. 625.
scilliticum vinosum com-
positum, II. 538.
Secalis cornuti, II. 546.
Sennae, II. 560.
 — **sine Aromatibus**, II. 562.
 — **citratum**, II. 561.
 — **compositum**, II. 560, 561.
 — **sine Aromatibus**, II.
 562.
laxativum, II. 562.
 — **cum Manna**, II. 562.
 — **purgans**, II. 562.
 — **simplex**, II. 560.
 — **cum Succo Citri**, II. 561.
 — **tamarindatum**, II. 561.
 — **et Tamarindi**, II. 561.
 — **tamarindatum**, II. 561.

Infusum Seminae cum Tamarin-
do, II. 561.
 — **tartarizatum**, II. 562.
Serpentariae Virginianae,
 265.
Simarubae, II. 570.
Sinapios, II. 441.
Specierum arom., 459.
Spigeliae, II. 588.
stomachicum, 491.
Tabaci, II. 236.
Tamarindi et Sennae, II.
 561.
Tamarindorum, II. 610.
 — **compositum**, II. 610.
Tanacetii, II. 614.
Thymi, II. 649.
Tiliae, II. 620.
tonico-nervinum, II. 665.
tonicum, 491, II. 14.
Trifolii fibrini, II. 658.
Ulmii, II. 660.
Valerianae, II. 665.
 — **compositum**, II. 665.
 — **vinosum**, II. 667.
vermifugum, II. 589, 645.
Veronicae, II. 674.
Violarum, II. 677.
vulnerarium, 80.
Inhalatio balsamica, 311.
Injectio acustica, 310.
 — **adstringens**, 138, 444, 495,
 589, 650, 679, II. 201, 45, 342,
 351, 431, 692, 694.
 — **Aluminis compos**, II. 351.
 — **anodyna**, II. 265.
 — **antiseptica**, 493, II. 499.
 — **c. Aqua Lauro-Cerasi**, 40.
 — **ad aures**, 310.
 — **auricularis deterfiva**, II. 491.
 — **balsamica**, 304.
 — **ad blennorrhoeam**, II. 694.
 — **ad carnem luxuriantem**
urethrae, II. 159.
Catechu, 443.
Chinae, 495.
 — **antiputrida**, 493.
 — **contrastimulans**, 40.
 — **cuprata**, 586, 589.
Cupri ammoniacalis, 684.
deprimens, II. 251.
detergens, 98, 583, II. 230.
 — **et roborans**, 110.
deterfiva adstringens, II.
 692.
 — **diuretica**, 613.
 — **emolliens**, II. 310.
 — **excitans**, 353, 631.
 — **fellea**, 631.
 — **ad fistulas**, 363, 402.
 — **ex Gallis**, 670.
 — **Girtanneri**, II. 373.
 — **in gonorrhoea**, II. 173.
 — **hydrargyrica simplex**, II.
 125.
 — **hydrargyro-saturnina**, II.
 186.
 — **terebinthinata**, II. 123.
Ichthyocollae et Myrrhae,
 684.
incitans, 402.
Lactis opiatum, II. 265.
leniens, 748, II. 214, 251, 266.
ad leucorrhoeam, II. 342.
 692.
lithontripctica, II. 392, 579.
mercurialis, II. 163, 177.
 — **Aliberti**, II. 177.
 — **opiacea**, II. 185.
 — **Plenkii**, II. 125.
 — **simplex**, II. 125.
 — **e Mercurio dulci**, II. 158.
mucilaginoso, II. 75.
ex Muriate Hydrargyri, II.
 168.

Injectio Murialis Hydrargyri
camphorata, II. 175.
 — **narcotica**, 751, II. 232.
 — **in necrosi syphilitica**, II.
 178.
 — **opiacea**, II. 265.
 — **ad phimosin**, 586.
de Plumbo et Mercurio,
 II. 136.
 — **resolvens**, II. 360.
 — **saturnina**, II. 334.
 — **cum Myrrha**, II. 351.
 — **myrrhata**, II. 351.
 — **sedans**, II. 254, 342.
 — **sedativa**, II. 265.
 — **adstringens**, II. 692.
Sulphatis Zinci aluminio-
sa, II. 692.
 — **terebinthinacea**, II. 620.
 — **tonica**, 493.
 — **vaginalis emmenagoga**, 148.
 — **cum Mercurio**, II. 143.
 — **Whately**, II. 180.
Inspissamentum Cucumeris
agrestis, II. 212.
 — **Urticarum**, II. 560.
intybus angustum, II. 49.
 — **hortensis**, 512.
Iunia, II. 2.
 — **dysenterica**, II. 2.
 — **Helenium**, II. 2.
lininum, II. 2.
Iodas Calcis, II. 8.
 — **Potassae**, II. 8.
Iodetum Kalii, II. 8.
Iodina, II. 7.
Iodium, II. 7.
Iodum, II. 7.
Ioduretum Carbonii, II. 10.
 — **Mercurii**, II. 188.
 — **Potassii**, II. 9.
Ipecacuanha, II. 11.
Iquimbea Jalapa s. macrorrhiza
 — **Convolv. Jalapa**.
Iris, II. 17.
 — **Florentina**, II. 18.
 — **foetidissima**, II. 18.
 — **Germanica**, II. 17.
 — **nostras**, II. 17.
 — **palustris**, II. 18.
 — **Pseudacorus**, II. 17.
 — **tuberosa**, 744.
 — **versicolor**, II. 18.
Isatina s. Isatinum, II. 21.
Isatis, II. 1, 20.
 — **tinctoria**, II. 1, 20.
Isolusium, II. 365.
Iva, II. 614.
 — **arthritica**, II. 643.
Izarinum, II. 485.
J.
Jacea, II. 21.
 — **nigra**, II. 21.
Jacobaea, II. 548.
Jalapa, II. 22.
 — **alba**, II. 105.
Jalapina, II. 22.
Jalapinum, II. 22.
Jalappa, II. 22.
Jalappium, II. 22.
Jamaticinum, 701.
Janipha Manihot, II. 615.
Jasminum, II. 32.
 — **officinale**, II. 32.
Jatropha Curcas, II. 439.
 — **Manihot — Janipha**.
 — **elastica — Siphonia Cal.**
Jecoris Aselli oleum, II. 216.
Jodum. (Iodum).
Juglans, II. 32.
 — **cinerea**, II. 32.
 — **regia**, II. 32.
Jujuba, II. 35.

Jalapum acidulatum, 73.
 — acidum, 33 54.
 — adstringens, 140. II. 29. 512.
 — aetherum, 76.
 — anodynum, II. 313.
 — antheiminticum, 622.
 — antiarthriticum, 375.
 — antihæmorrhagicum, 420.
 — antihypericum, II. 220. 423.
 — antiphthisicum, 686.
 — antispasmodicum, 77.
 — e Camphora, 373.
 — — cum Aceto, 374.
 — camphoratum, 373.
 — — acidulum, 374.
 — diatartareum, II. 566.
 — diureticum, II. 631.
 — emmenagogum, 576.
 — expectorans, 313.
 — foetidum, 284.
 — gummosum, 731.
 — hydragogum, 248.
 — leniens, II. 216. 251. 260. 382.
 — — et purgans, II. 393.
 — Menthae, II. 120.
 — mithridaticum, II. 278.
 — moschatum, II. 220.
 — Moschi, II. 220.
 — narcoticum, II. 313.
 — nitrosum, 48.
 — oxymellitum, 22.
 — pectorale, 731. II. 313. 695.
 — purgans, II. 29.
 — refrigerans, 59. 541. II. 392.
 — regium, II. 473.
 — Rosarum, II. 473.
 — rosatum, II. 473.
 — sambucinum, II. 511.
 — scilliticum, II. 443.
 — scoticum, 312.
 — sedans, II. 216. 381.
 — sedativum, II. 251.
 — sistens, II. 291.
 — stomachicum, II. 383.
 — succinatum, II. 598.
 — sudorificum, 176.
 — temperans, 375. II. 393.
 — Violarum, II. 677.
 — violatum, II. 677.
 — vitriolatum, 54.
Julep, f. Jalapum.
Juncus odoratus, 193.
Juniperus, II. 37.
 — communis, II. 37 511.
 — Lycia, II. 244. 511.
 — Phœnicea, II. 244.
 — Oxycedrus, II. 511.
 — Sabina, II. 37.
 — thurifera, II. 241.
 — Virginiana, II. 37.
Jupiter, II. 590.
Jus adstringens, 563.
 — antihæmorrhagicum, 673.
 — aperitivum, 292.
 — Cancrorum, 683 684.
 — Caponis, 684.
 — Carnis bubulae, 684.
 — Columbae, 684.
 — depurativum, 314.
 — diureticum, 292. 543.
 — Lactarum, 683.
 — leniens, 687.
 — Liquiritiæ, II. 77.
 — Millepedarum, II. 211.
 — ossium, 683.
 — pectorale, 334. 684. 686 II. 68.
 — purificans, II. 5.
 — Ranarum, 683.
 — temperans, 687.
 — Testudinum, 683. 684.
 — Vituli pulmonum, 683. 684.
 — vitulinum, 683 684.
Jusculum antiepilepticum, II.

Jusculum antispasmodicum, II.
 — 307.
 — helicinum, 684.
 — lientericum, 687.
 — pectorale, II. 36. 310.
 — Pulli gallinacei lientericum, 687.
 — siccum, 689.
 — Viperas, 681.
 — viperinum, 684.
Jusquiammum, 749.
Justicia Adhatoda, 54.
 — pectoralis, 43.

K.
Kadmia, II. 684.
Radium, II. 684.
Kaempferia Galanga, 676.
 — rotunda, II. 684.
Kali acetatum, II. 398.
 — aceticum, II. 398.
 — ammoniato - tartaricum, II. 413.
 — arsenicosum, II. Add.
 — bisulphuric, II. 383. et Add.
 — Borussicum, 38.
 — — venale, 38.
 — carbonicum, II. 377. 378.
 — — acidulum, II. 384.
 — — e Cinnibus clavellatis, II. 378.
 — — crudum, II. 377.
 — — impurum, II. 377.
 — — neutrale, II. 384.
 — — perfecte saturatum, II. 284.
 — — e Tartaro, II. 378.
 — causticum, II. 391.
 — — cum Calce, II. 372.
 — — fusum, II. 371.
 — — siccum, II. 371.
 — chloricum depurat., II. 397.
 — — venale, II. 397.
 — citratum, II. 403.
 — ferreo-borussicum, 38.
 — ferrocyanicum, 38.
 — ferruginoso - hydrocyanicum, 38.
 — — hydroiodicum s. hydroiodinicum, II. 8.
 — — hydrosulpho-cyanicum, 39.
 — — iodinicum, II. 8.
 — — iodicum, II. 8.
 — — muriaticum oxygenat. depurat. et venale, II. 397.
 — — nitratum, II. 389.
 — — nitricum, II. 389.
 — — crudum, II. 389.
 — — depuratum, II. 389.
 — — purificatum, II. 389.
 — — purum, II. 389.
 — — oxalicum acidulum, II. 403.
 — — purum, II. 403.
 — — oxymuriaticum depurat. et venale, II. 397.
 — — praeeparatum, II. 378.
 — — purum, II. 371.
 — — sidero-zooticum, 38.
 — — stibiato sulphurat. — He. par Antimonii.
 — — subcarbonicum, II. 377.
 — — — crudum, II. 377.
 — — — purissimum, II. 378.
 — — sulphurato-stibiato, 235.
 — — sulphuratum, II. 375.
 — — — pro balneo, II. 375.
 — — sulphuricum, II. 385.
 — — — acidum, II. 388.
 — — — crudum, II. 395.
 — — — depuratum, II. 385.
 — — tartaricum, II. 404.
 — — tartaratum, II. 404.
 — — vegetabile caustic., II. 370.
 — — purum, II. 370.

Kali vitriolatum, II. 385.
 — — zooticum, 38.
 — — — venale, 38.
Kalium iodatum, II. 8.
 — — sulphuratum, II. 375.
Kalmia, II. 44.
 — — latifolia, II. 44.
Keiri, 666.
Kermes Grana, 470.
 — — mineralis, 223.
Ketmia Aegyptiaca, 1.
Kikekunemalo, II. 44.
Kinnum, 609.
Kino, II. 44.
Krameria triandra, II. 442.

L.

Labdanum, II. 51.
Lac, II. 45.
 — — adstringens, II. 435.
 — — ammoniacale, 719.
 — — — compositum, 720.
 — — Ammoniacci, 719.
 — — Amygdalae s. Amygdalarum, 183.
 — — anodynum, 185.
 — — antispasmodicum, 367.
 — — artificiale, 185.
 — — Asae foetidae, 284.
 — — asinum, II. 46.
 — — — artificiale, 665.
 — — bubulum, II. 46.
 — — caprium, II. 46.
 — — diureticum, II. 618.
 — — ebutyratum, II. 46.
 — — Guajacii Gummi, 716.
 — — guajacinum, 716.
 — — leniens, 183.
 — — infantum, II. 382.
 — — Lunae, 357.
 — — mercurialis, II. 199.
 — — — Plenckii, II. 125.
 — — pectorale, 455.
 — — Plumbei, II. 333.
 — — Sulphuris, II. 600.
 — — terebinthinaceum, II. 618.
 — — Terrae, II. 88.
 — — vaccinum, II. 46.
 — — virginale, II. 339. 351.
Lacca, II. 46.
 — — in baculis, II. 46.
 — — coerulea, II. 47.
 — — Florentina, II. Add.
 — — in granis, II. 47.
 — — in massa, II. 47.
 — — Musci, II. 47.
 — — in ramis, II. 46.
 — — in ramulis, II. 46.
 — — in tabulis, II. 47.
Laccæ Muscus, II. 47.
Laccinum, II. 47.
Lacerta agilis, 681.
Lacmus, II. 47.
Lacryma Job, II. 49.
Lactica, II. 49.
 — — sativa, II. 49. 50.
 — — Scariola, II. 49.
 — — sylvestris, II. 49.
 — — virga, II. 49.
Lactucarium, II. 50.
Ladanum, II. 51.
 — — in massis, II. 51.
 — — in tortis, 51.
Lagophthalmus, 702.
Lamium album, I. 57.
 — — montanum, II. 113.
Lana philosophica, II. 684.
Lapathum acutum, II. 489.
 — — aquaticum, II. 489.
 — — crispum, II. 489.
 — — unctuosum, 66.
 — — sanguineum, II. 489.
Lapha, 278.

- Lapides Cancrī s. Cancrorum**, 359.
 — acetati, 368.
 — citrati, 368.
 — praeparati, 360.
 — Carpinum, 358.
 — Percarum, 358.
 — Spongiorum, 358.
 — praeparati, 360.
Lapilli Cancrorum, 359.
Lapis Armenius, 354.
 — Bufonius, 363.
 — calaminaris, 53. 684.
 — praeparatus, 11. 684.
 — causticus, 11. 371.
 — Chirurgorum, 11. 371.
 — divinus, 587.
 — de Goa, 11. 220.
 — Haematites, 611.
 — infernalis, 261.
 — — alcahuis, 11. 371.
 — Judaicus, 358.
 — — praeparatus, 360.
 — Lazuli, 133.
 — Lynceus, 358.
 — Manati, 364.
 — medicamentosus, 136.
 — miraculosus, 587.
 — nephriticus, 11. 62.
 — ophthalmicus, 587.
 — porcinus, 357. 369.
 — Pumicis, 11. 426.
 — septicus, 11. 371.
 — specularis, 366.
 — suillus, 357.
 — — praeparatus, 360.
 — vulnerarius externus, 587.
 11. 693.
Lappa major, 313.
 — minor, 11. 681.
Lappula hepatica, 80.
Larix Europaea, 11. 99. 67.
Laserpitium, 11. 52.
 — Germanicum, 11. 72.
 — latifolium, 11. 52.
 — Siler, 11. 52.
Lathyrus major, 441.
Laudanum antihystericum, 11. 263.
 — cinnabarinum, 11. 156.
 — compositum, 11. 248.
 — crocatum, 11. 248.
 — cydoniatum,
 — diureticum, 11. 263.
 — Helmontii junioris, 11. 263.
 — de Lalouette, 11. 247.
 — liquidum, 11. 248. 253. 255.
 — — compositum, 11. 248.
 — — Sydenhami, 11. 248.
 — — Warneri, 11. 258.
 — nepentes Quercetani, 11. 247.
 — opiatum, 11. 247. 248. 260.
 262.
 — — cydoniatum, 11. 263.
 — — Rousseau, 11. 254.
 — simplex, 11. 260.
 — urinarium, 11. 263.
 — — Micheli, 11. 263.
Lauri Oleum, 11. 53.
Lauro-Cerasus, 450.
Laurus, 11. 52.
 — Alexandrina, 11. 490.
 — Camphora, 371.
 — Cassia, 379.
 — Cinnamomum, 379.
 — Culilaban, 580.
 — Myrrha — Myrrha.
 — nobilis, 11. 52.
 — Sassaparilla, 11. 524.
Lavandula, 11. 57.
 — latifolia, 11. 57.
 — Spica, 11. 57.
 — Stoechas, 11. 593.
 — vera, 11. 57.
Lawsonia inermis, 11. 62.
Lawsonia spinosa, 11. 62.
Lecanora tuffeae-Lacca.
Ledum palustre, 11. 62.
Lemnithochorton, 741.
Lens, 11. 62.
Leontodon Taraxacum — Ta-
 rat. Dens Leonis.
Leontopodium, 51.
Leonurus Cardaca, 417.
Lepidium, 11. 62. 63.
 — Iberis, 11. 63.
 — latifolium, 11. 63.
Leporum talus, 363.
Lepus combustus, 359. 413.
 — timidus, 359. 681.
Leucanthemum odoratum, 458.
Leucoum luteum, 466.
Levisticum, 11. 71.
Libanus thurifera, 244.
Lichen, 11. 63.
 — cocciferus, 11. 63.
 — infundibuliformis, 11. 63.
 — Islandicus, 11. 64.
 — cinereus terrestris, 11. 63.
 — petraeus latifolius, 743.
 — pulmonarius, 11. 64.
 — Roccella — Lacca coeru-
 — lea.
 — stellatus, 743.
 — tartareus — Lacca coeru-
 — lea.
 — terrestris cinereus, 11. 63.
Lignum Agallochi veri, 11. 69.
 — Agallochum, 11. 69.
 — Aquilae, 11. 69.
 — Aspalathi, 11. 69.
 — benedictum, 707.
 — Brasilianum rubrum, 11.
 69.
 — Brasiliense, 11. 69.
 — Buxi, 345.
 — Campechense, 11. 69.
 — Campechianum, 11. 69.
 — Campechiense, 11. 69.
 — Campecauum, 11. 69.
 — cedrium, 11. 37.
 — coeruleum, 11. 69.
 — colubrinum, 11. 595.
 — Ebenum, 617.
 — Fernambuci, 11. 69.
 — Gua aci, 707.
 — Indicum, 707.
 — Juniperi, 11. 37.
 — Mahagoni, 11. 608.
 — Moluccanum, 577.
 — Moluccense, 577.
 — nephriticum, 11. 71.
 — Panavae, 577.
 — Pavonae, 577.
 — Quassiae, 11. 431.
 — Rhodii, 11. 71.
 — sanctum, 707.
 — Santali albi, 11. 513.
 — — citrini, 11. 513.
 — — rubri, 11. 513.
 — Sappan, 11. 69.
Ligusticum, 11. 71. 72.
 — Levisticum, 11. 71.
 — Meum, 11. 207.
Ligustrum, 11. 72.
 — Aegyptiacum, 11. 62.
 — vulgare, 11. 72.
Lilium, 11. 72.
 — album — L. candidum.
 — candidum, 11. 72.
 — Convallium, 587.
Limatura Chalybis, 632.
 — Ferri, 632.
 — — alcoholisata, 632.
 — — depurata, 632.
 — — praeparata, 632.
 — — puri, 632.
 — — purificata, 632.
 — Martis, 632.
 — — alcoholisata, 632.
Limatura Martis depurata, 632.
 — — praeparata, 632.
 — — purificata, 632.
 — — Stanni, 11. 590.
 — — puri, 11. 590.
Limontata alcoholica, 87.
 — Cremoris Tartari solubi-
 — lis, 11. 405.
 — — emetica, 242.
 — — haemastica, 54.
 — — laxatica, 11. 411.
 — — mineralis, 54.
 — — nitrica, 47.
 — — phosphorica, 50.
 — — sicca, 31. 541.
 — — stibiata, 242.
 — — sulphurica, 54.
 — — tartarica, 59.
 — — vegetabilis, 59. 540.
 — — vinosa, 11. 676.
Limonium, 320.
Limonium, 320.
Linaria, 11. 73.
 — Cymbalaria, 600.
 — spuria, 11. 73.
 — vulgaris, 11. 73.
Linctus acidus, 63. 600.
 — albus, 187.
 — amygdalinus, 42.
 — antisiphiliticus, 11. 201.
 — aperiens, 11. 100.
 — ad aphthas, 11. 581.
 — de Borace, 11. 581.
 — camphoratus, 373.
 — Cetacei, 455.
 — communis, 455. 11. 467.
 — compositus, 11. 266.
 — demulcens, 187.
 — emeticus, 248.
 — emolliens, 187.
 — expectorans, 26. 11. 542.
 — gelatinosus nutrens, 582.
 — ad gingivas, 11. 230.
 — de Haen, 430.
 — luxans, 430.
 — leniens, 11. 252. 651.
 — mannatus, 11. 100.
 — Mesembryanthemi crystal-
 — lini, 11. 207.
 — Olei Terebinthinae, 11. 632.
 — oleosus, 187.
 — Oxymuriatis calcici, 356.
 — pectoralis, 11. 12. 209.
 — Phosphori, 11. 320.
 — purgans, 733.
 — refrigerans, 454. 11. 392.
 — saponaceus, 11. 416.
 — saponato — hydrosulphura-
 — tum, 11. 376.
 — saponatus, 11. 416.
 — ad stomachacem, 356. 511.
 — subadstringens, 445.
 — vermifugus, 11. 665.
Lingua Avis, 673.
 — Bovis, 192.
 — cervina, 11. 544.
 — serpenteria, 11. 245.
Linimentum Absinthii, 8.
 — Acetatis Cupris cuprici, 582.
 — aceticum, 11. 419.
 — acidum, 34.
 — Aerginis, 582.
 — aetherum, 11. 53. 419.
 — aethericum, 11. 419.
 — album, 453.
 — Albuminis Ovi, 11. 300.
 — aluminum, 11. 382.
 — aluminosum, 138. 139.
 — ad ambustiones, 353.
 — — cum Opio, 354.
 — Ammoniacae, 154.
 — ammoniac. c. Canthar. 403.
 — — camphorat., 154. 167.
 — — compositum, 166.
 — ammoniacatum, 154.

Linimentum ammoniacat. mixtum — Liquor Ammonii subcarb. aquos. 781

Linimentum ammoniacat. mixtum, 167.
 — Ammoniaci Gummi, 720.
 — Ammoniae, 154.
 — et Antimonii tartaricati, 243.
 — Subcarbonatis, 167.
 — ammoniato-aethereum, 159.
 403.
 — aromaticum, 159. 403.
 — camphoratum, 154.
 — terebinthinat., II. Add.
 — cum Camphora, 154.
 — ammonicum, 154.
 — Ammonii foetidum, 155.
 — opiatum, 155.
 — ammoniatum, 154.
 — Ammoniiuret Mercurii, II. 190.
 — Amygdalarum, 182.
 — contra anginam, 180.
 — Anglicanum, 154.
 — anodynum, 155. II. 250. 257. 258. 419.
 — et resolvens, 751.
 — antarthriticum, 155. 168. 308. II. 535.
 — antihelminticum, 554.
 — antihæmorrhoidale, 452. 757. II. 73. 621.
 — antiherpeticum, 637.
 — antiherpticum, II. 316.
 — antiophthalmicum, 642. II. 327.
 — antipleuriticum, II. 420.
 — antipsoricum, 354.
 — antirheumaticum, II. 633.
 — antispasmodicum, II. 250.
 — antispasticum, 155.
 — antivenericum, II. 135.
 — aphrodisiacum, 309.
 — ad aphthas, II. 581.
 — ex Aqua s. Aquæ Calcis, 353.
 — aromaticum, II. 60.
 — stimulant, II. 479.
 — arsenicale, 272.
 — ad arthrodynam, 408.
 — Balsami Peruviani, 308
 — baryticum, 317.
 — Boracis, II. 581.
 — de Borate, II. 581.
 — boraxatum, II. 581.
 — calcareum, 353.
 — Calcariae sulphuratae, 355.
 — calcicum, 353.
 — cum Opio, 354.
 — Calcis, 353.
 — Camphoræ compositum, 159. 155.
 — camphorato-ammoniatum, 154. et Add.
 — opiaceum, 378.
 — saponatum, 378.
 — camphoratum, 378.
 — compositum, 155.
 — opiaceum, II. 257.
 — Cantharidum, 404.
 — camphoratum, 403.
 — Cepae, 90.
 — cuprosum, 592.
 — digestivum, II. 621.
 — diureticum, II. 635. 631.
 — gastro — scilliticum, II. 535.
 — emolliens, 180.
 — epilorium, 209.
 — excitans, 478. II. 42. 536. 224. 255.
 — aethereum, 403.
 — aromaticum, 403.
 — camphoratum, 403.
 — terebinthinat., 403.
 — ex Felle Tauri, 631.

Linimentum farinaceum cum Pice, II. 330.
 — gingivale, 34. 443.
 — mundificans, II. 228.
 — roborans, 443.
 — gummoso balsamicum, 310.
 — Hydrargyri, II. 135.
 — hydrargyro-acetosum, II. 209.
 — incitans, 375.
 — irritans, 403. 159.
 — saponaceum, 403.
 — juniperinum, II. 42.
 — leniens, 378.
 — ad mamillas, 310.
 — mercuriale, II. 124.
 — ammoniacale, II. 135.
 — camphoratum, II. 135.
 — opiaceum, II. 135. 250. 264.
 — muriaticum, 34.
 — narcoticum, II. 250.
 — Nicotianæ, II. 238.
 — nigrum, 344.
 — oleo calcareum, 353.
 — opiatum, II. 354.
 — ophthalmicum, 642.
 — opiaceum, 264.
 — camphorat., II. 250.
 — opiato-camphoratum, II. 250.
 — saponac., 250.
 — opiatum, II. 255. 419.
 — et saponaceum, II. 250.
 — Petrolei, II. 317.
 — ammoniatum, 154.
 — phosphoratum, II. 321.
 — camphoratum, II. 321.
 — plumbatum, II. 344.
 — psoricum, 605.
 — resinoso-terebinthinatum, II. Add.
 — resolvens, 155. 167. 310. 356. 372. 408. 631. II. 633.
 — et diureticum, II. 42.
 — rubefaciens, 403. II. 571.
 — saponaceum, 156. II. 417. 418.
 — camphoratum, II. 419.
 — compositum, 156.
 — saponato-ammoniat., 156.
 — camphoratum, 156. II. 418.
 — Saponis, II. 418. 420.
 — aethereum, II. 419.
 — camphoratum, 156. II. 258. 418.
 — compositum, 156. II. 258. 418.
 — et Opii s. cum Opio, II. 258. 419.
 — rubefaciens, 403.
 — saturnino-quecinum, II. 352.
 — sedans, 755. II. 250.
 — aethereum, 260.
 — sedativum, 755. II. 264.
 — camphoratum, II. 257.
 — simplex, 251.
 — spirituosum, 166.
 — anodynum, II. 258.
 — stimulant, 400. II. 679.
 — stomachicum, II. 479.
 — ad strumam, II. Add.
 — Subboratis Sodæ, II. 581.
 — de Sulphure, II. 601.
 — sulphurico-terebinthinatum, II. Add.
 — sulphuro-saponaceum, II. 575.
 — Superacetat. Plumbi comp. II. Add.

Linimentum Tabaci, II. 238.
 — Terebinthinae, II. 633.
 — aethereum, II. 628.
 — terebinthinum, II. 633.
 — terebinthino-ammoniatum, 156.
 — contra tineam, 155.
 — vermifugum, II. 614.
 — volatile, 154.
 — cum Camphora, 154.
 — camphoratum, 154.
 — Linum, II. 74.
 — catharticum, II. 74.
 — purgativum, II. 74.
 — usitatissimum, II. 73.
 — Liquamen Martis, 663.
 — Myrrhae, II. 229.
 — Salis Tartari, II. 380.
 — Liquidambar, II. 595.
 — imberbis, II. 595.
 — orientale, II. 591.
 — styraciflua, II. 595.
 — Liquiritia, II. 70.
 — cocta citrina, II. 80.
 — officinalis, II. 76.
 — Liquiritiæ Succus crudus, II. 77.
 — depuratus, II. 77.
 — Liquor Acetatis Ferri aetherei, 660.
 — ammonici, 173.
 — calici, II. 390.
 — Plumbi basici, II. 340.
 — Acidi muriatici oxygenati, 510.
 — oxalici, II. Add.
 — acidus Halleri, 56.
 — phosphoricus purus — Acid. Phosphori.
 — adstringens, II. 602.
 — Aeris cinnamomatus, 585.
 — Aeruginis, 587.
 — aethereus martialis nitrificus, 652.
 — oleosus, 76.
 — sulphuricus, 75.
 — Aetheris nitrosus, 73.
 — Alkali acetici nigri, II. 399.
 — volatilii acetici, 174.
 — compositus, 180.
 — alexiterius acetatus, 21.
 — extemporalis, 511.
 — extemporaneus, 511.
 — oxygenatus, 510.
 — Aluminis compositus, 139. II. 602.
 — ex Ammonia et Oleo Sacchini, 158.
 — ammoniaco-mercurialis, II. 200.
 — ammoniacalis cum Aceto, 173.
 — Ammonias, 144.
 — Acetatis, 173.
 — anisatus, 149.
 — carbonicae, 161.
 — purae, 144.
 — spirituosus, 148.
 — Subcarbonatis, 161.
 — subcarbonicae, 161.
 — ammoniato-stibiatas, 181.
 — Ammonii, 144.
 — acetici, 173.
 — anisatus, 149.
 — carbonici, 161.
 — aquosus, 161.
 — pyro-oleosi, 163.
 — caustici, 144.
 — foeniculatus, 149.
 — hydrothiodic., 172.
 — oxalici, 179.
 — puri, 144.
 — pyro-oleosi, 163.
 — succinici, 179.
 — subcarbonici aquosus, 161.
 49 *

Liquor Ammonii succinici, 179.
 — sulphurati, 172.
 — Sulphureti, 172.
 — tartarici, 181.
 — vinosus, 148.
 anodynus animalis, 74.
 — martialis, 655.
 — mineralis, 75.
 — Hoffmanni, 75.
 — aquosus, 70.
 — martialis, 655.
 — succinatus, 11. 599.
 — topicus, 166.
 — Trilleri, 166.
 — vegetabilis, 69.
 — de Vicat, 151.
 antarthriticus Elleri, 181.
 — de St. Marie, 181.
 antimiasmaticus, 590.
 — Beisseri s. Koechlini, 590.
 — Labarraquii, 356.
 Antimonii tartarisatus, 339.
 — tartarisati, 339. 246.
 antiophthalmicus, 249.
 antiplilgoticus, 23.
 antipneucicus, 273.
 antiscrophulosus Njeman-
 ni, 208.
 — antispasmodicus, 37. 180.
 181.
 — antisiphiliticus, 11. 170.
 — Chausseri, 11. 189.
 antiveneurus, 11. 179.
 — Roueni, 11. 518.
 aperitivus, 11. 410.
 ad apthas, 11. 581.
 Argenti muriatico-ammo-
 niati, 263.
 — nitrici, 261.
 — sulphurici, 263.
 aromaticus saponato-am-
 moniatus, 166.
 — Arsenialis Potassae, 273.
 — arsenicalis, 273.
 — Fowleri, 273.
 — Arsenici alba, 270.
 arthriticus Elleri, 181.
 — Pottii, 11. 633.
 Auri muriatici, 208.
 — auricularis, 310.
 balsamico-aromaticus, 11.
 481.
 Barytae aceticae, 11. Add.
 — Muriatis, 315.
 — muriaticae, 315.
 — nitricae, 318.
 baryticae, 316.
 Beisseri, 590.
 Bellosii, 11. 195.
 Calcariae chloratae, 356.
 — muriaticae, 367.
 — sulphuratae, 355.
 — sulphuricae, 366.
 Calcis, 352.
 — Muriatis, 367.
 — oxymuriaticae, 356.
 Camphorae artificialis, 11.
 633.
 Carbonatis Ammoniae, 161.
 — ammonici, 161.
 — cum Oleo empy-
 reum, 163.
 — kalici, 11. 320.
 catharteticus, 587.
 Chloroti Stibii, 235.
 Chlori, 510.
 — extemporaneus, 511.
 Ciner. clavellat. depurat,
 11. 382.
 — ad condylomata, 11. 179.
 187.
 Cornu Cervi alcalinum, 163.
 — succinatus, 179.

Liquor Cornu Cervi succinatus
 — albus, 179.
 — tartarisatus,
 181.
 — — terebinthina-
 tus, 173. 174.
 — volatilis, 163.
 — Cupri ammoniacalis, 539.
 — ammoniati, 539.
 — ammoniato-s-ammo-
 nio-muriatici, 590.
 — sulphurici — Reag.
 — sulphurico-ammonia-
 ti, 539.
 — cuproso-mercurialis, 591.
 — Deutchloruret. Mercurii,
 11. 177.
 — digestivus Boerhaavii, 11.
 399.
 — discutiens, 23.
 — diureticus, 211.
 — enixus, 169.
 — excitans, 158.
 — exsutorius, 403. 404.
 — febrifugus, 649.
 — Ferri alcalini, 644.
 — muriatici oxydati, 11.
 654.
 — — oxydul., 653.
 — saliti, 653.
 — sulphurici, 648.
 — fumans Boylei, 172.
 — Libavii, 11. 592.
 — ad gangraenam, 171.
 — ad gingivas, 200.
 — Gypsi, 306.
 — Hoffmanni anod., 75.
 — Hydrargyri ammoniati, 11.
 200.
 — — camphorati, 11. 179.
 — — muriatici corrosivi,
 11. 177.
 — — nitrici, 11. 195.
 — — oxydati, 11. 198.
 — — oxydulati, 11. 195.
 — — Oxymuriatis, 11. 178.
 — — hydrargyro-aceticus, 11.
 206.
 — Hydratis kalici, 11. 370.
 — — natrici, 11. 574.
 — Hydrogeni sulphuratus, 43.
 — hydrosulphuratus pro bal-
 neo, 44.
 — hydrosulphuretico-acidu-
 lus, 43.
 — hydrosulphuricus pro bal-
 neo, 44.
 — Kali acetici, 11. 399.
 — — nigri, 11. 399.
 — — cum Rho, 11. 402.
 — — carbonici, 11. 380.
 — — caustici, 11. 370.
 — — ferreo-borussici, 38. 39.
 — — ferruginoso-hydro-
 cyanici, 38. 39.
 — — oxalici, 11. Add.
 — — subcarbonici, 11. 380.
 — Koechlini, 590.
 — Lithargyri Acetatis, 11. 340.
 — — comp., 11. 342.
 — de Lamotte, 655.
 — Magnesia sulphuricae, 11.
 92. et Add.
 — — martialis, 655.
 — — mercurialis, 11. 177. 196.
 — Mercurii ammoniati, 11. 200.
 — — nitrosi, 11. 195.
 — — calore paratus, 11.
 195.
 — — dilutus, 11. 105.
 — — frigore paratus,
 11. 195.
 — — sublimati corrosivi,
 11. 177.
 — Mindereri, 173.

Liquor Mindereri fortior, 173.
 — tenuior, 173.
 — muriatico-hydrargyro-cu-
 pricus ammoniacalis, 591. 11.
 201.
 — Muriatis deuterydo-hy-
 drargyro-calcarei, 11. 144.
 — Ferri, 654.
 — Hydrargyri, 11. 177.
 — — hydrargyro-ammo-
 niacalis, 11. 200.
 — Myrrhae, 11. 229.
 — — alcalisatus, 11. 229.
 — Natri carbonici, 11. 578.
 — — caustici, 11. 574.
 — — chlorici, 11. 577.
 — — hydroiodinici, 11. Add.
 — — muriatici, 11. 577.
 — — ad nephritidem calculo-
 sam, 11. 310.
 — — nervinus, 655.
 — — Bangii, 375.
 — — Pereboomii, 11. 635.
 — Nitris Hydrargyri, 11. 195.
 — — hydrargyrici, 11. 198.
 — — hydrargyrosi, 11. 195.
 — — nitrico-aethereus martia-
 lis, 652.
 — — ad odontalgiam, 11. 195.
 — — odontalgicu., 11. 105.
 — — Olei animalis et Cajaputi,
 347.
 — — oleosus Sylvii, 151.
 — — ophthalmicus, 591.
 — — anodynus, 11. 653.
 — — deterisivus, 11. 652.
 — — roborans, 110.
 — — ad pannum oculorum con-
 sumendum, 594.
 — — ad periones, 11. 343.
 — — Plumbi muriatici, 11. Add.
 — — Plumbi Acetatis, 11. 346.
 — — acetici, 11. 350.
 — — — basici, 11. 340.
 — — Subacetatis, 11. 340.
 — — dilutus, 11. 342.
 — Potassae, 11. 370.
 — — Arsenicae, 273.
 — — causticae, 11. 370.
 — — Subcarbonatis, 11. 380.
 — — probatorius Hahnemanni,
 43.
 — — Moeglingii, 370.
 — — Vini, 270.
 — — Wirtembergicus, 270.
 — — ad pterygium, 594.
 — — pyrotartareus, 11. Add.
 — — pyrotartaricus, 11. Add.
 — — resolvens, 11. 128. 402.
 — — Sacchari Saturni, 11. 350.
 — — salinus laxativus, 11. 92. 410.
 — — Salis Alcali vegetabilis
 acetati, 11. 399.
 — — amari, 11. 92. et Add.
 — — Ammoniaci anisatus,
 149.
 — — fixi, 11. 367. et Add.
 — — communis, 11. Add.
 — — essentialis Tartari, 11.
 Add.
 — — mirabilis Glauberi, 11.
 Add.
 — — Sodae purissimi, 11.
 Add.
 — — Tartari, 11. 350.
 — — perfectesaturati, 11.
 Add.
 — — purissimi, 11. Add.
 — — Saponis stibii, 233.
 — — scilliticus, 11. 402.
 — — Sodae concentratae, 11. 574.
 — — oxymuriaticae, 11. 577.
 — — Spangenbergii, 11. 185.
 — — splenicus ex Tartaro, 11.
 401.

- Liquor Stanni muratici**, II. 692.
 — stibiatus cum Aconito, 61.
 — Stibii muratici, 235.
 — stypticus, 132. 654.
 — Weberi, 460.
 — Subacetatis Lithargyri, II. 340.
 — Plumbi s. plumbici, II. 340.
 — Subichloreti Ferri, 654.
 — Subcarbonatis Ammoniacae, 161.
 — Succinatis ammoniaci s. Ammonii, 179.
 — succinicus anodynus, II. 599.
 — Sulphatis calcarei, 356.
 — — Zinci aluminosus, II. 692.
 — Sulphureti Ammoniacae, 172.
 — Swietenii, II. 178. 200.
 — sphyiliticus Swietenii, II. 178. 200.
 — — Turnerii, II. 178.
 — Tartari emetici, 218. 241.
 — — solubilis, II. 413.
 — — chalybeati, 669.
 — — stibiatii, 240. 241.
 — — tartarizati, II. 405.
 — — vegetabilis, II. 399.
 — — vitriolati, II. 387.
 — Tartaratis ammoniaci, II. 181.
 — Terrae foliatæ, II. 399.
 — — — Tartari, II. 399.
 — — — spirituosus, II. 401.
 — — ponderosæ salitæ, 315.
 — — tonicus, 142.
 — Trillerii, 166.
 — ad ulcera atonica, II. 397.
 — — faucium, II. 230.
 — — oris, 583.
 — ad unguem oculorum consumend., 694.
 — — vegeto-mineralis de Prasavin, II. 205.
 — Vini probatorius Hahemannii, 43.
 — — visceralis, 662.
 — Vitrioli coerulei, II. Add.
 — — Martis, II. Add.
 — — — oxydati, II. Add.
 — volatilis Cornu Cervi, 163.
 — vulnerarius, II. 628.
 — — mineralis, 686.
 — — vegetabilis Dippelii, II. 210.
Liriodendron tulipifera, 473. II. 84.
Liryngium, 623.
Lithagrostis, II. 49.
Lithargyrium, II. 334.
Lithargyrus, II. 334.
Lithargyrum, II. 334.
Lithargyrus, II. 334.
Lithontripcticum Tulpii, 402.
Lithospermum, II. 84.
 — officinale, II. 84.
Litus acidus, 34.
 — ad hæmorrhoides, 757.
 — Hydrargyri, II. 186.
Lixiva pura, II. 371.
 — — liquida, II. 370.
Lixivia acetata, II. 398.
 — — caustica, II. 370.
 — — purificata, II. 378.
 — — tartarizata, II. 404.
 — — vitriolata, II. 386.
Lixivium Alkali vegetabilis, II. 380.
 — — ammoniacale, 144.
 — — — anisatum, 149.
 — — — aromaticum, 151.
 — — — causticum, 144. II. 674.
- Lixivium ammoniacale visum**, 148.
 — — causticum, II. 370.
 — — — minegale, II. 674. et
 Add.
 — — — vegetabile, II. 370.
 — — juniperinum, II. 330.
 — — cum Junipero, II. 330.
 — — Kali vegetabilis, II. 330.
 — — lithontripcticum Sander-sii, II. 373.
 — — — magistræ, II. 370.
 — — Martis, 653.
 — — Potassæ puræ magistræ, II. 370.
 — — — Matris Salis marini, 367.
 — — sanguinis, 38.
 — — Saponariorum, II. 674.
 — — Sodæ, II. 674.
 — — — puræ, II. 674.
 — — Tartari, II. 390.
Lobaria pulmonaria, II. 64.
Lobelia, II. 84.
 — — inflata, II. 84.
 — — sphyilitica, II. 84.
Lonchitis, II. 544.
Lonicera Pelecymentum, 411.
Looch adstringens, 86. 445.
 — — album, 187.
 — — Amygdalarum, 187.
 — — amygdalinum, 187.
 — — Amyli, 445.
 — — cum Amygd., 445.
 — — anisatum, 208.
 — — anthelminticum, 522.
 — — ad asthma, II. 535.
 — — antiasthmaticum, 721.
 — — anticatarrhale, 71.
 — — antisphyiliticum, H. 201.
 — — balsamicum, I. 310.
 — — bechicum, 609.
 — — Brassicæ rubræ, 333.
 — — camphoratum, 373.
 — — commune, 187. 465.
 — — compositum, II. 206.
 — — crocatum, II. 654.
 — — demulcens, 187.
 — — emolliens, 187.
 — — emeticum, 245.
 — — expectorans, 29. 228. 231. 249. 730. II. 604.
 — — — Rafaræ, 630.
 — — — Glacialis, II. 207.
 — — — Gordoni, 333.
 — — — gummoso-oleosum, 187.
 — — — gummosum, 731.
 — — — Japonicum, 445.
 — — — kermeticum, 228.
 — — — laxans, 513.
 — — — leniens, 456. II. 76. 252.
 — — — — balsamicum, II. 618.
 — — — de Manna, II. 100.
 — — — Mannæ, II. 100.
 — — — Metembryanthemi cryst., II. 207.
 — — — oleosum, 137.
 — — — Ovorum, 188.
 — — — Oxymuriatis calcici, 356.
 — — — pectorale, 187. 363. 730. II. 209. 636. 642.
 — — — — leniens, 188. 729.
 — — — pulmonale, 208. II. 82.
 — — — de pulmone vulpis, 208. II. 82.
 — — — purgans, 733.
 — — — refrigerans, II. 392.
 — — — rubrum, 188.
 — — — sanum et expertum, II. 81.
 — — — saponaceum, II. 416.
 — — — saponatum, II. 416.
 — — — saponicum, II. 416.
 — — — de Scilla, II. 535.
 — — — simplex, 187. 731. II. 654.
 — — — contra stomacacem, 366.
- Looch terebinthinatum**, II. 618. 631.
 — — contra tussim, II. 252.
 — — vermifugum, II. 665. 743.
 — — viride, II. 664.
 — — vomitivum, 215.
Lopezia racemosa, II. 436.
Lugo acida, 48.
 — — adstringens, 86. II. 348. 352. 666.
 — — — alcoholica saponacea, II. 417.
 — — — alcoholisata, 953.
 — — — anodyna, U. 310.
 — — — antispasmodica, 34. II. 168.
 — — — astrachitica Bonhomii, II. 350.
 — — — antiseptica, 493. II. 350.
 — — — e Cupro et Zinco compo-sita, II. 686.
 — — — excitans, 242. 608. II. 684.
 — — — exsiccans, II. 186.
 — — — ad hæmorrhoides, 757.
 — — — helleborata, 740.
 — — — Hydrargyri, II. 143. 477.
 — — — lutea, II. 144.
 — — — hydrocyanica, 37.
 — — — hydrosulphurata, 44.
 — — — mercurialis, II. 177.
 — — — — Alberti, II. 477.
 — — — — Many, II. 198.
 — — — Nicotianæ, II. 337.
 — — — contra perniones, 160. II. 381.
 — — — phagedæmica, II. 230.
 — — — plumbata, II. 343.
 — — — Plumbi composita, II. 186.
 — — — Quercus saturnina, II. 352.
 — — — resolvens, II. 243.
 — — — ad rheumatismum, II. 633.
 — — — saurina, II. 343.
 — — — sedativa, II. 310.
 — — — e Staphisagria, 608.
 — — — sulphuro-saponacea, II. 605.
 — — — Tartari stibiatii, 242.
 — — — terebinthinata, II. 628.
 — — — ad tineam, 353. II. 674. 684.
 — — — Veratri mercurialis, II. 158.
 — — — e Veratro, 740.
 — — — vinosæ, II. 670.
 — — — e Zinco et Cupro compo-sita, II. 686.
Lotus ad hæmorrhoides, 157.
 — — odorata, II. 106.
 — — — ad rheumatismum, II. 633.
 — — — urbana, II. 106.
Lucii maxillæ præparatae, 359.
 — — — Nicis mandibula, 364.
Lujula, 16.
Lumbricus terrestris, 682.
Lunaria, II. 86.
 — — — Botrytis, II. 86.
Lupinus, II. 86.
 — — — albus, II. 86.
Lupulina, II. 86.
Lupulinum, II. 86.
Lupulus, II. 86.
Lybisticum, II. 71.
Lycoperdon Bovista, 333.
Lycopersicum, II. 586.
Lycopodii semen s. sulphur. II. 87.
Lycopodium, II. 87.
 — — — annotinum — A. clavat.
 — — — clavatum, II. 87.
 — — — complanatum — C. clavat.
Lyringium, f. Lyringium.
Lysimachia lutea, II. 87.
 — — — Nummularia, II. 87.
 — — — purpurea, II. 497.
 — — — vulgaris, II. 87.
Lythargyrum, f. Lithargyrum.
Lythrum Salicaria, II. 497.
Lytta coerulea, 399.
 — — Gigas — Cantharis.

Lytta vesicatoria, 399.
— vittata — *Cantharis*.

M.

Macis, II. 224.
Madrepora oculata, 357.
Magisterium Antimonii diaphor-
ret., 215.
— *Bismuthi*, 329.
— *Gordiliorum*, 359.
— *Gummi Guttae* — *G. Gut-*
tae praep.
— *Jalapae*, II. 28.
— *Marcasitae*, 329.
— *Margaritarum*, 359.
— *Matris Perlarum*, 359.
— *Oculorum Cancrorum*, 359.
— *Saturni*, II. 337.
— *Sulphatis Ferri*, 642.
— *Sulphuris*, II. 600.
— *Tartri purgans*, II. 398.
— *Vitrioli Martis*, 642.
— *Zinci*, II. 685.
Magistrantia, II. 1.
Magma scytodepsicum ex Quer-
cu, II. 352.
Magues, 638.
— *arsenicalis*, 270.
Magnesia — *M. pura*.
— *aerata*, II. 88.
— *alba*, II. 88.
— *genuina*, II. 88.
— *calcinata*, II. 88.
— *usta*, II. 88.
— *carbonica*, II. 88.
— *venalis*, II. 88.
— *cretosa*, II. 88.
— *dulcis*, II. 88.
— *Edimburghensis*, II. 88.
— *effervescent.*, II. 88.
— *hydrochlorica*, II. 91.
— *mitis*, II. 88.
— *nigra*, II. 98.
— *Niri*, II. 88.
— *nitrica*, II. 88.
— *opalina*, 212.
— *phosphorica*, II. 92.
— *pura*, II. 88.
— *Salis amari*, II. 88.
— *Ebshamensis*, II. 88.
— *Epsomensis*, II. 88.
— *silicica*, II. 95.
— *stibiata*, 243.
— *subcarbonica*, II. 88.
— *sulphurica*, II. 92.
— *cruda*, II. 92.
— *depurata*, II. 92.
— *usta*, II. 88.
— *vitriariorum s. vitriarior.*
II. 93.
— *vitriolata*, II. 92.
— *depurata*, II. 92.
Magnesiae Subcarbonas, II. 88.
Magnesium, II. 88.
— *oxydatum nativum*, II. 98.
— *nigrum*, II. 98.
Magnolia glauca, II. 95.
Mahagoni, II. 608.
Majorana, II. 295.
Mala insana, II. 586.
— *Lycopersica*, II. 586.
— *Punica*, II. 426.
Malabathrum, 380.
Malas Ferri, 660.
— *Protoxydi*, 660.
Malicorium, II. 427.
Malthum, II. 95.
— *Hordei*, II. 95.
Maltum, II. 95.
— *Hordei*, II. 95.
Malucorium, II. 427.
Malum citreum, 636.
— *insanum*, II. 586.
— *Lycopersicum*, II. 586.

Malum Punicum, II. 426.
Malus communis, II. 368.
Malva, II. 96.
— *Alcea*, 80.
— *arbores*, II. 96.
— *hortensis*, II. 96.
— *minor*, II. 96.
— *rosea*, II. 96.
— *rotundifolia*, II. 96.
— *sylvestris*, II. 96.
— *vulgaris*, II. 96.
Malvaviscum, 119.
Manati lapis, 364.
Mandibula Lucii Piscis, 364.
Mandragera, 297.
Manganesium, II. 98.
— *ochraceum nigrum*, II. 98.
— *oxydatum*, II. 98.
— *nativum*, II. 98.
Manganum, II. 98.
— *hyperoxydatum*, II. 98.
— *oxydatum nativum*, II. 98.
Maniguetta, 206.
Mangostana Cambog. — *Garcinia*.
Manna, II. 98.
— *Alhagi*, II. 99.
— *brigitina*, II. 99.
— *Calabrina*, II. 99.
— *canaliculata*, II. 98.
— *canellata*, II. 98.
— *cannulata*, II. 98.
— *communis*, II. 99.
— *electa*, II. 99.
— *di fronde*, II. 99.
— *Gerace*, II. 99.
— *granulosa*, II. 99.
— *grassa*, II. 99.
— *in lacrymis*, II. 99.
— *lacrymata*, II. 99.
— *laricina*, II. 99.
— *liquida*, II. 100.
— *longa*, II. 98.
— *metallorum*, II. 155.
— *Persica*, II. 99.
— *pinguis*, II. 99.
— *sordida*, II. 99.
— *in sortis*, II. 99.
— *spissa*, II. 99.
— *tabulata*, II. 409.
— *tartarisata*, II. 409.
Mannita, II. 99.
Maranta arundinacea, 268.
— *Galanga* — *Alpinia*.
— *Indica*, 268.
Marathrum, 195.
Marcasita, 329.
— *argentea*, 329.
Marchantia polymorpha, 743.
Margaritae, 358.
— *praeparatae*, 359.
Marmelada adstringens, II. 637.
— *antinephretica*, II. 620.
— *expectorans*, 229.
— *febrifuga*, 458. II. 632.
— *de Haen*, II. 19.
— *Iridis*, II. 430.
— *mercurialis*, II. 124.
— *pectoralis*, II. 12. 663. 695.
— *purgans*, 733.
— *Tronchini*, 430.
— *de Zanetti*, 229.
Marmor album, 357.
— *calcareum*, 357.
— *praeparatum*, 360.
— *salinum*, 357.
— *saccharoides*, 357.
Marrubium album, II. 102.
— *foetidum*, 302.
— *nigrum*, 302.
— *vulgare*, II. 102.
Mars, 632.
— *solubilis*, 663.
— *vitriolata*, 648.
Martia, II. 676.
Martis limatura, 632.

Martum, II. 644.
— *Syriacum*, II. 644.
— *verum*, II. 644.
— *vulgare*, II. 648.
Massa Althaeae, 729.
— *pro fornice odorifera*, 325.
— *ad furnacem*, 325.
— *de Gummi Arabico*, 729.
— *Liquiritiae alba*, II. 79.
— *fusca*, II. 80.
— *odontalgica*, II. 104.
— *Pilularum e Cynoglossio*, II.
273.
— *hydragogarum Jani-*
ni, II. 165. et Add.
— *contra obstructions*
Halensis, II. Add.
— *polychrest. balsami-*
car., II. 112 et Add.
— *resolv. Schmuckeri*, II.
Add.
— *Ruffii*, II. 111. et Add.
— *scilliticarum*, II. 533.
— *de Succino Cratonis*,
104.
— *visceral. Kaempffii*, II.
Add.
Massicot — *Minium*.
Masticatorium excitans, II. 428.
Mastiche, II. 103.
Mastichina, II. 99.
— *Gallorum*, II. 648.
Mastix, II. 103.
Mater Margaritarum, II. 358.
— *Perlarum*, 358.
— *praeparata*, 359.
Materia perlata Kerkringii, 215.
Matonica Cardamomum, 416.
Matricaria, II. 105.
— *Chamomilla*, 457.
— *Parthenium*, II. 105.
Matrisylva, 292.
Maxillae Lucii praeparatae, 359.
Mays, II. 681.
Mechoacanana, II. 105.
— *alba*, II. 105.
— *nigra*, II. 22.
Meconas Sodae, II. 586.
— *Sodii Protoxydi*, II. 586.
Meconium, II. 246.
Medulla bovilla, 63.
— *saxorum*, 131.
Mel, 248.
— *Aceti*, 22.
— *colchitici*, 552.
— *Scillae*, II. 541.
— *album*, 248.
— *anthosatum*, II. 478.
— *Armoraciae*, II. 438.
— *Boracis*, II. 531.
— *boraxatum*, II. 581.
— *Chelidonii*, 468.
— *Colchici*, 551.
— *commune*, 248.
— *purum*, 248.
— *cupratum*, 532.
— *depuratum*, 248.
— *despumatum*, 248.
— *inspissat.*, 248.
— *flavum*, 248.
— *glycyrrhizatum*, II. 82.
— *hydrargyrum*, II. 126.
— *Hydargyri*, II. 158.
— *Liquiritiae*, II. 82.
— *mercuriale*, II. 121. 126. 148.
194.
— *Mercurialis annuae*, II. 121.
— *Mercurii dulcis*, II. 158.
— *Mororum*, II. 247.
— *e Muriae Hydargyri*, II.
158.
— *Ronismarini*, II. 478.
— *rosaceum*, II. 470.
— *Rosae*, II. 470.
— *Gallicae*, II. 470.

Mel Rosarum, II. 470.
 — rosatum, II. 470.
 — salutarium, II. 471.
 — de Rosis, II. 470.
 Rubi Idaei, II. 488.
 Sambuci Florum, II. 508.
 — Fructuum, II. 509.
 — Sanitatis, II. Add.
 Saponis, II. 416.
 Scillae, II. 536. 541.
 — acetatum, II. 611.
 — compositum, II. 537.
 — maritimae, II. 541.
 — scilliticum, II. 536.
 — compositum, II. 537.
 Subboratis Sodae, II. 581.
 Superacetatis Cupri, 582.
 terebinthinatum, II. 633.
 Vermium majalium, II. Add.
 — Violarum, II. 677.
 — virginum, 248.
Melaleuca Cajuputi, 347.
 — Leucadendron, 347.
Melampodium, 736.
Melanthium, II. 239.
Melia Azedarach, 302.
Melissa, 706.
Melilotus citrius, II. 106.
 — coeruleus, II. 106.
 — officinalis, II. 106.
 — vulgaris, II. 106.
Melissa Calamintha, II. 107.
 — citrata, II. 108.
 — citra, II. 108.
 — hortensis, II. 108.
 — humilis, II. 113.
 — Nepeta, II. 108.
 — officinalis, II. 108.
 — Turcica, II. 108.
Melissophyllum, II. 113.
Melitochorton, 741.
Melittis Melissophyllum, II. 112.
Mellago Graminis, 704.
 — Taraxaci, II. 616.
 — Tritici repentis, 704.
Mellitus Acetate Cupri, 582.
 — Aceti simplex, 22.
 — de Cupro acetatum, 582.
 — Mercurialis compos., II. 421.
 — Rosarum s. de Rosis, II. 470.
 — simplex, 248.
Melo, 679.
Meloe, II. 113.
 — majalis, II. 113.
 — niger — Cantharis.
 — Proscarabaeus, II. 113.
 — venicatorius — Cantharis.
Melongena, II. 586.
Menispermum lacunosum et M. Cocculus — Cocculus palmat. — palmatum — Cocculus palmat.
Menstruum Auri, 258.
 — pro essentia dulci, II. 402.
Mentha aquatica, II. 113.
 — arvensis, II. 113.
 — balsamica, II. 113.
 — Cataria, 411.
 — crispata, II. 114.
 — verticillata, II. 114.
 — equina, II. 114.
 — gentilis, II. 113.
 — longifolia, II. 114.
Menthastrum — Menthastrum.
 — piperita, II. 114.
 — Piperitidis, II. 114.
 — Pulegium, II. 425.
 — Romana, 303.
 — rotundifolia, II. 114.
 — rubra, II. 113.
 — Saracenica, 393.

Mentha sativa, II. 114.
 — sylvestris, II. 114.
 — folio rotundiore, II. 114.
 — verticillata, II. 114.
 — viridis, II. 114.
Menthastrum, II. 114.
Menyanthes trifoliata, II. 656.
Mephitis, 356.
 — barotica, 317.
 — hepatica, 42.
 — Plumbi, II. 336.
 — Sodae, II. 577.
Mercurialis, II. 121.
 — annua, II. 121. f.
Mercurius, II. 122.
 — acetatus, II. 203.
 — aceticus, II. 203.
 — alcalisatus, II. 127.
 — boraxatus, II. 190.
 — calcinatus ruber, II. 145.
 — causticus flavus, II. 191.
 — luteus, II. 191.
 — cinereus Blackii, II. Add.
 — corallinus, II. 145.
 — corrosivus flavus, II. 191.
 — ruber, II. 145.
 — sublimatus, II. 176.
 — cosmeticus, II. 199.
 — cum Creta, II. 127.
 — depuratus, II. 122.
 — dulcis, II. 165.
 — martialis, II. 167.
 — per viam humidam, II. 156.
 — emeticus flavus, II. 191.
 — flavus, II. 191.
 — gummosus Plenckii, II. 124.
 — hydrocyanicus, II. 189.
 — liquidus, II. 201.
 — cum Magnesia, II. 127.
 — mortis, 235.
 — muriaticus, II. 155.
 — muriatus corrosivus, II. 175.
 — niger Moscati, II. 142.
 — nitratus ruber, II. 145.
 — nitrosus, II. 194. 198.
 — alior, II. 195.
 — phosphoratus — Hydrarg. phosphoric.
 — praecipit. albus, II. 155. 199.
 — flavus, II. 191.
 — fuscus, II. 190.
 — Moscati, II. 142.
 — niger, II. 192.
 — ruber, II. 145.
 — per se, II. Add.
 — praeparat., II. 145.
 — venalis, II. 145.
 — Saundersi, II. Add.
 — viridis, II. 149.
 — Wurtzii, II. 170.
 — rectificatus, II. 152.
 — rediivivus Cinnabaris, II. 122.
 — ruber, II. 145.
 — saccharatus, II. 126.
 — cinereus Hahnem., II. 192.
 — solubilis Hahnemanni, II. 192.
 — Moretti, II. 143.
 — Moscati, II. 142.
 — sublimatus corros., II. 175.
 — venalis, II. 175.
 — dulcis, II. 155.
 — cum Sulphure, II. 138.
 — tartarisatus, II. 205.
 — terrestris, II. 316.
 — vitae, 213. 235.
 — vitriolatus, II. 193.
 — vivus, II. 122.
 — depuratus, II. 122.
 — rectificatus, II. 122.
Mesembryanthemum crystallinum, II. 207.

Mespilus, II. 207.
 — arbutifolius, 473.
 — Germanica, II. 207.
 — Oxyacantha, II. 207.
Metel, 604.
Metella, 604.
Metroxylon Sagu — Sagu.
Meum, II. 207.
 — athamanticum, II. 207.
 — Foeniculum — Foeniculum.
Mezereum, 602.
Mica Panis albi, II. 304.
Milium, II. 304.
 — Solis, II. 304.
Millefolium, II. 208.
Millepedas, Millepedes, II. 210.
 — praeparati, II. 211.
Milligrana, 744.
Mimosa Catechu, 441.
 — cinerea, II. 47.
 — Corinda, II. 47.
 — Nilotica, 15. 727.
 — Senegalensis, 752.
 — Unguis Cati, II. 71.
Minium s. Minium rubrum, II. 334.
Mirospermum toluiferum, 311.
Mistura, f. Mistura.
Miva, f. Mivatorum, 537. 599.
 — aromatica, 598.
Mixtura absorbens, 353. 368.
 — acida, 259. II. 388.
 — anodyna, II. 269.
Acidi muriatici, 34.
 — oxygenati, 511.
 — nitrici, 48.
 — phosphorici, 51.
 — acido-mineralis, 269.
 — astringens, 304. 444. 489.
 II. 71. 255. 467. 620.
 — aetherea, 76.
 — alba, 246. 721.
 — alcalina, II. 381.
 — aloetica, 110.
 — alterans, 242.
 — amara, II. 450.
 — cum Rheo, II. 450.
 — ammoniacalis, 719.
 — salina, 171.
Ammoniac, 719.
 — et Antimonii, 246.
Ammonii acetici, 176.
 — Liquoris, 177.
 — carbonici pyro-oleosi
 camphorata, 165. — compo-
 sita, 165. — caustici Liquoris, 147.
 — ex Ammonio muriatico,
 170.
 — Amygdalarum, 183.
 — analeptica, II. 299.
 — anodyna, 76. II. 251.
 — antacidia, II. 91. 578.
 — anthelmintica, 308. 522. II. 173. 317.
 — anthelmintico-incitans, II. 645.
 — antiacida, II. 91.
 — antiasthmatica, 221. II. 508.
 — — Swietenii, 164.
 — antiaphthosa, II. 299.
 — antiablenorrhagica, 304. 333.
 — anticatarrhalis, II. 539.
 — anticathartica, II. 226.
 — antidiarrhoica, 250. II. 224.
 — antidiysenterica, 38. 242. 497.
 — antiepileptica, 166.
 — antifebrilis, 488.
 — antigonorrhoeica, 304.
 — antihæmorrhagica, 54. 684.
 — antihæretico-diaphoretica, 61.
 — antihydrica, 410.
 — antilictica, II. 400.

- Mistura antilethargica; II. 252.
- antiplasmatica, 591.
 - antiododynamica, II. 270.
 - antidontalgica, 425. II. 270.
 - antiperiodica, 488-489.
 - antiphlogistica, II. 394.
 - antiphthorica, 610.
 - antipsorica, 637.
 - antiscabiosa, 637.
 - antispasmodica, 76. 105.
- 180.
- et diuretica, 77.
 - resolvens, 77.
 - simplex, 69.
- antisiphilitica, 583. II. 172.
- de Haen, II. 184.
- antivomitiva, 5.
- aperiens, 246.
 - ad aphthas, II. 299.
- Aqua Lauro-Cerasi, 40.
- aromatica, 398.
 - Assae foetidae. Assae foetidae, 284. pro clysmate, 283.
 - balsamica, II. 619.
 - bechica, 719.
 - boraxata, II. 381.
 - cum Calomelle, II. 198.
 - Camphorae, 373.
 - e Camphora cum Aceto, 374.
 - camphorata, 373.
 - aetherea, 376.
 - camphorata spirituosae, 376.
 - camphorica, 377.
 - Carbonatis Calcis comp., II. Add.
 - Potassae stomachica, II. 383.
 - cardiaca, 385-393.
 - carminativa, 210. II. 456.
 - Castorei aetherea, 439.
 - ammoniaco-spirituosae, 439.
 - cathartica, 299.
 - cathartica Arabica, III. 530.
 - cerea, 269.
 - Chelidonii, 468.
 - Chinae phosphorata, II. 391.
 - Gentiae, 516.
 - Ginehonae officinae, II. Add.
 - citro-muriatica, II. 576.
 - e Corio, 516.
 - Cornu Cervi, 729.
 - cervini, 729.
 - ustri, 729.
 - cretaea, 363.
 - Cretae, 363.
 - Cupri ammonio-muriatici, 591.
 - demulcens, II. 496.
 - ammoniacalis, 171.
 - depressans, 40. 613.
 - et valde diuretica, 613.
 - et expectorans, 614.
 - desobstruens, II. 402-406.
 - detergens, II. 473.
 - diaphoretica, 166. 176. 576.
 - ad diarrhoeam, II. 224.
 - Diatrion, II. Add.
 - Digitalis camphorata, 615.
 - diuretica, II. 395.
 - diuretica, 552. II. 87. 639.
 - 628. 679.
 - et refrigerans, II. 394.
 - ad dysenteriam, II. 266.
 - ad Gulochiam, 77.
 - emetica, 621. II. 14.
 - emeto anodyna, 229.
 - excitans, 489. II. 576.
 - mitis, 177.
- Mistura expectorans et tonica; II. 16.
- febrifuga, 488.
 - et purgans, II. 26.
 - ferrea, 356.
 - Ferri composita, 644.
 - foetida, 285. 438.
 - frigorifica, II. 391.
 - pro gingivis roborand., 443.
 - Guajaci, 716.
 - Gummi Bergeri, 716.
 - guajacina, 710.
 - Gummi-resinae F. Ammon comp., 720.
 - Asae foet., II. 284. et Add.
 - Myrrhae fer-rata, II. Add.
 - gummosa ex Hydrargyro corrosivo, II. 201.
 - e Sublimato corrosivo, II. 201.
 - scillitica, II. 543.
 - in haematuria chronica, II. 22.
 - Humifima, 30.
 - hydragoga, II. 212.
 - ad icterum, II. 400.
 - incisiva, II. 513.
 - incitans martialis, 662.
 - nervina, 268.
 - et sedans, II. 232.
 - e Kali nitrico, II. 391.
 - sulphurico, 247.
 - Kali tartarici, II. 407.
 - kermetica, 228.
 - Lauro-Cerasi Aquae, 40.
 - laxans, II. 100. 410. 461. 671.
 - leniens, 188. 600.
 - Mignoris Amm. acet. et caust., II. Mixt. Amm. acet. et caust. Liq.
 - lithontripctica, 77.
 - e Lupulo, II. 86.
 - Lycopodii, II. 87.
 - Magnesiae, II. Add.
 - e Magnesia sulphur., II. 92.
 - Marrubii, II. 103.
 - martiata amara, 602.
 - mercurialis, II. 124. 200.
 - balsamica, II. 125.
 - Mercurii gummosa, II. 124.
 - Millesfolii, II. 209.
 - mineralis, II. 180.
 - moschata, II. 220.
 - Moschi, II. 420.
 - mucilaginosae, 731.
 - mucilaginoso-aromaticae, 427.
 - balsamica, 3-312.
 - Myrrhae alcalisata, II. 230.
 - Griffithii, 644.
 - Natri phosphorici, II. 581.
 - nervina et resolvens, 268.
 - Nicotianae diuretica, II. 238.
 - nitrata, II. 391.
 - Nitratu Potassae, II. 391.
 - nitrato-camphorata, II. 394.
 - Nitrosa, II. 391. Add.
 - Nucum Juglandium, II. 34.
 - Olei Ricini cum Jalapa, II. 51.
 - oleosa, 188.
 - cum Aceto, 22.
 - oleoso-acida, 31. 541.
 - balsamica, 365. II. 481.
 - salina, II. 93.
 - opiacea, II. 251. 258.
 - opiato-aetherea, II. 252.
 - antidyenterica, II. 253.
 - Opii adstringens, II. 291.
 - oxygeno-muriatica, 571.
 - ad partum, II. 381.
- Mistura pectoralis, 38. 170. 176. 313-543.
- hydrocyanica, 377.
 - contra perionias, 399.
 - piperita, 398.
 - purgans, II. 31.
 - acidula, II. 410.
 - pyrotartarica, II. Add.
 - refrigerans, II. 391. 395. 396.
 - Resinae Copaybae, 395.
 - resolvens, 171. 316. 619. II. 10. 324. 402. 403. 406. 712. 688.
 - et roborans, II. 406.
 - spirituosae, II. 374.
 - Rhois radicans Extracti, II. 461.
 - Riverii, 29.
 - roborans, II. 45.
 - salina, II. 402. 404.
 - antacida, II. 93.
 - composita, II. 404.
 - Macbridi, II. 404.
 - pauperum, II. 399.
 - simplex, II. 396. 404.
 - volatiliss, 173.
 - saponacea, II. 381.
 - purgans, II. 28.
 - scillina, II. 536.
 - sedans et aromatica, II. 266.
 - sedativa, II. 252. 260. 266.
 - sedativo-narcotico-pectoralis, II. 252.
 - refrigerans, II. 391.
 - simplex, 23. et II. Add.
 - alba, II. Add.
 - anticorbatica, 548.
 - Ludovici, II. Add.
 - ordinaria, II. Add.
 - sistens, II. 291.
 - solvens, 247.
 - stomachica, 536. 695. II. 85.
 - subtyrica, 580.
 - Subcarbonatis Magnesiae, II. 91.
 - Potassae, 29.
 - succinea, II. 481.
 - sulphurico-acida, 66.
 - Sulphuris praecipitati, II. 604.
 - Sylvii, II. 247.
 - Tartari stibiatu et boraxati juniperina, 245.
 - tartarica, II. 407.
 - temperans, 22. 731.
 - terebinthinata, II. 619.
 - theriacalis, II. 288.
 - tonica, 505. 651. II. 404.
 - tonico-adstringens, 496.
 - antiseptica, 284. 494.
 - balsamica, 662.
 - diaphoretica, 406.
 - nervina Stahlii, II. 374.
 - stomachica, 561.
 - topica - Sapo chem Dipp., II. 374.
 - Trifolii aquatici foetida, II. 638.
 - ad tussim convulsivam, 488.
 - vinosa, 289.
 - volatiliss, 181.
 - ad vomitum sanguinis, II. 291.
 - vomitiva, II. 14.
 - vulneraria acida, 23. 177.
 - Zinci Sulphatis, II. 601.
- Mofesta - Gas acid. carbonicum.
- Molybdaentum Magnessi, II. 96.
- Molybdenica, II. 211.
 - Balsamina, II. 211.
 - Elatarium, II. 211.
- Monarda punctata, II. 213.
- Monoceros, 364.
- Monodon Monoceros, 364.

- Moringa**, II. 213.
 — oleifera, II. 213.
Morpheum, II. 213.
Morphia, II. 213.
Morphina, II. 213.
Morphinum, II. 213.
Morphium, II. 213.
 — aceticum, II. 215.
 — citricum, II. 216.
Morrhua, II. 216.
Morsuli Aceti. 21.
 — cum Acido citrico, 31.
 — Acidi oxalici, 49.
 — anthelmintici, 521.
 — antimonialis, 222.
 — Kunkelii, 222.
 — antistrumales, II. 415.
 — aromatici, 383.
 — aromatico-stomachici, 383.
 — Chinae, 479.
 — chinati, 479.
 — Citri, 540.
 — Ginseng, II. 304.
 — Imperatoris, 383.
 — Menthae piperitae, II. 117.
 — Oculorum Canceri, 360.
 — pectorales, II. 264.
 — purgantes, II. 29.
 — restaurantes Kunkelii, 222.
 — Rhoeados, II. 308.
 — ad scabiem, II. 603.
 — ad sitim restinguendam, 59.
 — ad sodam, 362.
 — solventes, s. solutivi, II. 24.
 — stibiati, 222.
 — Stibii, 222.
 — stimulantis, II. 606.
 — stomachici, 383.
 — ad ventriculi ardorem, 362.
 — contra vermes, 521.
Morsus Diaboli, II. 527.
 — Gallinae, 118.
Morus, II. 216.
 — Indica, II. 436.
 — nigra, II. 216.
 — ruber, II. 487.
Moschus, II. 217.
 — artificialis, II. 599.
 — moschiferus, II. 217.
Moscovatum, II. 494.
Motacilla Troglodytes, 359.
Mucharum Rosarum, II. 467.
Mucilago Acaciae, 728
 — Allihaeae, 123.
 — Amyli, 190.
 — Astragali Tragacanthae, II. 653.
 — camphorata, 372.
 — Cantharidum, II. 402.
 — Consolidae majoris, 563.
 — Corallinae Corsicanae, 742.
 — cretica, 353.
 — Cydoniorum, 599.
 — — Seminum, 599.
 — — acidulata, 600.
 — Foenu graeci, 671.
 — Glycyrrhizae, II. 78.
 — Gummi Arabici, 728.
 — — mercurialis, II. 123.
 — — Mimosae, 728.
 — — Tragacanthae, II. 653.
 — Helminthochortos, 742.
 — Lichenis Islandici, II. 67.
 — Lini Seminii, II. 74.
 — Liquiritiae, II. 78.
 — mercurialis Plenckii, II. 123.
 — oleosa, 187.
 — Psyllii, II. 332.
 — Salep, II. 496.
 — Tragacanthae, II. 653.
Mumia Persica nativa — Bitumen.
Mumiae, 292.
Pharmacopoea universalis, II.
- Mungos**, II. 222.
Mures marini, II. Add.
Muria, II. 575.
 — fontana, II. 575.
Murias Ammoniacae, 169.
 — aeruginatus, 590.
 — et Cupri, 590.
 — ferratus, 657.
 — superhydrargyricus, II. 109.
 — Ammoniae, 169.
 — et Cupri liquidus, 590.
 — depuratus, 169.
 — et Ferri, 657.
 — ferricus, 657.
 — martiatus, 657.
 — et Oxydi Ferri, 657.
 — purus, 169.
 — Ammonii ferricum, 657.
 — et Cupri, 590.
 — ammonio-ferricum, 657.
 — Antimonii, 235.
 — — superoxygenatus, 235.
 — Auri, 298.
 — — liquidus, 298.
 — et Sodae, 299.
 — aurico-natricum, 299.
 — — praeparatum, 299.
 — Barytae, 314.
 — — liquidus, 316.
 — baryticum s. baryticus, 314.
 — Calcariae, 367.
 — calcicum, 367.
 — Calcis, 367.
 — — oxygenatus, 355.
 — — superoxygenatus s. hyperoxygenatus, 355.
 — Cupri, 590.
 — Deutoxydi Hydrargyri, II. 175.
 — Ferri, 653.
 — ammoniacalis, 657.
 — liquidus s. liquidum, 653.
 — — sublimatus, 652.
 — ferricus, 653.
 — ferro ammoniacale, 657.
 — Hydrargyri, II. 175.
 — — basi oxydi imperf., II. 175.
 — — corrosivus, II. 175.
 — — Deutoxydi, II. 175.
 — — dulcis sublimatus, II. 155.
 — — ferratus, II. 167.
 — — mitis, II. 155.
 — — oxydatus, II. 175.
 — — Oxydi ammoniacalis, II. 199.
 — — oxydulati, II. 155.
 — — oxydulatus praeparatus, II. 155.
 — — oxygenatus sublimatione s. praecipitatione parat, II. 175.
 — — spirituosus liquidus, II. 178.
 — — suboxygenatus, II. 165.
 — — superoxygenat., II. 175.
 — hydrargyricus corrosivus, II. 175.
 — hydrargyro-ammoniacalis, II. 199.
 — — insolubilis, II. 199.
 — — acerrimus, II. 199.
 — — solutus, II. 200.
 — hydrargyrosus mitis, II. 155.
 — Magnesiae, II. 94.
- Murias Manganesi**, II. 98.
 — Mercurii corrosivi, II. 175.
 — — dulcis, II. 156.
 — — suboxygenat., II. 156.
 — — superoxygenat., II. 175.
 — Oxydi Hydrargyri ammoniacalis, II. 199.
 — — corrosivus, II. 175.
 — Oxyduli Hydrargyri mitis, II. 155.
 — — Stanni, II. 592.
 — — liquidus, II. 592.
 — — Stibii, 235.
 — — liquidus, 235.
 — oxygenatus Hydrargyri sublimatus, II. 175.
 — Platinae, II. 333.
 — Plumbi, II. 333.
 — Potassae, II. 397.
 — — hyperoxygenat., II. 397.
 — — oxygenatus, II. 397.
 — Protoxydi Hydrargyri, II. 155.
 — Sodae, II. 575.
 — — fossilis, II. 575.
 — — depuratum, II. Add.
 — — exsiccatus, II. Add.
 — — purus, II. Add.
 — Stanni, II. 592.
 — — Oxyduli, II. 592.
 — — liquidus, II. 592.
 — — protoxygenati, II. 592.
 — Stibii, 235.
 — stibiosus, s. stibiosus, 235.
 — — oxygenatus, 235.
 — Zinci, II. 684.
Murigenum, 509.
Muscae Hispanicae, II. 308.
Muscari ambrosiacae, II. 222.
Muscus Acaciae, II. 64.
 — albus quernus, II. 64.
 — arboreus, II. 64.
 — caninus, II. 63.
 — capillaceus major, II. 368.
 — catharticus, II. 64.
 — clavatus, II. 87.
 — corallinus, 741.
 — — marinus, 741.
 — Helminthochortos, 741.
 — Helminthochortos, 741.
 — Islandicus, II. 64.
 — marinus, 741.
 — pulmonarius, II. 64.
 — pyxidatus, II. 63.
 — quernus albus, II. 64.
 — terrestris, II. 87.
Mustela Piscis spinae s. vertebratae, 364.
Mustum, II. 680.
 — Hordei, II. 95.
Myrica Gale, 676.
Myricinum, 250.
Myristica, II. 222.
 — aromatica, II. 222.
 — moschata, II. 222.
Myrobalani belliricae, II. 226.
 — chebulae, II. 225.
 — citrinae, II. 225.
 — embliae, II. 225.
 — flavae, II. 225.
 — Indae s. Indicae, II. 225.
 — nigrae, II. 225.
Myrobalanus belliricae, II. 225.
 — chebulae, II. 225.
 — citrina, II. 225.
Myroxylon s. Myroxylum periferum, 308.
 — toluiferum — Mirosperrum.
Myrrha, II. 225.
 — liquida, II. 229.
 — rubra, II. 225.
Myrrhis annua, 293.
Myrtacantha, II. 499.

Myrtillus, II. 661.
 Myrtus, II. 231.
 — Brabantica, 676.
 — Caryophyllata — Caly-
 pranthus.
 — communis, II. 231.
 — Pimenta, II. 325.
 Mytilus margaritiferus, 358.
 Myxa, II. 231.

N.

Nacra Perlarum, 358.
 Napellus, 60.
 Naphae flores, 525.
 Naphtha, II. 231.
 — Aceti, 68.
 — Nitri, 71.
 — Petrolei, II. 317.
 — Vitrioli, 71.
 — — camphorata, 375.
 — — diluta, 70.
 — — martialis, 655.
 — — phosphorata, II. 320.
 — — rectificata, 75.
 Napus, 334.
 — sylvestris, 331.
 Narcissus Pseudo-Narcissus, II. 231.
 Narcotina, II. 232.
 Narcotinum, II. 232.
 Nardus, II. 232.
 — Celtica, II. 233.
 — — altera, 206.
 — Indica, II. 232.
 — rustica, 288.
 — sylvestris, 288.
 Nasturtium aquaticum, II. 234.
 — hortense, II. 232.
 — Indicum, II. 232.
 — pratense, II. 234.
 — sylvestre, 571.
 Natron s. Natrum, II. 577.
 — aceticum, II. 585.
 — carbonicum, II. 577.
 — — acidulum, II. 579.
 — — crudum, II. 577.
 — — crystallis, II. 577.
 — — depuratum, II. 577.
 — — siccum, II. 578.
 — — neutrale, II. 579.
 — — perfecte saturat, II. 579.
 — chloratum, II. Add.
 — glaciale, 366.
 — hydrodionicum, II. 10.
 — hydrochloricum, II. 575.
 — muriaticum, II. 575.
 — — oxygenatum, II. Add.
 — nitricum, II. 585.
 — oxyphosphorodes, II. 582.
 — praeparatum, II. 577.
 — phosphoricum, II. 582.
 — subboracicum, II. 579.
 — — carbonicum crudum, II. 577.
 — — sulphuratum, II. 574.
 — — sulphuricum, II. 583.
 — — acidum, II. Add.
 — — crudum, II. 583.
 — — crystallisatum, II. 583.
 — — depuratum crystall.
 II. 583.
 — — — siccum, II. 583.
 — tartaricum, II. 412.
 — tartarisatum, II. 412.
 Nauclea Gambir, 441.
 — longifolia, II. 44.
 Nenuphar, II. 242.
 Nenuphar, II. 242.
 Nepeta, 441. II. 108.
 — Cataria, 441.
 Nephrocatharticum Foresti, 256.
 Nephrodium Filix mas — Athy-
 rium.

Nerium, II. 235.
 Nerium Oleander, II. 235.
 Nezetta, II. 47.
 Nicotiana, II. 235.
 — minor, II. 235.
 — rustica, II. 235.
 — Tabacum, II. 235.
 Nicotianina, II. 235.
 Nicotianinum, II. 235.
 Nicotinum, II. 235.
 Nidi Hirundinum, 000.
 Nigella, II. 239.
 — arvensis, II. 239.
 — Damascena, II. 239.
 — sativa, II. 239.
 Nigrum Eboris, 413.
 Nihil s. Nihilum album, II. 684.
 — — griseum, II. 684.
 Ninsi, II. 574.
 Ninsing, II. 574.
 Ninsinus, II. 574.
 Nitras Ammoniacae, 169.
 — ammonicus c. Oxydo hy-
 drargyroso, II. 192.
 — Argenti, 260.
 — — ammoniacale, 262.
 — — crystallin., 260.
 — — crystallisatum, 260.
 — — fusus s. fusum, 261.
 — — argenticus crystallis., 260.
 — — fusus, 261.
 — Barytae, 318.
 — Bismuthi, 329.
 — — cum baseos excessu, 330.
 — — praecipitatus, 329.
 — Cupri, 589.
 — — Deutoxydi, 589.
 — Ferri, 662.
 — — Triotoxydi, 662.
 — Hydrargyri, II. 194.
 — — liquidus, II. 195.
 — Kali, II. 389.
 — — kalicum s. kalicus, II. 389.
 — — crudus, II. 389.
 — — depurat., II. 389.
 — — purus, II. 389.
 — Lixiviae, II. 389.
 — Mercurii Deutoxydi, II. 198.
 — — Protoxydi, II. 194.
 — — natricum s. natricus, II. 585.
 — Oxyduli Hydrargyri liqui-
 dus, II. 195.
 — Potassae, II. 389.
 — — crudus, II. 389.
 — — depuratum, II. 389.
 — — impurus, II. 389.
 — — purgatus, II. 389.
 — — purus s. purus, II. 389.
 — — cum Sulphure fusum,
 II. 390.
 — Potassii Protoxydi, II. 389.
 — Sodae, II. 585.
 — Sodii Protoxydi, II. 585.
 — Strychninae s. Strychnini,
 II. 595.
 — — subbismuthicum, 329.
 Nitri Naphtha, 71.
 — Spiritus fumans, 46.
 Nitrogenium, 302.
 Nitrum, II. 389.
 — — alkalisatum, II. 379.
 — — antimoniatum, 220.
 — — — Stahlian., 220.
 — — baroticum, 318.
 — — crudum, II. 389.
 — — crystallisatum et depurat.,
 II. 389.
 — — cubicum, II. 585.
 — — depuratum, II. 389.
 — — fixum, II. 379.
 — — — Schroederi, II. 385.
 — — — per Tartarum, II. 379.
 — — flammans, 160.
 — — fontanum — Sal Anglicum.
 — — lunare, 260.

Nitrum Mercurii, II. 194.
 — — nativum, II. 389.
 — — papaveratum, II. 390.
 — — perlatum, II. 390.
 — — purificatum, II. 389.
 — — purissimum, II. 390.
 — — purum, II. 389.
 — — regeneratum, II. 390.
 — — rhomboidale, II. 585.
 — — rosatum, II. 390.
 — — saturninum, II. 347.
 — — Schroederi, II. 385.
 — — tabulatum, II. 390.
 — — Terrae ponderosae, 318.
 — — venale, II. 389.
 — — vitriolatum Schroederi, II. 385.
 Nodus purgans, II. 550.
 Nola culinaria, 193.
 Nostoc, II. 239.
 Nostochium commune, II. 239.
 Nuces Cypressi, 581.
 — Juglandis immaturae, II. 32.
 — — moschatae, II. 222.
 — — Quercus, II. 433.
 — — — tostae, II. 435.
 — — quernae tostae, II. 435.
 — — vomicae, II. 240.
 Nuca, II. 222.
 Nuclei Pineae s. Pini, II. 324.
 Nummularia, II. 87.
 Nux Barbadaensis, II. 239.
 — — cathartica Americana, II. 239.
 — — Juglans s. Juglandis, II. 32.
 — — moschata, II. 222.
 — — vomica, II. 240.
 Nymphaea alba, II. 241.
 — lutea, II. 242.

O.

Ochioglossum, II. 245.
 Ochra lutea, 611.
 — rubra, 611.
 — Veneris, 584.
 Ocimum Basilicum, f. Ocimum.
 Octopus vulgaris — Sepia offic.
 Oculi Cancrorum, 359.
 — — citrati, 368.
 — — praeparati, 360.
 Ocimum Basilicum, 318.
 — — magnum, 319.
 — — medium, 319.
 — — minimum, 319.
 — — vulgatus, 319.
 Oenanthe Phellandrium — Phell.
 aquat.
 Oenos, II. 675.
 Oesopus, II. 243.
 Offa alba, 165.
 — — Helmontii, 165.
 Olea Europaea, II. 243.
 Oleo - Ceratum Aqua subactum,
 252.
 — — Margarum Mercurii, II. 206.
 — — resina Copahu, 303.
 — — de Mecca, 307.
 Oleosaccharum, f. Elaeosaccha-
 rum
 — — cephalicum, II. 222.
 — — Crotonis Tiglyi, 577.
 — — Myrrhae, II. 226.
 — — Succini, II. 599.
 — — Terebinthinae, II. 632.
 Oleum Absinthii aetherium, 5.
 — — coctum, 11.
 — — destillatum, 5.
 — — infusum, 11.
 — — stillatium, 5.
 — — acusticum, 755.
 — — aetherium — Ol. Vini dulce.
 — — Aloës, 91.
 — — aloëticum batavum, 91.

Oleum Althaeae, 127.
 — ammoniatum, 154.
 — Ammoniaci Gummi, 721.
 — Amygdalae, 182.
 — Amygdalarum s. Amygdalorum, 182.
 — — amarar. essent., 41.
 — — dulcicum, 182.
 — Anagallidis, 192.
 — Anethi aetherium, 197.
 — — coctum, 198.
 — Angelicae, 199.
 — animale, 691.
 — — aetherium, 691.
 — — empyreumaticum, 690.
 — — Dippelii, 691.
 — — foetidum, 690.
 — Anisi aetherium (destill.) s. volatile, 209.
 — — expressum, 209.
 — anthelminticum, 557. II. 632.
 — Anthemidis — Ol. Chamomillae.
 — Anthos, II. 479.
 — Antimonii, 235.
 — Apparitii, 760.
 — arilli Myrist. mosch. aeth. — Ol. Macidis.
 — aromo-narcoticum, 754.
 — Artemisiae, 275.
 — Arthanitae compos., 558.
 — arthriticum, 713.
 — Asphalti, II. Add.
 — Aurantii aetherium s. destillatum, 527.
 — — expressum, 526.
 — Aurantium, f. Aethereolum.
 — — ad aures, 90. 755.
 — Avellanarum, 571.
 — balatinum, II. 213.
 — Basilici, 319.
 — Been, II. 213.
 — Benzoës, 323.
 — Bergamottae s. Bergamotte, 526.
 — betulinum, II. Add.
 — bezoardicum Wedelii, 378.
 — Bryoniae compos., II. 543.
 — Bufonium, 754.
 — Buxi, 345.
 — Cacao, 346.
 — — concretum, 346.
 — — fructus, 346.
 — — spissatum, 346.
 — — Theobromae, 346.
 — Cajaputi, 347.
 — Cajeput, 347.
 — Cajeputae s. Cajeputi, 347.
 — — rectificatum, 347.
 — Cajuputi, 347.
 — Calami, 349.
 — Calcis, 367.
 — Camphorae, 377.
 — — liquidum et butyraceum, 377.
 — — nitricatum, 377.
 — camphoratum, 377.
 — Cannabis, 398.
 — Cantharidum, 404.
 — de Capparibus, 411.
 — Capparium, 411.
 — Cardamomi, 417.
 — carminativum, 466.
 — — aetherium, 460.
 — Carpathicum, 373.
 — Carvi, 422.
 — — aetherium, 422.
 — Caryophyllor. arom., 425.
 — Cascarillae, 427.
 — Cassiae cinnamomeae, 384.
 — Castorei, 134.
 — Cataputiae minoris, 441

Oleum Catellorum, 759.
 — de Cedro, 537.
 — — — rectific., 537. et Add.
 — Cerae, 251.
 — Cerefolii, 457.
 — Chamaemeli aetherium s. destillat., 459.
 — — coctum s. infus., 465.
 — — compos., 460.
 — — chamaemelinum, 465.
 — — Chaerophylli, 457.
 — — Chaerophylli, 457.
 — Chamomillae aeth. (destill.) 459.
 — — citratum, II. Add.
 — — coctum s. infus., 465.
 — — terebinth., 460.
 — Cheiri, 467.
 — Chenopodii, Add.
 — — anthelmint., 470.
 — Cicutae, 517.
 — — destillatum, 517.
 — Cinnamomi, 384.
 — — Ceylanici, 384.
 — — Sinensis — Ol. Cass. cinnam.
 — Citri Aurantii Corticis expressum, 526.
 — — medicae Corticum aetherium, 537.
 — — ex-pressum, 537.
 — — Colocynthis, 557.
 — — Conyzae comp., II. 212.
 — — Coriandri, 569.
 — — Cornu cervi empyreum. rectific., 691.
 — — — foetidum, 690.
 — — — rectificatum, 691.
 — — — succinatum, 691.
 — — volatile, 690.
 — Cort. Aurantior — Ol. Aurant. Cort.
 — — corylinum, 571.
 — — costicum, II. Add.
 — — Croci, 574.
 — — Crotonis, 577.
 — — Cubeburum aether., 579.
 — — Cucumeris Semin., II. Add.
 — — de Cucurbita, 580.
 — — Cucurbitae pleureticum, 580.
 — — Cumini aeth., 581.
 — — Cupri Oxidi viride, 593.
 — — Dictamni, II. 296.
 — — Dippelii, 691.
 — — dulce, 76.
 — — empyreumat. animale, 690.
 — — Pini sylvestris — Pix nigra liquida.
 — — — exsicc., — Pix.
 — — Enulae comp., II. 7.
 — — Euphorbii, 627.
 — — Filicis, II. Add.
 — — Florum Aurantii — Aethereol.
 — — septem, 466.
 — — Slotani, 759.
 — — Foeniculi, 195.
 — — aetherium s. essent., 195.
 — — Formicarum, 672.
 — — Fructus Cacao, 346.
 — — Galbani, 337.
 — — — comp., 337.
 — — Gautheriae, 680.
 — — Guajaci, 708.
 — — — compos., 708.
 — — Gummi Ammoniaci, 721.
 — — Habacuci, 557.
 — — Helenii comp., II. 7.
 — — hieraculinum, 571.
 — — Hyoscyami, 752.
 — — — ammoniaco-camphoratum, 155.

Oleum Hyoscyami Foliorum coctum, 752.
 — — — infusum, 752.
 — — — Herbae coctum, 752.
 — — — infusum, 752.
 — — — Seminum, 749.
 — — — vitide, 752.
 — — Hyperici infusum s. coctum, 758.
 — — — compos., 760.
 — — — Florum, 757.
 — — — Seminum, 757.
 — — Hyssopi, 762.
 — — Inulae compos., II. 7.
 — — Ireos, II. 20.
 — — Iridis, II. 20.
 — — irinum, II. 20.
 — — Jecoris s. Jecoris Aselli, II. 216.
 — — Juglandis, II. 33.
 — — Juniperi Baccarum, II. 40.
 — — — Ligni, II. 40.
 — — Lacertarum viridium, 660.
 — — Laricis, II. 627.
 — — — rectificatum, II. 627.
 — — — cum s. de lateribus, II. 243.
 — — Lauri Baccarum, II. 63.
 — — — expressum, II. 53.
 — — laurinum, II. 53.
 — — — expressum, II. 53.
 — — — infusum, II. 53.
 — — Lavandulae s. Lavendulae, II. 59.
 — — — pingue, II. 60.
 — — Ligni Rhodii, II. 71.
 — — — Santali citr., II. 513.
 — — — Sassafras, II. 525.
 — — Liliorum alborum, II. 72.
 — — Limonum Corticum, 537.
 — — Lini (usitatiss.) expressum, II. 75.
 — — — cum Calce, 353.
 — — — coctum, II. 75.
 — — — recens paratum, II. 75.
 — — — sulphuratum, II. 603.
 — — Lumbricorum terrestrium, 689.
 — — — Macidis, II. 224.
 — — Majoranae aether., II. 295.
 — — — infusum, II. 297.
 — — — Mariae, 608.
 — — — Martis, 653.
 — — — per deliquium, 653.
 — — — Mastiches, II. 104.
 — — — mastichinum, II. 104.
 — — — Melaleuca Leucadendron — Ol. Cajeput.
 — — — Meliloti, II. 106.
 — — — Florum volat., II. 106.
 — — — Melissa, II. 109.
 — — — Menthae aetherium, II. 117.
 — — — — crispae, II. 117.
 — — — — terebinthinat., II. 117.
 — — — — infusum, II. 116.
 — — — piperitae, II. 117.
 — — — Millefolii, II. 209.
 — — — Momordicae, II. 212.
 — — — — compos., II. 212.
 — — — Monardae, II. 213.
 — — — Morrhucae, II. 216.
 — — — Moschi, II. 221.
 — — — de mucilagibus, II. 75.
 — — — Mucilaginis, 671.
 — — — mucilaginosum, II. 75.
 — — — Myristicis s. Myristicae mosch., II. 224.
 — — — Myrrhae, II. 229. 230.
 — — — — per deliquium, II. 229.
 — — — myrtilinum, II. 231.
 — — — Myrti Pimentae, II. 327.
 — — — Naphae, 526.
 — — — narcoticorum, 754.

- Oleum Neroli**, 527.
 — Nicotianae, II. 238.
 — Nucis moschatae, II. 223.
 — — express. aethereum, II. 224.
 — Nucistae aethereum, II. 224.
 — — expressum, II. 223.
 — Nucum Juglandium, II. 33.
 — Olivarum, II. 243.
 — — Provinciale, II. 243.
 — — empyreumaticum, II. 243.
 — — oxygenatum, 511.
 — Origanum, II. 206.
 — — Cretici, II. 206.
 — Ovorum s. e Vitellis Ovorum, II. 209.
 — Oxydi Cupri viride, 593.
 — Palmae, II. 243.
 — Christi, II. 463.
 — Papaveris albi, II. 309.
 — — recens paratum, II. 309.
 — — somniferi, II. 309.
 — pargoricum, 750.
 — Perfoliatae infusum, 758.
 — Petrae, II. 317.
 — — album, II. 317.
 — — nigrum, II. 317.
 — — rubrum, II. 317.
 — Petrolei, II. 317.
 — Petroselini, 257.
 — Peucedani, II. 317.
 — Philosophorum, II. 243.
 — phosphoratum, II. 321. 322.
 — — aromaticum, II. 322.
 — phosphoricum, II. 321.
 — Pimentae, II. 327.
 — Pimpinellae Anisi, 209.
 — pinguedinis, 64.
 — Pini aethereum, II. 627.
 — — Laricis — Ol. Terebinth.
 — — sylvestris destill. —
 — Ol. Terebinth.
 — — volatile, II. 627.
 — Piperis nigri s. piperinum, II. 327.
 — — Jamaicensis, II. 327.
 — Pistaciarum, II. 329.
 — Pulegii, 425.
 — purgans, II. 530.
 — Pyro-animale, 600.
 — — depuratum, 691.
 — pyrogenium animale, 600.
 — Ricini, II. 463.
 — — Americani, II. 239.
 — — artificiale, 577. II. 29.
 — Rorismarini, II. 479.
 — Rosarum, II. 472.
 — — aethereum, II. 472.
 — rosatum, II. 472.
 — Rusci, II. Add.
 — Rutae aethereum, II. 492.
 — — infusum, II. 492.
 — Sabinae, II. 41.
 — Salviae, II. 502.
 — Sambuci, II. 510.
 — Santali citrini vel albi, II. 513.
 — — Saponis, II. 419. 421.
 — — Sassafras, II. 525.
 — — Saturejae, II. 526.
 — — Saturni, II. 348.
 — — Goulard., II. 348.
 — — Scarabaeorum, II. 113.
 — — Scorpionum simplex, 689.
 — — compos., 689.
 — — Scrophulariae, II. 545.
 — — septem Florum, 466.
 — — Seyylli, II. 610.
 — — Sesami orientalis, II. 569.
- Oleum Sinapi infusum**, II. 572.
 — Solani nigri, II. 586.
 — Spermatis Runarum, 690.
 — — stomachale, 12.
 — Stramonii, 607.
 — — compos., 754.
 — Succini, II. 598.
 — — aethereum, II. 598.
 — — crudum, II. 598.
 — — depuratum, II. 598.
 — — oxydatum, II. 599.
 — — rectificatum, II. 598.
 — — reductum, II. Add.
 — sulphuratum, II. 604.
 — Sulphuris, 56.
 — — Beguini, 172.
 — Tacamahacae, II. 608.
 — — contra taeniam Chaberti, II. Add.
 — — Tanacetii, II. 614.
 — Tartari per deliq., II. 380.
 — — foetidum, II. Add.
 — — per solutionem, II. 380.
 — — templinum, 333. II. 627.
 — Terebinthinae, II. 627.
 — — depuratum, II. 627.
 — — rectificatum, II. 627.
 — — sulphuratum, II. 604.
 — Terrae, II. Add.
 — — Thapsiae antirheumaticum, II. 647.
 — — Thymi, II. 649.
 — — Tiglii — Ol. Crotonis.
 — — ad terminis ventris, 466.
 — — de Tribus, II. 633.
 — — Valerianae, II. 670.
 — — Verbasci, II. 673.
 — — Vini, 76.
 — — aethereum, 76.
 — — dulce, 74. 76.
 — — volatile, 76.
 — — Violarum, II. 678.
 — — viride, 593.
 — — e Vitellis Ovorum, II. 209.
 — Vitrioli, 52. 53.
 — — Anglicum, 53.
 — — depuratum, 53.
 — — dulce, 75.
 — — Nordhusanum, 53.
 — — purificatum, 53.
 — — purissimum, 53.
 — — rectificatum, 53.
 — — volatile animale, 691.
 — — Dippelii, 691.
 — — vulpinum, 759.
 — — Zedoariae, II. 683.
 — — Zingiberis, II. 697.
- Olibanum**, II. 244.
 — — electum, II. 244.
 — — in sortis, II. 244.
- Olivae**, II. 243.
Olivillum, II. 213.
Olivum — Oleum Olivarum.
Olsmitium, II. 547.
Omphacium, II. 680.
Oniscus Asellus, II. 210.
Ononis, II. 244. 245.
 — — arvensis, II. 244.
 — — spinosa, II. 245.
- Onopordon Acanthium**, 417.
Onosma echioides, II. 245.
Opercula Cochlearum, 358.
Ophioglossum, II. 245.
 — — vulgatum, II. 245.
Ophiorrhiza Mungos, II. 222.
Opiatum adstringens, 306. 444.
 — — 481. II. 175. 435. 497.
 — — antiapoplecticum, II. Add.
 — — anticachecticum, II. 328.
 — — antichloroticum, 616.
 — — antidysentericum, II. 13.
 — — antiepilepticum, II. 267.
 — — 304.
 — — antigonorrhoeicum, 306.
- Opiatum antihaemorrhoidale**, II. 318.
 — — antihyperceticum, II. 25.
 — — antidontalgicum, 426.
 — — antiperiodicum et tonicum, 219.
 — — antiphthisicum, II. 603.
 — — antispythiliticum, II. 407.
 — — aperitivum et purgans, 647. II. 138.
 — — Arabicum, II. 517.
 — — dentifricium, 132. 366.
 — — desalterans, 623.
 — — detersivum, II. 228.
 — — dysentericum, II. 287.
 — — — balsamicum, II. 288.
 — — emmenagogum, 636. 646.
 — — febrifugum, 13. 479. 481. 482.
 — — — et incisivum, 482.
 — — — et purgans, 479.
 — — hydragogum, 647.
 — — leniens, II. 361.
 — — mesentericum, 636.
 — — Neapolitanum, II. 171.
 — — de Pajot-Laforest, II. 183.
 — — pectorale, 306.
 — — tonicum, 636.
 — — purgans, II. 260.
 — — purgativum, II. 160.
 — — — et tonicum, II. 167.
 — — de Roccamore, 526.
 — — sedans, II. 351.
 — — stimulans, II. 25.
 — — stomachicum, II. 606.
 — — sulphuratum, II. 603.
 — — cum Sulphure, II. 603.
 — — terebinthinatum, II. 632.
 — — vermifugum, II. 25. 139.
- Opium**, II. 246.
 — — brutum, II. 246.
 — — colatum, II. 246. 260.
 — — crudum, II. 246.
 — — depuratum, II. 246. 260.
 — — gummosum, II. 260.
 — — Indicum, II. 246.
 — — Persicum, II. 246.
 — — purificatum, II. 246.
 — — thebaicum, II. 246.
 — — torrefactum, tostum, II. 247.
 — — Turcicum, II. 246.
- Opobalsanum siccum**, 308.
 — — verum, 307.
- Opodeldoc**, 150.
- Opopanax s. Opopanax**, II. 294.
- Opuntia**, II. 295.
- Orchis fusca — Salep**.
 — — mascula — Salep.
 — — militaris — Salep.
 — — Morio — Salep.
 — — ustulata — Salep.
- Oreoselinum**, II. 547.
- Origanum**, II. 205.
 — — aquaticum, 625.
 — — commune, II. 206.
 — — Creticum, II. 205.
 — — Dictamnus, II. 205.
 — — Majorana, II. 205.
 — — vulgare, II. 206.
- Orleana**, II. 297.
 — — Terra, II. 297.
- Ornithoglossa**, 673.
- Orobanchae**, II. 297.
 — — Virginiana, II. 297.
- Orobis**, II. 675.
- Orontium majus**, 248.
- Orvietanum**, II. 288.
- Oryza**, II. 297. 298.
- — sativa, II. 297.
- Os Sepiae**, 358.
 — — — praeparatum, 359.
- Osmazoma**, II. 298.
- Ossa**, 363.
 — — de Cordibus Cervi, 364.

Ussa Sepiæ, 388.
 — usta præparata, 365.
Osteocolia, 367.
 — præparata, 359.
Ostreæ edulis, 357.
Ostrearum testæ, 357.
Ostruthium, II. 1.
Ova gallinacæ, II. 299.
Ovorum testæ, 357.
 — præparata, 359.
Oxalæ Ammoniaci, 178.
 — liquidus, 179.
 — Hydrargyri, II. 203.
 — Mercurii, II. 203.
 — Potassæ acidulum s. acidula, II. 403.
 — acidum s. acidum, II. 403.
 — basicum, II. 403.
 — et Ferri, 663.
 — neutrum, II. 403.
 — subpotassicum, II. 403.
Oxalis, 15.
 — Acetosella, 16.
 — corniculata, 16.
Oxalium, II. 403.
Oxidum f. **Oxydum**.
Oxodes Ferri, 638.
 — Hydrargyri nigrum, II. 192.
 — rubrum, II. 146.
 — Mangani nativum, II. 98.
 — Plumbi nigrum, II. 334.
 — Stibii album, 215.
 — sulphuratum, 229.
 — Zinci, II. 684.
 — album, II. 684.
 — zincicum, II. 684.
Oxyacantha, II. 207.
Oxyacetas Ammoniacæ, 173.
 — Mercurii, II. 203.
Oxyarbonas Plumbi, II. 336.
 — Zinci impuri præcip., II. 684.
Oxychlorurem Calcii, 355.
Oxycoccus s. Oxyococcus, II. 661.
Oxycratum, 21.
Oxydulum Antimonii hydrosulphuratum aurantiacum, 229.
 — Arsenici album, 270.
 — Ferri, 638.
 — fuscum, 643.
 — nigrum, 638.
 — Hydrargyri Hahnemanni, II. 192.
 — ammoniacale, II. 192.
 — nigrum, II. 142.
 — salinum, II. 192.
Plumbi, II. 334.
 — semifusum, II. 334.
Stanni, II. 590.
 — Stibii per Acidum muriaticum, 213.
 — fuscum, 220.
 — griseum, 213.
 — hydrosulphurat., 229.
 — hydrosulphurat. rubrum, 223.
 — sulphurat. fuscum, 220.
 — semifusum, 220.
 — vitreatum, 214.
 — vitreum, 214.
Oxydum Aluminii, 181.
 — factitium, 182.
 — naturale, 181.
 — Antimonii album, 213, 215.
 — per præcipitationem, 215.
 — lotum, 215.
 — anratum, 229.
 — hydrosulphurat. aurantiacum, 229.
 — fuscum, 223.
 — rubrum, 223.
 — majus per Nitrum, 215.
 — minus, 213.

Oxydum Antimonii nitre-riaticum, 235.
 — non ablutum, 219.
 — cum Phosphate Calcis, 216.
 — per Potassam, 219.
 — sulphuratum aurantiacum, 229.
 — griseum, 214.
 — rubrum, 223.
 — cum Sulphure per Nitrat. Potass., 220, Croc. Ant.
 — vitrificatum, 214.
 — cum Cera, 214.
 — arsenicale album, 270.
 — Arsenici album, 270.
 — cum Sulphure to Stibii, 271.
 — sublimatum, 270.
 — Auri, 300.
 — ammoniat., 300.
Bismuthi, 329.
 — album, 330.
 — Cadmii, II. 695.
 — calcicum purum, 351.
 — Calcis, 351.
 — Cupri per Acidum vegetabile, 592.
 — viride, 592.
 — Ferri, 613.
 — fuscum, 643.
 — nigrum, 638.
 — pusill., 638.
 — rubrum, 614.
 — ferricum, 638, 641.
 — cum Aqua, 643.
 — crystallatum nativum, 641.
 — ferroso-ferricum, 638, 643.
 — ferrosium, 638.
 — Hydrargyri, II. 145.
 — ammoniacale, II. 192.
 — cinereum, II. 142, 193.
 — completum, II. 145.
 — mediante Ammon. præcip., II. 193.
 — nigrum, II. 142, 192.
 — mediante Ammonia præcip., II. 193.
 — nitratum, II. 145.
 — rubrum, II. 145.
 — per Acidum nitricum, II. 145.
 — nitrici, II. 145.
 — nitrico-antimoniale, 192.
 — nitricum, II. 145.
 — rubrum, II. 145.
 — per Acidum nitricum, II. 145.
 — saccharatum, II. 126.
 — salinum, II. 192.
 — sulphuricum, II. 191.
 — hydrargyricum, II. 145.
 — præcipitatum, II. 142.
 — præparatum, II. 145.
 — hydrargyrosium, II. 142, 193.
 — Hydrogenii — Aqua communis.
 — Kadmii, II. 695.
 — Magnesi, II. 98.
 — nigrum, II. 98.
 — nativum, II. 98.
 — Manganis nigrum, II. 98.
 — Mangani nativum, II. 98.
 — nigrum, II. 98.
 — nativum, II. 98.
 — Mercurii, II. 142.
 — album per Acidum sulphuricum, II. 191, 192.
 — griseum, II. 192.
 — nigrum, II. 192.
 — rubrum, II. 141.
Platinae, II. 338.

Oxydum Plumbi album, II. 336.
 — carbonatum, II. 336.
 — per Acid. acetos., II. 336.
 — flavum, II. 334.
 — fusum, II. 334.
 — griseum, II. 334.
 — pulvicum, II. 336.
 — rubrum, II. 334.
 — semifusum, II. 334.
 — semivitreum, II. 334.
 — plumbicum semivitreum, II. 334.
 — plumbosum, II. 334.
 — Stanni hydrosulphuratum, II. 592.
 — stibicum, 213.
 — cum Sulphure to Stibii, 220.
Stibii c. Acido muriatico oxygenato paratum, 223.
 — griseum, 213.
 — hydrosulphurat., 229.
 — rubro-fusum, 223.
 — non ablutum, 219.
 — cum Potassa non ablutum, 219.
 — potassum non ablutum, 219.
 — cum Subphosphate Calcis, 216.
 — sulphuratum — Vitæ Antimonii.
 — rubrum, 223.
 — vitreum, 214.
 — cum Sulphure vitrif., 214.
 — stibiosum, 215, 220.
 — Vismuthi, 329.
 — Zinci, II. 684.
 — cinereum, II. 684.
 — impurum, II. 684.
 — præparatum.
Tutia præcip.
 — nativum, II. 664.
 — zincicum, II. 684.
 — album, II. 684.
 — griseum, II. 684.
 — per præcipitationem, II. 685.
 — per se, II. 684.
Oxygenium, II. 300.
Oxygeno-chloruretum Potassii, II. 397.
Oxylapathum, II. 489.
Oxymel, 22.
 — Aeruginis, 682.
 — allii, 92.
 — Allii, 92.
 — antispasmodicum, 285.
 — Belladonnae, 297.
 — chalybeatum, 659.
 — Colchicis colchicum, 652.
 — colchiticum, 652.
 — opusatum, 692.
 — helleboratum, 741.
 — martiale, 659.
 — Narcissi pratensis, II. 233.
 — Nicotianæ, II. 238.
 — Oxyduli Cupri, 682.
 — pectorale, II. 6.
 — Primulae veris, II. 422.
 — saccharinum, 22.
 — Sambuci, II. 509.
 — Scillae, II. 541.
 — scillinum, II. 541.
 — scilliticum, II. 541.
 — simplex, 22.
 — Tabaci, II. 238.
 — tartarosum, II. 407.
Orymuris Calcis, 355.
 — Hydrargyri, II. 175.
 — Plumbi, II. 333.
 — Potassæ, II. 397.

- Oxynitras Hydrargyri et Ammoniae, II. 192.
 — et Ammoniae mellitus, II. 194.
 Oxyporphas Calcis, 366.
 Oxyssaccharum, 22.
 — Digitalis, 614.
 — emeticum, 213.
 — scilliticum, II. 541.
 Oxysepticum, 45.
 Oxytartaras, II. 398.
 Oxytriphylum, 16.
- P.
- Padus, 450.
 Paeonia, II. 301.
 — officinalis, II. 301.
 Palampisa, II. 636.
 Palma Christi—Ricinus comm.
 Palmae sebaceum, II. 243.
 Palmulae, 602.
 Paludapium, 254.
 Pampphilus Chirurgorum, II. 688.
 Pampini Vitis, II. 679.
 Panacea duplicata, II. 385.
 — de Holstein, II. 385.
 — Kornmanni, 300.
 — lapsorum, 269.
 — mercurialis, II. 156.
 — Mercurii rubra, II. 146.
 — tartarica, 715.
 Panada Anglorum, II. 304.
 Panavae lignum, 577.
 Panax Quinquifolium, II. 304.
 Panchymagogum mercuriale, II. 155.
 — quercetanum, II. 155.
 — Panacratium verum, II. 531.
 Panes purgantes et vermifugi, II. 171.
 — saccharati purgantes, II. 24.
 Panicum miliaceum, II. 304.
 Panis, II. 304.
 — albus, II. 304.
 — Cassaviensis, II. 614.
 — Cydoniorum, 597.
 — cum Aromatibus, 598.
 — compos., 598.
 — porcinus, 597.
 Papaver, II. 306. 307.
 — album, II. 307.
 — coeruleum, II. 307.
 — corniculatum, 467.
 — erraticum, II. 306.
 — nigrum, II. 307.
 — officinale, II. 246.
 — Rhoecae, II. 306.
 — somniferum, II. 246. 307.
 Pareira brava, 524.
 Parietaria, II. 313.
 — officinalis, II. 313.
 Parillina s. Perillinum, II. 516.
 Paris, II. 314.
 — quadrifolia, II. 313.
 Parnassia palustris, 743.
 Paronychia, 293.
 — argentea, II. 314.
 Parthenium, II. 105.
 Paspalum Dactylum, II. 314.
 Passae Ficus, 420.
 Passulae, II. 690.
 — anthelminticae, II. 449.
 — Corinthicae, II. 690.
 — Corinthinae, II. 690.
 — laxativae, II. 550.
 — majores, II. 690.
 — minores, II. 690.
 — vermifugae, II. 449.
 Pasta adstringens, 132.
 — Althaeae, 729.
 — amygdalata cosmetica, 183.
 — amygdalina, 182.
 — anticephalalgica, 749.
 — Apii, 235.
 Pasta arsenicalis, 273.
 — Cacao, 345.
 — cum Lichene Islandico, II. 65.
 — cocaotina, 345.
 — lichenifera, II. 65.
 — saccharata, 346.
 — cosmetica, 183.
 — Dactylorum, 602.
 — emulsiva, 182.
 — epilatoria, 269.
 — Glycirrhizae, II. 78.
 — de Gummi Arabico, 729.
 — gummosa, 729.
 — saccharata, 729.
 — Iridis Florentinae, II. 20.
 — Jujubarum, II. 36.
 — cum Lichene Islandico, II. 68.
 — lichenifera, II. 68.
 — linacina, 689.
 — Liquiritiae, II. 78.
 — anisata, II. 79.
 — fusca, II. 79.
 — nigra, II. 79.
 — opiacea, II. 79.
 — cum Opio, II. 79.
 — ad naevos, 354.
 — pectoralis, 728.
 — contra perniones, 137.
 — regia, 182.
 — rubefaciens et febrifuga, II. 491.
 — vesicatoria, 405.
 Pastinaca, II. 314.
 — Anethum—Aneth. graveolens.
 — Opopanax, II. 291.
 — sativa, II. 314.
 Pata lupina, 417.
 Patientia, II. 489.
 Pavonae lignum, 577.
 Pavonis stercus, 59.
 Pediluvium ex Armoracia, II. 437.
 — alcalinum, II. 330.
 — irritans, II. 437.
 — sedativum, II. 50.
 Pedra de porco spuria—Lapis porcinus.
 Pelias Berus, 681.
 Pellis Goulardi, II. 346.
 Peltigera aphthosa, II. 63.
 — canina, II. 63.
 — horizontalis, II. 63.
 — polydactyla, II. 63.
 — venosa, II. 63.
 Penaea Sarcocolla, II. 516.
 Pentaphyllum, II. 422.
 Perca fluviatilis, 358.
 Percarum lapides, 358.
 Perchloruretum Mercurii, II. 175.
 Perdeutoxysulphuretum Antimonii, 229.
 Perfoliata, II. 314.
 Pericyclum, II. 411.
 Periploca Indica, II. 516.
 — Secamone, II. 527.
 Perlae, 358.
 — textiles, 358.
 Permurius Hydrargyri, II. 175.
 Peroxydum Cupri, 583.
 — Ferri, 641.
 — stalactiticum, 641.
 — Hydrargyri, II. 146.
 — Manganesii, II. 98.
 — nigrum, 000.
 — nativum, II. 98.
 — Mercurii, II. 144.
 — Plumbi, II. 336.
 Persica, II. 316.
 — vulgaris, II. 314.
 Persicaria minor, II. 316.
 — urens, II. 316.
 Personata, 313.
 Persulphuretum Stanni, II. 592.
 Pervinca, II. 675.
 Pes Calumbi, 702.
 — Cati, 211.
 — Leonis, 81.
 Petasites, II. 316.
 — major, II. 316.
 — rubens, II. 316.
 — vulgare, II. 316.
 Petroleum, II. 317.
 — album, II. 317.
 — Barbadense—Petroleum.
 — nigrum, II. 317.
 — rectificatum, II. 317.
 — rubrum, II. 317.
 Petroselinum, 254.
 — Macedonicum, 336.
 Peucedanum, II. 317.
 — officinale, II. 317.
 — Ostruthium—Imperatoria O.
 — Silaus, II. 569.
 Peziza Auricula—Auricula Judae.
 — nanus, 628.
 — communis vulgaris, 628.
 Phasianus Gallus—Ova
 Phellandrium aquaticum, II. 317. 318.
 Philonium Romanum, II. 293.
 Phoenicites, 358.
 Phoenix dactylifera, 602.
 Phosphas ammoniaco-mercurialis, II. 190.
 — Ammoniacae, 168.
 — Ammoniae, 168.
 — calcicum stibiatum, 216.
 — Calcii, 363.
 — Protoxydi acidus, 366.
 — Calcis, 363.
 — acidus, 366.
 — stibiatus, 216.
 — Cupri, 584.
 — Ferri, 647.
 — Hydrargyri, II. 190.
 — Magnesia, II. 92.
 — Mercurii, II. 582.
 — natrium, II. 582.
 — natrius cum Aqua, II. 582.
 — Sodae, II. 582.
 — et Ammoniaci, II. 583.
 Phosphorus, II. 319.
 — liquidus, II. 320.
 — pulveratus, II. 320.
 — urinae, II. 319.
 Phosphuretum Calcis, 354.
 Phrasium, II. 102.
 Phyllanthus Emblica, II. 225.
 Phyllitis, II. 544.
 Physalis Alkekengi, 88.
 Physica Islandica, II. 64.
 — nivalis, II. 63.
 — Prunastri, II. 64.
 Physeter macrocephalus, 142. 453.
 — microps—P. macroceph.
 — Orthodon, f. P. macroceph.
 — Tursio, f. P. macroceph.
 Phytolacca, II. 322.
 — decandra, II. 322.
 Picea, 2.
 Pichurim—Faba Pichurim.
 Picrotoxa, 544.
 Picrotoxinum, 544.
 Pigmentum Indicum, II. 1.
 — Urucui, II. 297.
 Pila Caprae Rupicaprae—Aegagropila.
 — marina, II. 322.
 Pilae Damarum, 369.
 — Rupicaprarum, 369.
 Pilosella, 744.
 Pilulae absorbentes, 631. II. 449. 578.
 — Acetatis Plumbi, II. 348.

Pilulae Acetatis Plumbi et Ipecacuanhae, II. 348.
 — Aconiti mercuriales, II. 182.
 — adstringentes, 135. 307. 442. 443. 635. 651. II. 45. 160. 227. 626. 637. 651.
 — et tonicae, 650.
 — aethiopicae, II. 141.
 — comp., II. 141.
 — albae, 646. II. 171.
 — Allii sativi, II. 416.
 — Aloëphanginae, III.
 — Aloës, 98.
 — et Agarici, 93.
 — amarae, 113.
 — et Asae foetidae s. c. As. foet., 99.
 — saponaceae, 99.
 — cum Colocynthide s. et Colocynthidis, 99.
 — compositae, 97.
 — crocatae, 111.
 — et Gummi Ammoniaci, 102.
 — martiales, 101.
 — cum Myrrha s. et Myrrhae, 111.
 — Myrrhae et Guajaci s. cum Myrrha et Guajaco, 218.
 — et Chinae, 113.
 — saponaceae, 97.
 — et Stalagmitidis cam-bogioidis, 732.
 — et Substantiarum foetidarum, 101.
 — et Tartari stibiati, 98.
 — cum Zingibere, 97.
 — aloëticae, 97.
 — amarae, 113.
 — martiales, 100. 101.
 — cum Myrrha, 116.
 — alterantes, 710. II. 160.
 — compositae, II. 161.
 — Plummeri simplices, II. 161.
 — Aluminis, 136.
 — amarae, 605. II. 449.
 — amaro-catharticae, 112.
 — contra amaurosos, 282.
 — Ambræ, 143.
 — de Ammoniaco, 721.
 — ex Ammoniaco cum Sulphure stibiato, 231.
 — Ammoniuretæ Cupri, 589.
 — analepticae, 218.
 — Andersoni, 103.
 — anethinae, 100.
 — Angelicæ, 116.
 — anglicæ, 97.
 — anodynae, 231. 560. 751. II. 267.
 — et sudorificæ, 246.
 — ante cibum, 113.
 — antihelminticæ, 117. 521.
 II. 161. 163. 165. 241. 493. 591.
 — purgantes, II. 161.
 — antiarthriticae, 164. 222.
 231. 247. 710. II. 143. 168.
 — antiasthmaticæ, 415.
 — anti diarrhoeicæ, II. 44.
 — antidysertericæ, 478. II. 275.
 — antiemeticae, II. 268. 291.
 — antiépépticæ, 262. II. 664.
 — antifebriles, 487.
 — antigalacticae, 372.
 — antigonorrhoeicæ, 307. 372.
 — antihypericæ, 316. II. 140.
 161. 163. 168. 183.
 — antihydripticæ, 724. II. 172.
 174.
 — antihystericae, 280. 433. 751.
 II. 218.

Pilulae antihystericae Josephi del Papa, 433.
 — opiatæ, 280.
 — antiictericæ, 117. 296. II. 159.
 — antilactosæ, II. 585.
 — antimoniales, 000.
 — compositæ, II. 164.
 — Kleinii, 223.
 — Antimonii compositæ, II. 164.
 — antiphlogisticæ, II. 348.
 — antirheumaticæ, II. 168.
 — antiscrophulosæ, II. 137.
 — antisepticae, 371.
 — antispasmodicæ, 262. 280.
 II. 218. 271. 664.
 — et tonicae, 372.
 — antispasticæ, 280.
 — antispylliticae, II. 164.
 167. 168. 183.
 — Plenckii, II. 126.
 — et resolventes, II. 159.
 — antiveneræ, II. 136. 143.
 147. 160. 185.
 — Kaempffii, II. 163.
 — Lassônne, II. 187.
 — Swediaur, II. 203.
 — aperientes, 100.
 — hydrargyratæ, II. 172.
 — laxantes, 117.
 — Stahlii, 635.
 — aperitivæ, II. 391.
 — aromaticae, 97.
 — Arseniatis Ferri, 275.
 — arsenicales, 272.
 — Arsenici, 272.
 — ad arthritidem, II. 143.
 — ex Asa foetida, 280.
 — Asae foet. s. Assae foet. compos., 99. 280.
 — helleboratæ, 283.
 739.
 — martiatae, 283.
 — saponatæ, 280.
 — scilliticae, 283.
 — simplices, 280.
 — asiaticæ, 272.
 — aureæ, 118.
 — Auri muriatici, 299.
 — Muriatis, 299.
 — ex Auro fulminanti, 301.
 — Bacheri, 738.
 — Baldingeri, II. 141. II. 626.
 — balsamicæ, 117. II. 227. 244.
 — aperitivæ, II. 625.
 — Junkeri, II. 637.
 — martiales, II. 227.
 — Mortonianæ, 25.
 — opiacæ, II. 264.
 — cum Opio, II. 264.
 — terebinthinatæ, II. 626.
 — Belladonnae, 296.
 — Bellostii, II. 136.
 — benedictæ Fulleri, 101.
 — benzoicæ, 26.
 — bilis, 631.
 — in bronchitidelenta, II. 318.
 — Brucini, 335.
 — cum Butyro Cacao, 347.
 — cachecticæ, 635.
 — caeruleæ, 689. II. 127.
 — Calcariae sulphurato-stibiatae, 234.
 — Cambogiæ comp., 103. 732.
 — camphoratæ, 371.
 — Cantharidum, 440.
 — cum Hydrargyro, 410.
 — mercuriales, 410.
 — opiacæ, 410.
 — Carbonum Kalinae, II. 375.
 — carminativæ, 631. 283.
 — Castorei comp., 433.
 — catarrhales, II. 170.

Pilulae catharticae, 555.
 — cathartico-diureticae, II. 170.
 — cephalicæ, II. 28.
 — chalybeatae, 635. 639. 645.
 — e Chelidonio, 468.
 — Chinae, 478.
 — aluminatæ, 136.
 — camphoratæ, 487.
 — compos., 487.
 — Chloruretæ Auri, 299.
 — ante cibum, 163. 113.
 — Cicutæ, 516.
 — coccinæ, 99.
 — Cocchii, 99.
 — cochiae, 99. 100.
 — Rhaïs, 99.
 — Colocynthidis comp., 99. 555.
 — extracti comp., 567.
 — communes, 111.
 — compos. Edinburgenses, 116.
 — Conii, 516.
 — cinnabarinæ, II. 155.
 — e Conio, 516.
 — cupratæ, 589.
 — Cupri ammoniaci, 589.
 — ammoniacalis, 581.
 — e Cupro ammoniaco, 589.
 — de Cynoglossio, II. 272.
 — cum Castoreo, II. 273.
 — demulcentes, 728.
 — deprimentes, II. 214.
 — depurantes, II. 162. 173.
 — desobstruentes, 102. 640. 721.
 II. 533.
 — diaphoreticæ, II. 142. 162.
 — diaphoretico-sedativæ, 227.
 — stibiatae, 218.
 — ad diarrhoeam, II. 44.
 — de Digitali, 612.
 — Digitalis purpureæ, 612.
 — diureticae, II. 174. 625. 637.
 — resolventes, II. 533. 534.
 — roborantes, II. 637.
 — Dulcamaræ, 618.
 — de duobus, 118.
 — ecoproticæ, 101.
 — ephraticæ, 112. 118. II. 448.
 — Elaterii comp., II. 212.
 — ex Elaterio, II. 212.
 — Emanuelis, 112.
 — emeticae, 586.
 — emmenagogæ, 634. 640. 645.
 724. II. 38. 166. 218.
 — et deprimentes, II. 215.
 — irritantes, 651.
 — excitantes, 262. 560. II. 241. 428.
 — expectorantes, II. 12. 165. 534. 690.
 — Extracti catholici, II. 528.
 — Opium, II. 272.
 — febrifugæ, 487.
 — Anglicæ, 478.
 — Fellis Tauri amarae, 631.
 — Ferri comp., 615. 651.
 — cum Myrrha, 645.
 — Sulphatis, 651.
 — sulphurici, 649.
 — comp., 651.
 — e Ferro laxantes, 640.
 — ferulacæ cum Ammono, 280.
 — cum Arnica et Tartaro stibiato, 282.
 — camphoratæ, 283.
 — foetidæ, 280.
 — majores, 553.
 — martiatae, 000.
 — fundantes, 170. 646.
 — Galbani comp., 337.
 — e Galbano martiatae, 634.

Pilulae Gambogiae comp., 103.
 — et Scammoniae,
 II. Add.
 — e Gentiana crocatae, 113.
 — contra gonorrhoeam, II.
 137. 166.
 — de Graphite, 637.
 — graphiticae, 637.
 — Griffithii, 645.
 — Guajaci, 716.
 — cum Hydrargyro, Stibio et Extractis narcoticis, 222.
 — cum Stibio, 233.
 — guajacinae, 716.
 — comp., 710.
 — de Gummatibus, 337.
 — Gummi Ammoniaci, 721.
 — Guttae aloëticae, 103.
 — gummi-resinosae, II. 227.
 — gummosae, 280. 337.
 — laxativae, 97. 337.
 — Hahnemanni, II. 194.
 — Hellebori, 738.
 — aloëticae, 739.
 — balsamicae, 739.
 — compos., 738.
 — ex Helleboro et Myrrha, 738.
 — de Hiera, 98.
 — Hiera cum Agarico, 98.
 — Humuli Lupuli, II. 85.
 — hydragogae, 578. 612. II.
 165. 170. 212. 412. 534.
 — Bontii, 103.
 — Janioi, II. 165.
 — Hydrargyri, II. 127.
 — gummosae, II. 125.
 — jalappinae, II. 170.
 — Muriatis camphoratae s. et Camphorae, II. 160.
 — et Oxyl. Stib. hydrosulph., II. Add.
 — oxydati, II. 182.
 — oxydulati nigri, II. 194.
 — Oxymuriatis, II. 203.
 — Submuriatis composita, II. 162.
 — ex Hydrargyro catharticae, II. 169.
 — diureticae, II. 194.
 — muriatico miti, II. 159.
 — cum Sulphure stibiato aurantiaco, II. 151.
 — nitrico, II. 196.
 — oxydulato nigro, II. 104.
 — Hydroiodatis Potassae, II. 9.
 — Hydrochloratis Manganesii, II. 98.
 — hypopicae Bontii, 103.
 — hypnoticae, II. 263.
 — hystericae, 337.
 — incisivae, 91. 640. II. 534.
 — incitantes, 560. II. 428.
 — iodatae, II. 8.
 — Iodii, II. 8.
 — Iodureti Mercurii, II. 188.
 — Jalapae, II. 28.
 — comp., II. 170.
 — ex Jalapae Resina, II. 170.
 — Jamesii, 218.
 — Kali sulphurici aloët., 103.
 — kermesinae, 228.
 — Keyseri, II. 204.
 — e Kino comp., II. 44.
 — et Camphora, II. 44.
 — lac pellescentes, 372. II. 167.
 585.
 — laxantes, II. 24. 28. 170.
 585.
 — cum Mercurio, II. 170.

Pilulae laxantes et resolventes,
 II. 171.
 — laxativae, II. 28.
 — lenientes, 728. II. 214. 215.
 250. 686.
 — Mesues, II. 272.
 — de Leslie, II. 172.
 — lithonripticae, II. 578.
 — Lucis majores, 100.
 — lunares, 262.
 — Macchiavelli, 112.
 — majores, 553.
 — Hoffmanni, II. 181.
 — Manganis muriatici, II. 98.
 — martiales, 634. 639. 645. 651.
 669.
 — martiatae cum Galbano et Myrrha, 651.
 — mastichinae s. e Mastiche, 104.
 — Meglini, 751.
 — Mellis hydrargyri, II. 127.
 — menagogae, 651.
 — catharticae, 118.
 — ad menstrua, 101. 113.
 — mercuriales, II. 128. 136.
 167. 168. 170. 187.
 — ammoniacales, II. 202.
 — camphoratae, II. 166.
 — diureticae, II. 191.
 — Moscati, II. 143.
 — Noltii, II. 203.
 — Plenki, II. 125.
 — compos., II. 126.
 — cum Opio, II. 126.
 — purgativae, II. 136.
 — saponaceae, II. 170.
 — Mercurii glycyrrhizati, II. 127.
 — melliti, II. 127.
 — terebinthinat, II. 128.
 — ex Mercurio dulci, II. 159.
 — et Camphora, II. 160.
 — et Guajaco, II. 168.
 — et Jalapa comp., II. 170.
 — saponaceae, II. 170.
 — comp., II. 170.
 — simplices, II. 169.
 — et Opio, II. 172.
 — comp., II. 164.
 — glycyrrhizato, II. 127.
 — mellato, II. 127.
 — solubili Hahnemanni, II. 194.
 — sulphurato stibiato, II. 141.
 — terebinthinato, II. 128.
 — ad morbos cutaneos, 231.
 — deploratos, 218.
 — Mortoni, 25.
 — moscoviticae, 562.
 — Moschi s. moschatae, II. 218.
 — Muriatis Hydrarg. oxydulati stibiatæ, II. 165. utrl. Pil. Hydr. Mur.
 — Myrrhae cum Arnica, II. 227.
 — amarae cum Ammoniaco, II. 227.
 — compos., 280. 645.
 — et Ferri, 645.
 — cum Myrrha et Guajaco, 218.

Pilulae narcoticæ, II. 12.
 — narcoticae, 416. II. 260.
 — Neapolitanae, II. 136.
 — Nicotiana, II. 235.
 — Nitratu Argentii fusi, 262. et Add.
 — opiatæ, II. 267.
 — Opium comp., II. 272.
 — saponaceae, II. 270.
 — ex Opio, II. 267.
 — opticae, 100.
 — orientales, II. 272.
 — Oxydi Antimonii et Sulphureti Mercurii, II. 137.
 — Oxymuriatis Hydrarg. et Ammoniacæ, II. 194.
 — pectorales, 231. 575. 721. II. 533.
 — opiaceae, II. 264.
 — tonicae, 645.
 — perpetuae, 213.
 — physagogae, II. 534.
 — piceae, II. 331.
 — Picis, II. 331.
 — Plumeri, II. 161.
 — compos., II. 162.
 — simplices, II. 161.
 — polychrestae, II. 147.
 — balsamicae, 112.
 — Starkeyi, 737.
 — e Praecipitato rubro, II. 147.
 — Pringelii, II. 172.
 — prophylacticae ad variolas, II. 161.
 — Protochlorureti Mercurii, II. 159.
 — cum Sulph. Antim. aurato, II. 161.
 — purgantes s. purgativae, 89. 117. 567. 577. 732. 739. II. 24. 28. 135. 160. 170. 172. 528.
 — dietæ Pievani, 118.
 — cum Hydr. muriat. miti, II. 169.
 — cum Calomelle, II. 169.
 — cum Mercurio, II. 170.
 — purificantes, 231.
 — ad putredinem nosocomialem, II. 218.
 — Pyrethri, II. 428.
 — relaxantes, 79.
 — e Resina Jalapae, II. 170.
 — resolventes, 102. 170. 247. 300. 510. 612. 634. 640. 646. 673. 721. II. 140. 143. 149. 163. 164. 165. 168. 395. 415. 448. 628. 647. 626.
 — diureticae et deprim., 612.
 — Finkii, II. 162.
 — cum Mercurio, II. 162.
 — et purgantes, 220.
 — cum Rheo, II. 418.
 — in scrophulis, 316.
 — Stahlis, 100.
 — rhabarbarinae antacidæ, II. 449.
 — Rhei, II. 448.
 — compos., 116.
 — palmatis, II. 448.
 — e Rheo cum Natro acetico, II. 448. 585.
 — Rhois toxicodendri, II. 461.
 — Richteri, 247.
 — roborantes, 585. II. 227.
 — ad blennorrhoeam, II. 449.
 — Ruffi, 111.
 — sanitatis Frankii, 104.
 — di Santa Fosca, 118.
 — saponaceae, 354. II. 415.
 — Saponis, II. 415.
 — aloëticae, 97.
 — compos., II. 170.

Phylloae Saponis cum Opio. 270.
 — Scammonii hydrargyrosæ, II. 187.
 — e Scammonio comp., II. 187.
 — mercuriales, II. 187.
 — Schmuckeri, 247.
 — Scillæ, II. 632.
 — scillinae et Mariæ Hydrarg. oxydul., II. 174.
 — scilliticae scillinae, II. 632.
 — scoticæ, 103.
 — contra scrophulas, II. 137.
 — sedantes et bechicæ, II. 250.
 — sedativæ, 272. 750. II. 263.
 686.
 — Sedilloti, II. 131.
 — sialegogæ, II. 173. 182.
 — Sodæ Subcarbonatis, II. 678.
 — solares Wildegansii, 301.
 — solventes del Porati, II. 415.
 — specificæ, II. 202.
 — splenicæ, 102. 117.
 — ad sputum sanguinis Dekkers, II. 274.
 — Stahlii, 100. 218.
 — sthenicæ, II. 124.
 — stibiatae, 222. 246.
 — cum Opio et laxantibus resinosis, 222. 931.
 — e Stibio et Hydrargyro, II. 161.
 — stimulantes, II. 377. 449.
 — ad gonorrhœam, II. 45. 637.
 — stomachicæ, 113. 116. 487. 686. II. 227.
 — e Storace, II. 269.
 — Strychnini, II. 594.
 — stypticæ, II. 348.
 — de Styrace sine Ambra, II. 269.
 — e Styrace, II. 269.
 — Subcarbonatis Cupri et Ammoniaci, 584.
 — Sodæ, II. 578.
 — ex Sublimato corros. — Pil. majores Hoffm.
 — de Sublimato et Opio, II. 184.
 — Suboxydi Hydrargyri, II. Add.
 — Sulphatis Cupri et Ammoniaci, 589.
 — Succini Cratonis, 104.
 — de Succino, 104.
 — — auctæ, II. Add.
 — sudorificæ, 710.
 — — lenientes, 228.
 — — sedativæ, 228.
 — spæcicæ, II. 102.
 — Sulphatis ammonico-cuprici, 589.
 — Ferri, 649.
 — comp., 650. 651.
 — Potassæ aloëticæ, 103.
 — sulphurato-stibiatae cum Arnica et Camphora, 231.
 — — cum Cicuta, 231.
 — Sulphureti Antimonii et Calcis, 234.
 — syphiliticæ, II. 147.
 — systema nervosum et musculare vellicantes, 262. II. 240.
 — Tabaci, II. 235.
 — Taddei, II. 184.
 — contra tæniam, 316. II. 137. 626.
 — Tartaræ Rontii, 103.
 — — Schroederi, 191.
 — e Tartaro boraxato, II. 412.
 — temperantes, 612.
 — e Terebinthina, II. 626. 637.
 — thebaicæ, II. 267.

Phylloae Thomsoni. 669.
 — tonicæ, 220. 336. 609. 662.
 — 686. 634. 645. 651. 659. 695.
 — — et anodynæ, 478.
 — — et antispasmodicæ, 218.
 — — Bacheri, 738.
 — — et hypnoticæ, II. 272.
 — — et lenientes, 478.
 — — nervinæ, 651.
 — — et purgantæ, II. 550.
 — — torpentes et resolventes, II. 51.
 — Toxicodendri, II. 461.
 — traumaticæ, II. 626.
 — de tribus, 117.
 — ad tussim Schroederi, II. 272.
 — Unguenti mercurialis, II. 131.
 — Valerianæ ferulicæ, 280.
 — ad variolas, II. 161.
 — veneræ, 589.
 — Veratrinæ, II. 672.
 — de Vigarous, II. 160.
 — Vogleri, II. 182.
 — Werlhofii, II. 173.
 — Zelleri, II. 196.
 Pimenta, II. 326.
 Pimento, II. 326.
 Pimpinella alba, II. 322.
 — Anisum, 297.
 — dissecta — P. Saxifraga.
 — hircina, II. 322.
 — hortensis, II. 323.
 — Italica, II. 323.
 — magna, II. 323.
 — minor, II. 323.
 — nigra, II. 323.
 — nostras, II. 322.
 — rubra, II. 323.
 — Saxifraga, II. 322.
 — umbellifera, II. 322.
 Pinckneya pubescens, 473. 1
 Pineolus, II. 324.
 Pinus Abies — Abies.
 — balsamea, I.
 — Canadensis, I.
 — Cembra, 303.
 — Larix — Larix Europ.
 — maritima, II. 617.
 — Mughus, 303. II. 627.
 — palustris — P. sylv.
 — Picea — Picea.
 — pinaster — P. sylv. var.
 — Pineæ, II. 324.
 — pumilio, 303.
 — sylvestris, II. 324. 617.
 Piper, II. 325.
 — album, II. 325.
 — Betel, 327.
 — caudatum, 578.
 — Cubeba, 578.
 — Hispanicum, II. 326.
 — Indicum, II. 326.
 — Jamaïcense, II. 326.
 — longum, II. 326.
 — nigrum, II. 325.
 — rotundum — P. nigrum.
 — Tabasci, II. 326.
 — Turcicum, II. 325.
 Piperæ, II. 325.
 Piperisum, II. 325. 329.
 Pista pro fonticulis, II. 620.
 Pissa, II. 329.
 Pissasphaltus — Petroleum, Asphaltus.
 Pistacia, II. 329.
 — Atlantica — P. Lentiscus.
 — Lentiscus, II. 103.
 — Terebinthus, II. 617.
 — vera, II. 329.
 Pistolochia, 263.
 Pix alba, II. 636.
 — atra, II. 636.
 — Burgundica, II. 636.

Pix Cadria, II. 820.
 — Graeca, II. 636.
 — liquida, II. 329.
 — — nigra, II. 329. 636.
 — navalis, II. 636.
 — solida, II. 636.
 — vegetabilis, II. 636.
 Plantago angustifolia, II. 331.
 — aquatica, II. 332.
 — arenaria — Psyllium.
 — Cynops, II. 331.
 — lanceolata, II. 331.
 — latifolia, II. 331.
 — major, II. 331.
 — media, II. 331.
 — Psyllium, II. 331.
 Platina, II. 333.
 Platinum, II. 333.
 Plumbago, 637.
 — Europæa, 609.
 Plumbi Acetas, II. 347.
 — Carbonas, II. 336.
 — Subcarbonas, II. 336.
 — Superacetas, II. 347.
 Plumbum, II. 333.
 — acetatum, II. 336.
 — aceticum, II. 346.
 — — crudum, II. 346.
 — — depuratum, II. 347.
 — carbonicum, II. 336.
 — hydrocyanicum, II. Add.
 — oxydatum — Plumbum.
 — — rubrum, II. 334.
 — phosphoricum, II. Add.
 — spathicum, II. 336.
 — ustum, II. 334.
 Poggereba, II. 364.
 Podalyria tinctoria — Sophora.
 Podophyllum peltatum, II. 364.
 Polanisia dodecandra, II. 364.
 Polium Creticum, II. 644.
 — montanum, II. 644.
 Pollen jutorum, 571.
 Polychroites, 673.
 Polygala, II. 365.
 — amara, II. 365.
 — amarella — P. amara.
 — Americana, II. 365.
 — rubella, II. 365.
 — Senega s. Seneka, II. 365.
 — Virgiana, II. 365.
 — vulgaris, II. 365.
 Polygalinum, II. 365.
 Polygonatum angulosum, 692.
 — latifolium, 692.
 — majus, 692.
 — vulgare, 692.
 Polygonum, 460.
 — aviculare, 460.
 — Bistorta, 330.
 — Fagopyrum, 639.
 — Hydropiper, II. 316.
 — Persicaria, II. 316.
 Polyopodium, II. 368.
 — Filix Mas — Athyrium.
 — vulgare, II. 368.
 Polyporus fomentarius, 78.
 — igniæ, 78.
 — officinalis, 78.
 — officinalis — A. garic. albus.
 Polytichum aureum, II. 368.
 — commune, II. 368.
 — vulgare, II. 368.
 Poma s. Poma acidula, II. 362.
 — Acajou, 431.
 — Auranfia, 626.
 — Borsdoriana, II. 368.
 — Citrea s. Citri, 636.
 — Colocynthidis — Colocynthides.
 — Renetia, II. 368.
 Pomatum albidissimum, 464.
 — ammoniacalesaponæ, 151.
 — antihæmorrhoidale, II. 251.

Pomatum antihyperpeticum, 228.
 354. II. 155. 159. 344. 346. 348.
 — Chevallierii, 356.
 — Goullardii, II. 346.
 — antipsoricum, 413. II. 148.
 605.
 — antispasmodicum, 434.
 — antivenerum, 298. II. 172.
 — Autenriethii, 243.
 — Belladonnae, 296.
 — camphoratum, 455.
 — Cantharidum, 405.
 — Carbonis, 413.
 — Desaulti, II. 150.
 — Deutochlorureti Mercurii,
 II. 181.
 — epispasticum, 405. 409.
 — ammoniacale, 154.
 — camphorat., 400.
 — escharoticum, 272.
 — Fabri, 244.
 — Gondreti, 154.
 — de Grandjean, 408.
 — ad haemorrhoides, II. 251.
 — Hellmundi, 271.
 — Jenneri, 243.
 — laurinum, II. 53.
 — leniens, 64. 378.
 — Lugdunense, II. 148.
 — contra lumbaginem, 164.
 — Lupulini, II.
 — mercuriale opiaceum, II.
 135.
 — oxygenat., II. 131.
 — Sanchezii, II. 131.
 — saponaceum, II. 135.
 — Naphae Florum, 529.
 — nitricum, 48.
 — ophthalmicum Pelletani,
 II. 148.
 — Oxydi Zinci, II. 686.
 — oxygenatum, 48.
 — de Papavere, Hyoscyamo
 et Belladonna, 755.
 — de Praecipitato rubro, II.
 148.
 — purgans, 554. II. 171.
 — Resinae viridis Mezerei, 603.
 — resolvens, 673. II. 175.
 — Saturni, II. 344.
 — Seminum frigid., 454.
 — stibiatum, 243.
 — Stramonii, 606.
 — sulphuro saponaceum, II.
 605.
 — à la sultane, 454.
 — ad tineam, 413. 673.
 — vesicatorium, 405.
Pompholyx, II. 684.
Pomum Citri, 636.
 — Hierosolymitanum, II. 211.
Populus, II. 369.
 — balsamifera, II. 369. 608.
 — nigra, II. 369.
 — tremula, II. 369.
Porcinus lapis — Lapis porci-
 nus.
Portlandia hexandra — China
 flava.
Portulaca, II. 370.
 — oleracea, II. 369.
Posca Galeii, II. 676.
Potassa, II. 377.
 — per Alcoholem, II. 372.
 — cum Calce, II. 372.
 — Calcis ope parata et fusa,
 II. 371.
 — caustica, II. 370. 372.
 — cum Calce, II. 372.
 — fusa, II. 371.
 — fusa, II. 371.
 — impura, II. 377.
 — liquida, II. 370.
 — praeparata, II. 378.
 — pura, II. 370.

Potassa pura liquida, II. 370.
 — fusa, II. 371.
 — purificata, II. 378.
 — sulphurica, II. 385.
 — venalis, II. 377.
 — vitriolata, II. 385.
Potassae Acetas, II. 398.
 — Carbonas, II. 384.
 — et Sodae Tartras, II. 412.
 — Euchloras, II. 397.
 — Subcarbonas, II. 377. 378.
 — Sulphas, II. 385.
 — cum Sulphure, II. 385.
 — Sulphuretum, II. 375.
 — Supercarbonas, II. 377.
 — Supersulphas, II. 388.
 — Supertartras, II. 400.
 — impura, II. 406.
 — Tartras, II. 404.
Potassium Myrrhae, II. 228.
Potassium, II. 370.
Potentilla, II. 421. 422.
 — Anserina, II. 421.
 — reptans, II. 422.
 — Tormentilla — Torment.
 eresia.
Poterium Sanguisorba, II. 323.
Pothos foetida, II. Add.
Potio absorbens, 148. II. 255. 381.
 578.
 — acetosa et oleosa, 22.
 — acida, 51.
 — acidula, 21.
 — acidulata, 59.
 — adstringens, 56. 133. 178.
 304. 331. 445. 447. 487. 496. 563.
 643. 679. II. 45. 71. 255. 414. 570.
 581.
 — et tonica, 494.
 — aetherea, 76.
 — camphorata, 376.
 — alba, 304.
 — alcalina, II. 384.
 — gasosa, 28.
 — alcoholica camphorata, 376.
 — alexipharmaca, 189.
 — alterans, 242.
 — aluminosa, 140.
 — amara, 602.
 — — antifebrilis, 68.
 — ammoniacalis, 166.
 — — Peyrilhe, 164.
 — ammoniata, 164.
 — ad anginam malignam, 245.
 — anglica, II. 100.
 — anodyna, 284. II. 126. 312.
 — anemetica, II. 14.
 — anthelmintica, 520. II. 464.
 — — aloëtica, 96.
 — — parum laxans, 520.
 — — oleoso-aromatica, II. 464.
 — antiacida, II. 91.
 — antiarthritica, II. 710. 716.
 — antiasthmatica, 147. 177.
 II. 381.
 — anticatarrhalis, 211. II. 438.
 542.
 — antichlorotica, 56.
 — anticolicca, II. 100.
 — anticynanchica, 245.
 — antidiarrhoëica, 170.
 — antidysenterica, II. 253.
 — antiemetica, 445.
 — antiepileptica, 677. II. 665.
 — antifebrilis, 34. Mixt. Ac.
 mur.
 — antigonorrhoeica, 304.
 — antihæmorrhagica, 51. 488.
 II. 251.
 — antihyperpeticæ, II. 376.
 — antihydrophobica, 177.
 — antihydropsica, II. 101.
 — antihysterica, 180. 439.
 — antiicterica, II. 400.
 — antilactosa, II. 381.

Potio antilyssica, 177. II. 113.
 — antinarctica, 551.
 — antinephretica, 731. II. 395.
 — antiperiodica, II. 262.
 — antiphlogistica, II. 392.
 — — laxans, 247.
 — antipleuretica, 219.
 — antirachitica, II. 486.
 — antiscorbutica, 487. II. 382.
 — antiscrophulosa, 166. 493.
 II. 579.
 — antiseptica, 30. 177. 489. 494.
 — antisoporosa, 242.
 — antispasmodica, 48. 69. 147.
 180. 219. 433. 439. 464. 470. II. 14.
 121. 220. 242. 288. 381. 666.
 — — et diuretica, 77.
 — — et resolvens, 77.
 — — et tonica, 488.
 — antistrumalis. antistrumo-
 sa, II. 381.
 — antisymphilitica, II. 178.
 — antitetanica, 169.
 — antimovistica, 28. II. 14.
 — aperiens s. aperitiva, II.
 392. 400.
 — contra aphonium, 87.
 — aromatica, 576.
 — contra asthma, 147.
 — asthmatica, 177.
 — ad atram bilem, II. 405.
 — balsamica, 304.
 — bechica, 176.
 — camphorata, 376.
 — Capivi, 304.
 — Carbonatis Calcis, 363.
 — cardiaca, 166. 666. 670.
 — carminativa, 147. II. 120.
 252.
 — ad catarrhum, II. 438. 542.
 — cathartica, II. 92. 93. 585.
 — cathartico - diaphoretica,
 217.
 — Chinae comp., 490.
 — cum Chinae decocto, 493.
 — — pulvere, 482.
 — chlorica, 511.
 — Choparti, 306.
 — confortans, 496. 577.
 — — acidulata, 577.
 — Copahu s. Copaivæ comp-
 304.
 — cordialis, 576. II. 288.
 — — diuretica, II. 5.
 — cum Creta, 303.
 — cretacea, 363.
 — demulcens, 729. II. 496.
 — d-primens, II. 852.
 — cum Deutochlorureto Mer-
 curii, II. 178.
 — diaphoretica, 176. 181. 219.
 246.
 — — et bechica, 219.
 — contra diarrhoeam, 178.
 — digestiva — Inf. am cum
 Natro.
 — diuretica, 48. 73. 177. 310.
 402. 457. 511. 551. 613. 616. II.
 238. 382. 391. 392. 400. 401. 410.
 411. 536. 539. 542. 632.
 — — et leniens, II. 403.
 — — Milmanni, II. 402.
 — drastica, 78.
 — contra ebrietatem, 147.
 — effervescentes, 28.
 — emetica, 228. 240. 245. 289.
 II. 15.
 — — cordialis, 242.
 — — emeto-cathartica, 247.
 — — laxans, 247.
 — emetisata, 240.
 — emmenagoga, 374. 402. 657.
 II. 40. 41. 491.
 — emulsiva, 183.
 — Eulæae composita, II. 6.

Potio excitans, 377. 380. 497. 511.
 II. 209. 244. 321. 401. 666.
 — et antispasmodica, II.
 665.
 — martialis, 662.
 — nervina, 268.
 — et resolvens, II. 452.
 — expectorans, 48. 177. 231.
 241. 284. 516. 614. 616. 685. 719.
 II. 381. 541. 599.
 — et incisiva, II. 16.
 — febrifuga, 274. 276. 498. 508.
 550. II. 15. 206. 391. 579.
 — amara, 483.
 — et laxativa, 488.
 — ferruginosa, 650. 656.
 — frigida martialis, 669.
 — fundans, 245.
 — gummosa s. gummata, 729.
 II. 653.
 — scillitica, II. 643.
 — gummoso-opiacea, II. 313.
 — haemastatica, 140. 651.
 — ad herpetem, II. 376.
 — Hulmii s. Hulmiana, 30.
 — hydragoga, 245. 468. 614.
 II. 40. 410. 658.
 — hypnotica, II. 251. 256. 312.
 — incisiva, II. 383. 543.
 — incitans, 497.
 — juniperina, II. 40.
 — cum Kermetes. Kermetica,
 228.
 — laxans, II. 92. 406. 564. 583.
 610. 611.
 — oleosa, II. 552.
 — laxativa, II. 100. 388. 562.
 — et leniens, II. 452.
 — oleosa, II. 558.
 — et et resolvens, II. 452.
 — et sedans, II. 452.
 — — Viennensis, II. 562.
 — leniens, 27. 188. 455. 615.
 729. II. 75. 215. 231. 251. 252.
 265. 310. 312. 393.
 — Andry, II. 126.
 — lithontripica, 34. II. 92.
 380. 385. 579.
 — cum Mauna et Rheo, II.
 456.
 — Mannae tamarindata, II. 100.
 — Martis aurata, 654.
 — salita, 664.
 — mercurialis, II. 123.
 — Plenkii, II. 124.
 — Mercurii vivi, II. 123.
 — narcotica, II. 214. 265.
 — nervina, 439.
 — nitrata s. nitrosa, II. 392.
 — nutrita et sedans, II. 51. 66.
 — ocytica, II. 546.
 — oleosa, 188. II. 653.
 — — drastica, 678.
 — — leniens, 189.
 — oxygenata, II. 397. et Add.
 oxymellata, 22.
 — paregorica, II. 251.
 — partum accelerans, II. 546.
 — pectoralis, 37. 38. 221. 246.
 310. 620. 719. 728. II. 103. 252.
 367. 496.
 — amara, 490. II. 306.
 — pellens, II. 381.
 — peruviana, 310.
 — phosphorata, II. 320.
 — pices, II. 330.
 — purgans s. purgativa, 229.
 248. 431. 578. II. 26. 32. 91. 100.
 405. 410. 445. 450. 460. 404. 530.
 564. 583. 611.
 — — anglica, II. 29.
 — — camphorata, II. 566.
 — — pro infantibus, II. 406.
 — et febrifuga, II. 362.

Potio pargans maior, II. 26.
 — et tonica, II. 456.
 — et vermifuga, II. 450.
 666.
 — ad rabtem, II. 113.
 — refrigerans, II. 393.
 — resolvens, 245. II. 10. 388.
 — — ex Iodio, II. 9.
 — et laxans, II. 452.
 — — Mutzelii, II. 405.
 — Ræverii, 28.
 — roborans, 496.
 — — aoidulata, 577.
 — salina, II. 93.
 — — mannata, II. 100.
 — — purgans, 247.
 — saponacea, II. 381. 417.
 — scillitica acidulata, II. 542.
 — sedans et leniens, II. 255.
 — — et diuretica, II. 393.
 — sedativa s. sedans, 751. II.
 81. 256. 403.
 — sistens, 576.
 — solutiva cum Cassia, 431.
 — stibiata, 249.
 — stibio-opiacea, 246.
 — stimularis, 165. 335. II. 9.
 594. 632.
 — et tonica, 489.
 — stomachica, 98. 331. 561. II.
 121. 432.
 — — visceralis, 8.
 — ad strumam, II. 311.
 — sudorifica, 171. 176.
 — sulphurata, II. 604.
 — sulphurea, II. 376.
 — contra taeniam, 306. II.
 631.
 — tartarica composita, II. 410.
 — tartaro-boracica, II. 411.
 — temperans, 297. 439. 616.
 731. II. 154. 392. 409.
 — terebinthinata, II. 618.
 — tetanica, 159.
 — tonica, 178. 207. 234. 393.
 487. 489. 492. 493. 494. 496. 497.
 500. 503. 576. 650. 700. II. 288.
 452.
 — et antispasmodica,
 488. 576.
 — — adstringens, II. 251.
 — — camphorata, 488.
 — — martialis, 662.
 — — tonico-anodyna, 560.
 — ad termina infantum, 461.
 — ad tussim convuls., II. 351.
 — vermifuga, 143. 470. 552.
 733. 743. II. 672. 645.
 — Viennensis, II. 562.
 — vinosa, 388. II. 676.
 — vomitiva, 240. II. 13. 15.
 — — stibiata, 240.
Potus cum Acido tartarico, 59.
 — acidus, 22. 53.
 — — mineralis, II. 53. et Add.
 — — vegetabilis, II. Add.
 — Aetheris sulphur. alcoho-
 — — lis, II. Add.
 — — aluminosus, 138.
 — — analecticus, 87.
 — — antichloroticus, 56.
 — — antifebrilis acidulus, 55.
 — — antiphlogisticus, diapho-
 — — reticus et leviter laxans, 241.
 — — — diureticus, II. 395. 396.
 — — — leviter laxans, 242.
 — — ad blenorhoeam, 304.
 — — carminativus, II. 43.
 — — Cerasorum, 452.
 — — Citri stibiatus, 242.
 — — communis incitans, 86.
 — — diureticus, II. 43.
 — — simplex, II. 401.
 — — hydrocyanicus, 38.

Potus mercurialis Balleti, II.
 107.
 — muriatico-acidus, 33.
 — Oryzae citratus, II. 298.
 — oxymelatus, II. 397.
 — oxymelicus, 22.
 — ad perniones, 138.
 — ex Pomis, II. 398.
 — Pomorum, II. 368.
 — Sacchari Lactis, II. 46.
 — spirituosus, 86.
 — sulphurico-salinus, II. 388.
Præcipitatus albus, II. 156. 199.
 — flavus, II. 191.
 — niger, II. 192.
 — per se, II. 145.
 — roseus, II. 491.
 — ruber, II. 145.
 — solubilis niger, II. 192.
 — viridis, II. 147.
 — Wurtzii, II. 190.
Prassium, II. 700.
Priapus Cervi, 682.
 — Ceti, 682.
 — Tauri, 682.
Primula officinalis, II. 422.
 — veris, II. 422.
Prinos, II. 422.
 — verticillatus, II. 422.
Propolis, 254.
Protoacetas Barii, 318.
 — Calcii, 368.
 — Mercurii, II. 293.
 — Plumbi, II. 346.
 — Potassii, II. 398.
 — Sodii, II. 585.
Protocarbonas Magnesii, II. 88.
 — Potassii, II. 394.
 — — et Ammoniaci, II. 385.
 — Sodii, II. 579.
Protochloras Potassii, II. 397.
Protochloruretum Ferri, 652.
 653.
 — Hydrargyri, II. 165.
 — Mercurii, II. 155.
Protocitras Calcii, 368.
 — Ferri, 602.
 — Potassii, II. 403.
Protogallas Plumbi, II. 362.
Prothydiotas Potassii, II. 8.
Prothydrochloras Calcii, 307.
 — Ferri solidus s. crystallis,
 653.
 — Magnesii, II. 91.
 — Mercurii, II. 156.
 — Potassii, II. 397.
 — Sodii, II. 676.
Prothydrocyanas Potassii, 38.
Prothydroferrocyanas Potassii,
 38.
Prothydrosulphas Calcii, 366.
Prothydrosulphocyanas Ferri,
 670.
 — Potassii, 39.
Protohyposulphites Potassii, II.
 389.
 — Sodii, II. 585.
Protoiodas Mercurii, II. 198.
Protoioduretum Mercurii, II.
 188.
Protomalas Ferri, 660.
Protomeconas Sodii, II. 586.
Protonitras Barii, 318.
 — Hydrargyri solutus, II. 195.
 — Mercurii, II. 194.
 — — et Ammoniaci, II. 198.
 — Plumbi, II. 339.
 — Potassii, II. 389.
 — Sodii, II. 685.
Protooleomargaras Plumbi, II.
 352.
 — Potassii, II. 413.
 — Sodii, II. 686.
Protophosphas Calcii acidus
 366.

Protosulfas, f. Protosulfphas.

- Protosulfas Barii, 317.
 — Calcii, 306.
 — cum Deutosulphate Sodii, II. 91.
 — Ferri, 648.
 — Magnesia, II. 92.
 — Potassii, II. 385.
 — et Ammoniaci, II. 388.
 — et Magnesia, II. 388.
 — Sodii, II. 583.
 Protosulphites Potassii, II. 389.
 — Sodii, II. 585.
 Protosulphuretum Antimonii, 221. 223.
 — Cupri, 583.
 — Stanni, 51. 592.
 Prototartras Antimonii, 236.
 — et Potassii, 236.
 — Potassii, II. 404.
 — et Ammoniaci, II. 413.
 — et Ferri, 663.
 — et Sodii, II. 422.
 Protoxychloruretum Calcii, 355.
 — Sodii, II. 575.
 Protoxydum Antimonii, 213.
 — Barii, 317.
 — Calcii, 359.
 — Cobalti, 643.
 — Ferri, 638.
 — Hydrargyri nitrico-ammoniacale, II. 192.
 — Plumbi, II. 334.
 — Potassii, II. 370.
 — Sodii, II. 574.
 — Stanni, II. 592.
 — Stibii griseum, 213.
 — sulphuratum fusc., 220.
 — Zinci, II. 684.
 — impurum, II. 684.
 Protoxyphosphuretum Calcii, 354.
 — Potassii, II. 374.
 — Sodii, II. 571.
 Pruna agrestia — Prunus spinosa.
 — Damascena — Prunus domestica.
 — laxativa, II. 529.
 — praeparata s. purgans, II. 529.
 Prunella, II. 422. 423.
 — vulgaris, II. 422.
 Prunellus sylvestris, 15. II. 423.
 Prunus, II. 423.
 — Avium — Cerasus.
 — Cerasus — Cerasus.
 — domestica, II. 423.
 — Laurocerasus — Lauro-Cerasus.
 — Padus, 450.
 — spinosa, 15. II. 423.
 — Virginiana, II. Add.
 Prussias Lixiviae et Ferri, 38. 670.
 — Mercurii, II. 139.
 — Potassae et Ferri, 38. 670.
 Pseudocacus, II. 18.
 Pseudoalcaninum, 192.
 Pseudo — Angustura, 208.
 Psoralea glandulosa, 530.
 — pentaphylla, 505.
 Psychotria emetica, II. 11.
 Psyllium, II. 331.
 Ptarmica, II. 424.
 — montana, 266.
 Pteris aquilina, II. 494.
 Pterocarpus Draca, II. 512.
 — erinacea — Kino.
 — officinalis — Pt. Draca.
 — santalinus, II. 512. 513.
 Ptitana Callaci, 000.
 — Datisbii, 541.
 — hippocratica, 745.
 — laxativa, II. 562.
 — Oryzae, II. 398.

- Ptisana ex pane, II. 304.
 — passulata, II. 502.
 Pulegium, II. 423.
 Pulicaria, II. 331.
 Pulmonaria arborea, II. 64.
 — Gallica, 744.
 — maculosa, II. 426.
 — officinalis, II. 426.
 Pulpa Caricarium, 421.
 — Cassiae, 429.
 — pro clysteribus, 429.
 — compos., 430.
 — Fistulae, 429.
 — Ceparum, 89.
 — Gynorrhodontis, II. 467.
 — Dactylorum, 602.
 — Bbuli, II. 608.
 — emolliens, 123.
 — Ficum, 421.
 — Jujubarum, II. 35.
 — Lilii, II. 72.
 — Melimelorum, II. 368.
 — Passularum, II. 660.
 — Pomorum dulcium, II. 368.
 — Prunorum, II. 423.
 — — depurata, II. 423.
 — Sambuci — Roob Samb.
 — Scillae, II. 531.
 — Sorbi Baccarum, II. 582.
 — Tamariudorum, II. 609.
 — Uvarum, II. 680.
 Puls arsenicalis, 272.
 Pulsatilla coerulea, 193.
 — minor, 194.
 — nigricans, 194.
 — vulgaris, 193.
 Pulticula de Manna, II. 99.
 — saponacea, II. 449.
 Pulvis contra abortum, II. 475.
 — absorbens, 217. II. 39. 447.
 — Wedelii, II. Add.
 — pro usu externo, II. 545.
 — ex Acido tartarico, 58.
 — aciculis, 58.
 — Aconiti, 61.
 — foliorum, 60.
 — aitratus, 61.
 — contra acridinem — P ab-
 sorb. 217.
 — adstringens, 135. 585. 643.
 646. II. 41. 269. 512. 604.
 — aërophorus, 28. II. 89.
 — e Magnesia carboni-
 ca, II. 89.
 — e Natro carbonico aci-
 dulb, 28.
 — ex Aethiöpe antimoniäli,
 II. 140.
 — aethiopicus, II. 141.
 — alexipharmacus, 132. II. 394.
 — Camerarii, 132.
 — Rollvagii, 132.
 — ruber, II. 304.
 — sinicus, II. 218.
 — alexiterius, 265. 505. II. 12.
 269.
 — Algethoi, 215. 215.
 — Aloë cum Canella, 104.
 — compositus, 101.
 — cum Gubaço, 104.
 — alterans comp., II. 102.
 — Plumbari, II. 161.
 — Aluminis comp., 135.
 — cum Kino, 135.
 — kinosatus, 135.
 — aluminoso-mercurialis, II.
 147.
 — aluminosus, 132. 136.
 — Helvetii, 135.
 — amarus, 594.
 — ferratus, 640.
 — ammoniato — camphorat.,
 164.
 — Ammonii, 164.
 — muriatici, 170.

- Beevis-Angeledis, 192.
 — analepticus, II. 522.
 — Angelicae comp., 170.
 — angelicus, 235.
 — — Sharpi, II. 147.
 — anodynus, II. 89. 204. 207.
 209. 270.
 — Camerarii, II. 264.
 — Doveri, II. 269.
 — Ludovici, II. 264.
 — anonyms, II. 655.
 — antacidus, 360. II. 89. f.
 Pulv. antiarth.
 — antarthriticus, II. 528.
 — purgans, II. 528.
 — Wepferi, II. Add.
 — anthelminticus, 520. 649.
 II. 23. 127. 162. 664.
 — stomachicus, II. 89.
 — antiarthriticus, 651. 769. II.
 459.
 — amarus, 459.
 — purgans, II. 549.
 — antiasthmaticus, II. 601.
 — anticaeculosis, II. 661.
 — anticaechnicus, 639. 643. 646.
 — anticaerthralis, 220. II. 302.
 308. 39. 601.
 — antichloroticus, 634.
 — anticolicus Camerarii, II.
 330.
 — anticonvulsivus stomach.
 432.
 — anti diarrhoeicus, II. 11.
 — antidysentericus, 565. II.
 209. 621.
 — antiemeticus, II. 89.
 — anti epilepticus, II. 153. 302.
 — — Marchionis, II. 302.
 — — niger, II. 303. et Add.
 — antifibrilis, 475. 559.
 — antihæmorrhagicus, 502.
 — antihæctico — scrophulosus,
 II. 223.
 — antihecticus, II. 448.
 — antihydropticus, 611.
 — antihystericus, 432.
 — antiictericus, II. 549.
 — antileucorrhoeicus, 629.
 — antilyssus, 362. II. 65. 152.
 491.
 — Ormskirkianns, II. 2.
 — Turchinensis v. Tun-
 quinensis, II. 218.
 — antimoniialis, 226. 221.
 — anti peridolicus, 508.
 — — et purgans, 476.
 — antiphlogisticus, II. 387.
 — antiphthisis, 586. II. 348.
 — antipleuriticus, II. 607.
 — antipsoricus, II. 348. 600.
 — — Pyrorethi, 355.
 — antirachiticus, II. 480.
 — antirheumaticus, 227. 332.
 — antisepticus, 475. 477.
 — aërospasmodicus, 227. 332.
 477. 611. II. 154. 164. 272. 663.
 661. 686.
 — infantum, II. 679.
 — nitrosus, II. 154.
 — et anticonvulsivus sto-
 machicus, 432.
 — Rosensteini, II. 269.
 — Stahlii, II. 531.
 — antispasticus, II. 663.
 — antistomatialis, 361. II. 139.
 686.
 — aperiens et resolvens, II. 387.
 — aperitivus, II. 365. 391.
 — apbradisticus, II. 218.
 — ad aquam confortativam,
 303.
 — ad urethras, 624.
 — Argenti Nitratii, 262.

Pulvis Ari alcalinus, 278.
 — comp., 278.
 — Arnicæ comp., 266.
 — opiat., 266.
 — aromatico-ferratus, 639.
 — aromaticus, 380. 381. II. 327.
 — arsenicalis, 271. 272.
 — Baumanni, 271.
 — Jostamondi, 271.
 — Plencisii, 271.
 — Plukketii, 271.
 — Rousselotii, 271.
 — arthriticus, 61.
 — Asari comp., 283.
 — atramentarius, 639.
 — Auri murtiatici, 299.
 — Auripigmenti facticii, 269.
 — balsamicus, II. 226.
 — basilicus, II. 162.
 — Belladonnae, 295.
 — benzoticus, 25.
 — e Benzoino, 25.
 — Bernhardi, 271.
 — bezoardicus albus Ludovici, 365.
 — Anglicus completus, 216.
 — — incomplet., 217.
 — Curvi, 277.
 — Halensis, 271.
 — Kollwagi, 732.
 — Semmerli, 300.
 — ad botium, II. 414.
 — cachecticus, 639.
 — Chesneau, 645.
 — Ludovici, 215.
 — Quercetani incompl., 643.
 — Calami aromatici, 348.
 — Calcariae sulphuratae cum Aconito, 355.
 — ad calculum, 524.
 — camphoratus, 371.
 — e Calicetorum Chellis comp., 360.
 — — pretiosus, 360.
 — Cantharidum camphorat., II. 410.
 — Capucinatorum, II. 493.
 — Carbonatis Calcis comp., 361.
 — capitalis Sancti Angeli, 288.
 — Carbonis acidulus, II. Add.
 — cardiacus, 665. II. 192.
 — contra cariem, 279.
 — de Carigan, II. 302.
 — carminativus, 208. II. 12.
 — 80.
 — Carthusianorum, 223.
 — caryocostinus, II. 528.
 — Caryophyllatae, 703.
 — et Rhei, 703.
 — castoreatus, 432.
 — contra casum, II. 512.
 — catarrhalis, II. 601.
 — ad catarrhum, II. 318.
 — Catechu comp., 442.
 — cathartico-diuret., II. 584.
 — catharticus, 94. II. 173. 447.
 — — absorbens, II. 438. 601.
 — — febrifugus, 426.
 — catholicus, II. 628.
 — causticus, II. 147.
 — — Krügeri, II. 183.
 — Cellensis aureus, II. 152.
 — — nobilis, II. 152.
 — cephalicus, 328. II. 235. 302.
 — — albus, II. 303.
 — — Camerarii, II. 153.
 — — niger, II. 665.
 — — ruber, II. 153. 476.
 — — Winteri, II. 153.

Pulvis e Cerassa comp., II. 327.
 — cervinus Camerarii, 365.
 — Chamomillae cum Antim., 217.
 — e Chelisi Cancerorum minus pretiosus, 360.
 — — pretiosus, 361.
 — Cheltenhamensis, II. 92.
 — Ghinzæ, 474. 476.
 — — antisepticus, 477.
 — — camphoratus, 474.
 — — compos., 476.
 — — factilius, 67.
 — — cum Sale Ammoniacico, 476.
 — Ghociolatae chinatae, 474.
 — e Cinchona cathart., 476.
 — Cinnamon comp., 380.
 — Coffeae cum Cort. Peruv., 474.
 — Colocynthidis, 563.
 — Comitæ de Warwick, 218.
 — Comitissæ Kantii, 565.
 — compositus Stahliani, II. 531.
 — ad condienda intranea, 110.
 — ad condienda carnes, 111.
 — ad condiendum, 110.
 — — cor, 111.
 — confortans Camerarii, II. 153.
 — Constantiniani, II. 205.
 — contentus, 380.
 — Contrayervæ comp., 595.
 — cordialis Cellensis, II. 152.
 — Cornacimus, 218.
 — Cornu Gervi ustrictum Opio, II. 267.
 — corroborans, 475.
 — Corticis Quercus et Anzheimidis nobilis, II. 433.
 — cosmeticus, 183. II. 814.
 — — ad manus, 67. 183.
 — Cosmii, 271.
 — cretaceus, 361.
 — Cretæ comp., 361.
 — — cum Opio, II. 267.
 — Cupressi restrictivus, II. 691.
 — dentifricus, 362. 413. 477.
 — II. 407. 600.
 — — albus, II. 426.
 — — Hufelandi, 477.
 — — niger, II. Add.
 — — Palatier, 508.
 — depressans et nauseosus, 611.
 — depurans, II. 141.
 — contra diabete[m], 133.
 — diacarthami, II. 628.
 — diaphoreticus, 219. 366. 710.
 — II. 164. 172. 269. 306. 600.
 — — et sedativus, II. 270.
 — diapnoicus, II. 269.
 — diaromatou, 380.
 — diarrhœdon, II. 476.
 — ad diarrhœdum, II. 11.
 — diascordii, II. 229.
 — diascennæ, II. 549.
 — digestivus, 208. 247. II. 89.
 — 92. 174. 320. 380. 409. 418.
 — — Kibitii, II. 464.
 — — cum Rho, II. 387.
 — — Uffezii, II. 397.
 — Digitalis purp., 611.
 — diureticus, 410. 611. II. 37.
 — 395. 586. 661.
 — — martialis, II. 394.
 — Doveri s. Doweri, II. 269.
 — dysentericus, 586.
 — ad dysuriam, 422.
 — ecephoticus, II. 409.
 — ecephracticus, 649. II. 90. 709.
 — — Sellii, II. 90.
 — Edinburgensis, II. 161.
 — emeticus, 385. 245. II. 72.

Pulvis emeticus comp., 243.
 — — Helvetii, 245.
 — emeto-catharticus, II. 11.
 — emmenagogus, 410. 634. II. 37. 265.
 — ad epilepticos, II. 664.
 — epilepticus, II. 153. 302. 663.
 — — albus, II. 303.
 — — Cellarii, II. 303.
 — — ad guttam Riverii, II. 302.
 — — Holsaticus, II. 303.
 — — Marchionis, II. 302.
 — 303.
 — — Marchionum, II. 89.
 — — mirabilis Mynsichti, II. 153.
 — — niger (Viennensis), II. 303.
 — — ruber, II. 153.
 — pro epithemate cordis et pulsum, II. 476.
 — equorum, 223.
 — errhinus, 288. II. 167.
 — ad erysipelas, II. 334. 607.
 — — extensus, 13.
 — erysipelatodes Mynsichti, II. 331.
 — — externus, 13.
 — escharoticus, 685. 694. II. 147. 203. 348.
 — evacuans purorum, II. 169.
 — excitans, II. 41. 166. 442.
 — in excoarctione aegri, 362.
 — ad excrescentias, 135.
 — expectorans, 426. II. 128. 372. 602.
 — — exsiccans et incitans, 371.
 — Extracti Pulsatillae, 164.
 — febrifugus, 170. 271. 475. 480.
 — 688. 694. II. 12. 327.
 — — adstringens, 474.
 — — et anticachecticus, 475.
 — — antimonialis, 215.
 — — Faesii, 476.
 — — Gaubii, 476.
 — — Hoffmanni, 475.
 — — et incisivus, 475.
 — — Jodelot, 476.
 — — Lescure, 477.
 — — Mortoni, 217.
 — — et nervinus, 476.
 — — cum Opio s. opiat., 476.
 — — pauperum, 703.
 — — et purgans, II. 23.
 — — salinus, II. 396.
 — — stibiatus, 475.
 — — Trilleri, 475.
 — — Unzeri, 231.
 — — ferratus, 639.
 — — Ferri alcoholisatus, 632.
 — — — limatis, 633.
 — — ferruginosus, 639.
 — — ad flatum, 208.
 — — contra ducremalbum, 649.
 — II. 103.
 — — Foeniculi comp., 197.
 — — Fontaneillesii, 272.
 — — de Fortyce, II. 412.
 — — Frankii, II. 409.
 — — fumalis, 323. II. 597.
 — — — Haugii, 323.
 — — — nobilis, 324.
 — — odoratus, 323.
 — — ad fumigationes mercuriatas, 609.
 — — galactopoeus, II. 89.
 — — galactopoeiticus, 197.
 — — di gambello, II. 602.
 — — Gantianæ comp., 694.
 — — Glycyrrhizæ comp., II. 649.
 — — graphiticus, 637.

Pulvis Gratifolae cum Hydrargyro, 706. II. 166.
 Gregorianus, II. 549.
 Grimaldii, 646.
 Guajaci cum Senna, II. 549.
 Guarini, 226.
 Gummi resinæ Guajaci opiatius, II. 709.
 et Subcarbonatis Ammoniacæ, II. 709.
 et Tartrat. Stib. et Potass., II. 709.
 gummosus, 727.
 — alkalinus, 727. II. 380.
 — cum Liquiritia et Sulphure stibiato, 230.
 — stibiatus, 226.
 — sulphuratus, 727.
 contra guttam serenam, 191.
 de gutteta, II. 302.
 ad gutteta, II. 302-303.
 ad hæmoptysin, II. 512.
 de Haly, 192.
 Helminthochorti comp., 742.
 hepaticus ruber, II. 407.
 ad herpeset, II. 141.
 Hieræ picræ, 104.
 hydrogogus, II. 28. 173.
 Hydrargyri cum Camphora, II. 106.
 — cinereus, II. 142. 192.
 — cum Opio, II. 171.
 — oxydam rubri, II. 147.
 — stibiato sulphurati cum Cicuta, II. 141.
 — stibiatus, II. 161. 164.
 — cum Hyoscyama, II. 164.
 ex Hydrargyro mur. miti cum Sulphure Stibii aurantiaco, II. 161.
 — rubro cum Alumine, II. 147.
 — stibiato sulphurato, II. 140.
 hypnoticus, II. 138.
 hystericus, 432.
 Imperatoris, 343. 381.
 incidens s. incisurus, 227. 243. 369. II. 405. 601.
 — Stahlii, 369.
 incrassans Fullerii, 727.
 pro infantibus, 362. II. 89.
 infantum, 362. II. 89.
 — anodynus, II. 89.
 — anticidus, II. 89.
 — citrinus, II. 89.
 — cum Rheo, II. 448.
 ad intertriginem, 362.
 Inulæ aromatis, II. 9.
 Ipecacuanhæ comp., II. 269.
 — et Cupri Sulphatis s. Cupri sulphurici, 586.
 hydrargyratus, II. 168.
 opiatius, II. 269.
 et Opii, II. 269.
 cum Opio, II. 269.
 cum Tartaro stib., 245.
 thebaicus, II. 269.
 Iridis cum Nitro, II. 391.
 Jalapæ comp., II. 22.
 hydrargyratus, II. 22.
 cum Hydrargyro muriatico miti, II. 22.
 cum Kali sulphurico, II. 22.
 et Muriat. Hydrarg. oxydulati, II. 169.
 — cum Natro, II. 22.
 — salinus, II. 22.
 et Supertartrat. Potassæ, II. 22.
 — tartaricus, II. 22.

Pulvis Jamesii, 216.
 Johannis de Vigo, II. 146.
 Janniperi Sabinæ comp., II. 37.
 pro jusculo extemporaneo, 683.
 — Kentianus, 216.
 — kermesinus, 225.
 — cum Camphora, 226.
 — e Kermete minerali, 226.
 — Kermetis cum Ipecacuanha, 227.
 — Kino comp., II. 44.
 — gummosus, II. 44.
 — Knoxii, 356.
 — Lauri carbonicus, II. 52.
 — Baccharum comp., II. 231.
 — laxans, II. 22. 448. 549. 601.
 — cum Mercurio, II. 22.
 — puerorum, II. 169.
 — cum Sale, II. 22.
 — et temperans Tronchini, II. 409.
 — laxativus vegetabilis, II. 22.
 — leniens antihypochondriacus Kleinii, II. 404.
 — — Thedeni, II. Add.
 — lenitivus, II. 447.
 — tartarizat., II. 447. 549.
 pro Limonata, 58.
 — Liquiritiæ comp., II. 549.
 lithontripcticus, II. 661.
 — longæ vitæ s. ad longam vitam, II. 550.
 — ad lumbricos, II. 169.
 — lunaris, 262.
 — Lupulini, II. 86.
 — ad maculas corneæ, II. 408. 694.
 — e Magnesiæ carbonica, II. 89.
 — Magnesiæ comp., II. 89.
 — cum Rheo, II. 89.
 — tartaricus, 28.
 — Mantuanus, 565.
 — manualis, 67. 183.
 — Marchionis, II. 302. 303.
 — martialis, 633.
 — Anglicus, 633.
 — masticatorius, II. 1.
 — mercurialis, II. 164. 168.
 — antimoniatus, II. 161.
 — argenteus, II. 205.
 — Mercurii Moscati, II. 142.
 — dulcis cum Opio, II. 171.
 — e Mercurio, II. 164.
 — dulci, II. 167.
 — admictum involuntarium, 616.
 — mitigans Wefferi, 122.
 — ad morsum canis rabidi, II. 391.
 — Moschi, II. 218.
 — comp., II. 218.
 — opiatius, II. 217.
 — motum peristalt. invertens, II. 12.
 — mucilaginosus, II. 633.
 — Muriatis hydrargyrosi thebaico, II. 171.
 — Myrrhae comp., II. 226.
 — Nardi Celticæ comp., II. 233.
 — nasalis odoratus, II. 476.
 — Natri carbon. cum Acido tart., 28.
 — nauseam ciens, II. 12.
 — nephriticus pretiosus, 369.
 — nervinus, II. 663.
 — Nitratis Argenti, 262.
 — Potassæ comp., II. 391.
 — Nitri oxalicus, II. 396.
 — tartaricus, II. 396.

Pulvis Nitri thebaicus, II. 208.
 — nitroso-camphoratus, II. 393.
 — nitrosus, II. 390. 396.
 — — cinnabarrinus, II. 194.
 — Nucis vomicæ, II. 440.
 — Nucum moschat. comp., II. 233.
 — nutricum, 197. II. 89.
 — nutriens, 683.
 — ocyticus, II. 228.
 — Oliban. compos., II. 244.
 — ophthalmicus, 628. II. 408.
 — — Baldingeri, II. 408.
 — opiatius, II. 267.
 — Opii comp., II. 269.
 — Oxalatis Potassæ, II. 403.
 — Oxidi Stibii comp., 228.
 — ex Pæonia comp., II. 362.
 — Pannonicus raber ordinarius, 133. — incomplet., 133. — minus pretiosus, 133.
 — paregoricus, II. 89.
 — ad partum, II. 328. 580.
 — pectoralis, 170. 217. 220. 226. 266. 321. II. 16. 309. 549. 602.
 — — balsamicus, II. 602.
 — — Wedelii, II. 602.
 — — et diaphoreticus, 222.
 — — resolvens, 230. II. 601.
 — — viridis, II. Add.
 — ad s. contra pediculos, 608.
 — peristalticum motum invertens, II. 12.
 — Peruvianus purgans, 476.
 — ex Phellandrio aquatico gummosus, II. 318.
 — ad s. contra phthisin, 486. 586. II. 318.
 — pleuriticus, 365.
 — — Mynsichti, II. 601.
 — Plumbi compos., II. 337.
 — e Plumbo comp., II. 337.
 — Plummeri comp., II. 162.
 — ad pollutiones nocturnas, 426.
 — Portlandii, 694.
 — precipitans Stahlii, 217.
 — Præcipiti, II. 146.
 — — de Garigian, II. 302.
 — ad proclapsum ani, 132.
 — ad prolapsum, II. 324.
 — puerorum citrinus, II. 18.
 — epilepticus cum Rheo, II. 448.
 — Pulsatillæ Extracti, 194.
 — purgans, 246. 631. II. 22. 89. 92. 169. 448. 528.
 — — absorbens, II. 601.
 — — antheiminticus, II. 173.
 — — et diureticus, 611.
 — — et irritans, 796.
 — purificans, II. 141.
 — — Jasseri, 223.
 — — Kæmpferi, 221.
 — purpureus Anglicus, 362.
 — pyricus, pyricus de Struensee, II. 397.
 — contra quartanam, 476.
 — Quercus compos., II. 433.
 — — marinae, 412.
 — ad rabiem Comitum d'Isenburg, 362.
 — contra rabiem, 192.
 — refrigerans, 56. II. 391. 409.
 — ad rachitidem, II. 486.
 — relaxans, 217.
 — Resinæ Guajaci et Subcarb. Ammoniacæ, 709.
 — resolvens, 226. 243. II. 174. 405.

Pulvis resolvens antiphlogisticus.
 II. 365.
 — comp. 218
 — Stahlian, 218.
 — restanraas, 346
 — Rhei comp., II. 387. 447.
 — cum Magnesia, II. 448.
 — et Muriat. Hydrar.
 oxydulati, II. 173.
 — saponaceus, II. 448.
 — salinus, II. 448.
 — et Sulphatis Potassae,
 II. 448.
 — cum Tartaro, II. 447.
 — cum Tartrato Infusae,
 II. 447.
 — e Rheo, II. 448.
 — rheumaticus anodynus, 245.
 — roborans P. corrob., II. 153.
 — antispasmod., II. 663.
 — martialis, 475.
 — Rubiae comp., II. 486.
 — Rudingii, 214.
 — Sacchari acidulus, 58.
 — Sabinae compos., II. 37.
 — Salep., II. 496.
 — Salicis compos., 498.
 — salino-stibiatus, 247.
 — salinus, II. 499.
 — compositus, II. 92. 154.
 — ad salivationem, II. 376.
 — Sambuci, II. 507.
 — Sanguinis Draconis den-
 tific, 365.
 — Saponis compos., 631.
 — contra scabiem, II. 600.
 — Scammonae comp., II. 528.
 — Scammonii antimoniatis,
 218.
 — comp., II. 528.
 — compos. Oulferii, 218.
 — Scillae comp., II. 531.
 — Stahlian, II. 531.
 — sedativus, 295. II. 268.
 — Sedlitzensis, 28.
 — Sennae compos., II. 594.
 — cum Sulphure, II. 549.
 — sialagogus, 170.
 — Sodae tartarisatus s. tartar-
 icus, 28.
 — Specierum Diatragac. s.
 Traganthae comp., II. 654.
 — Spongiae comp., 414.
 — stagnoticus, II. 247.
 — Stanni, II. 592.
 — ferratus, II. 591.
 — martiatus, II. 591.
 — philosophice paratus,
 II. 590.
 — sternutatorius, 288. 327. 557.
 579. 626. 736. II. 167. 235. 428.
 — albus, II. 222.
 — Nopsii, II. 567.
 — variegatus, 567.
 — viridis, 567.
 — stibiato-opiatus, 245. 709.
 — stibiatus, 216. 217. 230. 243.
 — de Marryat, 244.
 — stimulan., II. 52.
 — stomachicus, 208. 475. 476.
 560. 693. II. 685.
 — s. stomachalis Birck-
 manni, 278.
 — Dörflingensis, II. Add.
 — ad strumam, 361. 414. II.
 139. et Add.
 — contra strumam, 361. 414.
 II. 686.
 — Strychnini, II. 594.
 — stypticus, 132. 135. 649. II.
 44. 348.
 — Subcarbonatis calcici, 360.
 — sudorificus, II. 269.
 — Doveri, II. 269.

Pulvis sudorificus et tontous.
 II. 517.
 — ad suffundendum, II. 597.
 — pro suffumigib. s. suffi-
 mento II. 244. 597.
 — Sulphatis Ferri c. Kino,
 649.
 — Aluminae comp., 135.
 — ex Sulphure stibiato, 231.
 — — rubro, 220.
 — — cum Cam-
 phora, 220.
 — Sulphureti Antimonii, 221.
 — sulphureus, II. 601.
 — Sulphuris comp., 204.
 — — sublimatei comp., II.
 601.
 — sulphureus, II. 601.
 — Superphat. Aluminae et
 Potassae comp., II. 147.
 — Supertartratis Potassae et
 Stalagmitidis cambogioi-
 dis, II. 409. — et Digit.
 purp., II. Add.
 — Tanacetii comp., II. 613.
 — Tartari argillatus, II. 408.
 — compos., II. 407. 409.
 — Tartratis Stibii et Potas-
 sae, 709.
 — temperans, 27. 330. 611. II.
 347. 397. 409.
 — albus, II. 396.
 — Bouillon - Lagrange,
 II. 396.
 — camphorat., II. 394.
 — diureticus, II. 396.
 — Rosensteini, II. 396.
 — ruber, II. 154.
 — Stahlian, 127. II. 154.
 — Temnanti, 355.
 — Unzeri, II. 397.
 — terebinthinatus, II. 632.
 — terrestris, 260.
 — thebaicus, II. 267.
 — contra tineam, 316.
 — tisaniferus, 727.
 — tonico adstringens, 475.
 — antispasmod. martia-
 lis, 633.
 — martialis, 633.
 — stomachicus, 633.
 — tonicus, 475. 509. 525. 639.
 646. 649. 670.
 — Bangii, 476.
 — et resolvens, 227.
 — Tormentillae comp., II.
 651.
 — ad tormina infantum, II.
 448. — — — — — antacid., II.
 89.
 — Tragacanthae comp., II.
 653. 654.
 — Funchinensis, II. 218.
 — contra tussim convulsivam,
 227.
 — — infantum, II. 302.
 — ad ulcera crurum, II. 22.
 — — tendinum, II. 226.
 — Uvae ursi, II. 661.
 — Valerianae, II. 664.
 — — aromati., II. 663.
 — Vanillae, II. 671.
 — contra vermes, 620. II. 139.
 et Add.
 — vermifugus, 218. 294. 520.
 706. 742. II. 32. 127. 139. 158.
 168. 169. 174. 176. 575. 588. 591.
 592.
 — mercurialis, II. 137.
 — Vernicis, 685.
 — Viennensis albus virgineus,
 366.
 — Vigonis, II. 146.

Pulvis Vitae Imperatoris. 381
 382.
 — vomicus, II. 12.
 — vomitivus Scherffii, 245.
 — Zinci oxydati albi, II. 685.
 Pumex, II. 426.
 PUNCH, 87.
 — Pumica Granatum, II. 426.
 — Purgativum Grandii, II. 405.
 — Leroyi, II. 30.
 — Purpura Cassii, 300.
 — mineralis, 300.
 — Putamen Juglandis, II. 33.
 — Pyrethrum officinale, II. 428.
 — Parthenium — Matricaria.
 — salivale, II. 428.
 — Pyri martiales, 664.
 — Pyrites arsenicalis micaceus,
 269.
 — Ferri artificialis, 637.
 Pyrola, II. 429.
 — rotundifolia, II. 429.
 — umbellata, II. Add.
 Pyroleum ossium rectificat.,
 691.
 — Succini, II. 598.
 — Pyrus Cydonia — Cydonia.
 — Malus — Malus comm.
 Q.
 — Quadrichloruretum Sodii, II.
 675.
 — Quadroxalae Potassae, II. 403.
 — Quassia amara, II. 430.
 — excelsa, II. 431.
 — Simaruba — Simaruba.
 — Quassina s. Quassinum, II. 431.
 — Quercula minor, II. 643.
 — Quercus, II. 433.
 — Aegilops — Q. infectoria.
 — alba, II. 433.
 — Cerris s. Cerrus, 678.
 — Esculus — Q. infectoria.
 — Ilex, II. 433.
 — infectoria, 678.
 — marina, 673.
 — pedunculata, II. 433.
 — Robur, II. 433.
 — Suber, II. 433.
 — tinctoria, II. 433.
 — Quinina s. Quininum, 505.
 — Quinatum sulphuricum — Chi-
 num sulph.
 — Quininum, 505.
 — Quinquefolium majus, II. 422.
 — Quinque lapides pretiosi, II.
 697.
 — Quinquenervia minor, II. 331.
 R.
 — Radices conditae Carlinae, 421.
 — Radix Brasiliensis, II. 11.
 — — Lopeziana, II. 35.
 — — Mungos, II. 222.
 — — Serpentum, II. 222.
 — Ramenta Ferri, 632.
 — Rana esculenta, 681.
 — — temporaria, 681.
 — Ranunculus, II. 431.
 — — acris, II. 436.
 — — albus, 193.
 — — aquaticus, II. 436. 437.
 — — bulbosus, II. 436. 437.
 — — Ficaria, 467.
 — — Flammula, II. 437.
 — — nemorosus, 193.
 — — palustris, II. 437.
 — — pratensis, II. 436.
 — — sceleratus, II. 437.
 — Raphanus hortensis, II. 437.
 — — marinus, II. 437.
 — — niger, II. 437.
 — — rusticus, II. 437.

Raphanus rusticus, II. 437.
 — sativus, II. 437.
Rapum rubrum, 327.
Raspatura Cornu Cervi, 364.
 — Ligni Guajaci, 707.
Rastura Cornu Cervi, 364.
 — Ligni Guajaci, 707.
 — Sautalis rubri, II. 513.
 — Succini — Succina raspata.
Ratafia antiscurbatica, 457.
 — Carabum s. Caribaeorum, 712.
Ratanha, II. 442.
Ratanhia, II. 442.
Ratania, II. 442.
Realgar, 296.
Recrementum Vitri, II. 367.
Regina pratenvis, II. 589.
Reguliusti, 350. 413.
Regulus Antimonij, 241.
 — martialis, 212.
 — medicinalis, 212.
 — stampatus, 212.
 — stellatus, 211.
 — Stibii, 211.
Remedium contra accidentia a fungis veneficis, 105.
 — antidiabeticum Redfearn, II. 383.
 — antihydriopicum, 643.
 — antiphthisicum Adairi, 586.
 — antifaenicum, II. 153.
 — antivenerum de Mitrie, II. 33.
 — Capucinatorum, II. 195.
 — Christiani (Christien) ad bilem, 512.
 — Ducis d'Antia, II. 195.
 — contra hydropem, 613.
Requis Nicolai, II. 293.
Resina alba, II. 636.
 — Anime, 726.
 — Benzoes, 320.
 — benzoica, 321.
 — Burgundica, II. 636.
 — Cachibu, 345.
 — Canadensis fluida, 1.
 — Carannae, 411.
 — Cayennensis, II. 444.
 — Chinae, 486.
 — communis, II. 636.
 — Copahu, 303.
 — Copaiserae officinalis, 303.
 — copallina, 569.
 — Corticis Peruviani, 486.
 — elastica, II. 444.
 — Elemi, 620.
 — flava, II. 636.
 — Galbani, 336.
 — Gialappae, II. 27.
 — Gnidii viridis, 604.
 — de Gompert, 345.
 — Guajaci nativa, 708.
 — Hederae, 724.
 — Jalapae s. Jalappae, II. 27.
 — praeparata, II. 28.
 — Jalappae, II. 27.
 — praeparata, II. 28.
 — Juniperi, II. 511.
 — Kikakumalo, II. 44.
 — Laccae inramulis — Laccae.
 — Lenticis fluida, II. 617.
 — Lenticis, II. 103.
 — Ligni Guajaci, 708.
 — liquida — Terebinth. Veneta.
 — Mastichis, II. 103.
 — Meccanensis fluida, 307.
 — liquida, 307.
 — nigra, II. 320. 324.
 — Novae Hispanicae liquida, 303.
 — Oleae, II. 243.
 — Pini Abietis, 1.
 — balsamatae liquida, 1.

Resina Fini compressa liquida, II. 330.
 — — — — — solida, II. 636.
 — — — — — fusa — Colophonium
 — — — — — Quinquinae, 486.
 — — — — — Sanguinis Draconis, II. 511.
 — — — — — Scammonij, II. 528.
 — — — — — Syrae, II. 591.
 — — — — — Succini, II. 598.
 — — — — — balsamica, II. 599.
Resino-extractivum Chinae, 468.
Resta Bovis, II. 244. 245.
Rhabarbarinae Rhabarbarinum, II. 447.
Rhabarbarum s. Rheum, II. 446.
 — album, II. 106.
 — Britannicum, II. 446.
 — Bucharicum, II. 446.
 — Chinense, II. 446.
 — Danicum, II. 446.
 — Europaeum, II. 446.
 — Gallicum, II. 446.
 — Indicum, II. 106. 446.
 — Monachorum, II. 447.
 — Moscoviticum, II. 446.
 — nigrum, II. 22.
 — nostras, II. 446.
 — officinale, II. 446.
 — pauperum, II. 647.
 — Rhabarbaricum, II. 446.
 — Russicum, II. 446.
 — Sinense, II. 446.
 — spurium, II. 447.
 — Tartaricum, II. 446.
 — tostum, 447.
 — verum, II. 446.
Rhamninae Rhamninum, II. 445.
Rhamnium, II. 445.
Rhamnus, II. 444.
 — catharticus, II. 444.
 — frangula, II. 444.
 — Jajuba, II. 47.
 — Zizyphus — Zizyph. sat.
Rhaponticum, 446.
Rhaponticum, II. 445. 489.
 — verum, II. 446.
Rheimum — Rhabarbarinum.
Rheum, II. 446.
 — compactum, II. 446.
 — officinale, II. 446.
 — palmatum, II. 446.
 — Rhabarbarum — Rh. undulat.
 — Rhaponticum, II. 445.
 — spurium, II. 447.
 — undulatum, II. 446.
 — verum, II. 446.
Rheuminum, II. 447.
Rhinoceros Indicus, 364.
Rhinocerotis cornu, 364.
Rhodia, II. 546.
Rhododaphne, II. 235.
Rhododendron Chrysanthum, II. 450.
 — maximum, II. Add.
Rhodomet, II. 470.
Rhodosaccharum, II. 468.
Rhoeas, II. 306.
Rhus Cotinns, II. 460.
 — copallinum, 569.
 — Coriaria, II. 460.
 — glabra — Rh. Toxic.
 — spicaea, II. 460.
 — Toxicodendron, II. 460.
Ribes Grossularia, II. 461.
 — nigrum, II. 461.
 — rubrum, II. 461.
 — Uva crispa, II. 461.
Richardsonia Brasiliensis, II. 11.
Ricinus, II. 463.
 — communis, II. 463.
 — major, II. 239.
 — undulatus — R. comm.

Rob Acaciae Germanae Fructus, II. 424.
Rob Acaciae Brasilicae, 490. 41.
 — 520. 522.
 — Berberum, 386.
 — Cerasorum, 461.
 — Citri Medicas, 540.
 — Eydoroni, 507.
 — Cynosbato, II. 467.
 — Dauci, 607.
 — — Carotae, 607.
 — — crudus, 607.
 — — depuratum, 607.
 — Diacaryi Galeni, II. 33.
 — Ebuli, II. 508.
 — Fragariae, 672.
 — Jugland. reg. Nuc., II. 33.
 — Juniperi, 38. 39.
 — — Baccarum, II. 39.
 — — communis, II. 39.
 — — — — — 39.
 — — de Laffecteur, 420.
 — — Mororum, II. 216.
 — — Myrtillorum, II. 662.
 — — Nucum, II. 33.
 — — Orycogocis, II. 662.
 — — Prunorum, II. 424.
 — — Ribesiorum, II. 462.
 — — nigrorum, II. 461.
 — — Ribium, II. 462.
 — — Rosae caninae fructus, II. 467.
 — — — — — Galicae, II. 467.
 — — Rubi Idaei, II. 488.
 — — Sambuci, II. 508.
 — — — — — crudum, II. 507.
 — — — — — depuratum, II. 508.
 — — Sorbi, II. 538.
 — — Spinae cervinae, II. 445.
 — — — — — tonicum et antiperiodicum, 480.
 — — — — — Uvarum, II. 660.
 — — Vaccini Myrtilli, II. 662.
 — — — — — Orycoci, II. 662.
 — — — — — Vitis Idaeae, II. 662.
Robina Pseudo-Acacia, II. 465.
Rocella, II. 672.
 — tinctoria, II. 672.
Roob f. Rob.
Rorella, 618.
Resa alba, II. 465.
 — canina, 319. II. 465.
 — Centifolia, II. 465.
 — Damascena, II. 10.
 — Gallica, II. 465.
 — incarnata, II. 465.
 — mineralis, II. 191.
 — moschata, II. 465.
 — pallida, II. 465.
 — rubra, II. 465.
 — — vulgaris, II. 465.
 — — sylvestris, II. 465.
Rosae benedictae flores, II. 301.
regiae flores, II. 301.
Rosago, II. 236.
Rosaria, 546.
Rosmarinus, II. 477.
 — hortensis, II. 477.
 — officinalis, II. 477.
 — Stoechadis facie, II. 644.
 — sylvestris, II. 62.
Rps Solis, 618.
 — Chinae, 603.
 — Vitioli, 63.
Rotulae anthelminticae, II. 174.
 — Berberum, 386.
 — Citri, 540.
 — diantherae, II. 20.
 — — — — — Manis Christi, II. 405.
 — — — — — Menthae piperitae, II. 117.
 — — — — — pectorales, II. 602.
 — — — — — contra vermes, II. 139.
 — — — — — vesiciferae, II. 160.
Rubetae terrestres majores, 681.
Rubia major, II. 485.
 — — — — — Manjista, II. 485.
 — — — — — sativa, II. 485.

Rubia tinctoria, II. 485.
 — tinctorum, II. 485.
Rubigo, 643.
 — Ferri, 643.
 — praeparata, 643.
Rubinus, 131.
Rubrica fabrilis, 131.
Rubrum Anglicanum, 641.
 — cinchonicum, 474.
 — montanum, 641.
Rubus arcticus, II. 487.
 — Chamacmorus, II. 487.
 — fruticosus, II. 487.
 — Idaeus, II. 487.
 — niger, II. 487.
 — trivialis, II. 487.
 — villosus, II. 487.
Rumex Acetosus, 15.
 — acutifolius, II. 489.
 — acutus, II. 489.
 — alpinus, II. 447.
 — aquaticus, II. 489.
 — Britannica, II. 489.
 — crispus, II. 489.
 — nemorosus — R. obtusif.
 — obtusifolius, II. 489.
 — sanguineus, II. 489.
 — scutatus, 15.
Ruptorium commune, II. 371.
Ruscus, II. 490.
 — aculeatus, II. 490.
 — Hypoglossum, II. 490.
Ruta, II. 490-491.
 — capraria, 676.
 — graveolens, II. 490.
 — hortensis, II. 491.
 — muraria, 293.
 S.
Sabadilla, II. 493.
Sabadillina s. Sabadillinum, II. 493.
Sabadillum, II. 493.
Sabina, II. 37.
Saccharum, II. 494.
 — albissimum, II. 494.
 — album, II. 494.
 — Aluminis — II. Add.
 — antheleminticum, II. 126.
 — aurantiacum purgans, II. 23.
 — candium s. candidis s. can-
 tum, II. 494.
 — Chinae, 490.
 — clarificatum, II. 494.
 — crystallisatum, II. 494.
 — album, II. 494.
 — glyzyrrhizatum, II. 78.
 — hordeaceum, 745.
 — hordeatum, 745.
 — Lactis, II. 46.
 — mercuriale, II. 126.
 — compos., II. 136.
 — Mercurii vermicif., II. 126.
 — moscovatum, II. 494.
 — Myrrhae, II. 226.
 — myrrhatum, II. 226.
 — nitratum, II. 396.
 — officinarum, II. 494.
 — perlatum, II. 467-495.
 — purgans aurant. — Pulv.
Jal. comp.
 — purificat., II. 494.
 — purissimum, II. 494.
 — Quinquinae, 490.
 — ro atum, II. 466.
 — rubrum s. crudum.
 — Saturni, II. 346.
 — depuratum, II. 347.
 — saturninum, II. 346.
Sacculus aromaticus, II. 115.
 — purgans, II. 550.
 — resolvens, 144-170. II. 106.
 575.
Saffranum, 421.
Sagapenum, II. 495.

Sagapenum depuratum, II. 495.
 et Add.
Sago, II. 495.
Sagu, II. 495.
Sagus farinaria, II. 495.
 — genuina, II. 495.
 — Rumphii, II. 495.
Sal Absinthii, II. 379.
 — citraturum, II. 493.
 — Aceti — Vapor acetosus.
 — Acetosellae, II. 493.
 — acetosum ammoniacale, 173.
 — minerale, II. 585.
 — Alcali volatile siccatum, 160.
 — Alembroth, II. 198.
 — Alkali, f. S. Alcali.
 — amarum crudum, II. 92.
 — depuratum, II. 92.
 — Ammoniacum, 169.
 — Anglicanum, 160.
 — crudum, 169.
 — depuratum, 169.
 — fixum, 367.
 — martiale, 657.
 — nitrosum, 169.
 — purificatum, 169.
 — secretum Glauberi,
 169.
 — tartareum, II. 413.
 — volatile, 160.
 — Ammoniacus, 169.
 — fixus, 367.
 — volatilis, 160.
 — Anglicanum, II. 92.
 — catharticum, II. 92.
 — Anglicum s. Anglicus, II. 92.
 — cathart. depuratum,
 II. 92.
 — Armoniacum, 169.
 — Benzoëis acidum, 24.
 — essentielle, 24.
 — volatile, 24.
 — Boracis acidum, 26.
 — volatile, 26.
 — Cardui benedicti, II. 379.
 — catharticum, II. 583.
 — amarum, II. 92.
 — Centaurii minoris, II. 379.
 — Chalybis, 648.
 — Chinae essentielle, 485.
 — Cinerum clavellat depu-
 rat., II. 378.
 — commune s. communis, II.
 576.
 — depuratum, II. Add.
 — Coralliorum, 368.
 — Cornu Cervi, 162.
 — — depuratum, 162.
 — — succinatam, 179.
 — — volatile, 162.
 — culinare, II. 575.
 — digestivum, II. 398.
 — diureticum, II. 398.
 — vegetabile, II. 404.
 — diureticum, II. 398.
 — veget., II. 404.
 — de duobus, II. 385.
 — Ebshamense, II. 92.
 — Epsomense, II. 92.
 — Epsomense, II. 92.
 — depuratum, II. 92.
 — essentielle Benzoëis, 24.
 — Tartari, 67. II. 406.
 — Fabrum stipitum, II. 379.
 — febrifugum Sylvii, II. 398.
 — Gemmae, II. 575.
 — Glauberi, II. 583.
 — Guindre, II. 584.
 — Juniperi Ligni, II. 379.
 — de Lagaraye, 485.
 — Ixivialis Tachenan., II. 379.
 — Margaritarum, 368.
 — marinum s. marinus, II. 575.
 — — calcareum, 367.
 — — Calcariae, 367.

Sal martiale Lagresie, 649.
 — Martis, 648.
 — — muriaticum, 653.
 — — ammoniacale, 657.
 — Matris Perlarum, 368.
 — mercuriale acetosum, II.
 203.
 — Mercurii acetosum, II. 203.
 — microcosmic. urinae, II. 336.
 — mirabile Glauberi crud. et
 depurat., II. 583.
 — — depurat., II. 383.
 — — siccatum, II. 583.
 — — perlatum, II. 582.
 — Modenense artificiale, II. 94.
 — muriat baroticum, 314.
 — Nitri, II. 389.
 — Oculorum Cancrorum, 368.
 — Ononidis, II. 379.
 — Opii essentielle, II. 262.
 — panchestrum, II. 406.
 — Plumbi, II. 316.
 — polychrestum s. polychre-
 stus Glaseri, II. 385.
 — — Lemery, II. 385.
 — — Parisiense, II. 385.
 — — Seignette s. Seignette-
 ti, II. 412.
 — — solubile, II. 412.
 — polychrestus, II. 385.
 — Prunellae, II. 390.
 — pungens, 21.
 — Restae bovis, II. 379.
 — Rupellense s. Rupellensis,
 II. 412.
 — sapientiae, II. 198-385.
 — Saturni, II. 346.
 — Scientiae, II. 199.
 — sedativum s. sedativus, 26.
 — — Hombergi, 26.
 — — mercuriale, II. 190.
 — Sedlitzense, II. 92.
 — Seidlitzense, II. 92.
 — Seidschützense, II. 92.
 — Seignette, II. 412.
 — Sennae essentielle, II. 656.
 — Sodae acetatum, II. 585.
 — — crudum, II. 577.
 — — depuratum, II. 577.
 578.
 — — siccum, II. 578.
 — — perfecte saturat., II.
 579.
 — — purissimum, II. Add.
 — Succini, 52.
 — — depuratum, 52.
 — — essentielle, 52.
 — — volatile, 52.
 — Tachenianum, II. 379.
 — Tamarisci, II. 379.
 — Tartari, II. 378.
 — — essentielle, 57. II. 406.
 — — per se liquidum, II. 380.
 — — perfecte saturatum, II.
 384.
 — — purissimum, II. Add.
 — — sulphuratum, II. 385.
 — — volatile, 162.
 — Thermanum Carolinarum,
 II. Add.
 — Urinae fusibile, II. 386.
 — — microcosmic., II. 386.
 — — nativum, II. 386.
 — — volatile, 162.
 — urinosum purissimum, 160.
 — vegetabile s. vegetabilis,
 II. 404.
 — Vitae, II. 198.
 — Vitri, II. 387.
 — Vitrioli narcoticum, 26.
 — volatile, 159.
 — — Anglicanum, 160.
 — — aromaticum, 164.
 — — concretum, 162.
 — — Cornu Cervi, 162.

- Sal volatile oleosum Angelicae, 200.
- — Sylvii, 151.
 - — Salis Ammoniacy, 160.
 - — Succini, 62.
 - — Tartari, 162.
 - — urinae, 162.
 - vomitorium Vitrioli, II. 607.
 - Westendorffii, 21.
- Salab, II. 495.
- Salap, II. 495.
- Salap, II. 495.
- Salicaria, II. 497.
- Salicina s. Salicinum, II. 498.
- Salivalis, II. 498.
- Salix alba, II. 498.
- amygdalina, II. 498.
 - capraea, II. 498.
 - erycephala, II. 498.
 - fragilis, II. 498.
 - latifolia, II. 498.
 - pentandra, II. 498.
 - Russeliana — S. frag. vitellina, II. 498.
- Salsaparilla, II. 516.
- Germanica, 420.
- Salsilago ammoniacalis, 173.
- acetosa, 173.
 - Cornu Cervi succinata, 179.
 - Oxytartari, II. 399.
- Salsola Kali, II. 499.
- sativa — S. Soda.
 - Soda, II. 499.
 - Tragus, II. 499.
- Salvia agrestis, II. 645.
- Horminum, II. 500.
 - minor, II. 500.
 - officinalis, II. 499.
 - pratensis, II. 500.
 - Solarea, II. 500.
 - sylvestris, II. 645.
- Sambucus, II. 506.
- agrestis, II. 507.
 - Canadensis, II. 507.
 - Ebulus, II. 506.
 - humilis, II. 507.
 - nigra, II. 507.
- Sampsuchum, II. 295.
- Sanamunda, 702.
- Sandaraca, 299 II. 511.
- Germanica, II. 511.
- Sanguinalis, 450.
- Sanguinaria, 450. 702. II. 648.
- Canadensis, II. 511.
 - minor, II. 314.
- Sanguis Caprae Ibeae, 682.
- Draconis, II. 511.
 - in gravis, II. 512.
 - in guttis, II. 512.
 - in lacrymis, II. 512.
 - in placenta, II. 512.
 - in tabulis, II. 512.
 - Hirci, 682.
- Sanguisorba, II. 323.
- officinalis, II. 323.
- Sanicula alba, 609. II. 612.
- Europaea, II. 612.
- Santolina s. Santalinum, II. 513.
- citrinum, II. 513.
 - rubrum, II. 512.
- Santolina, II. 514.
- Chamaecyparissias, II. 514.
- Santonicum, 520.
- Sapa Uvarum, II. 680.
- vomitoria Sylvii, 240.
- Sapo aceticco-aethereus, II. 419.
- aceticus aethereus, II. 419.
 - Acidi sulphurici, 55.
 - acidus, 55. II. 633.
 - Achardi, 55.
 - sulphuricus, 55.
 - Aetheris aceticus, II. 419.
 - albus, II. 413. 414.
- Sapo alcoholico-ammoniacalis s. ammoniatus, 156.
- Alicantinus, II. 413.
 - Atoniensis, II. 413.
 - ammoniacalis, 154.
 - camphoratus, 156.
 - ammoniaco-camphorat., 156.
 - Ammoniae, 154.
 - oleaceus, 154.
 - amygdalinus, II. 414.
 - animalis, II. 414.
 - aromaticus, II. 414.
 - antimonialis, 232.
 - Antimonii, 232.
 - antiphlogisticus resolvens, II. 344.
 - antisialagogus Singeri, II. 376.
 - aromaticus, 156. 416.
 - pro balneo, II. 415.
 - arthriticus Pottii, II. 633.
 - cacaotinus, II. 414.
 - calcareus, 353.
 - Calcariae, 373.
 - Cerae, II. 574.
 - cereus, II. 574.
 - chemicus Dippelii, II. 374.
 - pro usu externo, II. 634.
 - chymicus, 165.
 - cosmeticus, II. 415.
 - domesticus, II. 413.
 - durus, II. 413.
 - guajacinus, 716.
 - Gummi Ammoniacy, 726.
 - Guttii, 733.
 - Hispanicus albus, II. 413.
 - Hydrargyri, II. 206.
 - Hydro sulphureti Oxyduli Stibii sulphurati, 232.
 - Jalapae s. Jalappae, II. 28.
 - jalapinus s. jalappinus, II. 28.
 - kalicus, II. 413.
 - medicatus, II. 414.
 - medicinalis, II. 414.
 - Medullae boviniae, II. 414.
 - — ammoniacalis camphoratus, 156.
 - mercurialis, II. 206.
 - — Chaussieri, II. 206.
 - — volatilis, II. 135.
 - Mercurii, II. 206.
 - mollis, II. 413.
 - niger, II. 413.
 - nostras, II. 413.
 - Olei Crotonis, 577.
 - — Terebinthinae et Potassae, II. 634.
 - oleosus — S. Alicantinus.
 - ex Oleo Tereb. volat. et Potassae, II. 634.
 - ex Olivo et Sodae, II. 414.
 - picrus, II. 413.
 - Potassae terebinthinaceus, II. 634.
 - sebaceus — Sapo domesticus.
 - Sodae oleaceus s. oleosus — S. Alicant. et medicat.
 - — sebaceus, II. 413.
 - Starkeyanus, II. 634.
 - stibiatius, 232.
 - sulphurato-ceratus, II. 376.
 - Sulphureti Sodae, II. 575.
 - tartareus, II. 634.
 - — Starkeyi, II. 634.
 - terebinthinatus, II. 634.
 - de toilette, II. 414.
 - vegetabilis, 727. II. 380.
 - Venetus, II. 413.
 - viridis, II. 413.
 - vitrioliorum, II. 98.
 - Wlogdensis, II. 413. 414.
- Saponaria officinalis, II. 614.
- rubra, II. 514.
- Saponina, II. 514.
- Sapota dissecta, 473.
- salicifolia, 473.
- Sapphirus, 131.
- Sarcocolla, II. 516.
- Sarcecollinum, II. 516.
- Sarsa, II. 516.
- Sarsaparilla, II. 516.
- Sassafras, II. 524.
- Saturaja, II. 526.
- capitata, II. 526.
 - hortensis, II. 526.
 - Thymbra, II. 526.
- Saturus, II. 333.
- phosphoratus, II. Add.
- Saxifraga alba, II. 626.
- Anglicana, II. 599.
 - granulata, II. 526.
 - rubra, II. 589.
- Scabiosa arvensis, II. 527.
- succisa, II. 527.
- Scammonium, II. 527.
- Aleppense, II. 527.
 - de Aleppo, II. 527.
 - Americanum, II. 103.
 - Halpense, II. 527.
 - Monspeliacum, II. 527.
 - Smyrnaeum, II. 527.
 - Syriacum, II. 527.
- Scandix Cerefolium — Chaerophyllum sat.
- Scarabaeus unctuaris, II. 113.
- Scariota, 512. II. 49.
- Schoenanthus, 193.
- Scilla marina, II. 531.
- maritima, II. 530.
 - — exsiccata, II. 531.
 - praeparata, II. 531.
 - rubra, II. 531.
- Scillitina, II. 531.
- Scillitimum, II. 531.
- Scincus, 681.
- marinus, 681.
 - marimus, 681.
 - officinalis, 681.
- Sclearea, II. 500.
- Scleroderma cervinum, 331.
- Sclerotium Clavus, II. 545.
- Scobs Ferri, 632.
- Ligni Sant. rubri, II. 613.
- Scopolendrium, II. 544.
- officinale, II. 544.
 - verum, 456.
- Scoparia, 693.
- Scordium, II. 635.
- Scorodonia, II. 645.
- Scorpio Europaeus, 682.
- Scorzonera, II. 544.
- Hispanica, II. 544.
 - humilis, II. 544.
 - latifolia sinuata, II. 544.
- Scrofularia, II. 645.
- Scrophularia aquatica, II. 544.
- foetida, II. 545.
 - nodosa, II. 545.
 - vulgaris, II. 545.
- Scutum antispasmodicum, II. 287.
- stomachicum, II. 287.
 - pro umbilico, 343.
- Scyphophorus cocciferus, II. 63.
- pyxidatus, II. 63.
- Sebaceum Palmae, II. 243.
- Sebestena, II. 231.
- Sebum, 62. f. Sevum.
- ovillum, 63.
 - vervecinum, 63.
- Secale, II. 545.
- cereale, II. 545.
 - cornutum, II. 545.
- Sedum acre, II. 546.
- majus, II. 546.
 - minus, II. 546.
 - Rhodiola, II. 546.

- Sedum Telephium, 572.
 Segetria ciliaris, 260.
 Selinum Cervaria, II. 547.
 — Galbanum — Bubon.
 — Oroselinum, II. 547.
 — palustre, II. 547.
 Semen Cinae, 520.
 — Contra, 520.
 — Cynae, 520.
 — Lumbricorum, 520.
 — sanctum, 520.
 — Santonicum, 520.
 — Sinae, 520.
 — contra vermes, 520.
 — Zedoariae, 520.
 Semina frigida majora, II. Add.
 — Perlarum, 358.
 Sementina, 520.
 Sempervivum, II. 546.
 — tectorum, II. 546.
 Senecio, II. 547.
 — coeruleus, 622.
 — Jacobaea, II. 548.
 — vulgaris, II. 547.
 Senega, II. 365.
 Senegina, II. 365.
 Seneka, II. 365.
 Senna, II. 548.
 — de la Faltie, II. 548.
 Sepia officinalis, 358.
 Sepiae os, 358.
 — praeparatum, 359.
 Septemfoium, II. 661.
 Septinervia, II. 331.
 Serici folliculi, II. 567.
 Sericum adhaesivum, 690.
 — Anglicum, 690.
 — crudum, II. 567.
 — tostum, 413.
 Serpentaria, II. 544.
 — minor, 278.
 — rubra, 331.
 — Virginiae, 261.
 — Virginiana, 264.
 — Virginica, 261.
 — vulgaris, 331.
 Serpyllum, II. 649.
 Serpyllum, II. 649.
 Serum, II. 567.
 — Lactis, II. 567.
 — acetosum, II. 568.
 — acidum, II. 568.
 — aluminatum, 141. II.
 — 568.
 — aluminosum, 141. II.
 — 668.
 — cum Cinna-
 mo, 141.
 — antiscorbuticum, 546.
 II. 569. 611.
 — aperitivum, II. 91.
 — chalybeatum, II. 568.
 — compositum, II. 569.
 — depuratum, II. 567.
 — dulce, II. 567.
 — Hoffmanni, II. 567.
 — dulcificatum, II. 568.
 — Hagenoti, 735.
 — mammatum, II. 101.
 — pulveratum, II. 567.
 — cum Sinapi, II. 572.
 — sinapinum, II. 572.
 — sincerum, II. 567.
 — van Swieten, II. 412.
 — tamarindatum, II. 568.
 611.
 — tamarindatum, II.
 — 568. 611.
 — tartarisatum, II. 568.
 — temperans, II. 611.
 — vaccinum, II. 567.
 — vinosum, II. 568.
 — Weissii, II. 569.
 Sesamum, II. 569.
 — orientale, II. 569.
 Seseli Creticum, II. 569.
 — Massiliense, II. 569.
 — montanum, II. 569.
 — pratense, II. 569.
 — tortuosum, II. 569.
 Sesquichloreti Ferri Liguor, 654.
 Sesquichloruretum Ferri, 653.
 Sevum, 62.
 — bovillum, 63.
 — bubulum, 63.
 — cervinum, 63.
 — Ceti, 453.
 — hircinum, 63.
 — ovillum, 61.
 — praeparatum, 62.
 — vervecinum, 63.
 Siciliana, 767.
 Sideritis hirsuta, II. 690.
 Siderocyanas Ferri, 669.
 Sief album, II. 337.
 — cum Opio, II. 337.
 Siegesbeckia orientalis, 59.
 Sigillum Salomonis, 692.
 Silene, II. 569.
 — Behen, 319.
 — Otites, II. 569.
 — Virginica, II. 569.
 Siler montanum, II. 62.
 Silicas Aluminae et Ferri, 133.
 — et Glucini, 133.
 — et Sodae, 133.
 — Magnesia, II. 95.
 — Zirconii, II. 697.
 Siliciphthoruretum Aluminii,
 133.
 Siliqua Banillae, II. 670.
 — dulcis, 452.
 — hirsuta, II. 593.
 — Vanillae. Vanillae s. Va-
 milliae, II. 670.
 Silurus Glanis, 680.
 Simarouba, II. 570.
 — amara, II. 570.
 Simaruba, II. 570.
 — officinalis, II. 570.
 Sina, 520.
 Sinapis alba, II. 570.
 — nigra, II. 570.
 Sinapisimus fortior, II. 571.
 — irritans, II. 571.
 — mitior, II. 571.
 — simplex, II. 571.
 Sinopsis, 131.
 Siphonia Cahuchu, II. 441.
 — elastica — Siph Cahuchu.
 Sison, II. 573.
 — Amomum, II. 573.
 Sisymbrium Nasturtium, II. 233.
 — Sophia, II. 573.
 Sium Ammi, 134.
 — Amomum, II. 573.
 — angustifolium, II. 573.
 — latifolium, II. 573.
 — Ninsi, II. 574.
 — nodiflorum, II. 573.
 — Sisarum, II. 573.
 Smaltum, 543.
 Smaragdus, 133.
 Smilacium, II. 516.
 Smilax China, 471.
 — officinalis — S. syphil.
 — Sarsaparilla, II. 516.
 — syphilitica, II. 516.
 Smiris, 131.
 Smyris, 131.
 Soda, II. 577.
 — acetata, II. 589.
 — acetosa, II. 589.
 — aërata, II. 577.
 — boraxata, II. 580.
 — caustica, II. 574.
 — fluida, II. 574.
 — communis, II. 577.
 — cretacea, II. 577.
 — depurata, II. H.
 Soda effervescens, II. 577.
 — impura aërata, II. 577.
 — muriatica, II. 575.
 — nativa, II.
 — phosphorata, II. 582.
 — phosphorica, II. 582.
 — Pura, II. 574.
 — — liquida, II. 574.
 — purificata, II. 577.
 — sulphurica, II. 583.
 — tartarisata s. tartarizata, II.
 — 412.
 — vitriolata, II. 583.
 Sodae Subcarbonas exsiccata, II.
 — 578.
 — Carbonas, II. 579.
 — Murias, II. 575.
 — — exsicc., II. Add.
 — Phosphas, II. 582.
 — Subboras, II. 580.
 — Sulphas, II. 583.
 — Sulphuretum, II. 674.
 Sodium, II. 574.
 — iodatum, II. 10.
 Sol, 298.
 Solamen hypochondriacorum,
 II. 404.
 — scabiosorum, 674.
 Solanina, 618. II. 586.
 Solaninum, 618. II. 586.
 Solanum Dulcamara, 618.
 — furiosum, 295.
 — lethale, 295.
 — Lycopersicum, II. 586.
 — maniacum, 605.
 — Melongena, II. 586.
 — nigrum, II. 580.
 — quadrifolium, II. 314.
 — scandens, 018.
 — tuberosum, II. 586.
 — vesicarium, 88.
 Soldanella, II. 587.
 Solenostemma Argel — Cyan-
 chum.
 Solidago Saracenicum, II. 679.
 — Virga aurea, II. 678.
 Solutio Acetat. Cupri et Muriat.
 Ammon., 591.
 — — Mercurii, II. 204.
 — — Morphini, II. 215.
 — — Plumbi aquosa, II. 350.
 — — crystallis. fortior,
 II. Add.
 — — — opioacea, II. 350.
 — — plumbici, II. 342.
 — — Zinci, II. 604.
 — Acetitis sinzici, II. 604.
 — Acidi arsenicosi et Nitra-
 tis Potass., 273.
 — — muriat. oxyg. vapo-
 rif., 33.
 — — nitrici vaporifera, 47.
 — alexiteria, 33.
 — — Gaubiana, 258.
 — — oxygenata, 510.
 — aluminosa, 138.
 — Ammoniaci subcarb. alco-
 hollisata, 165.
 — antiscorbutica, 316.
 — antiscrophulosa, 316.
 — antistruumalis s. antistru-
 mosa, II. 10.
 — Arseniatis Ammoniaci, 275.
 — arsenicalis, 273.
 — — amara, 273.
 — — Borussica, 274.
 — — Brerae, 273.
 — — Rowleri, 273.
 — — Heimi, 273.
 — — Jacobi, 273.
 — — simplex, 274.
 — arsenicata, 273.
 — Arsenici, 270.
 52 *

Solutio Arsenitis kalicae. 273.
 — Potassae, 273.
 — balsamica alcalisata II. 579.
 — Barytae muriaticae, 315.
 — Belladonnae, 296.
 — Calcariae muriaticae, 367.
 — sulphurato-stibiatae, 234.
 — Calcis, 362.
 — Muriatis, 367.
 — Camphorae aetherea, 375.
 — aquosa, 372.
 — oleosa, 378.
 — cathaeretica, 269.
 — cerata, 250.
 — Chloratis Potassae, II. 397.
 — Citratis kalici, II. 404.
 — citro-muriatica, II. 576.
 — Coeheni, II. 373.
 — Cindetti, II. 10.
 — Cremoris Tartari, II. 409.
 — cuprata, 586.
 — Cupri ammoniacalis, 595.
 — sulphurici aquosa, 586.
 — cupro-arseniata, 269.
 — Deutoiodureti Mercurii alcoholica, II. 188.
 — aetherea, II. 188.
 — Elatecii, II. 212.
 — epispastica, 241.
 — evaporatoria, 77.
 — excitans, II. 576.
 — Extracti Nucis vomicae, II. 241.
 — ferrata, 669.
 — Ferri aluminosa, 650.
 — — muriatici cum Baryta mur., 316.
 — Ferrocyanatis Potassae, 39.
 — Fowleri, 273.
 — Fuliginis foetida, 287.
 — gelatinosa, 684.
 — Guajaci gummosa, 716.
 — Gummi Guttae alkalina, 733.
 — Hahnem. saponacea, II. Add.
 — Heinekii, 274.
 — Hepatis Sulphuris, II. 376.
 — Hydrargyrate, II. 186.
 — Hydrarg. gummosi, II. 125.
 — Hydriodatis Potassae, II. 9.
 — — iodurati, II. 10.
 — Hydrochloratis Ammoniaci et Ferri, 669.
 — — Zinci aetherea, II. 684.
 — Hydroiodatis Potassae, II. 9.
 — — iodurati, II. 10.
 — hypnotica, II. 254.
 — lithontripctica, II. 380.
 — — della Lena, II. 401.
 — Malatis Ferri, 661.
 — Marryati, II. 179.
 — mercurialis, II. 200.
 — Mercurii corrosivi, II. 178.
 — mineralis, 273.
 — — Fowleri, 273.
 — Murchii acetici, II. 215.
 — mucilaginosa, 728, II. 653.
 — Muriatis Ammon. acetata, II. Add.
 — — Barytae, 315.
 — — Calcis, 367.
 — — hydrargyrate, II. 184.
 — — Ferri, 554.
 — — composita, 654.
 — — ferri aetherea, 655.
 — — spirituosa, 654.
 — — spirituoso-aetherea, 655.
 — — Hydrargyri oxydati, II. 200.

Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corrosdens, II. 179.
 — et Ammoniae fortior, II. 200.
 — — oxygenati, II. 178.
 — — oxydati et Ammon. dilutior, II. 200.
 — — Potassae oxygenati, II. 397.
 — — Zinci aetherea, II. 684.
 — — Myrrhae, II. 229.
 — — alcalisata, II. 229-230.
 — — alcoholica, II. 229.
 — — Nitratis Argenti, 261.
 — — — fusi, 261.
 — — Hydrargyri ammoniacalis, II. 198.
 — — Sodae, II. 586.
 — — nitricata s. nitrosa, 48.
 — — Opii alcoholisata, II. 254.
 — — oxygenata Calcis, 355.
 — — Oxymuriatis calcici, 355.
 — — Pearsoni, 274.
 — — Plumbi in Acido acetoso, II. 340.
 — — Potassae, II. 370.
 — — alcoholica, II. 373.
 — — causticae, II. 370.
 — — prophylactica contra scarlatinam, 296.
 — — Resinae Guajaci aquosa, 716.
 — — resolvens Niemanni, 172.
 — — Vogleri, 172.
 — — Rob. Jumperi, II. 39.
 — — salina gelatinosa, II. 584.
 — — salino-gelatinosa, 687.
 — — Saponis, II. 417.
 — — aetherea, II. 419.
 — — alcoholica, II. 417.
 — — aromatica, II. 418.
 — — et camphorata, II. 418.
 — — camphorata, II. 418.
 — — et opiaceae, II. 419.
 — — Saviardi, II. 373.
 — — sedativa, II. 254-264.
 — — ad strumam, II. 10.
 — — styptica Looftii, 654.
 — — Subacetatis Cupri et Ammoniae, 595. et Add.
 — — — plumbici, II. 342.
 — — Subcarbonatis Ammoniaci alcoholica, 148.
 — — Ammoniae, 161.
 — — ammoniaci spirit., 148.
 — — Potassae aquosa, II. 380.
 — — Sublimati, II. 178.
 — — corros. alcoholica, II. 178.
 — — — opiaceae, II. 185.
 — — — aetherea, II. 180.
 — — — aquosa, II. 177.
 — — Sulphatis argenti — Liq. Arg. sulph. Cupri, 586.
 — — — et Ammoniaci, 589.
 — — — aromatisata, 586.
 — — — camphorata, 586.
 — — — composita, 587.
 — — Potassae II. 387.
 — — — Zinci, II. 690.
 — — — aluminosa, II. 692.
 — — — aquosa simplex, II. 690.
 — — — zinctici, II. 691.
 — — Sulphureti Antimonii et Calcis, 234.

Solutio Sulphureti Potassae alcoholica, II. 377.
 — — Tartari depurati, II. 409.
 — — — solubilis, II. 405.
 — — — alcoholica, II. 406.
 — — — aquosa, II. 405.
 — — Tartratis Stib. et Potassae, 240.
 — — Thascheri, 164.
 — — Veratrini, II. 672.
 — — vitriolica, II. 692.
 — — Weikardi, II. 201.
 — — Zinci aluminosa, II. 692.
 — — Sonchus asper, II. 587.
 — — laevis, II. 687.
 — — oleraceus, II. 587.
 — — Sophia Chirurgerum, II. 573.
 — — Sophora tinctoria, II. Add.
 — — Sorbus, II. 587.
 — — aucuparia, II. 587-588.
 — — domestica, II. 587.
 — — Sotirella parva, II. 271.
 — — Soymida, II. 608.
 — — Sparadrap s. Sparadrapium adhaes., II. 638.
 — — album, II. 355.
 — — aromaticum, II. 224.
 — — e Cetaceo, 456.
 — — commune, II. 620.
 — — compositum c. emplastris, II. 355.
 — — ad Corpus conditum involvendum, II. 224.
 — — desiccativ. s. exsiccans, II. 338.
 — — cum emplastris, II. 625.
 — — epuloticum, II. 354.
 — — Goulardi, II. 346.
 — — ordinarium, 253.
 — — pallidum, II. 354.
 — — resinosum, II. 640.
 — — resolvens, II. 319.
 — — rubrum, II. 155.
 — — vesicans, 408.
 — — viride, 593.
 — — vulgaris, 253.
 — — Spartium scoparium — Gemista scop.
 — — Spathula foetida, II. 18.
 — — Spathum s. Spatum calcareum, 356.
 — — ponderosum, 317.
 — — Species adstringentes, II. 208.
 — — — pro gargarismate, II. 427.
 — — Althaeae, 119.
 — — — compositae, 121.
 — — amarae, 13-448.
 — — amaricantes, 13.
 — — anodynae, 410-11. 309.
 — — anthelminticae, 13-264.
 — — antihæmorrhoidales, 91.
 — — antinephreticae, 256.
 — — antispasmodicae, 706.
 — — antiscorbuticae, II. 437. et Add.
 — — antispasmodicae, II. 663.
 — — aperitivae majores, 257.
 — — — minores, 257.
 — — — cum Rheo, 257.
 — — contra apoplexiam, II. 302.
 — — aromaticae, 380-459-11. 57-85-477-500.
 — — — caryophyllatae, 382.
 — — — completae, 382.
 — — — rosatae, 380-381.
 — — — completae, 381.
 — — avenaceae, 301.
 — — bechicae, 421-456-630-734-11. 35-75-35-680.
 — — — pro Bromio Avenae, 301.
 — — de Bryonia, 330.
 — — carminativae, 422-459.
 — — caryocostinae, II. 528.

- Species ad cataplasma, 119. 120.
 — pro cataplasmate emolliente, 119.
 — catharticae et sudorificae, 246.
 — cephalicae, 170. II. 114.
 — pro cucuphis, II. 19.
 — epithemate, II. 58.
 — fomentatione, II. 58.
 — sacculo, II. 19.
 — pro clysmate, 121.
 — cordiales, II. 69.
 — temperatae, II. 69.
 — pro cucuphis, II. 57.
 — Decocti antinephrithici, 256.
 — pro gargarism. adstring., II. 427.
 — Lignorum, 420. 716.
 — antipodagr. Vibenensis, 718.
 — nephro-cathart. Forestii, 256.
 — pro Decocto antiarthritico, 718.
 — antipsorico, 706.
 — antipodagr. Vibenensis, 718.
 — Avenae, 301.
 — carminativo, 422.
 — demulcente, 727.
 — Florum et Fructuum, II. 35.
 — ad gangraenam, II. 476.
 — infantum, II. 76.
 — Lignorum, 420.
 — nigro, 678.
 — vulnerario, II. 324.
 — ad Decoctum Lignorum, 716.
 — depurantes, 2.
 — detergentes s. detersivae, 717.
 — Diaboracis, II. 580.
 — Diacinnamomi, 380. 382.
 — Diacretae, 361.
 — Diaereos, II. 19.
 — Diagalappae, II. 22.
 — Diamargaritae frigidae, II. 242.
 — calidae, II. 695.
 — Diambrae, 380. 382.
 — sine odoratis, 381.
 — completae, 382.
 — Dianthos, II. 477.
 — Diapentes, II. 228.
 — diaphoreticae, II. 507.
 — Diarrhodon, II. 476.
 — Diascordii, II. 289.
 — Diatragacanthae, II. 654.
 — frigidae, II. 654.
 — Diatron Santalon, II. 514.
 — Diaturbith cum Rheo, II. 447.
 — discutientes, 14.
 — diureticae, 255. 256. 291. II. 316.
 — emmenagogae, 336.
 — emollientes, 119. 459. II. 96.
 — ad s. pro cataplasmate, II. 74.
 — ad enema, 121.
 — ad enema, 121.
 — pro enemate emolliente, 121.
 — pro epithemate, II. 476.
 — cordis et pulsuum, II. 476.
 — Extracti Nucis vom, II. 247.
 — ad fomentum, II. 85.
- Species ad fomentum emolliens, 119.
 — pro fomento emolliente, 119.
 — pro potu ad colicam, 459.
 — emmenagogo, 336.
 — ad gangraenam, 14.
 — antihæmorrhoidali, II. 427.
 — laterali, II. 309.
 — fotus discutientis et nervini, 170.
 — fumales, 323.
 — pro suffimento, II. 244.
 — ad fumigationem anticontagiosam, 57.
 — pro fumigationibus, 323.
 — pro fumo, 323.
 — contra gangraenam, 14. II. 476.
 — ad gargarisma, 121.
 — pro gargarismate, 121.
 — adstringenti, II. 127.
 — emolliente, II. 96.
 — de Gemmis frigidæ, II. 242.
 — guajacinae compositae, II. 515.
 — Herbarum pro infuso analeptico, 256.
 — Hierae picrae, 104.
 — de Hyacintho, II. 476.
 — Imperatoris, 380. 381.
 — pro infuso diuretico, II. 316.
 — pectorali, 121.
 — ad infusum pectorale, 121.
 — lenientes, 727.
 — lactificantes Rhazis, 380. 382.
 — Lapid. pretiosor. frigid., II. 242.
 — Lignorum, 716.
 — mundificantes, 2.
 — nephro-catharticae Forestii, 256.
 — nervinae, 525.
 — pro cucuphis, 613.
 — externae, II. 114.
 — pro odoramento, II. 18.
 — odoriferæ, II. 18.
 — pectorales, 121. 683. II. 65. 76. 674.
 — cum Fructibus, II. 35.
 — contra pleuresiam, II. 309.
 — pro potu infantum, II. 76.
 — purgantes, II. 549.
 — resolventes, 14. 459. II. 428. 488. 515.
 — externae, 14.
 — contra scorbutum, II. 437.
 — sputum sanguinis, II. 208.
 — sudorificae, 313. 420. II. 507.
 — ad suffundendum, 323.
 — pro suffitu, 323.
 — pro Thea, II. 108.
 — pro Tisana, 704.
 — Turionum Pini comp., II. Add.
 — pro vaporibus Acidi acetici, 21.
 — muriatici, 33.
 — nitrici, 47.
 — Superoxydi muriatici, 509.
 — vermifugae, 13.
 — viscerales pro clysmate s. enematis Kaempferi, H. Add.
 — vulnerariae, 448. II. 324. 500.
- Specificum antitrophicum Weisfæci, 673.
 — antiepilepticum Weismani, 588.
 — antifebrile Crollii, 352.
 — cephalicum, II. 153.
 — Cranii, 212.
 — Genevensis, II. 203.
 — jalapinum, II. 22.
 — Paracelsi, II. 385.
 — stomachicum Poterii, 215.
 — Tartari pharyngicum, 130.
 — de Zobel, 135.
 — Specilla cerea, II. 353.
 — Sperma Ceti, 453.
 — Mercurii, II. 203.
 — Ranarum, 681.
 — Spertiola Crollii, II. 227.
 — Sphaera marina, II. 323.
 — thalassia, II. 322.
 — Sphaerococcus Helminthochorton — Gigartina.
 — Sphondylium, 333.
 — Spica, II. 57.
 — alpina, II. 233.
 — Celtica, II. 233.
 — Indica, II. 233.
 — Nardus, II. 233.
 — Spigelia anthelmia, II. 588.
 — Marylandica, II. 588.
 — Spilanthus, II. 234.
 — Acmella, 59.
 — oleraceus, II. 234.
 — Spina alba, 417. 418. II. 207.
 — cervina, II. 444.
 — domestica, II. 444.
 — Spinachia, II. 589.
 — Spinacia, II. 589.
 — oleracea, II. 589.
 — Spinæ dorsi Mustelæ Piscis, 364.
 — Viperae, 681.
 — Vulpis, 681.
 — Spiræa Filipendula, II. 589.
 — trifoliata — Gillenia trifoliata.
 — Ulmaria, II. 589.
 — Spiritus Absinthii, 6.
 — Abietis, 2.
 — Aceti, 17.
 — aceticus-aethereus, II. Add.
 — Aeruginis, 19.
 — aethereus nitrosus, 71.
 — vitriolatus, 76.
 — Aetheris aromaticus, 395.
 — ferratus, 655.
 — nitratus, 71.
 — nitrici, 71.
 — nitrosi, 71.
 — sulphurici, 75.
 — comp., 76.
 — vitriolici, 75.
 — compositus, 76.
 — Alcali volatilis, 148.
 — alexiterius, 388.
 — Aluminis, 53.
 — ammoniacalis terebinthinatus, 150.
 — ammoniacatus, II. 257.
 — Ammoniac, 148.
 — anisatus, 149.
 — aromaticus, 151.
 — compositus, 151.
 — foetidus, 285.
 — succinatus, 158.
 — cum Succino, 158.
 — ammoniato-anisatus, 149.
 — Angelicæ, 199.
 — compositus, 199. 200.
 — camphoratus, 199.
 — Anhaltinus, II. 629.
 — Anisi, 210.
 — compositus, 210.
 — Anthos, II. 483.
 — antihystericus, 285. 434.

- Spiritus antiïctericus, II. 628.
 — antiscorbut. Drawitzii, 549.
 — aperitivus Renoti, II. Add.
 — Armoraciae, II. 438.
 — compos., II. 438.
 — aromaticus, 388. II. 110. 210.
 484. 649.
 — acetosus, II. 59.
 — acidus, II. 210.
 — ammoniacalis, 151.
 — camphoratus, 199.
 — arthriticus Pottii, II. 633.
 — Aurantiorum abstractitius, 528.
 — Corticum, 528.
 — Balsami Copaivae, 304.
 — Peruviani, 309.
 — balsamicus, II. 630.
 — Beguini, 172.
 — bezoardicus Bussii, 180.
 — Bryoniae albae compositus, 435.
 — caeruleus, 596.
 — Camphorae, 376.
 — camphorato-crocatus, 376.
 — camphoratus, 376.
 — Cantharidum ammoniacalis, 150.
 — Cari Carvi, 423.
 — carminativus, II. 484.
 — — Sylvii, 200.
 — Carvi, 423.
 — Caryophyllor. aromaticorum, 425.
 — Castorei compositus, 434.
 — Cerasorum nigrorum, 452.
 — Cinnamomi, 389.
 — Citri Corticis, 538.
 — Cochleariae, 547.
 — — compositus, 548.
 — Convallariae, 568.
 — Cornu Cervi, 162. 163.
 — — rectificatus, 163.
 — — succinatus, 178.
 — — vinosus, 148.
 — Cortic. Aurantiorum, 528.
 — Croci, 574.
 — Diatribon, II. Add.
 — Eboris, 163.
 — Foeniculi alcalinus, 196.
 — Formicarum, 19. 671.
 — Frumenti, 81.
 — — concentratissimus, 85.
 — — concentratus, 85.
 — — depuratus, 81. Alcoh. dilut.
 — — dilutus, 85.
 — — rectificatus, 85.
 — Fuliginis, 19. 673.
 — fumans Beguini, 172.
 — Fumariae, 675.
 — Jasmini, II. 32.
 — Juniperi, II. 41.
 — — compositus, II. 42.
 — Lauro-Cerasi, 39.
 — Lavandulae s. Lavendulae, II. 60.
 — — ammoniacalis, II. 61.
 — — compositus, II. 60.
 — Ligni Guajaci, 208.
 — Liliorum Convallium, 568.
 — Lumbriocorum, 163.
 — — vinosus, 149.
 — Mastiches compos., II. 104.
 — mastichinus, II. 104.
 — Mastichis, II. 104.
 — matricalis, II. 104.
 — Melissa, II. 110.
 — — compositus, II. 110.
 — — magistralis officin., II. 110.
 — Mellis Andernaci, 249.
 — Menthae crispae, piperitae et viridis, II. 119. 120.
 — — saccharatus, II. 120.
- Spiritus Millefolii, II. 210.
 — acetatus, II. 210.
 — Mindereri, 173. 174.
 — muriatico-aethereus, 70.
 — Myristicae s. Myristicae moschatae s. aromaticae, II. 223.
 — Myrti Pimentae, II. 327.
 — nervinus Riemeri, 166.
 — Nasturtii aquatici, II. 231.
 — Nitri, 45.
 — — acidus, 45.
 — — dulcis, 71.
 — — fumans, 46.
 — — Glauberi, 46.
 — — Glauberianus, 46.
 — — tenuis, 47.
 — — tenuis, 47.
 — nitrico-aethereus, 71.
 — Nucis moschatae, II. 223.
 — — compos., II. 223.
 — Olei Terebinth aethereus, II. 627.
 — oleosus aromat Sylvii, 151.
 — ophthalmicus Himlyi, 309.
 — — Mindereri, 173.
 — Oryzae, 81.
 — Panis, II. 306.
 — Pimentae s. Pimento, II. 327.
 — potassatus, II. 373.
 — Palegii, II. 425.
 — purgans, II. 32.
 — Pyrethri, II. 430.
 — — compos., II. 430.
 — Raphani compos., 548.
 — — rusticani, II. 438.
 — rectificatus, 82.
 — resolvens, II. 417.
 — — Schmuckeri, 172.
 — Ribium nigror., II. 462.
 — Rorismarini, II. 483.
 — — acetatus, II. 210.
 — — compositus, II. 210.
 — — officinalis, II. 483.
 — Rosarum, II. 473.
 — Sabiniae, II. 42.
 — Sacchari, 81.
 — salinus aromaticus, 151.
 — Salis, 31.
 — — acidus, 31.
 — — Ammoniaci per Alkali fixus, 161.
 — — anisatus, 149.
 — — aquos, 144. 161.
 — — c. Calce viva parat., 144.
 — — causticus, 144.
 — — cum Cinerib. clavell., 161.
 — — dulcificatus, 148.
 — — dulcis, 148.
 — — foeniculatus, 149.
 — et Add.
 — — lactescens, 158.
 — — lacteus, 158.
 — — per Sal Tartari, 161.
 — — simplex, 161.
 — — succinatus, 158.
 — — cum Succino, 158.
 — — sulphurat., 172.
 — — tartarisat., 161.
 — — urinosus, 144.
 — — vinosus, 148.
 — — volatilis, 144.
 — Armoniaci anisat., 149.
 — — dephlogisticatus, 509.
 510.
 — Dubois, 70.
 — dulcis, 70.
 — fumans, 31.
 — marini, 31.
 — — coagulat., II. 368.
 — — dephlogist., 509. 510.
- Spiritus Salis terebinthinatus, II. 633.
 — — volatilis oleos. Sylvii, 151.
 — Salviae, II. 502.
 — Sambuci, II. 511.
 — saponaceus, II. 417.
 — saponatus, II. 417.
 — Saponis, II. 417.
 — — compositus, II. 634.
 — Saturni, 20.
 — Serpylli, II. 649.
 — suaveolens pro suffitu, 537.
 — Succinatiss Ammoniae, 179.
 — — ammonici, 179.
 — sulphureo-aethereus, 75.
 — — vinosus, 75.
 — sulphurico-aethereus, 75.
 — — camphoratus, 375.
 — — ferruginosus, 655.
 — — martiat., 655.
 — Sulphuris, 56.
 — — Beguini, 172.
 — — per campanam, 56.
 — — volatilis, 53. 172.
 — Tartari, II. Add.
 — — rectificatus, II. Add.
 — — simplex, II. Add.
 — — vitriolatus, II. Add.
 — tenuior, 82.
 — Terebinthiniae, II. 627.
 — theriacalis, II. 287.
 — — camphoratus s. cum Camphora, 200.
 — — non camphoratus, 200.
 — — correctus, 200.
 — — simplex, 200.
 — Thymi, II. 649.
 — traumaticus, II. 593.
 — de tribus, II. Add.
 — Trifolii fibrini, II. 659.
 — Ungulae Alcis, 163.
 — Valerianae compositus, II. 670.
 — Vanillae, II. 671.
 — Vini, 81. 85.
 — — absolutus, 84.
 — — alcoholisatus, 83.
 — — alkalisatus, 84.
 — — ammoniacus, 172.
 — — camphoratus, 376.
 — — crocatus, 376.
 — — communis, 83.
 — — concentratissimus, 83.
 — — dephlegmatissimus, 84.
 86.
 — — depuratus, 83.
 — — fortior, 82.
 — — Gallici, 81. et Add.
 — — rectificatissimus, 82.
 83. 84. 85.
 — — rectificatus, 81. 82. 83.
 84. 85.
 — — tartarisatus, 84.
 — — tenuior, 82.
 — — tenuis, 84. 85.
 — — vinosus camphoratus, 376.
 — — Frumenti, 81.
 — — rectificatus, 82.
 — — tenuior, 82.
 — Viperarum, 163.
 — Viridis Aeris et Veneris, 19.
 — Vitrioli, 53.
 — — acidus, 53.
 — — coagulat. Mynsichti, II. 385.
 — — dulcis, 75.
 — — phlogisticatus, 56.
 — — tenuis, 53.
 — — volatilis, 53.
 — — causticus, 144.
 — — foetidus, 285.

Spiritus vulnerarius, II. 210.
 — acidus, II. 210.
 Spodium, 365.
 Spongia calcinata, 412.
 — cerata, II. 590.
 — Cynosbati, 319.
 — lacinulosa, II. 590.
 — marina, II. 589.
 — maritima, II. 589.
 — officialis, II. 590.
 — — cerata, II. 590.
 — — tosta, 412.
 — praeparata, II. 590.
 — — abque cera, II. 590.
 — usta, 412.
 Spongiae ceratae, II. 590.
 — compressae, II. 590.
 — officinales, II. 598.
 — ustae, 412, f. libr. Spon-
 gia.
 Spuma Martis, 663.
 Squamae Ferri purif., 638.
 Squamaria, 609.
 Squilla, II. 531.
 Squinanthus, 193.
 Stachys recta, II. 590.
 Stalagmitis cambogioidea, 732.
 Stannas Auri, 300.
 Stanni Amalgamatis Pulvis, II.
 591.
 — Pulvis, II. 590.
 Stannum, II. 590.
 — granulatum, II. 590.
 — Indicum, II. 663.
 — limatum, II. 590.
 — muriaticum oxydulat., II.
 592.
 — praeparatum, II. 590.
 — — cum Sulphure, II. 592.
 — pulveratum, II. 590. 592.
 — raspatum, II. 590.
 — suboxydatum, II. 592.
 — sulphuratum, II. 592.
 Staphisagria, 608.
 Staphysagria, 608.
 Staeche Caroliniana, 320.
 — Limonium, 320.
 Stella Terrae, II. 95.
 Stercus caninum album, 364.
 — diaboli, 279.
 — Gallinae, 59.
 — Pavonis, 59.
 Stibiis Potassae, 215.
 Stibium, 211.
 — oxydatum album, 215.
 — — ablutum, 216.
 — — non ablut., 219.
 — — fuscum, 220.
 — — griseum, 213.
 — — sulphurat. vitrificat.,
 214.
 — oxydulatum, 213.
 — — fuscum, 220.
 — praeparatum, 221.
 — purum, 211.
 — striatum, 221.
 — sulphurat. nigrum, 221.
 — — alcoholisa-
 tum, 221.
 — — crudum, 221.
 — — laevigatum,
 221.
 — — — porphyrisa-
 tum, 221.
 — — venale, 212.
 Stillicidium aromaticum, 171.
 Stipites Angelicae Saccharo
 conditae, 198.
 — Apii Saccharo cond., 255.
 Stizobolium, II. 592. 593.
 — pruriens, II. 592.
 Stizobolium f. Stizobolium.
 Stoechas Arabica, II. 593.

Stoechas citrina, II. 593.
 — Germanica, II. 593.
 — Neapolitana, II. 593.
 — purpurea, II. 593.
 Stomachus vitulinus exsiccat.,
 II. Add.
 Storax, II. 594.
 Stramonium, 604. 605.
 Strobili s. Strobili Pini, II. 325.
 — Lupuli, II. 85.
 Strombus lentiginosus, 357.
 Strychna, II. 594.
 Strychnina, II. 594.
 Strychninum, II. 594.
 — nitricum, II. 595.
 Strychnos colubrina, II. 595.
 — Ignatia — Ignatia amara.
 — Nux vomica, II. 240.
 Styrcinum, II. 595.
 Styrcax amygdaloides, II. 594.
 — Balsamum, II. 594.
 — Benzoin, 320.
 — Calamita, II. 594.
 — cannulata, II. 594.
 — communis, II. 595.
 — in grans, II. 594.
 — granulata, II. 594.
 — liquida s. liquidus, II. 595.
 — Liquidambar, II. 595.
 — in massis, II. 594.
 — officialis s. officinale, II.
 594.
 — purificata, II. 594.
 — Resina, II. 594.
 — solidus, II. 594.
 Subacetis s. Subacetis Cupri,
 592. 594.
 — — impurus, 592.
 — cupricus, 592. 594.
 — Deutoxydi Cupri, 591.
 — Plumbi, II. 336. 340.
 — — liquidus, II. 340.
 — — Protoxydi, II. 340.
 — — dilutus, II. 342.
 — — liquidus, II.
 340.
 Subbisulphuretum Stibii, 229.
 Subboras natricum, II. 580.
 — Sodae, II. 580.
 — Sodii Protoxydi, II. 580.
 Subcarbonas ammonicum em-
 pyreumaticum, 162.
 — Ammoniaci oleosus con-
 cretus, 162.
 — — liquidus, 163.
 — — ammoniacus, 169.
 — Ammoniae, 159.
 — — animale, 162.
 — — liquidum s. liquidus,
 160.
 — oleosus concentratus,
 162.
 — — pyro animale, 162.
 — — — liquidum, 163.
 — — — pyro-oleosum s.
 pyro-oleosus, 162.
 — — liquidus, 163.
 — Barii Protoxydi, 317.
 — Barytae, 317.
 — bismuthicum, 329.
 — Calcariae cretaceum s. cre-
 taceus, 356.
 — Calcii Protoxydi, 356.
 — Calcis, 356.
 — — praeparatus, 359.
 — Ferri, 643.
 — Tritoxydi, 643.
 — ferrosus ferricum, 643.
 — kalicum depuratum, II. 378.
 — — impurum, II. 377.
 — Magnesia, II. 88.
 — natrium, II. 577.
 — Plumbi, II. 336.
 — — Protoxydi, II. 336.
 — Potassae crudus, II. 377.

Subcarbonas Potassae impu-
 rum s. impurus, II. 377.
 — — ex Part. comb., II. 378.
 — — liquidus, II. 380.
 — — purus, II. 378.
 — Potassii Protoxydi, II. 377.
 — Sodae, II. 577.
 — — exsiccata, II. 576.
 — — impurus s. impura, II.
 577.
 — Sodii Protoxydi, II. 577.
 Subchloras Calcis, 356.
 Subchloruretum Antimonii, 235.
 — Calcis liquidum, 356.
 — Sodae liquidum, II. 577.
 Subdeutoacetas Cupri, 591.
 — — et Ammoniac.,
 595.
 Subdeutoacetas Cupri, 584.
 — Potassii, II. 378.
 — Sodii, II. 577.
 — — impurum, II. 577.
 Subdeutonitras Cupri et Am-
 moniaci, 589.
 Subdeutosulphas ammoniaco-
 mercurialis, II. 192.
 — Cupri et Ammon., 588.
 — Hydrargyri, II. 191.
 — Mercurii, II. 191.
 Subdeutoatras Potassii et sti-
 bii, 236.
 Subdeutoxysulphuretum Anti-
 monii, 223.
 Suber, II. 433.
 Suberina, II. 433.
 Subhydrochloras Antimonii, 235.
 Sublimatus corrosivus, II. 175.
 — dulcis, II. 156.
 Submurias ammoniaco-hydrar-
 gyricus, II. 199.
 — Antimonii, 235.
 — Hydrargyri, II. 155.
 — — ammoniatus, II. 199.
 — Mercurii, II. 156.
 — — mitis, II. 155.
 — — praecipitatus, II. 155. 199.
 — — sublimatus, II. 156.
 Subnitras Bismuthi, 329.
 — bismuthicum s. bismuthi-
 cus, 329.
 Suboxydum Plumbi, II. 334.
 — Stanni, II. 592.
 Subphosphas Calcariae s. Calcis,
 363.
 — Calcii Protoxydi, 363.
 — Sodae, II. 582.
 — Sodii, II. 582.
 — — Protoxydi, II. 582.
 Subphosphuretum Calcis, 354.
 Subprotoacetas Plumbi, II. 339.
 Subprotoboras Sodii, II. 570.
 Subprotocarbonas Barii, 317.
 — Bismuthi, 329.
 — Calcii, 356.
 — Plumbi, II. 337.
 — Potassii, II. 377.
 — Sodii, II. 577.
 Subprotoxydrosulphas Antimo-
 nii, 223.
 Subprotomitras Bismuthi, 329.
 — Hydrargyri et Ammoniae,
 II. 192.
 — Mercurii, II. 192.
 Subprotophosphas Calcii, 363.
 — Sodii, II. 582.
 Subprotosulphas Plumbi, II. 339.
 — Potassii, II. 388.
 Subsulfas Cupri et Antimonii,
 588.
 — Hydrargyri peroxydati, II.
 191.
 — Stibii loti, 221.
 Subsulfas ammonio-cupri-
 cum, 588.
 — Antimonii, 214.

760 **Subsulphas Cupri et Ammoniae — Sulphas Potassii Protoxydi.**

Subsulphas Cupri et Ammoniae, 588.
 — Deutoxydi Cupri et Ammoniaci, 588. — et Ammoniae, 588.
 — Hydrargyri peroxydati, II. 191.
 — flavus, II. 191.
 — Potassae, II. 388.
 — Stibii Ioti, 21.
Subtritocarbonas Ferri, 643.
Succinas Ammoniaci, 179.
 — Ammoniae, 179.
 — liquidus, 179.
 — pyro-animale liquidum, 179.
 — pyro-oleoso-aquosum, 179.
 — — — solutus, 179.
Succinum, II. 596.
 — album, II. 596.
 — citrinum, II. 596.
 — oxygenatum, II. 599.
 — praeparatum, II. 597.
 — raspatum, II. 596.
Succisa, II. 527.
Succolata alba, II. 497.
 — antivenerae, II. 182.
 — Castaneae, 432.
 — Lichenis Islandici, II. 65.
 — medica s. simplex, 346.
 — purgans, II. 171.
 — Vanillae odore, 346.
Succus Acaciae Germanicae inspissat., 15.
 — nostratis, 15.
 — Acetosae, 16.
 — Acetosellae, 17.
 — Aconiti inspissatus, 60.
 — Agrestae, II. 680.
 — antiscorbuticus, 546.
 — Armoraciae compositus, II. 438.
 — Aurantiorum, 526.
 — e Baccis Myrtillorum, II. 662.
 — Beccabungae, II. 674.
 — Belladonnae inspissat., 295.
 — Berberum, 326.
 — Boraginis, 332.
 — Bryoniae, 335.
 — Buglossi, 192.
 — Carotae, 607.
 — Centaurii minoris, 447.
 — Cerasorum, 451.
 — Cerefolii, 457.
 — Cichorii, 512.
 — Cicutae, 515.
 — — — inspissatus, 515.
 — Citreorum, 540.
 — Citri, 540.
 — Cochleariae, 546.
 — — — compositus, 546.
 — Conii macul., inspiss., 515.
 — Consolididae, 562.
 — Cucumeris, II. Add.
 — Cydoniorum, 599.
 — Dauci, 607.
 — — — inspissatus, 607.
 — — — depurat., 607.
 — diureticus, II. 438.
 — domesticus, II. 445.
 — Ebuli, II. 507.
 — — — Baccarum, II. 507.
 — Elaterii, II. 214.
 — Fragorum, 672.
 — Fumariae, 674.
 — Glycyrrhizae crudus, II. 77.
 — — — depurat., II. 77.
 — Graminis, 704.
 — Granatorum, II. 427.
 — Granorum Kermaes, 470.
 — Hyoscyami inspissatus, 760.

Succus Hypocystidis, 761.
 — Japonicus, 441.
 — Juniperi inspissatus, II. 38.
 — — — depuratus, II. 38.
 — — — 38.
 — Kermetis, 470.
 — Lactuae virosae inspiss., II. 49.
 — Limonum, 540.
 — Liquiritiae crudus, II. 77.
 — — — anisatus, II. 77.
 — — — de Blois, II. 79.
 — — — depuratus, II. 77.
 — — — c. Gummi, II. 77.
 — — — gummosus, II. 77.
 — Malorum fermentat. chalybeat., 600.
 — Marrubii albi, II. 102.
 — Millefolii, II. 208.
 — Momordicae Elaterii spissat., II. 214.
 — Mororum, II. 216.
 — — — inspissatus, II. 216.
 — Myrtillorum, II. 662.
 — Nasturtii aquatici, II. 234.
 — Oxycocci, II. 662.
 — — — c. Nitrate Potassae, II. 662.
 — Parietariae, II. 313.
 — e Persicorum Floribus, II. 315.
 — Plantaginis, II. 332.
 — Pomorum, II. 368.
 — Prunellae, II. 423.
 — Pulmonariae, II. 426.
 — Rhamni, II. 445.
 — — — cathartici, II. 445.
 — Ribesiorum nigror., II. 461.
 — Ribium, II. 462.
 — Rosarum pallidarum, II. 465.
 — Rubi Idaei, II. 487.
 — Sambuci, II. 507.
 — Baccarum, II. 507.
 — crudus, II. 507.
 — — — inspissatus crudus, II. 508.
 — — — depuratus, II. 508.
 — Saponariae, II. 514.
 — de Spina cervinae, II. 445.
 — Spinae cervinae, II. 445.
 — Stramonii spissat., 605.
 — — — concretus, 605.
 — Taraaci, II. 615.
 — — — temperans et diureticus, 457.
 — thebaicus, II. 246.
 — Trifolii fibrini, II. 656.
 — — — concretus, II. 656.
 — Toxicodendri, II. 460.
 — Tritici repentis, 704.
 — Vaccinii Oxycocci c. Nitrate Potassae, II. 662.
 — Veronicae, II. 674.
 — Violarum, II. 677.
Suffitus Chlorini, 509.
 — oxymuriaticus, 509.
Sulphas acidulum Aluminae, 134.
 — acidulum Aluminae et Lixiviae, 134.
 — Aluminae, 134.
 — — — acetatum, 136.
 — — — acidulum, 134.
 — — — exsiccatum, 134.
 — — — fusum, 134.
 — — — et Lixiviae acidulum, 134.
 — — — et Potassae acidulum s. acidulum, 134.
 — — — ustus, 134.
 — — — acidulum s. acidus, 134.
 — — — aluminico-kalicus, 134.

Sulphas aluminico-kalicus c. Aqua, 134.
 — — — aluminicus c. Aqua, 134.
 — — — 134.
 — Ammoniacae, 169.
 — — — cupratum, 588.
 — Argenti, 263.
 — — — liquidum, 263.
 — Barytae, 317.
 — — — nativus, 317.
 — baryticus nativus, 317.
 — Cadmii, II. Add.
 — calcium, 366.
 — Calcii Protoxydi, 366.
 — Calcis, 366.
 — Chinini, 506-523.
 — cinchonae, 623.
 — Cinchonini, 623.
 — Cupri, 584.
 — — — acidus, 584.
 — — — aluminosus, 587.
 — — — aluminos. camphorat., 587.
 — — — ammoniacalis, 588.
 — — — et Ammoniae s. Ammoniaci, 588.
 — — — coeruleus, 584.
 — — — cupricus, 585.
 — — — acidus, 584.
 — — — c. Aqua, 585.
 — Cupri Deutoxydi acid., 581.
 — cupro-ammoniacale, 588.
 — Ferri, 648.
 — — — ad albedinem calcinat., 648.
 — — — calcinat., 641.
 — — — exsiccata, 648.
 — — — Oxyduli, 648.
 — — — Protoxydi, 648.
 — — — purus, 648.
 — — — viridib., 648.
 — ferrosus c. Aquas purus, 648.
 — Hydrargyri, II. 191.
 — — — luteum, II. 191.
 — — — hydrargyricum cum excessu Oxydi, II. 191.
 — Kali, II. 385.
 — kalico-aluminicum, 134.
 — kalicus crudus, II. 385.
 — — — depuratus, II. 385.
 — Lixiviae, II. 385.
 — Magnesia, II. 92.
 — — — depuratum, II. 92.
 — — — purificatum, II. 92.
 — — — purus, II. 92.
 — — — et Sodae, II. 94.
 — magnescius c. Aqua crudus, II. 92.
 — — — depuratus, II. 92.
 — Magnesi Protoxydi, II. 92.
 — Mercurii, II. 192.
 — Deutoxydi, II. 192.
 — — — oxydulat., II. 191.
 — — — Morphinae s. Morphini, II. 214.
 — — — Protoxydi, II. 192.
 — natrium s. natricus, II. 583.
 — natrium c. Aqua crudus, II. 583.
 — — — depuratus, I. 583.
 — — — depuratus, II. 583.
 — Oxyduli Ferri, 648.
 — Pigmenti Indici liquid., II. 1.
 — Potassae, II. 385.
 — — — acidus, II. 388.
 — — — et Ammoniaci, II. 388.
 — — — depuratus, II. 385.
 — — — ferruginosus, 649.
 — Protoxydi, II. 192.
 — — — cum Sulphure, II. 386.
 — Potassii, II. 385.
 — — — Protoxydi, II. 385.

Sulphas quinicus, 506.
 — Sodae, II. 583.
 — acidulum s. acidulus, II. 583.
 — acidum s. acidus, II. 583.
 — et Magnesia, II. 585.
 — Sodii Protoxydi II. 583.
 — super-ammoniaco-cupreus, 588.
 — cupricus, 588.
 — triammonico-cupricus, 588.
 — Zinci, II. 690.
 — purus, II. 690.
 — zincicus s. zincicus, II. 690.
 — venalis, II. 690.
 — zincicus c. Aqua, II. 690.
Sulphis s. Sulphites Potassae, II. 389.
 — sulphuratus, II. 389.
 — sulphurat. Potassae et Mercurii, II. 192.
Sulphites Sodae, II. 585.
 — sulphuratus, II. 585.
Sulphur, II. 599.
 — antimoniumatum fuscum, 223.
 — rubrum, 223.
 — praecipitatum, 223.
 — tartarisatum, 223.
Antimonii, 229.
 — auratum, 229.
 — liquidum, 233.
 — hydrogenatum, 229.
 — praecipitatum, 223.
 — saponatum, 232.
 — auratum Antimonii, 229.
 — liquid., 233.
 — in bacillis, II. 600.
 — cabalinum—S. impurum.
 — citrinum II. 600.
 — Cupri, 583.
 — depuratum, II. 600.
 — griseum—S. impurum.
 — lotum, II. 600.
 — Lycopodii, II. 87.
 — praecipitatum, II. 600.
 — rubrum, 223.
 — stibiatum, 243.
 — aurantiacum, 229.
 — rubeum, 223.
 — rubrum, 223.
 — rufum, 229.
 — sublimatum, II. 600.
 — lotum, II. 600.
 — vegetabile, II. 87.
Sulphuretum Ammoniacae, 172.
 — hydrogenatum, 172.
Ammoniae, 172.
Antimonii, 221.
 — et Calcis, 234.
 — nativum, 221.
 — nigrum, 221.
 — et Potassae, 235.
 — praecipitatum, 229.
 — praeparatum, 221.
Arsenici, 269.
 — flavum, 269.
 — rubrum, 269.
Barii, 314.
Calcariae, 354.
 — et Stibii, 234.
Calcii c. Sulphate calcico, 354.
 — c. Sulphureto Stibii et Sulphate calcico, 234.
 — Calcis, 154.
 — antimoniumatum, 234.
 — et Arsenici, 270.
 — liquidum, 366.
 — stibiatum, 234.
Ferri, 637.

Sulphuretum Ferri potassati, 638.
Hydrargyri nigrum, II. 138.
 — et Stibii, II. 140.
 — oxydulatum, II. 138.
 — rubrum, II. 152.
 — simplex, II. 138.
 — stibiatum, II. 140.
 — et Stibii, II. 140.
 — sublimatum, II. 152.
 — triturationum, II. 138.
 — kalicum, 375.
Kalii c. Sulphate kalico, II. 375.
 — Lixiviae s. Lixiviae, II. 374.
 — Lixiviae stibiatum, 219.
 — Mercurii, II. 151.
 — Oxyduli Stibii hydrogenatum, 229.
 — Plumbi, II. 333.
 — Potassae, II. 374.
 — et Ferri, 638.
 — martiale, II. 376.
 — simplex, II. 375.
 — Potassii Protoxydi, II. 374.
 — Sodae, II. 574.
 — simplex, II. 574.
 — Sodii Protoxydi, II. 574.
 — Stanni, II. 592.
 — Stibii, 221.
 — arsenicatum, 271.
 — hydrogenatum, 229.
 — nativum, 221.
 — nigrum, 221.
 — crudum, 221.
 — praeparatum, 221.
 — oxydulati, 229.
 — Oxyduli hydrogenatum, 229.
 — praeparatum, 221.
 — rubeum, 223.
 — venale, 221.
 — ablutum, 221.
 — Suboxydi Antimonii hydrogenatum, 223.
 — Vini, 137.
Sulphuroprussuretum Potassae hydrogenatum, 39.
Sumach, II. 460.
Superacetis Cupri impurus, 592.
 — Plumbi, II. 346.
Supercarbonas Calcii Protoxydi, 303.
 — Potassae, II. 377.
Supercarburetum Ferri, 637.
Superdeutosulphas Cupri, 584.
Superhydro-sulphuretum Mercurii, II. 151.
Superhydro-sulphuro-Superhydro-sulfites Oxydi Antimonii, 229.
Supermurias Hydrargyri, II. 175.
Superoxalas kalicum, II. 403.
 — Potassae, II. 403.
 — Potassii Protoxydi, II. 403.
Superoxydum manganicum, II. 98.
 — Plumbi, II. 336.
 — plumbicum, II. 334.
 — plumbosum, II. 334.
Superphosphas Calcii, 366.
Superprotartras Potassii, II. 406.
 — cum Borate Sodae, II. 411.
 — boraxatus, II. 411.
Superprotocarbonas Calcii, 363.
 — Ferri, 647.
Superprotooxalas Potassii, II. 403.
Superprotophosphas Calcii, 366.

Superprotosulphas Sodii, II. 583.
Superstibii kalica, 215.
Supersulphas Aluminae et Potassae, 134.
 — exsiccatum, 134.
 — fusus, 134.
 — Argillae alcalisatum, 134.
 — Oxydi Aluminium et Protoxydi Potassii, 134.
 — Potassae, II. 398.
 — Sodii Protoxydi, II. 583.
Supersulphuretum Mercurii, II. 138.
 — Potassii, II. 375.
 — Sodae, II. 574.
Supertartras kalicum, II. 406.
 — Potassae, II. 406.
 — depuratum, II. 406.
 — Potassii Protoxydi, II. 406.
Supertartris Potassae, II. 406.
Suppositorium ad alvum sollicitandum, II. 416.
 — antihelminticum, 98. 101.
 — antihæmorrhoidale, 413.
 — commune, 250.
 — emolliens, 347.
 — irritans, 554.
 — laxativum, II. 416.
 — leniens, II. 268.
 — Mellis commune, 250.
 — irritans, 554.
 — roborans, II. 434.
 — sedativum, II. 268.
Surinamina, 701.
Sus Scrofa, 504.
Swietenia febrifuga, II. 608.
 — Mahagony, 473. II. 607.
Symphytum, 562.
 — dentarium, 609.
 — maculosum, II. 426.
 — minimum, 320.
 — officinale, 562.
 — tuberosum, 562.
Symplocarpus foetidus—Dracocentrus:
Synopsis, 131.
Syringites, 358.
Syrupus Absinthii, 6.
 — compositus, 6.
 — de Absinthio, 6.
 — compositus, 6.
 — Acaciaram, II. 424.
 — Florum, 424.
 — Aceti, 22.
 — antimoniati, 243.
 — Acetosae, 16.
 — Acetosellae, 17.
 — Acetositis Citri, 542.
 — Acidi acetici, 22.
 — acetosi, 22.
 — citrici, 3. 542.
 — hydrocyanici, 37.
 — phosphorici, 51.
 — sulphurici, 53.
 — de Acido Tartari, 59.
 — de Adianto Monspelicaco, 65.
 — adstringens, II. 463.
 — Jouberti, II. 662.
 — cum Aethere sulphurico paratus, 76.
 — de Agresta, II. 681.
 — Agrestae, II. 681.
 — alcalinus, II. 381.
 — Alexandrinus, II. 473.
 — Allii, gr.
 — de Allio, gr.
 — de Althæa, 125.
 — compositus, 126.
 — Althæae, 125.
 — compositus, 126.
 — officinalis, 125.
 — Ammoniacy, 720.

Syrupus Ammoniaci compos.

- 148
 — de Ammoniaco, 720.
 — ammoniacalis, 720.
 — Amomi Zingiberis, II. 695.
 — Amygdalarum, 185.
 — amygdalinus, 185.
 — Amygdali Persicae, II. 315.
 — — Florum, II.
 315.
 — de Amygdalis, 185.
 — Amygdalium, 185.
 — Anethi Foenic. comp., 255.
 — anodynus, 666.
 — Anthemidis, 464.
 — antiarthriticus, II. 530.
 — antihydopicus, II. 530.
 — antiscorbaticus, II. 440.
 — — compositus, II. 440.
 — — Porali, II. 183.
 — antiscrophulosus, 299.
 — antivenerens St Ildephont,
 II. 180.
 — aperitivus, 255.
 — Apii, 255.
 — de Apio, 255.
 — — compositus, 255.
 — Aquilegiae, 259.
 — Armoraciae, II. 441.
 — — compositus, II. 440.
 — aromaticus, 276.
 — cum Artemisia et Castoreo Lemery, 276.
 — de Artemisia, 276.
 — — compositus, 276.
 — Artemisiae, 276.
 — ad arthritidem et hydro-
 pem, II. 530.
 — de Arundine, 319.
 — Atriplicis Mexicanae, 470.
 — Aurantii, 530.
 — — Florum, 528.
 — Aurantiorum, 528.
 — — Corticum, 530.
 — — alcoholicus, 535.
 — — vinosus, 531.
 — e Succo, 526.
 — de Aurantiis, 526.
 — Auri, 208.
 — — muratico-natrici, 299.
 — Balsami Peruviani, 309.
 — — Indici nigri, 309.
 — — Tolutani, 311.
 — balsamicus, 304, 309, 311.
 — — pectoralis, 313.
 — — de Tolu, 311.
 — bechicus, II. 377.
 — Belladonnae, 207.
 — Bellidi mercurialis, II. 196.
 — Bellidis, 326.
 — de Benzoe, 321.
 — de Berberide, 326.
 — Berberidum, 326.
 — Berberum, 326.
 — Betonicae, 328.
 — Betulae a'hae, 329.
 — Boraginis, 332.
 — Botryos compositus, 470.
 — de Boullay, 391.
 — Boyleanus, 563.
 — de Brassica rubra, 333.
 — Bryoniae, 335.
 — Buslossi, 193.
 — Byzantinius Mesnes, 256.
 — Capilli Veneris, 65, 66, 528.
 — Capillorum Veneris, 65.
 — — compositus, 66.
 — Capitum Papaveris, II.
 311.
 — Cardifolii, 411.
 — cardiacus, 392.
 — Cardui benedicti, 419.
 — Carthami solutivus, 422.
 — Caryophylli rubri, 609.
 — Cascarillae, 422.

Syrupus Cassiae Sennae, II. 560.

- Catechu, 445.
 — Centaurii minoris, 448.
 — Cerasorum, 451.
 — — acidorum, 451.
 — chalybeatus, 650, 668.
 — Chamomeli, 464.
 — Chamomillae, 464.
 — Chenopodii, 470.
 — — chermesinus, 470.
 — Chinae, 491.
 — — compositus, 472.
 — — vinosus, 499.
 — Chinaechinae, 494.
 — — compositus, 472.
 — Chininae sulphuricae, 508.
 — Chinini sulphurici, 508.
 — de Cichorio, 513.
 — — compositus, 513, II.
 453.
 — Cicutae, 515.
 — Cinchonae, 491.
 — — vinosus, 499.
 — Cinchonini, 524.
 — Cinnamonii alcoholicus,
 392.
 — — aquosus, 391.
 — — vinosus, 392.
 — Citreorum de Succo, 542.
 — Citri Aurantii Corticis, 530.
 — — Florum, 528.
 — — Corticum s. Corticis
 amarus, 542.
 — — alcoholicus, 542.
 — — aquosus, 541.
 — — vinosus, 542.
 — — aromaticus, 542.
 — — medicae Succi, 542.
 — — Succi, 542.
 — — e toto, 541.
 — de Cochlearia officinali,
 546.
 — Cochleariae, 546.
 — — compos., 546.
 — — officinalis comp., II.
 440.
 — Colchici, 552.
 — — aeteticus, 552.
 — — autumnalis, 552.
 — communis, II. 494.
 — Consolidae majoris, 563.
 — — compositus, 564.
 — Contrayervae, 566.
 — — compos., 566.
 — copalivus, 304.
 — Corallii, II. 495.
 — — rubri, 369.
 — Corallinae Corsicanae, 742.
 — Coralliorum, 369.
 — Corticis Peruviani, 495.
 — Corticum Aurantii, 530.
 — Croci aquosus, 573.
 — — vinosus, 574.
 — de Cucurbita Mesnes, 580.
 — Cuisinieri, II. 523.
 — cyanicus, 37.
 — de Cydoniis, 599.
 — Cydoniorum, 599.
 — depurans depurativus, II.
 523.
 — depurativus Larreyi, II. 401.
 — — Majaulti, 148.
 — de Desessarts, II. 16.
 — Diacodii, II. 311.
 — Diacodion, II. 311.
 — Diacodium crocatus, II.
 312.
 — — liquidum Montani,
 II. 311.
 — Dianthi Caryophylli, 609.
 — de Dictamno, II. 296.
 — Digitalis, 614.
 — — aeteticus, 614.
 — domesticus, f. 445.
 — drasticus, II. 530.

Syrupus emeticus, 242.

- d'Ange Sala, 242.
 — — Glauberi, 242.
 — Emetini, 621.
 — emulsivus, 185.
 — Enulae, II. 4.
 — Erysimi, 623.
 — de Erysimo, 623.
 — — compositus, 624.
 — — Lobelii, 624.
 — expectorans, II. 15.
 — Farfae, 630.
 — Florum Aurantii, 528.
 — — Naphae, 528.
 — Foeniculi, II. Add.
 — Fragorum, 692.
 — de Framboesii, II. 488.
 — de Fumaris, 675.
 — Fu'ariae, 675.
 — Gentianii, 700.
 — Glycerrhizae, II. 83.
 — de Granatis, II. 427.
 — Granatorum, II. 427.
 — guajacini, 713.
 — Gummi Ammoniaci aquo-
 sus, 720.
 — — vinosus, 720.
 — — Acaetiae, 729.
 — — Arabici, 729.
 — Hederae terrestri, 735.
 — Helicum Bouqueti, 685.
 — Helibori nigri comp., 739.
 — Helimintochorti, 742.
 — Hepatis Sulphuris, II. 377.
 — hordeatus, 185.
 — Hydriodatis Potassae ioda-
 rati, II. 10.
 — Hydragryi, II. 124.
 — Hydrocyanatis Potassae, 38.
 — Hyoscyami, 750.
 — Hyperici, 757.
 — hypnoticus, II. 265.
 — Hyssopi, 761.
 — — compositus, 761.
 — — cum Scilla, 761.
 — — scillitius, 761.
 — de Hyssopio, 761.
 — incisivus, II. 15.
 — Iodii, II. 8.
 — Ipecacuanhae aquosus, II. 14.
 — — alcoholicus, II. 17.
 — — compositus, II. 15, 16.
 — de Jalapa, II. 30.
 — Jalapae aromatizatus, II. 30.
 — jalapinus, II. 30.
 — de Jujubis, II. 36.
 — Kali sulphurati, II. 377.
 — Karabe, II. 266.
 — Kermes Granorum, 470.
 — kermesinus, 470.
 — de Kinkina, 494.
 — Kino, II. 45.
 — de Lescure, 496.
 — Lichenis Islandici, II. 65.
 — Limonis, 542.
 — Limonium, 541, 542.
 — — compositus, 543.
 — — e Succo, 542.
 — Liquiritiae, II. 83.
 — longae vitae, II. 121.
 — Lupulini, II. 87.
 — Macidis, II. 223.
 — magistris, 667.
 — de Manna, II. 101.
 — — laxativus, II. 101.
 — e Manna c. Senna, II. 101.
 — Manna, II. 101.
 — — cum Senna, II. 101.
 — Marrubii, II. 103.
 — de Marrubio, II. 103.
 — martialis, 667.
 — Mastichinis, II. 104.
 — mastichinus, II. 104.
 — Matricariae, II. 105.
 — de Meconio, II. 311.

- Syrupus Melissae**, II. 109.
 — de Melle, 248.
 — de Mentha piperita, II. 116.
 — Menthae, II. 115.
 — crispae, II. 115.
 — piperitae, II. 116.
 — — vinosus, II. 116.
 — piperitidis, II. 116.
 — viridis, II. 116.
 — de Menyanthe, II. 656.
 — — compos., II. 656.
 — mercurialis, II. 121. 124. 204.
 — Cheroni, II. 180.
 — gummos. de Lagneau.
 II. 124.
 — Mercurii, II. 124.
 — — gummosus, H. 124.
 — de Mercurio et Gummi, II. 124.
 — Mercurio solub. Hahnem II. 104.
 — Mesembryanthemi crystal lini, II. 207.
 — Millefolii, II. 209.
 — de Millefolio, II. 209.
 — Millepedum, II. 211.
 — mineralis, 53.
 — Molasses, II. 495.
 — Mori nigrae, II. 217.
 — de Moris, II. 217.
 — Mororum, II. 217.
 — Morphi acetici, II. 216.
 — muraticus, 33.
 — de Musco querno, II. 65.
 — Myrtilli, II. 662.
 — Myrtillorum, II. 662.
 — de Myrto, II. 231.
 — Naphae Florum, 528.
 — de Nasturtio, II. 231.
 — de Nicotiana, II. 237.
 — Nicotianae, II. 237.
 — Nucistae, II. 223.
 — Nymphaeae, II. 242.
 — — albae de Florib., II. 242.
 — opiatius, II. 248. 265.
 — Opii, II. 265.
 — — alcoholicus, II. 265.
 — — emulsivus, II. 265.
 — — succinatus, II. 266.
 — — vinosus, II. 248.
 — de Opio, II. 265.
 — Oryzocci Baccarum, II. 662.
 — ex Oxydulo Hydrargyri Hahnem, II. 104.
 — Paeoniae, II. 301.
 — de Papavere albo, II. 311.
 — Papaveris albi, II. 311.
 — — anisatus, II. 312.
 — — de capitibus, II. 311.
 — — crocatus, II. 312.
 — — erratici, II. 308.
 — — Rhoeadis, II. 308.
 — — Rhoeados, II. 308.
 — — rubri, II. 308.
 — — somniferi, II. 311.
 — paralyseos Florum, II. 422.
 — pectoralis, 470. II. 265. 643. 675.
 — — Anglicus, II. 312.
 — — de Courti, II. 15.
 — — leniens, 461.
 — — Maloeti, II. 266.
 — — Persicae Foliorum, II. 314.
 — — Persicorum Florum, II. 314.
 — — ad pertusium, 491. 564.
 — — Peucedani, II. 317.
 — — Plantaginis, II. 332.
 — — majoris, II. 332.
 — — Polygalae Virginianae, II. 366.
 — — de Pomis comp., II. 561.
- Syrupus de Pomis comp solutivus**, II. 561.
 — Pomorum helleborat., 730.
 — — compositus, II. 561.
 — — redolentium, II. 368.
 — — solutivus, II. 561.
 — — Prassii albi, II. 103.
 — — Primulae veris, II. 422.
 — — prophylacticus, II. 121.
 — — Prunellae, II. 423.
 — — Psychotriae emeticae, II. 17.
 — — e Pulmonibus vitulinis, 665.
 — — purificans amarus, II. 441.
 — — e Quinque Radicibus, 255.
 — — Radicum quinque aperientium, 255.
 — — Raphani rusticani, II. 441.
 — — regius, II. 473.
 — — resolvable, 245.
 — — Rhabarbari, II. 452.
 — — de Rhabarbaro, II. 457.
 — — cum Rhabarbaro aromat., II. 453.
 — — Rhamni, II. 445.
 — — — cathartici, II. 445.
 — — Rhei, II. 452.
 — — — alcalisatus, II. 456.
 — — — aromaticus, II. 453.
 — — — palmati, II. 452.
 — — — cum Senna, II. 561.
 — — cum Rhoearomat., II. 453.
 — — de Rhoear., II. 452.
 — — — compositus, II. 453.
 — — Rhoeadis s. Rhoeados, II. 308.
 — — Ribesiae nigrae, II. 462.
 — — de Ribesiiis, II. 462.
 — — Ribesiorum, II. 462.
 — — Ribis nigri, II. 462.
 — — — rubri, II. 462.
 — — Ribium, II. 462.
 — — — nigrorum, II. 462.
 — — Rosae, II. 469.
 — — — Centifoliae, II. 469.
 — — — Gallicae, II. 468.
 — — Rosarum compos., II. 470.
 — — — pallidarum, II. 469.
 — — — rubrarum, II. 458.
 — — — simplex, II. 470.
 — — — solutivus, II. 469.
 — — — solutivus c. Senna, II. 470.
 — — rosatus simplex, II. 469.
 — — — solutivus, II. 469.
 — — de Rosis pallidis, II. 469.
 — — — siccis, II. 468.
 — — Rubi acetatus, 22.
 — — — arcticus, II. 487.
 — — — fruticosi, II. 488.
 — — — cum Melle, II. 488.
 — — — Idaei, II. 487. 488.
 — — Sacchari, II. 494.
 — — — albi, II. 494.
 — — — rubri, II. 494.
 — — saccharinus c. Aqua Naphae, 528.
 — — Sambuci, II. 508.
 — — de Sarsaparilla comp., II. 523.
 — — — et Guajaco, II. 523.
 — — — et Senna comp., II. 523.
 — — Sarsaparillae, II. 518.
 — — — et Guajaci, II. 523.
 — — Sassafras Corticis Ligni, II. 525.
 — — de Scammonio, II. 530.
 — — scelotyrbicus Foresti, II. 234.
 — — de Scilla, II. 535.
 — — Scillae, II. 530.
 — — — acetosus, II. 541.
 — — — compositus, II. 637.
 — — — maritima, II. 530.
- Syrupus scilliticus**, II. 536.
 — Scordii, II. 645.
 — de Scordio, II. 645.
 — sedativus, II. 265.
 — Sedi majoris, II. 547.
 — Sempervivi, II. 547.
 — Senegae, II. 366.
 — — cum Liquiritia, II. 367.
 — — moschatus, II. 367.
 — Sennae, II. 560.
 — — compositus, II. 467.
 — — rosaceus, II. 470.
 — simplex, II. 491.
 — Smilacis Sarsaparillae, II. 523.
 — solutivus, II. 561.
 — Spigeliae, II. 539.
 — de Spina cervina, II. 445.
 — Spinae cervinae, II. 445.
 — spleneticus, 256.
 — Stevensii, II. 523.
 — de Stoechade, II. 593.
 — — compos., II. 593.
 — — Succis Ribis nigri, II. 462.
 — — Rubi Idaei, II. 487. 488.
 — sudorificus, II. 523.
 — Sulphatis Chinini compos., 508.
 — — Morphii, II. 214.
 — sulphureticus, 173.
 — de Sulphureto Potassae, II. 377.
 — Sulphuris, II. 377.
 — Symphyti, 563.
 — et Symphyto, 563.
 — — Fernelii, 504.
 — Tartratis Mercurii, II. 206.
 — thebaicus, II. 266.
 — de Thridace, II. 51.
 — Toluiferae Balsami, 311.
 — Tolutanus, 311.
 — de Trifolio fibrino, II. 656.
 — — composi- tus, II. 656.
 — — Tunicae, 609.
 — — — Florum, 609.
 — Tussilaginis, 630.
 — de Urtica, II. 650.
 — Urticarum, II. 660.
 — Uvarum, II. 680.
 — Valerianae, II. 665.
 — — Radicis, II. 665.
 — Vanillae, II. 671.
 — vermifugus, 743.
 — — et purgans, II. 566.
 — de Veronica, II. 675.
 — Viola, II. 677.
 — — odoratae, II. 677.
 — Violarum, II. 677.
 — — communis, II. 678.
 — — Petalorum, II. 677.
 — — solutivus, II. 678.
 — Viperarum, 685.
 — vitriolatus, 53.
 — Zingiberis, II. 696.
- T.
- Tabacum**, II. 235.
Tabellae absorbentes, II. 90.
 — Acidi citrici, 31.
 — — oxalici, 49.
 — alimentariae, 689.
 — Althaeae, 122.
 — Anisi composita, II. 80.
 — antacidiae, II. 9.
 — antehelminthicae, 649. II. 24.
 138. 150. 174.
 — antiacidiae laxantes, II. 90.
 — anticatarrhales Tronchini, 227.
 — antichloroticae, 635.
 — antimonialiae Kunkelii, 222.
 — Antimonii, 222.
 — antiperiodicae, 487.
 53 *

Tabellae antipSORICAE, II. 603
 — aphrodisiacae, II. 219.
 — ad ardorem ventriculi, 362.
 — aromaticae, 383.
 — Balsami Tolutani, 311.
 — ad botium, 415.
 — Calabricae, II. 99.
 — Carbonatis Magnesiae, II. 90.
 — Castorei, 433.
 — de Catechu Terra, 442.
 — — et Magnesiae, 443.
 — — odoriferae, 443.
 — Chinae, 487.
 — cum Coffea Mokk., II. 10.
 — desalterantes, II. 387.
 — Diacarthami, II. 528.
 — Diarrhodon, II. 467.
 — — cum Rhabbaro, II. 449.
 — Diatragacanthae, II. 655.
 — emeticæ, 245.
 — Glycyrrhizae comp., II. 80.
 — Ferri, 635.
 — Guajaci, 710.
 — gummosae, II. 655.
 — Iridis Florent. comp., II. 20.
 — Japonicæ, 606.
 — kermesinae, 226.
 — Kermetis, 226.
 — Liquiritiae, II. 79.
 — Magnesiae, II. 99.
 — Manus Christi, II. 466.
 — mercuriales, II. 164.
 — de Mercurio, II. 164.
 — au Moka, II. 10.
 — cum Oculis Cancrorum, 360.
 — Opii, II. 164.
 — pectorales, 227. 310. II. 264.
 — 602.
 — purgantes compos., II. 528.
 — purgativæ, II. 29. 171.
 — Quinquinae, 487.
 — refrigerantes, II. 396.
 — restaurantes Kunkelii, 222.
 — de Rheo, II. 449.
 — rosatae, II. 466.
 — Scammonii et Sennae purgantes, II. 528.
 — de Semine Santonico, 521.
 — ad sitim, 59.
 — ad sodam, 362.
 — Spitzlayi, 208.
 — Stibii Kunkelii, 222.
 — Sulphureti Antimonii, 222.
 — Sulphuris, II. 602.
 — temperantes, II. 396. 403.
 — de Terra Catechu, 442.
 — de tribus, II. 396.
 — contra vermes, 521.
 — vermifugae, 521. II. 160. 169.
 — violatae, Violarum, II. 677.
 — Vitæ, II. 219.
 Tabulae Althæae, 122.
 — antichloroticae, 635.
 — Ferri composita, 640.
 — instantanes, 635.
 — Kermetis, 226.
 — martiales, 635. 640.
 Tacamahaca, II. 608.
 — communis, II. 608.
 — in sortis, II. 608.
 — sublimis, II. 608.
 — in testa, II. 608.
 Taffetas Anglicum, 600.
 — epispasticum Guilberti, 400.
 — Kesinae Gnidii, 604.
 — vesicans, 400.
 Taffia, 81.
 Talcum, II. 95.
 — transparent, 366.
 — Venetae, II. 95.
 Talpa Europaea, 359.
 Talpae combustae, 359. 413.

Talus Leporum, 263.
 Tamarindi, II. 609.
 Tamarindus Indica, II. 609.
 Tamariscus, II. 612.
 — Gallicus, II. 612.
 Tamarix Gallica, II. 612.
 — Germanica, II. 612.
 Tamnus, f. Tamus.
 Tamus, II. 612.
 — communis, II. 612.
 Tanacetum, II. 612. 613.
 — hortense, 303.
 — vulgare, II. 612.
 Tapioca, II. 614.
 Tapioka, II. 614.
 Taraxacum, II. 615.
 — Dens Leonis, II. 615.
 Tartari Crystalli, II. 406.
 Tartarum, II. 406.
 — antimoniatum, 236.
 — crudum, II. 406.
 — Ferri, 663.
 — solubile, II. 404.
 — vitriolatum, II. 385.
 Tartarus, II. 406.
 — acetosus, II. 398.
 — albus — T. crudus.
 — ammoniacalis, II. 413.
 — ammoniacus, II. 413.
 — antimoniialis, 236.
 — boraxatus, II. 411.
 — chalybeatus, 663.
 — — solubilis, 663.
 — crudus, II. 406.
 — crystallisatus, II. 406.
 — depuratus, II. 406.
 — emeticus, 236.
 — ferruginosus, 663.
 — impurus, II. 406.
 — martialis, 663.
 — — solubilis, 663.
 — martiatus, 663.
 — mercurialis, II. 205.
 — natronatus, II. 412.
 — ruber — T. crudus.
 — solubilis, II. 404.
 — — ammoniacalis, II. 413.
 — stibiatus, 236.
 — tartarisatus, II. 404.
 — vitriolatus crudus, II. 385.
 — — depuratus, II. 385.
 Tartras acidulus Potassae admixto Acido Boracico, II. 411.
 — — purus, II. 406.
 — — venalis, II. 406.
 — Ammoniacae pyro-oleoso-aquosus, 181.
 — Ammoniaci, 181.
 — Antimonii, 236.
 — — et Potassae, 236.
 — Kali, II. 404.
 — kalico-ammonicus, II. 413.
 — — ferricum s. kalico-ferricus, 663.
 — — — natricus c. Aqua, II. 412.
 — — — natricum, II. 412.
 — — stibialis, 236.
 — — stibicus, 236.
 — kalicus, II. 404.
 — kalinum, II. 404.
 — Lixivæ s. Lixivæ, II. 404.
 — — acidulus depuratus, II. 406.
 — — impurus, II. 406.
 — — et Sodae, II. 412.
 — — stibiatum s. stibiatus, 236.
 — Mercurii, II. 205.
 — — et Potassae, II. 205.
 — — Protoxydi, II. 205.
 — Oxyduli Stibii et Potassae, 236.
 — Potassae, II. 404.

Tartras Potassae acidulum s. acidulus, II. 406.
 — — acidulus crudus, II. 406.
 — — purus, II. 406.
 — — praeparat., II. 407.
 — — acidus, II. 406.
 — — et Ammoniaci, II. 413.
 — — — stibiatum, 236.
 — — antimoniatum, 236.
 — — boraxatus, II. 411.
 — — ferratum, 663.
 — — et Ferri, 663.
 — — — liquidum, 665.
 — — — solidus, 664.
 — — ferrosus, 663.
 — — ferruginosus, 663.
 — — neutrale, II. 404.
 — — et Oxydi Ferri, 664.
 — — et Sodae, II. 412.
 — — sodicum, II. 412.
 — — stibiale, 236.
 — — stibiatum s. stibiatus, 236.
 — — — stibiosum, 236.
 — Potassii Protoxydi, II. 404.
 — — — et Ammoniaci, II. 413.
 — — — et Sodii, II. 412.
 — — — stibiosus, 236.
 — Sodae et Kali, II. 412.
 — Stibii, 236.
 — — cum Potassa et Potassae, 236.
 — — subpotassicum, II. 406.
 — — superpotassicum, II. 406.
 Tartras Antimonii, 236.
 — boraxata Potassae et Sodae, II. 412.
 — Lixivæ stibiatus, 236. f. Tartras.
 — Potassae, II. 404.
 — acidula depurata, II. 406.
 — — et Ammoniaci, II. 413.
 — — et Sodae, II. 412.
 — — stibiata, 236.
 Tecolithus, 368.
 Tela aëreosa, 260.
 — — emplastica epulotica, II. 354.
 — — dicta Maja, 263.
 — Gualthieri, II. 355.
 — Ichthyocollae glutinans, 690.
 — — vulgaris, 263.
 Telephium vulgare, 572.
 Terebinthina, II. 617.
 — abiegna, II. 617.
 — abietina, II. 617.
 — Argentoratensis, II. 617.
 — balsamea, I.
 — Bordegalensis, II. 617.
 — Burdigalensis, II. 617.
 — Canadensis, I.
 — Chia, II. 617.
 — cocta, II. 636.
 — communis, II. 617.
 — de Copahu, 303.
 — Cypria, II. 617.
 — empyreumatica, II. 330.
 — laricea, II. 617.
 — laricina, II. 617.
 — larigna, II. 617.
 — nativa, II. 617.
 — pinea, II. 617.
 — Pini Laricis, II. 617.
 — — sylvestris, II. 617.
 — pistacina, II. 617.
 — Veneta, II. 617.
 Terra absorbens mineralis, II. 88.
 — Aluminis, 131.
 — amara, II. 88.
 — — aërata, II. 88.

Terra amara sulphurica, II. 92.
 — vitriolata, II. 92.
 — animalis, 363.
 — argillacea pura, 131.
 — bolaris, 131.
 — pura, 131.
 — calcareata, 356.
 — calcarea pura, 351.
 — Gatcheu, 441.
 — foliata Mercurii, II. 203.
 — mercurialis, II. 203.
 — mineralis, II. 536.
 — Tartari, II. 398.
 — — crystallisata, II. 535.
 — Japonica, 441.
 — Lemnia, 131.
 — Lemniana, 131.
 — magnesica, II. 88.
 — Ossium, 363.
 — ponderosa acetata, 318.
 — — aërata, 317.
 — — carbonica, 317.
 — — muriatica, 314.
 — — muriatica Bergman-
 ni, 315.
 — — pura, 317.
 — — salita, 314.
 — — vitriolata Bergman-
 ni, 317.
 — sigillata, 131.
 — — alba, 131.
 — — rubra, 131.
 — — talcosa oxyanthracodes, II.
 88.
 — Tripolitana, II. 669.
 — Umbrae, 641.
 — viridis, 584.
 — Vitrioli dulcis, 641. 642.
 Testae Cochleae, 357. 359.
 — Ostrearum, 357. 359.
 — Uvorum, 357. 359.
 — — praepraetatae, 359.
 Testes Equi, 662.
 Tetranchera Pichurim, 629.
 Tetroxydum Manganis, II. 98.
 Teucrium Chamaedrys, II. 643.
 — Chamaecypri, II. 643.
 — Creticum, II. 644.
 — flavum, II. 643.
 — Iva, II. 644.
 — Marum, II. 644.
 — montanum, II. 644.
 — Scordium, II. 645.
 — Scorodonia, II. 645.
 Thalictrum flavum, II. 647.
 — magnum, II. 647.
 Thapsia Asclepium, II. 647.
 Thea amara, II. 646.
 — Bohea, II. 647.
 — bouy, II. 647.
 — Chinensis, II. 647.
 — haemastatica, II. 468.
 — Heysan, II. 647.
 — Mexicana, II. 647.
 — Paraguay, 680.
 — Pekao, II. 647.
 — perlata, II. 647.
 — poudre à canon, II. 647.
 — Saot-chaou, II. 647.
 — Schulang, II. 647.
 — viridis, II. 647.
 Theina — Theae principium
 salif.
 Theobroma Cacao, 345.
 Theriaca, II. 278.
 — Andromachi, II. 278.
 — coelestis Hoffmanni, II. 292.
 — Diatessaron, II. 228.
 — officinalis, II. 3. 228.
 — pauperum, II. 228.
 Thlaspi, II. 648.
 — arvense, II. 648.
 — Bursa pastoris, II. 648.
 — campestre, II. 648.
 — sativum, II. 233.

Thridax, II. 50.
 Thuja articulata, II. 511.
 — occidentalis, 260.
 Thus, II. 244.
 — — verum, II. 244.
 Thuya, f. Thuja.
 Thymelaea, 602.
 Thymus Alpinus, II. 648.
 — Creticus, II. 648.
 — hortensis, II. 648.
 — mastichina, II. 648.
 — Serpyllum, II. 648.
 — vulgaris, II. 648.
 Tiglium, 577.
 Tilia, II. 650.
 — Tilia, II. 650.
 — — Europaea, II. 650.
 Tillium, 677.
 Tincal, II. 680.
 Tinkal, II. 680.
 Tinker, II. 680.
 Tinctura Absinthii, 9.
 — — alcalina, 10.
 — — amara, 10.
 — — aquosa, 11.
 — — composita, 10.
 — Acetatis Ferri, 660.
 — — — alcoholica, 660.
 — — — Zinei, II. 695.
 — — acida aromatica, 395.
 — Acidi sulphurici, 395.
 — Aconiti, 62.
 — — aetherea, 62.
 — — alcoholica, 62.
 — Acori, 360.
 — adstringens, II. 436.
 — aetherea, 75.
 — — alcoholica de Muria-
 te Ferri, 655.
 — — camphorata, 375.
 — — ferrata, 655.
 — — alcalina, II. 373.
 — — acris, II. 373.
 — — alcoholica aromatica, II.
 265.
 — — Alcaeae, 81.
 — — purpureae, II. 98.
 — Alcoholis Sulphuris ioda-
 ta, II. 8.
 — alexipharmaca Huxhami,
 503.
 — — alkalina acris, II. 373.
 — Aloës, 96. 97.
 — — aetherea, 108.
 — — alcoholica compos., 105.
 — — aquosa, 97.
 — — composita, 106.
 — — crocata, 105.
 — — cum Myrrha, 105.
 — — — crocata, 105.
 — — et Myrrhae, 105.
 — — Socotrinae, 96.
 — — aloëtica alcalina, 107.
 — — amara, 532. 535. 698. II. 658.
 — — — Halensis, II.
 — — Ambrae, 143.
 — — — aetherea, 143.
 — — — balsamica Dippelii, 143.
 — — — composita aetherea, 143.
 — — — grisea alcalina, 143.
 — — — liquida, 143.
 — — — Mindereri, 143.
 — — — moschata aetherea, 144.
 — — — cum Moscho, 143.
 — — — ammoniata aromatica, 151.
 — — — — — asthmatica, 151.
 — — — — — foetida, 286.
 — — — Amomi repentis, 416.
 — — — Zingiberis, II. 696.
 — — Angelicae, 203.
 — — — ammoniacea, 200.
 — — Angusturae, 207.
 — — anodyna, II. 248. 669.
 — — — volatilis, II. 267.

Tinctura antiarthritica, II. 382.
 — — antiepileptica, 568.
 — — antigonorrhoeica, II. 395.
 — — antihysterica, 438.
 — — Antimonii acris, II. 373.
 — — — alcalina, II. 373.
 — — — balsamica, II. 373.
 — — — Hermbstaedtii, 233.
 — — — Jacobi, 233.
 — — — nigra, II. 373.
 — — — saponata, 233.
 — — — tartarisata, II. 373.
 — — — antiodontalgica, II. 429.
 — — — antiphthis. Gramanni, 662.
 II. 352.
 — — — antirheumat., 606.
 — — — antispasmodica, 287. II. 669.
 — — — Christiani, II. 253. 257.
 — — — camphor., II. 257.
 — — — Dumasii, II. 257.
 — — — Keupii, II. 669.
 — — — et tonica, II. 668.
 — — — antispasmodico-emmena-
 goga, 105.
 — — — antisyphilitica, II. 180.
 — — — — Besnardi, II. 383.
 — — — — Talbotii, II. 383.
 — — — antivenera Falkii, II. 183.
 — — — aperitiva, 34. II. 457.
 — — — Aquilegiae Florum, 269.
 — — — Aristolochiae Serpentariae,
 265.
 — — — Arnicae, 267.
 — — — — aetherea, 268.
 — — — — alcoholica, 267.
 — — — — aromatica, 390. 393. II. 60.
 — — — — acida, 395.
 — — — — c. Acido sulphurico,
 395.
 — — — — ammoniacea, 151.
 — — — — composita, II. 58. 501.
 — — — — sulphurica, 395.
 — — — — Artemisiae Absinthii, 9.
 — — — — arthritica, II. 40.
 — — — — Asae foetidae, 286.
 — — — — — aetherea, 286.
 — — — — — ammoniata, 286.
 — — — — — kalica, 287.
 — — — — — stibiata, 233.
 — — — — Asari, 289.
 — — — — Asae foet., f. Tinct. Asae
 foet. etc.
 — — — — Aurantii, 534.
 — — — — — dulcis, 535.
 — — — — — immaturi, 535.
 — — — — — Pomor. immat., 535.
 — — — — Aurantium aetherea, 530.
 — — — — — Corticum, 534.
 — — — — — — — alcalis, 532.
 — — — — — — — Whytiii, 504.
 — — — — — Pomor. immaturor.,
 535.
 — — — — aurea s. aurata, 557. 655.
 — — — — — nervino-tonica, 655.
 — — — — — — — Lamotte,
 655.
 — — — — Auri, 299.
 — — — — — Balsami Canadensis, 1.
 — — — — — — — roborans, 1.
 — — — — — — — Copaiuae, 304.
 — — — — — — — — — alcalina, 304.
 — — — — — — — — — de Mecca, 307.
 — — — — — — — — — Peruviani, 308.
 — — — — — — — — — Tolutani, 312.
 — — — — — — — — — balsamica, 312. 321. II. 597.
 — — — — — — — — — composita, 1. 304. 321.
 — — — — — — — — — purificans, II. 183.
 — — — — — — — — — Belladonnae, 297.
 — — — — — — — — — Bellidis Florum, 320.
 — — — — — — — — — Benzoatis Ammoniae cam-
 phorata, II. 268.
 — — — — — — — — — — — composita,
 II. 269.
 — — — — — — — — — — — Benzoës, 321.
 — — — — — — — — — — — balsamica, 321.

- Tinctura Benzoës composita, 321.
- Benzoini, 321.
 - balsamica, 321.
 - composita, 321.
 - Bestuchefii, 655.
 - bezoardica, II. 683.
 - Ludwigi, 303.
 - Bonplandiae trifoliatae, 207.
 - Botryos, 469.
 - Mexicanae, 469.
 - Bruceae, 207.
 - Brucini, 335.
 - Burgundica, 501.
 - caerulea, 621-696.
 - Calami aromatici, 350.
 - composita, 350.
 - Calumbae, 561.
 - Cambogiae ammoniacata, 733.
 - ammoniata, 733.
 - Camphorae, 376.
 - composita, II. 258.
 - opiata, II. 257-258.
 - Cancrorum Oculorum, 368.
 - Canellae albae, 392.
 - Cantharidis, 401.
 - vesicatoriae, 401.
 - Cantharidum, 401.
 - aetherea, 404.
 - camphorata, 404.
 - composita, 404.
 - camphorata s. alcoholica camphorata, 402.
 - composita, 402.
 - opiata, 403.
 - terebinthinata, 403.
 - Capsici, II. 326.
 - anni, II. 326.
 - et Cantharidum, II. 326.
 - Carbureti Sulphuris iodurata, II. 8.
 - Cardamomi, 416.
 - composita, 417.
 - Cardui benedicti, 419.
 - carminativa, 423.
 - Wedelii, 423.
 - Caryophyllatae, 702.
 - Caryophyllor. aromaticor., 424.
 - Cascarillae, 428.
 - alcoholico-alkalina, 428.
 - aquosa s. aquosa alkalina, 428.
 - Cassiae cinnamomeae, 392.
 - lignae, 392.
 - Sennae comp., II. 657.
 - Castorei, 436.
 - aetherea, 440.
 - Canadensis, 436.
 - aetherea, 440.
 - composita, 437.
 - foetida, 437.
 - kalina, 437.
 - Moscovitici, 436.
 - opiata, 437.
 - thebaica, 437.
 - vulgaris, 436.
 - Catechu, 446.
 - aromatica, 446.
 - composita, 446.
 - Ferrae, 446.
 - cathartica, II. 557.
 - Centaurii minoris, 448.
 - Cerasorum nigror., 452.
 - Chamamelii, 463.
 - Chamomillae, 463.
 - Chenopodii, 469.
 - aetherea, 469.
 - ambrosioidis, 469.
 - Chestoni, 452.
 - Chinae, 504.
- Tinctura Chinae alcoholica, 502.
- amara, 504.
 - ammoniata, 503.
 - aquosa, 490.
 - Cort. compos., 504.
 - compos. alcohol., 503.
 - flavae, 502.
 - fuscuae vinosae — ut Tinct. alcoh. sed cum Vino Hisp.
 - gingivalis, 505.
 - regiae, 503.
 - rubrae, 503.
 - simplex, 502.
 - volatilis, 503.
 - Chinini sulphurici, 509.
 - Cicutae, 517.
 - aetherea, 517.
 - aquatica, 517.
 - Cinchonae alcoholica, 502.
 - aetherea comp., 505.
 - amara, 504.
 - ammoniata, 403.
 - composita, 503.
 - kalina, 503.
 - lancifoliae, 502.
 - martiata, 602.
 - officinalis, 502.
 - officina comp., II. 505.
 - volatilis, 503.
 - Cinchonini, 524.
 - sulphurici, 524.
 - Cinnamomi, 302.
 - aouti, 302.
 - aetherea, 395.
 - composita, 393.
 - phosphorico-acida, 51.
 - Sinensis, 392.
 - Zeylanici, 392.
 - Citri Aurantii, 534.
 - Coccinellae septemp., 544.
 - Coccionellae, 545.
 - Cochleariae, 517.
 - coerulea, 583-690.
 - Colchici autumnalis, 551.
 - Seminum, 552.
 - — vinosa, 552.
 - — vinosa, 551.
 - Colocynthidis, 557.
 - anisata, 557.
 - stibiata, 557.
 - Colombae, 561.
 - Colombo, 561.
 - Columbo, 561.
 - comp. Whyttii, 504.
 - Conii composita, 517.
 - Conorum Humuli Lupuli, II. 86.
 - Contrayervae, 566.
 - Convolvuli Jalapae, II. 31.
 - Coralli, II. 495.
 - Coralliorum, 368.
 - Corticis Peruviani alcoholica, 502.
 - — alkalina, 503.
 - — aquosa kalina, 400.
 - — composita, 504.
 - — volatilis, 503.
 - — Quercus, II. 434.
 - — Winterani, 571.
 - Corticum Aurantior., 534.
 - — Winteranorum, 571.
 - cosmetica, 321.
 - simplex, 321.
 - Croci, 574.
 - Crotonis Eleutheriae, 428.
 - Cullilaban s. Cullilawan, 580.
 - Cupri, 588.
 - — Lewisi, 584.
 - — sulphurici, 587-588.
 - Curcumae, 596.
 - — aquosa, 596.
 - Daffyi, II. 559.
- Tinctura Dahlbengi, 667.
- Delphinii, 667.
 - Diambrae sine odoratis, 381.
 - diaphoretica, 567.
 - Dictamni albi, 610.
 - digestiva, 690.
 - Digitalis, 615.
 - aetherea, 616.
 - aquosa Fowleri, 613.
 - aquoso-aetherea, 616.
 - composita, 614.
 - Flitiacri, 616.
 - Harlesii, 615.
 - Macleani, 615.
 - Planchii, 615.
 - purpurea, 616.
 - — aetherea, 616.
 - Remeri, 614.
 - semispirituosa, 615.
 - simplex, 615.
 - spirituosa, 615.
 - Trommsdorffii, 616.
 - diuretica, 616 II. 658.
 - elastica, 644.
 - Ellebori comp., 740.
 - Enulae, II. 5.
 - Euphorbii, 627.
 - excitans, 402.
 - Extracti Opii, II. 253.
 - — Tormentillae erectae, II. Add.
 - febrifuga, 274.
 - — acida, II. Add.
 - Cluttonii, 204.
 - Huxhami, 593.
 - Mutisii, 594.
 - Whytti, 594.
 - ferrata, 666.
 - Ferri, 653.
 - — Acetatis, 660.
 - — acefici, 660.
 - — aetherea, 660.
 - — aetherea, 665.
 - — ammoniata, 659.
 - — aurantiaca, 662.
 - — muriati, 663.
 - — muriatici, 653-654.
 - — oxydulati, 654.
 - — Muriatis, 654.
 - — oxydul. tartar., 661.
 - — pomata, 661.
 - — pomati, 661.
 - — Protohydrochloratis, 654.
 - — sulphuro-zoot., 670.
 - — tartarici, 666.
 - — tartarisata, 665.
 - — tartarissati vinosi, 665.
 - — Tritohydrochloratis, 664.
 - ferruginosa, 666.
 - Flor. Salis Ammoniaci martialium, 289.
 - foetida, 287-437.
 - — ammoniacata, 437.
 - — pyro-oleosa, II. 280.
 - Formicarum comp., 671.
 - Fuliginis alkalina, 178.
 - — Clauderi, 178.
 - — foetida, 287.
 - Galangae, 676.
 - Galbani, 337.
 - — composita, 338.
 - Gallarum, 679.
 - Gei urbani, 703.
 - Gentianae, 698.
 - — alkalina, 699.
 - — composita, 698.
 - — alkalina, 700.
 - — rubrae, 698.
 - Gentianini, 700.
 - — alkalina, 700.
 - — Geofraeae, 701.
 - gingivalis, 446.

Tinctura gingivalis balsamica — Tinctura Papaveris Rhoeadis s. Rhoeados. 767

Tinctura gingivalis balsamica, 440.
 — Glechomae hederaceae, 735.
 — Gnidii Resinae, 604.
 — contra gonorrhoeam, II.
 395.
 — Guajaci, 711.
 — aetherea, 711.
 — ammoniacata, 712.
 — ammoniata, 712.
 — composita, 712.
 — Emerigonis, 712.
 — foeniculata, 712.
 — Gummi, 712.
 — Ligni, 711.
 — officinalis, 711.
 — Resinae, 712.
 — volatilis, 712.
 — Dewessii, 713.
 — Gummi Ammoniaci, 720.
 — kalina, 720.
 — Laccae aquosa, II. 47.
 — Guttae ammoniata,
 733.
 — Gutti, 733.
 — — alcalina, 733.
 — — ammoniacata, 733.
 — — ammoniata, 733.
 — haemastatica, 491.
 — Haematis ammoniacata, 659.
 — Haffieldi, 713.
 — Hederæ terrestris, 735.
 — Helenii, II. 5.
 — Hellebori albi, 740.
 — — composita, 740.
 — — nigri, 740.
 — — vinosa, 740.
 — — viridis, 741.
 — Hiernæi contra taeniam,
 99.
 — Humuli, II. 86.
 — Lupuli, II. 86.
 — hydragoga, 656. 741. II. 42.
 — Hyoscyami, 752.
 — aetherea, 752.
 — faeculae, 752.
 — nigri, 752.
 — Seminum, 752.
 — Hyperici, 758.
 — — vinosa comp., 757.
 — — vulneraria alcoholi-
 ca, 758.
 — — comp., 758.
 — hypnotica, II. 255.
 — Indigo Resinae, II. 1.
 — Inulae, II. 5.
 — Iodii, II. 7.
 — Iodii, II. 7.
 — — aetherea, II. 8.
 — Iodinae, II. 7.
 — — diluta, II. 7.
 — Ipecacuanhae, II. 16. 17.
 — — anisata, II. 17.
 — — opiata, 177.
 — Ipecacuanhae, II. 16.
 — Jalapae s. Jalappae, II. 31.
 — — aromatica, II. 31.
 — — composita, II. 31.
 — — confortans, II. 31.
 — — Resinae, II. 31.
 — Japonica, 446.
 — Juglandis Nucum Cort vi-
 rid., II. 34.
 — kalina, II. 373.
 — Kermesii, 470.
 — Kinkinae amara, 604.
 — Kino, II. 45.
 — Laccae aquosa, II. 47. et
 Add.
 — — alcoholica, II. 48.
 — — comp., II. 48.
 — — aluminata, II. 48.
 — — coerulea, II. 48.
 — — aquosa, II. 48.
 — — kalica, II. 48.

Tinctura Laccæ spirit., II. 48.
 — c. Spiritu Cochlear.
 offic., 549.
 — Lactucæ, II. Add.
 — — virosæ, II. 50.
 — Lactucarii, II. 50.
 — Laudanum, II. 248.
 — Lauri Cinnamomi — Tinct.
 Cinn.
 — Lavandulæ composita, II.
 60.
 — laxativa, 66.
 — Ligni Agallochi, II. 69.
 — — Aloës, II. 69.
 — — Quassiae, II. 432.
 — — Sassafras, II. 525.
 — — composita, II.
 525.
 — Lignorum, 3-711.
 — Lobeliae, II. 85.
 — — inflatae, II. 85.
 — longae vitae, 114.
 — Lupuli, II. 86.
 — — strobilorum, II. 86.
 — Lupulini, II. 86.
 — Lyttæ vesicatoriae, 401.
 — — aetherea, 404.
 — Macidis, II. 223.
 — Mæcis, II. 223.
 — Malatis Ferri, 661.
 — Mari veri aetherea, II. 644.
 — Martis, 654.
 — — adstringens, 654-659.
 660.
 — — alcalina, 644.
 — — aperiens, 654. 664.
 665.
 — — aperitiva, 654. 659.
 666.
 — — Glauberi — T.
 Mart. tart. Glaub.
 — — tartarisata, 666.
 — — Zwoelferi, 660.
 — — aures, 654.
 — — cydoniata, 661.
 — — dulcis, 654.
 — — elleborata, 657.
 — — helleborata, 657.
 — — Klaprothii, 660.
 — — pomata, 661.
 — — pomati, 661.
 — — cum Pomis Auran-
 tiis, 661.
 — — salita, 653-654.
 — — cum Spiritu Salis,
 654.
 — — cum Succo Cydonio-
 rum, 661.
 661.
 — — Pomorum,
 tartarisata, 664. 665.
 — — Glauberi, 665.
 — — Ludovici, 665.
 — — cum Vino, 667.
 — — Malvat. et
 Aurant., 662.
 — — et Pomis, 662.
 — — vinosa, 667.
 — — Boerhaavii, 667.
 — — e Vitriolo, 660.
 — Mastiches, II. 105.
 — — composita, II. 105.
 — — mastichina, II. 105.
 — — Matris Perlarum, 368.
 — — Melampodii, 740.
 — — Mellissae, II. 109.
 — — Meliosæ vesicat. — Tinct.
 Canthar.
 — — Menthae crispae, II. Add.
 — — piperitæ, II. 116.
 — — piperitidis, II. 116.
 — — viridis, II. 116.
 — — Menyanthis, II. 648.
 — — Metallorum, II. 373.
 — — Millefolii, II. 209.

Tinctura Millepedum, II. 211.
 — Mimosae Catechu, 446.
 — moschata, II. 221.
 — Moschi, II. 221.
 — — aetherea, II. 221.
 — — alcoholica, II. 221.
 — — artificialis, II. 599.
 — — vinosa, II. 221.
 — — de Muriate Ferri aeth. al-
 coholica, 655.
 — — Muriatii Ferri, 654.
 — — — alcoholisata,
 654.
 — — — cum Oxydo
 rubro, 654.
 — Myrrhae, II. 229.
 — — alcalisata, II. 230.
 — — alcoholica, II. 229.
 — — — uterina, 237.
 — — cum aqua Rabelii, II.
 230.
 — — aquosa, II. 229.
 — — phosphorata, 51.
 — — uterina, 237.
 — — nervina Bestuscheffii, 655.
 — — Halensis, 655.
 — — (nervalis) et tonica,
 II. 668.
 — — nervino-tonica martialis,
 655.
 — — — La Motte, 655.
 — Nicotianae, II. 237.
 — Nucis vomicae, II. 241.
 — Nucum vomicarum, II. 241.
 — Oculorum Populi, II. 369.
 — odontalgica, II. 429.
 — Olei camphorati, 377.
 — ophthalmica, 246.
 — Opii, II. 253.
 — — acetosa, II. 247.
 — — alcoholica, II. 253.
 257.
 — — et acidi benzoici
 camphorata, II. 258.
 — — aromatica, II.
 255.
 — — composita, II.
 256.
 — — saponacea, II.
 258.
 — — ammoniacalis, II. 257.
 — — et camphorata,
 II. 257.
 — — ammoniacalis, II. 258.
 — — ammoniata, II. 257.
 259.
 — — et Benzoatis Ammo-
 niacae, II. 259.
 — — benzoica, II. 258.
 — — — comp., II. 259.
 — — camphorata, II. 257.
 258.
 — — crocata, II. 248.
 — — crocea, II. 257.
 — — Ecardi, II. 256.
 — — Extracti, II. 253.
 — — officinalis, II. 253.
 — — saponacea, II. 258.
 — — simplex, II. 247-253.
 255.
 — — spirituosas, II. 247-253.
 — — thebaica genuina, II.
 247.
 — — — vinosa, II. 247.
 — — — anticolica, II. 256.
 — — — et aromatica, II.
 248.
 — — — crocata, II. 248.
 — — — Sydenhami, II.
 248.
 — — Orosellini, II. 547.
 — — Papaveris erratici, II. 308.
 — — — Florum, II. 309.
 — — Rhoeadis s. Rhoeados,
 II. 308.

- Tinctura Phellandrii aquatici, 517
 — physagoga, 530.
 — Pici Graecae comp. s. alcoholica, 105
 — Pimentae sulphurica, II. 326.
 — Pimpinellae, II. 323.
 — albae, II. 323.
 — comp., II. 324.
 — kalica, II. 324.
 — Pini, 2.
 — comp., 3.
 — Piperis Jamaicaens. aetherea, II. 326.
 — nigri, II. 326.
 — plumbosa, II. 312.
 — Populi, II. 369.
 — Oculorum, II. 369.
 — proprietatis Mysnichi, 210.
 — Protohydrochlorat. Ferri, 664.
 — purgans, II. 31.
 — Pyrethri aetherea, II. 430.
 — Quassiae alcoholica, II. 432.
 — excelsae, II. 432.
 — vinosa, II. 432.
 — Quercus Corticis, II. 434.
 — Raphani comp., II. 439.
 — Ratanhiae, II. 443.
 — acetosa s. cum Aceto, II. 443.
 — aquosa, II. 443.
 — comp., II. 443.
 — saccharata, II. 443.
 — regia, 143. 390.
 — Resinae Guajaci, 712.
 — Indigo, II. 1.
 — Succini, II. 599.
 — resino-saponacea, 713.
 — Rhabarbari, II. 454.
 — alcoholica, II. 458.
 — aromatica, II. 458.
 — aquosa, II. 454.
 — composita, II. 459.
 — spirituosus, II. 468.
 — vinosa, II. 457.
 — Rhei, II. 454.
 — alcoholica, II. 458.
 — et Aloës, II. 113.
 — amara, II. 458.
 — aquosa, II. 451. 454.
 — alcalina, II. 454.
 — salina, II. 455.
 — composita, II. 458.
 — Dorelii, II. 457.
 — dulcis, II. 457. 458.
 — et Gentianae, II. 459.
 — palmati, II. 454.
 — spirituosus, II. 458.
 — dulcis, II. 458.
 — vinosa, II. 457.
 — Dorelii, II. 457.
 — Rhododendri, II. 459.
 — Rhois radicans, II. 401.
 — roborans, 303. 503. 699.
 — Rosarum, II. 471. 473.
 — acidula, II. 473.
 — Sabinae, II. 40.
 — kalina, II. 40.
 — sacra, 95. 113.
 — salina, II. 374.
 — comp., 700.
 — Salis Amm. cuprifera, 590.
 — cuprifera, 590.
 — Tartari, II. 373.
 — phosphorata, II. 321.
 — Sanguinariae Canad., II. 511.
 — Sanguinis Draconis, II. 512.
 — Saponis, II. 417.
 — camphorata, 186.
 — et Opii s. cum Opio, II. 268.
 — Sarcocollae, II. 516.
 — Sassafras, II. 526.
- Tinctura Sassafras compos., II. 525.
 — Ligni, II. 525.
 — Saturni, II. 341.
 — saturnino-martialis, II. 350.
 — Scammonii, II. 529.
 — Scillae, II. 538. 539.
 — aromatica, II. 539. 1.
 — composita, II. 539.
 — kalina, II. 539.
 — maritimae, II. 538.
 — Scordii, II. 646.
 — composita, II. 646.
 — sedativa, II. 253. 255.
 — camphorata, II. 258.
 — Senegae, II. 366.
 — Sennae, II. 557.
 — amara, II. 558.
 — aromatica, II. 557.
 — comp., II. 557.
 — Serpentinae Virg., 265.
 — stibiata, II. 260.
 — Stibii alcalisata, II. 373.
 — stomachica, 532. 536. 608. II. 326.
 — acuta Ernstingii, II. 326.
 — aromatica, 395.
 — Lentini, 351.
 — Lipsialis, 151.
 — martialis, 666. 668.
 — Whytti, 504.
 — Stramonii, 606.
 — aetherea, 606.
 — alcoholica, 606.
 — Seminis, 606.
 — Strychnini, II. 594.
 — Strychnos, II. 241.
 — Succini, II. 597.
 — aetherea, II. 597.
 — alcalisata, II. 598.
 — alcoholica, II. 597.
 — aromatica, II. 481.
 — balsamica, II. 597. 599.
 — foetida, II. 599.
 — Sulphatis Chinini, 599.
 — Cinchonini, 524.
 — Cupri, 587.
 — Sulphuris, II. 377.
 — Alcoholicis iodata, II. 8.
 — Carbureti iodurati, II. 8.
 — Sulphuroprussureti Ferri, 670.
 — Tanacetii, II. 614.
 — Tartari, II. 373. 374.
 — acris, II. 374.
 — composita, 715.
 — tartarisata Glauberi, 666.
 — Ludovici, 666.
 — Tartratis Potassae ferrici, 665.
 — Terebinthinae, II. 618.
 — Terrae Japonicae, 446.
 — Catechu, 446.
 — thebaica, II. 253. 255.
 — Bambergi, II. 256.
 — theriacalis, 199. II. 287.
 — Toluiferae Bals., 312.
 — tolutana, 312.
 — aetherea, 313.
 — tonica, 401.
 — Huxhami, 503.
 — martialis, 608.
 — lactea, 654.
 — et temperans, 491.
 — Whytti, 504.
 — tonico-nervina Halensis, 655.
 — Bestuscheffii, 655.
 — Tormentillae, II. 652.
 — Trifolii fibrini, II. 658.
 — Tritohydrochlorat. Ferri, 654.
 — Turionum Pini comp., 3.
 — Valerianae, II. 667.
- Tinctura Valerianae aetherea, II. 669.
 — camphorata, II. 669.
 — ammoniacea comp., II. 668.
 — ammoniata, II. 668.
 — anodyna, II. 669.
 — camphorata, II. 668.
 — composita, II. 668.
 — officinalis, II. 667.
 — sylvestris, II. 667.
 — volatilis, II. 668.
 — Vanilliae. Vanillae, II. 671.
 — Veratri s. Verat. albi, 740.
 — viridis, 741.
 — Veratrinii, II. 672.
 — vermifuga, II. 260.
 — cum Vino Boerhaavii, 667.
 — vinoso Boerhaavii, 667.
 — Vincetoxicis, 297.
 — pro vita producenda, 114.
 — volatilis anodyna, II. 257.
 — vulneraria, II. 501.
 — rubra, II. 501.
 — simplex, II. 105.
 — Stahlii, II. 628.
 — Zedoariae, II. 682.
 — composita, II. 682.
 — Zinci Acetatis, II. 695.
 — Zingiberis, II. 680.
 — Tinkal, Tinkar, II. 569.
 — Tisana acida, 541.
 — acidulata, II. 463.
 — adstringens, 54. 446. 563. 728. II. 427. 4. 7. 652.
 — alcalina Mascagni, II. 380.
 — Angelicae, 202.
 — antidysenterica, II. 381.
 — antilebrilis acidula — Potus anti-acid., 456.
 — antigalactica, 456.
 — antiteristica, II. 486.
 — antilactosa, 456.
 — antiphlogistica, II. 392.
 — antiscorbatica, 549. II. 438. 486.
 — antisrophulosa, 495.
 — antisyphilitica, 715.
 — antivenerica, II. 715. II. 522.
 — purgans, II. 520.
 — aperitiva, II. 400.
 — Arabica, II. 518.
 — ad arenulas, II. 579.
 — Burgenodi, II. 180.
 — Callaci, II. 522.
 — camphorata, 374.
 — carminativa, II. 100.
 — Cerorum Succii, 451.
 — Cichorii, 513.
 — Citri comp., 541.
 — communis, 745.
 — Cremoris Tartari, II. 410.
 — depurativa — Tis. purif. — Vigarous, II. 520.
 — diuretica, 420. II. 43. 382. 395. 401. 490.
 — emulsiva, 185.
 — cum Camphora, II. 394.
 — et camphorata, II. 394.
 — Enulae, II. 4.
 — fibrifuga, 550.
 — et laxans, II. 410.
 — Feltzii, II. 519.
 — resolv. et diuret. — Decoct. resolv. etc.
 — de Fruct. pectoralibus, 421.
 — haemastatica, II. 209.
 — Helenii, II. 4.
 — imperialis, II. 400.
 — Inulae, II. 4.
 — Jausserandi, II. 521.
 — laxativa, II. 611.
 — leniens, 124.
 — Lusitanica — Decoct. Lus.

- Tisana Milmanni**, II. 410.
 — de St. Marie, II. 517.
 — nitrata, II. 391.
 — oxygenata, II. 397.
 — pectoralis, 124. II. 46. 97.
 — purgativa, II. 611.
 — purificans, 620.
 — refrigerans et diuretica, II. 396.
 — regalis, II. 562.
 — resolvens et diuretica, II. 401.
 — ad scorbutum, II. 438.
 — stomachica resolvens, II. 392.
 — sudorifica, 314. 714. II. 519.
 — — Astruc, II. 521.
 — — excitans — Decoct. diaphor. incit.
 — — et nutriens — Decoct. incit. nutr.
 — — et purgans, II. 522.
 — sulphurico-salina, II. 388.
 — contra tineam, 715.
 — tonica et antiherp., II. 486.
 — ad urinam arenosam, II. 579.
 — vermifuga, 294.
 — Vinachi, II. 521.
 — vinosa, II. 393.
 — — Williamisi, 552.
 — vulneraria, 267.
 — — Yvo Gaukes, 715.
Tithymalus latifolium, 415.
Tithymalus Cyprissiae, 616.
Toluifera Balsama — Miro-sperm. toluif.
Tonco — Faba Tunca
Topasium, 131.
Topicum antispasmod., 431.
 — et tonicum, II. 287.
 — aurificum, 298.
 — detersivum, II. 128.
 — Jeniens s. sedans, II. 247.
 — purgans, 554.
 — resolvens, 435.
 — vermifugum, 554.
Tordylus, II. 569.
 — officinale, II. 569
Tormentilla erecta, II. 651.
 — sylvestris, II. 651.
Tornalis coerulea, II. 47.
 — rubra — Nezetta.
Totasana, 757.
Toxicodendron — Rhus radice.
 et Toxic.
Tragacantha, II. 652.
Tragacanthae Gummi, II. 652.
Tragea Actis Granorum, II. 507.
 — alba, 727.
 — aromatica, 380. 381.
 — — Gabelchoveri s. Gabelkoveri, 381.
 — — officinalis, 381.
 — Granorum Actes, II. 507.
 — ophthalmica, 207. 628.
Tragema de Semine Santonico, 521.
 — Chinae, 487.
Tragopogon, II. 655.
 — porrifolium, II. 655.
 — pratense, II. 655.
Tragoselinum, II. 322.
 — majus, II. 323.
Trapa natans, II. 655.
Tremella Auricula Judae, II. 655.
Tribuli aquatici — Trapae nat. fructus.
Trichechus Manatus, 364.
Trichites — Alumen plumosum.
Trichomanes, 65.
Trifolium, II. 656.
 — acetosum, 16.
 — antiscorbuticum, II. 656.
 — aquaticum, II. 656.
 — aureum, 743.
Trifolium cervinum, 625.
 — fibrinum, II. 656.
 — Melilotus officinalis, II. 106.
 — paludosum, II. 656.
 — palustre, II. 656.
 — pratense, II. 656.
 — purpureum, II. 656.
Trigonella Foeniculum graecum 670
Trinitatis Herba, II. 21.
Triosteum perfoliatum, II. 659.
Tripela s. Tripela officinalis, II. 659.
Tripolitana Terra, II. 659.
Trissago, II. 613.
Triticum aestivum, Spelta et hybern turgidum — Farina, Amylum, Furfur.
 — faginum, 629.
 — repens, 704.
Trito-Acetas Ferri, 659.
Tritohydrochloras Ferri, 653.
Tritohydrocyanas Ferruretiferri, 669.
Tritohydroferrocyanas Ferri, 669.
Tritonitras Ferri, 652.
Tritophosphas Ferri, 647.
Tritoxydum Antimonii, 219
 — Ferri, 641.
 — Plumbi, II. 334. 636.
Trochisci de Agarico, 78.
 — absorbentes, II. 90.
 — ex Acetate Mercurii, II. 205.
 — albi, II. 337.
 — — Rhazis, II. 337.
 — Alhandal, 553.
 — — Alipti moschati, II. 219.
 — — Alkekengi, 88.
 — — cum Opio, 89.
 — — Alkermes, 472.
 — — completi, 472.
 — — Althaeae, 122.
 — — compos., 122.
 — — de Ambra, 142.
 — — Amyli, 190.
 — — antacidi, II. 90.
 — — anthelmintici, 521. 649. II. 24. 174.
 — — Doct. Ching, II. 160.
 — — antihysterici, 575.
 — — Antimonii, 222.
 — — martiales, 649.
 — — aromatici, 383.
 — — aromatico-stomachici, 383.
 — — bechici, 727. II. 79.
 — — albi, 122. 190. 727. II. 20. 79.
 — — citrini s. flavi, 728.
 — II. 80.
 — — nigri, II. 80.
 — — opiacei s. opiati, II. 268.
 — — rubri, II. 655.
 — — Calami aromatici, 348.
 — — Calcis Carbonatis, 362.
 — — de Carabe, II. 275.
 — — Carbonatis Magnesiae, II. 90.
 — — Plumbi camphorati, II. 337.
 — — carbonici, 414.
 — — Castorei, 433.
 — — Catechu, 442. 443.
 — — — cum Ambra, 443.
 — — — cum Liquiritia, 443.
 — — — cum Magnesia, 443.
 — — Chausseri, II. 272.
 — — Chloruret Calcis, II. 696. 1.
 — — Citratis ferrici, 663.
 — — Colocynthidis, 553.
 — — — praep., 553.
 — — de Cremore Tart., II. 409.
 — — Cretae, 362.
 — — Cupressi Fruct., 581.
 — — Cyphos, II. 626.
Trochisci digestivi, II. 580.
 — emetici, 611.
 — — emmenagogi, 636. II. 10.
 — — Enulae, II. 3.
 — — escharotici, II. 181. 186.
 — — — albi, II. 181.
 — — excitantes, II. 328. 428.
 — — ferruginosi, 636.
 — — ad foetorem oris, 443.
 — — fumales, 325.
 — — Galliae moschatae, II. 219.
 — — e Glycyrrhiza, II. 79.
 — — Glycyrrhizae, II. 79.
 — — — comp., II. 80.
 — — — cum Gummi, II. 80.
 — — — cum Opio, II. 81.
 — — — thebaici, II. 81.
 — — Gordonii, 728.
 — — Gummi Acaciae, 727.
 — — guminosi, 727. II. 655.
 — — hedychroi, 348.
 — — hermetici, II. 169.
 — — — Scretae, II. 174.
 — — Hydrargyri, II. 194.
 — — Japonici, 666.
 — — Imperatoris, 383.
 — — iodati, II. 8.
 — — Iodii, II. 8.
 — — Ipecacuanhae, II. 13.
 — — — comp., II. 13.
 — — — opiatas, II. 13.
 — — de Karabe, II. 275.
 — — de Lagneau, II. 125.
 — — Lichenis Islandici, II. 68.
 — — Liquiritiae, II. 80.
 — — — cum Gummi, II. 80
 — — Magnesiae, II. 90.
 — — — Mannae, II. 90.
 — — masticatorii, II. 104.
 — — Menthae piperitae, II. 117.
 — — mercuriales, II. 155. 164.
 194
 — — Mercurii saccharati, II. 125.
 — — — saccharini, II. 125.
 — — de Minio, II. 186.
 — — Mogolici, II. 219.
 — — moschati, II. 219.
 — — Muriat. oxygenat. Hydrargyri, II. 181.
 — — muscardae — Troch. Catechu.
 — — de Myrrha, 283.
 — — — comp., 283.
 — — Myrrhae comp., 283.
 — — Nitrat. Potassae, II. 391.
 — — de Nitro, II. 391.
 — — odoriferi, 142.
 — — cum Oxido Merc. nig. et Sacch. aropi., II. 143.
 — — pectorales, 621. 727.
 — — — Regis Danorum, II. 81.
 — — purgantes, II. 171.
 — — refrigerantes, II. 396.
 — — Rhazis, II. 337.
 — — de Scilla, II. 531.
 — — — Damocratis, II. 531.
 — — scillitici, II. 531. 534.
 — — sedativo-balsamici, II. 81.
 — — solventes s. solutivi, II. 24.
 — — ad sputum cruentum, 442.
 — — stibati, 222.
 — — stomachici, 383.
 — — ad strumam, 415.
 — — — Succini, II. 275.
 — — e Sulphure, II. 602.
 — — temperantes, II. 396. 403.
 — — de Terra Catechu, 442.
 — — contra vermes, II. 169.
 — — vermifugi, II. 169.
 — — — Barthezii, II. 169.
 — — Viperarum, 682.
 — — de Vipera, 682.
Tropeaeolum ma us, II. 233.
Trypthera magna, II. 288.
Tubera cervina, 331.

Tunica, 609.
 — hortensis, 609
 — rubra, 609.
Tunicæ interiores, ventriculi Gallinae, 682.
Turiones Piceae, 2.
 — Pini, 2.
Turpethum album, II. 659.
 — minerale, II. 190. 191.
 — nigrum, II. 192.
 — rubrum, II. 190.
 — vegetabile, II. 659.
Tussilago, 630.
 — Farfara, 629.
 — Petasites, II. 316.
Tuthia, II. 684.
Tutia, II. 684.
 — Alexandrina, II. 684.
 — praeparata, II. 684.
Tyelinum, II. 547.

U.

Ulmaria, II. 589.
Ulmus, II. 659.
 — campestris, II. 659.
 — fulva — Ulmus campestris.
 — fulva, II. 659.
Ultramarinum, 133.
Uva Lactuca, 741.
 — pavonia, 741.
 — squanaria, 741.
Umbilicus, 572.
 — marinus, 358.
Umbræ, 641.
Uncaria Gambæ — Nuclea G.
Unguentum Abbatiae du Bec,
 II. 640.
 — Acetatis Cupri, 582. 592.
 — — crystalli, 592.
 — — cum Melle, 582.
 — — Plumbi, II. 344.
 — — carbonatum, II. 354.
 — — superplumbic, II. 344.
 — acetatum, 23.
 — Acetitis Cupric. Melle, 582.
 — — Plumbi, II. 344.
Acidi nitrici, 38.
 — — nitrosi, 48.
 — — sulphurici, II. 696 c.
 — acre, II. 696 c.
Adipis suillae, II. 473.
Adipocerae Cetorum, 453.
adstringens, 138. II. 339 443.
 691.
 — Aegyptiacum, 582.
 — Aegypticum, 582.
 — Aeruginis, 582. 583. 592.
 — — melleum, 582.
 — Aethiopicum, II. 140.
 — agglutinans martiale, II. 642.
 — Agrippae, II. 543.
 — Alabastrinum, 130.
 — Alabastrum, 130.
 — albissimum, 454.
 — album, 251. 453. II. 337.
 — — camphoratum, II. 338.
 — — resolvens, 154.
 — — Rhazis, II. 337.
 — — simplex, II. 337.
 — — alcalinum, II. 337.
 — — Aloës c. Petroleo, 98.
 — — de Althæa, 128.
 — — Althæae. Althæae, 128. 252.
 — — amarum, 588.
 — — ad ambusta 754. II. 687. 689.
 — — ad-ambustiones, II. 338.
 — — ammoniacalesaponaceum, 154.
 — — ammoniatum, 168.
 — — amygdalinum, 252.
 — — Amyridis elemif, II. 621.
 — — anodynum, 754.
 — — anthelminticum, 12. 98. 558.

Unguentum antiarthriticum, II.
 131.
 — — antihæmorrhoidale, 678.
 — — II. 250. 266. 339. 345. 349. 354.
 591. 687.
 — — antihæretic, 228. 354. II.
 155. 159. 202. 344. 346. 348. 607.
 — — — Chevallieri, 354.
 — — — Cullerieri, II. 191.
 — — — Goulardi, II. 346.
 — — — antiophthalmicum, II. 250.
 — — — antiphthiriacum, 257.
 — — — antipsoric., 413. II. 110. 144.
 148. 181. 202. 382. 384. 575. 605.
 — — — Jasseri, II. 635.
 — — — c. Nicotiana, II. 230.
 — — — antiscrophulos., II. 10. 238.
 — — — antispasmod., 334.
 — — — antisyphilit., 298.
 — — — antivenerum, 298. II. 149.
 172.
 — — Apostolorum, II. 358.
 — — Aquae Rosarum, II. 473.
 — — Arcaei, II. 621.
 — — aromaticum, II. 53. 55. 56.
 479.
 — — — camphorat., II. 56.
 — — — arsenicale, 272.
 — — — Arsenici, 272.
 — — — de Arthanita, 558.
 — — — aureum, II. 640.
 — — — Autenriethii, 243.
 — — — contra decubitus, II.
 696 b.
 — — — Balsami et Olei Laricis, II.
 621.
 — — — balsamicum, II. 621.
 — — — basilicum, II. 621. 640.
 — — — flavum, II. 621. 640.
 — — — nigrum, II. 621.
 — — — pallidum, II. 640.
 — — — cum Pice navali, II.
 641.
 — — — Belladonnae, 296.
 — — — Bellii, II. 150.
 — — — de Ricour, II. 364.
 — — — ad bleunorrhag. chorda
 tam, II. 135.
 — — — de Bolo, 132.
 — — — c. Bromo, II. 696 a.
 — — — Bryoniae, II. 543.
 — — — Burdenii, II. 384.
 — — — Calaminae comp., II. 690.
 — — — calaminare, II. 686.
 — — — e calaminari lapide, II. 686.
 — — — Calcis vivae, 353.
 — — — Calendulae Flor., 370.
 — — — de Calomelle, II. 158.
 — — — camphoratum, 455.
 — — — Cantharidis, 399.
 — — — — cereum, 404.
 — — — — infusi, 399.
 — — — Cantharidum, 404. 405.
 — — — — cereum, 404.
 — — — — colatum, 409.
 — — — — irritans, 404.
 — — — — opiatum, 400.
 — — — Carbonatis plumbici, II. 337.
 — — — — Zinci impuri, II. 686.
 — — — Carbonis, 413.
 — — — cardiacum, 620.
 — — — carminativum, 466. II. 56.
 — — — Catechu, 414.
 — — — cathæreticum, 558. II. 148.
 — — — Cerae, 251.
 — — — ceratum, 252.
 — — — cereum, 251.
 — — — — Curcumae, 252.
 — — — Cerussae, II. 337.
 — — — — acetatae, II. 337.
 — — — — camphoratum, II. 338.
 — — — Cetacei album, 453.
 — — — Ceti, 453.
 — — — cinnabarinum, II. 156.
 — — — Cirilli, II. 181.

Unguentum Cirilli opiaceum,
 II. 181.
 — — citricum, 31.
 — — citrinum, 128. II. 197. 640.
 — — clysmaticum, 130.
 — — coeruleum — Ungt. Hy-
 drargyri.
 — — ad combustiones, 754. II.
 338. 346.
 — — Comitissae, 678. II. 693.
 — — commune, 251.
 — — Conii, 617.
 — — Conyzae, 627.
 — — corrodens, II. 148.
 — — cosmeticum, 454.
 — — Cucumerum, II. 696 r.
 — — cupratum, 589. 592.
 — — Cupri, 589.
 — — — compositum, 592.
 — — e Cupro, 586.
 — — Curcumae, 252.
 — — Cyanureti Mercurii, II. 189.
 — — Cyrilli, II. 181., f. Ungt.
Cirilli opiac.
 — — — Damascenum, 583. 592.
 — — — coeruleum, 544.
 — — — defensivum, 132.
 — — — depilatorium, 519. II. 620.
 — — — depurativum, II. 238.
 — — — Desaulti, II. 150.
 — — — desiccativum, II. 687.
 — — — Deutochlorureti Merc., II.
 181.
 — — — Diapompholigos, II. 686.
 687. 689.
 — — — digerens balsamicum, II.
 621.
 — — — digestivum, II. 622.
 — — — — animalatum, II. 622.
 — — — — aloëticum, II. 622.
 — — — — compositum, II. 622.
 — — — — flavum, II. 621.
 — — — — mercuriale, II. 131.
 — — — — myrrhatum, II. 622.
 — — — — opiaceum, II. 623.
 — — — — simplex, II. 622.
 — — — Digitalis, 619.
 — — — — purpureae, 616.
 — — — — diureticum resolvens, II. 535.
 — — — — dodecapharmacum, II. 358.
 — — — — ad dolorem faciei, II. 337.
 — — — — Duboisii, II. 197.
 — — — — Elemi, II. 621.
 — — — — cum Alumine, II. 140.
 — — — — compositum, II. 621.
 — — — — et Terebinthinae, II.
 621.
 — — — — emolliens, 90. 251. II. 620. 640.
 — — — — et sedans, II. 255.
 — — — — empiricum Flaki, II. 591.
 — — — — emplasticum, II. 107.
 — — — — Enulae, II. 2.
 — — — — enulatum, 399. II. 2.
 — — — — epispasticum, 399. 405. 407.
 409. 603.
 — — — — ammoniacale, 154.
 — — — — camphorat., 400. 408.
 — — — — fortius, 407.
 — — — — mitius, 399.
 — — — — viride, 409.
 — — — — escharoticum, 272. II. 149.
 — — — — excitans, 404.
 — — — — essiccans, II. 339. 687. 689.
 691.
 — — — — rubrum Acrelii, II. 690.
 — — — — exsutorium, 407.
 — — — — c. Extr. Canth. comp., 399.
 — — — — Fabri, 241.
 — — — — Falckii, II. 151.
 — — — — Fellis bovini comp., 631.
 — — — — Filii Zachariae, 252.
 — — — — flavum, 128. II. 638. 639.
 — — — — Florum Naphae, 529.
 — — — — ad fonticulos Bergii, 409.
 — — — — fuscum, II. 149. 354. 641.

Unguentum Gallae, 678.
 — Gallarum, 678.
 — compos., 678.
 — ex Gallis comp. s. opiatum, 678.
 — Gondreti, 154.
 — Goulardi, II. 346.
 — de Grandjean, 408.
 — de Graphite, 637.
 — griseum, II. 626.
 — — camphoratum, II. 144.
 — haemorrhoidale, 576. 750.
 — ad haemorrhoides, II. 250. 266. 270. 354.
 — Helenii, II. 2.
 — Hellebori albi, 741.
 — — viridis, 741.
 — Hydrargyri, II. 128.
 — albi, II. 202.
 — album, II. 202.
 — cinereum, II. 128.
 — — fortius, II. 181.
 — — cum Terebinthina, II. 130.
 — citrinum, II. 197.
 — compositum, II. 197.
 — Dentoxynitrat., II. 148.
 — fortius, II. 130.
 — griseum, II. 144.
 — mitius, II. 130.
 — Muriatis ammoniacalis, II. 202.
 — nitrati, II. 197.
 — Nitratis, II. 197.
 — nitrico oxydi, II. 148.
 — Oxydi cinerei, II. 128.
 — praecipitati albi, II. 202.
 — rubri, II. 148.
 — rubrum, II. 148. 140.
 — Sulphureti sublimati, II. 155.
 — c. Hydrobromate Potass. bromureo, II. 666.
 — — sine et c. Terebinth., II. 128.
 — ex Hydrargyro oxydato rubro, II. 148.
 — Hydriodatis Potassae, II. 9.
 — — iodurati, II. 10. 695 h.
 — Hyoscyami s. de Hyoscyamo, 753.
 — hypnoticum, II. 275.
 — de Infuso Canthar., 399.
 — infrigidans Galeni, II. 474.
 — Inulae, II. 2.
 — — Helenii, II. 2.
 — iodatum, II. 8.
 — Iodii, II. 8.
 — Iodureti Arsenici, II. 666 h.
 — — Barii, II. 666 h.
 — — Mercurii, II. 188.
 — — Sulphuris, II. 666 h.
 — irritans, 405. 407.
 — Jadelotii, II. 202. 376.
 — Janini, II. 202.
 — Jenneri, 243.
 — Joerdensii, II. 150.
 — Juchii, II. 132.
 — juglandinum c. Felle Tauri, 632.
 — Junperi, II. 43.
 — Kali hydroiodici, II. 9.
 — Lapidis calaminaris, II. 686. 689.
 — — laurino-camphorat., II. 56.
 — — laurinum, II. 53.
 — — leniens, 64. 378. II. 265. 268. 547.
 — — et balsamicum, II. 621.
 — — lenitivum, 128. II. 620.
 — de Linaria, II. 73.
 — Linariae, II. 73.
 — de Liquiritia, II. 339.
 — Lithargyri, II. 344.

Unguentum Lithargyri resinos. martiale, II. 642.
 — de Lithargyro s. de Lithargyro, II. 344.
 — Lugdunense, II. 148.
 — Lupuli, II. 86.
 — Lupulini, II. 86.
 — luteum, II. 622.
 — Lythae, 404.
 — — cereum, 404.
 — — irritans, 404.
 — ad maculae corneae, 632.
 — magistrale, II. 361.
 — Majoranae, II. 207.
 — malorum insanorum, 592.
 — Malvae, II. 98.
 — malvinum, II. 98.
 — martiatum, II. 56.
 — Matris, II. 354.
 — — Theclae, II. 354.
 — Medullae mucilaginis, 254.
 — — vaccinae, 61.
 — mercuriale, II. 128. 149.
 — — album, II. 202.
 — — Werlhofii, II. 202.
 — — aptyalizomenon, II. 187.
 — Baekingii, II. 149.
 — camphorat., II. 135.
 — cinereum, II. 128.
 — citrinum, II. 197.
 — — Baumé, II. 197.
 — — corrosivum, II. 181.
 — — mitius, II. 130.
 — — opiaceum et opiatum, II. 135.
 — — oxygenatum, II. 131.
 — — rubrum, II. 148.
 — — Sanchezii, II. 131.
 — — saponaceum, II. 135.
 — — c. Terebinthina, II. 130.
 — Mercurii rubrum, II. 148.
 — — sulphurati, II. 140.
 — de Mercurio dulci, II. 158.
 — Mezerei, 603.
 — — Resinae viride, 603.
 — Minii, II. 335.
 — — camphoratum, II. 335.
 — de Minio, II. 335. 361.
 — — camphoratum, II. 335.
 — Monspeliacum, 157.
 — mundificans, II. 139.
 — — Poterii, II. 238.
 — — Stahlii, II. 134.
 — — Zelleri, II. 202.
 — Muriatis hydrargyro-ammoniacalis, II. 202.
 — — oxygenati Hydrarg., II. 181.
 — Myrrhae, II. 228.
 — myrtinum comp., 678.
 — Naphae Flor., 529.
 — narcoticum, II. 268.
 — Neapolitanum, II. 128.
 — nervinum, 159. II. 53. 479.
 — de Nicotiana s. Nicotiana, II. 238.
 — — nigrum, II. 155.
 — — Nihili, II. 686. 687.
 — — ad oculos, II. 686. 687.
 — de Nihilo, II. 686.
 — Nitratis Hydrargyri, II. 197.
 — — — fortius, II. 197.
 — — — mitius, II. 197.
 — — hydrargyrici, II. 197.
 — — Mercurii et Ammoniacae, II. 198.
 — — nitricatum, 48.
 — — — fortius, 48.
 — — — mitius, 49.
 — — nitricum, 48.
 — — nutritum, II. 344.
 — — oculare, II. 349.
 — — — album, II. 688.
 — — — Keyseri, II. 688.

Unguentum ad oculosum defluxiones, II. 693.
 — ophthalmicum, 55. 591. 632. II. 151. 349. 687. 693.
 — — album, II. 686. 688.
 — — eupratum, 591.
 — Dupuytrenii, II. 150.
 — Janini, II. 202.
 — Pelletani, II. 148.
 — Richteri, II. 149.
 — rubrum, II. 148. 688.
 — Sloanii, II. 688.
 — — viride, II. 688.
 — — St. Yves, II. 150.
 — — opiatum s. opiaceum, II. 250. 267. 268. 346.
 — — Opodeldoch, 156.
 — — Oxycarbonatis Zinci impuri, II. 686.
 — — Oxydi albi Merc. per Acid sulphurici, II. 191.
 — — Cobalti, 544.
 — — Cupri melleum, 582.
 — Hydrarg. cinerei, II. 130.
 — — nitrati, II. 148.
 — — rubri, II. 148.
 — — rubrum Tittmanni, II. 148.
 — — Plumbi acetatum, II. 344.
 — — albi, II. 344.
 — — carbonati, II. 337.
 — — fuscum, II. 354.
 — — rubrum, II. 361.
 — — Zinci, II. 699.
 — — camphoratum, II. 687.
 — — — impuri, II. 686.
 — — — nativi, II. 686.
 — — Oxyduli Plumbi semivitrei adustum, II. 354.
 — — oxygenatum, 48.
 — — ex tempore parandum, 511.
 — — Oxynitris Hydr. et Ammoniae, II. 696 i.
 — — comp., II. 696 i.
 — — oxynomenon, 48.
 — de Papav., Hyosc. et Bellad., 755.
 — — paralyticum, 55. II. 420.
 — — ad paralysis, II. 420.
 — — pectorale, II. 20.
 — — pedicularum, II. 131.
 — — contra pediculos, 197. II. 449. 493.
 — — — capitis, 608.
 — — ad perniones, 138. 373. II. 56. 638.
 — — phosphoratum, II. 321.
 — — phosphoricatum, 51.
 — — Phylolaccae Radicis, II. 322.
 — — de Pice et Cera, II. 641.
 — — piceum comp., II. 640.
 — — Pisis, II. 640.
 — — — aridae, II. 640.
 — — et Ceruae, II. 641.
 — — empyreum, II. 640.
 — — liquidae, II. 330.
 — — — cum Oxydo Merc. rubro, II. 149.
 — — — et Sulphuris, II. 330.
 — — Piperis nigri, II. 328.
 — — Plumbi compositum, II. 339.
 — — — plumbicum, 344.
 — — — pomadinum, 252. II. 473.
 — — 475.
 — — pomatum oxygenatum, 48.
 — — Popholiogis, II. 689.
 — — populeum, 745. II. 399.
 — — Populi Gemmar. comp., 755.
 — — 54 *

- Unguentum Praecipitati viridis, II. 206.
- de Praecipitato rubro, II. 148.
 - propolicum, 254.
 - ad prosopalgiam, II. 337.
 - psoricum Anglicum, II. 666.
 - Pulveris Meloë vesicatorii s. Canth., 399.
 - purgans, 554 II. 171.
 - purpureum Wurzii, 583.
 - refrigerans, 378. II. 473.
 - Regentii, II. 150.
 - regium, II. 640.
 - de Renal, II. 272.
 - de Resina Pini comp., 128.
 - Resinae albae, II. 638.
 - — Elemi, II. 621.
 - — flavae, II. 621. 640.
 - — nigrae, II. 611.
 - — Pini Burgund., II. 639.
 - — sylv. comp. 128.
 - resinosum, II. 618. 6661.
 - resolvens, 400. 422. 673. II. 135 175. 349.
 - — mammarum tumores
 - — Linim. volat.
 - — resuntivum, 128. 129.
 - — Rorismarini comp., II. 53.
 - — Rosae Aquae, II. 473.
 - — Rosarum, II. 473.
 - — rosatum, II. 473. 474.
 - — — compositum, II. 202.
 - — — simplex, II. 474.
 - — rubefaciens, 63.
 - — rubrum, II. 150. 335.
 - — — ad labia oris, II. 245.
 - — — potabile, II. 245.
 - — Rustii, II. 150.
 - — Rutae, II. 402.
 - — Sabadillae c. Mercurio, II. 131.
 - — Sabinae, II. 40.
 - — Salicis, II. 498.
 - — Salis marini, II. 576.
 - — Sambuci, II. 510.
 - — sambucinum, II. 510.
 - — sandalinum, II. 513.
 - — saponaceum, II. 416 419.
 - — Saponis, II. 419.
 - — saturninum, II. 344. 349.
 - — — s Saturni saponaceum, II. 346.
 - — saturno mercuriale, II. 197.
 - — ad scabiem, II. 144. 197. 605.
 - — — Anglicum, II. 607.
 - — — Jasseri, II. 606.
 - — — Zelleri, II. 202.
 - — Scillae, II. 535. 537.
 - — — maritimae, II. 537.
 - — scilliticum, II. 537.
 - — ad scrophulas, II. 10.
 - — Sebi Arcaei, II. 621.
 - — sedans, II. 349. 547.
 - — sedativo-narcoticum, II. 258.
 - — sedativum, II. 264. 265.
 - — Semin. frigidior., 454.
 - — siccativum, II. 187.
 - — simplex, 251. 252. II. 638.
 - — 639.
 - — Sinapis, II. 571.
 - — Solani, II. 587.
 - — somniferum, II. 275.
 - — Spermatis Ceti, 453.
 - — splenicum, 726.
 - — de Staphisagria, 608.
 - — — compos., 608.
 - — Staphysagriae, II. 131.
 - — — compositum, II. 131.
 - — stibiatum, 243.
 - — stimulan., 404. II. 149.
 - — stomachale, 12. 424. 466.
 - — Stramonii, 606.
- Unguentum contra strumam, 299 II. 696 p.
- — Styrciacis, II. 596.
 - — — comp., II. 595.
 - — — resinosum, II. 595.
 - — Subacetatis Cupri, 594.
 - — — cum Melle — Oxymel cupros.
 - — — Plumbi liquidi, II. 314.
 - — — opiatum, II. 346.
 - — — camphoratum, II. 346.
 - — — saponaceum, II. 346.
 - — — plumbici, II. 344.
 - — Subacetitis Cupri, II. 592.
 - — Subcarbonat. Plumbi, II. 337.
 - — Submur. Hydr. amm., II. 202.
 - — Subnitrat. Hydrarg., II. 148.
 - — Suboxydi Hydrarg., II. 130.
 - — Sulphat. Hydrarg., II. 191.
 - — sulphuratum, II. 605.
 - — — compositum, II. 6-6.
 - — — simplex, II. 605.
 - — e Sulphure, II. 605.
 - — — hydrargyrato, II. 140.
 - — sulphuricum, 55.
 - — Sulphuris, 605.
 - — — compos., II. 605. 606.
 - — sulphuro alcalinum, II. 370.
 - — — a la sultane, 435.
 - — Superacetat. Plumbi comp. II. 696.
 - — Supernitrat. Hydrarg., II. 197.
 - — — suppurans, 90.
 - — — suppurativum, II. 149.
 - — — ad tabida membra, 627.
 - — — Tartari emetici, 243.
 - — — — stibiati, 243.
 - — — e Tartaro stibiato, 243.
 - — — Tartratis Potass. stibiati, 243.
 - — — Stibii et Potassae, 243.
 - — — II. 696 d.
 - — — de Terebinthina, II. 622.
 - — — — et Adipibus, II. 621.
 - — — — et Cera — Ung. Alth. et Ungt. cer. Curcum.
 - — — — et Ovorum Vitellii, II. 622.
 - — — Terebinthinae, II. 622. 623.
 - — — — camphoratum, II. 622.
 - — — 624.
 - — — — et Picis, II. 610.
 - — — — resinosum, II. 610.
 - — — terebinthinatum, II. 620 621.
 - — — tetrapharmacum, II. 610.
 - — — ad tineam, 413. 673. II. 173.
 - — — 198. 202. 607. 638.
 - — — de Tornamira, II. 337.
 - — — tripharmacum, II. 344.
 - — — Turpethi mineralis, II. 191.
 - — — Tutiae, II. 686. 687.
 - — — ad ulcera lymphatica, II. 149.
 - — — — scrophulosa, II. 149.
 - — — — venerea, II. 149.
 - — — de Uvis, 252.
 - — — ad varices ani, II. 345. 354.
 - — — Veratri, 74.
 - — — Veratrinii, II. 672.
 - — — ad s. contra vermes, 12 98.
 - — — 558.
 - — — ad vesicata, 409.
 - — — vesicatorium, 405. 407.
 - — — virginale, II. 693.
 - — — viride, 492 591.
 - — — — potabile, 760.
 - — — Zinci, II. 689. 687.
 - — — — potabile, 760.
- Unguis odoratus — Blatta by-zant.
- Ungula Aloës, 682.
- — — praeparata, 682.
 - — — Caballina, 630.
- Ungulae Cancrorum, 359.
- Unicornu, 364. 682.
- — fossile, 394.
 - — marinum, 364.
 - — — praeparatum, 364.
 - — — minerale, 364.
 - — — verum, 364.
- Uniones, 358.
- — praeparatae, 360.
- Urea, 59.
- Uredo Frumenti — Sclerotium Clavus.
- Ursinum verum, 15.
- Ursus, 333.
- Urtica, II. 66c.
- — dioica, II. 660.
 - — Hispanica — U. pilulifera.
 - — major, II. 660.
 - — minor, II. 660.
 - — mortua, II. 52.
 - — pilulifera, II. 660.
 - — Romana, II. 660.
 - — urens, II. 660.
- Urucu, II. 297.
- Usnea plicata, II. 65.
- Uva quercina, II. A. 1d.
- — Ursi, II. 660. 661.
 - — versa, II. 314.
 - — vulpina, II. 314.
- Uvae, II. 679.
- — passae, II. 680.
- Uvularia, II. 490.
- V.
- Vaccae Stercus, II. 6961.
- Vaccinium, II. 661.
- — Myrtillus, II. 661.
 - — Oxyccocus, II. 661.
 - — Vitis Idaea, II. 661.
- Vainiglia, II. 670.
- Valeriana, II. 662.
- — Celtica, II. 232 233.
 - — major, II. 662.
 - — minor, II. 662.
 - — officinalis, II. 663.
 - — Phu, II. 662.
 - — sylvestris, II. 663.
- Valerianella olitoria, II. 670.
- Vaniglia, II. 670.
- Vanilla, II. 670.
- — aromatica, II. 670.
- Vanillia, II. 670.
- Vapor aceticus, 21.
- — Acidi aceticis, 21.
 - — hepaticus, 43.
 - — hydro-sulphuratus, 43.
 - — Muriatis Calcis oxygenati i. e. Muriatis Calcis oxyquant. plaect.
 - — oxymuriat. acidus — Liq. alex. extemp.
- Vapores, f. Vapor.
- Variolaria, II. 671.
- — orcina, II. 671.
- Vateria Indica — Elaeocarp. copallif.
- Ventriculus Gallinae, 682.
- Venus, 58z.
- Veratria, 736. II. 672.
- Veratrina, II. 672.
- Veratrinum, 735. II. 672.
- Veratrum, 735.
- — album, 735.
 - — Lobelian. — Verat. album.
 - — Sabadilla, II. 493.
- Verbasculum pratense, II. 422.
- Verbascum, II. 672.
- — album, II. 672.
 - — nigrum, II. 672.
 - — phlomoides, II. 672.

- Verbascum thapsiforme**— Verb.
 — Thapsus.
 — Thapsus, II. 672.
Verbena, II. 673.
 — officinalis, II. 673.
 — triphylla, II. 673.
Verbesina, 329
Vernis majalis, II. 113.
Vernix sicca, II. 511.
Veronica, II. 674.
 — Anagallis, II. 673.
 — Beccabunga, II. 673.
 — officinalis, II. 673.
 — purpurea, 327.
 — teucriifolia, II. 674.
 — Teucrium, II. 674.
 — Virginica, II. 674.
Verrucaria, 370. 735.
Verrucarium, 571.
Vertebrae Mustelae Piscis, 364.
Vesicatorium de Lecomte, 409.
 — magistrale, 405.
Vicia, II. 675.
 — Ervilia, II. 675.
 — sativa, II. 675.
Victorialis feminea, 703.
 — longa, 93.
 — mascula, 93.
 — rotunda, 703.
Vinaigre de quatre voleurs —
 Acet. quat. latron.
Vinca, II. 675.
 — major, II. 675.
 — minor, II. 675.
Vincetoxicum, 290.
Vini Gallici Spiritus — Spir.
 Vin. Gall.
Vinum, II. 675.
 — absinthiatum, 8.
 — Absinthii, 8.
 — compos., 9.
 — Absinthitis, 8.
 — adstringens, 304. 446. 531.
 II. 487.
 — adustum, 81.
 — album, II. 676.
 — Alicantium, II. 676.
 — Aloës, 95.
 — Socotrinae, 95.
 — aloëtico-alcalinum, 109.
 — aloëticum, 95.
 — amaro-chalybeatum, 667.
 — amarum, 450. 697.
 — alcalisat., 532.
 — aromaticum, 9.
 — et diureticum, II. 557.
 — scillit. comp., II. 538.
 — cum Spiritu Vini, 697.
 — ammoniat. c. Tinect. ana-
 lept., 187.
 — anthelminticum, 8.
 — antiapoptecticum, II. 31.
 — antiictericum, 531. II. 556.
 — antimoniale, 239.
 — antimoniatum Huxh., 239.
 — Antimonii, 239.
 — Huxhami, 239. 240.
 — tartarizati, 239.
 — antileucorrhoeicum, 501.
 — antiperiodicum, 501.
 — antirheumaticum, 243.
 — antiscorbaticum, 501. II.
 439.
 — aperiens et purgans, II. 557.
 — aperitivum et tonicum
 Barthez, 411.
 — Armoraciae, II. 439.
 — aromaticum, II. 501.
 — alcalisatum, 532.
 — camphoratum, 376.
 — opiaceum, II. 248.
 — aromo-chalybeatum, 668.
 — — opiaceum, II. 248.
 — Aurantior. comp., 531.
 — — Corticum, 530.
- Vinum Aurantior. Corticum al-**
 calisatum, 532.
 — Bordegalense, II. 676.
 — Burgundicum, II. 676.
 — Calami, 350.
 — calidum, 391.
 — camphoratum, 376.
 — Catechu, 440.
 — Cephaelis Ipecac. — Vin.
 Ipecac
 — chalybeatum, 667. 668.
 — — comp., 668.
 — Chinae, 499.
 — — amarum, 500.
 — — aromaticum, 501.
 — — compos., 500.
 — — martiatum, 500.
 — chinatum, 499.
 — c. Chinino sulph., 509.
 — Cinchonae, 499.
 — Cinchonini, 524.
 — Cinnamomi, 391.
 — Cochleariae comp., II. 439.
 — Colchici, 551.
 — Colocynthis, 557.
 — cordiale, 391. 391.
 — Corticis Peruviani, 499.
 — crocato-opiatum, II. 248.
 — crocatum, 573.
 — Cupressi compositum, 531.
 — Cydoniorum, 86.
 — Dictamni martiatum, 668.
 — Digitalis, 615.
 — diureticum, II. 43. 211. 440.
 628.
 — amarum, II. 538.
 — — Anglicum, II. 411.
 — — Sydenhami, II. 410.
 — emetico-purgans Leroy,
 248.
 — emeticum, 239. II. 16.
 — — turbidum, 240.
 — Enulae, II. 5.
 — enulatum, II. 5.
 — excitans, 400. II. 411. 658.
 — de Extractis, 531.
 — febrifugum, 500.
 — ferratum, 667.
 — Ferri, 667.
 — ferruginosum, 668.
 — Gallicum album, II. 676.
 — — rubrum, II. 676.
 — Genistae Sydenhami, II. 410.
 — Gentianae, 697.
 — — compositum, 697.
 — Granati, II. 427.
 — Gratiolae, 707.
 — Gujaci helleborat., 740.
 — Hellebori albi, 740.
 — — viridis, 740.
 — hippocraticum, 301.
 — Hispanicum, II. 676.
 — Hungaricum, II. 676.
 — hydragogum, II. 410.
 — Hydromellis, 86.
 — Inulae, II. 5.
 — Ipecacuanhae, II. 16.
 — — compositum, II. 16.
 — Juniperi alcalisat., II. 400.
 — Juniperinum, II. 43.
 — lixiviale, II. 410.
 — Lusitanicum arte fact., 87.
 — Maderanum, II. 676.
 — Malacense, II. 676.
 — martiale aromaticum, 668.
 — martiatum, 667. 668.
 — — compositum, 668.
 — Martis, 667.
 — mellitum, 86.
 — Nicotianae, II. 237.
 — — Tabaci, II. 237.
 — ophthalmicum, 99.
 — opiaceum, II. 248. 291.
 — opiatum per ferment., II.
- Vinum Opii**, II. 248. 256.
 — — aromaticum, II. 248.
 — — compositum, II. 248.
 — — crocatum, II. 248.
 — — de Oxydi Antimonii, 239.
 — — de Opio compositum, II.
 248.
 — paregoricum, II. 248.
 — Psychotriae, II. 16.
 — — emeticae, II. 16.
 — purgans, II. 557.
 — — et tonicum, II. 556.
 — Raphani martiatum, 668.
 — Rhubarbari amarum, II. 457.
 — Rhei, II. 457.
 — — amarum, II. 457.
 — — aromaticum, II. 457.
 — — compositum, II. 457.
 — — palmati aromat., II.
 457.
 — Rhenanum, II. 676.
 — — arte factum, 87.
 — roborans, 9. 500.
 — rubrum, II. 676.
 — Salviae, II. 501.
 — Scillae, II. 537.
 — — alcalinum, II. 538.
 — — maritimae, II. 537.
 — scilliticum, II. 537.
 — Scillites, II. 537.
 — Sennae, II. 558.
 — Sinapios, II. 572.
 — stibiatum, 239. 240.
 — — c. Extr. narcot., 62. 242.
 — stomachicum, 419. 502. 697.
 — Stramonii, 666.
 — strypticum, 531.
 — Sulphatis Chinini, 509.
 — sulphuratum, 137.
 — Tabaci, II. 237.
 — ex Tartrate Antimonii, 239.
 — Tartratis s. Tartritis Anti-
 monii, 239.
 — — Potassae et Antimo-
 nii, 239.
 — — Stibii et Potassae, 239.
 — — tonico-stimulans, 500.
 — — tonicum, 697.
 — — et antiperiod., 500.
 — Trifolii fibrini, II. 658.
 — Valerianae, II. 667.
 — Veratri, 740.
 — — albi, 740.
 — — viridis, 740.
 — Vincetoxici amarum, 450.
 — Viperarum, 683.
 — Xerense, II. 676.
Viola, II. 676.
 — canina, II. 676. 677.
 — dentaria, 608.
 — Jatamarensis, II. 233.
 — odorata, II. 676.
 — pedata, II. 676.
 — tricolor, II. 21.
Violaria, II. 676.
Viperæ s. Viperarum Caro et
Spinae, 681.
Viperina, 264. 620.
Virga aurea, II. 679.
Viride Aeris, 592.
 — — crystallisatum, 592.
 — — praeparatum, 592.
 — — cubicum, 648.
 — — montanum, 584.
Viscago, II. 569.
Visci Lignum, II. 679.
Viscum s. Viscus, II. 679.
 — — album, II. 679.
 — — Betulae — V. album.
 — — Coryli — V. album.
 — — quercinum, II. 679.
 — — quernum, II. 679.
 — — Salicis — V. album.
 — — Tiliae — V. album.

- Viscum Xylobalsamum — Xylobalsamum.
 Vismuthum, 329.
 Vitellum s. Vitellus Ovi — Ova gallinacea.
 Vitex Agnus castus, 79.
 Vitis Idaeae, II. 662.
 — Pampini, II. 679.
 — vimiera, II. 679.
 Vitri Herba, II. 409.
 Vitrioli Gilla Theophrasti — Gilla.
 — Phlegma s. Ros, II. Add.
 — Terra dulcis — Terra Vitri. dulcis.
 Vitriolum album, II. 690.
 — — purum, II. 690.
 — Anglicum, 648.
 — camphoratum, 587.
 — coeruleum, 584.
 — — purum, 584.
 — Cupri, 584.
 — — factitium, 584.
 — Cyprinum, 584.
 — Cyprum, 584.
 — de Cypro, 584.
 — ferreum, 648.
 — Ferri, 648.
 — Goslariense, II. 690.
 — Hungaricum, 648.
 — Londinense, 648.
 — Magnesia, II. 94.
 — Martis, 648.
 — — ad albedinem calcinat. 648.
 — — calcinatum, 648.
 — — exsiccatum, 649.
 — — factitium, 648.
 — — purum, 648.
 — — siccatum, 648.
 — — Po assae, II. 385.
 — Romanum, 648.
 — Sodae, II. 583.
 — Veneris, 584.
 — viride, 648.
 — vulgare, II. 690.
 — Zinci, II. 690.
 — — factitium, II. 690.
- Vitrum Antimonii, 214.
 — — ceratum, 214.
 — — hyacinthinum, 214.
 — — Moscoviticum — Alumen scissile.
 — — Stibii, 214.
 Viverra Civetta, II. 683.
 — Zibetha, II. 683.
 Volkameria aculeata, 473.
 Vulnerarium Helveticum, 266.
 Vulpis Caro et Spinae, 681.
 Vulvaria, 469.
- W.
- Wakaka Indorum, II. 671.
 Wintera aromatica — Cort.
 — Wint.
 Winteranus Cortex — Cort.
 — Wint.
 — — spurius — Cort.
 — Wint. spurius.
 Wismuthum, 329.
 Wrightia antidysenterica, 88.
 473-550.
- X.
- Xanthium, II. 681.
 — strumarium, II. 681.
 Xylaloës, II. 69.
 Xylobalsamum, 191.
 Xylocassia, 380.
 Xyris, II. 18.
- Z.
- Zanthorrhiza apiifolia, II. 681.
 Zanthoxylum clavatum, II. 681.
 Zasa, II. 516.
 Zarsaparilla, II. 516.
 Zea Mays, II. 681.
 Zedoaria, II. 682.
 — longa, II. 682.
 — rotunda, II. 682.
 Zerumbet, 431.
 Zibebae, II. 680.
 Zibetha, II. 683.
- Zibethum, II. 683.
 Zinci Acetas, II. 691.
 — — impurus, II. 684.
 — Carbonas, II. 685.
 — Flores, II. 684.
 — Magisterium, II. 685.
 — Oxycarbonas, II. 684.
 — Oxydum, II. 684.
 — — album, II. 681.
 — — impurum, II. 684.
 — — per se, II. 684.
 — — per praecipitationem, II. 685.
 — Protoxydum, II. 684.
 — Sulphas, II. 690.
 Zincum, II. 683.
 — acetatum, II. 694.
 — aceticum, II. 694.
 — album, II. 684.
 — calcinatum, II. 684.
 — hydrocyanicum, II. 684.
 — oxydatum, II. 684.
 — — album, II. 681.
 — — calaminare, II. 684.
 — — sulphuricum, II. 690.
 — — via humida paratum, II. 685.
 — praecipitatum, II. 685.
 — purum, II. 681.
 — Silesiacum, II. 696 h.
 — sulphuricum, II. 690.
 — — venale, II. 690.
 — terrestre, II. 684.
 — vitriolatum, II. 690.
 Zingiber, II. 695.
 — album, II. 695.
 — commune, II. 695.
 — nigrum, II. 695.
 — officinale, II. 695.
 — officinarum, II. 695.
 — vulgare, II. 695.
 Zinziber, II. 695.
 — vulgare, II. 695.
 Zirconium, II. 697.
 Zizyphum, II. 35.
 — sativus, II. 35.
 — vulgaris, II. 35.
 Zostera marina, 741. II. 322.
- Acetas ferricus, II. 696 i.
 Acetum Castorei comp., 440.
 — de Framboisii — A. Rub. Id.
 — Lilior. Convall., 568.
 — Naphae, II. 696 h.
 — pestilentialis — Acet. aromat.
 — plumbosum, II. 340.
 — pyroxylicum — A. pyrolygno.
 — stillatit. — Acet. destill.
 Acidum azoticum — Acid. nitricum.
 — carbonic. aëroideum — A. carbonic.
 — chloro-nitrosum, 258.
 — hydriodosum, II. 8.
 — hydrochlorinicum, 31.
 — hydrothion. liq. extemp. por., 43.
 — muriatico-nitros., 258.
 — muriaticum oxygenat. aëroideum, 509.
 — Nitri dulcificatum, 71.
 — nitricum fumans — A. Nitri fum.
 — Ossium — Acid. phosphoric.
 — Phosphori p. deliquium, 52.
 — — perfectum, 49.
 — pyroxylicum — A. pyrolygno.
 — Salis dulcificat., 70.
- Acidum Vitrioli phlogisticat. s. volatile, 56.
 Adeps, f. Unguent. u. Pomatum.
 — ceteria, II. 696 c.
 — suilla — Axungia Porci.
 Aër nitrosus, II. 696 i.
 — phlogisticatus — Gas azoticum.
 — vitriolicus, II. 696 i.
 Aergro destillata, 591.
 Aether Cupri, 590.
 — oxygenatus — Liq. anod. succ., II. 599.
 Aethiops Cupri, II. 696 h.
 — graphitialis, II. 135.
 — mercurialis, II. 138.
 — mineralis apyrus s. via sicca parat., II. 138.
 — — auratus, II. 149. 696 i.
 — — via humida parat., II. 138.
 Aethusa Meum — Ligusticum M.
 Album Bismuthi — Magister. Bism.
 Alkali fluor, 144.
 — min. aërat s. mite, II. 577.
 — — vitriolic., II. 583.
 — vegetabile acetatum, II. 398.
 — volatile salitum, 169.
 Alcohol Crotonis, II. 696 h.
 — Nucis vomicae, II. 696 m.
 Alumen album, glaciare, romanum — Alumen.
- Amalgama Auri, 208.
 Ammonii acetici Liq., f. Liq. Amm.
 Ammonium aëratum — A. carbonic.
 — carbonic. pyro-oleos. — Ammon. carbon. crud.
 — hydrogenato-sulphurat., 172.
 — liquid. caust. 134.
 — muriat. ferrat., 657.
 — nitricum, 169.
 Andira inermis, reifusa, Surinamensis — Geoffraea inerm. et Surinam.
 Antimonium purum, 211.
 Apozema de Cochlearia comp., II. 442.
 Aqua antimiasmatis compos., II. 695.
 — — Calcariae c. Cera, 254.
 — — Cerasorum amygdalata, II. 695 c.
 — chlorata — Liquor Chlori.
 — hepatica s. hydrosulphurata s. hydrothionica extemporanea, 43.
 — de Herbis vulnerariis, II. 696.
 — hydrogenato-sulphurata, 42.
 — Hlyssoni, 551.
 — ophthalmica, II. 696 k.
 — phagedaenica mitis, II. 143.

- Aqua Raphani rust.** — Aq. Ar-morac.
 — sulphurato-stibiata, 231.
 — vegeto-mineral., 11. 606 u.
 — viridis Hartmanni, 595.
 — Vitae Germanica — Tinct. purgans.
 — aquae iodatae, 11. 606 i.
 — c. Kali iod. 11. 606 i.
Argentum nitricum oxydatum fusum, cryst., 260. 261.
Argyritis — Lithargyrum.
Arsenicum oxyd. alb. — Ars alb — sulphuratum u. sulphurat. flav. — Ars. flav.
 — rubrum — Ars rubrum.
Arundo Calamagrostis, 11. 694 c.
Aselli — Millepedae.
Athamantha Oreosolin. — Oreosel.
Aureum crepitans s. diaphoreticum s. sclopetans — A. fulminans.
 — limatum, 208.
 — musivum, 11. 592.
 — oxydat. ammoniat. — A. fulmin.
 — suboxydatum, 300.
Axungia ceteraria, 11. 606 c.
Bainea Chlori, 11. 606 g.
 — Jodi, 11. 606 i.
Balsamum Libani — B. Carpathic.
 — Lithuanicum — Ol. betulin., 11. 606 e.
 — Mechae, 307.
 — Myristicae, 11. 224.
 — Resinar. antirheumat. Liboschitzii, 403.
 — Terebinth. Framii, 11. 621.
 — vulnerarium Stahl.ii, 11. 618.
Bezoardicum metallic. — Aur. oxydat.
 — pestilentielle — Acet quat. latron.
Bicarbonetum Sulphuris — Al. cohoh Sulphuris.
Boras hydrargyrosus, 11. 190.
 — natricus c. Aqua — Borax.
Borussia ferroso-ferricus, 669.
 — calicus, 38.
 — hydrargyricus, 11. 189.
Bromum, 11. 606 c.
Bromuretum Potass. et Sodii, 11. 606 f.
Buccu, 11. 606 f.
Cadmia fornacum — Tutia.
Cadmium, 11. 606 k.
Calcarea sulphuratum, 354.
Calcaria acetica, 362.
 — caustica — C. usta.
 — chlorata, 355.
 — hydrochlorica, 355.
Calophyllum Tacamahaca — Tacam.
Calotropis Mudarii, 11. 606 l.
Calx sulphurata, 354.
 — pura — C. usta.
Caphura — Camphora.
Carbonas ammonicus admixto Oleoempyreumatico animalii — Ammon. carbon. crud — bipumbicus — Cerussa.
 — calcicus, 356.
 — Ferri praecipitatus, 643.
 — magnesicus cum Hydrate magnesico, 11. 88.
Cassia cocta — Conserva.
 — solutiva — Pulpa Cassiae.
Cataplasma acre Kerndlii, 11. 606 d.
 — de Farinis et Pulpis — C. emolliens.
 — c. Kinakina et Camph. — Catapl. antisept.
- Cataplasma de Papavere et Hyoscyamo** — C. anodyn.
 — e Piperi et Aceto — Catapl. antipleuret.
 — de Pulpis et Unguento — C. maturans.
 — adsuppurationem promov. — C. maturans.
Ceratum Diapompholig, 11. 689.
 — Kinakina medicat., 489.
Cerevisia abietina comp., 3.
 — de Kinakina — C. Chinae.
Chininum sulph., 523.
Chloretum Amm. c. Oxydo hydr. — Hydrarg. ammon. mur. — s. Chlorum Natrii, 11. 606 e.
Chloris calcicus — Calcaria chlorinica venal.
Chrysis — Lithargyrum.
Citras Chinini, 11. 606 g.
Clavus secalinus — Secale cornutum.
Clematis Flammula — Cl. erecta.
Collyrium Hydriodat. zinc., 11. 606 h.
Coluber Berus — Pelias B.
Conchae sulphuratae, 11. 606 f.
Conditum Vermium majalium, 11. 113.
Confectio de Croco — C. de Hyacintho.
Conserva Cynorrhodi, 11. 467.
 — Heleni, 11. 2.
Cornu Cervi ustum album — C. C. ust.
Corydalis tuberosa — Aristol. fabacea.
Cremor Tartari volatilis, 11. 413.
Crocus Auri ceraunochryson — Aurum fulmin.
 — Martis obstructivus, 641.
 — Zwelferi, 642.
Cuprum carbonicum oxydat., 11. 606 g.
Cyanetum Plumbi, 11. 606 m.
Cyanuretum Ferri c. Cyaneto F., 669.
 — kalis et Ferri c. Aqua, 38.
Decoct. antiscorb. s. Specier. Pini comp., 11. 606 n.
 — Kinaekinae — D. Chinae.
 — de Panis Medulla — D. album.
Diosma crenata u. serratifolia, 11. 606 f.
Electuarium anth. Mathieui, 11. 591.
 — de Croco — Confect. de Hyacintho.
 — dentifric., 11. 606 d.
 — de Kinakina — E. Chinae.
 — opiat adstringens, 11. 289.
Elixir tonic. ad dentes, 11. 606 n.
Elixirium dictum de Garu — Garu.
 — s. Elixir ad scrophulas — Tinct. Gent. alcalina.
Emplastrum ad nodos mamma- rum — E. Mell. camph., 11. 107.
 — Fuliginis, 11. 606 i.
 — piccum comp., 11. 640.
Extractum Aconiti vinos, 61.
 — Filicis aetherum, 11. 606 e.
 — oleoso-resinos, 11. 606 e.
 — Kinaekinae — E. Chinae.
 — Ligni Quassiae, 11. 431.
 — Menyanthis — E. Trifol. fibr.
 — phlegmagog. Quercetani, 550.
 — Pini Turion., 11. 606 m.
 — Ratanhae, 11. 606 n.
 — Rhamni cathartici — Rob.
- Extractum Ribesiorum** — Rob. — Semin. Santon. s. Chinae aeth., 11. 606 a.
 — ex Uvis — Sapa.
Ferrugo — Ferri Rubigo.
Ferrum acetic. oxydat., 11. 606 i.
 — Boruss. oxydato-oxydula- tum, 669.
 — hydriod. oxydulat., 11. 10.
 — limatum — Limatura Ferri.
 — muriaticum rubrum, 652.
 — viride, 652.
 — oxydatum nigrum, 638.
 — rubrum, 641.
 — oxydulatum, 638.
 — arsenicum, 275. et 11. 606 i.
 — pomat. semiliquid. — Extr. Ferri pomat.
 — potabile Willisii, 663.
 — sulphuric. viride — F. sulph. oxydulat.
Fumigatio volatilis, 11. 606 d.
Gas azoticum oxydatum, 302.
 — hydrosulphuricum, 42.
 — hydrothionicum, 42.
 — nitrogenium — G. azoticum.
 — dephlogisticat. — G. azot. oxydat.
 — nitrosum, 11. 606 i.
 — oxydum nitrosium, 302. 11. 606 i.
 — sulphuricum, 11. 606 i.
 — sulphurosum, 11. 606 i.
Glandes quercinae tostae, 11. 435.
Globuli Tartari ferrati, 654.
Gummi Opopanacis, 11. 294.
Guttae febrifugae, 11. 606 c.
Hepar Arsenici minerale, 11. 606 e.
 — Calcis — Hepar Sulphuris calcar.
Hordeum praeparatum Thile- nii, 745.
Hyacinthus Muscari Muscari ambros.
Hydrargyrum ammoniato mu- riaticum insolub., 11. 199.
 — solubile — Sal Alembroth.
 — Boruss. s. hydrocyanicum oxydat. — H. boruss. et hydrocyanic.
 — chlorat in maximo — II. muriat. corrosiv.
 — mite praep. — H. mur. mite.
 — cyanatum, 11. 189.
 — glyzyrrhizatum, 11. 606 l.
 — iodatum, 11. 188.
 — mellitum, 11. 126.
 — nitric. oxydatum, 11. 194.
 — oxydulat., 11. 194.
 — oxydat. phosphoric. acid. 11. 606 l.
 — subsulphuricum, 11. 191.
 — oxydulat. aceticum, 11. 203.
 — calcareum — H. c. Creta.
 — magnesiatum — H. c. Magnesia.
 — nigrum purum, 11. 606 i.
 — saccharatum, 11. 126.
 — phosphoric. oxydulatum, 11. 190.
 — stibiato-sulphurat. auran- tiacum, 11. 606 l.
 — sulphuratum, 11. 152.
 — oxydulatum, 11. 138.
 — terebinth., 11. 606 l.
Hydras aluminicus — Terra Alu- minis.
 — natricus — Natron caust.
 — Oxydi ferrici, 643.
Hydriodas ferrosus, 11. 10.
 — Kali, 11. 8.
 — zincicus, 11. 606 p.

- Hydrochloras ammonicus crudus** — Ammon. muriat. crudum. Itat Hydrochlor. Amm. crud.
- Infusum Ayapanae**, II. 696 h.
- Rhei Chinensis, II. 461.
 - — — cum Alkali, II. 454.
- Iodetum Ferri**, II. 10.
- Hydrargyri, II. 198.
 - Sulphuris, II. 696 n.
- Ioduretum Arsenici, Barii et Sulphuris**, II. 696 k.
- Kadmium**, II. 696 k.
- sulphuricum oxydatum, II. 696 k.
- Kali arsenicosi Liquor**, 273.
- Borussicum ferratum, 38.
 - caustic. sicc. in bacillis — K. caust. fus.
 - chloratum, II. 397.
 - hydrocyanicum, 38.
 - — ferratum, 38.
 - hydrothionicum c. Stibio hydrothion. — Sapo stibiat. us.
 - hyperoxymuriaticum, II. 397.
 - — muriaticum, II. 398.
 - — hyperoxygenat., II. 397.
 - nitrosum — Nitrum anti-moniatum.
 - oxalicum acidum, II. 403.
 - purum mite, II. 377.
 - subcarbonic. e Ciner. clavell. e Tart. — Kali carbon. e Cin. et e Tart.
 - Succo Citri neutralisatum, II. 403.
 - sulphuratum stibiat., 235.
 - tartaricum ammoniatum, II. 413.
 - — ferratum — Ferrum potab. Willis.
 - — hydrargyrat. oxydulatum, II. 205.
 - — natronatum, II. 412.
 - — stibiat. oxydatum, 236
- Kalium chloratum**, II. 398.
- Lapis Aetides**, 641.
- Lignum Sassafras**, II. 524.
- Visci, II. 679.
- Limatura Auri**, 298.
- Linimentum causticum**, II. 696 j.
- hydrosulphurat. saponac. Jadelot., II. 376.
 - saponac. opiat., II. 258. 419.
 - saponato-terebinthinatum, II. 631.
 - sulphurico-terebinthinatum s. sulphuricum, II. 696 c.
 - ex Vitello Ovor., II. 696 m.
- Liquor Acetatis triplumbici**, II. 340.
- acetatus Ammonii, 173.
 - Acidi tart., II. 696 c.
 - Ammon. foenic., II. 696 d.
 - ex Ammonia Oleo Succini commixto — Aq. Luciae.
 - Ammonii acetici dilutus = Spir. Mind.
 - — oleosi — Sal vol. oleos.
 - — oxalici, II. 696 l.
 - — spirituosus, 148.
 - anodyn. Fuchsii — Liq. anod. succin., II. 599.
 - — — martialis Klaprothii, 660.
 - — valerianatus, II. 660.
 - antarthriticus Potii, II. 633.
 - Citratis Morphinae, II. 696 m.
 - Cupri ammoniato-muriatici c. Hydrargyro, II. 696 h.
 - hepaticus Mustelae fluviat., II. 696 i.
- Liquor Hydrarg. ammoniato-muriat.**, II. 200.
- — oxydati, II. 195.
 - — — phosphorici, II. 696 l.
 - Iodinae — Solut. Coindetii, II. 10.
 - Kali hydriodici, II. 9.
 - Kali hydriodici iodurati, II. 10.
 - Muriatis zincici, II. 696 p.
 - Natri muriat., II. 695 n.
 - — sulph., II. 696 o.
 - philodont., II. 696 k.
 - pyro-oleos. ex pauco veget. parat., II. 696 n.
 - Salis comm., II. 695 n.
 - Stibii chlorici s. Stib. muriat. oxydul., 235.
 - stypticus Looftii, 654.
 - tartarisatus Morphinae, II. 696 m.
 - — — Zincii muriatici, II. 696 p.
- Lixivium Saponariorum s. kalinum**, II. 370.
- Lotio Hydrargyri nigra**, II. 143.
- Magnesia arsenicalis**, 270
- carbonica gravior s. ponderosior et levior — Magn. carbon.
 - — Muriae, II. 88.
 - Magnesium aceticum, II. 696 k.
 - — hyperoxydatum, II. 98.
 - — muriatic oxydulat., II. 696 k.
 - — oxydat. cinereo-nigrum, II. 98.
 - — sulphuricum oxydulat., II. 696 k.
- Malaguetta** — Maniguetta.
- Marcasita alba Hispanica** — Magist. Bism.
- Massa caustica** — Pulv. arsenical. Rousselotii.
- de Dactylis etc. — Pasta.
 - — mercurialis — Ung. Hydr. citrin.
 - Pilular. Schmidti contra taeniam, II. 696 f.
- Mercurius cinereus Moscati**, II. 142.
- griseus — M. praecip. Saundersi.
 - nitrosus calide paratus, II. 195.
 - — frigore paratus, II. 194.
 - phosphoratus Fuchsii, II. 696 l.
 - — tartarisatus liquidus, II. 205.
 - — terebinthinatus, II. 696 l.
 - — Zincii, II. 696 l.
- Mixtura ammonio-citrica**, II. 696 d.
- As. foet., II. 696 c.
 - Cinchon. offic., II. 696 g.
 - kalino-citrica et natro citrica, 29.
 - — sulphurica et natro-sulph., 29.
 - Myrrh. ferrata, II. 696 i.
 - Nitrat. Potass., II. 696 n.
 - Rogersi, II. 696 c.
- Morphina acetica s. Morphinum acet.**, II. 215.
- — sulphurica, II. 696 l.
- Morsuli stibiato sulphurati**, 222.
- Mucago, f. Mucilago.**
- Mucilago Hydrargyri**, II. 123.
- Mudarii Radix**, II. 696 i.
- Murias ammonicus**, 109.
- — ferratus, 657.
 - — Ferri cum Aqua, 652.
 - — Sodae siccata, II. 696 o.
- Naphtha chlorica et muriatica**
- Spir. muriat. aeth.
 - — Petrae — N. Petrolei.
- Naphtha Zincii — Aether Zincii.**
- Narceina** — Morphina acetica.
- Natri arsenicosi Liquor**, II. 696 a.
- Natron s. Natrum arsenicosum**, II. 695.
- boracic. simpl. s. natronat.
 - — Borax.
 - — causticum — Liq. Natr. caust.
 - chloricum, II. 696 c.
 - hyperoxymuriat. — Natron chloratum.
 - — muriat. hyperoxygenatum — N. chloratum.
 - — phlogiston — Nitrum flammans.
 - — phosphoric. simpl. s. natronatum, II. 532.
 - — potassino-tartaricum, II. 412.
 - — subcarbon. depuratum, II. 578.
 - — — siccum, II. 578.
 - — Succo Citri neutralisatum, II. 696 n.
 - — sulphuric. siccum, II. 583.
- Nitras ammonicus immixto Oxydo hydrargyrico — Hydr. oxydul. nigr.**
- Ammonii, 169.
 - argenticus, 260.
 - hydrargyricus, II. 195.
 - hydrargyrosus, II. 194.
 - quadribismuthicus — Magist. Bism.
- Nitrum ammoniacale — N. flammans**
- Argenti, 260.
 - non fixum — N. flammans.
 - regeneratum — N. flammans.
 - semivolatile — N. flammans.
- Novum antidiysentericum — Ipecacuanha.**
- Nuces Cacao — Cacao.**
- Myrstickae — N. moschatae.
 - — purgantes — Been.
- Oleo-ceratum Aqua subactum — Ceratum Galeni.**
- Oleum Anisi sulphurat. — Bals. Sulph. anis.**
- — Arnicae Florum, II. 696 d.
 - — Aurantii Florum, 526.
 - — Chamomill. citrat., II. 696 e.
 - — infernale — Ol. Ricini Americ.
 - — Jecinoris Lotae, II. 696 i.
 - — Kuori — Ol. betulinum.
 - — Lathyridis — Ol. Catapat. minoris.
 - — Laurocerasi — Ol. Amygd. amar.
 - — Moringae — Ol. Been.
 - — Ocymy — Ol. Basilici.
 - — pyrocarbonicum, II. 695 m.
 - — contra taeniam Chaberti, II. 632.
- Orellana**, II. 297.
- Oxydum Alumii**, 131.
- — Ferri ferrato-boruss. — Ferr. boruss.
 - — ferricum — Ferr. oxydat. rubrum.
 - — Kadmii, II. 696 k.
 - — Stibii album, 213. 235.
 - — — c. Chloreto Stibii — Pulv. Algarothi.
 - — — hydrargyrosus, II. 695 l.
 - — — praecipitando parat., 215.
 - — — c. Sulphureto Stibii — Crocus metallor.

Oxyphosphas Ferri — **Phosphoric.**
 Pastilli de Catechu odorati etc.
 f. Tabellae und Trochisci.
Berthromunetum Ferri, II. 606 c.
Phosphas ferricus simplex, acidulus, ferrosus acidulus et simplex — **Phosphas Ferri** — Hydrarg., II. 606 l.
 — Hydrargyrosus, II. 190.
Filulae Aloës et Cambogiae, 102.
 — C. Brothureto Ferri, II. 606 f.
 — Cambog. et Scammon., 732.
 — coeruleae — P. Cupri ammoniac.
 — Hoffmanni — P. balsamicae.
 — e Hydrarg. muriat. corros., II. 187.
 — mercuriales Barbarossae, II. 606 g.
 — Muriat. Hydr. oxydul. et Oxidi Sulf. hydrosulph., II. 102.
 — Veterinariae, II. 606 e.
Platinum's Platina muriat., II. 337.
Plumbum acetic. oxydatum — Liq. Pl. acet. basici u. Sacch. Sat.
 — oxydulat. acidum — Sacch. Sat.
 — Borussicum, II. 606.
 — oxydulat. carbonic. — Co-russa.
Pomatum s. Unguentum — Cyriilli — Unguent.
 — epispast flav. et mitius — Ungt. episp. mitius.
 — viride — Ungt.
Pothos foetida — **Dracontium** — **Potio antispasmodica**, 76.
 — emetica antimoniat, 220.
 — c. Ipecacuanha, II. 13.
 — ex foetidis — P. antihyst.
 — ex G. Ammon. et Scilla — P. incisiva.
 — c. Hydrobromate Potassii, II. 606 i.
 — ex Ipecac. comp. s. ad per-tussim, II. 15. P. exp.
 — pectoralis, II. 606 n.
Potiuncula Hulmiana, 30.
Ptisana Callaci, II. 522.
 — ex florib. bech. — Tis-pector., II. 97.
 — — Chamaemeli — ut Ptis. ex flor. bech.
 — — Sambuci et Tilliae, f. Infusum.
 — de foliis Cichorii, Boragi-nis, Buglossi, Chamaedryos et Inulae — Infusum et Tis-sana.
 — de fructibus — Tis. de fruct. pect.
 — de Radice Graminis — Deco-ct. Gramin.
Pulpa Colocynthidis — Colo-cynthides.
 — de Plant. emoll. — P. emoll.
 — Ros. canin. — P. Cynovr-hod.
Pulvis atrophorus Vogleri, 28.
 — aloëtic. c. Ferro, 101.
 — c. Guajaco, 104.
 — anticid. Vogleri, II. 606 k.
 — antipodagric. Portlandi, 604.
 — antivener., II. 606 l.
 — Auri — Aurum fulmin.
 — Cambogias. G. Gutta comp. s. hydragogus, II. 22.
 — Comitissae — China.

Pulvis adustifus, II. 606 g. k.
 — niger, 606 e.
 — hypnoides Krollii, II. 138.
 — Jacobi febrifugus — P. Ja-comii.
 — Jalapae et Scammon. com-poa., II. 22. 23.
T. Jesuitarum s. Patrum — China.
 — magnesib. tartaricus, 28.
 — magnesib. tartaricus, 28.
 — Sapo vegetab. — P. gum-mos. atcalim.
 — de Scammon. et Oxydo Sulf. comp. — P. Cornachur.
 — Senna, Scamm. et Lig-nia comp., II. 540.
 — ad strumam, II. 606 g.
 — de Sulphate Potass. comp. — P. temp. Stabilit.
 — Sulphure et Scilla com-p. pos., II. 606.
 — Sulphure et Hydr. ni-gri et Scamm. comp., II. 137.
 — Tribus — P. Cornachi-ni.
 — vermifugus absque Merc., 742.
Pyrothoid, II. 606 a. d.
Quadrastibias kalicus — Antim-onium diaphoret.
Resina Ligni Guajaci artificia-lis — Extr. Guaj. spirit.
Risigallum — Realgar.
Rob Rhamni cathart. — R. Spin-cervin.
Rotulae Calami aromatici, II. 606 i.
Rubinus Antimonii — Magnesia opalina.
Saccharum aluminatum, II. 606 d.
Sal Ammoniacum Cupri — Cuprum ammoniat.
 — Anglicanus volatilis, 160.
 — aperitic. Friedericianum — S. mirab. Glaub.
 — mirab. delapsum, II. 583.
 — Plantar. Tachenii modo parat. — S. Tachenian.
 — Rochellense, II. 412.
 — volat. Vitrioli narcoticum, 26.
Sapo Antimon. resinos. c. Am-mon. Kaempf., II. 606 d.
 — Cacao, II. 414.
 — ceraceus s. ceratus, II. 574.
 — Crotonis, 577.
 — hydrargyratus — S. mer-curialis.
 — medicus s. purissimus, II. 414.
 — Sulphuris — Kali sulphu-rat.
 — superammoniacatus, II. 606 d.
Semichloretum Hydrargyri — Merc. dulcis.
Semiodetum Hydrargyri, II. 188.
Semina ex Umbellif. s. carminat. — Pulv. carmin.
Serapinum s. Serapium — Sa-gapenum.
Sericum epispast. Guilberti, 400.
Sesquisulphuretum Stibii — An-tim. crud. praep.
Solutio antispasmodica, II. 606 f.
 — arsenicatis kalina, 273.
 — — natrosa, II. 600.
 — As. foet., II. 606 e.
 — atrophica, II. 606 i.
 — ad balneum salino-gela-tin., 687.
 — Chloruret. Calcis alcoho-lia, II. 606 f.
 — Jodinae, II. 9.

Solutio Mercur. calida parati — Liq. Bektetii, II. 606 c.
 — styptica, II. 606 c.
Species ad tussim — Sp. bechi-cae.
Specificum antipodagric. Emeri-gonis — Trinct. Guajaci c. Taffia.
Spiritus acetico-feratus, 660.
 — carminat. de tribus, II. 606 c.
 — chlorico-aethereus, 70.
 — e faesibus Vini — Sp. Vini-muriatico-oleosus, 70.
 — ad paralysis, II. 606 m.
 — saponatus comp., II. 634.
 — Serenium Golofici amm-oniatus, II. 606 h.
 — Succr. Sacchari — Taffia.
 — sulphuratus Beguini, 172.
 — sulphurico-acida — Mixt. sulphurico-acida.
 — — aethereus muriatico-ferat., 655.
 — Vini alcoholisatissimus — Alcohol. absolut.
 — volat. aromatico-oleosus? — Stibium calcareo-phosphorat. — Rulv. Jacobi febrifug.
 — hydrothionis oxydat.
 — Sulphur stibiatum rubrum.
 — oxydat. alb. kalisatum — St. oxydat. album.
Strychnium — Strychninum.
Suboxyphosphas Ferri — Ferr. phosphoric.
Succus Chermes, 430.
 — Liquirit. merc., II. 606 l.
 — Uvarum immaturarum — Omphacium.
Suffumigatio Guytoniana und **Smithiana** — Fumigatio.
Sulphas Alum. et Potass. puzus, 134.
 — Ammonii, 169.
 — Hydrarg. peroxydati, II. 191.
 — kadmicus G. Aqua, II. 606 k.
 — Radmii, II. 606 k.
 — manganosus C. Aqua, II. 606 l.
Sulphur aurat. Antim. saponat., 232.
 — iodatum, II. 606 o.
Sulphuretum Stibii c. Sulphate Calcii — Calcaria sulphura-to stibiat.
 — — — Kalii — Kali sulphuratum stibiat.
Syrupus de Adianto Canad. — S. Capill. Ven.
 — Cichorii c. Rheo, II. 453.
 — Citrat. acid. Chinini, II. 606 n.
 — hydrocyanicus — S. cyani-cus.
 — de Kinakina etc. — Syr. Chinae etc.
 — de Omphacio — S. Uvar.
Tabellae de Acido Tart., 159.
 — de Concrement. s. Lapid. Cancror., 360.
 — — Ipecacuanha, II. 13.
 — — Kinckina — T. Chinae.
Tartarus hydrargyratus, II. 205.
 — vitriolat. acidus — Kali sulph. acidum.
Tartarus Hydrargyri, II. 205.
 — hydrargyrosus, II. 205.
Terra aluminaris, 131.
 — muriatica — Magnesia car-bonica.
Tinctura Acetabis ferrosi, 660.
 — Ammoniaci, 720.
 — Antimonii Thedenii — Liq. Kali acet. spirit.

- Tinctura antispast. Lentini —
 Tinct. Valerian. aeth.
 — Aurantior. comp. — Elix.
 Aurant. comp.
 Liq. Kali acetici spirit.
 — Copaivae, 304.
 — Cupri volatilis, 590.
 — Ferri acetici oxydul., 660.
 — — muriat. aetherea, 655.
 — — vinosa — Vinum mar-
 tium
 — Klaprothii, 655.
 — Ligni Guajaci — T. Gua-
 jaci.
 — — — 711. 712.
 — Martis Edinburgensium,
 654.
 — Moschi, 11. 696 l.
 — Rhei purgans Edinburgen-
 sium, 113.
 — sacra Edinburgensium, 113.
 — Saponis stibiati — T. An-
 tim. Jacobi.
 — saturnina Gramanni, 11.
 352.
 — Seminum Colchici, 11. 696 b.
 — cum Sodae Carbonate —
 Elix. Peyrilhe.
- Tinctura Stramonii ammo-
 niata, 11. 696 b.
 — Succii volatilis — Spir.
 Sal. Amm. succinat.
 — Sulphuris volat. Hoffm —
 Liq. fum. Boylei.
 — Veneris volatilis, 590.
 — Vitrioli Ludovici — T.
 Ferri tartarici.
 Trisulphuretum Kali c. Sul-
 phate kalico — Kali sulphu-
 rat.
 Trochisci Chlorureti Calcis. 11.
 696 f.
 Turbith mineral. — Turpethum
 m.
 Turpethum mercuriale — T. mi-
 nerale.
 Unguentum c. Bromo, 11. 696 f.
 — cineritium, 11. 128.
 — Hydrarg. coeruleum, 11. 128.
 — — griseum, 11. 128.
 — — terebinthinat., 11. 130.
 — c. Hydriodate Potass. io-
 dureto, 696 f.
 — c. Hydrobromate Potass.
 bromur., 11. 696 f.
 — Jaceae, 11. 696 f.
- Unguentum Jodeti Kali, 11. 9.
 — mercuriale comp. — Ung.
 Hydr. terebinth.
 — — Cyrilli, 11. 181.
 — Mercurii nitrati — Ung.
 Hydr. citrinum.
 — — — praecip. albi, 11. 202.
 — — — rubri, 11. 148.
 — de Mucaginis. — Emplastr.
 — ex Ol. volatilib. etc. —
 Bals. nervin.
 — ex Ovor. Vitell. — Digest.
 simpl.
 — saponato - hydrosulphura-
 tum, 11. 376.
 — ad scabiem Werlhofii s.
 Zelleri, 11. 202.
 — sulphurat alcalin., 11. 376.
 — terebinthinat comp., 11. 621.
 Vesicans Anglic. — Empl. vesic.
 Angl.
 Vinum de Kinakina — V. Chi-
 nae.
 Zincum Borussicum s. zooticum,
 unctio cyanicum, 11. 691.
 — hydriodic. oxydatum, 11.
 696 p.

