

TROMBOZA ARTEREI HEPATICE ÎN UNELE NEOPLASME GASTRICE ȘI PANCREATICE CU ADENOPATII ALE TRUNCHIULUI CELIAC

S.Bancu, T.Bara, M.Coroi, D.Marian, E.V.Bancu

Clinica de Chirurgie nr.1
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În unele neoplasme gastrice și pancreatiche, cu adenopatii în jurul trunchiului celiac și pe trajectul arterei hepatici comune, poate surveni o trombozare a arterei hepatici în porțiunea ei inițială. În aceste condiții ficatul mai primește sânge arterial doar prin artera gastroduodenală. Dacă în cursul operațiilor de exereze se va ligatura sau se va secționa artera gastroduodenală, va urma o ischemie arterială hepatică, cu riscul necrozei de ficat.

Lucrarea noastră consemnează 5 astemene cazuri, în care obstrucția arterei hepatici a fost o surpriză intraoperatorie. În primele două cazuri acesti fapti a fost descoperit doar la autopsie, în urma decesului a doi bolnavi operați cu duodeno-pancreatectomie cefalică, prin necroza hepatică. La următorii trei bolnavi tromboza arterei hepatici a fost surprinsă intraoperator, prin dispariția pulsului arterial în hil, necesitând protezare sau reimplantare în aorta arterei hepatici.

Concluzia lucrării este că verificarea permeabilității arterei hepatici înainte de secționarea arterei gastroduodenale este obligatorie în cursul ablărilor pentru neoplasme din această zonă de vascularizație. O arteriografie de trunchi celiac ar fi binevenită în acest sens.