

AGLOMERAREA NEOPLAZICĂ LA BOLNAVII CU HEMOPATII MALIGNE

Smaranda Demian, G.Oltean, C.Dudea

Clinica Medicală nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În literatura de specialitate este relatată prezența cu frecvență crescută a afecțiunilor neoplazice la persoane înrudite sau având un mod de viață asemănător.

Lucrarea și-a propus studiul aglomerării neoplazice la bolnavii cu hemopatii maligne, luând în studiu un număr de 89 de pacienți. Cele mai frecvente afecțiuni întâlnite au fost: leucemii acute și cronice, limfoamele maligne și mielomul multiplu. La 36 de bolnavi (40,44%) a fost constatătă existența aglomerării neoplazice în studiul a 2-3 generații, utilizând arborele genealogic. Incidența cea mai mare a fost constatătă la bolnavii cu boala Hodgkin (35,7%), limfom malign nonhodgkinian (43,7%), leucemie limfatică cronică (38,1%). În 11 (30,55%) din cele 36 de cazuri este vorba despre neoplazii hematologice, iar în celelalte cazuri (2 de boala Hodgkin și 1 caz de leucemie limfatică cronică) aceeași boală a fost întâlnită la 2 frați, respectiv la părinți și copii.

Studiul efectuat constituie un argument pentru considerarea că nefiziabiloare a aglomerării neoplazice la bolnavii cu hemopatii maligne, fapt explicat prin transmiterea predispoziției la boala în condiții similare de viață și de condiționare genetică.