

# HEPATITA VIRALĂ ACUTĂ AGHBs POZITIVĂ ÎN ZONA REGHIN

Cristina Golea\*, Monica Sabău\*, Monica Dărăld\*, Simona Stoica\*  
Aurelia Cojan\*\*, E. Szilcs\*\*, R. Czékula\*\*\*

\* Disciplina de epidemiologie

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

\*\* Centrul de Medicină Preventivă, Târgu-Mureș

\*\*\* Spitalul Ortopedie Rechin, Secția de bolbă mărcioase

Cu toate că hepatita virală B este universal răspândită, incidența ei are larg variații teritoriale, fiind direct condiționată de circulația virusului hepatitei B într-un anumit areal și întreținută endemic de numărul purtătorilor cronici de AGHBs.

În aprecierea ponderii hepatitei acute B din arealul Rechin, am testat prin tehnică ELISA 187 seruri provenite de la pacienți cu semne de suferință hepatică acută.

Cu toate că proporția hepatitei acute cu evidențe serice de AgHBs a fost de 31,5%, ponderea hepatitei acute B reale, în opinia noastră este însă mai mică. Portajul asimptomatic de AgHBs fiind destul de mare în arealul luat în studiu, este posibil ca o parte a bolnavilor studiați să fie purtători cronici de AgHBs la care se suprapune o infecție acută cu un alt virus hepatic.

Curba de morbiditate AgHBs pozitive corelată cu vîrstă pacienților a fost relativ constantă. Pondere ridicată (29%) a hepatitei acute cu AgHBs din prima decadă de viață se explică între altele și prin posibilitățile multiple de transmitere orizontală existente în familie și în colectivitățile de copii. Ambele sexe au fost în măsură egală afectate, neexistând o diferență statistic semnificativă între ponderea hepatitei AgHBs pozitive la bărbați și femei și nici între frecvența ei în mediul urban și rural.