

STUDIU CLINICO-MORFOLOGIC AL GASTRITEI CU HELICOBACTER PYLORI

*Ligia Bancu, Simona Băluagă, Ilona Csíkay, Ana Bratu, C. Dudea,
Ana Maria Stauder*

Clinica Medicală nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Congresul Internațional de Gastroenterologie de la Sydney, din 1991, a elaborat un nou sistem de clasificare al gastritelor în care un loc distinct îl ocupă gastrita cu Helicobacter pylori.

Am introdus în acest studiu un lot de 52 de bolnavi, care s-au supus endoscopiei digestive superioare pentru simptome de tip ulceros. Endoscopia a

infirmitate prezenta năștei ulceroase la toți acești pacienți, relevând în schimb modificări ale mucoasei antrale. Endoscopic am găsit mucoasa antrală hiperemică, eritematoasă uneori cu fine exudății. Din fragmentele endobioptrice s-a pus diagnosticul infecției cu Helicobacter pylori la 34 bolnavi, reprezentând 65,74%.

Am obținut ameliorarea subiectivă evidentă la pacienții care au fost tratați cu terapie anubacteriană asociată. În concluzie, gastritele cronice cu sindrom non ulceros dispeptic, pot fi abordate terapeutic cu rezultate bune, urmărind endoscopic eradicarea infecției și modificările la nivelul mucoasei gastrice.