

INFECȚIA CU HELICOBACTER PYLORI LA BOLNAVII CU ULCER DUODENAL

*Ligia Bancu, Ioana Crăidey, Simona Bățaga, Ana Bratu, Corina Ureche,
Adriana Stănean, C. Dudea*

*Clinica Medicații nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș*

Helicobacter pylori, bacterie gram-negativă descrisă de Warren și Marshall în 1983, are largi implicații în patologia tubului digestiv și constituie mobilul multor cercetări științifice în gastroenterologia modernă.

Diagnosticul infecției cu Helicobacter pylori se practică în serviciul de endoscopie digestivă al Clinicii Medicale nr. 1 din septembrie 1992. Am folosit o metodă rapidă de diagnostic calitativ bazată pe capacitatea germenului de a secreta ureaza; am introdus fragmentele de endobiopsie antrală într-o soluție conținând uree și un indicator de pH, care în prezența H. pylori își modifică culoarea. În paralel, am folosit diagnosticul histopatologic, cu ajutorul colorației Giemsa. Din 24 pacienți cu ulcer duodenal diagnosticat endoscopic, 20 dintre ei prezintau concomitent infecția cu Helicobacter pylori, reprezentând 83,33%.

Ne aflăm la începutul unor cercetări pe care le dorim extensive, cu urmărire în timp a efectului eradicării infecției asupra ratei de reactivare a ulcerului.