

PARTICULARITĂȚI CLINICE ALE COLAGENOZELOR LA BĂRBAȚI

Lia Georgescu, Anca Cozoș, O. Bodea

Clinica de Bolealologie și Reumatologie
Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș



Reumatismele inflamatorii și colagenozele prezintă frecvent un debut și o evoluție atipică la sexul masculin, studiind cauzistica reumatologică la bolnavii bărbați de la clinica noastră între anii 1990-1993 se desprind următoarele aspecte clinice: poliartrita reumatoïdă debutează la membrele inferioare, nu respectă simetria, iar aspectul de debut este mai degrabă algodistrofic decât eruditiv. Deformitățile apar mult mai târziu, iar vasculita reumatoïdă este o raritate.

Sclerodermia la bărbați nu apare ca o afecțiune de sine stătătoare, ea însoțește ciroza biliară sau carcinomul broncoalveolar.

Panarterita nodosă (Boala Kussmaul-Mayer) afectează predilectiv sexul masculin, debutând ca o polinevriuș senzitivă simetrică care ulterior dezvoltă un sindrom subfebril-febril, modificări ale fundului de ochi și uneori infarci miocardici fără dureri semnificative. Față de boala PAN, răspunsul terapeutic favorabil este deosebit de prompt la bărbați.

L.E.D. a fost decelat doar la 2 cazuri, fiind vorba de sindroame lipoide inducute verosimil medicamentelor de xilina respectiv fenitoian. Evoluția acestor cazuri de lupus induc a fost favorabilă după sistarea medicației inducătoare.

Colagenozele la bărbați impun investigații laborioase privind:

- 1) o eventuală asociere a unei neoplazii (la SA, PR)
- 2) o posibilă medicație inducătoare
- 3) hepatita virală B în antecedentele bolnavilor cu panarterită nodosă.