

STAREA DE SĂNĂTATE PARODONTALĂ A ADOLESCENȚILOR APRECIATĂ PRIN INDICELE CPITN

A. Monea, Șt.Bocskay, Monica Monea, Ileana Roman, O. Manolache,
M. Pop, stud. Delia Barb anul V.

Disciplina de odontologie și parodontologie

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Scopul acestei investigații a constat în aprecierea stării de sănătate parodontală la o colectivitate de adolescenți, cu ajutorul indicelui CPITN / Indicele parodontal al nevoilor de tratament pentru colectivitate/.

Acest indice, conceput în 1977 și recunoscut de FDI și OMS, permite o nouă orientare calitativă în ceea ce privește prevenirea și combaterea bolii parodontale.

Datele preliminare ne relevă că din cei 50 subiecți examinați gingivita cu sau fără prezența tantrului dentar /CPITN scor = 2/, a reprezentat forma de afectare parodontală întâlnită la 26% din cazuri.

**Prezența pungerilor parodontale de 3-4 sau CPTN scor = 3 sau evidență în
2% din eșantionul examinat**



Suprimarea semnelor de inflamație din parodontul de invetig se poate realiza prin implementarea unor măsuri de profilaxie parodontală primară, ce vizează combaterea acumulării de plăci dentare microbiano și de tartar cu acetizarea de rădăcină ("scaling și root planning").