

ABSCEES RECE

LA

Partea supero-internă a tendonului
lui Achile, vindecat cu injecțiile
modificatrice CALLOT

DE

Dr. AL. BOLINTINEANU

Docent al Facultății de Medicină din București.

PARTEA RECE CALLOT - STINTA ȘI TEHNOLAGIE - TÂRCU





* 4 4 0 0 0 3 7 9 6 *

Biblioteca UMFST

18

ABSCES RECE

LA

Partea supero-Internă a tendonului
lui Achille, vindecat cu injecțiile
modificatrice CALLOT


DE

Dr. AL. BOLINTINEANU

Docent al Facultății de Medicină din București.



30 AUG 1973





Absces Rece, la partea internă a tendonului lui Achille stâng, vindecat prin injecțiile modificatrice ale lui Callot

În luna Iunie 1906, vine la Consultațiile Spitalului de Copii, fetița *Marioara I.*, în etate de 11 ani, născută în Comuna Mircești, Jud. Dâmbovița, domiciliată în București, Str. Gr. Pleșoianu 7, care suferea de:

Absces rece, la partea internă a tendonului lui Achille stâng, puțin mai jos de articulația Tibio-tarsiană.

Ea a urmat mai multă vreme, Consultațiile chirurgicale de la Spital, unde i s'a recomandat repaos, și i s'a dat ca tratament la interior: Soluțiune Coirre, Sirop Iodo-tanic, etc., etc.

În fine, pe la 11 August acelaș an, prietenul meu D-rul *N. Donescu*, o trimise la mine (acasă), cu insistenta rugăciune, de a mă ocupa în de aproape de această bolnavă, care cu greu se mai putea servi acum de piciorul său.

Asupra antecedentelor ei ereditare și colaterale, menționez numai că: Tatăl său,—de profesiune muncitor cu mâinile, a fost și e pe deplin sănătos; că mama sa, suferă dese ori de dureri de cap; și că are un frate și trei surori, complet sănătoși.

Ca antecedente personale, ne spune că a fost sănătoasă până în ziua de 8 Septembrie 1905, când făcând un pas greșit, și-a scrântit (?) încheietura glesnei stângi, așa că n'a mai putut din acea zi să puie piciorul în pământ.

De și un om care pricepea asemenea lucruri (?!), i-ar fi îndreptat piciorul (?!), totuși bolnava nu se mai putu de atunci, servi bine de el.

S'a mai căutat în urmă cu numeroase babe, până ce, văzând după câteva luni, că nu se mai vindecă, și că începe să-i apară la partea de dinăuntru a încheieturei o umflătură, veni la consultațiile chirurgicale de la Spitalul de Copii.

Bolnava prezentă:

La partea internă a tendonului lui Achille din partea stângă, o tumoră de mărimea unei portocale mijlocii, cu

pielea de deasupra de culoare normală, nedureroasă la presiune, și cu fluctuație manifestă.

Incheietura Tibio-Tarsienă liberă, dar cu mișcările limitate în parte, din cauza durerilor ce se nășteau prin tensiunea ce se crea tumorei.

Ganglionii din vintre, foarte puțin măriți de volum; cei din alte regiuni, normali.

Nimic din partea celorlalte organe.

Starea generală bună.

Tumoarea creșu mereu, până ce ajunse la dimensiunile de azi, când bolnava începând să aibă dureri la fiecare mișcare pe care o făcea, se decide din nou a se arăta la medic.

Când mi s'a prezentat mie, am luat deciziunea a-i face injecțiile modificatrice ale lui *Callo*.

I-am făcut la fiecare 3—4 zile o injecție cu câte 1 ctm. c. de Eter iodoformat, după ce mai întâi îi scoteam cu siringa, atât puroi pe cât îmi era cu putință (5—15 ctm. c.).

Plaga acului o astupam totdeauna cu Colodiu.

Tensiunea ce urma după astuparea plăgei, aducea copilei mai totdeauna dureri mari, dureri cari însă încetau după 5—15 minute, așa că, nu căutam nici odată a micșora tensiunea ce dobânda tumora, făcând puncție cu acul siringei, — după procedeu d-lui Profesor *dr. Romnicianu*, — pentru că, pe de o parte copila suporta acest timp scurt durerile (5—15 minute); iar pe altă parte, temându-mă că, micșorând tensiunea, efectul terapeutic să nu mai fie cel așteptat.

În a 7-a săptămână, copila fu cu totul vindecată, vindecare care se menține și azi în cea mai perfectă stare, putându-se servi de piciorul său, ca și înainte de aparițiunea boalei.

12 August 1907. Împreună cu d. *Dr. N. Nestor* îi facem Oftalmo-reacțiunea, care e pozitivă după 8 ore.

După 22 ore, copila e revăzută de *d-rul Nestor*, care îmi afirmă că, Oftalmo-reacțiunea e foarte intensă.

* * *

Sunt 6 ani de când am început să urmăresc cu încredere la Spitalul de Copii, sub direcțiunea d-lui Profesor *Dr. Romnicianu*, acest tratament, și mărturisesc că de multe ori, am avut succese care m'au încurajat mult.

Tratamentul acesta însă, cerând și el mult timp de aplicare, iar pe de altă parte, fiind și ceva dureros din cauza înțepăturilor acului, și a tensiunii ce o face Eterul iodoformat, cea mai mare parte din bolnavi, nu au răbdarea trebuincioasă.

Încercam la început a face această operație sub anestezie generală, dar făcând socoteala că un bolnav se vindecă în 6—8 săptămâni în termen mediu, și că trebuie a-i face 2 injecții pe săptămână, urma că, pentru a ajunge la vindecarea lui, trebuia adormit cel puțin de 12—16 ori.

Aceasta m'a făcut să renunț la anestezia generală în cele mai multe cazuri, precum și în cazul copilei de azi.

Condițiunile principale ce se cer pentru acest tratament, cred că sunt :

O asepsie perfectă, și precauțiunea ca, acul să fie în condițiunile cerute, spre a nu lăsa o plagă cu un orificiu prea mare, așa în cât să riscăm a rămâne deschis, și eu putința de a se infecta.

Am avut ocazia să văd în serviciul d-lui profesor *Dr. Romnicianu*, și să practic ~~eu~~ singur, numeroase feluri de tratamente pentru Abscese reci, dar așa înclina mai mult către cel ce am întrebuințat în cazul copilei *Marioara I.*, cerând un timp mult mai scurt ca celelalte tratamente, neapunând plăgile la infecții secundare, și mai ales conducându-ne sigur, la vindecare.

Neîndoios, tratamentul general își are locul său consacrat, și legat de oricare tratament operator.

1907, Septembrie.

