

# **PREVENIREA OSIFICĂRII HETEROTOPICE ÎN ARTROPLASTIILE DE ȘOLD, PRIN ADMINISTRARE DE ANTIFLOGISTICE NESTEROÏDE**

**L. Seres-Szurm\*, C. Ciugudean\*\*, A. Bălini\*\*, O. Nagy\*\*,  
Ilieana Slavici-László\*\*, M. Stoica\*\***

\*Disciplina de anatomię, \*\*Clinica de Ortopedie și Traumatologie  
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Incidența osificării ectopice pericoarticulare după artroplastia de șold este relativ ridicată (30%), existând o predispoziție crescută în coxartrozele bilaterale, cele osteofitice, în spondiloza anchilozantă, displazia congenitală a șoldului etc. Complicația determină o artroplastie simptomatică cu diminuarea cotației funcționale a șoldului, a mișcărilor de flexie și abducție.

Pentru prevenirea acestei complicații, am utilizat un tratament antiflogistic nesteroid din ziua operației, timp de trei săptămâni postoperator, după următoarea schemă: În prima săptămână aspirina, zilnic 1000 mg, în a doua și a treia săptămână indometacin sau diclofenac 100-150 mg/zi, în 2-3 doze.

Dintr-un număr de 370 operați care au beneficiat de această medicație, la controalele clinice și radiologice, efectuate la 3, 6, 12 luni s-au prezentat 314 bolnavi (204 femei și 110 bărbați). Osificări heterotopice minime au apărut la 27 operați (8,5%), toate fiind asimptomatice.

Considerăm eficientă profilaxia antiflogistică nesteroidă timpurie în prevenirea osificării ectopice după artroplastii, drogurile utilizate diminuă răspunsul inflamator caracteristic fazei inițiale de osteoformare ectopică, descresc concentrația prostaglandinelor osteoactive și inhibă diferențierea celulelor osteogenetice.