

# ÎNCHIDEREA PLĂGII DUPĂ AMIGDALECTOMIE

Gh. Măfay, S. Sabău

Clinica O.R.L.

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Amigdalectomia, una dintre cele mai frecvente intervenții chirurgicale determină apariția în lojele amigdalene a două plăgi deschise de aproximativ 3/3 cm, care generează o serie de inconveniente și complicații: hemoragii, invazie microbiană masivă a organismului prin plaga denudată, durere și halenă fetidă. Problema închiderii plăgii după amigdalectomie rămâne în actualitate datorită deficiențelor metodelor folosite, închiderea prin sutură nefiind posibilă din cauza țesutului muscular foarte mobil care elimină sutura în câteva ore.

Autorii prezintă experiența clinicii în acest domeniu. După numeroase încercări am introdus badijonarea plăgii cu acid tanic 30% care acționează ca hemostatic și astringent al vaselor și țesuturilor, formând și un strat fin de cheag.

Ulterior am introdus utilizarea soluției de perclorură de fier 30% care are un efect mai energetic și produce o coagulare superficială a sângelui și a lichidelor tisulare formând o peliculă subțire de cheag protector.

Folosirea acestor metode previne în mare măsură hemoragiile postoperatorii și invazia microbiană, reduce durerea și halena fetidă, scurtând timpul de vindecare.

---