

TRATAMENTUL CLINIC ȘI AMBULATOR AL PSORIAZISULUI

O. Bujia, S. Morariu

Clinica de Dermatovenerologie
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Sintetizând tratamentele aplicate la un număr de 109 cazuri de psoriasis din care (P. vulgar 47, P. diseminat 30, P. eritrodermie 12, P. artropatic S. B. palmoplantar 8, P. gutat 4) am obținut următoarele concluzii terapeutice ce impun ordinea importanței:

1. Tratamentul focarelor de infecție:

T. general: amigdalectomia, penicilinoterapie, endotoxină bacilară, Vit. A,

Vit. C;

2. Tratamentul keratolitic (decapant)

T.local; acid salicilic 3-5%, acid benzoic 5-5%, uree 3-5%, magnezia usta 5%;

3. T. Fotosensibilizant:

T. local: eozină 2%, mercurocrom 2%, fuxină 2-5%, cristal violet 1%, alb metil 1%, ultraviolete, sol.meladinină faible. Sulfură de seleniu 2%,

T. general: psoralen, metoxalen, trisoralen, neosoralen, trimetil-psoralen, psoriazin (inhibă sinteza A.D.N. și a diviziunii celulare) vit.D2;

4. T.antiinflamator

T. local: oleu cadini 5-10%, pix liguida 5-10%, oleu rusci 10-20%, crisarobină, 0.25-3%, diatranol (obținut din crisarobină, cu succidaancele sale: antranol 5%, cignolină 0,25-1%). Tumenol 5-10%, tigenol 2-5%, ihtiol 5-110%, lig. carbonicus detergens, colatar (pix lithantracis 1-3%).

T. general:cortizon.

5. T. antiproliferativ

T.general: Vit.D3, Liq.Fowler, ciclosporină 26 mg+Eritromicină (sau Doxiclină, Calcitriol, Vit. B12, Vit. A.

6. T. antimicotic

T. general: Eretinat (Tigascon) modelcază genele din epiderm.

T. local: Metotrexat, Carvolizină

7. T. sebopsoriazisului

T. local: pp.alb, alb, galben, cenușiu, Hg, calomel, glicerolat de sulf.

T. general: Vit. B6, Vit. F.

8. T. ce stimulează sinteza atretinalului:

T. general: Vit. E, Vit. B12, metionină, ulcostop, cistină, cisteină, folcisteină, acid folic.