

VALOAREA SIMPTOMATOLOGIEI ȘI A MODIFICĂRILOR ENDOSCOPICE ÎN DIAGNOSTICUL GASTROESOFAGIAN

Simona Bățaș, G. Oltean, Ligia Bancu, Ana Bratu, Ilona Csídey,
Corina Ureche, C. Duda

Clinica Medicală nr. 1
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Incidența refluxului gastro-esofagian este crescută în patologia medicală și ocupă primele locuri între acuzele bolnavilor digestivi.

Studiul efectuat de autori pe perioada ultimilor doi ani pe un număr de 1109 de bolnavi a cercetat incidența și cauzele refluxului gastroesofagian, precum și corelația acestuia cu manifestările clinice și aspectele endoscopice. S-a ajuns la următoarele concluzii:

1. Refluxul gastroesofagian a fost depistat la un număr de 135 cazuri examinate endoscopic.

2. Cele mai frecvente manifestări clinice sunt reprezentate de: pirozis 56%, dureri epigastrice 93%, dureri retrosternale 43%, sindrom dispeptic (grețuri, vărsături, meteorism, regurgitații) 34%.

3. Cele mai frecvente cauze ale refluxului gastroesofagian sunt: ulcerul duodenal activ 26,66%, ulcerul duodenal asociat cu gastrită 19,76%, hernia hiatală, ulcerul gastric, altele.

4. Aspectele endoscopice se corelează cu simptomatologia existând leziuni de esofagită gr. I 88,8%, esofagită gr. II 7% și esofagită gr. III 4,2% din cazuri.