

IMPACTUL UNUI CITOSCREENING SISTEMATIC ASUPRA DEPISTĂRII PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

C. Rădulescu, O. Corbeanu, M. Gliga

Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr.2
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

În intervalul 1 I 1963 - 31 XII 1992 au fost internate în Clinica de Ginecologie nr. 2 un număr de 948 bolnave cu cancer de col uterin în toate stadiile (0- IV). Intervalul studiat a fost împărțit în 3 perioade de 10 ani. În prima perioadă (1963 - 1972) în care s-a făcut un screening sistematic prin examen citotumoral, incidența formelor preclinice de cancer (st. 0 - IA) a fost de 2,35%, a formelor curabile (st. IB - II) de 56,05% și a stadiilor avansate (III - IV) de 42%.

În perioada următoare (1973 - 1982) în care s-a efectuat un citoscreening sistematic la 3 ani, la aproape toate femeile cu risc din municipiul Tg.-Mureș și parțial

din județ, incidența formelor preclinice depistate și tratate a fost de 36,01%, a formelor curabile de 36,65% și a formelor avansate de 27,33%.

În a treia perioadă (1983-1992) în care examinările citotumorale de masă s-au efectuat mai puțin regulat și sistematic, mai ales în ultimii 3 ani, incidența formelor preclinice a fost de 24,04%, a formelor curabile de 56,66% și a formelor avansate de 26,76%.

Studiul nostru demonstrează importanța citoscreeningului în depistarea precoce a NIC, cancerului invaziv incipient și macrocarcinoamelor curabile.
