

PEDIATRIE

PROBLEME ACTUALE PRIVIND HEPATITELE A, B, C, D, E ȘI HEPATITELE CAUZATE DE ALTE VIRUSURI

Z. Pap, E. Vass, L. Barabás, Minodora Nistor

Clinica de Pediatrie nr.2
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș

Hepatitele acute și cronice sunt cauzate de diferite virusuri conform cărora distingem hepatita A, B, C, D, E și hepatitele cauzate de alți virusuri (mononucleoza infecțioasă, varicela, herpes zoster, HIV etc).

Hepatita A este cauzată de virusul tip A, ca mod de contaminare orală cu o incubatie de 15-45 de zile. Virusul nu este hepatotoxic dar boala este foarte răspândită, pe globul pământesc fiind cca 500 milioane de bolnavi. Hepatita B este destul de răspândită în lume, în Europa cca 2-4% a populației suferă de această boală, iar pe tot globul pământesc numărul bolnavilor atinge 200 milioane de bolnavi. Incubația variază între 42-140 zile. Cronicizarea hepatitei B are o frecvență de 8-10%. Din acest motiv pe plan mondial a fost acceptată vaccinarea antihepatitei B la vârsta de 1 an. La noi conform Schemei Programului Național de Vaccinare vom aplica în viitorul apropiat acest vaccin. Hepatitele de tip C, D, E au o mortalitate destul de mare cu o evoluție cronică. Mai amintim hepatitele cauzate de alte tipuri de virusuri, de ex. varicela, herpes zoster, HIV, citomegalia, ecovirusul, mononucleoza infecțioasă, care poate să provoace pe lângă hepatită și micropoliadenopatii cu transaminaza crescută și monocitoză ridicată.

Prevenirea acestei hepatite este obiectivul major prin respectarea igienei corporale, alimentării și vaccinarea preventivă în vederea scăderii posibilității de cronicizare sau apariția cirozei sau carcinomului hepatocelular.