

EFICACITATEA CECLOR-ULUI ADMINISTRAT ÎN CLINICĂ ȘI AMBULATOR

Z. Pap, Doina Drașoveanu, Julieta Dunca, Adrienne Horváth

**Clinica de Pediatrie nr.2
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș**

CECLOR-ul este o cefalosporină din generația a II-a a cefalosporinelor din care am primit în 1993 pentru utilizare 40 flacoane. În aprilie 1990 am sosit prin

Asociația de Binefacere "Primăvara" din Marseille 130 flacoane de Alfatil care este identic cu Ceflor-ul, pe care l-am utilizat în clinică și policlinică.

Cefalosporinele sunt împărțite în 3 grupe, numite și generații și anume:

I. Cefalexin (Pyassan, Oracef)

II. Cefuroxim (Zinacef), Cefaclor (Ceflor)

III. Cefotizid (Fortum, Claforan)

Cefalosporinele ca și penicilinele inhibă prin aderență formarea membranelor celulare a microbilor. Cefalosporinele din generația I acționează cel mai mult asupra Stafilococilor, iar cele din generația a II și a III asupra germenilor gramnegativi. Cefalosporinele sunt rezistente față de lactamază, produsă de stafilococ sau de microbi gramnegativi.

În timpul tratamentului nu am constatat efecte secundare, ca alergie, leucopenie, diaree etc. Observațiile noastre sunt prezentate în câteva diapozitive.
