

# STRATEGIA DIAGNOSTICULUI PRECOCE AL CANCERULUI RECTOSIGMOIDIAN

*Diana Pop Petre, Tereza Crăciun Mureșan, Rodica Rediș, D.Brata*

Clinica Medicală nr.2  
U.M.F. Târgu-Mureș

În ciuda numeroaselor progrese înregistrate în ultimele decenii, diagnosticul precoce al cancerului rectosigmoidian rămâne deficitar, răspunzător de temporizarea actului operator.

Strategia adoptată în prezent, devenind un standard operațional este supravegherea bolnavilor cu risc.

Scopul lucrării a fost de a evalua aplicarea acestei strategii în diagnosticul precoce al cancerului rectosigmoidian.

Pe o perioadă de 5 ani (1990-1994) un număr de 193 bolnavi (80 bărbați - 41,45% și 113 femei - 58,54%), cu vârsta medie de 51,21 ani au fost supuși tușeului rectal și examenului rectoscopic, precum și efectuarea reacției Gregerssen.

Din acești bolnavi 102 (58,84%) au fost incluși în lot pe baza datelor clinice sugestive (hemoragie digestivă inferioară, tulburări ale tranzitului intestinal), iar 91 (47,15%) au prezentat doar o reacție Gregerssen pozitivă.

Ritmul investigațiilor a fost de 3-6-12 luni la bolnavii cu risc înalt și de 1-2 ani dacă riscul a fost redus.

În caz de negativitate a endoscopiei inferioare s-a practicat irigoscopia cu dublu contrast și irigografia, iar suspiciunea unei localizări colonice a dus la efectuarea colonoscopiei.

Tușeul rectal a permis depistarea cancerului rectosigmoidian doar la 2 (1,03%) dintre bolnavii simptomatici examinați, iar efectuarea rectoscopiei cu biopsie și examen histopatologic a ridicat numărul de bolnavi la 10 (5,18%).

În concluzie, strategia modernă de diagnostic al cancerului rectosigmoidian este o strategie activă, bazată pe examinarea clinică și endoscopică a unor grupe populaționale cu risc crescut.

Diagnosticul precoce este un diagnostic de "vigilență oncologică", ce trece de la suspiciune la investigație și dispensarizare.

Examenul clinic minuțios, coroborat cu reacția Gregerssen și tușeul rectal rămân metodele de elecție în selecționarea bolnavilor pentru examinarea endoscopică inferioară în vederea tratamentului chirurgical în timp util.