

Dr. Bokai Árpád

Denygyujtemeny

Étodik bővített kiadás



BUDAPEST SINGER & ZWOLNER Kiadás

LÁPFÜRDŐK OTTHON

könnyen és kényelmesen előállíthatók.



Egyedüli természetes pótlék a
gyógy-lápfürdőknek

otthon az év minden időszakában.

MATTONI-féle LÁPSÓ

(száraz kivonat)

1 kilós ládácskákban.

MATTONI-féle LÁPLÚG

(folyékony kivonat)

2 kilós üvegekben.

Gyógyítja a következő betegségeket:

Metritis, endometritis, oophoritis, parametritis, perimetritis, peritonitis, chlorose, anaemia, serophulosis, rhachitis, izzadmányok felszívódása, fluor albus, abortusra való hajlandóság, részleges paralysis, paresis, csúsz, rheuma, podagra, ischias és haemorrhoidalis bántalom.

MATTONI ÉS WILLE, BUDAPEST.

**MATTONI HENRIK,
BÉCS, KARLSBAD, FRANZENSBAD.**

4. 22. 77

MATTONI-FÉLE

GISSHÜBLER

legtisztább égvényes

SAVANYU-KÚT

mint gyógyforrás több századon át a **légző- és emésztési szervek**, köszvény-, gyomor- és hólyaghurut megbetegedéseinél kipróbálva. Gyermek, lábbadozók és terhéseknek e víz különösen ajánlatik.

MATTONI és WILLE

szerb királyi udvari szállítók.

— **B U D A P E S T.** —

GISSHÜBL SAUERBRUNN vasútállomás
Karlsbad mellett (Csehország), **BÉCS, FRAN-**
ZENSBAD.

Mattoni gyógy- és vízgyógyintézete
GISSHÜBL SAUERBRUNNBAN

vasútállomás **KARLSBAD** mellett (Csehország).

A Mattoni-féle Gissshübl Sauerbrunn eredeti helye.

Pneumaticus es belegzési gyógy mód.

Ideg- és mellbetegeknek, lábbadozóknak, hurut- és köszvényben szenvedőknek stb.

Az összes arzén és vastartalmú ásványvizek között a legkönnyebben emészthető

természetes arzén
és
Guber-forrás
vastartalmú
ásványvíz
SREBRENICA BOSNIÁBAN.

Arzénsavas hydrid 0.061

Kénsavas vasoxydul 3.734

A Guber-forrás sikerrel alkalmazható:

1. Oly betegségekben, melyek a vér rendellenes összetételén alapulnak (vérszegénység, sápkór).
2. Elgyengülés esetén, kimerítő betegségek után; továbbá maláriában, váltólázban és az e bajokat követő senyves állapotokban.
3. A női ivarszervek betegségeiben és azok következményeiben.
4. Bőrbajokban.
5. Idegbajokban.
6. Az új képletek bizonyos nemei ellen (lymphomák).

Kizárólagos szétküldési jog:

MATTONI ÉS WILLE, BUDAPEST.

MATTONI HENRIK,

BÉCS, KARLSBAD, FRANZENSBAD.

DgC28

VÉNYGYUJTEMÉNY

A MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV

MÁSODIK KIADÁSA ÉS PÓTFÜZETE ALAPJÁN

A LEGÚJABB GYÓGYSZEREKRE S A GYERMEKGyakorlatra
TEKINTETTEL


ÖSSZEÁLLÍTOTTA

Dr BÓKAY ÁRPÁD

A GYÓGYSZERTAN RENDES TANÁRA A BUDAPESTI EGYETEMEN

ÖTÖDIK

JAVÍTOTT ÉS TETEMESEN-BŐVÍTETT KIADÁS.



BUDAPEST 1897

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA.

13 JUN 2004



Hornyánszky V., Budapest.

ELŐSZÓ

AZ ÖTÖDIK KIADÁSHOZ.

E könyvecske első kiadása 1889-ben jelent meg. Hogy hét év multán az ötödik kiadásra van már szükség, bizonyítja használhatóságát és szükségességét. Ezen ötödik kiadást ismét bővítettem. Felvettem a némileg is használtabb új szereket, az újabb és hasznosabb vényeket, az új gyógyvizeket, gyógyfürdőket. A serum antidiphtheriticum, az organotherapiában fontosabb anyagok sem maradtak ki. Az újonnan felvett gyógyszerek sorozata betűrendben a következő: Acid. camphoricum — cinnamyllicum, — phenylo-aceticum, — phenylo-propionicum, Alumnolum, Analgenum, Argentaminum, Argoninum, Aristolum, Benzonaphtholum, Cantharidinum, Chloralose, Citrophenum, Cresolkészítmények, Diuretinum, Ferratinum, Ferripyrinum, Formaldehydum solut., Formanilidum, Gallanolum, Guajacolum carbonicum, Haemolum, Haemogallolum, Hydrarg. zincum cyanatum, Jodopyrinum, Lactopheninum, Loretinum, Losophanum, Lycetolum, Lysidinum, Malakinum, Mydrinum, Myrtilli fruct. Neurodinum, Nutrose, Ovarium-készítmények, Piperazinum hydrochlor., Resorbinum, Salacetolum, Salicylamidum, Salophenum, Scopolaminum hydrobrom. Serum antidiphtheriticum, Somatose, Sperminum Poehl., Sulfaminolum, Tannalum, Tannigenum, Tetrona-

lum, Thermodinum, Thilanium, Thioform, Thiophenum
 bijodatum, Thyreoidea-készítmények, Trionalum, Tume-
 nolum, Tropacocainum hydrochlor. Tussolum, Vinum
 Tokajense. — A vények száma e kiadásban 873-ra emel-
 kedett. Az új taxa medicamentorum alapján minden
 vény árát újonnan számította ki dr. Jármay Gyula úr,
 miért is neki hálás köszönetet mondok.

Budapest, 1897. január 1-én.

Dr. Bókay Árpád,
 egyetemi tanár.



I. Vényszerkesztési jegyzetek.

A vény az orvos írásos rendelete a gyógyszerészhez. A vényen legelőre teendő a rendelés helye és napja. Összetett vénynél az egyes szerek között első helyen álljon a főszer (basis), erre következék a segítőszer (adjuvans), majd a corrigens virium, azután a constituens, végre a corrigens odoris, vel coloris, vel saporis. A gyógyszerek neveinek rövidítése úgy történjék, hogy összecserélés ne történhessék meg; egyéb megszokott rövidítések betűrendben a következők:

āā == anatica quantitas, egyenlő mennyiség.

ad rat. == ad rationem.

c. == cum.

conc. cont. == concide, contunde.

concent. == concentratus.

colat. == colatura.

consp. == consperge.

coq. == coque vagy coquatur.

D. == detur vagy da.

decoct. == decoctum.

dil. == dilutus.

dent. tal. dos. == dentur tales doses.

disp. == dispensa vagy dispensentur.

div. == divide.

div. in dos aequ. == divide in doses aequales.

f. == fiat v. fiant.

gm. == gramma v. grammata.

gtt. == gutta vagy guttae.

infus. == infusum.

inj. == infunde.

l. a. == lege artis.

M. == misce v. misceantur.

No. == numero.

p. == pulvis.

P. p. == pro paupere.

qu. s. == quantum satis.

R. v. Rp. == recipe.

reit. == reiteretur.

rep. == repetatur.

S. == signa v. signetur.

A súlyok jelzése sohasem egyedül számokkal, hanem szóval is történjék (1875. évi 23,717 sz. beltigym. rendelet), tehát nem 0'05, hanem centigm. quinque, s nem 0'20, hanem centigm. viginti.* Decagm., hectogm. kifejezések ne használtassanak, hanem gm. decem., gm. centum. A beteg neve s lehetőleg lakása is jelezve legyen a vényen, ha csak különös tekintetek nem követelik annak elhagyását. Az orvos neve tisztán, olvashatólag legyen aláírva. Egy papírszeletnek mindkét oldalára vény ne irassék. Siirgősség esetén a vényre felül cito! vagy statim! vagy periculum in mora! szavak irassanak feltűnő, erős betűkkel. Szegényeknek rendelés alkalmával a vény bal alsó szélére P. p. (pro paupere) jegyeztessék, ha pedig diszebben óhajtjuk a gyógyszer kiállítását, úgy cap. eleg. (expedietur eleganter) jelzéssel lássuk el a vényt.

Minden vény csak egyszer készíthető el, ismétlés esetén minden egyes alkalommal a reit. vagy rep. jelzéssel s az orvos új aláírásával és a kelettel látandó el.

* A vénygyűjtemény vényeiben a súlyok helykimélés céljából csak számokkal jeleztek. Ha az ott közölt vények használat alkalmával másolatnak, a súlyok betűkkel jelzendők.

Species. Theakeverék. Ily alakban csak oly szereket rendeljünk, melyek még nagyobb adagban sem okozhatnak mérgezési tüneteket; ki vannak zárva tehát p. o. a fol. belladonnae, fol. digitalis, vagy fol. jaborandi. Speciesből egy csészére tetéztet evőkanálnyi vehető (7—10 grm.), p. o. a spec. laxantes-ből.

Pulveres. Elosztatlanul dobozban (skatulyaporban) hevesebb hatású port, p. o. kali chloricumot, morphint, rad. ipecacuanhaet nem szabad rendelni. Vízszívó vagy illó anyagokat tartalmazó elosztatlan porokat üveg dugós üvegben kell rendelni (vitrum cum opist. vitr. clausum). Osztott porok ne a dispensáló, hanem a dividáló módszer szerint rendeltessenek; tehát nem M. f. pulv. dent. tal. dos. Nr. X. — hanem, M. f. pulv. div. in dos. aequ. Nr. X. Osztott porok súlya rendszerint 0.3—0.5 gm. legyen, kivételesen lehet több is, de legfeljebb 1.5 gm. Vízszívó szereket vívdányagául ne sacch. alb., hanem sacch. lactis vételessék s a porok charta ceratában vagy paraffinában rendeltessenek. Hydrarg. bichlor corros., argent. nitr., auro-natrium-chloratum, hyoscinum, aconitinum, cocaínium s az utóbbi alcaloidok sóinak vívdányaga argilla alba legyen, minthogy az említett szereket szerves anyagok jelenlétében könnyen bomlanak s így hatásukból veszítenek. Vagyonsosabb betegeknek az osztott port papírhüvely helyett capsula amylacea-ban rendelhetjük (drága).

Pilula. Súlya 0.1—0.15 gm. legyen. Lehetőleg kerek számmal (30—50—60) rendeljünk labdacsokat. Gyermeknek és oly felnőtteknek, kik a labdacsokat lenyelni nem tudják, pilula ne írassék. Jó pilula-excipiensek a következők: 1. Argilla alba néhány csepp vízzel, vagy vízzel és glicerinnel aa. Kizárólag ezen excipiens használandó a poroknál már említett fémsók és alcaloidok rendelésekor, midőn azután a behintés is argillával történjék. 2. Növényi porok és uugu. glycerini, vagy mucil. gummi arab. qu. s. 3. Pulv. liquir. és succus liquir. depur. aa, ha kevés a basis, — ha pedig az utóbbi sok, úgy pulv. liquir. kevesebb veendő. 4. Ha a basis rosszul ragadó por s kiteszi a pilulatömeg felét. jó excipiens a sacchar alb. és a gummi arab pulv. aa. néhány csepp vízzel 5. Balzsamokhoz, aetheres kivonatokhoz, illó olajokhoz cera flav. pulv. és sacch. alb. aa. vételessenek. 6. Száraz gyanták, gummigyanták, vagy száraz gyantászerű növényi kivonatok néhány csepp borszeszszel már jó labdacsoanyagot adnak; néha jó lesz kevés növényi port (p. o. pulv. rad. althaeae) is hozzákeverni. 7. Natronszáppan kevés növényi porral és mucil. gummi arab.-vel vagy borszeszszel könnyen alakítható labdacsokká. 8. Száraz vizes kivonatok néhány csepp vízzel vagy borszeszszel lesznek gyúrhatókká. 9. Sűrű kivonatokhoz kevés növényi por vételessék. 10. Fél-sűrű kivonatokhoz kétféle növényi por veendő. Behintés argillával, lycopodiummal, pulv. rad. liquirit. vel, pulv. rad. althaeaevel, pulv. cort. cinnamomival, magnes. carb. v. nstával szokott történni. Labdacso bevonása (obductio) költséges, és így az csak rossz szagú vagy kellemetlen ízű vagy légen könnyen bomló szerekekkel készült labdacsoknál rendelendő el. Legegyszerűbb a bevonás collodiummal, gelatinával, körülményesebb

tolui balzsammal, drágább ezüsttel, arannyal; (*obduc. collodio, gelatina, bals. tolutano, auro foliato v. foliis auri, argento foliato v. foliis argenti.*) A bevonás a labdacsok oldékonyágát leszállítja. Csinosak a dragirozott labdacsok (*obd. l. a mucil. gummi arab. et amylo saccharato*). Ha azt akarjuk, hogy a labdacsok a gyomorban ne oldódjanak fel, hanem csak a bélhuzamban, keratinizáltassuk azokat (*obd. l. a. keratino.*) Rendkívül csinosak a *Frère-féle granulák*, melyek pilulák, pontosan vannak adagolva s a gyógyszeradag rájuk van nyomtatva.

Trochisci, pastilli, tablettae compressae csak vagyonosaknak rendelkezhetők.

Capsulae. Használatuk mind jobban terjed. *Capsula amylacea* csak porok felvételére szolgál. *Capsula gelatinosa elastica* folyó balzsamok, olajok (ol. ricini) számára használtatik. *Capsula gelatinosa operculata* sűrű extractumok dispensálására igen alkalmas. *Perlae gelatinosae* borsó v. babmekkoraságú tokocskák. *Capsulae keratinosae v. Pohl-féle vékonybéltokecskák* oly gyógyszereknek a tápcsőbe vitelére használtatnak, melyekre nézve kívánatos, hogy azok a gyomorral ne érintkezzenek s hatásukat csak a belekben fejtsék ki, csak ott oldódjanak fel; a keratintok u. i. a gyomornedvben nem oldódik, míg a pancreasváladékban igen könnyen. A legtöbb gyógyszerárban készletben vannak némely gyógyszer meghatározott mennyiségével gyárilag már megtöltött tokocskák (p. o. a ricinusolaj-capsulák). Kitiűden használhatók a *Clertan-féle gyöngycapsulák*, melyek 10 ctm. szilárd v. 5 csepp folyékony gyógyszert tartalmaznak. Újabb időben nálunk is készítenek jól használható gyöngytokocskákat, melyekben már lemért mennyiségű gyógyszer foglaltatik.

Emplastra. Ha valamely emplastrum felkenve nem hivatalos ily alakban szegényeknek azt ne rendeljük; kivétel az empl. cantharordin., mely bőrdarabra (corium) vastagon (crasse) felkenve irandó, a bőrdarab hossza, szélessége, vagy formája jelzendő p. o. „extende crasse super corium extensione longit. centimetr. 10, latitud. centimetr. 8, vagy magnitudine chartae lusoriae, v. volae manus“ stb.

Suppositorium súlya 2·5—5·0 grm. szokott lenni. Ha a végbélcsap csak arra szolgál, hogy a székletételt könnyítse, tisztán sebum ovileből v. natronszappanból is állhat; ha mint vívőanyag szerepel, úgy legtöbbször butyrum cacao-ból készítették. *Suppositorium* a hüvelybe is bevihető. Némelyek cacao-vajból globuli vaginales név alatt 5·0—20·0 grm. súlyú golyókat is készíttetnek. Újabban cacao-vajból vagy gelatinból gyárilag is állítanak elő oly suppositoriumokat, melyek bőlül üresek s gyógyszerekkel tölthetők meg; megtöltés után megfelelő operculummal záratik el az ily csapocska. Ezen csapok majd kúp-, majd henger-, majd tojás-alakúak; ezek a hüvelybe vitelre is alkalmasak.

Electuaria. Ily alakban nem szabad könnyen bomló vagy éle nyúló szereket rendelni, vagy melyek növényi savakkal érintkezve

vegybomlást szenvednek, valamint olyanokat sem, melyek már kis adagban erősen hatékonyak. Növényporok 3—5 rész syrruppal, mel depur.-al, 4—6 r. pulpa tamarind.-al jó electuariumot adnak; nehezen oldható porokhoz = r. syrup. vagy 2. r. pulpa tamarind. vétessék. Mint vivőanyag szerepelhetnek még pulpa prunor., mel rosatum, electuar. aromat., hashajtókhoz az electuar. lenitivum. Egyszerre 50 grm.-nál többet ne rendelünk. Bevétel kávéskanalként történik.

Unguenta. Zsiros kenőcsökhöz, hogy azok ne avasodjanak (nyáron), kevés acid. benzoicumot lehet tételni. Hosszú időre ne rendeljünk kenőcsöt, legfeljebb 3—4 napra. Szagjavítóul 30—50 gm. kenőcsre 1 csepp illó olaj, (ol. rosar, ol. lavand.) elegendő. Jodoformos kenőcs szagát legjobban elveszi a cumarin (1 grm. jodoformra 0.1 grm. cumarin). A hivatalos indifferens kenőcsökön kívül, melyek mint excipiensek használatnak, jó kenőcs-alapanyagot ad a lanolin és axung. porci aa + aqua dest. qu. s. A kenőcs-alapanyaghoz az excipendum csak bizonyos határok közötti mennyiségben keverhető; így p. o. míg illó olajok s camphora csak 1:10—12, addig causticus alkaliák 1:3 is vehetők; száraz vagy sűrűn folyó anyagok, mint gyanták, porok, balzsamok, kivonatok 1:3—4, tincturák, chloroform 1:6, ammon. sulfo-ichthyolicum, azaz *ichthyo*l és natrium sulfo-ichthyolicum 1:2.

Linimenta. Jó linimeniumot adnak: 1. Ammonia pura liquida 1 r. + oleum sesami 4 r. 2. Chloroform 1 r. + ol. sesami 4 r. 3. Camphor, illó olajok 1 r. + axungia porci s más szilárdabb zsirok, vagy hivatalos kenőcs-anyagok 5 r. 4. Ol. lini + aqua calcis aa.

Mixturae et solutiones ad usum internum. Rossz szagú anyagokat illatos vízben, csipős szereket nyákos folyadéokban (decoct. rad. althaeae, decoct. tuber. salep) oldva rendeljünk. Izjavító a syrupok (1:15). Rendelés 1—2 napra történjék. Érjedésre hajlamos folyadékok hűvös helyen, nyáron jeges vízben tartassanak. Savanyú mixturák, jódos vagy sublimatos oldatok porcellán vagy üvegkanálból vétessenek be. A bevételre szánt folyadék összes mennyisége 50—200 gm., legtöbbször 150 gm, szokott lenni, gyermekeknek 80—100 gm. Világosságon bomló anyagok vitrum nigrumban vagy coeruleumban rendeltessenek. Bevétel evő-, gyermek-, kávéskanalként.

Guttae. L. a táblázatot a cseppek súlyviszonyairól. A rendelt összes mennyiség 15—30 gm. szokott lenni. Izjavító legtöbbször nem kell. Csak értelmes betegeknek rendeljünk cseppeket. Az oldat tiszta legyen, zavarodást ne mutasson; ha idővel csapadék mutatkoznék benne, elvetendő. Erősen lútos szerekből oly mennyiség cseppek alakjában ne adassék a beteg kezébe, melylyel mérgezés történhetnék. Erős mérgek, mint p. o. strychnin. nitr., atropin. sulf., eserin. salicyl. ily alakban sohase adassanak a beteg kezébe; az ily cseppeket tartsa az orvos magánál (az orvos kezéhez). Acid. hydrochlor. dilut. üveg dugós üvegben rendeltessék. Ha lehet 2%-os

csepp-oldatok rendeltessenek, ekkor az oldat egy cseppjében megközelítőleg 1 millignja a hatékony anyagnak foglaltatik.

Collutorium és gargarisma mennyisége 300—500 gm. Felnőttek egyszeri öblítéskor 25—30 gmot fogyasztanak el. Kis gyermekeknek, kik e folyadékokat esetleg lenyelhetnek, ezeket puha vászon-darabbal felitatta, mosogatások alakjában kell használni.

Mixturae agitandae, seu mediae. Rázandó-keverék. Nem cél-szerű gyógyszeralak. Ha írjuk, ne felejtjük el a vényre feljegyezni: „*S. Használat előtt felrázni*“.

Injectiones subcutaneae. Fecskendőt soha se adjunk a beteg kezébe; a befecskendés műveletére sem a beteget, sem a laicus környezetét meg ne tanítsuk, így nem nevelünk morfinistákat. Bujakórosok és tuberculoticusok számára külön-külön fecskendőket tartunk. Helybelileg erősen izgató vagy éppen maró szerek ily módon ne használtassanak. Mily töményegű oldatok s mily szerek használata a megszokott, arra nézve l. a táblázatot. Az oldat mindig tökéletes legyen, azért vényíráskor a szűrést (filtra) elrendelni ne felejtjük. Ha a folyadék idővel megzavarodnék, úgy vagy az oldott szer csapódott ki, vagy gombavegetatio támadt a folyadékban; a szer mindkét esetben elvetendő. A szer mindig „*sub sigillo, az orvos kezéhez*“ rendeltessék; legjobb, ha azt az orvos azonnal magához veszi s nem hagyja a beteg kezében. A diplitheria elleni serum használatáról l. a megfelelő cím alatt a gyógyszerek között.

Saturationes. A vényen mindig jelzendő „*f. saturatio*“, hogy a gyógyszerész az elkészítést szabály szerint eszközölhesse. A készítés részletes körülírása a vényen szükségtelen. A telíték vívőanyaga 180—200 gm. viz. Szénsavas sóból (kali carbon., natr. carbon, natr. bicarbon.) 5—10 gm. rendeltessék, míg a telítő savból (acid. citricum, vagy succus citri, vagy acid. tartaric.) „*qu. s. ut. fiat saturatio*“. Körülbelül 1 gm. szénsavas só 0.65 gm. acid. citricum és 0.625 gm. acid. tartar. telít; a succus citri változó savtartalmú, ezért a mennyisége előre meg nem határozható, hanem „*qu. s.*“ irandó. — Ha a jelzett savak helyett hatékonyabb savtartalmú anyagok képezik a telítő anyagot, p. o. acet. scillae, akkor az utóbbi mennyiségét ki kell írni. A telítésnek különben nem kell teljesnek lenni.

Emulsioncs. Zsíros olajat tartalmazó magvak (amygdalae dulces, sem. lini, sem. papaveri) 8—10 r. vízzel jó fejetet adnak, (emulsioncs. verae); az emulgenst itt a magvakban levő növényi fehérje. Emulsio spuria készítésénél az emulgens gummi arab. pulv. (nem mucilago!), v. pulv. tragacanthae, v. vitellum ovi szokott lenni. Ami ezek fejetképező erejét illeti, gummi arab. 10 gm. = tragacantha 1 gm = vitellum ovi unius. Illatos olajokhoz gummi arab. aa vétessék, zsíros olajokhoz, gyanták és balsamokhoz 1/2 r. gummi arab. Víz 8-szor annyi vétessék, mint a mennyi az emulgendum. Syrupok, sacchar. album, mel depur. emollik a fejet tartósságát, sók, savak csökkentik azt s ezért hozzáátételük kerülendő.

Gyantákhoz legjobb a vitellum ovi mint emulgens. Mindkét fajta emulsio irásakor „f. emulsio“ kiteendő.

Maceratum. Illatos anyagoknál elegendő 2—3 órai maceratio, keserű anyagoknál 12—14 órai szükséges; szegények házilag készítsék azt s a kivonandó anyagot species alakban írja fel az orvos.

Digestum s. Infusum digestionis. A digestio 12—24 órán át történjék. Jelzés a szerek felsorolása után a következő: „Stent in loco tepido in vaso l. a. clauso per horas 12 (v. 24), saepius agitando. Cola et filtra.“

Infusum. Lazább szövetű (levél, fű, virág, vékonyabb gyökök p. o. rad. ipecacuanhae, rad. valerianae), vagy illatos olajat tartalmazó növényrészek kivonására alkalmas gyógyszeralak. Colatura legyen 150 gm., gyermekeknek 80—100 gm. Izjavítóul syrupok 1 : 15.

Decoctum. Tömöttebb szövetű növényrészek (keményebb gyökök, kérgek) kivonására alkalmas gyógyszeralak. Illatos olajat tartalmazó anyagok kivonására ne használtassék. Colatura, izjavító stb. mint az infusumnál.

Klysma. Kiürítő csőrének elég 200—400 gm. víz hűvösen vagy langyosan; lehet használni ugyanannyi infus. rad. valerianae-t. vagy infusum chamomillae-t is. Növeli a hatást 1—2 kávéskanál konyhasó, glaubersó, keserűsítő hozzáadása. Ha zsíros olajat is akarunk a csőréhez keverni, 1 evőkanál olajat dörzsöljünk össze 1/2 kávéskanálnyi szappanreszelékkel s úgy keverjük azt a folyadékhoz. Oxyuris vermicularis ellen jó klysmát nyerünk, ha 100—150 gm. foghagymaforrázathoz (házilag készitendő) 1—2 kávéskanál ecetet elegyítünk; különben naponta ismételt hidegvizes kiürítő beöntések is jól szolgálnak. Tenesmus ellen jól látó klysma a langyos koménnyitőfőzet 200 gmja. Tápláló csőrének legjobb a *Leube-Rosenthal-féle hús-pankreas klystir*, mely következőleg készitendő el: Végy finomra vagdalt húsvakarékot 150—300 gmot, adj hozzá triss és lehetőleg finomra vagdalt marhapankreast (fehér máj a mészárosok nyelvén), mely zsíros kötőszövet borítékától előzetesen megtisztított; keverd össze kanállal és habard 150 gm. melegvíz segélyével sűrű péppé s fecskendezd melegen az előbb már bélsártól megtisztított végbélbe alkalmas fecskendő segélyével. Lehet 25—50 gm. zsirt is (többet nem) hozzátenni. Jól használható mesterséges táplálásra az *Ewald-féle tojásos csőre is*; egyrészt 2—3 tojás egy evőkanálnyi hideg vízzel összehabartatik, másrészt kékhegyni fehér liszt fél csésze 20%-os szőlőcukor-oldattal felforraltatik s a keverékhez egy pohárka piros bor öntetik; az egész 40° C-ra lehűtetik s a tojásoldattal lassan elegyítetik. A cukor-liszt keverékhez egy evőkanálnyi peptont is lehet tenni. Az így elkészült langyosra melegített csőre kétszerre használandó el egy nap alatt! Egyszerűbb a *Kussmaul-féle tojásos csőre*; 2—3 tojást sárgijáva, együtt fele mennyiségű vízzel, mely lassanként öntendő hozzá, tejszerű folyadékká habarunk össze, a keveréket 12 óra hosszat hűvös helyen

tartjuk s használat előtt 35° C-ra melegítjük. Ozélt érhetünk különben *langyos tejből* álló csőrékkel is, vagy tojás és tej keverékével.

Bélinfusio, béllirigatio. Kiürítési czélokra legjobb ha térd-könyök-helyzetben tiszta langyos víz 1—1½ literje öntetik a bélbe irrigateur segélyével. Ugyanezt tesszük béllezáródásoknál is. Idült bélhurut, enteritis follicularis, vérhas eseteiben salicylsavas natrium, benzoésavas natrium, tannin, alumen segélyével készült oldatok jól használhatók.

II. Némely mértékről.

Egy evőkanál víz 15·0—20·0 gmot tesz ki.

Egy gyermekkanálnyi víz == ½ evőkanállal == 7·5—10·0 gmmal.

Egy kávé s. theás kanálnyi víz == ½ gyermekkanállal == 3·5—5·0 gmmal.

Egy csésze víz 120·0—150·0 gmot tesz ki.

Egy késhegynyi por == ¼—½ kávéskanállyal.

Egy Pravaz-féle fecskendő körülbelül 1 köbcentnyi folyadékot vesz fel.

Régi orvosi súlyok értéke.

1 régi orvosi font	== 12 uncia	== 360 gm., kikerékitve
1 uncia	== 8 drachma	== 30 " "
1 drachma	== 8 scrupulum	== 3·75 " "
1 scrupulum	== 20 granum	== 1·25 " "
1 granum		== 0·06 " "
1 gramm.	== 16 granum.	
1 decigm.	== 1·6 granum.	
1 centigm.	== ⅓ granum.	
1 milligm.	== ⅓₀ granum.	

III. Cseppek súlya.

Lehetőség szerint cseppentő üvegeket vagy cseppentő csövecskéket használjanak a betegek. Hozzávetőleg:

Víz és nehezebb vizes folyadékokból	}	1 gm. == 16 csepp.
Savakból		
Balzsamokból		
Nehezebb illatos olajokból	}	1 gm. == 20 csepp.
Tincturákból		
Zsíros olajokból		
Könnyebb illatos olajokból	}	1 gm. == 25 csepp.
Chloroformból		
Aether aceticusból		
Szeszes vizekből (aqua spirituosae) . .		
Aether sulfuricusból		1 gm. == 50 csepp.

Pontosabb adatok néhány fontos szerről.

Szer neve	1 gmra esik	Szer neve	1 gmra esik
Acid. hydrochloricum dilat.	16 csepp	Liquor kalii arsenicosi seu Solutio Fowleri	16 csepp
Aether depur. vol sulfur.	50 "	Oleum crotonis	25 "
Aether aceticus	25 "	Oleum menthae piper.	25 "
Aqua destill.	16 "	Oleum sesami	20 "
Aqua amygdalar. amar	25 "	Oleum ricini	20 "
Aquae spirituosae	25 "	Oleum terebinthinae rect.	25 "
Balsamum peruvianum	16 "	Spiritus aetheris	25 "
Chloroformium	25 "	Spirit. ferri sesquichlor.	
Elixirium acidum Hal- leri	30 "	aether	25 "
Kreosotum	25 "	Spiritus (90%)	30 "
Liquor ferri sesquichlo- rati	12 "	Spiritus dil. (70%) . . .	25 "
		Tincturae spirituosae . .	20 "
		Vina medicamentosa . .	20 "

IV. Czélszerűtlen és veszélyes gyógyszer-keverékek.

1. Alcaloidok hatását szabad Cl., Br., J., valamint más erősen élellyitő anyagok pl. kalium hypermanganicum gyengítik, sőt meg is szüntetik.

2. Belladonna és aconitumkészítmények máró lúgokkal érintkezve, elvesztik hatásukat, aconitumkészítmények már akkor is, ha vízzel hosszabb ideig állanak.

3. Tannin és tannin-tartalmú készítmények fém sókkal, alcaloidokkal, fehérjékkel, enyvvvel, dextrinnel, növényi nyákkal csapadékot adnak.

4. Zsíros olajok és más zsíradékok lúgokkal, erős savakkal fém sók savanyú oldataival ne kevertessenek.

5. Tincturák, melyek balzsamokat vagy gyantás anyagokat tartalmaznak, víz hozzáadására tejszerűen megzavarodnak.

6. Aqua chlori csak vízzel vagy legfeljebb syrupus simplex-el elegyíthető.

7. Kalium sulfuratumhoz, calcium sulfuratumhoz, ha savak vagy savanyú sók kevertetnek, kénhydrogén fejlődik, kén kiválása mellett vagy a nélkül. A nevezett szerek rendelésekor kerültessenek a fémélegek, s azok sói, Cl., Br., J., tannin és tannintartalmú anyagok.

8. Lúgos kémhatású folyadékok édesítésére csak szintelen szirupok használtassanak.

9. Vasoldatokhoz ízjavításra csak syrupus simplex vagy syrupus corticum aurantior. használtassék.

10. Savak, savanyú sók, savanyú syrupok és tincturák rendelkezéskor kerülessenek szénsavas sók, szappanok, jodkalium, bromkalium. Kivétel a szénsavas sókat illetőleg, ha saturatiók állítandók elő.

11. Ezüstsókhhoz, ólomsókhhoz, higanyoxydulsókhhoz, nem szabad chlór-, bróm-, jódvegyületeket keverni.

12 Ólomkészítményekhez nem szabad kénsavas sókat keverni.

13. Plumbum aceticum s más fémsók növényi kivonatokkal csapadékokat alnak.

14. Argentum nitricumhoz, jodkaliumhoz, auro-natrium-chloratumhoz sem syrupokat, sem más szerves anyagokat keverni nem szabad, *ízültől egyedül glycerin használendő.*

15. Higanysókok elromolhatnak a legkülönbözőbb szerves vegyületek jelenlétében. Hydrargyrum bichlor. corrosivum, ha porban vagy pilulában rendeltetik, vídőanyagul csupán argilla alba használtassék; ugyanez áll a légenysavas ezüstre nézve is.

16. Jodkalium vagy bromkalium ne rendeltessék solia kali chloricummal egyidejűleg, vagy az utóbbival keverve.

17. **Robbanó gyógyszerkeverékek** (Kobert után).

a) 1 r. chromsav keverve 2 r. glycerinnel azonnal robban.

b) Kalium chloricum szénport tartalmazó fogporral keverve még a szájban is robbanhat. Kén jelenléte még növeli a veszedelmet.

c) Kalium chloricum catechuval, gubacsporról, tanniummal keverve a dörzsölő csészében explodálhat. Ha előbb még glycerint is teszünk a keverékhez, az explosio mulhatatlanul beáll.

d) Kalium chloricum és natrium subsulfurosum porrá elegyítve robbannak.

e) Kalium chloricum, tinctura ferri chlorati, glycerin aa. (Angliában kedvelt elegy) melegben igen könnyen robbannak.

f) Jod és ammonium semmi esetre se kevertessenek, mivel ekkor robbanó jodnitrogen keletkezik.

g) Brom és alcohol ha kevertetnek, gyakran robbanó brom-aether keletkezik.

h) Acid. nitr. + acid. hydrochlor. + tinct. nucis vomicae aa néhány óra múlva robbannak, épen úgy acid. nitr. + acid. hydrochlor. aa 10:0 + tinct. cardamomi 20:0.

i) Salétrom, ha keverékekben csészében dörzsöltetik, bár nehezebben robban, mint a kalium chloricum, mégis gyakran okozott már szerencsétlenséget.

j) Acid. picricum porban rendelve, csaknem minden más anyaggal robban.

k) Nitroglycerin nemcsak tisztán robban könnyen, hanem erős hígításokban is.

V. Fürdők.

	Liter
Teli fürdőhöz (balneum totale) szükséges vízmenyiség	== 200—300
Félfürdőkhöz (semicupium)	" " == 100—150
Ülőfürdőhöz (insessus)	" " == 40—50
Lábfürdőhöz (pediluvium)	" " == 10—20
Karfürdőhöz (brachiluvium)	" " == 5—10

Hideg fürdő hőmérséke 10° — 20° C. == 80° — 16° R.

Hűvös fürdő " 20° — 28° C. == 16° — 22° R.

Langyos fürdő " 28° — 35° C. == 22° — 27° R.

Meleg fürdő " 35° — 40° C. == 27° — 32° R.

Forró fürdő " 40° — 45° C. == 32° — 36° R.

Thermicusan indifferens fürdő a 34° — 35° C. hőmérséktől.

Mesterséges fürdők.

Asványsavas fürdő. Teli fürdőhöz kell acid. nitr. crud. 50° — 100° , vagy acid. nitr. crud. és acid hydrochlor. crud. aa 30° — 50° ; lábfürdőhöz harmadrésze. Fakád!

Diófalevél-fürdő Friss diófalevelekből 500° — 1000° , szárazakból kétszer annyi forráztassék le. Forrázat gyorsan átszűrve, egy teli fürdőhöz elegyítendő. Gyermeknek teli fürdőjéhez 300° friss diófalevél, vagy 600° száraz vétessék.

Enyves-fürdő. $\frac{1}{2}$ —1 kilogramm. enyv vagy gelatina egy teli fürdőre.

Fenyőlevél-fürdő. 200° — 300° fenyőlevél kivonat (droguistától) egy fürdőhöz.

Hangya-fürdő Azelőtt erdei hangyák forrázatával készült; jól pótolhatók a hangyák, ha egy fürdőhöz tíz-tizenöt gm. acidum formicicum tétetik.

Illatos (aromaticus) fürdő sokféle módon készíthető: a) Species aromaticae 200° — 500° gmjából 2 liter vízzel forrázat készíttetik s az a fürdőhöz öntetik. b) Tinct. arnicæ 100° öntetik a fürdőhöz, vagy c) Ol. terebinthinae 40° — 50° gm. jól el kell keverni, különben csipi a bőrt) vagy d) Aqua coloniensis $\frac{1}{2}$ —1 üveg.

Jódos fürdő. a) Kalium jodatum vagy natrium jodatum 100° — 120° egy fürdőhöz; pharmakologice irrationalis; b) 10° — 15° jodum purum 20° — 25° kalium jodatum vagy natrium segélyével oldandó elegendő mennyiségű vízben, s ezen oldat öntendő a fürdőhöz; erősen izgatja a bőrt. Fakád!

Kén-s fürdők. Kalium sulfuratum pro balneo (kali kénmáj), vagy helyette natrium vagy calcium sulfuratum 50° — 200° oldásokkal a teli fürdőben. Kénhydrogen fejlesztése sósavval felesleges, dús fejlődésnél ártalmas is. Fakád!

Konyhasós-fürdő v. sósfürdő. A fürdő 2—3%-nyi sótartalmú legyen. Teli fürdőben oldassék fel 4—6 kilogramm anyálúsó, vagy

konyhasó, vagy tengerisó, vagy marhasó. Gyermeknek sósfürdője ne legyen töményebb, mint 1—1½%-nyi sótartalmú.

Korpa-fürdő. Korpa (legjobb a búzakorpa) 2—3 kilogramja vászonzacskóba kötve 5—8 liter vízzel ½ órán át főzetik. Főzet a fürdőhöz üntetik és a korpás zacskó a vízben kifacsartatik.

Lúgos fürdő. Teli fürdőben 200:0—500:0 kereskedésbeli szóda feloldatik, v. natrium hydrooxydatum solutumból 50:0 üntetik a fürdőhöz.

Malátafürdő. Árpamalátának 2—3 kilogramja 5—8 liter vízben ½ órán át főzetik. Főzet gyorsan szárva a fürdőhöz üntetik. Maláta sör- és szeszgyárakban kapható.

Mustáros fürdő. Teli fürdőre 500:0—800:0 farina semin. sinapis vétessék, lábfürdőre 100:0—200:0. A lisztet nem zacskóban tétetik a fürdőhöz, hanem közvetlenül.

Szappanfürdő. Egy fürdőre 100:0—200:0 sapo kalinus venalis v. 200:0—300:0 sapo szegediniensis vétessék.

Szénsavas fürdő v. pezsgő fürdő. Oldassék fel a fürdőben 150:0—200:0 natrium bicarbonic. s. fürdés közben, folytonos keverés mellett, óvatosan, a testtől távol, üntessék bele 150:0—200:0 acid hydrochlor. crud.

Sublimátfürdő. Fürdő vétele orvos jelenlétében! Fürdőt az orvos készítse el! Fakád! Sublimat sub sigillo sub signo veneni, orvos kezéhez rendeltessék! a) Felüldötteknek teli fürdőre 50—100. hydrarg. bichlor. corros. b) Csecsemőknek — 2 éves gyermeknek 3—5—0.8 hydrarg. bichlor. corros. Fürdés tartama 10 perc. Gyermekeket óvni, nehogy fürdővíz a szájába jusson!

Vásfürdő v. acélfürdő. Pharmacologicæ irrationalis. Bőrön át vas uem szívódik fel. Legegyszerűbb globuli martiales segítségével előállítani. Egy teli fürdőhöz 1—4 db. szükséges.

VI. Bőr alá fecskendezésre használt szerek oldatainak töménysége.

A Pravaz-féle fecskendők, melyek bőr alá fecskendezéskor használtaknak, nem mindig 1 kcm. űrtartalmúak, ezért megvételkor űrtartalmuk meghatározandó. Befecskendezés előtt és után a fecskendő és tűje 2%-os carbololdattal fecskendeztetessék át, így elkerüljük a befecskendezés helyén lobnak keletkezését. Jó a tilt bor-szeszlángou is áthúzni. Ujabban bőr alá fecskendezési célokra sterilizált oldatok is tartatnak készletben, beforrasztott üvegcsővekben. Egy csövecskében rendszeren 1 kcm. folyadék foglaltatik. Igen ajánlhatók.

S z e r	Szer- meny- nyi- sége	Oldó folya- dék mennyi- sége	Egyes adag a ható- anyagból	J e g y z e t
Acid. carbohcum li- quid.	0.1-0.2	10.0 Aqu.	0.01-0.04	Polyarthrititis rheu- maticánál, or- báncznál. Excitans. Fecskendés előtt felmelegítendő. Hánytató. 3 éven alóli gyer- meknek nem sza- adni.
Aether sulfur. . . .	—	—	1/2-2 fecsk.	
Autipyrinum	5.0	5.0 Aqu.	1.5-2.0	
Apomorphin hydro- chlor. felnőtteknek	0.1	10.0 Aqu.	0.005-0.01	
Apomorphin. hydro- chlor. gyermek- nek	0.02	10.0 Aqu.	0.001-0.002	
Atropin. sulfuricum	0.02	10.0 Aqu.	0.0004-0.0005	Borszeszben oldva fájdalmas. Fájdalmas. Ha per- os nem lehet, jobb klysmában. Nem fájdalmas. Fenygető tünetek jelentkezése ese- tén amylnitrit 4- 8 cseppjét belele- geztetni.
Camphora	1.0	10.0 Ol. se- sami	0.1	
Chininum bisulfur .	1.0	12.0 Aqu.	0.3-0.8	
Chinin. muriat carb- amidat	2.0	10.0 Aqu.	0.5-1.0	
Cocain. hydrochlor.	0.1-1.0	10.0 Aqu.	0.01-0.5	
Codeinum. hydroch- lor	0.5	10.0 Aqu.	0.05	Nem ajánlatos. Rendkívüli vi- gyázat. Erősen mérgező
Coffein. natrio-ben- zoicum	2.0	10.0 Aqu.	0.1-0.2	
Coffein. natrio-sa- licylic.	—	—	—	
Ergotinum s. Extr. secalis corn. spis- sum	1.0	5.0 Aqu. 5.0 Glycerin	0.1-0.2	
Ferrum citric. oxy- dat	1.0	10.0 Aqu.	0.05-0.1	
Hydrarg. bichlor. corros	0.1	10.0 Aqu. + 0.3 Natr. chlor.	0.01-0.015	Nem ajánlatos. Rendkívüli vi- gyázat. Erősen mérgező
Hydrarg. bichlor. carbamid. solut .	—	—	—	
Hydrarg formami- midat solut.	—	—	—	
Hyoscinum hydro- chlor.	0.005	10.0 Aqu.	0.0002-0.0005	

Szer	Szer- meny- nyi- sége	Oldó folya- dék mennyi- sége	Egyes adag a ható- anyagból	J e g y z e t
Hyosciaminum crystallis.	0·05	5·0 Aqu. + 5·0 Glycerin	0·001-0·005	Nem megbízható készítmények is jönnek forgalom- ba. — Legjobb a Merck-féle. Vi- gyázat!
Liquor ammonii anisatus	—	—	1/2-1 fecsk.	
Liquor kali arseni- cosi l. sol. Fowleri	—	—	—	
Morphinum hydro- chlor.	0·2	10·0 Aqu.	0·005-0·02	Atropin-mégezés esetén több.
Pilocarpinum hydrochloric. fel- nőtnök.	0·2	10·0 Aqu.	0·01-0·02	
Pilocarpinum hydrochloric. gyermeknek . . .	0·1	10·0 Aqu.	0·001-0·005	
Solutio Fowleri. . .	5·0	10·0 Aqu.	2—4 gtt.	1/4—1/2 fecskendő- vel. Vigyázat! Kelle- metlen tünetek esetén paralde- hyd 3·0—6·0.
Strychninum nitri- cum	0·05	10·0 Aqu.	0·001-0·005	
Tinct. Moschi	—	—	Egy fecsk.	

VII. Belégzésre használt szerek oldatainak töménysége.

<i>Acid. carbolicum</i>	0·5—4·0 : 200·0	Aqua dest.
<i>Acid. lacticum</i>	5·0—15·0 : 200·0	"
<i>Acid. tannicum</i>	0·5—4·0 : 200·0	"
<i>Amylniirit</i>	5—8 csepp gyapotra v. kén- dőre cseppentve légzendő be.	"
<i>Aqua amygdalar. amor.</i>	0·5—5·0 : 200·0	Aqua dest.
<i>Aqua calcis</i>	tisztán v. 100·0 : 50·0	"
<i>Aqua chlori</i>	2·0—10·0 : 200·0	"
<i>Argentum nitr. cryst.</i>	0·04—1·0 : 200·0	"
<i>Chininum bisulfuric.</i>	0·2—0·5 : 200·0 ¹⁾	"
<i>Cocainum hydrochlor.</i>	0·5 : 100·0 ²⁾	"
<i>Extractum Belladonnae</i>	0·02—0·1 : 200·0	"
<i>Hydrargyr. bichlor. corros.</i>	0·04—0·2 : 200·0	"

¹⁾ Tussis convulsivánál.

²⁾ 20 grammnál több folyadékot nem szabad belélegezni, ez megfelel 0·1 grm. coainónak. A beteg a nyálát le ne nyelje, hanem köpje ki. Ezzel a gégebe nem jutott cocainnak szervezetébe jutását elkerüli.

<i>Kalium bromatum</i>	0·4—4·0 : 200·0	Aqua dest.
<i>Kalium chloricum</i>	0·4—4·0 : 200·0	"
<i>Kalium hypermanganicum</i>	0·2—2·0 : 200·0	"
<i>Kalium iodatum</i>	0·5—1·0 : 200·0	"
<i>Liquor ferri sesquichlorati</i>	0·5—3·0 : 200·0	"
<i>Natrium benzoicum</i>	5·0—20·0 : 200·0	"
<i>Natrium bicarbonicum</i>	0·4—4·0 : 200·0	"
<i>Natrium chloratum</i>	0·4—4·0 : 200·0	"
<i>Oleum pini silvestris</i>	} 15—30 csepp ¹	
<i>Oleum terebinthinæ</i>		
<i>Pyridinum</i>	3·0—5·0.	
<i>Thymolum</i>	0·2—0·4 : 200·0	Aqua dest.
<i>Tinctura opii simplex és crocata</i> ²⁾	0·1—1·0 : 200·0	"

VIII. Gyermekgyógyászati gyakorlatban fontosabb és hatékonyabb szerek adagolása.⁴

Rövidítések : *gyerm.* = gyermeknek; *kk.* = kávéskanál; *gyk.* = gyermekkanál; *ór.* = óránként; *gtt.* = gutta; *l.* = lásd; *m.* = mint. A súlyokat jelző számok mellől a gm. többnyire elhagyott.

S z e r	A d a g
Acid. benzoicum	3—6 éves gyermek. 0·05 pro dos. 0·25—0·3 pro die.
Acid. carbolicum	Helybelileg is nagy vigyázattal. Torokvizben nagyobb gyermeknek 1/2%-os oldat aqua calcis-al; ha lenyeiné, ne rendeltessék. Torokecsetelésre 1 : 10 glycerin. Bels. nem!
Acid. citricum	0·5—1·0 : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Acid. hydrochlor. dilut	Korhoz képest 5—8 gtt. : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Acid. lacticum	Csecsemőknek 0·5—1·0 : 80,0 2 ór. 1 kk. nagyobb gyermek. 1 gyk.
Acid. phosphor	1,0 : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Acid. pyrogallicum l. Pyrogallol	

¹⁾ Párolgó meleg vízre csepegtetni.

²⁾ Vízben nem oldódik, ezért néhány csepp borszeszben oldandó előbb, azután hígítandó fel vízzel.

³⁾ Irrationalis.

⁴⁾ Nagyreszt a budapesti Stephánia gyermekkórházban elfogadott adagolás alapján.

S z e r	A d a g
Acid. salicyl	Bels. nem. Küls. hintőpor 1,0 : 10,0.
Acid. sulfur. dilut.	5—6 éves gyermek. 10 gtt. : 80,0 2 ór. gyk.
Acid. tannicum	Korhoz képest 0,01—0,03 pro dos; 0,05—0,15 pro die.
¹ Acid. tartaricum	Mint az acid. citricum.
Agaricin	0,002—0,005—0,008 pro dos.
Althaeae rad.	Decoct. 5,0 : 80,0 2 ór. kk.
Alumen	Száj-, torokvíz 2,0 : 100,0. Belsőleg 1—2 éves gyermek. 0,4 : 80,0 2 ór. gyk.
Ammonium chlorat	} 3—6 éves gyermek. 0,5 : 80,0 2 ór. gyk.
Ammonium chlorat ferrat	
Amylenhydrat.	0,2—0,5 pro dos.
Antifebrin	Annai centigm. pro dos. a hány éves a gyermek. de 14 éven alul soha 0,1 gmon felül pro dos. és 0,5 gmon felül pro die.
Antimonium sulfuratum auratum	2—6 éves gyermek. 0,005—0,01 pro dos. 2 ór. : 0,025—0,05 pro die.
Antipyrinum	Mint antipyreticum annai decigm. pro dos., a hány éves a gyermek. 3—4-szer v. egyszerre 3-szor annai decigm., a hány éves a gyermek.
Apomorph. hydrochlor.	Mint emeticumot csak nagyobb (5—6 éven felüli) gyermeknek nagy szükség (!) esetén subcutan 0,001—0,002 gm. pro dos. Mint expectorant nem !
Aqua amygdalar. amar.	{ 2 éven aluli gyermek. 5 gtt. : 50,0 2 ór. 1 kk.
Aqua laurocerasi	
Aqua calcis	2 éven felüli gyermek. 5—10 gtt. : 50,0 2 ór. 1 gyk.
Aqua laxativa viennensis	Száj-, torokvíznek 100,0 : 50,0 v. 100,0 : 100,0.
Arnicae flor.	3—6 éves gyermek. ór. 1 gyk. míg hatás jelentkezik.
Argentum nitricum	4—8 éves gyermek. infus. 1,0 : 80,0 2 ór. 1 gyk.
Arsen készítmények l. Solutio arsen. Fowleri	Belsőleg. 3—6 éves gyermek. 0,002—0,003 pro dos. 2—3-szor pro die.
Atropinum sulfur	Ne rendeltessék !
Belladonna l. Extract. bellad.	
Benzoe l. Acid. benz.	

S z e r	A d a g
Bicarbon. natrii l. Natr. hydrocarb.	
Bismuthum subnitricum . .	1—6 éves gyermek. 0.05—0.2 pro dos. 0.25—0.5 pro die.
Bismuth. subsalicyl.	0.1—0.20 pro dos. napj. 5—6-szor.
Bismuthum tannicum	Mint a bismuth subnitr.
Borax veneta l. Natr. boracicum.	
Calcium carbon. praecipit .	Belsőleg 1—3 éves gyermek. 0.1—0.2 pro die.
Calomel	Mint hashajtót 4—8 éves gyermek. 0.05 pro dos., míg hatás nem jelentkezik. Bélhurutnál. syphilis congenitánál csecsemőnek, — 2 éven aluli gyermek. 0.005—0.008 pro dos. 2 ór.; 0.025—0.04 pro die. 2—5 éves gyermek. 0.008—0.01 pro dos. 2 ór.; 0.04—0.5 pro die.
Camphora	3—6 éves gyermek. 0.01—0.02 pro dos. 2 ór.; 0.05—0.1 pro die.
Cannabis indica l. Extr. cannabis.	
Cascarilla l. Tinct. cascarillae.	
Chinae cortex	4—6 éves gyermek. decoct. 4,0 : 100.0 2 ór. 1 gyk.
Chininum ferro-citricum . .	3—6 éves gyermek. 0.03—0.05 pro dos. 2 ór.; 0.15—0.25 pro die.
Chininum sulfur	Mint antimalaricumot 2—4 éves gyermek. 0.2—0.3, 6—10 éves gyermek. 0.3—0.5
Chininum bisulfur	a lázrohammentes időben. Mint antipyreticumot ugyanannyit pro die
Chininum hydrochlor	4—5 részre elosztva. Chinin. tannicumból háromszor annyit.
Chininum tannicum	
Chloralhydrat	Csecsemőnek 0.2—0.5 : 80.0 2 ór. k.k. v. gyk.; csörében 0.2—0.3 egyszerre nyákos oldatban.
Cocainum hydrochloric . . .	Bels. nem. Küls. mint felnőtteknél. Vigyázat!
Coffeinum natrio-benzoic. .	0.02—0.05 pro dos.
Coffeinum natrio-salicyl . .	0.1—0.5 pro die.
Cremor tartari l. Kalium hydrotartaricum.	
Cuprum sulfuricum	Mint emeticumot 2—6 éves gyermek. 0.2—0.3 : 80.0 1/4 ór. k.k. v. gyk. a hatás beálltaig.

S z e r	A d a g
Digitalis folia.	Csecsemőnek infus. 0·1 : 80, 0·2 ór. kk.; 3—6 éves gyermek. infus. 0·2—0·3 : 80,0 2 ór. gyk.
Diuretin	0,05—0,15 pro dos. 0,3—1,0 pro die.
Electuarium lenitivum . . .	3—6 éves gyermek. 1—2 kávéskanállal; ha hatása nincs 3—4 óra múlva ismét ugyanannyit.
Elixirium acidum Halleri. .	Mint az acid. sulf. dil.
Ergotinum	5 éven túli gyermek. 0·05 pro dos. 2 ór.; 0·20 pro die.
Extractum belladonnae . . .	3—10 éves gyermek. 0·005—0·01 pro dos. napjában 1—2-szer.
Extractum cannabis indicae	4—8 éves gyermek. 0·005—0·02 pro dos. 2 ór.; 0·025—0·1 pro die.
Extract. filicis maris aethe- reum	4—8 éves gyermek. electuariumban 2·5— 4·0 egy óra alatt.
Extract. fluid. grindeliae .	2—4 éves gyermek. 2 ór. 8—12 cseppet.
Extract. hyosciami	2—6 éves gyermek. 0·005—0·01 pro dos. 2 ór.; 0·025—0·05 pro die.
Extract. nucis vomicae . . .	1—6 éves gyermek. 0·003—0·005 pro dos. 2 ór.; 0·015—0·025 pro die. 6—10 éves gyermek. 0·005—0·007 pro dos. 2 ór.; 0·025—0·035 pro die. Enuresis noct. esetén nagyobb gyermeknek este 0·01 pro dos.
Extract. opii aquos.	Nem rendeljük, helyette tinct. opii simpl.
Extract. ratanhia dep. . . .	Csecsemőnek s 3 éven aluli gyermek. 0·2—0·4 : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Extr. secalis cornuti spiss. l. Ergotin.	
Ferrum reduct.	Szédülő gyermeknek 0·03. pro dos., 0·15 pro die.
Ferrum jodatum l. Syrupus ferri jodati.	
Ferrum lacticum	{ Csecsemőnek 0·01—0·02 pro dos.; 0·02— 0·05 pro die. 2—6 éves gyermek. 0·03— 0·05 pro dos.; 0·15—0·3 pro die.
Ferrum natrio-pyrophospho- ric	
Ferrum oxyd dialys.	2—4 év. gyermek. 2·0 : 100·0 2 ór. 1 kk. v. gyk.
Ferrum sesquichlorat solu- tum	1—4 éves gyermek. 8—10 gtt.: 80,0 2 ór. gyk. 4—8 éves gyermek.; 10—15 gtt.: 80,0 2 ór. gyk.
Ferrum sulfuricum oxydul. Filix mas l. Extr. filic. mar. aeth.	0,5—1·0 : 15,0—20,0 napj. 3 × 10 cseppet.

S z e r	A d a g
Flores salis ammoniaci mar- tiales l. Ammon. chlor. ferat.	
Flores zinci l. Zincum oxy- dat.	
Fructus tamarindorum l. Ta- marindus.	
Granati cortex l. Punicae granati cortex.	
Gummi Kino	Mint az extr. ratanhae.
Hydrargyr. bichlorat. corro- sivum	Csak fürdőben, l. mesterséges fürdők.
Hydrargyr. chlorat. mite l. Calomel.	
Hydrargyr. jodatum flavum	4—6 éves gyermek. belsőleg 0.005—0.01 pro dos. porban 2-szer napjában.
Hydrargyrum tannic. oxydul.	0.005—0.02 pro dos. 2 X napj. bels.
Hydromel infantum	2—3 éves gyermek. 2 ór. gyak. míg hatás jelentkezik.
Hyosciamus l. Extr. hyosci- ami.	
Ipecacuanhae radix	Mint expectorans infusumban csecse- mőnek 0.1 : 80.0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyermek. 0.15—0.25 : 80.0 2 ór. gyak. Mint emeticum infusumban 1.0—2.0 : 50.0 1/4 ór. csecsemőnek kk., 2—6 éves gyermek. gyak. míg hatás jelentkezik.
Jodoformium	Bels. nem. Kenőcs, hintőpor, mint fel- nőttnek. Vigyázat!
Kalium aceticum solutum	3—6 éves gyermek. 1.0—2.0 : 80.0 2 ór. kk. v. gyak.
Kalium bromatum	Csecsemőnek 0.5—1.0 : 80.0 2 ór. kk. : 2—6 éves gyermek. 1.0—2.0 : 80.0 2 ór. gyak. Porban 2—6 éves gyermek. 0.1—0.2 pro dos.; 0.5—1.0 pro die.
Kalium chloricum	Vigyázat! Száj-, torokvizben 1.0—3.0 : 150.0; ha a gyermek lenyelne, moso- gatások puha vászondarabbal. Belső- leg 2—6 éves gyermek. 1.0—2.0 : 80.0 2 ór. gyak.
Kalium hydrotartaricum	4—8 éves gyermek. 1.0—2.0 pro die.
Kalium hypermanganicum	Szaj-, torokviznek 0.2—0.3 : 150.0; ha lenyelne a gyermek, mosogatások puha vászondarabbal.

S z e r	A d a g
Kalium jodatum	Kenőcsnek 2·0 : 30,0 hozzá 0·1 jodum purum. Belsőleg 1—4 éves gyermeknek 0·5—1·0 : 30,0 2 ór. kk. v, gyk.; 4—8 éves gyermek. 1·0—2·0 : 30,0 2 ór. gyk.
Kalium natrio-tartaricum . .	3—5 éves gyermek. 10·0 : 100,0 ór. gyk.
Kalium stibio-tartaricum . .	Mint emeticum 1—2 éves gyermek. 0·05 : 50,0 1/4 ór. kk. míg hatás jelentkezik. Gyenge gyermekeknek v. gyomor- és béliizgalom esetén ne rendeltessék (!).
Kamala depuratum	2—6 éves gyermek. 2·0—4·0 electuariumban ; 1 1/2 óra alatt elfogyasztandó.
Koso flores s. Kusso flor. . .	4—5 éves gyermek. 6·0—10·0 electuariumban ; 1 1/2 óra alatt elfogyasztandó.
Lactas ferri l. Ferrum lactic.	
Lactucarium germanicum . .	4—6 éves gyermek. 0·02—0·03 pro dos. 0·1—0·15 pro die.
Lichen islandicus	Decoctumban 2·0—4·0 : 30,0 2 ór. gyk. Mint az ol. jecoris aselli.
Liparin	5—7 év. gyermek. 30,0 : 100,0 2 ór. 1 kk. v. gyk. Belsőntésre 300·0 : 1000·0.
Liquor alumin. acet.	Csecsemőnek — 2 éven aluli gyermek. 8—10 gtt. : 30,0 2 ór. kk. ; 2—6 éves gyermek. 10—15 gtt. : 30,0 2 ór. gyk.
Liquor ammonii anisatus . .	
Liquor ferri sesquichlor. l.	
Ferrum sesquichlor. sol.	
Liquor kalii acet. l. Kalium acet. solut.	
Magisterium bismuthi l. Bismuth. subnit.	
Magnesium carbonicum hydrooxydatum	} Késhegynyit napjában 2—3-szor.
Magnesium oxydatum s. Magnesia usta	
Mannitum	Csecsemőnek 5·0 : 50,0 (aqua ferv.) ór. gyk. míg hatás jelentkezik.
Morphinum hydrochloricum.	Gyermekeknel egyáltalán ne használtassék (! !). Legfeljebb uraemiás gőcsök esetében nagyobb gyermek alá 0·05 : 10,0, ebből 1/2 Pravg. die. 0·01—0·02 pro dos. : 0·05—0·1 k.; 2—6 éves gyermek. 0·1 : 30,0 2 ór. gyk.
Moschus	
Natrium hydrocarbon. seu bicarb.	

S z e r	A d a g
Natrium boracicum	Száj-, torokviznek (soor) 1'0—2'0:100'0. Puha vászondarabbal mosogatások.
Natrium bromatum	1—2 év. gyermek. 1'0 : 100,0 2 ór. kk.
Natrium nitricum	3—6 éves gyermek. 0'5—1'0 : 80,0 2 ór. gyk.
Natrium phosphoricum	3—6 éves gyermek. 1'0—2'0 : 80,0 2 ór. gyk.
Natrium salicylicum	Mint antipyreticum 2—4 éves gyermek. 1'0—2'0 : 80,0 ór. gyk.
Nux vomica l. Extr. nucis vom. és tinct. nucis vom.	
Opium purum	Ne rendeltessék; helyette tinctura opii simpl.
Oxymel scillae	Hánytatókban syrup helyett 10'0—20'0.
Oleum jecoris aselli	Napjában 1—2-szer korhoz képest kk. v. gyk.
Oleum ricini	Korhoz képest kk. v. gyk.
Oleum terebinthinae	L. belélegzésre szolgáló szerek tábláját.
Paraldehydum	0'5—1'0 pro dos. és pro die.
Paullina sorbilis s. Pasta	1—5 éves gyermek. 0'03—0'05 pro dos. ;
Guarana	0'15—0'25 pro die.
Pepsinum germanicum	Csecsemőnek 0'05. pro dos. szopáselőtt; 2—5 éves gyermek. 0'1 pro dos. étke- zés előtt. Utána sósav.
Phenacetinum	Mint antipyreticum bels. 2—5 éves gyermek. 0,1—0,15 ; 6—10 éves gyermek. 0,2 pro dos. napj. 3—4-szer.
Phosphorus	0,0002—0,0005 pro dos. és pro die.
Pilocarpinum hydrochlor.	Subcutan 1—5 éves gyermek. 0'002—0'005 pro dos. ; 5—12 éves gyermek. 0'006— 0'01 pro dos.
Polygalae senegae rad.	3—5 éves gyermek. decoct. 4'0 : 80,0 2 ór. gyk.
Protojoduretum hydrargyri l. Hydrarg. jodat. flav.	
Pulpa tamarindorum l. Ta- marindus.	
Pulvis Doveri	Nagy vigyázat! Csecsemőnek 0'005— 0,008 pro dos. és 0'025—0'04 pro die; 1—5 éves gyermek. 0'008—0'03 pro dos. 0'04—0'15 pro die ; 6—10 éves gyermek. 0'04 pro dos. 0'2 pro die.
Punicae granati cortex radi- cis	4—8 éves gyermek. 15'0 grmból macerato- decoctum 150,0 vízre : 1 1/2 óra alatt bevenni.

S z e r	A d a g
Pyrogallol	Kenőcs. 1 : 20. (Vigyázat!)
Ratanhae radix l. Extr. ratanh. dep. és tinct. ratanh.	
Rhei chinensis radix.	3—8 éves gyermek. 0·05—0·1 pro dos. 0·25—0·5 pro die.
Sal ammoniacus dep. l. Ammon. chlor.	
Sal. Seignetti l. Kalium natrio-tartar.	
Salep tubera	0·5 : 80,0 decoct. 3 ór. kk. v. gyk.
Salolum	Bels. 0,3—0,5 pro dos. 3—5 × napj.
Santonium	2—4 éves gyermek. 0·02—0·03 pro dos. 0·06—0·08 pro die. 4—8 éves gyermek. 0·03—0·04 pro dos.: 0·09—0·12 pro die.
Senega l. Polygalae senegae radix.	
Solutio arsenicalis Fowleri.	5—12 éves gyermek. 1 gtt. pro die., fokozatosan emelkedőleg 3—5 gtt.-ig pro die oldatban.
Strychnium nitricum	Ne rendeltessék!
Sulfonal	0,25—0·5 pro dos. és pro die mint hypnoticum és 0,1—0,15 pro dos. napj. 3—4-szer mint sedativum.
Sulfur auratum antimonii l. Antimon. sulfur. aurat.	
Syrupus ferri iodati	2—4 éves gyermek. 3—5 gtt. 3—4-szer napjában cukros vízben.
Tamarindus	4—8 éves gyermek. decoctum 10·0 : 100,0 2 ór. gyk.
Tanninum pur. l. Acid. tannic.	
Tannas chinini l. Chinin tannic.	
Tartarus emeticus l. Kalium stibio-tartaricum.	
Tinctura belladonnae	1—5 éves gyermek. 1—3 gtt. : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Tinctura cascarillae	1—2 éves gyermek. 10 gtt. 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Tint. castorei	Mint a tinct. moschi.
Tinct. chinae composita	1—3 éves gyermek. 1·0 : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Tinct. moschi	1—2 éves gyermek. 10 gtt. : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.

S z e r	A d a g
Tinct. nucis vomicae	Csecsemőnek 1 gtt. : 80,0 2 ór. kk.; 1—3 éves gyermek. 1—3 gtt. : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.; 3—6 éves gyermek. 3—5 gtt. : 80,0 2 ór. gyk.
Tinct. opii simplex	Nagy vigyázat! Csecsemőknek 1 gtt. : 80,0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyermek. 2—4 gtt. : 80,0 2 ór. kk. v. gyk.: újszülött- nek az első 2 hónapban ne rendel- tessék.
Tinct. opii crocata	
Tinctura ratanhia	Csecsemőnek 10 gtt. : 80,0 2 ór. kk.
Tinct. rhei aquosa	Csecsemőnek 1·0—2·0 : 80,0 2 ór. kk.
Tinct. rhei vinosa s. Darelli	
Tinct. strophanthi	5 éven aluli gyermek. nem!! 5—10 évesnek 3—4 × napj. 1 csepp. Nagy vigyázat!
Tinct. valerianae spirit.	Csecsemőnek 10 3,0 2 ór. kk. 2—5 éves gyermek 15 gtt. : 80,0 2 ór kk. v. gyk.
Unguentum hydrargyri cine- reum	Bedörzsölési gyógymódra 3—6 éves gyermeknek 0·3—0·5 pro die unguent. simplexszel aa.
Urethanum	Mint sedativum 1—3 éves gyermek. 0,1— 0,3 pro dos. és 0,5—1·0 pro die. Mint hypnoticum 12—18 hónapos gyermek. 0,25, 2—3 évesnek 0,5, 5—6 évesnek 1,0, 10 éven felülének 1,5.
Uvae ursi folia	4—8 éves gyermek. decoct. 5·0 : 80,0 2 ór. gyk.
Valerianae radix	4—8 éves gyermek. infus. 4·0 : 80,0 2 ór. gyk.
Zincum oxydatum	Csecsemőnek 0·02 pro dos., 0·08—0·1 pro die; 2—5 éves gyermek. 0·03— 0·04 pro dos., 0·1—0·15 pro die.
Zincum valerianicum	

IX. Legnagyobb adagai

**a Magyar Gyógyszerkönyv II-dik kiadásába felvett
mérgekként ható gyógyszereknek.**

A Magyar Gyszk. II. kiadásában az általános szabályok 2-dik pontja így hangzik: „Ha valamely gyógyszerből nagyobb adagot rendel az orvos a mellékelt táblában feltüntetett legnagyobb adagnál, a gyógyszerésznek csakis azon esetben szabad a gyógyszer kizsoltgáltatnia, ha annak mennyisége mellé az orvos felkiáltó jelt (!) tett.” „Ezen súlymennyiségeken túl *felőrttek* számára az orvos felkiáltó jel (!) használata nélkül ne rendeljen.” (M. Gyk. II-dik kiadás.)

Szer neve	Grammata		Szer neve	Grammata	
	pro dosi	pro die		pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum	0·005	0·02	Extractum cannabis		
Acidum carbohcum .	0·10	0·50	indicae	0·10	0·30
Aconitum	0·001	0·002	Extractum colocyn-		
Aconitum (tubera) .	0·10	0·50	thidis	0·10	0·40
Amyle nitrosa	0·20	0·60	Extractum hyosci-		
Apomorphinum hyd-			ami foliorum . .	0·15	0·80
rochloricum	0·01	0·05	Extractum nucis vo-		
Aqua amygdalarum			miae	0·04	0·20
amararum	1·00	5·00	Extractum opii . . .	0·05	0·30
Argentum nitricum .	0·03	0·20	Extractum scillae . .	0·20	0·80
Atropinum sulfuri-			Extractum secalis		
cum	0·002	0·006	cornuti	0·25	1·00
Belladonna (radix) .	0·07	0·30	Hydrargyrum bichlo-		
Cantharides	0·05	0·20	ratum corr	0·03	0·10
Chloralhydratum . .	3·00	6·00	Hydrargyrum bijo-		
Chlorodine	1·50	6·00	datum rubrum . .	0·03	0·10
Cocainum hydrochlo-			Hydrargyrum chlo-		
ricum	0·05	0·20	ratum mite	0·50	1·00
Codeinum	0·05	0·20	Hydrargyrum cyana-		
Coffeinum	0·10	0·60	tum	0·03	0·10
Coffeinum citricum .	0·10	0·60	Hydrargyrum joda-		
Colchicinum	0·003	0·01	tum flavum	0·05	0·20
Colocyntiis	0·30	1·00	Hydrargyrum oxy-		
Cuprum sulfuricum .	0·15	0·50	datum flavum . . .	0·03	0·10
Digitalis (folia) . . .	0·20	1·00	Hyosciamus (folia) .	0·20	1·00
Extractum aconiti			Jodoformium (pro		
tuberorum	0·03	0·12	usu interno)	0·30	1·50
Extractum belladon-			Jodum	0·05	0·20
nae radieis	0·05	0·20	Kalium chloricum . .	0·50	5·00

Szer neve	Grammata		Szer neve	Grammata	
	pro dosi	pro die		pro dosi	pro die
Kalium stibio-tartaricum	0·15	1·00	Strychninum nitricum	0·01	0·02
Kreosotum	0·05	0·20	Tinctura aconiti	0·50	1·50
Kusseinum	1·00	3·00	Tinctura belladonnae	1·00	4·00
Lactucarium	0·30	1·00	Tinctura cannabidis	1·00	4·00
Lobelia (herba)	0·50	4·00	Tinctura cantharidum	0·50	1·00
Morphinum	0·02	0·10	Tinctura colchici	2·00	6·00
Morphinum hydrochloricum	0·03	0·12	Tinctura colocynthis	1·00	3·00
Oleum crotonis	0·05	0·10	Tinctura digitalis	1·00	5·00
Opium pulveratum	0·15	0·50	Tinctura jodi	0·20	1·00
Paraldehydum	3·00	6·00	Tinctura nucis vomicae	0·50	1·50
Physostigminum salicylicum	0·001	0·003	Tinctura opii crocata	0·50	2·00
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06	Tinctura opii simplex	0·50	2·00
Plumbum aceticum depuratum	0·10	0·50	Veratrinum	0·005	0·02
Pulvis Doveri	1·00	4·00	Vinum colchici	1·00	3·00
Resorcinum	3·00	10·00	Vinum stibio-tartaricum	0·50	1·50
Sabina (frondes)	1·00	2·00	Zincum aceticum	0·10	0·50
Santoninum	0·10	0·30	Zincum sulfuricum quae emeticum	1·00	5·00
Scilla siccata	0·20	1·00	Zincum valerianicum	0·10	0·50
Secale cornutum	1·00	3·00			
Solutio arsenicalis Fowleri	0·50	1·20			

Függelék.

Legnagyobb adagai

a Magyar Gyógyszerkönyv II-ik kiadása Pótfüzetébe felvett erősen ható gyógyszereknek.

Szer neve	Grammata		Szer neve	Grammata	
	pro dosi	pro die		pro dosi	pro die
Codeinum hydrochlor	0·05	0·2	Strophanthi semina	0·05	0·15
Diuretinum	1·0	8·0	Subphonalum	2·0	4·0
Guajacolum	0·05	0·2	Tinct. Strophanthi	0·5	2·0
Hydrargyrum salicyl	0·03	0·1	Urethanum	3·0	6·0

X. Legnagyobb adagai

a Magyar Gyógyszerkönyv I-ső kiadásába felvett, de
a II-ik kiadás táblázatából kihagyott mérgekként ható
gyógyszereknek.

Szer neve	Grammata		Szer neve	Grammata	
	pro dosi	pro die		pro dosi	pro die
Acidum hydro-cyanicum (Pharm. austr. 1855)	0.05	0.20	Hydrarg. chloratum mite via humida par	0.25	0.50
Amygdalinum in emulsione	—	0.18	Hydrarg. sulfur basicum	0.20	0.20
Aqua laurocerasi	1.5	5.00	Kalium ferrocyanatum flavum	0.10	0.60
Atropinum	0.002	0.006	Morphinum acetis cum	0.03	0.12
Aurum natrio-chloratum	0.03	0.10	Narceinum	0.05	0.10
Conium	0.001	0.003	Natrium arsenicicum	0.002	0.004
Curara	0.15	0.40	Phosphorus	0.001	0.005
Digitalinum (Pharm. gall. et nostrae)	0.002	0.01	Radix hellebori	0.30	1.20
Extractum belladonnae folior	0.1	0.4	Scammonium	0.15	0.60
Extractum conii	0.18	0.6	Semen hyosciami	0.20	1.00
Extractum digitalis	0.10	0.40	Semen stramonii	0.20	1.00
Extractum hellebori	0.10	0.40	Semen strychni nucis vomicae	0.12	0.5
Extractum hyosciami seminum	0.15	0.60	Stibium sulfuratum aurantiacum	0.20	0.60
Extractum lactucae virosae	0.30	0.90	Stibium sulfuratum rubrum	0.10	0.30
Faba St. Ignatii	0.01	0.06	Strychninum	0.007	0.02
Ferrum iodatum	0.06	0.24	Tinctura lobeliae	1.00	3.00
Folia belladonnae	0.15	0.6	Tinctura pulsatillae	0.55	2.20
Gutii	0.20	0.80	Tinctura stramonii	0.55	2.20
			Tinctura veratri virid	0.35	1.40
			Zincum cyanatum	0.005	0.012
			Zincum oxydatum	0.40	1.60

XI. Vénygyűjtemény.

Az árak kiszámítását Dr. Jármay Gyula úr, a budapesti gyógyszerész-grémium elnöke volt szíves eszközölni. A hivatalos gyógyszeres az 1896. évi hiv. árszabvány szerint, a nem hivatalosak pedig a magy. orsz. gyógyszerészegylet által kiadott árszabvány szerint vétettek számításba. A vények árainak kiszámításánál a rendes polgári expeditio vétetett alapul. Oly vényeknél, melyeknél kisebb és nagyobb adagok vannak jelezve, mindig a kisebbnek ára vétetett ki.

H — hivatalos; † — kézi eladásban ki nem adható gyógyszer, melyek a többiektől elkülönítve tartandók; †† — erősen ható mérgek, melyek külön és elzárt helyen tartandók.

Ahol a szövegben az adagok után ! jel látható külön megjegyzés nélkül — *dos maxim. singula*.

H. Absinthii herba. (*Artemisia Absinthium*. Compositae.)

Hatóanyagok: 1) absinthium, jegeczfíthető keserű anyag, 2. illó olaj, mely a camphorral isomer absintholt is magában foglalja. Amarum, excitans. Porban 0,5—1,0 pro dos. napj. 3—4-szer; infusumban 5,0: 150,0 2 ór. evőkanállal. 100,0 — 9 kr.

H. Tinctura Absinthii composita. Amarum. 20—40 csepp napj. 2—3-szor, borban, liqueurben. 10,0 — 8 kr.

1 <i>Rp.</i> Infus. herb. Absinthii 5,0—10,0 1. a. p. ad colat. 150,0 Syr. cort. Aurantior. 10,0 <i>MDS.</i> 2 ór. 1 evőkan. 36 kr.	2 <i>Rp.</i> Tinct. Absinthii comp. 5,0 Tinct. Rhei Darelli 40,0 <i>MDS.</i> 3—4-szer napj. 30—50 cseppet. 60 kr.
---	--

H. Acetanilid. s. Antifebrin. (C_8H_7NO). Szintelen, selyemfényű, szagtalan, rhombicus jegeczlapocskák, csipős ízűek. Vízben nehezen (1:180), borszeszben (erős borban, cognacban), aetherben könnyen oldható. Antipyreticum, antirheumaticum, analgeticum, influenza ellenes; 1 r. acetanilid antipyreticus hatása = 4 r. antipyrinnel és = 2,0 phenacetinnel. Adag 0,1—0,2—0,5 pro dosi 1—2 ór.; 0,5—2,0 pro die porban, tokajiban, cognacban. Gyermekeknek annyi centigm pro dos. a hány éves a gyermek; de 14 éven alul soha 0,1-on felül pro dos. és 0,5-on felül pro die. 1,0 — 2 kr.

3 <i>Rp.</i> Acetanilidi s. Antifebrini 1,0—2,0. Sacchari alb. 3,0. M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10. <i>DS</i> 1—2 ór. 1 port. 41 kr.	4 <i>Rp.</i> Acetanilidi s. Antifebrini 3,0. Pulv. et succi Liquir. aa qu. s. P. pilul. No. 30. <i>DS.</i> 1—2 szemet ór. v. 2 ór. 45 kr.
--	--

- 5 *Rp.* Acetanilidi 1,0. 6 *Rp.* Acetanilidi 0,5.
 Cognac Sacchar. alb. 2,0.
 Syrup. cort. Aurant. aa 30,0. M. f. pulv. div. in dos. aequ.
 M. f. solut. No. 10.
DS. ór. v. 2 ór. 1 evőkan. (0,2). *DS.* 4—5 éves gyermekeknek
 65 kr. 2—3 ór. 1 port.
 41 kr.

Acetophenon seu Hypnon (C_8H_8O). Színtelen, olajszerű folyadék, keserű mandulaolajra s gyöngyvirágra emlékeztető szagú, csipős ízű; vízben nem, borszeszben, chloroformban, aetherben, zsíros olajokban jól oldódik. Egy csepp súlya 0,025. Hypnoticum. Chloralhydrát pótszere. Értéke felől eltérő vélemények. Nem biztos hatású. Helybeli lobokozó hatása folytán vigyázat! Adag 3—6 csepp egyszerre fejetben v. caps. gelat.-ban. 1,0 = 30 kr.

- 7 *Rp.* Hypnoni gtt. 10. 8 *Rp.* Hypnoni gtt. 3—6.
 Olei Amygdal. dulc. Spirit. vini 1,0.
 Gummi arab. pulv. aa 10,0. Syrup. cort. Aurant. 20,0.
 Syr. cort. Aurant. 60,0. *MDS.* Egyszerre bevenni.
 Aquae dest. 120,0. 26 kr.
 F. l. a. emulsio.
DS. Egyszerre felét bevenni.
 79 kr.

- 9 *Rp.* Hypnoni gtt. 12.
 Glycerini 10,0.
MD. in caps. gelat. No. 6.
S. 1—2 tokocsát egyszerre
 bevenni.
 66 kr.

†H. **Acetphenetidín s. Phenacetin.** ($C_8H_9NO_2$). Fehér, fénylő jegeczlapocskák. Szagtalan, iztelen, vízben nehezen, glycerinben könnyebben, borszeszben könnyen oldódik. Antipyreticum, analgeticum, antirheumaticum, influenza ellenes; hasonlóan hat, mint az acetanilid. Antipyreticus hatása = 2 r. Antipyrin hatásával; az antifebrin még egyszer oly hatékony. Egyszeri nagyobb adag p. o. 0,50—0,70—1,00 czélszerűbb, mint ór. vagy 2 ór. kis adagok p. o. 0,15—0,20 (Kobler.) Cognacban, borban is rendelkez Napjában 2,0 gmon felül nem szükséges emelkeni. Anodyn czélból 1,0—1,5 pro dos. és pro die. Gyer. 0,1—0,2 pro dos. 1,0 = 4 kr. 10,0 = 35 kr.

- 10 *Rp.* Phenacetini 5,0. 11 *Rp.* Phenacetini 10,0.
 Div. in dos. aequ. No. 10. Div. in dos. aequ. No. 10.
 Det. in caps. amylac. Det. in caps. amylac.
S. Szükség szerint 1 dbot. *S.* 1 darabot bevenni szükség
 Antipyreticum. szerint
 85 kr. Neuralgia. Hemicrania.
 1 frt. —

H. **Acetum seu Acetum vini.** Eczet. 6% eczetsavat tartalmaz. Lázás betegeknek hűtő mosogatások acetum + víz aa;

kiürítő v. analepticus czélból csőrének 20,0—30,0 eczet + 150,0 víz; száj- és torokvíznek infus. malvae- v. salviae-hez 10,0—20,0. Antidot. chemicum maró és szénsavas égvényekkel mérgezések alkalmával. 100,0 = 3 kr.; 1000,0 = 20 kr.

H. Acetum aromaticum. Füstölő szer; különben úgy használtatik, mint az acetum. 100,0 = 12 kr., 1000,0 = 1 frt

12 Rp. Decoct. rad. Althaeae e	13 Rp. Infus. fol. Salviae s.
10,0.	Malvae e
l. a. p. ad colat. 200,0.	l. a. p. ad colat. 300,0.
Aceti vini 30,0.	Aceti aromat. 10,0.
MDS. Csőrének.	Syr. simpl. 20,0.
36 kr.	MDS. Száj-, torokvíz- 49 kr.

H. Acetum pyrolignosum rectificatum. Barnás színű, eczet- és kátrányszagú folyadék. Vizes oldata eczetsavnak, methylszesznek, brenzcatechinnek, hangyasavnak, kresol-, phenol és kreosotnak. Adstringens, gyenge desiniciens. Küls. üszkös sebek borongatására 1:20. hüvelyirrigatiókra 1:50. Bels. nem 100,0 = 10 kr. 1000,0 = 80 kr.

†H. **Acetum Scillae.** l. Scilla.

††H. **Acidum arsenicosum seu Arsenicum album.** (As. O₃) Fehér, porcellánszerű v. áttetsző darabok; szagtalan; vízben nehezen, borszeszben alig oldódik. Küls. kenőcsben causticum 1:20—30. Bels. pilulában (soha sem üres gyomorba) 0·001—0·005! pro dos. napj. 3—4-szer; 0·02! pro die. 1,0 = 1 kr. (subtil. pulv.).

H. Solutio arsenicalis Fowleri s. Liquor Kalii arsenicosi. Kalium arsenicosum oldata. Színtelen, átlátszó, erősen lúgos kémhatású folyadék. 100 részben 1 r. arsenessav foglaltatik Bels. acid. arsenicosum helyett. Feluőtteknek adag 2—8! csepp pro dos. 2—3-szor napj. (8 csepp = 0·50) nem éhgyomorral! Adagot a dos. maxim. határán belül fokozatosan emelni lehet. Dos maxim. pro die 1·2! Gyermekeknek (5—12 éves) adag 1 csepp pro die oldatban, melyet fokozatosan emelhetni 3—5 cseppig pro die. 1,0 = 1 kr.

14 Rp. Acid. arsenic.	1,0.	15 Rp. Acid. arsen.	0,03.
Cinnabaris fact.	3,0.	Piperis nigri	1,0.
Ungu. emoll.	24,0.	Succi et pulv. Liquir. aa	
M. f. pasta		qu. s.	

DS. Vásonra kenve lupusnál a beteg helyre alkalmazni, s 24 óránként változtatni, míg a lupusgöcsök el nem pörkösödtek. Hebra módosított pasta Cosmi-ja.

54 kr.

ut. f. pilul. No. 30,
DS. Naponta 3-szor 1 szemet. Emelni lehet az adagot 3+3 szemig. Egy pilulában 0·001 acid. arsen. Intermittens malarica, ichthyosis, psoriasis, lymphoma malignum, chlorosis. 43 kr.

- 16 *Rp.* Acid. arsenic. 0,5.
Morphini hydrochlor. 1,5.
Kreosoti. qu. s.
ut. f. pasta.

DS. Fogideget őrölt pasta, fogorvosok számára; belőle a fogba gombostűfejnyi helyezendő, az ür gyapottal s foggyantával elzárandó

67 kr. (SCHEFF).

- 18 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri 5,0.
Tinct. amaræ 10,0.
MDS. 3-szor napj. 3—9 cseppet.

Lymphoma, lymphosarcoma, tuberculosis, scrophulosis, idült bőrbajok, neuralgiák, malaria, diabetes, chorea.

23 kr.

- 17 *Rp.* Acid. arsen. 0,12.
Chinini sulf.
Extr. Gentianae aa 4,0.
M. f. pilul. No. 60.

DS. Napj. 2 szemet; fokozatosan emelkedhetni 6 szemig pro die.

Asthma nervosum.

79 kr. (BAMBERGER.)

- 19 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri 2,0.
Tinct. Ferri pomati
Aquæ Menthae piper.
aa 50,0.

MDS 3-szor napj. 1 kk.

Chlorosis, idült bőrbajok.

73 kr.

- 20 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri
Tinct. Valerianæ aa 1,00.
MDS. Napj. 3-szor 5—10 cseppet.

Gyerm. diabetes insipidus.

29 kr.

- 21 *Rp.* Sol. arsen. Fowleri gtt. 2.

Aqua dest. 30,0.

MDS. Reggel, este 1 evőlk.

5—12 éves gyermek. chorea minor esetén. Minden 3-ik nap egy cseppel növeljük az adagot, felmenve 8 cseppre pro die; ezen arányban a víz mennyisége is szaporítandó 60,0-ig. 8 cseppről ismét visszatérünk 2 cseppig. 2—3 ily turnust végeztethetünk. Torokfájás, emésztési zavarok esetén a szer néhány napra kihagyandó. 18 kr.

II. Acidum benzoicum seu Flores Benzoes

($C_7H_6O_2$). Fehér-sárgás, lemezes v. tűalakú, selyemfényű, benzoegyantához hasonló szagú jegeczekből álló por. Vízben nehezen, borszeszben, aetherben könnyen oldódik. Expectorans, excitans. Bels. osztályban, labdacásban 0,05—0,3 pro dos. napj. többször. Bőr alá fecskendezve híg borszeszes oldatban, de fájdahtas. (ROHDE) 1,0 = 9 kr.

- 22 *Rp.* Acid. benzoici 0,5—2,0.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 1—2 ór. 1 port.

44 kr.

- 23 *Rp.* Acid. benzoici
Rad. Ipecac. pulv. aa. 1,0.
Pulv. et. extr. Liquirit.
aa qu. s.

F. pilul. No. 30.

Cousp. cum. pulv. Liquirit.

DS. 2 ór. 1—2 szemet.

Expectorans. 53 kr.

24 *Rp.* Acid. benzoici
 Camphor. trit. aa 0,5
 Sacchar. alb. 4,0.
 M. f. pulv. div. in. dos.
 aequ. No. 10.
DS. 1—2 ór. 1 port.
 Excitans. 46 kr.

26 *Rp.* Acid. benzoici 3,0
 Camphor. trit.
 Sulfur. aurat. Antimonii
 aa 0,5.
 Elaeosacchar. Foenic.
 5,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No 10.
D. in chart. cerat.
S. 2 ór. 1 port.
 Expectorans tiúdvizenyőnél.
 83 kr. (BEHREND'S).

H. **Acidum boricum** [B(OH)₃]. Fehér, lemézes, gyöngyházfényű, alig savanyú ízű jegoczpor. 25 r. hideg, 3 r. forró vízben, 15 r. borszeszben oldódik. Antisepticum. Bels. ritkán (hányásnál, sarcina ventriculi esetén); adag porban 0,3—1,0 pro dos. vagy 3%-os vizes oldatban övökanalanként; pro die 1,0—3,0. Helybeli s külső használatra: sebkezelésnél, torok- és szájvíznek 2—4%-os oldat, hólyagmosásra 2%-os langyos oldat; gégebe, fülbe befúvásokra porítva, kenőcsökhöz 1 : 5—10. Ára 10,0 = 4 kr. (crystall) v. 10,0 = 5 kr. (pulver.)

28 *Rp.* Acid. borici pulv.
 Cerae alb aa 5,0.
 Olei Amygdal. dulc.
 Paraffini aa 10,0.
 M. f. ungu.
DS. Kenőcs. (LISTER).
 47 kr.

30 *Rp.* Acid. borici.
 Sulfur. praecip. aa 1,0.
 Vaselinei 48,0.
 M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Herpes tonsu-
 ransnál 2-szer napj. a beteg
 helyeket szappannal lemosás
 után bedörzsölni. (BESNIER).
 54 kr.

25 *Rp.* Acid. benzoici 1,5.
 Camphorae 1,0.
 Spirit. dil. 12,0.
MDS. Bőr alá fecskendésre.
 Egyszerre 1 fecskendővel.
 Excitans. (ROHDE).
 38 kr.

27 *Rp.* Acid. benzoici.
 Moschi aa 0,5.
 Sacchar. alb. 4,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port.
 Excitans.
 2 frt 90 kr.

29 *Rp.* Acid. borici 10,0.
 Vaselinei 50,0.
 M. f. ungu.
DS. Kenőcs égési sebekre.
 60 kr.

31 *Rp.* Acidi borici 10,0.
 Aquae dest. 500,0.
MDS. Hólyagmosásra Hasz-
 nálat előtt langyosra mele-
 gitendő. 63 kr.

32 *Rp.* Acid. borici 6,0.
 Aquae font. 300,0.
 Olei Menthae pip. gtt. 3.
MDS. Száj-, torokvíz.
 41 kr.

33 Rp. Acid borici	0,5.
Lanolini	50,0.
Vaselini	10,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs.

Intertrigo. 72 kr.

Acidum camphoricum. $[C_6H_5 \cdot C_2H_5 \cdot (COOH)_2]$. Szintelen jegeczlapok, v. fehér, savanyú-keserű, szagtalan por. 140 r. hideg, 8 r. forró vízben, 13 r. borszeszben old. Izgató, desinficiáló, összehúzó és veritékellenes szer. Utóbbi hatása bels. is. Haszn. garat, gége, orr hurutos, fekélyes bántalmainál, cystitisnél $\frac{1}{2}$ —2%-os oldatok helybelileg spray, ecsetelés, kifeeszkendés alakjában; idült folyamatoknál erősebbek. Befűvásra 2—3%-os porkeverék. Antihydroticum bels. 2,0—3,0 este többször. 1.0 = 12 kr.

34 Rp. Acid. camphorici 10,0.

Div. in dos. aequ. No. V.

DS Este 1—2 port. Phthisicusok izzadása ellen.

1 frt 42 kr.

† **H. Acidum carbolicum seu Acid. phenylicum, s. Phenolum** $[C_6H_5(OH)]$. Fehér, v. kissé vöröses, áttetsző, jegeczes tömeg; szaga jellemző, íze maró. 35—40° C.-nál megolvad. Oldható 20 r. vízben, borszeszben, aetherben, chloroformban, glycerinben, zsíros és illó olajokban minden arányban.

Antisepticum, antirheumaticum. Bőrrel, nyálkahártyákról, sebekről könnyen felszívódik, ezért vigyázat! különösen gyermekeknél! Sebek mosására, öblítésére, borogatásokra, eszközök tisztítására 2½—5%-os oldatok, hólyagmosásra, húgycsőbe fecskendésre $\frac{1}{2}$ —1%-os oldat, torok-szájvíznek 1%-os, belégzésre permete alakjában $\frac{1}{2}$ —1%-os, bőr alá fecskendésre, v. parenchymába befecskendésre 1—2%-os oldatok. Catgut 10%-os olajoldatban, szivacs, draincsövek, selyem 5%-os vizes oldatban tartandók. Belsőleg 0.01—0.10! pro dos. napj többször. Dos. maxim. pro die 0.5! 10,0 = 3 kr. 100.0 = 21 kr.

35 Rp. Acid. carbol 3,0—15,0.
Aquae dest. 300,0.
MDS. Külsőleg. Sebkezeléshez 36 kr.

36 Rp. Acid. carbol. 1,0—2,0.
Olei Terebinth. 30,0.
MDS. Külsőleg.

3—4-szer napj. a torok ki-ecsetelendő diphtheritisnél; a bőr ecsetelendő erysipelasnál. 27 kr.

37 Rp. Acid. carbol.
Collodii aa 5,0.
MDS. Caries dentiumnál gypotra felvéve a fogűrbe.
23 kr.

38 Rp. Acid. carbol. 1,0.
Ungu. simpl. 10,0.
M. f. ungu.
DS. Bőrre dörzsölni para tis-cus bőrbántalmaknál.
33 kr.

- 39 *Rp.* Acid. carbol. 5,0.
Spiritus 10,0.
MDS. 5—8 cseppet a Curschmann-féle álarcz segélyével belélegezni.
Gangraena pulmon. Bronchitis foetida.
23 kr.
- 40 *Rp.* Acid. carbol. 2,0.
Aqua dest. 150,0.
Olei Menthae pip. gtt. 5.
Spiritus dil. 20,0.
MDS. Belégzésre. Siegle-féle készülékkel. Gangraena pulmon. Abscessus pulmon. Bronchitis foetida.
36 kr.
- 41 *Rp.* Acid. carbol. 0,2.
Aqua dest. 10,0.
M. filtra.
DS. Bőr alá fecskendésre.
1/2—1 fecskendővel polyarthrititis rheumaticánál a fájdalmas ízület tájékán fecskendeztessék be.
23 kr.
- 42 *Rp.* Acid. carbol. Ammon. pur. liquid. aa 5,0.
Spiritus.
Aqua dest. aa 10,0.
MDS. Szaglószer heveny orvyszánál.
29 kr.
- 43 *Rp.* Acid. carbol. 0,5.
Aqua dest. 150,0.
MDS. 2 ór. 1 evőkan.
Gyomorban székelő erjedés ellen. 29 kr.
- 44 *Rp.* Acid. carbol. 1,5.
Extr. Liquir. dep.
Pulv. rad. Liquir. aa qu. s. ut. f. pilul. Nr. 30.
Consp. pulv. Liquir.
DS. 2 ór. egy szemet.
Prurigo, psoriasis.
42 kr.
- 45 *Rp.* Acid. carbol. 5,0.
Aqua dest. 150,0.
Aqua Menthae pip. 50,0.
MDS. 2—4-szer napi. 1 klk.
Diabetes mellit. (EUSTERN.)
38 kr.

†H. **Acidum carbolicum crudum.** Sárgásbarna folyadék. Csupán desinfectióra használtatik (tárnyékszékek, pöczegődrök, istállók stb.) vízoidatban (5%) v. gypsszel, szénmel, krétával porrá alakítva. Jó keverék p. o. acid. carbol. crud. 2 r. calcium hydroxyd. 5 r., gypsum ust. 20 r., kőszén 10 r., Szobák meszelésére 100 r., mésztejhez 2 r. acid. carbol. crud. 100,0 = 7 kr., 1000,0 = 60 kr.

†H. **Acidum carbolicum liquidum.** Ebből 1,1 grm. = 1,0 grm. acid carbol. cryst. 10,0 = 3 kr.

II. **Aqua carbolata.** 1%-os oldat. 100,0 = 3 kr., 1000,0 = 25 kr.

Carbolas kötözőszerek.

II. **Gaze carbolatum album Listeri.** 1 meter = 30 kr., 5 meter = 130 kr., 10 meter = 270 kr.

- H. Tela sericea protegens.** (Silk protective Listeri 600□ cm. = 40 kr., 1200□ cm. 80 kr.)
H. Lana Gossypii carbolata (carbolvatta) 10,0 = 13 kr.
 25,0 = 20 kr., 50,0 = 33 kr., 100,0 = 60 kr.)
H. Chorda carbolata. (Catgut.) Egy üveggel = 70 kr.
H. Filum sericeum antisepticum. (Carbolos varró-selyem). Egy üveg = 42 kr.)
H. Tubuli praeparati carbolati. (Drainage-csövek).

Acidum chloro-nitrosus s. Aqua regia. Keverék, melyben acid. hydrochlor. conc. 3. r. acid. nitric. conc. 1 r. foglaltatik. Csupán lábfürdőkhez icterus chronicus esetén. (30,0—50,0: 10—30 liter vízre. Fekád!) 10,0 = 3 kr.

†**H. Acidum chromicum** (CrO_3). Piros, fénylő, szagtalan, légen elfolyósodó prismaticus jegeczek; vízben, borszeszben jól oldódik. Causticum. Küls. condylomák, szemölcsök, teleangiectasiák, polypusok étetésére. Kutaszra ráolvasztandó. Ha oldatban alkalmaztatik, a környező bőr v. nyálkahártyafelület védelmi szempontból olajjal beecsetelendő. Bels. nem. 1,0 = 2 kr.

46. *Rp. Acid. chromici.*

Aquae dest. $\overline{\text{aa}}$ 5,0.

MD. in vitro cum epist. vitro bene clauso.

S. Külsőleg edzésre. 41 kr.

Acidum cinnamylicum ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH}$). Színtelen (!) jegeczlapocskák, hideg vízben nehezen, forróban könnyen, borszeszben, aetherben, glycerinben, olajban, boraxtartalmú vízben könnyen oldódik. Iztelen, kellemes szagú. Antituberculosis hatásának mondják (Landerer). gégetuberc. ecsetelésre, lupusgücsökhöz fecskendésre 1:10 borszeszre; tályogokba fecskendésre 1:10—20 glycerinre; izületekbe fecsk. 5%-os égvényes emulsió. U. ez intravenosus befecsk. Ezekből 0,1—0,3—0,5 köbet. használtassék el egyszerre, 2—4 naponként ismételve az adagot. 1,0 = 10 kr.

47 *Rp. Acid. cinnamyl.* 1,0

Cocaini hydrochlor 0,5.

Spirit. vini 20,0.

MDS. Lupusgücsökbe egyszerre 2—3 csepp fecskendezendő.

82 kr.

48 *Rp. Acid. cinnamyl. pulv.*

5,0.

Olei Amygdal. dulc. 10,0.

Vitellum ovi unius

Solut. Natr. chlor. (0,7%)

qu. s

ut. f. emuls. 100,0.

DS. Befecskendésre.

0,1 kctm. haszn. egyszerre;

emelkedni lehet 0,3—0,5

kctm-ig.

93 kr.

H. Acidum citricum ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$). Nagy, szintelen, rhombos-jegeczek, savanyú ízűek, vízben, borszeszben jól oldódnak. Gyenge

antipyreticum, inkább hűtőszert; substantiában kevésbé maró. Bels. oldatban adag: 2,0—5,0 : 150,0 2 ór. 1 evőlk. Saturatiókhoz succus citri helyett; 1,0 szénsavas sőt helyt 0,65 acid. citricum. 10,0 (crystall) = 10 kr., 10,0 (pulv.) = 10 kr.

H. Acidum hydrochloricum dilutum (HCl). (Tömény sósav 4 r. + víz 6 r.) Vízfőzta, savanyú folyadék. Bels. mint gyenge antipyreticum 2,0 : 150,0, 2 ór. 1 evőlk. Digestivum dyspepsiák bizonyos eseteiben; adag 10—15 csepp 1 pohár vízre, ez étkezés közben fogyasztandó el. 10,0 = 2 kr. 100,0 = 15 kr.

49 *Rp.* Acid. hydrochlor. dil. 2,0.
Aquae dest. 150,0.
Syrup. Rubi Idaei 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evőlk.
28 kr.

50 *Rp.* Acid. hydrochlor. dil. 20,0.
D. in vitro cum epist.
vitreo bene clauso.
S. 10 cseppet 1 vörösborsos
pohár vízre. 24 kr.

51 *Rp.* Acid. hydrochlor, dil. gtt. 5—8.
Aquae dest. 80,0.
Syrup. simpl. 8,0.

MDS. 2 ór. 1 ktk., — gyk.
Gyermekek dyspepsiájánál, ha a hányadék alcalicus kényszerű.

H. Acidum lacticum ($C_3H_5O_3$). Szüntelen, szörpsűrűségű, savanyú, szagtalan folyadék; vízben, borszeszben, aetherben, glycerinben jól oldódik. Oldja a croupphartyát. Töményen maró. Concentráltabb oldatokban gümös gégefekélyek edzésére. Bels. mint hypnoticum megbízhatlan; diabetes mellit. nál CANTANI ajánlotta. Adag: belégzésekre 5,0—10,0 : 200,0. Bels. 5,0 : 150,0. 1,0 = 3 kr. 10,0 = 25 kr.

52 *Rp.* Acid. lactici 10,0.
Aquae dest. 200,0
MDS. Belégzésre (Siegle-féle porlasztóval) $\frac{1}{2}$ —1 óránként. Croup. diphtheritis.
54 kr.

53 *Rp.* Acid. lactici 30,0.
Apuae dest. 30,0.
MDS. Gümös gégefekélyek ecsetelésére.
92 kr.

54 *Rp.* Acid. lactici 5,0.
Aquae dest. 150,0.
Syrup. cort. Aurant. 50,0.
MDS. 3-szorra ollogasztani 1 nap alatt.
Diabetes mellit.
53 kr.

55 *Rp.* Acid. lactici 5,0.
Sacchar. alb. 50,0.
Tragacanth. pulv. 0,1.
Aquae dest. glycerinatae 50 qu. s.
ut. f. pastilli No. 50.
DS. Étkezés előtt 2 dbot.
Dyspepsiájánál sósav helyett.
62 kr.

56 *Rp.* Acid. lactici 0,5—1,0
 Aquae dest. 60,0.
 Syrupi simpl. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. Kisebb
 gyermek és csecsemők heveny
 gyomor- és bélhurutja esetén.
 26 kr.

†H. **Acidum nitricum concentratum purum** (HNO_3). Színtelen, maró, hevítve olillanó folyadék. Küls. láb-fürdőkhez icterus chronicus esetén, mint az acid. chloro-nitrosum. Mint causticum condylomák, szemölcsök, marási sebek, méhszáji erosiók, noma étetésére; üvegbot v. üvegecsét! Bels. nem. 10,0 = 3 kr. 100,0 = 22 kr.

Acidum nitricum fumans. Keveréke légenysavnak és allégenysavnak. Pirosas-barnás v. sárgás. fűtő szagú, sárga gőzöket bocsátó folyadék. Küls. mint az acid. nitr. conc. pur. Bels. nem. 10,0 = 3 kr.

II. **Acidum nitricum dilutum.** (200,0 töm. légenysav + 800,0 víz). Küls. edzésre. Bels. gyenge antipyreticum; adják morbus Brighti-nél és icterus catarrh. chron.-nál is. Adag oldatban: 1,0—2,0: 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 2 kr., 100,0 = 14 kr.

57 *Rp.* Acid. nitrici dil. 2,0. 58 *Rp.* Acid. nitrici dil. 15,0.
 Aquae dest. 150,0. Aquae dest. aa
 Syrupi simpl. 20,0. *MDS.* Külsőleg.
MDS. 2 ór. 1 evők. Fagydagاناتok 2 × napj.
 31 kr. üvegecséttel ecsetelendők.
 19 kr.

Acidum oxynaphtoicum s. α Naphtolcarbolsav. ($C_{11}H_7O_3$). Színtelen, finom jegecztűk; naphtolszagú; hideg vízben nem, forróban is rosszul oldódik, alkoholban 10% feloldható, glicerumban 1 1/2%. Antisepticum. 5-ször erősebb mint a salicylsav. Nagy adagban mérgező (!) Bels. nem. Küls. edények, árnyékszékerek fertőtlenítésére substantiában; sebek, stb. kezelésénél 1/3—1%-os oldatok. Kenőcsök 1: 20. Collodiumban 0,5: 100. 1,0 = 3 kr.

Acidum phenylo-aceticum. ($C_6H_5-CH_2-COOH$). Fehér, fénylő, meleg vízben, borszeszben, aetherben oldh. 1/2%-os oldata a tuberculosus genyet fertőtleníti. Tuberculosis esetén Williams ajánlja a tömény szesz oldat 10 cseppjét 30 gm. vízben napj. 3-szor. Lehet emelkedni 20 cseppig.

Acidum phenylo-propionicum. ($C_6H_5-CH_2-CH_2-COOH$). Fehér, finom jegeczek; oldékonyság, használat mint az acid. phenylo-acet.-nál.

H **Acidum phosphoricum.** (H_3PO_3). Orthophosphorsav vizes oldata. Színtelen, szagtalan, savanyú folyadék. Bels. gyenge antipyreticum. Adag 2,0—4,0: 150,0, 2 ór. 1 evők. 10,0 = 4 kr.

59 *Rp.* Acid. phosphor. 3,0.
 Aquae dest. 130,0.
 Syrup. Rubi Idaei 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők. mérsé-
 kes lúznál.
 30 kr.

60 *Rp.* Decoct. tuber Salep. e 1,5.
 l. a. p. ad colat. 120,0.
 Acid. phosphor. 3,0
 Tinct. Opii simpl. 1,0
 Tinct. Cinnamomi 10,0.
 Syrup. cort. Aurant. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
 Menorrhagia. metrorrhagia.
 47 kr.

61 *Rp.* Acid. phosphor. 1,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

Gyermekeknek cystitis catarrh-
 nál alkalikus kémhat. vizelet
 esetén 26 kr.

†H. Acidum pyrogallicum s. Pyrogallolum

($C_6H_2O_5$). Fehér, könnyű, erősen fényleő, lemez vagy túalakú
 jegeczek. Vízben elég könnyen, borszeszben, aetherben igen jól
 oldódik. Bels. nem. Küls. némely idült bőrbaj ellen kenőcs 1:
 10—20. Nagyobb bőrfelületeket óvakodjunk bekenni, felszívódik
 a bőrön át, vesevérzéssek nem ritkák. Phagedaenicus fekélyekre
 hintőpor alakjában 1,0 = 7 kr.

62 *Rp.* Acid. pyrogallici 1,5—3,0.
 Vaselinei 30,0.
 M. f. ungu
DS. Kenőcs.
 Psoriasis lupus.
 52 kr.

63 *Rp.* Acid. pyrogallici 10,0.
 Amyli 40,0.
 M. f. pulv. det. in vitro
 cum epist. vitreo clauso.

S. Hintőpor.

Kautschuk-ballon segítségével
 1—3 millimeter vastagon
 ráhinteni phagedaenicus
 fekélyre, gyapottal befűdni.
 1 frt 16 kr.

(VIDAL.)

64 *Rp.* Acid. pyrogallici 3,0.
 Axung. porci 2,0.
 Lanolini 20,0.
 M. f. ungu.
DS. Kenőcs. Psoriasis, Eczema
 margin. 63 kr.

H. Acidum salicylicum crystallisatum ($C_7H_6O_3$).

Fehér, túalakú jegeczekből álló por, íze édeses-savanyú, fanyar;
 538 r. hideg vízben oldódik, melegben könnyebben, glicerinnben,
 borszeszben igen könnyen. Küls. mint antisepticum. Kenőcsbőz
 1: 20—30; sebmosó vízhez 1: 300, hintőporba 1: 30 talcum, v.
 amyllum, v. bolus alba-hoz, hólyagmosásra 1: 500—1000. Bels.
 antipyreticum, antirheumaticum, de helybeli maró hatása miatt
 ma már ritkán rendelik, helyette sokkal czélszerűbb a natr.
 salicyl. vagy a salol. 1,0 = 2 kr. 10,0 = 15 kr.

- 65 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
 Axung. porci 2,0.
 Lanolini 7,0.
 M. f. ungu.
D.S. Kenőcs.
 Eczema, ichtyosis.
 35 kr. (RABOW.)
- 66 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
 Vaselini 25,0.
 Amyli
 Zinci oxyd aa 12,5.
 M. f. pasta.
D.S. Külsőleg.
 Eczema. (LASSAR).
 52 kr.
- 67 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
 Vaselini 30,0.
 Tint. Benzoës 2,0.
 M. f. ungu.
D.S. Kenőcs, 3-szor napi.
 használandó.
 Atonicus fekélyek, eczema
 capitis. 45 kr.
- 68 *Rp.* Acid. salicyl 1,0.
 Collodii flexil. 10,0.
M.D.S. Külsőleg ecsetelésre
 Tyúkszemek kiirtására
 27 kr.
- 69 *Rp.* Acid. salicyl. 3,0.
 Amyli 10,0.
 Talci venet. 87,0.
 M. f. pulv. det in scatul.
S. Hintőpor. Lábak izzadása,
 phthisicusok éjjeli izzadása
 ellen. 38 kr.
- 70 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0
 Aquae dest. 500,0
M.D.S. Hólyagmosásra. Hasz-
 nálat előtt langyosra mele-
 gitendő. 42 kr.
- 71 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
 Acid. borici 6,0.
 Aquae dest. ferv. 300,0.
M.D.S. Sebkitőzéshez. Hasz-
 nálat előtt langyosra mele-
 gitendő. 47 kr.
- 72 *Rp.* Acid. salicyl. 2,0.
 Amyli 10,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
S. Hintőpor.
 Gyermekeknek. Ompha-
 litis, ulcus umbilci.
 24 kr.
- 73 *Rp.* Acid. salicyl.
 Lanolini
 Ol. Terebinth aa 10,0.
 Axung. porci 70,0.
 M. f. ungu.
D.S. Este bedörzsölni. Poly-
 arthritis. (BOURGET.)
 73 kr.

Salicylsavas kötözőszerek.

- H. **Lana Gossipii salicylata.** (4%). (Salicylvatta.) 10,0 = 13.
 25,0 = 20 kf. 50,0 = 33 kr. 100,0 = 60 kr.
Gaze salicylatum. Nem hiv.
Acidum sozolicum l. Aseptolum.

†H. **Acidum sulfuricum concentratum** (H_2SO_4). Színtelen, szagtalan, olajszerű folyadék. Mint gyógyszer neir. haszn. 10,0 = 2 kr., 100,0 = 18 kr.

H. **Acidum sulfuricum dilutum**. (Tömény kénsav 106,4 gm., + víz 1000 gm.) Színtelen, áttetsző folyadék. Küls. mint izgató, összehúzó vérzékeny fekélyekre 1 : 10—30. Bels. gyenge antipyreticum; szokásos szer palpitation cordis nervosa, menorrhagia, metrorrhagia eseteiben. Adag 2,0—3,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 1 kr., 100,0 = 7 kr.

74 *Rp.* Acid. sulfur. dil. 50,0.
Aceti 300,0.
Spir. dil. 130,0.
Mel. dep. 100,0.
MDS. Külsőleg
(Aqua vulneraria Thedeni.)
76 kr.

75 *Rp.* Acid. sulfur. dil. 2,0.
Aquae dest. 130,0.
Syrup. Rubi Idaei 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
30 kr.

76 *Rp.* Acid. sulfur. dil. gtt. 10.
Aquae dest. 80,0.
Syrup. Rubi Idaei 20,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
3—6 éves gyermekeknek.
26 kr.

77 *Rp.* Decoct. cort. Chinae
succirubr. e 4,0.
l. a. p. ad colat. 100,0.
adde
Acid. sulfur. dil. gtt. 10.
Syrup. cort. Aurant. 15,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
5 éven túli gyermekeknek
morbus maculosus Werlhofii
esetén. 40 kr.

†H. **Liquor acidus Halleri s. Elixirium acidum Halleri**. (Spiritus conc. 150 gm. + acid. sulfur. conc. 50 gm.) Átlátszó, sárgás színű, szesz és aether szagú folyadék. Küls. a bőr mosogatására urticariánál 1 : 100; scorbuticus foghús ecsetelésére 1 : 10. Bels. mint az acid. sulfur. dilut., melynél az étvágyat állítólag kevésbé rontja. 10,0 = 3 kr.

78 *Rp.* Liquor. acid. Halleri 4,0.
Syr. Rubi Idaei 60,0.
MDS. 1 kk. — gyk. egy pohár
vízre, napj. 2-szer
Középkorú gyermekeknek
haemophilia esetén.
35 kr.

79 *Rp.* Liquor acid. Halleri
Tinct. Opii crocatae aa 2,0.
Tinct. Cinnam. 15,0.
MDS. 2 ór. 20 cseppet tokai po-
hárnyi vízben. Metrorrhagia.
28 kr.

Acidum sulfurosum. (SO_2). Keletkezik, ha ként elégetünk. Színtelen, fojtó szagú gáz. Erős desinticiens. Helyiségek desinfectiójára 1 köbméter légtérre 9—10 gm. kén kell, mely agyagedényben égetendő el; lehet a kén szénporral keverve vastálczán is elégetni. Egyidejűleg vízgőzőket is fejlesztünk. Vigyázat, fulladást okozhat(!). Bels. az 5%-os vizes oldat Angliában gyakran

használtatik e név alatt, gyomorban erjedés, typhus abdom., scarlatina, cholera eseteiben; adag ezen készítményből: 0,5—4,0 pro dos. 3—4 $\times$ napj. erősen hígítva. 5%-os oldatból 10,0 = 2 kr.

H. Acidum tannicum s. Tanninum ($C_{14}H_{10}O_6$, H_2O).

Sárgás fehér, fanyar, ü-szehúzó ízű por. Egyenlő mennyiségű langyos vízben, kétannyi borszeszben oldódik, 6 r. glicerinben. Adstringens, stypticum. Küls. száj-, torok-, szemviznek, klysmának, húgycsőbe fecskendésre, hólyagmosásra 1 : 100—200, permete alakjában belégzésre 0,5—4,0 : 200, kenőcsbe 1 : 5—10, torok, gége ecsetelésére 1 : 5—10. Choléránál Cantani-féle enteroclysis céljaira 5,0—20,0 : 1500—2000 38—40 °C vízre 20—30 csepp. tinct. opiival. Bels. 0,05—0,5 pro dos. többször napj. porban, pilulában. Gyomoremésztést megrontja, pepsint, peptonokat lecsapja. 1,0 = 2 kr., 10,0 = 12 kr.

80 Rp. Acid. tannici 1,0.

Aquae Amygdalar. amar. 20,0.

Aquae dest. 100,0.

MDS. Szemviz.

Conjunctivis catarrh.

42 kr. (DESMARRES)

81 Rp. Acid. tannici 2,0.

Ungu. simpl. 20,0—30,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs.

Méhszáji erosióknál tampo-
nirozásra.

40 kr.

82 Rp. Acid. tannici 1,5.

Butyri Cacao. qu. s. (10,0)

ut. f. l. a. suppositoria

No. 5.

DS. Tanninesapocskák.

62 kr.

83 Rp. Acid. tannici 0,2—1,0.

Aquae dest. seu Vini rubr.

200,0.

MDS. Húgycsőbe befecsken-
désre.

30—84 kr.

84 Rp. Acid. tannici 0,3—0,4.

Pulv. Doveri. 0,1—0,3.

Sacchar alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

1—5 éves gyermekeknek bél-
hurut esetén.

43 kr.

85 Rp. Acid. tannici 2,0.

Pulv. Doveri 1,0.

Elaeosacchar. Menth. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 por.

Felnőttnek diarrhoeánál.

52 kr.

86 Rp. Acid. tannici 0,3—0,5.

Sacchari alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

1—5 éves gyermeknek neph-
ritis scarlatinosa esetén.

41 kr.

87 Rp. Acid. tannici 1,0.

Opii pur. 0,5.

Extr. Nucis vom. 0,15.

Extr. Cascariillae qu. s.

(3,0)

ut. f. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Cassiae Cin-
namomi.

DS. 3 $\times$ napj. 3 szemet.

Diarrhoea (GERHARDT.)

67 kr.

88 Rp. Acid. tannici 3,0.
 Extr. Aloes aquos. 1,0.
 Extr. Graminis qu. s.
 ut. f. pilul. Nr. 100.
 Consp. Lycopod.
DS. 3 × napj. 4 szemet.
 Morbus Brighti.
 61 kr. (FRERICHS.)

90 Rp. Acid. tannici 0,2—0,5.
 Aqua dest. 90,0.
 Vini tokayens. 15,0.
 Glycerini 10,0.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 2—4.
MDS. 2 ó. 1 kk.
 Gyermeknek catarrh. intest. chron. esetén.
 59 kr. (GERUARDT.)

89 Rp. Acid. tannici.
 Chinin. sulfur. aa 2,5.
 Bals. peruviani 1,0.
 Aquae coloniensis 5,0.
 Ung. rosati. 50,0.
 M. f. ungu.

DS. Hajkenőcs. Hajhullás
 ellen. 1 frt 4 kr.

91 Rp. Acid. tannici 4,0.
 Aquae picis 80,0.
 Aquae dest. 400,0.
MDS. Permete alakjában
 belégzésre. Bronchiectasia,
 bronchitis putrida.
 54 kr. (WALDENBURG.)

H. Acidum tartaricum. ($C_4H_6O_6$). Hasábalakú, gyakran kéreggő összenőtt, színtelen, áttetsző, légálló jegeczek; íze savanyú. Oldódik — sr. vízben, $2\frac{1}{2}$ sr. borszeszben. Használat, adag, mint az acid. citricumnál. 10,0 = 4 kr. (crust.) 10,0 = 5 kr. (pülver)

†**H. Aconitum Napellus. Tubera.** (Ranunculaceae). Hatóanyagai 1. aconitin. 1. alant. 2. pseudoaconitin. Nem használtatik; helyette készítményei.

†**H. Extractum Aconiti.** Borszeszes kivonat dextrinnel szárítva; fájdalomcsillapító neuralgiáknál; haszn. mind küls., mind bels. Kenőcshöz 1 : 5—10. Bels. 0,005—0,03! pro dos., 0,025—0,12! pro die. Változó erélyű megbízhatatlan készítmény. 1,0 = 7 kr.

†**H. Tinctura Aconiti.** Haszn. mint az extractum. Adag bels. 3—5 csepp pro dos. többször napj. Dos. maxim. sing 0,5! Dos. maxim. pro die 1,5! 10,0 = 7 kr.

††**H. Aconitinum germanicum.** $C_{30}H_{47}O_7N$). Fehér v. sárgás, szagtalan por, keserű, égető ízű; hideg vízben kevésbé, forróban 50—60 részben, borszeszben, sósavas vízben jól oldódik. Haszn. mint az extr. Aconiti. Küls. kenőcshöz 0,02—0,04 : 10,0, melyből borsónyi használandó el egyszerre. Bels. 0,0005—0,001! pro dos. 2—3 × napj. Rendkívül heves mérég. Haszn. nélkülözhető. Dos. maximum. pro die 0,002! 0,01 = 2 kr.

92 Rp. Aconitini german. 0,05.

solve in

Chloroform. qu. s.

adde

Ungu. emollient. 20,0.

M. f. ungu.

DS. Aconitin-kenőcs. Subsigno veneni. Borsónyi használandó el. 2 × napok.
 Neuralgia. 58 kr.

Adonis vernalis. Herba. (Ranunculaceae). Hatóanyaga az adonidin (glucosida), melynek vegyképlete még nincs pontosan meghatározva. Hatása mint a fol. digitalisé, de erősebb diureticum, s e tekintetben közel áll a scillához. Nem cumulativ hatású. Adag: infus. 3,0—6,0: 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 5 kr.

Adonidinum. Színtelen, v. feliéres-sárga, amorph por, keserű, borszeszben jól, vízben aetherben kevésbé oldódik. Hatás, mint a herba Adonis vern. Adag porban, pilulában 0.005 pro dos. 2—4-szer napj. 0,01 = 6 kr.

93 Rp. Infus. herb. Adonis vern.
e 3,0—6,0.
l. a. p. ad colat. 140,0.
Oxymel Scillae 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
37 kr.

94 Rp. Adonidini 0,15.
Pulv. et extr. Liquirit.
qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquir.
DS. 3 ór. 1 szemet.
1 frt 32 kr.

H. Aether aceticus ($C_2H_4O_2$). Tiszta, átlátszó, könnyen mozgó, erősen illó, kellemes zamatú folyadék. Küls. bedörzsölésre rheumaticus fájdalmaknál. Bels. mint az Aether. sulfur. 10,0 = 8 kr.

†**H. Aether bromatus. s. Aethylum bromatum. s. Bromoethyl** (C_2H_5Br). Színtelen. erősen fénytörő, illó, kellemes szagú folyadék: vízben nem, borszeszben, aetherben oldható, 38—40° C-nál forr. Levegőn és napfény behatása alatt megbomlik (!) Helybelileg permete alakjában anaetherisál; belégezve analgeticum; tapézés, eszméleti megmarad. Kisebb műtételnél (fogászat) belégzésre 8—15 gm. használandó ol. Hystericus, epilepticus görcsök esetén 4—5 gm. kendőre csepegtetve belégzendő. Szívbetegknél, tüdővészeseknél, vesebetegknél kerüld (!) Vigyázat (!) Per os nem alkalmaztatik. Ne tévesztessék össze az aethylum bromatummal. 30 gmos üvegcsében van készletben. 1,0 = 3 kr. 10,0 = 18 kr.

H. Aether depuratus seu sulfuricus ($O_3H_{10}O$). Tiszta, átlátszó, színtelen, könnyen mozgó, erősen illó folyadék, sajátos szaggal; 34—36° C-nál forr. Küls. haszn. bedörzsölésre rheumaticus fájdalmaknál, bőrön véghez viendő kisebb műtéteknél érzéstelenítésre a Richardson-féle spray segélyével. Bels. 5—20 csepp v. 1/2—1 fecskendővel pro dos. subcután, mint excitans. Tisztán vagy chloroformmal aa belégeztetve jó narcosist. ad. 10,0 = 2 kr., 100,0 = 15 kr.

95 Rp. Aether dep. 20,0.
Olei Terebinth. 8,0.
MDS. 15—30 cseppet.
3—4-szer napjában.
Durand-féle szer epekökö-
lika ellen.
20 kr.

96 Rp. Aether dep. Tinct. Valerian. aeth. aa 15,0.
MDS. 15—30 cseppet egy-
szerre.
Excitans.
35 kr.

H. Spiritus aethereus s. Liquor anodynus Hoffmanni. (Aether dep. 100 gm. + Spiritus 300 gm). Szagló-szer. Bels. exitans 10—30 csepp cukorra cseppentve v. mixturában. 10,0 = 3 kr.

Aether Petrolei s. Ligroine. C_nH_{2n+2} képletű szén-kövények keveréke; főleg amylkövény. Színtelen, illó, könnyen lobbano folyadék (vigyázat gyertyával, gyufával!!). Haszn. helyi anaesthesia eszközlésére. A Richardson-féle „Compound anaesthetic fluid for local anaesthesia” czimű szerben van: Aether Petrolei 4 r. + Aether dep. 1. r. 10,0 = 3 kr.

Aethoxy-coffeinum [$C_8H_9(OC_2H_5)N_3O_2$]. Olyforma hatása van mint a cocainnak. 2%-os vízdaltból 1 fecskendővel bőr alá fecskendve helybeli érzéketlenség jelentkezik. (Ceola.) DUJARDIN-BEAUMETZ hemicraniánál dicséri hatását. 0,2—0,5-os adagokra az üterekben a feszülés emelkedik, pulsus 2—6 ütessel szaporodik, emelt közérzet; később az arcz kipirul, csekély izzadás. Némelyek szerint az alvást is előmozdítaná. (?) 0,10 = 6 kr.

97 Rp. Aethoxy-coffeini 0,2.

Aquae dest. 10,0.

MDS. 2% oldat bőr alá fecskendésre; az orvos kezéhez.

32 kr.

98 Rp. Aethoxy-coffeini

Natr. salicylici aa 0,25.

Cocaini hydrochlor. 0,02.

Aquae dest. 20,0.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. Egyszerre bevenni.

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

Hemicrania.

46 kr.

99 Rp. Aethoxy-coffeini 1,0.

Sacchar. alb. 2,0.

M.f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

Det. in caps. amylicae.

S. ór. 1 port.

Neuralgia trigemini. Hemicrania.

(DUJARDIN-BEAUMETZ.)

1 frt 21 kr.

Aethylenum chloratum s. Liquor hollandicus.

($C_2H_2Cl_2$). Színtelen, chloroformszagú folyadék. Küls. elvonó bedörzsölésekre tisztán v. mint linimentum 1: 3—5. Belégezve narcosis. Ritkán használtatik. 1,0 = 4 kr.

Aethylidenum chloratum s. Aethylidenum bichloratum ($C_2H_2Cl_2$). Isomer az Aethylen. chlorat.-al. Színtelen, chloroformra emlékeztető szagú folyadék. Belégeztetve jó narcosist ad; állítólag a szívre kevésbé veszélyes, mint a chloroform. (LIEBREICH.) 1,0 = 15 kr.

Aethylum chloratum s. Monochloroethan s.

Aethylchlorür. C_2H_5Cl . Víziszta, könnyen mozgó, igen erősen illó, 12° C-nál már forró, vízben nehezen, borszeszben igen jól oldható folyadék, könnyen gyulad. (Vigyázat!) Ujabban

mint helybeli anaestheticumot használják kisebb műtéteknél. Beforrasztott üvegcsővekbe zárva van forgalomban, melyek 10 köbctm. ürtartalmúak. A forrasztási hely letűrendő, midőn az illó anyag vékony sugár alakjában önként áramlik ki a műteendő felületre, azt lehűti s érzésteleníti. 1 csővecske ára 60—80 kr.

Agaricinum. A *Fungus Laricis* v. *Agaricus albus* hatóanyaga; nem más, mint kissé tisztátlan agaricinsav ($C_{16}H_{30}O_8 \cdot H_2O$). Fehér jegeczes por. Antihydroticum, különösen phthisicusok éjjeli izzadásánál. Hatás 5—6 óra múlva. Gyenge diureticum. Adag bels. 0,005—0,01 pro dos. egyszer-kétszer; gyermeknek 0,002—0,005—0,008 pro dos. Subcután igen fájdalmas, ezért pilulában v. porban. 0,10 = 4 kr.

100 Rp. Agaricini	0,15.	101 Rp. Agaricini	0,1.
Pulv. Liquirit.		Morphini hydrochlor.	0,05.
Mucil. Gummi arab. aa		Sacchar alb.	4,0.
qu. s.		M. f. pulv. div. in dos.	
ut. f. pilul. No. 30.		aequ. No. 10.	
DS. Este lefekvés előtt 2—3		DS. Este 1 port.	
órával 1—2 szemet; hajnal-		45 kr.	
ban ismét. 45 kr.			

102 Rp. Agaricini	0,02—0,05.
Sacchar. alb.	4,0.
M. f. pulv. div. in dos.	
No. 10.	

DS. Este egy port. Gyermeknek.
41 kr.

H. Agaricus chirurgorum. (*Polyporus fomentarius*. Fungi. Hymenomycetes.) Taplógomba. Hajszáledényes külső vérzéseknél vérzéscsillapító. Főlöszleges; ha piszkos a készítmény, veszélyes is, sebfertőzést okozhat. 10,0 = 4 kr.

Alantol. l. Heleinin.

†H. **Aloe.** Különböző Aloe-fajok leveleinek sűrített tejnedve. Gyantaszzerű, fénylő, fekete vagy feketésbarna, kagylós törésű, keserű ízű daradok. Hatóanyaga az aloin (l. alant). Bels. 0,02—0,05 pro dos. 2—4-szer napj. mint amarum, 0,2—0,3 pro dos. mint laxans, 0,5—1,0 pro dos. mint drasticum hat; utóbbi adagokban ellenjavalt hórszám, terhesség, könnyen vérző aranyér eseteiben. 10,0 = 2 kr. v. 10,0 = 3 kr. (pulv.).

†H. **Extractum Aloes.** Vizes kivonat, száraz, porítható. Kétszer oly hatékony, mint az Aloe, ezért felényi adagok adandók. 10,0 = 16 kr.

†H. **Tinctura Aloes.** Amarum. Adag 5—20 csepp pro dos. 10,0 = 5 kr.

H. Pilulae laxantes. Tartalmaznak Aloet, Jalapa-gumót, natronszappant. Hashajtó-adag 2—3 szem. 1 db. = 1 kr., 10 db. = 8 kr.

Aloinum. Az Aloe hatóanyaga; sárgás, hideg vízben nehezen, forróban könnyen oldódik; jegecses, keserű ízű anyag. Hatása mint az Aloe-é. Adag bels. laxans célból 0,15—0,2 pro dos. pilulában. Angliában igen használatos obstip. habit. eseteiben. 1 gm. = 4 kr.

103 *Rp.* Aloes pulv.
Extr. rad. Rhei chin.
aa 2,0.
Extr. Belladonn. 0,1.
Extr. Taraxaci qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Cassiae
Cinnam.
DS. 2—3 szemet egyszerre.
Laxans. 60 kr.

104 *Rp.* Aloes pulv. 10,0.
Extr. Chinae 5,0.
Pulv. cort. Cinnam. 2,0.
Syrup. cort. Aurant. 3,0.
M. f. pilul. No. 100.
Consp. pulv. Cassiae Cin-
nam.
DS. Evés előtt 1—2 szemet.
Tonicum, stomachicum.
1 frt 6 kr.

105 *Rp.* Extr. Aloes.
Extr. rad. Rhei chin.
Ferri lactici aa 2,0.
Pulv. et succi Liquirit.
aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
DS. 1—3 szemet reggel és
este.
Chlorosis et obstip. habit.
64 kr.

106 *Rp.* Extr. Aloes.
Pulv. rad. Rhei chin.
aa 1,0.
Extr. Colocynth.
Gummi Gutti aa 0,5.
Pulv. rad. Althaeae.
Mucil. Gummi arab aa
qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
DS. 1—2 szemet naponta.
Drasticum 57 kr.

107 *Rp.* Extr. Aloes.
Fel Tauri inspiss. aa 2,0.
M. f. pilul. No. 30.
Obduc. Keratino.
DS. 3 × napj. 3 szemet.
Icterus cum obstipatione.
86 kr.

108 *Rp.* Tinct. Aloes
Tinct. Chinae comp.
aa 15,0.
DS. 3 × napj. 15—30 csep-
pet.
Amarum. 31 kr.

H. Althaeae radix. (Malvaceae). Hatóanyagainövényi nyak, keményítő. Pora jó pilulaanyag mucil. gummi arab-val; pilula-hintópor. Decoct. 1 : 10 nyákos, bevonó folyadék, száj-, torokvíz-
nek; különben csipős anyagoknak jó vehiculum. 100,0 = 20 kr.
1000,0 = 160 kr., 10,0 6 kr. (subt. pulv.)

H. Althaeae folia Hatóanyaga növényi nyálka. Decoct. 1 : 10,
nyákos, bevonó folyadék. 100,0 = 10 kr. 1000,0 = 80 kr.

H. Species Althaeae. (Rad. és fol. Althaeae, rad. Liquirit, flor. Malvae.) Egy csésze theára (infus.) tetézt evőkanálnyi veendő. 100,0 — 16 kr. 1000,0 = 140 kr.

H. Syrupus Althaeae. Kellemes ízjavító. 10,3 = 3 kr.

109 Rp. Decoct. rad. Althaeae

e 10,0.

l. a. p. ad. colat. 300,0.

Tint. Opii simpl. 2,0.

Syrup. Althaeae 20,0.

MDS. Száj, torokváz.

Stomatitis- v. angina ca-

tarrh. 44 kr.

110 Rp. Rad. Althaeae 20,0.

Rad. Liquir. decort. 10,0.

Rhizom. Iridis.

Fruct. Foeniculi. aa 1,0.

Conc. cont. M. f. spec.

DS. 2 evők. 1 csésze theára.

23 kr.

111 Rp. Decoct. rad. Althaeae

e 5,0.

l. a. p. ad. colat. 100,0.

Salis ammon. dep. 0,5.

Tinct. Opii simpl. gtt. 3.

Succi Liquir. 5,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk. 3—6 év.

gyerm. bronchitis. esetén.

47 kr.

112 Rp. Syrup. Althaeae 50,0.

Oxymel Scillae 5,0.

Aquae Melissae 25,0.

MDS. 1—2 ór. 1 kk. 2—3

év. gyermek. köptető.

38 kr.

H. Alumen [$K_2Al_2(SO_4)_4 \cdot 24H_2O$]. Szintelen, áttetsző, kemény octaederek vagy kristálydarabok, levegőn könnyen elmulnak. 10 $\frac{1}{2}$ sr. vízben oldódik, oldat savanyú kémhatású, összehúzó, édeses-savanyú ízű. Adstringens, stypticum, gyenge antisepticum. Küls. teli fürdőre 100—150 gm., száj-, torokvizhez, hüvely ki-mosására 2,0—5,0 : 100,0; húgycsőbe fecskendésre 0,5 : 100,0, kenőcsre 1 : 10—20. Bels. porban, pilulában, nyákos oldatban 0,1—0,5 pro dos., 0,5—2,0 pro die. 10,0 = 2 kr. (subt. pulv.)

H. Alumen ustum [$K_2Al_2SO_4$]. Fehér por, 25 sr. vízben lassan oldódik. Substantiában hintőpor vérző sebekre. 10,0 = 4 kr. (subt. pulv.).

113 Rp. Aluminis 0,5.

Aquae Foeniculi 50,0.

MDS. Szemecseppek.

Conjunct. catarrh.

26 kr.

114 Rp. Aluminis

Plumb. acet. basic. so-

lut. aa 1,0.

Aquae dest. 200,0.

MDS. Húgycsőbe fecsken-

désre. Használat előtt fel-

rázandó. 34 kr.

115 Rp. Aluminis

Zinci sulfur

Acid. carbol. aa 0,3—0,6,

Aquae dest. 200,0.

MDS. Húgycsőbe fecsken-

désre 37 kr.

116 Rp. Aluminis 0,6.

Cupri sulfur. 0,03.

Aquae dest. 200,0.

MDS. Húgycsőbe fecsken-

désre 33 kr.

- 117 *Rp.* Aluminis 5,0.
Aquae dest. 300,0.
Syrup. Moror. 30,0.

MDS. Száj-, torokvíz.
46 kr.

- 119 *Rp.* Aluminis 1,0.
Camphorae trit. 0,5.
Ungu. emoll. 30,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs.
Puritus vulvae et ani.
60 kr.

- 120 *Rp.* Aluminis 1,0—2,0.
Pulv. Doveri 1,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10

DS. 2 ór. 1 port.
Diarrhoea, haemoptoe,
vesevérzés 43 kr.

- 122 *Rp.* Decoct. tuber Salep e 0,5.
l. a. p. ad colat 80,0.
Aluminis 0,4,
Tinct. Opii simpl. gtt.
1—2:
Syrup simpl. 8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.
1 éves gyermeknek heveny-
bélhurut ellen. Ha collap-
sus leme jelen, tint. opii
helyett tinct. valerian.
gtt. 10.
42 kr

- 118 *Rp.* Aluminis
Kalii chlorici aa 3,0.
Aquae dest. 150,0.
Syrup. Moror. 20,0.

MDS. Gyermekeknek száj-,
torokvíz.

Stomat. catarrh. és aphtho-
sa, angina catarrh., tonsil-
litis follicul. Ha lenyelnék,
puha rongyra itatni a fo-
lyadékot, s úgy mosogatni
a beteg helyet. 46 kr.

- 121 *Rp.* Aluminis 4,0.
Morphini hydrochlor. 0,05.
Sacchar alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 3—4 port naponta.
Phthisicusok csillapíthat-
lan hasmenése ellen.
43 kr.

- 123 *Rp.* Aluminis
Zinci sulfo-carbol
aa 0,5—2,0.
Aquae dest. 250,0.

MDS. Hügyesőbe, hólyagba
fecskendésre blennorrhoea-
nál. 36 kr.

Aluminii acetici liquor. Tiszta, szintelen, eczetsav-szagú
folyadék. Antisepticum, adstringens. Haszn. küls. renyhe, éves sebek
mosogatására (1 : 5) blennorrhoea-urethrae, bőzös hüvelyhurut,
ozena esetén befecskendésre (1 : 20), szájvíznek (1 : 30). Bels.
ritkán, hasmenések ellen 5—20 csepp syrupban, napi. többször.
10 grm. = 3 kr.

124 *Rp.* Aluminii acet. liqu.
 10,0.
 Aquae dest. 80,0.
 Syrup. simpl. 20,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

Gyermeknek dysenteria
 catarrh. és diphtheritica
 esetén. (SOLTMANN).

29 kr.

125 *Rp.* Aluminii acet. liqu.
 20,0.
 Aquae dest. 400,0.

MDS. Csőrének.

Gyermeknek dysenteria
 catarrh. és diphtheritica
 esetén. (SOLTMANN.)

38 kr.

Aluminium acético-tartaricum. Színtelen, fénylő, gummiszerű, ecetsav-szagú, összehúzó, édeses-fanyar ízű darabkák. Vízben jól oldódik, borszeszben, glicerinben nem. Adstringens, antisepticum. A liquor alumin. acet.-ot jól pótolja (haszn. l. azon. cz. alatt.). Küls. sebmosó folyadéknak 2—3%-os oldat, szájviznek, húgycsőbe, hüvelybe, orrba fecskendésre, lábak mosogatására (bűzös lábizzadás) 1—2% oldat. 1 grm. = 3 kr.

126 *Rp.* Alumin. acet. tartar. 6,0.
 Aquae dest. 300,0.
 Syrup. simpl. 30,0.

MDS. Száj-torokvíz.
 62 kr.

127 *Rp.* Alumin. acet. tart. 2,0.
 Aquae dest. 150,0.
 Tinct. Opii simpl. 1,0.

MDS. Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhoea.
 36 kr.

128 *Rp.* Alumin. acet. tart. 10,0.
 Aquae dest. 20,0.
 M. f. solut.

DS. Ecsetelésre. Fagydagatokat.
 60 kr.

129 *Rp.* Alumin. acet. tart. 2,0.
 Aquae. dest. 130,0.
 Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 2 ór. v. 2 ór. 1 evőkan.
 Gyomor-, bél-, tüdővérzések.
 39 kr.

130 *Rp.* Alumin. acet. tart. 4,0.
 Aquae dest. 200,0.
 Aquae Amygdal. amar. 10,0.

MDS. Permetete alakjában belégzésre.
 Bronchitis putrida, gangraena pulmon. 49 kr.

H. Aluminium hydrooxydatum $[Al_2(OH)_6]$. Fehér, könnyű, nyelvhez tapadó por, vízzel senileges hatású péppé elegyedik. Csak mint szárító hintőpor használtatik. 10,0 = 29 kr.

Alumnolum. (2 naphtholdisulfonsavas aluminium.) Vegyképlete még nem adható. Fehér, máig vízben, glicerinben jól, borszeszben nehezebben s nékiesen oldódó por. Adstringens, antisepticum.

Küls. hintőporok 10—20% talcum v. amyhummal. Sebmosogatóra, kifecskendésre a sebészetben s nőgyógyászatban 0,5—2%-os oldatok. U. ilyen a húgycsőbe fecsk., orr- és gégebántalmaknál 0,5—1%-os, szemcseppeknek 2—4%-os old. Bels. nom. 1,0 = 6 kr.

H. Ammoniacum. Gummi-resina. Izgató, oszlató tapasztok alkatrésze. Bels. azelőtt mint expectoraus használtatott emul-sio vagy pilula alakjában. Adag 0,3—0,5 pro dos, 1,5—3,0 pro die. 10,0 = 6 kr. (pulv.).

Ammonium-készítmények.

H. Ammonii caustici liquor (H, N). Tiszta, átlátszó, színtelen, átható szagú, maró folyadék. 100 részben 10 sr. ammonia-gáz van. Causticum. Küls. rovar-, scorio-csipések kiegészítésére. Bels. készítményei, főleg az ammon. carbou. 10,0 = 2 kr., 100,0 = 14 kr.

H. Ammonium aceticum solutum s. Liquor

Ammonii acet. s. Spiritus Mindereri ($C_2H_7NO_2$). 15% ammonium aceticumot tartalmaz. Tiszta, átlátszó, színtelen, illó folyadék. Küls. mint desiniciens sebek kötözéséhez 1 : 4, száj, orr, hüvely kiöblítésére 1 : 20—30. Bels. mint diaphoreticum nyákos folyadéokban, syrupban 0,5—1,0 pro dos. napj. 3—4-szer, 10,0 = 5 kr.

131 Rp. Infus. flor. Sambuci e	132 Rp. Ammon. acet. sol. 10,0.
10,0.	Aquae Menthae
l. a. p. ad colat. 150,0.	pip. 100,0.
Ammon. acet. so-	Spir. Aether. nitr. 2,0.
lut. 10,0.	Syrup. cort. Aurant. 25,0
Syrup. simpl. 20,0.	MDS. ór. 1 evők.
MDS. ór. 1—2 evők.	Diaphoreticum. 49 kr.
Diaphoreticum. 45 kr.	

H. Ammonii anisati liquor s. Spiritus salis ammoniaci anisatus. (Ammonia 7,5 + Spirit. 30,0 + Ol. Anisi 1,25.) Bels. kitinő expectorans. Adag 5—20 csepp pro dos. napj. többször, nyákos oldatban. Köptetők hathatós adjuvansa. 10,0 = 5 kr.

133 Rp. Decoct. rad. Althaeae e	134 Rp. Liquor Ammon. anisat.
10,0.	1,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.	Syrup. Althaeae 50,0.
Liquor, Ammon. anisat.	Syrup. Ipecac. 10,0.
Vini stibiat aa 5,0.	MDS. 2. ór. 1 kk.
Syrup. Ipecac. 10,0.	2—4 éves gyermeknek.
MDS. 2 ór. 1 evők.	Bronchitis capill. Pneum.
Expectorans.	mon. catarrh.
45 kr.	38 kr.

H. Ammonium bromatum (*NH₄Br*). Fehér, jegecsez por, vízben könnyen oldódik. Antispasmodicum. sedativum. Adag : 0.1—1.0 pro dos. 3—4-szer napj. oldatban; leginkább kalium bromat. v. natrium bromat.-al együtt. 10.0 = 14 kr.

135 *Rp.* Ammon. brom.
Natr. brom. aa 5.0.
Aquae Menthae pip. 150.0.
MDS. Reggel, este 1 evők.
58 kr.

136 *Rp.* Ammon. brom.
Kalii brom. aa 3.0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. Nr. 10.
Det. in. chart. cerat.
S. Naponta 2—3 port
czukros vízben. 49 kr.

Epilepsia, hystero-epilepsia,
delirium tremens.

H. Ammonium carbonicum (*C₁₂H₁₁N₃O₃*). Ammonium szagú, erősen lúgos, szüntelen, kemény, szálasan jegecsez, légen elmálló illó anyag. 4 r. vízben lassan oldódik. Küls. bőrizgató kenőcshöz, linimentumhoz 1 : 30—50. Bels. mint analepticum, excitans oldatban 1.0—2.5 : 150.0. 2 ór. 1 evők. 10.0 = 2 kr.

137 *Rp.* Ammon. carb. 5.0.
Camphorae trit. 1.0.
Ungu. simpl. 30.0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.
45 kr.

138 *Rp.* Ammon. carb. 2.0
Apuae dest. 130.0.
Syrup. simpl. 20.0.
MDS. ór. 1 evők.
Excitans.

139 *Rp.* Ammon. carb. 2.0.
Camphorae trit. 0.2.
Gummi arab. pulv. 10.0.
Subige et solve in
Aqua dest. 130.0.
adde
Syrup. Althaeae 20.0.
MDS. 2 ór. 1 evőkän.
Excitans.
41 kr.

140 *Rp.* Infus. rad. Ipecac. e 0.3.
l. a. p. ad colat. 80.0.
Ammon. carb. 0.5.
Syrup. simpl. 20.0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
2—5 éves gyermek. Pneumon.
catarrh.
46 kr.

H. Ammonium chloratum s. Sal. Ammoniacum depur. s. Salmiak, (*H₄NCl*). Fehér, jegecsez por, szagtalan, sós ízű; egyenlő r. forró vízben, 3 r. hidegben oldódik. Expectorans. Ellenjavalt magas láznál. Adag: permete alakjában belégzésre 1%-os oldat; bels. oldatban 2.0—4.0 : 150.0 2 ór. 1 evők. 10.0 = 4 kr.

141 *Rp.* Ammon. chlorati 4,0.
Aquaë dest. 150,0.
Syrup. Ipecac. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők. Expectorans. 35 kr.

143 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae e 5,0.
l. a. p. ad colat 100,0.
Ammon. chlor. 0,5.
Tinct. Opii simpl. gtt. 3.
Succi. Liquirit. dep. 5,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
3—6 éves gyermeknek.
47 kr.

142 *Rp.* Ammon. chlorati 5,0.
Tartar. stibiat. 0,03—0,05.
Aquaë Foeniculi 150,0.
Syrup. Senegae 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Erős expectorans.
47 kr.

144 *Rp.* Ammon. chlor. 0,4—0,5.
Aquaë dest. 100,0.
Syrup. Althaeae 15,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
3—6 éves gyermeknek.
Expector. 33 kr.

Ammonium chloratum ferratum s. Floressalis ammoniaci martiales. Pirosas-sárga, vízzívó, vízben jól oldódó por. Kombinálja az ammon. chlor. és vas hatásait. Adag bels. mint az ammon. chlor. 10,0 = 6 kr.

145 *Rp.* Ammon. chlor. ferrat. 2,0.
Chinin. sulf. 2,5.
Extr. Aloes. 1,25.
Succi Liquirit. dep. 10 25
qu. s. ut. f. pilul No. 60.
Consp. Lycopod.
DS. 3 × napj. 4—6 szemet.
(FRIEDRICH.)
Chlorosis és mellette fehérvérűség esetén.
63 kr.

146 *Rp.* Ammon chlor. ferrat. 0,5.
Aquaë dest. 100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
3—6 éves gyermek. Idült
hőrgyhurut és vérszegénység esetén.
31 kr.

Ammonii succinici liquor. [$C_4H_4O_4(NH_4)_2$]. Tiszta, barnás, igen kellemetlen szagú folyadék. Használat, adag, mint a liquor Ammonii anisatusnál. 10,0 = 15 kr.

147 *Rp.* Liquor. Ammon succin. 1,0.
Aquaë Melissae 80,0.
Syrup simpl. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Hagymázosak hőrgyhurutjánál. (OPPOLTZER.)
39 kr.

148 *Rp.* Liquor. Ammon. succin. Aether sulf. aa 3,0.
Olei Menthae pip. gtt. 3.
MDS. 20 cseppet egyszerre.
cnamomilla theában.
Antispasmodicum.
25 kr.

H. Linimentum ammoniatum s. Linim. volatile.
Liquor. Ammon. 40,0. + Ol. Sesami 160,0. Bőrvörösítő, bőrizgató.
10,0 = 4 kr.

H. Amygdala amara. Tartalmaz zsíros olajat, emulsint, amygdalint. 10,0 = 3 kr. Belőle készül az

†**H. Aqua Amygdalarum amararum.** 0.1% kéksavat tartalmaz, ezenkívül benzaldehidet. Bels. az érzékenységre, visszahajlási tevékenység csökkentésére. Adag 10—20 csepp pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. sing. 1,0! dos. maxim. pro die 5,0! Kék v. fekete üvegben rendeltessék. 10,0 = 7 kr.

149 Rp. Aquae Amygdal. amar.	150 Rp. Amuls. Amygdal.
15,0.	100,0.
Morphini hydrochlor.	Aquae amygdal.
0,05	amar.
MD. in vitro coerul.	Extr. Hyosciami
S. 3× napj. 10—15 cseppet.	Syrup amygdal.
35 kr.	10,0.
	MDS. 2 ór. 1 kl.
	Izgatott köhögéskor. 53 kr.

H. Amygdala dulcis. Tartalmaz zsíros olajt, fehérjét, cukrot, mézgát. 10,0 = 2 kr. Belőle készülnek az

H. Emulsio amygdalina. Mandulatej. Bevonószer. Adag: evőkanalanként. 100,0 = 29 kr.; 200,0 = 34 kr.

H. Syrupus amygdalinus. Tejszerű, kellemes ízű, nyákos ízjavító. Főleg fejetekhez. 10,0 = 5 kr.

H. Oleum Amygdalarum dulcium. Áttetsző, sárgás, szagtalan zsíros olaj. 10,0 = 7 kr. 100,0 = 50 kr. Belőle készül az

H. Emulsio oleosa. Bevonószer. Adag: evőkanalanként. 100,0 = 22 kr.; 200,0 = 31 kr.

Amylenum hydratum seu Dimethylaethyl-carbinol. ($C_4H_{12}O$). Szintelen, könnyen mozgó, camphor és menthaszagú és ízi folyadék. 8 r. vízben oldódik, borszeszben minden arányban. Hypnoticum; a chloralhydrátnál gyengébb. 1,0 chloralhydrát = 4,0 amylenhydráttal = 3,0 paraldehyddel (MERING). Adag. 2,5—3,0 pro dos. caps. gelat.-ban v. vízben ízjavítóval, v. csőrében. Gyermekeknek korukhoz képest 0,2—0,5 pro dos. 1,0 = 8 kr.

151 Rp. Amyleni hydrati	7,0.	152 Rp. Amyleni hydrati	6,0—7,0.
Aquae dest.	50,0.	Morphini hydrochlor.	0,02—0,03.
Extr. Liquirit.	10,0.	Aquae dest.	60,0.
MDS. Este lefekvés előtt		Extr. Liquirit.	10,0.
felét bevenni.		MDS. Este lefekvés előtt	
93 ki (MERING.)		felét bevenni.	

153 Rp. Amyleni hydrati	5,0.	Álmatlanságnál, mely fáj-
Aquae dest.	50,0.	dalmak következtében áll
Mucilag. Gummi arab.	20,0.	fenn. (MERING.) 93 kr.
MDS. Csőrére.	70 kr.	

154 *Rp.* Amyleni hydrati 3,0—4,0.
 Vini rubri 30,0—40,0.
 Syrup. simpl. 10,0—15,0.

MDS. Este egyszerre bevenni.

51 kr.

155 *Rp.* Amyleni hydrati 1,0.
 Det. in caps. gelat. elast.

Dent. tal. dos. No. 10.
S. Este 3—4 dbot elfogyasztani.

1 frt 50 kr.

156 *Rp.* Amyleni hydrati 7,0.

Aquae flor. Aurant. 50,0.

Syrup. cort. Aurant. 30,0.

MDS. Este felét egyszerre bevenni.

96 kr.

†**H. Amyle nitrosa s. Amylnitrit s. Amylium nitrosum** [$C_2H_5(NO_2)$]. Közömbös kémhatású, v. gyengén savanyú, könnyen mozgó, sárgás, sajátságos gyümölcszagú folyadék. Vízben nem, borszeszben jól oldható. Edényhűdítő. Cocain-mérgezésnél dynamicus ellenszer. Adag: kendőre csepegtetve belégzendő 3—6 csepp pro dos. (Vigyázat!) Per os sohasem rendeltetik. Fekete v. kék üvegben egyszerre kevés rendeltessék. Dos. maxim. sing. 0,2! Dos. maxim. pro die 0,6! 1,0 = 3 kr.

157 *Rp.* Amylii nitrosi 5,0.

Det. in vitro nigro.

S. 3—6 cseppet rendelet szerint beléjezni.

Stenocardia. Epilepsia. 28 kr.

H. Amylum Tritici. Buzakeményítő. Finom, fehér por, szag és íztelen, hideg vízben és borszeszben oldhatlan; 96 r. forró vízzel nyúlós, áttetsző, tejszerű, szagtalan folyadékot képez. Hűtőpor. Forró vízzel készült oldata bevonó csőrének. Jodmérgezésnél chemicus ellenszer. 100,0 = 18 kr. (subt. pulv.).

Analgen. Egy chinolinszármazék. Fehér, jegecs, íztelen, vízben oldhatlan, borszeszben és híg savakban oldódó por. Analgeticum köszvény és csúznál. Mint antipyreticum nem vált be. A vizeletet sötétre vagy vörösre festi, utóbbi szín ecetsavra még élénkebb lesz. Adag bels. porban 0,5—1,0 pro ds. 2,0—3,0. pro die. 1,0 = 20 kr.

H. Angelicae radix. (Archangelica offic. Umbelliferae). Hatóanyagai: illó olaj, angelicasav, angelicin (canphorszerű anyag). Stomachicum, stimulans. Adag: infus. 1 : 10,0. 100,0 = 23 kr. v. 10,0 = 6 kr. (subt. pulv.).

H. Anisum stellatum. Fructus. (Illicum anisatum. Magnoliaceae.) Hatóanyaga illó olaj, Illatos thealeverékhez. 10,0 = 6 kr. v. 10,0 = 9 kr. (pulv.).

H. Anisum vulgare. Fructus. (Pimpinella Anisum. Umbelliferae). Hatóanyaga illó olaj. Carminativum, galactogogum, izjavító. Adag porban, infusumban 0,5—2,0 pro dos. 100,0 = 14 kr. v. 10,0 = 5 kr. (pulv.).

Anthrarobin (keveréke $C_{14}H_{10}O_2$ és $C_{14}H_{12}O_2$ -nak). Alizarinból állítatik elő. Sárgás-fehér por; vízben nem oldódik, jól borszeszben, glicerinben, zsíroknak. Hatása mint a chrysarobiné, csakozgy gyengébb, míg a pyrogallussavnál erősebb. Nem okoz gyuladást, ált. hatása nem mérgező. (PICK, WEYL, BEHREND.) Kenőcsben, tincturában 1,0—2,0 : 10,0, eczema margin, psoriasis, herpes tonsurans, pityriasis versicolor ellen. 1,0 = 8 kr.

158 Rp. Anthrarobini

10,0—20,0.

Ol. Sesami 30,0.

Lanolini 60,0.

M. f. ungu.

D.S. Kenőcs.

1 frt 62 kr.

159. Rp. Anthrarobini

10,0—20,0.

Spiritus dil. 90,0—80,0.

solve ebulliendo.

D.S. 10—20%-os anthrarobin tinctura.

1 frt 18 kr.

160 Rp. Anthrarobini

20,0.

Boracis venet. 35,0.

Glycerini

Spirit. vini aa 90,0.

M.D.S. Anthrarobin-borax-oldat.

(BEHREND). 2 frt 33 kr.

161 Rp. Anthrarobini

10,0.

Collodii flexil. 90,0.

M. f. solut.

D.S. 10%-os anthrarobin-collodium.

1 frt 54 kr.

H. Antidotum Arsenici (vízben keveréke ferrum oxyd. sulfur. solut. és magnes hydroxydatum-nak). Hatóanyaga a keverés közben képződő vasoxydhydrat [$Fe_2(OH)_6$]. Barna, zavaros folyadék. Adag arsén-mérgezés esetén 10 perczenként, majd 15—20 perczenként 2—3—5 evőkanállal. Használatkor felrázandó. Hánytatókat, gyomormosást nem teszi feleslegessé. 10,0 = 2 kr.

162 Rp. Antidoti Arsenici 300,0.

D.S. Rendelet szerint.

Exped. statim!!

74 kr.

H. Antifebrin I. Acetaulid.

H. Antipyrin s. Dimethyloxychinicin ($C_{11}H_{12}N_2O$).

Fehér, jegeszes por, v. nagyobb, hasábos, színtelen, csaknem szagtalan jegescek. Vízben igen jól, egyenlő r. borszeszben oldódik. Antipyreticum, antirheumaticum, analgeticum, influenza ellenes, helybelileg haemostaticum és érzéstelenítő. Szívujjoknál, szívgyengeségnél vigyázat!! Adag bels. 0,5—2,0 pro dos. 2,0—6,0 pro die porban, oldatban. Subcután fájdalmas. 1,0 = 12 kr. 10,0 = 1 frt.

- 163 *Rp.* Antipyrini 5,0.
Div. in dos. aequ. No. 10.
Det. in caps. amylac.
S. Rendelet szerint. Antipyr-
reticum.
1 frt 20 kr.
- 164 *Rp.* Antipyrini 5,0.
Aquaе Menthaе pip. 100,0.
Syrup. cort. Aurant. 45,0.
MDS. Rendelet szerint.
1 evőkanálban 0,5 anti-
pyrin. 1 frt 12 kr.
- 165 *Rp.* Antipyrini 0,5—1,0.
Vini Malagens,
Aquaе dest. āā 25,0.
Syrup. cort. Aurant. 50,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
2—3 éves gyermek. Pertussis.
55 kr.
- 166 *Rp.* Antipyrini.
Aquaе dest āā 10,0
M. f. solut. filtra.
DS. Bőr alá fecskendésre.
1—2 fecskendővel egy-
szerre. 1 frt 26 kr.
- 167 *Rp.* Antipyrini
Aquaе dest. āā 10,0
Cocaini hydrochlor. 0,05.
M. f. solut. filtra.
DS. Bőr alá fecskendésre.
1/2 fecskendővel egyszerre.
1 frt 32 kr.
- 168 *Rp.* Antipyrini 5,0
Syrup. cort. Aurant. 25,0.
Aquaе dest. 50,0.
MDS. Rendelet szerint.
1 evők. = 1,0 antipyrin.
91 kr.
- 169 *Rp.* Antipyrini 5,0.
Aquaе dest. 150,0.
Tinct. Opīi simpl. gtt. 6.
MDS. Csőrének felét egy-
szerre langyosan olasz-
nálni.
90 kr.

Antiseptin. s. Asepsin. s. Parabromacetanilid.

($C_6H_4Br.NH_2.CH_2.CO_2$) Színtelen, vízben nem, borszeszben jól oldható prismák. Antisepticum, antipyreticum, sedativum, anti-neuralgicum. Küls. hintőporban különösen fekélyekre. Bels. 0,02—0,05 pro dos. 3 ór. porban (Cattani).

Apiolum album crystallisatum. ($C_{12}H_{14}O_4$). Petroselinum sativum (Umbelliferae) gyümölcséből nyert illó olajnak stea-roptenje (camphen). Hosszú fehér tűkben jöged, gyengén petre-zselyem szagú. Vízben nem, borszeszben, aetherben, zsíros és illó olajokban jól oldódik. Antimalaricum; jól hat dysmenorrhoeicus tünetek ellen is. Adag bels. malaria ellen 0,5—1,0 pro dos. caps. gelat-ban; dysmenorrhoea esetén 0,2—0,3 pro dos. 2,0—4,0 gmos adagok oly mellékhatási tüneteket idéznek elő, mint a chinin nagy adagai. 0,10 = 2 kr.

178 *Rp.* Apioli alb. cryst.

Sacchar. alb. $\overline{aa}$ 20.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

Det. in caps. gelat. oper-
cul.

S. Napj. 2—4 dbot.

Amenorrhoea, dysmenor-
rhoea. 1 frt 7 kr.

†H. **Apomorphinum hydrochloricum** ($C_{17}H_{17}NO_2$,
HCl). Kristályos, szürkés por, nedves levegőn, világosságon könnyen zöldül, bomlik; 30 r. vízben, 20 r. borszeszben oldódik. Subcután alkalmazva 0'005—0'01! hánytató; per os 0'001—0'003 pro dos. expectorans. 5—6 éves gyermeknél csak nagy szükség esetén hánytatónak subcután 0'001—0'002. Kisebb gyermeknek nem (!) Dos. maxim. pro die felnőttek 0'05! Fekete üvegben rendeltessék. 0,01 = 3 kr.

171 *Rp.* Apomorphini hydro-
chlor. 0,1.

Aquae dest. 10,0.

M. filtra. Det. in vitro
nigro.

S. Bőr alá fecskendésre. Az
orvos kezéhez.

$\frac{1}{2}$ —1 fecskendővel emeti-
cum felnőttek.
59 kr.

172 *Rp.* Apomorph. hydrochlor.
0,02.

Aquae dest. 10,0.

M. filtra. Det. in vitro
nigro.

S. Bőr alá fecskendésre. Az
orvos kezéhez.

$\frac{1}{2}$ —1 fecskendővel 5—6
éves gyermeknek emeti-
cum. 35 kr.

173 *Rp.* Apomorphini hydro-
chlor.

Morphin. hydrochlor.

$\overline{aa}$ 0,03.

Acid. hydrochlor. dil.

0,5.

Aquae dest. 130,0.

Syrup. cort. Aurant 20,0.

MD. in vitro nigro.

S. 2—3 ór. 1 evőkan.

Expectorans 52 kr.

174 *Rp.* Apomorphini hydro-
chlor. 0,03.

Pulv. rad. Liquir.

Succi Liquir. dep. $\overline{aa}$

qu. s. ut. f. pill. No. 30.

Comp. pulv. Liquir.

D.S. 1—2 ór. 1—3 sze-

met. Expectorans.

48 kr.

Aquae aromaticae. Szag- és ízjavító vivőfolyadékok.

H. **Aqua Aurantii florum.** 10,0 = 3 kr.

H. **Aqua Cinnamomi simplex.** 100,0 = 18 kr.

H. **Aqua Cinnamomi spirituosa.** Főleg keserű
mixturákhoz 100,0 = 23 kr.

H. **Aqua Foeniculi.** Csecsemőknek carminativum.
100,0 = 9 kr.

H. **Aqua Menthae piperitae.** 100,0 = 15 kr.

H. **Aqua Rosarum.** 100,0 = 13 kr.

175 *Rp.* Aqua Foeniculi

Aqua dest. aa 40,0.

Natrii bicarb. 0,4.

Syrup. simpl. 8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.

Csecsemőknek dyspepsia
acida esetén.

32 kr.

176 *Rp.* Aquae Foeniculi

Aquae dest. aa 40,0.

Tinct. Rhei aquos.

1,0—2,0.

Syrup. simpl. 8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.

Csecsemőknek. Dyspepsia.

27 kr.

H. **Aqua Chlori** Zöldes-sárga, átlátszó, fojtó szagú folyadék.
4% chlórt tartalmaz. Fekete üvegben rendeltessék. Bels. nem.
Küls. mint desiniciens fekélyek, hüvely, méli mosogatására, öblíté-
tésére aa vízzel, v. 1:2 vízhez, 10,0 = 3 kr.; 100,0 = 25 kr.

H. **Aqua Calcis.** CaO-t tartalmaz. Erősen lúgos kémhatású,
tisztá, szagtalan, színtelen folyadék. Száritó, összehúzó, gyengén
desiniciens, oldja a nyákot, croup- és diphtheritis-hártyát. Küls.
száj-, torokvíznek tisztán; belégzésre, légycsőbe befecskendezésre
3:1 vízhez, v. vízzel aa; égési sebekre ol. lújával aa. Bels. adag:
kk. v. evőkanalanként tisztán v. tejjel, syruppal. 100,6 = 4 kr.
1000,0 = 30 kr.

177 *Rp.* Aquae Calcis

Ol. Lini loti aa 100,0.

M. f. linim.

DS. Külsőleg.

Égési sebek, eczema, ex-
coriatio. 50 kr.

178 *Rp.* Aquae Calcis 150,0.

Aquae dest. 50,0.

Liquor. Natrii caust.

gtt. 15.

MDS. Permetezőből belég-
zendő.

Gyermekeknek croup ese-
tén. 28 kr.

179 *Rp.* Aquae Calcis.

Aquae dest. aa 100,0.

MDS. Szájviz.

Stomatitis aphthosa

23 kr.

180 *Rp.* Aquae Calcis.

Aquae dest. aa 100,0.

Acid. carbol. liqu.

0,5—1,0.

MDS. Száj-, torokvíz,
Nagyobb gyermek. diphthe-
ritis esetén. Ha lenyelné,
carbolsav nélkül rendel-
jük. 27 kr.

181 *Rp.* Aquae Calcis 80,0.

Syrup. simpl. 20,0.

MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

Gyermekeknek dyspepsia
acida ellen.

24 kr.

H. **Aqua Calcis saccharata.** Chemicus ellenszer carbol-
sav (ha gyomron át történt a mérgezés) és oxalsav mérgezésnél.
Adag 5—10 percrenként 2—4 kanállal. 100,0 = 7 kr.

H. **Aqua carbolata** l. **Acidum carbolicum.**

H. **Aqua laxativa viennensis.** l. **Senna.**

Aqua Laurocerasi. Obsolet, helyette l. **Aqua Amygdalar. amar. Amygdala** cz. a.

H. Aqua plumbica.

H. Aqua vegeto-mineralis Goulardi } l. *plumb. acet.*
 } *basic.*

Aqua phagedaenica. Frissen készül. 1 r. hydrarg. bichlor. + 300 r. aqua calcis. Zavaros folyadék. Küls. renyhe syphiliticus fekélyek kötözésére. Felrázandó haszn. előtt. 10,0 = 2 kr.

Aquae phagedaenica nigra frissen készül 1 r. hydrarg. chlorat. mito + 60 r. aqua calcis. Küls. syphiliticus fekélyek kötözésére. 10,0 = 2 kr.

Araroba s. Pulvis Goa s. Po de Bahia. Finom, barnasárga, néha sötétbarna por, gyakran tisztátalanítva van farostokkal. Hatóanyaga chrysarobin. Erősebb bőrizgató. Haszn. a bőrgyógyászatban. Adag kenőcsben 1,5—3,0; 30,0. Belőle készül a

Chrysarobinum. Nem tiszta anyag, legtöbb lenue $C_{30}H_{22}O_8$ vegyület. Sárga, könnyű, jegeczes por, vízben rosszul, forró borszeszben, chloroformban, benzolban, kalilúgbau jól oldódik. Bels. nem haszn. (mérgező!). Küls. bőrizgató, lobokozó. Bőrgyógyászatban psoriasis, herpes tonsurans, eczema marginatum, pityriasis versicolor eseteiben. Adag kenőcsben, linimentumban, collodiumban 0,5—1,0; 10,0. Nagy bőrfelületek ne kenessenek be egyszerre. 1,0 = 7 kr.

182 Rp. Chrysarobini	1,0.	183 Rp. Chrysarobini	0,5.
Vaselinæ	20,0.	Collodii flexil.	10,0.
M. f. ungu.		MDS. Chysarobin collo-	
DS. Kenőcs.	43 kr.	dium.	25 kr.

Arbutin l. Uvae Ursi fol.

Argentaminum. Ezüstphosphat + aethylendiaminból készül. Színtelen, lúgos folyadék. Erős desiniciens, összehúzó. Főleg mint antgonorrhoeicum befecsk. alakjában (fájdalmas). Adag 1: 1000—4000. 1,0 = 8 kr.

†**H. Argentum nitricum crystallisatum.** ($AgNO_3$). Lemezes, színtelen, szagtalan, maró, fémcs ízű jegeczek. Substantiában, töményebb oldatokban causticum, higabb oldatokban erős adstringens. Torok, gége, ornyákhártya ecsetelésére 1,0—10,0: 50,0; köthártya ecsetelésére 0,2: 10,0. Credé újszülötteknél 1%-os oldatot használt mint prophylacticumot blennorrhoea neonatorum ellen. Csőrének 0,5—1,0; 100,0; húgycsőbe fecskendésre 0,05: 100,0—150,0; hólyagmosásra 0,4—2,0: 400,0 langyosan. Oldatok fekete üvegekben, rendeltessenek. Bels. adag: 0,005—0,03! pro dos. 2—3 × napj. 0,20! pro die porban, pilulában argilla alba-val. 1,0 = 11 kr.

†**H. Argentum nitricum fusum.** Fehér v. szürkés rudacsák. Causticum. 1,0 = 11 kr.

Argentum nitricum cum Kalio nitrico. Rudacsák. Enyhébb causticum, mint az argentum nitr. fusum 1,0 = 8 kr.

184 *Rp.* Argent. nitr. cryst.
1,0—10,0.
Aquae dest. 50,0.
MD. in vitro nigro.
S. Gége, torok, orrnyák-
hártya ecsetelésére.
35 kr.

186 *Rp.* Argent nitr. cryst.
0,4—2,0.
Aqua dest. 400,0.
MD. in vitro nigro.
S. Hólyagmosásra. Egy-
szerre 100 grm. fogysz-
tandó el. Cystitis chro-
nica. 47 kr.

188 *Rp.* Argent. nitr. cryst.
0,05—0,2.
Talcu venet. subtiliss.
pulv. 50,0.
M. f. pulv. det. in vitro.
S. Gégébe, fülbe befúvásra.
29 kr.

190 *Rp.* Argent. nitr. cryst. 0,05.
Argillae alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Naponta 2—4 port.
41 kr.

185 *Rp.* Argent. nitr. cryst. 0,2.
Aquae dest. 10,0.
MD. in vitro nigro.
S. 2%-os lapis oldat a kötő-
hártya ecsetelésére.
26 kr.

187 *Rp.* Argent nitr. cryst.
0,15—0,5.
Aquae dest. 120,0—150,0.
MD. in vitro nigro.
S. Klystirnek egyszerre fe-
lét. Dysenteria.
31 kr.

189 *Rp.* Argent. nitr. cryst. 0,15.
Argillae alb. qu. s.
F. cum. gtt. nonnull.
Aqua dest.
pilul. No. 30.
Consp. pulv. Argillae.
DS. Naponta 2—3-szor 1
szemet. 41 kr.

191 *Rp.* Argent. nitr. cryst.
0,03—0,1.
Aquae dest. 80,0.
Glycerini 20,0.
MD. 2 ór. 1 kk.
Gyermekeknek enteritis
follicularis esetén.
34 kr.

H. Argilla alba s. Bolus alba. Fehér agyag. Aluminium-silicat. Idomtalan, fehér, földes, könnyű, törékeny, zsíros tapintatú, agyagszagú, vízben széteső darabok. Pilula- v. por-constituens argent. nitr., auro-natr. chlorat., hydrarg. bichlor. corr., hyoscinum, cocain-sók, és aconitinum rendelésekor. 10,0 = 2 kr.

Argonium. Ezüst és natriumcasein összekötötése 428% arg. tartalmú. Finom, fehér, vízben oldh. por. Híg oldatban nem edző, bacteriumellenes. 1½%-os oldatok haszn. melyek opalizálnak. Oldás melegben. Színes üvegben rendeltessék. 1,0 = 12 kr.

Aristolium. Dithymoldijodid. Jodoform és jodol pótszere. Szagtalan, pirosos barna, vízben, glycerinben nem, borszeszben kevésbé, aetherben, zsíros olajokban jól oldh. por. Haszn. mint a jodoform, Bels. nem. Küls. kenőcshez és collodiumhoz 8—10%, hintőpor-
nak és befúvásra töményen. vagy 5—10%. 1,0 = 30 kr.

- 182 *Rp.* Aristoli 3,0.
Ol. Sesami 20,0.
Lanolini 75,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs égési sebekre.
1 frt 83 kr.
- 183 *Rp.* Aristoli 3,0.
Sacch. lactis 30,0.
M. f. pulv.
DS. Külsőleg. Hintőpor.
1 frt 23 kr.

H. Arnicae montanae flores (Compositae). Hatóanyagok: illatos olaj, arnicin (keserű anyag) és gyanta. Excitans, diaphoreticum. Bels. adag infusumban 5,0—10,0 : 150,0 ór. 1 evők. 10,0 = 2 kr. 100,0 = 18 kr.

H. Arnicae montanae folia. Hatóanyagok csekélyebb mennyiségben, mint a virágokban. Használat, adag, mint fent, 10,0 = 1 kr., 100,0 = 8 kr.

H. Arnicae montanae rhizoma. Illatos olaj több, arnicin kevesebb, mint a virágokban; haszn. mint fent. Bels. adag, infus. 7,0—15,0 : 150,0 ór. v. 2 ór. 1 evők. 10,0 = 2 kr., 100,0 = 18 kr.

H. Tinctura Arnicae. Küls. zúzott, metszett sebekre ecsetelések, borongatások alakjában izgató, kevésbé antisepticus hatású. Bels. excitans. Adag bels. 10—40 csepp napj. többször 10,0 = 3 kr.

- 194 *Rp.* Infus. flor. Arnicae e 7,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Liquor. Ammon. anisati 2,0.
Syrup. cort. Aurant. 10,0.
- 195 *Rp.* Infus. rhiz. Arnicae e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
f. cum.
Camphor. trit. 1,0.
Gummi arab. 5,0.
l. a. emulsio.
adde
Syrup. simpl. 15,0.

MDS. ór. v. 2 ór. 1 evők.
Öregék bronchitise, oedema pulm. Expectoraus, excitans.

38 kr.

- 196 *Rp.* Infus. flor. Arnicae e 1,0.
l. a. p. ad colat. 100,0.
Liquor. Kalii acet. 2,0.
Syrup. simpl. 15,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.
4—8 éves gyermek. collapsus esetén.

40 kr.

MDS. 2 ór. 1 evők.
Excitans typhus abdominal, pneum. crouposánál fellépő collapsus esetén.
51 kr.

- 197 *Rp.* Tinct. Arnicae.
Tinct. Valerianae aa 15,0.
Olei Mentha pip. gtt. 5.
MDS. 15—30 cseppet 2 ór. ó-borban v. cognacban.
Erős excitans. 32 kr.

H. Asa foetida. Beszáradt tejnedv. Barnás, foghagyma szagú, keserű, csipős ízű gyantás anyag. Hatóanyaga egy kén tartalmú illó olaj és gyanta. Antispasmodicum, néha mint analepticum és

expectorans. Bels. klystirben (emulsio) 4,0—8,0 pro dos. Per os pilulában 0,2—0,5 pro dos. napj. többször. 10,0 = 4 kr. v. 10,0 = 6 kr. (pulv.).

198 *Rp.* Asae foetidae 8,0.
Vitellum ovi unius.
f. l. a. emulsio cum
Aqua dest. 200,0.
DS. Csőrénék; egyszerre
felét elfogyasztani.
45 kr.

199 *Rp.* Asae foetidae 6,0.
Rad. Valerian. pulv.
Mucilag. Gummi arab.
aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 60.
Obduc. Collodio.
S. 3 × napj. 3—5 szemet.
80 kr.

200 *Rp.* Infus. flor Chamomil-
lae e 8,0.
l. a. p. ad colat. 100,0.
Asae foetidae 1,0.
Vitellum ovi unius
f. emulsio.
DS. Csőrénék.
Gyermekeknek. Spasmus
glottidis.
54 kr.

201 *Rp.* Asae foetidae 5,0.
Camphorae tritae 1,0.
Opii pur. pulv. 0,5.
Extr. Taraxaci qu. s.
ut. f. pilul. No. 50.
Consparg. pulv. Irid.
flor.
DS. 3 × napj. 4—5 szemet.
Antispasticum.
50 kr.

Aseptolum s. Acidum sozolicum ($C_6H_5SO_3$, OH). A kereskedésbeli 33,4% savat tartalmazó pirosas-barna folyadék; s keveréke az ortho- és paraszolsavnak. Vízben, borszeszben, glicerinben oldható, zsíros olajokban nem. Antisepticum. Ajánlatott sebkezelési czélokra 3—10%-os oldata. Gyomor-, bélhuzam fertőztelenítésére 4,0—5,0 pro die potio alakjában. Nem mérges, nem maró. Rövid időn a hatásos orthosav a hatástalan parasavba megy át. 1,0 = 4 kr.

202 *Rp.* Acid. sozolicum 25,0.
Aqua dest. 475,0.
M. det. in vitro nigro.
S. 5%-os sozolsavoldat seb-
kezelési czélolra.
1 frt 40 kr.

203 *Rp.* Acid. sozolicum 5,0.
Aqua dest. 500,0.
Succi Citri.
Sacchar. alb. aa qu. s.
(20,0).
M. f. limonada.
DS. Egy napi italul
Gyomor-bélhuzam fertőz-
telenítésére.
85 kr.

Aspidosperminum l. Quebracho cortex.

††H. **Atropinum sulfuricum l. Belladonna.**

Auro-Natrium chloratum ($AuNaCl + H_2O$). Sárga, jege-
czes por, vízszívó, vízben könnyen oldható. Bels. hysteri, chorea,
tabes dorsalis ellen ajánlották. Adag pilulában argilla alba-val
0,003—0,006 pro dos. 2—3 napj. 0,10 = 35 kr.

- 204 *Rp.* Auro-Natr. chlor. 0,1.
Argillae albae qu. s.
f. cum. gtt. nonnull.
Aqua dest.
pilul No. 30.
Consp. pulv. Argillae.
D.S. 2—3 × napj. 1 szemet.
74 kr.
- 205 *Rp.* Auro-Natrii chlor. 0,1.
Aqua dest. 50,0.
M.D. in vitro nigro.
S. 3 × napj. 15—20 csepp.
pet.
Tabes dors. Syphilis.
59 kr

Balsamum canadense. Mézszínű, terpentinszagú, sárga, ragadós balzsam. Terebinthina comm. helyett haszn. Mint hurutellenes szer. 0,5—1,5 prodos. pilulában. 10,0 = 15 kr.

H. Balsamum Copaivae. Illó olajos és gyantás, sárgás-barna, átlátszó, faolaj sűrűségű, balzsamos illatú, keserű-csipős ízű, borszeszben, aetherben oldható növénynedv. Bels. adag emulsióban, vagy caps. gelat. opercul.-ban, vagy pilulában gonorrhoea, idiült cystitis, pyelitis, bronchoblennorrhoea ellen 0,5—2,0 pro dos. 3—4-szer, vagy 20—40 csepp. 2—4-szer napj. 10,0 = 6 kr.

- 206 *Rp.* Bals. Copaiv. gtt. 10.
Det. in caps. gelat. opercul.
Dent. tal. dos. No. 30.
S. 3 × napj. 2—4 kapsulát.
70 kr.
- 207 *Rp.* Bals. Copaiv. 15,0.
Det. in lagen.
S. 3 × napj. étkezés után 15 cseppet osztában.
19 kr.
- 208 *Rp.* Bals. Copaiv. 20,0.
Gummi arab. qu. s.
Aqua Menthae pip. 160,0.
f. l. a. emuls., adde
Syrup. cort. Aurant.
20,0.
M.D.S. 2 ór. 1 evők.
78 kr.
- 209 *Rp.* Cerae flav. 2,0.
leni calore lipuefac adde
Bals. Copaiv. 8,0.
refrigerat. admisce
Cubeb. pulv. 8,0.
M. f. l. a. pilul No. 100.
Consp. pulv. Cinna-momi
S. 3 × napj. 5—10 szemet
67 kr.

H. Balsamum peruvianum. Sötétbarna, kissé áttetsző, sűrű, levegőn nem száradó, savanyú kémhatású, kellemes illatú nem ragadós, keserű, csipős ízű növénynedv. Keveréke fahéj-savas benzyl-aethernek, fahéjsavnak, benzoésavnak, gyantának. Küls. antisepticum, antiparasiticum (scabies, phthiriasis). Bels. mint a bals. copaivae porban (ezukorral), pilulában, emulsióban, capsul. gelat. opercul.-ban; adag 3—16 csepp pro dos. napj. többször. 10,0 = 28 kr.

- 210 *Rp.* Bals. peruvian. 2,0.
Ungu. simpl.
M. f. ungu.
D.S. Hajkenőcs.
70 kr.
- 211 *Rp.* Bals. peruvian gtt. 4.
Det. in caps. gelat. opercul.
Dent. tal. dos. No. 20.
S. 3—4 × napj. egy kapsulát.
70 kr.

212 *Rp.* Bals. peruvian. 5.0.
 Spirit. dil. 200,0.
MDS. Külsőleg. Hajhullás
 ellen. 2 × napj. a fő bajas
 része bedörzsölendő.
 (HEBRA.)
 50 kr.

213 *Rp.* Bals. peruvian. 2,0.
 Pulv. Gummi arab. qu. s.
 Aqua dest. 130,0.
 f. l. emuls., adde
 Syrup. simpl. 20,0,
DS. 2 ór. 1 evők.
 47 kr.

H. **Balsamum Styracis** l. *Styrax liquid.*

H. **Balsamum vitae Hoffmanni s. Mixtura oleoso-balsamica.** Spiritus aromaticus-ban oldata több illó olajnak s bals. peruvianumnak. Küls. mint bőrvörösítő. 10,0 = 8 kr.

†H. **Belladonnae radix.** (*Atropa Belladonna. Solanaceae.*)
 Főhatóanyaga az atropin. Készítményei használatnak. 10,0 = 2 kr., vagy 10,0 = 6 kr. (pulv.)

†H. **Extractum Belladonnae.** Borszeszes kivonat dextrinnel beszárítva. Küls. kenőcsben 1 : 10—20 fájdalomcsillapító. Bels. colica saturnina, cardialgia, izgatott köhögés, pertussis, epilepsia, hyperhydrosis, salivatio, enuresis nocturna, diabetes ellen porban, pilulában adag 0,01—0,05! pro dos. 3—4 × napj. Dos. maxim. pro die 0,2! 1,0 = 6 kr.

†H. **Tinctura Belladonnae.** Haszn. mint az extractum. Küls. kenőcshöz. 1 : 10. Bels. adag 2—10 csepp pro dos. 2—4 × napj. Dos. maxim. sing. 1,0! (20 csepp!) Dos. maxim. pro die 4,0! 10,0 = 7 kr.

††H. **Atropinum sulfuricum.** [$(C_{17}H_{23}NO_3)H_2SO_4$]. Fehér, jegeszes por. Egyenlő r. vízben, 3 r. borszeszben oldható. Mydriaticum 0,01—0,1 : 10,0—20,0 a kötőhártya redőbe cseppentve. Bels. haszn. mint az extr. bellad. Adag 0,0005—0,001 pro dos. 2—3 × napj. (Nagy vigyázat!) pilulában vagy subcután. Dos. maxim. sing. 0,002! Dos. maxim. pro die 0,006! 0,01 = 2 kr.

Homatropinum hydrobromicum

Homatropinum sulfuricum

} Szemészetben mydriaticum, Oldat, mint az atropinnál. Kevésbé mérges, mint az atropin. 0,01 = 20 kr.

214 *Rp.* Extr. Belladonn. 1,0.
 Ungu emollient. 20,0.
 M. f. ungu.
DS. Belladonna-kenőcs.

58 kr.

215 *Rp.* Extr. Belladonn. 0.1.
 Butyri Cacao qu. s.
 (10,0.)
 ut. f. l. a. supposit.
 No. 5.

DS. Belladonna-kúpok.
 Tenesmus, prostatitis, gonorrhoea, hólyaggörcs.
 61 kr.

- 216 *Rp.* Extr. Belladonn.
Extr. Nucis vomic.
aa 0,05—0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Este lefekvés előtt 1
port. 3—10 éves gyermek-
nek.
Enuresis nocturna
43 kr.
- 218 *Rp.* Extr. Belladonn. 1,0.
Zinci oxyd.
Pulv. rad. Valerian.
aa 2,5.
Extr. Liquirit. qu. s.
ut f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Cinna-
momi.
DS. 3 × napj. 2 szemet.
Chorea, epilepsia
53 kr.
- 220 *Rp.* Atropini sulf. 0,01—0,1.
Aqua dest. 20,0.
M. filtra.
DS. Atropin cseppek, szem-
be cseppentésre. Sub sigillo.
Sub signo veneni. Az orvos
kezéhez. 28 kr.
- 222 *Rp.* Atropini sulf. 0,01.
Aqua dest. 10,0.
M. filtra.
DS. 0,1% os atropin-oldat
bőr alá fecskendésre. Sub
sigillo. Sub signo veneni.
Az orvos kezéhez. 1 fecsk-
endőben 0,001 atrop. sulf.
1/10—1/2 fecskendővel egy-
szerre. 28 kr.
- 224 *Rp.* Atripin sulf. 0,01
Morphini hydrochlor. 0,3.
Extr. Taraxaci qu. s.
ut. f. pilul. No. 20.
Consp. pulv. Liquirit.
DS. 3 × napj. 1 szemet.
Colica saturnina.
43 kr.
- 217 *Rp.* Extr. Belladonn. 0,2.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 3—4 port naponta.
41 kr.
- 219 *Rp.* Tinct. Belladonn.
gtt. 2—4
Kalii bromati
Natrii bicarb
aa 0,5—1,0
Aqua dest. 80,0—100,0
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—5 éves gyermeknek.
Pertussis.
34 kr
- 221 *Rp.* Tinct. Belladonn.
gtt. 2—5.
Aqua dest. 80,0.
Syrup. Rubi Idaei 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—5 éves gyermeknek.
Pertussis. 23 kr.
- 223 *Rp.* Atropini sulf. 0,01.
Pulv. rad. Liquirit.
Extr. Liquirit., aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
DS. Este 1—, legfeljebb 2
szemet.
Phthisicusok izzadása
ellen. U. e. pilulák (3 ×
napj. 1 szemet) diabetes
epilepsia, salivatio ellen is.
42 kr.
- 225 *Rp.* Homatropini hydro-
brom. 0,1
Aqua dest. 10,0.
M. filtra.
DS. Suo momine. Szembe
cseppentésre. Az orvos ke-
zéhez. Mydriaticum
2 frt 28 kr.

Benzanilidum $C_6H_5NH(C_6H_5CO)$. Fehér, jegeczes, vízben oldhatlan por, 58 r. hideg borszeszben oldható. Hatása mint az antifebriné, de gyengébb. Főleg gyermekeknek használt antipyreticum (Calin) Adag. bels. 1—3 éves gyermek 0,1—0,2 gm. pro dos. porban, 4—8 évesnek 0,2—0,4 gm. Felnőttnek 0,5—1,0 gm. pro dos.

H. Benzoe. Gyanta. Vörösbarna, fénylő, kellemes illatú, szemcsés darabok. Hatóanyaga a benzoésav. 5 r. borszeszben csekély maradékkal oldható. 10,0 = 7 kr. Nem haszn., helyette az acid. benzoicum. Készítménye a

Tinctura benzoës. Szépítő szerek gyakori alkatrésze. 10,0 = 5 kr.

226 Rp. Tinct. Benzoës 10,0.
Aquae Rosar. 10,0.
MDS. Lac virginum. Külső-
leg. Mosdóvízhez 1 evő-
kanálnyi öntendő. Cosme-
ticum. 35 kr.

227 Rp. Tinct. Benzoës 5,0.
Spiritus aetheris 50,0.
MDS. Külsőleg. A fej hajás
részének bedörzsölésére.
Seborrhoea. 33 kr.

Benzolum (C_6H_6). Színtelen, kellemetlen szagú, könnyen mozgó folyadék. Küls. scabies ellen (nem megbízható). Bels. sarcina ventriculi, trichiniasis ellen. (Mosler.) Adag. 0,5—1,0 pro dos. 3—4-szer napj. nyákos folyadékokban, emulsióban, caps. gelat.-ban. 10,0 = 5 kr.

228 Rp. Benzoli 20,0.
Ungu. rosati 40,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs. Scabies. 67 kr.

229 Rp. Benzoli 10,0.
Mucil. Gummi arab.
Aquae Menthae pip. aa 30,0.
Aquae dest. 180,0.
MDS. Felrázva 2 ór. 1 evők.
Trichiniasis (Mosler.) 50 kr.

Benzonaphtholum. Benzoésavas β naphtol. Fehér, jegeczes, szagtalan, íztelen por. Vízben nem, borszeszben, chloroformban oldh. Bélben benzoésavra és β naphtolra hasad. Bélantisepticum a betol és salol helyett. Adag. porban 0,5—1,0 pro dos. és 5,0 pro die. Gyerme. fele, harmada. 1,0 = 3 kr.

Betolum. s. Naphtalolum ($C_{17}H_{14}O_2$). A salolhoz vegyileg is, hatásra nézve is igen közel áll. Fehér, fénylő jegeczekből álló, szagtalan, íztelen por. Hideg v. forró vízben oldhatlan. A bélhuzamban salicylsavra és naphtolra hasad. Eddig hólyaghurutoknál (alcalicus, homló vizelet esetén), polyarthritiseknél, hasmenéseknél használták jó sikerrel. Adag. bels. porban 0,3—0,5—1,0 pro dos. 3—5 $\times$ napj. 1,0 = 8 kr.

- 230 *Rp.* Betoli 3,0—10,0.
 Sacchar. alb 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3—5 $\times$ napj. egy port.
 63 kr.

Bismuthum subgallicum. l. Dermatolum.

H. Bismuthum subnitricum s. Magisterium

Bismuthi. Keverék ($NO_3BiO + H_2O$) és [$NO_3BiO + BiO(HO)$].

Fehér, szagtalan, jegeczes por, gyengén savanyú hatású; vízben oldhatlan. Küls. fedőszér, kissé összehúzó. Bels. haszn. cardialgia, ulcus ventriculi, diarrhoeák némely alakja, bélfekélyek esetén. Adag porban 0,2—1,5 pro dos. 3—5 $\times$ napj. 1,0 = 7 kr.

- 231 *Rp.* Bismuth. subnitr. 5,0. 232 *Rp.* Bismuth. subnitr. 2,0.
 Aquae dest. 200,0. Morphini hydrochlor. 0,1.
MDS. Húgycsőbe fecskendezőre. Használat előtt felrázandó. 60 kr. Gummi arab. pulv. 3,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. Gégébe befűvésra. 38 kr.
- 233 *Rp.* Bismuth. subnitr. 3,0. 234 *Rp.* Bismuthi subnitr. 3,0.
 Pulv. Doveri 1,0. Extr. Nucis vom. 0,1.
 Elaeosacchar. Menthae 2,0. Magnes. carbon. 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos. M. f. pulv. div. in dos
 No 10. aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port. *DS.* 2 ór 1 port.
 Diarrhoea. Cardialgia, ulcus ventriculi.
 68 kr. 62 kr.
- 235 *Rp.* Bismuth. subnitr. 0,5—1,0.
 Pulv. Doveri 0,1—0,3.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
 1—6 éves gyerm. Heveny
 bélhurut.
 45 kr.
- 236 *Rp.* Bismuth. subnitr. 0,5—1,0.
 Pulv. Doveri 0,1—0,4.
 Extr. Nucis vom. 0,03—0,05.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
 1—8 éves gyerm. Idült
 bélhurut.
 47 kr.
- 237 *Rp.* Aquae Foeniculi 75,0.
 Aquae Calcis 6,0.
 Bismuthi subnitr. 3,0.
 Syrupi. cort. Aurant. 15,0.
MDS. Használat előtt felrázandó. 2 ór. 1 kk.
 Csecsemőnek diarrhoeája
 (ha zöld a székletét) ellen.
 51 kr.
- 238 *Rp.* Bismuthi subnitr. 5,0.
 Glycerini 50,0.
 M. f. linimentum.
DS. Külsőleg. 66 kr.

H. Bismuthum subsalicylicum seu salicylicum.

[$Bi(C_7H_5O_2)_3$, Bi_2O_3 .] Alaktalan, sárgás, vízben oldhatlan por. Savak könnyen felbontják. Küls. nem. Bels. mint a bismuth. subnitr. Vulpian typhus abdominalisnál jó eredményt látott. ha 1,0—2,0 pro dos. 3—4-szer napj. rendelt; mások phthisicusok hasmenésénél rendelnek 0,5 pro dos. 2—3 $\times$ napj. Gyermekeknek enteritis cholericus és follicularis esetén 0,2—0,25 pro dos. napj. 5—6-szor. (EHRING). Porban v. rázandó keverék alakjában. 1,0 = 4 kr.

239 Rp. Bismuthi subsalicyl. 5,0.

Morphini hydrochlor. 0,05.

Sacchar. alb. 2,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. Nr. 16.

DS. 3 ór. 1 port.

Phthisicusok hasmenése ellen.

60 kr.

240 Rp. Bismuthi subsalicyl.

2,0.

Aquae dest. 100,0.

Glycerini pur.

Cognac. aa 8,0.

MDS. Felrázva 2 ór. 1 kk.—gyk.

Gyermeknek acut. catarrh. intest., enteritis cholericus, enteritis follicularis esetén.

40 kr.

241 Rp. Bismuthi subsalicyl.

10,0.

Aquae dest. 140,0.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 1—2 ór. 1 evőkan.

Bevétél előtt felrázandó.

Typhus abdom.

65 kr.

242 Rp. Bismuthi subsalicyl.

Sacchar. lact. aa 25,0.

M. exact. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 40.

DS. 8 ór. 1 port. Gyomor-,

bél-fekélyek, idült bél-

hurut. (SOLGER).

2 frt 3 kr.

243 Rp. Bismuthi subsalicyl.

4,0—5,0.

Aquae dest. 100,0.

Glycerini 10,0.

MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

Gyermekeknek (EHRING).

40 kr.

H. Bismuthum tannicum. Sárgás v. barnássárga por, íztelen, vízben oldhatlan. Antidiarrhoeicum. Adag porban: 0,2—1,0 pro dos. 3—5 $\times$ napj. 1,0 = 9 kr.

244 Rp. Bismuthi tannici 3,0.

Morphini hydrochlor.

0,05.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

Diarrhoea.

68 kr.

245 Rp. Bismuthi tannici

0,5—1,0.

Pulv. Doveri 0,1—0,4.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

1—8 éves gyermek. Idült bélhurut. 46 kr.

Boldo s. Boldu s. Boldoa folia. *Peumus Boldus* s. *Boldua fragrans* (Monimiaceae) Hatóanyagai illatos olaj (2%), boldin nevű alkaloid (0,1%), kevés tannin. Irodalom sok irányú javulatokat sorol fel; úgy látszik, mint *exitans dyspepsia atonica* eseteiben jól használható. Amerikában főleg különböző májbántalmak ellen használják. Adag bels. infus. 10,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 10 grm. == 8 kr.

Tinctura Boldo (20 : 100). Adag bels. 5—15 csepp pro dos. 3—4×napj. 10,0 = 7 kr

Extractum fluidum Boldo. Adag bels. 10—20 csepp pro dos. 3—4×napj.

Blatta orientalis. Svábbogár. Száritott, porított rovarok. Oroszországban népies antihydropicus szer. Diaphoreticum, diureticum. Adag: 0,3—1,0 pro dos. 3—4×napj. porban, pilulában. 1,0 == 8 kr.

246 Rp. *Blattae orient pulv.*

3,0.

Div. in dos aequ. No. 10.

D. in caps. amylnae

S. 2 ór. 1 port.

84 kr.

H. Bolus alba l. Argilla Alba.

H. Borax venetus l. Natr. boracicum.

Bromaeethyl. l. Aethylenum bromat.

Bromatum hydratum ($C_2Br_2HO + H_2O$). Színtelen, közönbös, tálalakú, vízben oldható jégezek. Chloralhydrat pótszere, de annál gyengébb hypnoticum és sedativum. Szívre hevesen hat. Adag. bels. oldatban 0,1—0,2 napj. többször, mint sedativum; 0,5—1,0 pro dos. mint hypnoticum 1,0 == 30 kr.

247 Rp. Bromali hydrati 1,0.

Aquae dest. 100,0.

Mucil. Gummi arab.

Syrup. Rubi Idaei aa

50,0

MDS. 3×napj. 1 evők.

Sedativum. (STEINAUER.)

98 kr.

248 Rp. Bromali hydrati

Succi Liquir. aa 1,5.

M. f. l. a. pilul No. 25.

Obduc. gelatina.

DS. 1—3 szemet napj.

2—3-szor. (STEINAUER.)

1 frt 6 kr.

H. Bromkalium l. Kalium bromatum.

Bromoformium ($CHBr_3$). Színtelen, kellemes szagú, édeses ízű folyadék, vízben nehezen, borszeszben könnyen old. Fény behatására bomlik, megbarnul, ekkor elvetendő. Fekete üvegben tartandó. Hatása mint a chloroformé. Nem veszélytelen (!) Haszn. belégzésre narcosis céljából. Bels. tussis convulsivánál annyi csepp pro dos. a hány éves a gyermek napj. 3—5-ször kanál cukros vízben. Felnőttnek mint sedativum 0,5 gm. pro dos. 2—3×napj. capsulában 1,0 == 7 kr.

Bucco s. Buchu s. Diosmae s. Barosmae folia.

(Rutaceae). Tartalmaz a mentha piperita olajához hasonló, v. azzal azonos illó olajat, melyből egy a menthollal valószínűleg azonos stearopten állítható elő, továbbá salicylsavat és keserű anyagot. Diaphoreticum, gyengébb diureticum; haszn. ezenkívül cystitis és pyelitis catarrh. eseteiben is. Adag bels. infus. 5,0—10,0 : 100,0 2 ór. 1—2 evők. 10 gm. = 4 kr.

†H. Bulbus Scillae l. Scilla.

Butyl-chloralum hydratum (Croton-chloral-hydrat) ($C_4H_9ClO_2 + H_2O$). Kicsiny, selyemfényű, fehér jegeczapocskák, jellegző szagúak, hideg vízben nehezen, melegben könnyebben, borszeszben könnyen oldódnak. Chloralhydrát pótszere. Sedativum. hypnoticum, anodynum (?). Szívre alig hat. Bels. adag vizes-glycerines oldatban, v. porban, v. pilulában 0,2—0,4 pro dos. 2 ór. sedativ., anodyn.; 0,5—2,0 pro dos. hypnoticum. 1,0 = 15 kr.

249 Rp. Butyl-chlorali hydrati

5,0—10,0.
Glycerini 20,0.
Aquae dest. 130,0.
MDS. Egyszerre 1 evők., ha
kell 5 p. múlva ismét, s
10 p. múlva ismét.
Anodynum.
Tic douloureux,
(LIEBREICH)
1 frt 8 kr.

250 Rp. Butyl-chlorali hydrati

2,0.
Glycerini 10,0.
Aquae Foenic. 90,0.
MDS. Este lefekvés előtt
2—3 evőkanállal.
Hypnoticum.
64 kr.

H. Butyrum Cacao l. Ol. Cacao.

H. Calamus Acorus. Rhizoma (Aroideae). Hatóanyagok: acorin (keserű anyag) és illatos olaj. Amarum. Belső adag: porban 0,5—1,5 pro dos. 2—3×napj. v. infus 8,0—10,0 : 100,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 2 kr. 100,0 = 13 kr.

251 Rp. Infus. rhizom. Calami

e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Rhei Darelli 8,0.
Syrup. cort. Aurant.
15,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
47 kr.

252 Rp. Rhizom. Calami 30,0.

Rad. Gentianae
Rad. Rhei chin.
Semin. Cardamomi
Flaved. cort. Aurant.
aa 10,0.
Conc. et. cont. m. f.
species.
DS. Keserű theakeverék.
Házilag 1 liter fehér borral
maceratum készítendő.
Ebből 3×napj. egy tokajt
pohárral.
75 kr.

H. Calcaria chlorata s. Calcium hypochlorosum

[$\text{Ca}(\text{OCl})_2$]. Fehér v. fehéres, gyakran összegomolyodó, nyirkos por, mely chlór-szagú; íze kesernyész, fanyar. Levegőn nedvességet vesz magához, vízben tökéletlenül oldódik. Desiniciens, adstringens, szárító. Helyiségek fertőztelenítésére substantiában elhintve; erősebb Cl-fejlesztés céljából tányérban valamely savval (eczet) leöntve, v. konyhasóval és barnakővel keverve (aa) és híg kénsavval leöntve. Küls. sebmosó v. borongató folyadéknak 2%-4%-os szűrt oldatok, száj-, torokvíznek v. orrba fecskendésre 2%-5%-os oldatok, húgycsőbe fecskendésre 0,05—0,1 : 100,0. Bels. nem. 100,0 = 7 kr. 1000,0 = 50 kr.

253 Rp. Calcar. chloratae 6,0.

Aqua dest. 300,0.

M. filtra.

DS. Külsőleg, borongatásra.

Gyermeknek vulvitis diphtherit. esetén. 37 kr.

254 Rp. Calcar. chloratae 0,1

Aqua dest. 100,0.

MD. in vitro nigro

S. Befecskendésre gonorrhoea. 29 kr.

H. Calcium carbonicum nativum s. Creta alba.

Iszapolt kréta. Tiszta krétából előállított igen finom por. Küls. fogporba mint mechanicusan ható anyag. Bels. nem. 10,0 = 2 kr (subt. pulv.).

H. Calcium carbonicum praecipitatum (CaCO_3).

Hőfehér, igen finom por. Küls. fogporba. Bels. porban mint antacidum (pyrosis, némely diarrhoea, savmérgezések) kávéskanalként, késhegyenként; rhachitisnél 0,1—0,3 pro dos. 2—3 × napj. 10,0 = 15 kr.

255 Rp. Calc. carb. pulv. 30,0.

Magnes. carb. 5,0.

Natrii bicarb.

Sapon. medic. ras.

aa 3,0.

Olei Menthae pip. gtt. 5.

M. f. pulv. subtil.

DS. Fogpor.

40 kr.

256 Rp. Calc. carb. praecip. 5,0.

Pulv. rad. Rhei 2,0.

Elaeosacchar. Foenic. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 3—4 × napj. 1 port 58 kr.

258 Rp. Calc. carb. praecip.

1,0—2,0.

Ferri lact. 0,5—1,0.

Sacchar. albi 10,0.

M. f. pulv. det. in scai.

S. 3 késhegygel napj. 1—3 éves gyermek. Rhachitis.

24 kr.

257 Rp. Calc. carb. praecip.

Gummi arab. pulv. aa

5,0.

tere c.

Aqua Cinnamomi 150,0.

adde

Syrup. simpl. 10,0.

DS. 1—2 evők. 3—4-szer napj. Pyrosis.

61 kr.

H. Calcium chloratum fusum (CaCl_2). Színtelen v. fehér, áttetsző, szilárd, kristályos szerkezetű tömeg; íze csipős és keserű. Vízben, bor-szeszben könnyen oldódik, aetherben nem. Levegőn vizet vesz fel és szétfolyik. Substantiában causticum, hig oldatokban adstringens. Szemvíznek $\frac{1}{2}\%$ — 1% -os oldat, sebmosó folyadéknak 4 — 5% -os oldat. Bels. ritkán; $0,2$ — $0,5$ pro dos. 3 — $4 \times$ napj. hig oldatban scrophulosisnál, phthisisnél, makacs hányásnál. $10,0 = 6$ kr.

259 Rp. Calc. chlorat. 5,0.

Spiritus aromat. 30,0.

M. f. solut.

DS. 3 — $4 \times$ napj. 25—30

cseppet kis pohár vízben.

34 kr.

Calcium hypophosphorosum. s. Calc. hypophosphit. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$. Fehér hatoldalú prismák v. fénylő jögeczlapocskák. Szagtalan, légálló, vízben elég jól oldh. Kisebb adagokban phthisis, chlorosis, scrophul., rachitis, cachexia eseteiben. Láz ellenjavallatot képez. Nagy adagban undort kelt s kellemetlen felbőgőzéseket okoz. Nem szabad együtt adni savakkal és kali chloricummal. Savanyú ételek tiltassanak. Adag bels. $0,2$ — $0,5$ gm. 3 — $4 \times$ napj. oldatban. $1,0 = 2$ kr.

H. Calcium oxydatum s. Calcaria caustica, s. usta (CaO). Fehér v. szürkés, szilárd darabok. Félannyi vízzel megnedvesítve, erősen megmelegszik és finom fehér porrá málíkszét, melyből négyannyi vízzel egynemű sűrű pép támad. Causticum. Csak kiils. mint *Pasta caustica viennensis*. $100,0 = 3$ kr. v. $10,0 = 1$ kr. (pulv.)

260 *Pasta caustica viennensis*.

1 Rp. Kalii caust. pulv. 5,0.

Det. in lagen.

S. Suo nomine.

20 kr.

2 Rp. Calc. oxyd. pulv. 5,0.

Det. in lagen.

S. Suo nomine.

15 kr.

3. Rp. Spiritus 10,0.

DS. Suo nomine.

12 kr.

Az 1. és 2. sz. a. anyagok összedörzsöltetnek s a bor-szesz lassú hozzáadása mellett pastává alakíttatnak, melyet lapocz v. kanál segélyével az edzendő helyre kenünk fel. A környezetet, melyet a maró hatástól óvni akarunk, ragtapasz csíkokkal ragaszszuk be. A pastát 10 perczig kell a bőrön rajta hagyni, azután bő vízzel lemosni.

H. Calcium phosphoricum [$\text{Ca}_2\text{H}_2(\text{PO}_4)_2, 4\text{H}_2\text{O}$]. Fehér, könnyű, kristályos por, vízben nem oldható. Bels. felnőtteknek

csonthántalmak esetén porban, pastillákban 0,5—1,5 pro dos.
 3—5 $\times$ napj.; gyermeknek rhachitis ellen 0,2—0,5 pro dos.
 3—4 $\times$ napj. 10,0 = 34 kr.

261 *Rp.* Calc. phosphor.
 Sacchar. alb. aa 20,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. 3 $\times$ napj. 1 késhegygyel.
 Gyermeknek. Rhachitis.
 90 kr.

262 *Rp.* Calc. phosphor. 3,0.
 Ferri reduct. 0,5.
 Sacchar. alb. 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 DS. 3 $\times$ napj. 1 port.
 Feluóttnek.
 51 kr.

263 *Rp.* Calc. phosphor.
 Ferri lact. aa 3,0.
 Sacchar. lactis 10,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. 3 $\times$ napj. 1 késhegygyel.
 Gyermeknek. Rhachitis.
 39 kr.

Calcium sulfuratum s. Calciumsulfid. Keveréke CaS és $CaSO_3$ -nek. Szürkésfehér v. sárgásfehér, záptojás szagú por, légen bomlik, savakkal leöntve H_2S -t fejleszt; lúgos kémhatású; vízben kevésbé, borszeszben nem oldódik. Fürdőhez 50,0—100,0 vegyünk s a vízhez kevés HCl -at öntsünk (idült fémmergezések, rheumatismus, némely idült bőrbaj). 10,0 = 2 kr.

H. Solutio Vlemingekx s. Calc. oxysulfurat. solut. Calcium sulfuratum oldata. Haszn. scabies, psoriasis, prurigo ellen. 100,0 = 20 kr.
 SCHNEIDER módosított vénye köv.:

264 *Rp.* Calc. oxydat. 30,0.
 Sulfur. subl. 60,0.
 Aquae dest. 600,0.
 M. coque ad remanent. 360,0.
 Filtra.

DS. Külsőleg. Ecsetelésre.

Arczon nem szabad ecsetelni. A beteg fürdőben zöld szappannal ledörzsöltetik, s $\frac{1}{2}$ óráig a fürdőben marad; ezután a beteg helyek az oldattal bedörzsöltetnek s a beteg ismét fürdőbe szál $\frac{1}{2}$ órára.

64 kr.

H. Calcium sulfuricum ustum s. Gypsum ustum ($CaSO_4$). Fehér, alaktalan, íztelen és szagtalan por. 1 r. 400—500 r. vízben oldódik. Felényi vízzel péppé keverve az 5 p alatt megmerorodik. Contentivum. Kemény kötések készítésére haszn. 100,0 = 4 kr., 1000,0 = 25 kr.

H. Calumbae radix s. Colombo radix. (Cocculus palmatus. Menispermaceae.) Hatóanyagai: berberin, calumbin (keserű anyag), keményítő. Amarum, tonicum, antidiarrhoeicum. Bels. adag: decoct. 5,0—10,0: 150,0 2 ór. 1 evőlk. 10,0 = 3 kr, vagy 10,0 = 6 kr. (pulv.)

H. Extractum Calumbae. Borszeszes kivonat. Vízben zavarosan oldódik. Bels. adag porban, pilulában, oldatban 0,3—1,0 pro dos 1,5—3,0 pro die. 1,0 = 12 kr.

Berberinum hydrochloricum $C_{10}H_{17}NO_4 \cdot HCl + 2\frac{1}{2}H_2O$. Sárgás, finom tűkből álló jegeczes por. Keserű ízű, 80 r. hideg vízben oldódik, könnyebben forró vízben, borszeszben. Tonicum, amarum. Adják tumor lienis malaricus ellen. valamint méhvérvérek ellen is hydrastis canadensis helyett. Bels. adag porban vagy borszeszes oldatban 0,03—0,05 pro dos. $3 \times$ napj. 0,1 = 16 kr.

Berberinum phosphoricum $(C_{10}H_{17}NO_4 \cdot 2H_3PO_4)$. Sárgás, jegeczes, keserű por. Hideg vízben is jól oldódik. Haszn. mint a berber. hydrochlor.

265 Rp Decoct. rad. Calumbae

e 8,0.

l. a. p. ad. colat. 150,0.

Tinct. Opii crocat

gtt. 10,

Syrup. simpl. 15,0.

MDS. 2 ór. 1 evőlk.

Felnőttnek. Diarrhoea.

40 kr.

266 Rp Decoct. rad. Calumbae

e 2,0.

l. a. p. ad. colat. 80,0.

Extr. Ratanhae dep.

0,2—0,4.

Tinct. Opii simpl.

gtt. 2. — gtt. 3.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

1½—3 éves gyermeknek.

Diarrhoea chiron.

43 kr.

267 Rp Extr rad. Calumbae

3,0.

Pulv. Doveri. 1,0.

Sacchar alb. 2,0.

M. f. pulv. div. in. dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

Felnőttnek. Diarrhoea.

80 kr.

268 Rp Extr. rad. Calumbae 5,0.

Aquae Cinnamomi

simpl. 150,0.

M. f. solut.

DS. 2 ór. 1 evőlk.

Felnőttnek, Tonicum, ama-

rum. 1 frt 23 kr.

H. Camphora. $(C_{10}H_{16}O)$. Stearopten. Fehér, jegeczes, áttetsző, fénylő, szívós tömeg, átható szagú, fűszeres ízű, illó; vízben nem oldódik, borszeszben, aetherben, zsíros és illó olajokban jól old. Borszeszszel nedvesítve porítható (camph. trita). Küls. gyenge antisepticum, izgató; sebekre substantiában, hintőpor alakjában, vagy kenőcs v. linimentum alakjában (1: 5—10). Bels. excitans 0,05—0,2 pro dos. 4—5 $\times$ napj. porban, emulsióban; sedativum nagyobb (0,5—0,8) adagokban. 10,0 8 = kr.

- H. Linimentum saponato-camphoratum s. Opodeldoc.** Küls. derivans bedörzsölésekre. 10,0 = 4 kr.
H. Oleum camphoratum. Küls. derivans bedörzsölésekre. 10,0 = 7 kr.
H. Spiritus camphoratus. Küls. mint az előbbieik. 100,0 = 24 kr., 200,0 = 46 kr.

- 269 Rp.** Ol. camphor. _____
 Chloroformii aa 15,0.
 M. f. linim.
 DS. Külsőleg bedörzsölésre
 42 kr.
- 270 Rp.** Camphor. tritae _____
 Moschi aa 0,5.
 Sacchar. lactis 4,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 Det. in chart. cerat.
 S. 2 ór. 1 port.
 Excitans.
 2 fjt 87 kr.
- 271 Rp.** Camphor. trit. 1,0.
 Gummi arab. pulv. 10,0.
 Aquae dest. 150,0.
 Syrup. simpl. 10,0.
 F. l. a. emuls.
 DS. 2 ór. 1 ovók.
 Excitans 45 kr.
- 272 Rp.** Camphor. trit. 0,5.
 Mellum ovi unius _____
 Aquae dest. 150,0.
 F. l. a. emuls.
 DS. Csőrének. Egyszerre felét elhasználni.
 Excitans.
 39 kr.
- 273 Rp.** Camphor. 2,5.
 Ol. Amygdal. dulc. 10,0.
 M. f. solut. filtra.
 DS. Bőr alá fecskendésre.
 1 fecskendővel egyszerre.
 Excitans. 41 kr.
- 274 Rp.** Camphor. trit. 0,5.
 Sacchar. lactis. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 Det. in chart. cerat
 S. 2 ór. 1 port.
 3—6 éves gyermeknek.
 Excitans. 47 kr.
- 275 Rp.** Camphor. tritae 0,2.
 Chinin. hydrochlor. 0,5.
 Pulv. Gummi arab.
 Sacchar. alb. aa 1,5.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 det. in chart. cerat.
 S. 2 ór. 1 port.
 Gyermeknek cholera asiat és cholera infant. esetén erőhanyatlás alkalmával.
 55 kr. (Rertz.)
- 276 Rp.** Camphorae 1,0.
 Aetheris acet. 15,0.
 Tinct. Opii simpl. 3,0.
 MDS. 10—30 perczenként 10—15 cseppet.
 (OPPOLTZER.)
 Choleránál excitans.
 37 kr.

Camphora monobromata ($C_{10}H_{13}BrO$). Színtelen, prisma-ticus tűk vagy jegecslapok, légálló, gyenge champhorszagúak, vízben oldhatatlanok, borszeszben, aetherben, chloroformban, zsíros olajokban jól oldódnak. Sedativum delirium, tremens, hysteria

epilepsia eseteiben. Bels. adag 0,1—0,5 pro dos. napj. 3—4-szer, caps. amylac. v. gelatin.-ban, emulsióban. 1,0 = 3 kr.

277 Rp. Camphor. monobromatae 2,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
Det. in caps amylac.

S. 3 × napj. 1 capsulát.
73 kr.

278 Rp. Camphor. monobrom. 2,0.
Ol. Sesami 20,0.
Gummi arab. 10,0.
Aqua dest. 150,0.
Syrup. simpl. 15,0.
F. l. a. emulsió.

DS. 3 ór. 1 evők.
57 kr.

†H. **Cannabis indicæ summitates.** (Cannabineae.)

Hatóanyagok: cannabin s. haschischin, tetanocannabin, cannabinon (lágy gyantás anyag), illó olaj. Sedativum, gyenge anodynum (opium pótszere), antispasmodicum, nagy adagban hypnoticum (?) 10,0 = 2 kr. Haszn. készítményei:

†H. **Extractum Cannabis indicæ.** Borszeszes kivonat. Küls. kenőcsben 0,2—0,5 : 10,0—20,0. Bels. porban, pilulában 0,05—0,1! pro dos. 3—4-szer napj. Dos maxim. pro die. 0,3! 1,0 = 8 kr.

†H. **Tinctura Cannabis indicæ.** Küls. nem. Bels. 5—20 csepp pro dos. 3—4×napj. Dos. maxim. sing. 1,0 (20 csepp)! Dos. maxim. pro die. 4,0! 10,0 = 6 kr.

Cannabinum tannicum. Keveréke cannabinnak és tanninak. Összetétel igen változó. Tetanocannabin nem tartalmaz; ez előnye. Sárgásbarna, vízben oldhatatlan, kellemetlen szagú por, íze keserű, összehúzó. Enyhe hypnoticum. Megbízhatlan. Adag. 0,25—0,5 pro dos. este lefekvés előtt. 0,1 = 3 kr.

Cannabinonum. Lágyas, barna színű, gyantás anyag, vízben nem, borszeszben, aetherben jól oldódik. Sedativum, hypnoticum némelyek szerint. Főfájást, hányást, lelki nyugtalanságot, exaltatiót gyakran okoz. Nőknél kétszer oly erős hatású, mint férfiaknál. Szívbetegségeknél kerüljük alkalmazását. Adag bels. pastillákban coffea tosta-val v. pulv. cacao-val 0,02—0,03—0,05 pro dos. 0,10 = 3 kr.

Haschisch purum. Barnás, lágy, gyantás anyag, vízben nem, borszeszben sárga színűen oldódik. Keveréke cannabinonumnak és tetanocannabinnak, mely utóbbi alkotórésznél fogva excitans. Eddig melancholia eseteiben rendelték 0,02—0,06 gm.-nyi adagokban coffea tosta-val porban, pastillákban (pilula nem ó). Nem ajánlható; gyakran haschischrészség, catalepsia, rángó görcsök a bevétel után.

279 *Rp.* Extr. Cannabis ind. 0,5.
 Extr. Hyosciami 0,1.
 Sacchar. alb. 5,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3×napj. 1 port.
 Izgatott köhögés ellen.
 53 kr.

281 *Rp.* Tinct. Cannabis ind.
 Tinct. Ipecac aa 5,0.
MDS. 3—4 × napj. 10—15
 cseppet.
 Felúttnek catarrh.
 bronch.
 24 kr.

283 *Rp.* Cannabini tannici 1,0.
 Sacchar. alb. 2,0
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. Este lefekvés előtt 1—2
 port. (HILLER.)
 Hypnoticum.
 69 kr.

284 *Rp.* Cannabini tannici 3,0.
 Extr. Liquir.
 Pulv. Liquir. aa qu. s.
 ut f. pilul. No. 30.
 Obduc. fol. Argenti.
DS. Este lefekvés előtt
 3—5 szemet.
 1 frt 72 kr.

280 *Rp.* Extr. Cannabis ind.
 Pulv. rad. Ipecac.
 aa 0,06.
 Sacchar. lactis 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3×napj. 1 port.
 3—6 éves gyermek. Catarrh
 bronch. acut.
 43 kr.

282 *Rp.* Cannabinoni 0,2.
 Coffeae tostae pulv.
 Sacchari albi aa 4,0.
 Gummi Tragacanth.
 0,05.
 Aquae glycerin. qu. s
 ut f. massa plastica e
 qua formentur pastilli
 No. 10.
DS. 0,02 grmos cannabi-
 non pastillák.
 Este 1—2 szemet.
 Sedativum, hypnoticum. (?)
 48 kr.

H. Cantharides. (*Lytta vesicatoria*. Coleoptera.) Hatóanyaga cantharidin ($C_8H_6O_4$), mely savi természetű anyag. Haszn. készítményei. 10,0 = 15 kr. pulv.)

Cantharidinum. ($C_{10}H_{12}O_4$). Szintelen, négy oldalú jegeczlapocskák, vízben nem, hideg alkoholban nehezen, aetherben, zsíros olajokban könnyen old. Haszn. a bogarak helyett tapasztókba, collodiumba. Bőr alá fecsk. és bels. psoriasis, lepra gégetubercul, tüdőtubercul. eseteiben. Adag bőr alá és bels. 0,0002—0,0005 gm.; tehát oly minimális, hogy annak lemérése igen bonyolult. Nem megbízható. Főlöszleges. 0,01 = 6 kr.

†**H. Tinctura Cantharidum.** Küls. mint bőrizgató kenőcsben, linimentumban 1 : 20—50. Bels. diureticum (nem ajánlható mérgező hatása miatt). Dos. maxim sing. 0,5! dos maxim. pro die 1,0! 10,0 = 10 kr.

H. Emplastrum Cantharidum s. Empl. vesicatorium consuetum. Hólyaghuzó tapasz. Bőrön hólyagot híz 8—10 óra múlva; előbb, ha a bőrt kevésbé megzsíroztuk. Cantharidin a tapasz alkalmazásakor felszívódik (ezért vigyázat!). 10,0 = 14 kr.

H. Emplastrum Cantharidum perpetuum. Gyengébb az előbbinél, hólyagot csak igen sokára híz. Bőrvörösítő. 10,0 = 17 kr.

285 Rp. Tinct. Canthar. 2,0.
Olei Sesami 50,0.
Olei Bergamottae 5,0.
MDS. Külsőleg. Hajolaj.
Alopecia.
55 kr.

286 Rp. Empl. Cantharid. qu. s.
Extende crasse super
corium (s. linteum)
magnitud. volae
maguus.
DS. Hólyagkúzó.
54 kr.

H. Capilli Veneris frondes. (Filices.) Hatóanyaga illatos olaj. Haszn. a hasonló nevű syrup készítéséhez. 10,0 = 2 kr.

H. Carragaheen. s. Fucus Carragaheen. (Algae.) Hatóanyagai növényi nyák, igen kevés brom, jó d. Belőle nyákos főzet készítették (1 : 100), mely mint vehiculum szerepel csipős, izgató anyagok adagolásánál. 10,0 = 2 kr.

H. Carbo ligni depuratus. Szürszon desodorans. Bels. antidotum alkaloid mérgezések s keserű anyagokkal mérgezések eseteiben. Adag 0,5—2,0 porban, ostyában 5—10 percenként. Más indicatiók (typhus, pyrosis stb.) meg nem állhatnak. Fogpor-nak fölötte ártalmas. 10,0 = 2 kr., 100,0 = 14 kr.

Carbo animalis
Carbo ossium } mint a carbo ligni.

H. Cardamomi fructus. (Elettaria Cardamomum. Scitamineae.) Hatóanyaga illó olaj. Carminativum, stomachicum. Önállóan nem haszn.; főleg illatos vagy keserű theakeverékekhez. 10,0 = 29 kr.

H. Caryophylli flores. (Caryophyllus aromaticus. Myrtaceae.) Hatóanyaga illó olaj. Haszn. mint a cardamomum. 10,0 = 4 kr. vagy 10,0 = 8 kr. (pulv.).

H. Cascarae sagradae cortex. (Rhamnus Purshiana. Rhamnaceae.) Hatóanyaga több gyanta. Kifűzően használható enyhe hashajtó. Adaga porban (caps. amyl.) 0,25 pro dos. 10,0 = 2 kr. Főleg a köv. készítményei használtak:

H. Extractum Cascarae sagradae fluidum. Adag 20—30 csepp pro dos. 1—4×napj. 1,0 = 2 kr. 10,0 = 17 kr.

Vinum Cascarae sagradae. Nagyon elterjedt s kedvelt készítmény. Jól haszn. a Rozsnyay-féle bor, melynek alig van keserősége. Adag: 2 evők. v. egy tokajiban pohárral egyszerre. 10,0 = 8 kr.

287 Rp. Pulv. Cascarae sagrad.
2,5.
Div. in dos. aequ No 10.
Det in caps. amylac.
S. Napj. 2—4 dbot.
62 kr.

289 Rp. Vini Cascarae sagrad.
Rozsnyai. lagenam
unam.
DS. 2 evők. egyszerre.

290 Rp. Extr. Cascarae sagrad,
fluid.
Syrup. cort. Aurat.
Aquae dest. aa 15,0.
MDS. 3 X napj. 1 kk.
Obstip. habit.
48 kr.

288 Rp. Extr. Cascarae sagrad.
fluidi 50,0.
leni calore inspissa, dein
adde
Pulv. Liquir. qu. s.
ut. f. l. a. pilul. No. 100.
Consp. pulv. Liquir.
DS. 2—3 szemet egyszerre
napj. 2—3-szor.
1 frt 50 kr.

291 Rp. Extr. Cascarae sagrad.
fluidi 30,0.
Glycerini 60,0.
Aquae dest. 30,0.
MDS. 3—4 ór. 1 kk.
Obstip. (CAMPBELL)
89 kr.

Cascarillae cortex. (Croton Eluteria. Euphorbiaceae).
Hatóanyagai: illó olaj, gyanta, cascarillin (keserű anyag). Ama-
rum, tonicum, ezenkívül jó szer hasmenésekkel összekötött dys-
pepsiáknál. Adag porban 0,5—1,0 pro dos., infusumban 10,0 : 150,0
2 ór. 1 evők. 10,0 = 3 kr. v 10,0 = 5 kr.

Extractum Cascarillae. Borszeszes kivonat. Pilulá-
ban, oldatban (zavarosan oldódik) adag 0,2—0,5 pro dos. napj.
3—4-szer. 1,0 = 8 kr.

Tinctura Cascarillae. Adag. 20—50 csepp pro dos.
3 X napj. 10,0 = 6 kr.

292 Rp. Tinct. Cascarillae
gtt. 10.
Aquae dest. 80,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—2 éves gyermekeknek
dyspepticus hasmenésnél.
23 kr.

293 Rp. Extr. Cascarillae
Pulv. cort. Cascarillae
aa 3,0.
M. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Cinna-
moni.
DS. 3 X napj. 3—5 szemet.
61 kr.

II. Castoreum. Kiszáradva gyantaszerű, kemény, sötétbarna,
fénylő, sajátos erős szagú, aromás-kesernyész ízű, borszeszben
oldható, porrá törhető állati váladék. Hatóanyagok: gyantas
anyag és illatos olaj. Excitans, antispasmodicum. Bels. adag
porban, pilulában, pastillában 0,1—1,0 pro dos. napj. többször,
0,1 = 5 kr.

H. Tinctura Castorei. Haszn. mint a castoreum. Bels.
adag: 20—30 csepp pro dos. napj. többször. 1,0 = 14 kr.

294 Rp. Castorei 1,0.
 Elaeosacch. Menthae 4,0.
 M. f. pulv. div. in. dos.
 aequ. No. 10.

DS. 6r. 1 port.

Excitans.

96 kr.

296 Rp. Tinct. Castorei
 Tinct. Valerian. spirit.
 aa 10,0.
 MDS. 3 × napj. 20—30
 cseppet.
 Hystericus görcsöknél.
 1 frt 59 kr.

295 Rp. Castorei
 Camphorae trit. aa 2,0.
 Extr. et. pulv. rad. Li-
 quirir aa qu. s.
 ut. f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Lycopod.

DS. 3—4 × napj. 2—3

szemet.

Excitans. 1 frt 41 kr.

297 Rp. Tinct. Castorei 5,0.
 Aquae Cinnamomi
 simpl. 50,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 25,0.

MDS. 2 6r. 1—2 kk.

Excitans. 1 frt 3 kr.

Catechu pallidum. Az Acacia Catechu fájából készült kivonat. Könnyű, barnásszürke, kagylós törésű darabok; íze össze-
 húzó, fanyar. Legnagyobb része oldódik vízben, borszeszben.
 Hatóanyaga catechu-csersav. Adstringens. Haszn. mint az acid.
 tannicum. Adag bels. porban, pilulában 0,1—1,5 pro dos. napj.
 többzür. 10,0 = 3 kr., v. 10,0 = 4 kr. (pulv.).

298 Rp. Catechu pallid. 4,0.
 Pulv. Doveri 1,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 Det. in caps. amylac.

S. 2 6r. 1 port.

Diarrhoea ellen 64 kr.

299 Rp. Catechu pallidi 10,0.
 Sacchar alb. 40,0.
 Mucil. Gummi arab.
 qu. s.
 ut. f. trochisci No. 50.

DS. Napj. 4—8 szemet.

Diarrhoea.

50 kr.

Cava-Cava I. Piper Methysticum.

H. Centaurii herba. (Gentianeae.) Hatóanyaga az erythrocentaurin (keserű anyag). Amarum. Adag infusumban 5,0—15,0: 150,0 2 6r. 1 evők. Keserű theakeverékek egyik megszokott alkatrésze 10,0 = 3 kr.

H. Extractum Centaurii. Sűrű, vizes kivonat. Amarum. Adag 0,5—2,0 pro dos. oldatban. Gyakran haszn. mint pilula-alapanyag. 10,0 = 30 kr.

H. Cera alba. Protectivum. Bels. emulsióban diarrhoeánál, dysenteriánál. Vele készül számos kenőcs, emplastrum, a charta cerata s a cereoli medicati (bougies medicales). 10,0 = 6 kr.

300 *Rp.* Cerae albae 15,0.
leni calore liquefac
in mortario calefacto,
f. l. a. emulsio cum
Gummi arab. 10,0.
Aqua dest. 150,0.
cui addo
Extr. Opii aquos. 0,1.
Elaeosacch. Menthee 10,0.

DS. 2 ór. 1 evők.

Diarrhoea.

75 kr.

301 *Rp.* Cerae albae 5,0
Olei Amygdal. dulc. 35,0.
Cetacei 10,0.
leni calore liquefactis
refrigeratisque adde
Aquae Rosar. 5,0.
Tinct. Benzoes 2,0.
M. f. l. a. ungu.

DS. Cold. cream.

73 kr.

H. **Cera flava.** Haszn. mint a Cera alba. 10,0 = 5 kr.

H. **Ceratum Cetacei.** Részint mint protectivum, részint mint a bőrre alkalmazandó szerek vivőanyaga haszn. 10,0 = 8 kr.

Cerium oxalicum. [$CeC_2O_4 \cdot 3(H_2O)$]. Fehér, szemcsés, légálló por, szagtalan, sem vízben, sem borszeszben nem oldódik, sósavban igen. Cardialgia, csillapíthatlan hányás (terhesek) ellen bels. adag porban 0,06—0,2 pro dos. napj. 3—4-szer. 1,0 = 2 kr.

302 *Rp.* Cerii oxal. 1,0,
Elaeosacchar. Menthae. 4,0.
M. f. pulv. div. in. dos.
aequ. No. 10.
D. 3 ór. 1 port.
48 kr.

H. **Cetaceum s. Sperma Ceti.** Hőfehér, fénylő, lemezesen jégezes, áttetsző, zsíros tapintatú, szagtalan, íztelen állati zsíradék. F leg plamitinsavas cetylaether. Kenőcsök, ceratumok készítésénél fontos anyag. 10,0 = 6 kr.

H. **Chamomillae vulgaris flores.** (Compositae.) Hatóanyaga illó olaj. Illatos theakeverékek gyakori alkotórésze. Infusuma (15,0—20,0 : 150,0) jó vivőanyag. 10,0 = 3 kr., 100,0 = 20 kr ; 10,0 = 6 kr. (pulv.)

H. **Charia sinapisata** l. Sinapis nigra.

H. **Chinae Calisayae cortex planus s. China regia plana.** Cinchona Calisaya (Rubiaceae) törzsének kérge. Főhatóanyagai chinin ($C_{20}H_{24}N_2O_8$), chinidin (isomer a chininnel), cinchonin ($C_{20}H_{24}N_2O_8$), cinchonidin (isomer a cinchoninnel). Az alkaloidokból legalább 2% ot tartalmazzon mindhárom hivatalos kéreg. Amarum, tonicum. Adag: decoctum 1 : 10 vízzel v. vörös borral. 10,0 = 11 kr. v. 10,0 = 16 kr. (pulv.).

H. **Chinae Calisayae cortex convolutus.** Cinchona Calisaya (Rubiaceae) ágainak kérge. Hatóanyagok, használat, adag, mint a törzsnek kérgénél. 10,0 = 8 kr. v. 10,0 = 13 kr. (pulv.).

H. Chinae succirubrae cortex. Cinchona succirubra (Rubiaceae) törzsének és nagyobb ágainak kérge. Hatóanyagok, használat, adag, mint fentebb. 10,0 = 5 kr. v. 10,0 = 9 kr. (pulv.)

H. Extractum Chinae. Vizes kivonata a cort. chinae succirubr.-nek. Száraz, porítható. Csersavtartalma tetemes, alkaloidtartalma csekély. Tonicum, adstringens. Adag porban, pilulában 0,5—2,0 többször napj. 1,0 = 10 kr.

H. Tinctura Chinae simplex. Cort. chinae succirubr.-ből készül. Tonicum, stomachicum. Adag 20—50 csepp pro dos. napj. többször. 10,0 = 8 kr.

H. Tinctura Chinae composita s. Tinctura roborans Whyti. Cort. chinae succirubr. mellett rad. gentianae, flavedo cort. aurant. és cort. cassiae cinnamomi is használtatik készítéséhez. Tonicum, stomachicum. Adag 20—25 csepp pro dos. napj. többször. 10,0 = 6 kr.

H. Vinum Chinae. Malagaborral készül. Tonicum. Adag gyermekknál, tokaji pohárnyi 2—3 × napj. 10,0 = 8 kr.

303 Rp. Cort. Chinae succirubr.

Vini rubri 15,0.
f. l. a. decoctum 200,0.
cui adde
Elixir acid Halleri 2,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.
Tonicum. Felnőttnek.
1 frt 7 kr.

304 Rp. Decoct. Chinae Calisayae e

4,0.
l. a. p. ad. colat. 100,0.
Acid. sulf. dilut. gtt. 10.
Syrup. cort. Aurant. 15,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.
5 éven túli gyermeknek
morb. macul. Werlhof-nél,
scorbut nál, v. reconvalescentia tartama alatt.
41 kr.

305 Rp. Cort. Chinae succirubr.

Carbonis ligni depur. aa 100,0.
M. f. pulv.

DS. Hintópor putrid sebekre.
1 frt 28 kr.

306 Rp. Extr. Chinae 0,2—0,4.

Aquae dest. 100,0.
Syrup. simpl. 15,0.

MDS. 2 ór. kk. v. gyk.
1—4 éves gyermeknek.
Tonicum. 33 kr.

307 Rp. Extr. Chinae 2,5.

Medullae ossium bovis 25,0.
Olei Lavand. 1,0.
M. f. ungu.

DS. Hajkenőcs.
68 kr.

308 Rp. Tinct. Chinae comp.

Tinct. cort. Aurant. aa 20,0.
Tinct. Nucis vomicae 10,0.

MDS. 3 × napj. 20—30.
cseppet.
Amarum Tonicum. 44 kr.

309 *Rp.* Extr. Chinae
 Extr. Centaurii aa 5,0.
 Pulv. rad. Rhei chin.
 qu. s. (5,0)
 ut. f. pilul. No. 50.
 Consp. pulv. Cinnam.

DS. 3 × napj. étkezés előtt
 2—3 szemet. Stomachicum,
 1 frt 10 kr.

310 *Rp.* Tinct. Chinae comp.
 Tinct. Rhei vinos.
 aa 1,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 15,0.

MDS. 2 ór. 1 kl. v. gyk.
 1—3 éves gyermeknek.
 Stomachicum. 31 kr.

Hivatalos chinin-készítmények.

H. Chininum ($C_{20}H_{21}N_2O_2, 3H_2O$). Fehér, selyemfényű, tűalakú jegeczekből álló por. Keserű, lúgos kémhatású; vízben alig, borszeszben elég jól oldódik. Gyógyszerekre sói használatnak. 0,10 = 2 kr.

H. Chininum bisulfuricum ($C_{20}H_{21}O_2N_2, H_2SO_4, 7H_2O$). Szintelen, hasábos kristályok, levegőn elmállanak; 11 sf. vízben, 32 sr. borszeszben oldódik. Oldata savanyú kémhatású. Antitypicum (antimalaricum), antipyreticum, (dos. totalis) tonicum, amarum, (dosis refracta). Adag bels. dosis totalis 0,5—1,0, míg a dos. refracta 0,05—0,1 3—4 × napj. porban, pilulában, pastillában oldatban. Subcután a hivatalos chininsók közül ezen készítmény használatik, mert vízben legjobban oldódik. 1,0 = 9 kr.

H. Chininum hydrochloricum ($C_{20}H_{21}O_2N_2, HCl, 2H_2O$). Fehér, selyemfényű, többnyire összegomolyodó jegeczekkék. Keserű ízű, 34 sr. vízben, 3 sr. borszeszben oldható. Oldata neutralis kémhatású. Hatás, használat mint a chinin. bisulf. Subcután ritkábban. 1,0 = 12 kr.

H. Chininum sulfuricum [$(C_{20}H_{21}O_2N_2)_2H_2SO_4, 7H_2O$]. Igen finom, hajlékony, tűalakú, gomolyokká összetapadó, selyemfényű, keserű ízű kristálykák; száraz levegőn elmállanak. 800 sr. hideg, 25 sr. forró vízben, 60 sr. hideg, 6 sr. forró borszeszben oldódik. Ha vízben oldani akarjuk 0,08-hoz 1 csepp acid. sulf. dilutum veendő. Hatást, használatot l. chinin. bisulfuricumnál. 1,0 = 8 kr.

H. Chininum tannicum insipidum Rozsnyai. 100 részben 30—32 sr. chinin. Sárgás színű, íztelen por, vízben alig, 40 sr. borszeszben oldódik. Hatás, használat, mint a chinin. bisulf. Adag $2\frac{1}{2}$ —3-szor annyi, mint a chinin. bisulf.-ból 1,0 = 11 kr.

311 *Rp.* Chinin. sulfur. 1,5.
 Pulv. folior. Digitalis
 Opii pur. pulv. aa 0,3.
 Succ. Liquirit. qu. s.
 ut f. pilul. No. 30.
DS. 3 × napj. 1—3 szemet.
 (Pilul. Heimi. Phthisisnél.)
 52 kr.

313 *Rp.* Chinin. bisulfur. 2,0.
 Aquae dest.
 Syrup. Mororum
 aa 50,0.
MDS. Félis interm. malar-
 cianál felét egy óra
 alatt elfogyasztani 3—
 4 órával a várt láz-
 roham előtt.
 58 kr.

315 *Rp.* Chinin. hydrochlor. 2,0.
 Div. in dos. aequ. No. 10.
 Det. in caps. amylic.
S. 2—5 adagot pro die, ren-
 delet szerint.
 Antipyreticum, antimalari-
 cum, antineuralgicum.
 84 kr.

317 *Rp.* Chinin. sulfur. 0,5.
 Sacchar. alb. 5,0
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port. Tonicum.
 43 kr.

319 *Rp.* Chinin. tannici 3,0.
 Pastae cacaotinae sacch.
 qu. s. (20,0)
 ut f. trochisci No. 10.
DS. Rendelet szerint. Chi-
 nin-chocolade. 1 trochiscus
 0,1 chinint tartalmaz. Gyer-
 meknek váltóláz roham
 előtt 3 órával 1—3 darabot
 78 kr.

312 *Rp.* Chinin. sulfur. 0,4—0,6.
 Aquae dest.
 Syrup. Rubi Idaei
 aa 40,0.
 Acid. sulfur. dil. gttas
 qu. s. ad perfect. solut.
DS. ór. 1 gyk.
 2—6 éves gyermeknek vál-
 tóláznál lázmentes időben
 a szer felét ór. 1 gyk.
 41 kr.

314 *Rp.* Chinin. bisulfur. 1,0.
 Aquae dest. 11,0.
 M. filtra.
DS. Bőr alá fecskendésre.
 1 fecskendő 0,07—0,08
 chinint tartalmaz.
 38 kr.

316 *Rp.* Chinin. hydrochlor. 1,0.
 Aquae dest. 100,0.
 f. solut. admisce
 Vitell. ovi unius
 Tinct. Opiisimpl. gtt. 10.
DS. 2 csőrének.
 Antipyreticum.
 47 kr.

318 *Rp.* Chinin. sulfur.
 Ferri sulfur. aa 1,5.
 Pulv. et extr. Liquirit.
 qu. s.
 ut f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Liquiritiae.
DS. 3 × napj. 3—3 szemet.
 Anaemia, chlorosis. 53 kr.

320 *Rp.* Chinin. tannici
 Natrii bicarbon. aa 0,5.
 Lactucarii german. 0,2.
 Sacchar. albi. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aqu. No. 10.
DS. 4 port napj.
 4—6 éves gyermeknek.
 Phthisis.
 48 kr.

Nem hivatalos China-készítmények.

Chininum aethylo-sulfuricum. $C_{10}H_{24}N_2O_4(C_2H_5)_2SO_4$. Fehér, nehezen jegecszítendő, vízben jól oldható anyag. Bőr alá fecskendésre ajánlották. Subcután 0,2—0,5 gm. pro dos.

Chininum bimuriaticum carbamidatum. 70% chinint tartalmaz. Hosszú, fehér, prismaticus jegeczek = sr. vízben oldatnak. Kittinő készítmény bőr alá fecskendés céljaira. Hosszabb időn át nem tartható, bomlik. Antipyreticus adag 0,2—0,5 pro dos. 2—3 × napj. 1,0 = 30 kr.

321 Rp. Chinin. bimuriatici carb-
amid. 2,0.
Aqua dest. 8,0.
M. filtra.

DS. Bőr alá fecskendésre.
1 fecskendőben 0,2 gm.
van a készítményből.
86 kr.

Chininum ferro-citricum. Fénylő, kissé áttetsző, vörösbarna lemezek, keserű ízűek, 3 r. vízben oldódnak. 9% chinint és 30—32% vasoxydot tartalmaz. Haszn. chlorosisnál, olygaemiánál, scrophulosisnál. Adag porban, piulában v. oldatban 0,2—0,5 pro dos. 3—4-szor napj. Főleg a gyermekgyakorlatban haszn. 1,0 = 10 kr.

322 Rp. Chinini ferro-citrici 0,3—0,6. 323 Rp. Chinini ferro-citr. 2,0.
Pulv. rad. Gentianae 1,0.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aegu. No. 10.

DS. 3—4 ór. 1 port.

4—8 éves gyermeknek.

42 kr.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos. aegu.

No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

Chlorosis, olygaemia.

61 kr.

Chininum hydrobromicum. $C_{10}H_{24}N_2O_4.HBr.2H_2O$. Szintelen, fénylő, légálló, szagtalan, vízben elég jól oldódó jegecszítők. Malaricus neuralgiák ellen ajánlották. Adag bels. 0,1—0,5 pro dos. pilul. v. oldatban. Bőr alá fecsk. 10%-os oldat, melyhez glycerin is adható. 1,0 = 20 kr.

Chininum salicylicum ($C_{10}H_{24}N_2O_4.C_7H_5O_3.H_2O$). Fehér, laza jegeczek, hideg vízben nehezen, borszeszben könnyebben oldódnak. Egyesíti a chinin és salicylsav hatásait. Antipyreticum. Adag 0,1—0,5 pro dos. porban 3—4 × napj. 1,0 = 20 kr.

Chinidinum sulfuricum seu Conchininum sulf.

s. β **Chininum sulf.** Isomer a chininum sulf.-al. Finom, tűalakú, szintelen, keserű ízű jegeczek. Vízben könnyebben oldódik, mint a kénsavas chinin. Hatás, használat, mint a chinin-sóknál. Hatása a chinin. sulf.-éhoz úgy viszonylik, mint 3:5:4. 1,0 = 10 kr.

Chinchoninum sulfuricum $[(C_{10}H_{14}ON_2)_2H_2SO_4 \cdot 2H_2O]$.
Nagyobb épszögű hasábokból álló kemény jegeczek; kevésbé keserű, mint a chinin sulfur. 60 r. vízben oldódik, 7 r. tömény borszeszben. Hatása, használata, mint a chinin. sulfuricumé, adaga azonban félszer nagyobb legyen. 1,0 = 2 kr.

*

Chinolinum (C_9H_7N) . Szintelen, olajszerű, erősen fénytörő, keserű mandolaolaj-szagú folyadék. Vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Antisepticum, s mint ilyen száj-, torokvíznek haszn. 1,0:500,0 (kevés borszesz segélyével feloldani); diphtheritisnél torokcsetelésre 5%-os víz-borszeszes oldat. Bels. ma már nem haszn. 1,0 = 5 kr.

Chinolinum tartaricum $[3(C_9H_7N) \cdot 4(C_4H_4O_6)]$. Selyemfényű, szintelen, légálló, keserű mandolaolaj-szagú jegeczek; vízben elég jól oldódnak. Íze nem keserű. Bels. antipyreticum, antimalaricum (?). Adag volt porban, oldatban 0,5—1,5 pro dos. 3—4× napj. Obsolet 1,0 = 5 kr.

† **H. Chloralum hydratum** $(C_2C_2H_3O_2)$. Szintelen, átlátszó kristályok; szaga gyengén szurós, íze kesernyész, csipős; vízben, borszeszben oldódik. Sedativum kis adagban, hypnoticum nagy adagban. Substantiában nem szabad adni! Ellenjavalt a gyomorlobos vagy fekélyes bántalmainál, szívbajoknál. Lázas bántalmak esetén csak kis adagban. Sedativ adag nyákos oldatban 0,1—0,5 pro dos. 2—3 ór. Hypnoticus adag oldatban, pilulában, vagy klystirben, suppositoriumban 1,5—2,5 egyszerre vagy két adagra osztva, lefekvés előtt. Bőr alá fecskendezve tályogokat okozhat. Dos. maxim. sing. 3,0! dos. maxim. pro die 6,0! 1,0 = 2 kr., 10,0 = 15 kr.

324 Rp. Chlorali hydrati 4,0.
Syrup. cort. Aurant 60,0.

M. f. solutio.
DS. Lefekvés előtt felét
elfogyasztani. Hypnoticum.
49 kr.

326 Rp. Chlorali hydrati 5,0.
Morphiini hydrochlor. 0,05.
Aquae Menthae pip. 120,0.
Syrup. cort. Aurant. 30,0.

MDS. 2 ór. 1 evőkan.
Sedativum elmebeteg-
nek. 66 kr.

325 Rp. Chlorali hydrati 2,0.
Mucilag. Gummi arab. 50,0.
Aquae dest. 50,0.
MDS. Csörének. Egyszerre
elfogyasztani. 58 kr.

327 Rp. Chlorali hydrati 0,2—0,5.
Aquae dest. 80,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 2 ór. 1 kfk. v. gyk.
Csecsemőnek trismus és
tetanus esetén. Ha a
gyermek nyelni nem
tudna, csörében rende-
lendő az összes adag
fele, esetleg az oldat az
orran át üntendő be.
34 kr.

Chloralamid, jobban mondva **Chloralum formamidatum** ($\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{OH.NHCOH}$). Fénylő, fehéres nagyobb jég-czek, kesernyős ízűek. Hideg vízben lassan oldódik, borszeszben jobban. 60°C -on túl nem szabad hevíteni, sem alkáliakkal összehozni, mert akkor componenseire u. i. chloralra (hydrat) és hangyasavas ammon-ra hasad szét. Hypnoticum. A vérben chloral hasad le belőle, innen hatása. Hypnoticus adag 1,0—2,0—3,0 pro dos. oldatban. Feljebb menni veszélyes lehet (!). 3,0 chloralamid = 2,0 chloralhydrát. Szívbetegségeknél vigyázat (!). 1,0 = 6 kr.

328 Rp. Chloralamidi	4,0.	329 Rp. Chloralamidi pulv.	5,0.
Aquae dest.	50,0.	Div. in dos. aequ.	
Cognac	5,0.	No. 10.	
Syrupi cort. Aurant.		Dent. in caps. amylac.	
	15,0.	S. Este lefekvés előtt 3—5	
M. f. solut.		port.	
DS. Este lefekvés előtt felét		90 kr.	
bevenni.	59 kr.		

330 Rp. Chloralamidi 6,0.
 Aquae dest. 60,0.
 Syrup. cort. Aurant 30,0.
 MDS. $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ részét este
 lefekvés előtt egyszerre
 elfogyasztani.
 68 kr.

Chloralimidum. ($\text{CCl}_3\text{—CH=NH}$). Színtelen, szag- és íztelen jegecztük; vízben oldhatlan, könnyen alkoholban, zsíros olajokban. Hatás, haszn. mint a chloralamidnál. Talán erősebb hypnoticum. Adag. bels. 1,0—2,0 gm. pro dos. pilul., porban v. borszeszes oldatban. 0,10 = 4 kr.

Chloralose. ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}_2\text{O}_6$) Chloral és glycese vegyülete. Finom illó jegecztük; hideg vízben alig, meleg vízben, borszeszben, könnyen old. Hypnoticum. Kellemetlen mellék tünetek gyakoriak. Vigyázat (!). Adag bels. porban 0,1—0,3 pro dos. és pro die. 0,10 = 4 kr.

†H. **Chlorodine.** (Tartalmaz: extr. cannabist, aether aceticust, chloroformot, tinctura zingiberist és syrupus aurantiorumot). Zöldessárga színű, csipős ízű, chlorof.-aether szagú folyadék. Bels. antispasmodicum, sedativum, azonkívül cardialgia, kolika ellen. Adag 15—20 csepp pro dos. napj. többször. Dos. maxim. sing. 1,5! Dos. maxim. pro die 6,0! 10,0 = 14 kr.

†H. **Chloroformium** e **Chloralo** (CHCl_3). Színtelen, átlátszó, nem kellemetlen szagú, édeses ízű folyadék. Vízben alig oldódik, borszeszszel, aetherrel és zsíradékkal elegyíthető. Forr 60 — 61°C -nál. Küls. linimentum alakjában bőrre dörzsölve fájdalomcsillapító és elvonó neuralgiáknál, rheumatismusnál. Belégzé-

sek alakjában strychnin mérgezésnél, tetanusnál, eclampsianál; sebészetben nagyobb műtétek kivitelenél mint anaestheticum, narcoticum. Anaesthesia és narcosis előidézésére 5,0—10,0 szükséges; iszákosoknak több (vigyázat!!). Szívbántalmaknál ellenjavalt. Narcosis tartamát meghosszabbíthatjuk, s chloroformot megtakaríthatunk morph. hydrochl. előzetes bőr alá fecskendezésével (0,01—0,03), Per os *tiszta chlorof.*-ot ne adjunk, hanem azt vagy vízben felrázva v. nyákos vehiculumban elkeverve. Bels. tengeri betegség, hasmenések, bélérgek, cardialgia, orjedés a gyomorban, hyperemesis ellen (sőt typhus ab. esetén is) 5—20 csepp! 10,0 = 11 kr. 100,0 = 90 kr.

331 Rp. Chloroformii 10,0.
Ol. Hyosciami aa 20,0.
M. f. linim.
D.S. Külsőleg, bőr bedörzsölésére.
Neuralgia, rheumatismus.
45 kr.

332 Rp. Chloroformii 10,0.
Cerae alb. 5,0.
Adipis suilli 85,0.
M. f. ungu.
D.S. Kenőcs.
Pruritus
66 kr.

333 Rp. Chloroformii 4,0.
Syr. simpl. 40,0.
M.D.S. 3 része osztva 1 óra alatt vízben bevenni. Tagnálk.
33 kr.

334 Rp. Chloroformii 3,0.
Spiritus vini 12,0.
Tinct. Abisinthii comp. 15,0.
M.D.S. 20—50 cseppet vízben.
(Colica, tengeri betegség, hemicrania).
29 kr.

H. Chorda carbolata, l. Acid. carbol.

Chrysarobinum, l. Araroba.

Cinae flores. (Compositae.) Hatóanyaga santonin. Virágok ma már nem használatnak, helyettük santonint rendelünk 10,0 = 2 kr.

†**H. Santoninum** ($C_{15}H_{15}O_2$). Santonsav-anhydrid. Színtelen, hasábalakú, vagy pikkelyes kristályok. Vízben alig, borszeszben is kevésbé oldódik. Haszn. ascaris lumbricoides elűzésére. Adag porban, pastillában gyermekeknek 0,02—0,04 pro dos. napj. 3—4-szer, felnőtteknek 0,05—0,1!! pro dos. 3—4-szer napj. Dos maxim. pro die 0,3! = 1 kr.

335 Rp. Santonini 0,2—0,4.
Olei Ricini 50,0.
M.D.S. 2 ór. 1 kk. székiürülés bekövetkeztéig.
2—4 éves gyermeknek.
27 kr.

336 Rp. Santonini 0,2—0,4.
Sacchar alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in. dos. aequ. No. 10.
D.S. Délelőtt 3—4 port; d. u. 1—2 kk. v. gyk. ol. Ricini.
3—8 éves gyermeknek.
41 kr.

337 Rp. Santonini 0,25.
Pastae cacaotinae sacch.
 qu. s. (20,0.)
 ut. f. pastilli No. 10.
DS. Santonin-chocolade
 1 drb tart. 0,025 santonint.
 48 kr.

338 Rp. Santonini 0,12—0,3.
Calomelanos 0,06—0,2.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in. dos.
aequ. No. 6.
DS. reggel este 1 port.
 3—8 éves gyermek. *ascaria.*
 35 kr.

Cinchoninum sulfuricum, l. Chinakészítmények cz. a.
 †**H. Cinnubaris factitia** (*HgS*). Igen finom por, élénk piros,
 szagtalan, íztelen. A decoct. Zittmanni készítéséhez haszn. 10,0 =
 8 kr.

H. Cinnamomi Cassiae cortex. (Laurineae.) Hatóanyagai
 illó olaj, kevés csersav, gyanta. Pora pilulahintő-por, íz és szag-
 javító; a kéregdarabok keserű v. illatos theakeverékek, tinc-
 turák készítéséhez használatnak. 101,0 = 31 kr., 10,0 = 6 kr.
 (pulv.).

H. Aqua Cinnamomi simplex. Szagjavító vehiculum.
 100,0 = 18 kr.

H. Aqua Cinnamomi spiritiosa. Szagjavító vehicu-
 lum. 100,0 = 23 kr.

H. Symplicum Cinnamomi. Iz és szagjavító. 10,0 = 5 kr.

H. Tinctura Cinnamomi. Keserű vagy illatos tinc-
 turák alkatrésze, Stomachicum. Adag 25—30 csepp pro dos.
 napj. többször. Szokásos metrorrhagiák ellen is adagolni 10,0 =
 4 kr.

H. Oleum Cinnamomi Cassiae. Illatos olaj. Szag-
 javító. *Elaeosaccharum* készítéséhez haszn. 1,0 = 5 kr.

H. Citri cortex fructus. (Aurantiaceae.) Hatóanyagai keserű
 anyag és illó olaj. Keserű vagy illatos theakeverékekhez, tinc-
 turákhoz haszn. 10,0 = 7 kr.

H. Citri flavedo corticis. Hatóanyagok, használat, mint
 fentebb. 10,0 = 7 kr. 10,0 = 11 kr. (pulv.).

H. Oleum Citri. Illatos olaj. *Elaeosaccharum* készítéséhez
 haszn. 1,0 = 4 kr., 10,0 = 30 kr.

Citrophenum. Citromsav és phenetidín összeköttetése. Fehér,
 kellemes ízű, vízben nehezen oldódó por. Antipyreticum, anal-
 geticum mint a phenacetin. Adag: bels. porban 0,5—1,0 pro dos.
 3,0—5,0 pro die. 1,0 = 20 kr.

†**H. Cocainum hydrochloricum** ($C_{17}H_{19}NO, HCl$). Fe-
 lér, jögeczes por, vagy szintelen kristályok. Ize kesernyés és a
 nyelvet mulékonnyan érzésteleníti. Vízben, borszeszben, chloro-
 formban könnyen oldódik. Vizes oldata semleges kémhatású.
 Helybeli anaestheticum, analgeticum. Szem érzéstelenítésére 5%-
 20%-os oldatból néhány csepp a kötőhártya-redőbe cseppentetik;
 szájfekélyek 5%-10%-os oldattal ecsetelendők; garathyperaes-
 thesiánál, anginánál 2%-5%-os oldattal ecsetelések; gége-

orttükörözés előtt a garat 10%-20%-os oldattal érzéstelenítendő; endolaryngealis vagy endonasalis műtéteknél gége, orr nyákhártyája 10%-20%-os oldattal ecseteltessek; gégefekélyek 10%-os oldattal kezelve, szűnnek a köhögési inger s a nyelési nehézségek; dobhártya 5%-10%-os oldat néhány cseppjével érzéstelenítendő; foghús a végzendő műtétek előtt 5%-os oldattal ecsetelendő; fogextrakciónál előbb a megfelelő foghúsrészletet kell érzésteleníteni, azután a foghúsba 10%-15%-os oldatból $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ Pravaz-fecskendőnyit fecskendezni (vigyázat!); férfi, nő húgycsővét 2%-os oldat 2—3 cm-terje érzésteleníti; égési sebek, herpes Zoster fissura ani, sebes csecsbimbók stb. 2%-5%-os oldattal ecseteltessek. Belsőleg cardialgia, csillapíthatatlan hányás (terhesek, tengeri betegség) esetén, azután mint stimulans testi kimerülés, collapsus, bódító mérgezések esetén 0,02—0,05! pro dos. napj. 3—4-szer porban. pilulában, cseppekben, bőr alá fecskendés alakjában. Dos. maxim. pro die 0,2! Heveny cocain-mérgezés esetén amyl-nitrit néhány cseppje (8—10) légzendő be. 0,10 = 10 kr., 1,0 = 73 kr.

339 Rp. Cocaini hydrochlor. 0,5.

Ungu emoll. 25,0.

M. f. ungu.

DS. Kenőcs.

Tenesmusnál a végbélnyílásba bábnai bedörzsölendő.

1 frt 1 kr.

341 Rp. Cocaini hydrochlor.

0,1—0,5.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

DS. Szükség esetén egy port. Cardialgia. hyperemesis.

49 kr.

343 Rp. Cocaini hydrochlor.

0,15—0,25.

Butyri Cacao qu. s. (10,0.)

ut. f. supposit. No 5.

DS. Egy darabot elhasználni szükség esetén. Tenesmus.

74 kr.

340 Rp. Cocaini hydrochl. 0,5.

Aquae dest. 10,0.

Hydrarg. bichlor

corros. 0,001.

M. f. solutio. Filtra.

DS. Bőr alá fecskendésre 5%-os cocain oldat. Az orvos kezéhez. Kisebb, a bőrön végrehajtható műtéteknél anaesthetizálás céljából $\frac{1}{2}$ —1 fecskendőnyi használandó el.

87 kr.

342 Rp. Cocaini hydrochl.

0,5—1,0.

Aquae dest. 100,0.

MDS. Belehelésre Siegle-féle permetezőből. Vigyázat. Nem szabad lenyelni! Görcsös köhögésnél.

76 kr.

344 Rp. Cocaini hydrochlor. 1,0.

Aquae dest. 8,0.

Spiritus 2,0.

MDS. Külsőleg. 10%-os cocain oldat. 97 kr

345 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
(0,3)—0,5.

Morphini hydrochlor.
2,0.

Tinct. Belladonnae
(5,0)—10,0

Aquae amygdal. amar.
25,0.

MD. ad. vitr. hyalin.

S. ór. 10—15 cseppet.

Hyperemesis, gastralgia,
hysterica hyperaesthesia.
hyster. convulsio.

1 frt 26 kr.

347 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,25—0,5.

Aquae dest. 250,0.

Kalii chlorici 5,0.

Aquae Amygdal.
amar. 10,0.

MDS. Porlasztóval az orrba
viendő. Coryza főfájással.
(SCHNITZLER.)

74 kr.

348 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,06—

Aquae dest.

Kalii chlorici.

Aquae Amygdal. amar.
aa 0,5.

MDS. Melegen belégzendő
permeté alakjában. Tussis
convuls. 40 kr. (GREFFNER.)

348 *Rp.* Acid. arsenicosi
Cocaini hydrochlor.
aa 0,5.

Kreosoti qu s.

Fiat pasta mollis.

DS. Fogtömés előtt a pulpa
elroncsolására szolgáló
pasta.

75 kr.

†H. **Codeinum.** I. Opium.

†H. **Coffeinum.** ($C_8H_{10}N_4O_2$). Tülaakú, fehér, selyemfényű,
kellemetlen kesernyős ízű kristályok. 80 sr. hideg, 2 sr. forró
vízben, 50 sr. borszeszben oldódik. Cardiacum (digitalis pótszere,
nem cumulativ hatású), diureticum: ezenkívül hemicrania, neu-
ralgiák ellen is szokásos szer. Hivatalos sói használatnak, melyek
vízben jól oldódnak. Dos maxim. sing. 0,1! dos maxim. pro die
0,6! 0,1 = 2 kr.

†**Coffeinum citricum.** Nem vegyület, csak keverék.
66% coffeint tartalmaz; vízben jobban oldódik, mint a coffein.
Adag porban 0,05—0,1! pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim.
pro die 0,6! 0,1 = 2 kr.

†H. **Coffeinum natrio-benzoicum.** 40—46% coffeint
tartalmaz; 2 r. forró vízben oldódik, s ha a víz kihűlt is,
oldatban marad. Fehér, amorph. por, benzoé szagú, keserű
ízű. Adag porban, oldatban. bőr alá fecskendezve 0,1—0,2
pro dos. napj. 3—4-szer. 0,1 = 3 kr.

†H. **Coffeinum natrio-salicylicum.** 50% coffeint
tartalmaz; 2 r. forró vízben oldódik. Fehér, amorph, szag-
talan, keserű-édes ízű por. Adag mint a coff. natr. benzoic.
0,1 = 2 kr.

349 Rp. Coffeini citr.
 Chinin. hydrochlor.
 aa 0,6.
 Sacchar. alb. 4,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.

DS. Hemicrania esetén
 1—2 port. napj. 58 kr.

351 Rp. Coffein. natrio-benzoic.
 2,0.
 Aquae dest. 10,0.
 M. filtra.

DS. Bőr alá fecskendésre
 1/2—1 fecskendővel egy-
 szerre. 86 kr.

350 Rp. Coffein natrio-benzoic.
 1,0.
 Aquae dest. 130,0.
 Syrup Rubi Idaei 20,0.

MDS. 2—3 ór. 1 evők.
 63 kr.

352. Rp. Coffein. natrio-salicyl.
 1,0.
 Elaeosacchar. Citri 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.

DS. 2—3 ór. 1 port.
 66 kr.

353 Rp. Coffeini natrio-salicyl.
 2,0.
 Pastae Cacaot. sacchar.
 qu. s.
 ut. f. trochisci No. 10.
DS. Napj. 3—4 dbot.
 80 kr.

H. Cognae s. Spiritus Vini gallici. Sárgás. tiszta, kellemes borszesz szagú és ízű folyadék. 46—50% borszeszt tartalmaz. Excitans, analepticum. Adag kávé-, evőkanalanként, esetleg tejjel vegyítve. 100 = 11 kr.

†**H. Colchici semina.** (Colchicum autumnale, Colchicaceae). hatóanyaga colchicinum. Készítményei haszn. 10,0 = 2 kr.

††**H. Colchicinum** ($C_{17}H_{15}NO_6$). Alkaloid. Sárgásfehér-néha jegecses por, levegőn megbarnul. Ize tartósan keserű, 2 r. vízben, borszeszben oldható. Kőszvényes, csúszos bántal, mak ellen haszn. Adag pilulában, oldatban 0,0005—0,003! pro dos. 2—3 × napj. Dos. maxim. pro die 0,01! Nagy vigyázat, hevesen ható mérég (!); inkább az alábbi készítmények használtassanak. 0,01 = 3 kr.

†**H. Tinctura Colchici seminum.** Adag 15—30 csepp 2—3 × napj. vízben, syrupban. Dos. maxim. sing. 2,0; dos. maxim. pro die 6,0! 10,0 = 6 kr.

†**H. Vinum Colchici.** Adag 5—15 csepp 2—3 × napj. Dos. maxim. sing. 1,0! Dos. maxim. pro die 3,0! 10,0 = 10 kr.

354 Rp. Colchicini 0,015.
Pulv. et extr. Lipuir. āā
qu. s.
ut f. pilul. No 30.
Obduc. Collodio.

DS. 3 × napj. 1—2 szemet.
Egy pilulában 0,0005 col-
chicin.
70 kr.

355 Rp. Tinct. Colchici. 10,0
Tinct. Opii simpl. 1,0.
MDS. 3 × napj. 10—15
cseppet. 22 kr.

356 Rp. Vini Colchici. 10,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
MDS. 3—3 ór. 5—10 csep-
pet. Vin. Colchici opiatum.
26 kr. (EISENMANN).

II. Collodium. Kissé sűrű, félig átlátszó, közömbös kémhatású
folyadék. Protectivum. 10,0 = 4 kr.

H. Collodium flexile. (50 r. collodium + 1 r. ol. ricini.)
Protectivum. Nem törékeny. 10,0 = 6 kr.

II. Collyrium adstringens luteum. Szemvíz. Adstrin-
gens. Főalkatrészei zinc. sulf. és ammon. chlorat. Tisztán v.
egyenlő r. vízzel elegyítve kötőhártyaredőbe cseppenteni néhány
cseppet catarrh. conjunct. esetén. 10,0 = 3 kr.

†**H. Colocynthis fructus.** (Colocynthis Cucumis. Cucur-
bitaceae.) Hatóanyaga a colocynthin ($C_{56}H_{101}O_7$), glycosida ter-
mészetű keserű anyag. Drasticum, hydrogogum (?). Adag por-
ban, pilulában 0,05—0,3! pro dos. Dos. maxim. pro die 1,0!
Inkább az extractum használtatik. 10,0 = 13 kr. v. 10,0 = 22 kr.
(subt. pulv.).

†**H. Extractum Colocynthis.** Száraz kivonat.
Drasticum. Adag porban, pilulában 0,05—0,1! pro dos. Dos.
maxim. pro die 0,4! 1,0 = 14 kr.

†**H. Tinctura Colocynthis.** Drasticum. Adag
5—20 csepp pro dos. Dos. maxim. sing. 1,0! Dos, maxim. pro
die 3,0! 10,0 = 8 kr.

357 Rp. Fruct. Colocynth. pulv. 1,0.
Pulv. rad. Rhei chin. 2,0.
Sacchar. alb. āā 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 1—2 port szükség sze-
rint. 45 kr.

358 Rp. Extr. Colocynth.
Sapon. medic. āā 1,0.
Spiritus qu. s.
ut f. pilul. No. 20.
Consp. pulv. rhiz. Iridis
DS. 1—2 szemet egyszerre.
67 kr.

359 Rp. Olei Ricini 30,0.
Tinct. Colocynth. 1,0.
MDS. Egyszerre 1 evőlk.
22 kr.

H. Colophonium depuratum flavum. Világossárga; felette törékony, üvegszerűen átlátszó, kézhez ragadó, hidegen szagtalan, terpentin-ízű gyanta. Hintőpor alakjában styplicum. 100,0 = 6 kr.

H. Condurango cortex. (Gonolobus Condurango Asclepiadeae). Hatóanyagai keserű anyag, gyanta, csersav. Stomachicum. Gyomorrák ellen ajánlották. Adag: decoctum v. maceratum 15,0—20,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 3 kr.

H. Vinum Condurango. Malagaborral készül. Amarum. Evőkanalanként napj. többször. 10,0 = 7 kr.

360 Rp. Cort. Condurango 15,0.
macera per hor. sex cum
Aqua dest. 150,0.
filtra et adde
Syrup. Cinnamomi 20,0.
DS. 2 ór. 1 evők.
43 kr.

361 Rp. Decoct. cort. Condu-
rango e 15,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Opii crocat. 1,0.
Syrup. cort. Aurant.
10,0.

MDs. 2 ór. 1 evők.
41 kr.

Conii maculati herba. (Umbelliferae.) Hatóanyaga coniin. Készítményei haszn. de ritkán. 10,0 = 1 kr.

Conium ($C_8H_{17}N$). Kereskedésbeli részben élenyülve. Színtelen. v. sárgás, olajos, rossz szagú, maró folyadék. 100 r. vízben oldódik, borszeszben könnyen. Ritkán haszn. Főleg helybelileg kenőcs alakjában (0,05—0,1 : 10,0) mint fájdalomcsillapító. Bels. tetanus és strychnin-mérgezés ellen szóba hozták. Nem ajánlható! 0,01 = 2 kr.

Conium hydrobromicum ($C_8H_{17}N.HBr$) Színtelen, tűalakú, prismaticus jegeczek; vízben könnyen oldódik. Francia orvosok ajánlottak 0,001—0,005-öt pro dos. tussis convuls., asthma, neuralgiák, hányás ellen. 0,01 = 2 kr

Extractum Conii. Borszeszes kivonat. Azelőtt mint antispasmodicum, antineuralgicum használtatott. Küls. kenőcsben 1 : 5—10; bels. 0,03—0,1 napj. 3—4-szer pilulában 1,0 = 4 kr.

362 Rp. Coniini hydrobrom. 0,02.
Aqua Melissae 100,0.
Syrup cort. Aurant. 50,0.

MDs. 3 × napj. 1 evők.
kan. (0,002 gm coniin-
só van benne.)
62 kr.

363 Rp. Coniini hydrobrom. 0,02.
Aqua dest. 10,0.

MDs. Bőr alá fecsk. Suo
nomine. 1/2—1 fecsk. egy-
szerre.
25 kr.

Convallariae majalis herba. (Smilacaceae.) Hatóanyagai convallamarin és convallarin (glycosidák). Cardiacum, diureticum. mint a digitalis, csakhogy gyengébb. Nem cumulativ hatású. Az értékét illető ellentétes tapasztalatok a készítmények különböző gyűjtési helyére és frissességére vezethetők vissza. Adag infus. 5,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. Ha diarrhoea jelentkeznék, mellőzendő a szer. 10,0 = 6 kr.

Tinctura Convallaride majalis. Adag 10 csepp
3—4 × napj. 10,0 = 10 kr.

364 Rp. Infus. herb. Convallar.
maj. e 5,0.
l. a. p. ad. colat. 150,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 15.
Syrup. Scillae 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
41 kr.

365 Rp. Tinct. Convallariae
Aquae Amygdalar.
amar. aa 5,0.
MDS. 2 ór. 15 cseppet.
26 kr.

H. Coriandri frutis. (Coriandrum sativum. Umbelliferae.)
Hatóanyaga illó olaj. Stomachicum, carminativum. Keserő v. illa-
tos thoakeverékek gyakori alkotórésze 10,0 = 1 kr.; 100,0 =
8 kr.

Coto cortex. (Származás ismeretlen.) Hatóanyaga a cotoin
(glycosida). Antidiarrhoeicum, amarum. Adag porban 0,2—0,5
pro dos. 3—4 × napj. Helyette jobban használhatók készítmé-
nyei. 10,0 = 5 kr.

Tinctura Coto. Adaga 10—20 csepp 2—3 ór. borban,
nyákos folyadéokban. 1,0 = 2 kr.

Cotoinum. ($C_{17}H_{31}O_6$). Sárga, jegezes por, vízben nehezen,
borszeszben jól oldódik. Adag pilulában, borszeszes oldatban
0,01—0,05 pro dos. 3 × napj. 0,01 = 4 kr.

366 Rp. Tinct. Coto 20,0.
DS. 10—15 cseppet
3—4 × napj.
50 kr.

367 Rp. Cotoini 0,5.
Sacch alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aeq. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port.
2 frt 39 kr.

Creolin. Pearson-féle. Feketésbarna, kellemetlen szagú, méz-
sűrűségű anyag. Vízben tejfehéres színnel oldódik, de ha áll,
barnás csapadék jelentkezik. Különös fajta angol kőszén száraz
lepárlási terménye. Carbolsav helyett ajánlották mint nem mérges(?)
anyagot. Mérgező hatását újabban többen kimutatták. Antisepti-
cum, antiparasiticum ectoparasiták ellen; taenia, oxyuris ellen is
megkísérlették, de nem ajánlatos (!) Sebészetben, szülészetben
1/2% és 2%-os oldatok használtak; cystitisnél hólyagöblítésre,
gonorrhoeánál hügyeső, hüvely kifeeszkendésére 1—5 pro mille
oldatok. Irrigatók por rectum igen veszélyesek; kerültessenek (!)
Bels. Hiller erjedéssel járó gyomor-bélbajoknál 0,3—0,5 gmot ad
3 × napj. capsula gelat.-ban. Különböző összetételűek lévén a
koreskedésbeli készítmények, hatás megbízhatlan. Fülösleges szer.
Gyermekgyakorlatban mellőzendő; erős eczemák, fekélyek gyak-
ran keletkeznek 10,0 = 3 kr.; 100,0 = 20 kr.

368 Rp. Creolini 1,0.
 Pulv. Trifolii fibr.
 Extr. Gentianae aa qu. s.
 ut f. pilul No. (50)—100
 Consp. pulv. Cassiae
 Cinnam.
 DS. napj. 5—10 szemet.
 (SCHNITZLER.)

370 Rp. Creolini 5,0.
 Olei Lini loti 100,0.
 M. f. linim.
 DS. Külsőleg. linim. styra-
 cis helyett.
 Scabies, phthiriasis.
 48 kr.

372 Rp. Creolini 12 0.
 Spirit dil. 2,0.
 Tragacanthae 2,0.
 Succ. Liquir. pulv.
 Rad. Liquir. pulv.
 aa 24,0.
 f. l. a pilul. No. 200.
 DS. 2—3 × napj. 2 szemet
 bevenni.
 1 frt 22 kr. (СПАЕТП.)

369 Rp. Creolini (1,0)—2,0.
 Aquae Menthae pip.
 (100,0)—500,0.
 MDS. Száj-torokvíz.
 Hosszantartó angina
 tonsill. eseteiben.
 (SCHITZLER.)
 34 kr.

371 Rp. Creolini 2,0.
 Acid. boracici 100,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. Hintőpor fekélyekre.
 74 kr.

Cresolum crudum. (Kresylsav, Kresylol.) Sárgás, tiszta, kozmászagú, sűrű folyadék. Keveréke ortho-, meta-, és parakresolnak s más rokonvegyületeknek (carbol, naphthalin, pyridin.) Vízben tökéletlenül old. Ezért inkább készítményei haszn. ezek a következők:

Tricresolum. A három cresol elegye. Színtelen, tiszta, 2-5%-ban old. vízben. Haszn. sebészetben 1%-os vizes oldata, mint a carbolsav, melynél 3-szor erősebb desinficiens.

Cresolum purum liquidum. Orthocresolból áll csupán ($C_6H_4CH_3, OH + OH_1$). Színtelen, carbolszagú folyadék. Haszn. mint a tricresolé.

Liquor cresoli saponatus. Cresolum crud. + sapo kalinus aa. 50 % cresol van benne. Barna, vízben oldb. olajszerű folyadék. Árnyékszék, köpöcsészék, ürödénvek stb. fertőtlenítésére 5%-os vizes oldatok haszn. Ennek 10%-os oldata, mely tehát 5% cresolt tartalmaz az

Aqua cresolica, mely tisztán vagy ugyanannyi vízzel felhígítva haszn.

Calcium cresolicum. Cresol + mésztej aa. Szörpstűrű, vízben jól old. folyadék. 5%-os oldatok haszn. ürülék, stb. fertőtlenítésére.

H. Croci gallici stigmata. (*Crocus sativus*. Iridaeae.) Hatóanyag illó olaj. Stomachicum, emmenagogum. Adag porban, pilulában 0,2—1,0 pro dos. napj. 3—4szer. Obsoleteknak tekinthető. 1,0 = 10 kr. v. 1,9 = 11 kr. (subt. pulv.).

Crotonis semina. (*Tigilium offic.* Euphorbiaceae.) Drasticum. Használtatik a belőle készült:

†**H. Oleum Crotonis.** Sárga, v. sárgásbarna, áttetsző, sűrű, sajátos kellemetlen szagú, kezdetben enyhe, olajos, később tartósan égető ízű zsíros olaj. Hatóanyaga: crotonolsav s annak glyceridje. Drasticum. Adag: klystirnek 1—2 csepp emulsióban, per os $\frac{1}{4}$ —1 csepp pro dos. ricinusolajban, v. emulsióban, v. cukorral eldörzsölve. Dos. maxim. sing. 0,05! Dos. maxim. pro die 0,1! Nagy vigyázat!! 1,0 = 2 kr.

373 Rp. Olei Crotonis gtt. 2.
Olei Ricini 30,0.
M. exact.
DS. Rendelet szerint 1 kk.
22 kr.

374 Rp. Olei Crotonis gtt. 1.
Elaeosacchar. Citri 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 4.
Dent in chart. cerat.
S. 3 ór. 1 port, míg székletét
jelentkezik. 33 kr.

H. Cubebae fructus. (*Cubeba offic.* Piperaceae.) Hatóanyagok: illó olaj, cubebin és gyanta. Haszn. bels. gonorrhoea, cystitis chron. ellen. Adag porban, pilulában 1,0—3,0 pro dos. 3—4 × napj. 10,0 = 8 kr.

H. Extractum Cubebae aethereo-spirituosum. Mézszűrűségű. Haszn. mint a fruct. Cubebae. Adag pilulában, capsula gelatinosában 0,5—2,0 pro dos. 1,0 = 14 kr.

375 Ip. Pulv. Cubebae recent.
tus.
Extr. Cubeb. aether-
spirit. aa 5,0.
M. f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Lycopod.
DS. 3 × napj. 3 szemet.
1 frt 20 kr.

376 Rp. Extr. Cubebae. aether-
spirit.
Bals. Copaivae
Pulv. Gummi arab.
aa 5,0.
f. l. a. emulsio cum
Aqua Menthae pip.
150,0.
adde.
Syrup. Simpl. 15,0
DS. 3 ór. 1 evőlk.
1 frt 32 kr.

Cucurbitae Peponis semina. (*Cucurbitaceae.*) Galandféregbajtó szer. Adag a decorticált magvakból 50—100 gm. pro dos. reggel éhgyomorral; utána 1 órával ol. ricini adassék.

- 377 *Rp.* *Seminum Cucurbitae decort.* 50,0.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pasta
D.S. Rendelet szerint elfogyasztani.
Taenia solium.

H. *Cuprum aluminatum s. Lapis divinus s.*

Lapis ophthalmicus. Fehéres-kék, camphorszagú, vízben majdnem egészen oldódó darabok. Enyhén causticum, adstringens. Küls. substantiában fekélyes nyákhártyák edzésére; szemvíznek és húgycsőbe beleszkendésre 0,2—0,5 : 100,0 (filtra). 10,0 = 14 kr.

- †**H. *Cuprum sulfuricum* ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)** Ferde hasábalakú, kékszínű jegeczek. Levegőn kissé elmaálk; 3,5 sr. hideg, 1 sr. forró vízben oldódik. Küls. substantiában mint nyákhártyákat, fekélyeket, hámfosztott bőrfelületeket edző szer; higabb oldatokban (0,2%—0,5%) mint adstringens haszn. Bels. emeticum. Adag: bels. porban, oldatban, electuariumban 0,1—0,15! Dos. maxim. pro die 0,5! 10,0 = 3 kr. pulverat: 10,0 = 4 kr.

- 378 *Rp.* *Cupri sulfur.* 0,1. 379 *Rp.* *Cupri sulf.* 50,0.
Aquae Rosar. 30,0. *Alumin.* 150,0.
Tinct. Opii simpl. 0,5. *M. f. pulv. det. in scat.*
M.D.S. Szemcsepppek. S. 2 kávéskanálnyi 1 liter
Adstringens. langyos vízben feloldandó.
 28 kr. Fluor albus esetén a hüvely irrigatójára. 74 kr.

- 380 *Rp.* *Cupri sulf.* 1,0. 381 *Rp.* *Cupri sulfur.* 0,4.
Aquae dest. 60,0. *Aquae dest.* 60,0.
D.M.S. 5—10 perczenként 1 *Syrup. simpl.* 20,0.
 kk., míg hányás jelentkezik. *M.D.S.* 1/4 ór. 1 kk., míg
Emeticum fejtötnnek. hányás jelentkezik.
 24 kr. *Emeticum* 2—6 éves
 gyermeknek.
 31 kr.

***Daturae Stramonii semina et folia.* (Solanaceae.)**

Hatóanyaga újabb vizsgálatok szerint az atropin és a hyosciamin. Belladonna-készítmények egészen fölöslegessé teszik. Obsolet. 10,0 = 2 kr.

Tinctura Stramonii, mint a *Tinct. Belladonnae* 10,0 = 6 kr.

Dermatolum. Basicus gallussavas bismuth. $O_6H_4(OH)_2CO_2Bi(OH)_2$. Sárga, finom, légálló, világosságon meg nem változó, szagtalan, oldhatatlan anyag, mely 55% bismuthéleget tartalmaz. Jodoform pótszere, szárító, váladékcsoökkentő, sebgógyulást elősegítő, gyengébb antibacteriosum. Nem izgat, nem mérgező. Haszn. küls. hintőpor alakjában sebek, fekélyek, combustio, nedvező eczema

eseteiben, v. kenőcsben. Bels. HEINZ a bism. subn. helyett ajánlja.
1,0 = 8 kr. 10,0 = 60 kr.

382 Rp. Dermatoli	30,0.	383 Rp. Dermatoli	10,0.
Talci venet.	70,0.	Ungu. emoll.	90,0.
Amyli trit.	10,0.	M. f. ungu.	
<i>MDS.</i> Híntőpor bűzös		<i>DS.</i> Külsőleg.	
izzadásnál.		1 frt. 80 kr.	
2 frt 10 kr.			

H. Dextrinum. ($C_6H_{10}N_5$)_n Színtelen, vagy kissé sárgás, átlátszó, nem jegezes darabkák. Vízben könnyen oldódik, s ragadós, semleges kémhatású folyadék képződik. Gyógyszerészeti technikában fontos szer. Kemény kötés készítésére vétecsék 100 r. dextrin, 60 r. borszesz, 50 r. víz; a képződő péppel a pólyadarakok bekenendők. 10,0 = 2 kr.

†**H. Digitalis folia.** (*Digitalis purpurea* Scrophularineae.)
Hatóanyagai 1. Digitoxin ($C_{41}H_{72}O_{17}$). 2. Digitalin. 3. Digitalein.
4. Digitonin (glycosidák). Gyenge antipyreticum; néha vérzések ellen jól szolgál; főleg incompenzált két-hegyű, három-hegyű, billentyű elégtelenségénél, bal visszeres szájadék szűkületénél haszn., ugyanezen esetekben igen jó diureticum. Ideges szívdobogásnál is kitűnő. Cumulativ hatású, ezért nagy vigyázat hosszabb adagolás alkalmával. Bels. adag infus. 0,5—1,5 : 150,0 2 ór. 1 evők. (2 napra elegendő), porban 0,1—0,2 pro dos 4—5 × napj. Dos maxim. sing. 0,2! dos. maxim. pro die 1,0. 10,0 = 2 kr. pulverat: 10,0 = 5 kr.

†**H. Tinctura Digitalis.** Használat, mint a leveleknél.
Adag bels. 5—15 csepp 3—4 × napj. Dos. maxim. sing. 1,0 (20 csepp)! dos. maxim. pro die 5,0! 10,0 = 7 kr.

384 Rp. Infus. folior. Digital.	385 Rp. Infus. folior. Digital.
e 0,6.	e 1,0.
l. a. p. ad colat. 140,0.	l. a. p. ad colat. 140,0.
Tinct. Opii simpl. gtt.	Kalii nitr. 5,0.
10.	Syrup. simpl. 10,0.
Syrup. Scillae 10,0.	<i>MDS.</i> 2 ór. 1 evők.
<i>MDS.</i> 1 ór. 1 evők.	43 kr.
38 kr.	

386 Rp. Infus folior. Digital.	387 Rp. Pulv. folior. Digital.
e 0,6.	Chinin. sulf. aa 0,5.
l. a. p. ad colat. 130,0.	Sacchar. alb. 4,0.
Elixir. acid. Halleri 2,0.	M. f. pulv. div. in dos.
Syrup. Moror. 20,0.	aequ. No. 10.
<i>MDS.</i> 2 ór. 1 evők.	<i>DS.</i> 2—3 ór. 1 port.
41 kr.	45 kr.

388 *Rp.* Tinct. Digitalis. 5,0.
 Aquae Amygdalar.
 amar. 10,0.
MDS. 3 × napj. 10—20
 cseppet.
 Palpitatio cordis nervosa.
 28 kr.

390 *Rp.* Tinct. Digitalis. 5,0.
 Kalii acet. solut. 15,0.
MDS. 2 ór. 10—15 cseppet.
 Diureticum.
 27 kr.

392 *Rp.* Folior. Digit. pulv.
 Bulb. Scillae sicc. pulv.
 aa 1,5.
 Roob Juniperi qu. s.
 ut. f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Liquirit.
DS. 3—4 × napj. 1 szemet.
 Diureticum.
 44 kr.

389 *Rp.* Infus. folior. Digital.
 e 0,2—0,3.
 l. a. p. ad colat. 100,0.
 Kalii acet. solut. 2,0.
 Syrup. simpl. 15,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 3—6 éves gyermeknek.
 40 kr.

391 *Rp.* Infus. folior. Digitalis
 e 0,3.
 l. a. p. ad colat. 100,0.
 Aquae Amygdalar.
 amar. gtt. 15.
 Syrup. simpl. 15,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 6 éven túli gyermeknek.
 40 kr.

Diphtheria-antitoxin l. Serum antidiphtheriticum.

†H. **Doveri pulvis** l. Opium.

H. **Diuretinum** l. Theobrominum natrio-salicylicum.

Duboisium sulfuricum. Sárgás, amorph, vízszívó anyag.
 A duboisin ($C_{17}H_{15}NO_3$) némelyek szerint azonos a hyosciamin-
 nel. Mydriaticum; az atropin-nél állítólag gyorsabban hat. Adag
 szemecseppeknek 0,01—0,1:20,0. Az orvos kezéhez! Sub signo
 veneni! 0,01 = 7 kr.

H. **Elaeosacchara.** Olajcukrok, illatos cukrok. Dürzsölés
 által elegyítették 2 gm. sacchar. alb. + 1 csepp ol. aether. Íz- és
 szagjavítók. Leggyakrabban haszn. elaeosacchar. menthae piper.,
 anisi, citri, foeniculi.

H. **Electuarium lenitivum** l. Senna.

Emplastra.

H. **Emplastrum adhaesivum.** Ragtapsz. Contentivum,
 protectivum. Bőrre közönbös hatású. 10,0 = 4 kr.

H. **Emplastrum adhaesivum linteo extensum.**
 Contentivum, protectivum. Bőrre közönbös hatású. 100 □ ctm. =
 7 kr. 1000 □ ctm. = 50 kr

H. **Emplastrum adhaesivum extensum ameri-**

canum elasticum. Kautschuk-sparadrap. Contentiv. protectiv. Bőrre közönlös 100 □ ctm. = 12 kr. 1000,0 = 100 kr.

H. **Emplastrum anglicanum.** Protectivum. 100 □ ctm. = 33 kr.

H. **Emplastrum Cantharidum**

H. **Emplastrum Cantharidum per-** } l. Cantharides.
petum

H. **Emplastrum Cerussae.** Száritó tapasz. 10,0 = 5 kr.

H. **Emplastrum diachylon simplex.** Protectivum. Alapanyag más tapaszok készítéséhez. Száritó 10,0 = 3 kr.

H. **Emplastrum diachylon compositum.** Gyengén izgató, penyedést előmozdító. 10,0 = 4 kr.

H. **Emplastrum Hydrargyri.** Izgató, oszlató. Főleg syphiliticus fekélyekre rendeltetik. 10,0 = 8 kr.

H. **Emplastrum Minii adustum.** Izgató, oszlató. 10,0 = 5 kr.

H. **Emplastrum saponatum.** Gyengén izgató. 10,0 = 5 kr.

*

H. **Emulsio amygdalina**

H. **Emulsio oleosa** } l. Amygdala dulcis.

†H. **Ergotina** l. *Secale cornutum*.

Erythrophloeinum hydrochloricum. Az N'Cassa kéregben előforduló alkaloid sója. Sárgás, jegeces, vízben jól oldható por. Lewin ajánlotta a cocain helyett, mint helybeli érzéstelenítőt. Fájdalmat okoz eieinte. Távollatása mint a digitalisé és görcsokozó, mint a picrotoxin. Haszn. nem ajánlható. Küls. 0,05—0,2%-os oldatok, bőr alá 0,1—1%-os oldatból $\frac{1}{2}$ —1 fecsk. 0,01 = 10 kr.

H. **Eserinum salicylicum** l. *Physostigminum salicyl.*

H. **Eucalypti folia.** (*Eucalyptus globulus*. Myrtaceae). Hatóanyagai illatos olaj, kevés gyanta és csersav. Antisepticum, antipyreticum, antimalaricum (?), diaphoreticum. Küls. kötésekhöz infus 10,0 : 100,0. Bels. infus. 10,0 : 150,0 2 ór. 1 evőlk. 10,0 = 1 kr.

H. **Olenm Eucalypti australe amygdalinum.**

Majdnem színtelen illó olaj, vízben alig, borszeszben könnyen oldódik; lavandulához hasonló szagú, hűsítő, kesernyész ízű. Küls. elvonó linimentumnak 1 : 5 (ol. sesami); desiniciens sebkötő folyadéknak 2 r. : 20 r. spiritus + 30 r. víz. Belégzésre 10—15 csepp forró vízre cseppentendő, a párák belégzendők (bronchitis foetida, gangraena pulmon., bronchiectasia esetén). Bels. malaricus láznál 5—15 csepp pro dos. caps. gelatinosában 4—5-ször napj. (Nem megbízható.) 1,0 = 3 kr.

Eucalyptolum ($C_{10}H_{16}O$). Az eucalyptus-olaj egyik alkotórésze. Színtelen, camphor-szagú folyadék, vízben oldhatlan, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban, jól oldható. Haszn. küls. mint bőrizgató, rheumatismus, neuralgiák eseteiben; sebészetben fertőztelenítő kötésekhöz, mint az ol. eucalypti.

Bels. idült bronchitis- bronchit. foetida, gangraena pulm., bronchiectasia eseteiben adag: 5—10 csepp napj. többször, gelatin-fokocskákbán v. belégzés alakjában úgy, mint az ol. eucalypti. 1,0 = 8 kr.

H. Tinctura Eucalypti. Bels. 2—1 kk. napj. febris intermittens malarica esetén a lázmentes időben; gyermekeknél tussis convulsiva ellen ajánlották. (3,0:100,0 3 ór. 1 gyk.) 10,0 = 4 kr.

393 Rp. Tinct. Eucalypti 3,0.
Glycerini 15,0.
Syrup. simpl. 30,0.
Aquae dest 100,0.
MDS. 3 ór. 1 gyk.
Nagyobb gyermeknek tussis convulsiva ellen.
39 kr.

394 Rp. Eucalyptoli gtt. 5.
Det. in caps. gelat.
Dont. tal. dos. No. 20.
S. 2 ór. 1—2 szemet.
Bronchitis foetid. Gangr. pulm.
1 frt 20 kr.

Eulyptol. (SCHMELTZ.) Erélyes antifermentativum. Keveréke 6 r. salicyl-savnak, 1 r. carbolnak és 1 r. eucalyptus-olajnak. Küls. sebészetben mint antisepticum. Fülösleges készítmény. Nem tévesztendő össze az eucalyptollal (!).

Euphorinum. s. Phenylurethan. $CO.O C_6 H_5. NH(C_6 H_5)$
Fehér, jégezes, aromás por, kissé csipős ízű; vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Antirheumaticum, analgeticum, antipyreticum, mint az antipyrin. Adag bels. kezdetben 0,1—0,2 gm.; ha jól türethet 0,5 gm. pro dos. Pro die 1,0—2,0 gm. (!) 1,0 = 15 kr.

†**H. Euphorbium.** (Euphorbia resinifera. Euphorbiaceae). Megszáradt tejnedv; sokalakú, leginkább borsónagyságú, szennyes, halványsárga, homályos, csipős ízű darabok; vízben, borszeszben csak részben oldódik. Izgató tapaszok alkatrésze. Azelőtt bels. mint drasticum haszn., most már obsolet. 10,0 = 5 kr.

Europhenum. Isobutyl-orthocresol-jodid. 28 1% jódot tartalmaz. Finom, sárga, vízben oldhatlan por, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban jól oldódik. Ha megnedvesedik jó hasad le belőle. Antibacteriosum jodoform helyett. Használták ulcus cruris, scrophuloticus tekélyek, fekélyes lupus, combustio, ulcus molle, ulcus syphil. eseteiben kenőcs, pasta, collodium alakjában (1—5—10%) Subcután syphilis eseteiben 0,05—0,1 gm. pro dos. olajban oldva, szűrve 1,0 = 30 kr.

Evonyminum. Barnás v. zöldes, gyantaszerű kivonat, melyet az evonymus atropurpureus gyökereinek v. ágainak kérgéből nyernek. Vízben oldhatlan, borszeszben jól oldódik. Cholagogum, cartharticum, nagy adagban drasticum. SÉNATOR a podophyllinnal egyenrangúnak tartja. Adag bels. 0,1—0,2—0,4 (drasticum) pro dos. pilulában; czélszerű extr. belladonnae-val v. extr. hyosciami-val összekötni. Obstip. habitual. eseteiben 0,05—0,08 pro dos. pilula alakban; ez hosszabb időn át is adható 0.10 = 14 kr.

- 395 *Rp.* Evonymini 1,5.
 Extr. Belladonnae 0,1.
 Extr. Trifol. fibr.
 Pulv. rad. Gentianae
 aa qu. s.
 ut f. pilul. No. 30.
 Obduc. Keratino.
- D.S.* Este 1—2 szemet.
 Obstip. habit. 2 frt 80 kr.
- 396 *Rp.* Evonymini 1,0.
 Extr. Hyosciami 0,1.
 Sacchar. lact. qu. s.
 Div. in dos. No. 10.
 Det. in caps. gelat.
- S.* Egyszerre 1 dbot. Szükség esetén még egyet.
 Egyszeri hashajtásra.
 2 frt 10 kr.

Exalginum s. Methylacetanilid ($C_9H_{11}NO$). Pompás, színtelen, hosszú jogecztűket v. fehér táblácskákat képez, melyek hideg vízben nehezen, hig v. tömény borszeszben könnyen oldódnak. Analgeticum; DUJARDIN-BEAUMETZ szerint mint ilyen fölötte áll az antipyrinek fölé, leg neuralgiák ellen ajánlatik. Adag bels. 0,2—0,5 pro dos. napj. többször gyenge alcoholicus (rhumos cognacos stb.) oldatban. 1,0 = 25 kr.

- 397 *Rp.* Exalgin 2,5.
 Cognac 15,0.
 Syrup. simpl. 30,0.
 Aquae dest. 100,0.
- M.D.S.* Egyszerre 1—3 evők.
 napj. 3—4-szer.
 1 frt 16 kr.
- 398 *Rp.* Exalgin 2,5.
 Spirit. Menthae pip 5,0.
 Aquae Melissa 120,0.
 Syrup. cort. Aurant. 30,0.
- M.D.S.* Reggel és este egy evők. (0,25).
 1 frt 23 kr.
- 399 *Rp.* Exalgin 2,0.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
- D.S.* 3 ór. 1 port.
 89 kr.
- 400 *Rp.* Exalgin 2,5.
 Tinct. cort. Aurant. 5,0.
 Aquae dest. 120,0.
 Syrup. cort. Aurant. 30,0.
- M.D.S.* Este és reggel
 1 evők.
 1 frt 3 kr.

H. Extracta omnia. l. a megfelelő drogok czímei alatt.

Extracta fluida. (Fluid extract.) Amerikai gyógyszeralak, mely divatba kezd jönni. A köbctm. fluid extract rendszeren a készítéshez felhasznált drog 1 gm-jának felel meg. Igen cél-szerű készítmények.

Fel Tauri inspissatum. Besűrített marhaepe. Sötét, baruászöld, sűrű anyag. Aloe- vagy jalapával készült hashajtó pilulákhoz mint alapanyag, ha azok ictericus betegnek rendeltetnek. 1,0 = 2 kr.

Ferri praeparata.

A bels. használt vaskészítmények javalatai: *chlorosis, oligoemia, rhachitis, scrophulosis* esetei. Ellenjavallatok: *haemoptoe* (kivéve a *ferrum sesquichlor.*), *phthisis, lázak, plethora, acut gyomorhurut.* Bevétel legcélszerűbben étkezés közben:

Ferratinum. 7% vasat tartalmazó, szerves vasösszekötterés; azonos a sertésmájából előállítható vasvegyülettel. Vörösbarna vízben oldhatlan, szag- és íztelen por. Bels. adag porban 0,5—1,5 pro die, többszörré felosztva. Gyermekeknek 0,1—0,2 pro die. Kitiűnő hatású, jól felszívódó készítmény (!). 1,0 = 15 kr.

Ferripyrinum. Vaschlorid és antipyrin vegyülete. Narancsszínű, vízben jól old. por. Adstringens, vérzéscsillapító; nem mar. Porban vagy 20%-os oldatban alkalmazható küls. orrvérzés, fogextractio, stb. esetoiben. Bels. chlorosisnál 0,3—0,6%-os oldatokban 0,05 3—4 × napj. 1,0 = 20 kr.

H. **Ferrum pulveratum** (Fe). Finom, sötétszürke, íztelen, nehéz por, kevésbé fémfényű. Bels. adag: 0,05—0,2 pro dos. 3—4 × napj. porban, pastillában. 10,0 = 4 kr.

H. **Ferrum reductum** (Fe). Szürke, fénytelen, igen finom por, íz- és szagtalan. Bels. adag 0,05—0,2 pro dos. 3—4 × napj. porban, pilulákban, pastillában. 1,0 = 3 kr.

Ferrum carbonicum saccharatum (FeCO₃). 10% vasat tartalmaz. Zöldesszürke por, édeses fémízű; emésztést csak kevésbé zavarja. Bels. adag 0,2—0,5 pro dos. 3—4 × napj. porban. 1,0 = 1 kr.

H. **Ferrum lacticum** (FeC₆H₁₀O₆. 3H₂O). Zöldefehér, apró, tűalakú kristályokból álló kéregdarabok, vagy por. 40 r. hideg, 12 r. forró vízben oldódik, borszeszben alig; emésztést nem zavarja! Bels. adag: 0,1—0,1 pro dos. 3—4 × napj. porban. 1,0 = 2 kr.

H. **Pilulae ferratae.** Egy szem tartalmaz 0,1 grm. ferrum lacticumot. adag 1—2—3 szem 3—4 × napj. 1 db = 2 kr. 10 darab 15 kr.

H. **Ferrum natrio-pyrophosphoricum** [2(Na₂Fe₂P₂O₇), Na₄P₂O₇]. 7H₂O]. Fehér, jegezes por. íze enyhén sós, de nem összehúzó, hideg vízben lassan és nehézkesen, langyosban könnyebben oldható. 13% vasat tartalmaz. Bels. adag: 0,2—0,5 pro dos. 3—4 × napj. porban. 1,0 = 2 kr.

H. **Liquor Ferri oxydati s. Oxychloridum Ferri solutum** [3Fe₂(OH)₆, Fe₂Cl₆]. Sötét barnavörös, átlátszó, szagtalan folyadék, gyengén összehúzó ízű, 3 1/2% vasat tartalmaz. Ferrum oxydatum dialysatum helyett vételettel föl a M. Gyk.-be. Adag bels. 10—20 csepp pro dos. 3—4 × napj. 10,0—5 kr.

Ferrum oxydatum dialysatum solutum. Híg, sötétbarna, kissé összehúzó ízű folyadék; 5% vaséleget tartalmaz. Bels. adag: 5—15 csepp pro dos. 3—4 × napj. A M. Gyk. rendel-

kezése szerint e helyett a gyógyszerésznek Liquor ferri oxyd. kell kiszolgáltatni.

H. Extractum malatis Ferri s. Extractum Ferri pomati. Körülbelül 8% vasat tartalmaz almasavas só alakjában. Zöldefekete színű, vízben jól oldható anyag. Bels. adag 0,2—0,5 pro dos. 3—4 $\times$ napj. oldatban, pilulában. 10,0 = 11 kr.

H. Tinctura malatis Ferri s. Tinctura Ferri pomati. Bels. adag. 15—30 csepp pro dos. 3—4 $\times$ napj. 10,0 = 9 kr.

Tinctura Ferri acetici aetherea. Tiszta, barnásvörös, eczetaother szagú, savanyús, összehúzó ízű, vízben jól oldódó folyadék. A vas hatása mellett kevésbé excitans is. Bels. adag 15—30—50 csepp pro dos. 2—4 $\times$ napj. cukros vízben, tokajiban. 10,0 = 3 kr.

H. Ferrum oxydatum sulfuricum solutum [$Fe(S_2O_3)_3$]. Sárgásbarna, átlátszó, kissé sűrűs folyadék, nagyon összehúzó ízzel; 10% vasat tartalmaz. Csopán az antidotum arsenici készítéséhez haszn. 10,0 = 5 kr.

H. Ferrum sesquichloratum crystallisatum (Fe_2Cl_6). Kristályos, barnássárga, légen szétfolyó tömeg; vízben, borsszeszben, aetherben jól oldódik. Csak oldatban haszn. L. a köv. készítményt. 10,0 = 7 kr.

H. Ferrum sesquichloratum solutum s. Oleum Martis. (Ferrum sesquichlor. crystall. + Aquae dest. aa). Sötét, sárgásbarna folyadék. Küls. töményen causticum, hígítva stypticum. Bels. ors hígításban stypticum gyomor-, bélvérzések, vesevérzések, haemoptoe eseteiben. Küls.: injectiókra, belégzésekre 1%-os oldat; vérző sebek, diphtheriticus fekélyek ecsetelésére 1:2 vízhez v. 1:1 vízhez. Bels. adag: 1,0—3,0:150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 5 kr.

H. Spiritus Ferri sesquichlorati aethereus s. Tinct. nervino-tonica Bestuscheffi. Aranysárga színű, összehúzó, vasízű folyadék. Csak bels. chloroticus, oligoemicus, kimerült betegeknek. Adag: 10—30 csepp 3—4 $\times$ napj. cukron v. tokaji borban. 10,0 = 6 kr.

H. Ferrum sulfuricum oxydulatum. Vaszgálicz [$Fe_2(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$]. Kékes-zöld színű, jegeczes por, vízben jól oldódik. Küls. hintőpor alakjában stypticum; $\frac{1}{4}$ %—1%-os oldatokban adstringens. Bels. kali carbonicummal mint Bland-féle labdacok chlorosis ellen. 10,0 = 4 kr.

H. Syrupus Ferr jodati (100 részben 12,2 r. vasjodür). Színtelen v. kissé sárgás, vasízű. Scrophulosis, amyloid elfajulások, syphilis- és malaria-cachexia eseteiben bels. 15—30 cseppet 3—4 $\times$ napj. 10,0 = 9 kr.

H. Pilulae Ferri jodati s. Pil. Blankardi. Haszn. mint a syrup. ferri jodat. Adag: 3—9 szemet napj. 1 db. = 2 kr. 10 db. = 15 kr.

H. Globuli martiales. 40 grm. súlyú golyók. Feketék, fénylők, 8 r. forró vízben csaknem egészen oldódnak. Kalium-ferro-tartaricumot tartalmaznak. Vasas fürdők készítéséhez 1—4 db. használandó. Fölösleges! Vasas fürdők pharmacologicæ nem igazolhatók! 1 db. (40.0) = 25 kr.

Felnőttek számára.

- 401 Rp.** Ferri pulv.
 Pulv. rad. Rhei aa 1,0.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. Napj. 3 port.
 43 kr.
- 402 Rp.** Ferri reducti.
 Chinin. hydrochlor. aa 1,0.
 Elaeosacchar. Cinnamomi 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
MDS. Napj. 3 port.
 61 kr.
- 403 Rp.** Ferri reducti 2,5.
 Pastae. cacaotinae sacch. 5,0.
 M. f. l. a. pastilli No. 50.
DS. 3 × napj. 1—2 szemet.
 44 kr.
- 404 Rp.** Ferri carbon. sacchar.
 Extr. Nucis vom. 0,1.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. Napj. 3 port.
 43 kr.
- 405 Rp.** Ferri lactici
 Extr. Chinae
 Pulv. rad. Rhei aa 2,0.
 Extr. Gentianae qu. s.
 ut. f. pilulae No. 30.
 Consp. pulv. Cinnamomi.
DS. 3 × napj. 1—3 szemet.
 70 kr.
- 406 Rp.** Ferri natrio-pyro-phosph.
 Chinin. sulfur. 1,0.
 Sacchar. alb. 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. Napj. 3—4 port.
 51 kr.
- 407 Rp.** Extr. malat. Ferri 5,0.
 Vini Malagens. 150,0.
 M. f. solut.
DS. 3 × napj. 1 evők.
 82 kr.
- 408 Rp.** Tinct. malat. Ferri.
 Tinct. Chinae comp. aa 10,0.
 Tinct. Nucis vom. 3,0.
MDS. 8 × napj. 20—30 cseppet. 32 kr.
- 409 Rp.** Ferri sesquichlorati
 cryst. 3,0.
 Collodii flexil. 27,0.
MDS. Külsőleg.
 Collodium stypticum.
 37 kr.
- 410 Rp.** Ferri sesquichlorati sol.
 Aquae des. 150,0.
 Syrup. simpl. 20,0.
MDS. Or. v. 2 ór. 1 evők.
 31 kr.

- 411 *Rp.* Ferri sulfur. oxydul.
Kalii carbon. $\bar{a}\bar{a}$ 15,0.
Tragacanthae pulv. 8,0.
Syrup. simpl. qu. s.
ut. f. l. a. pilul. No. 100.
Consp. pulv. Cinna-
momi
DS. 3 $\times$ napj. 3 szemet,
majd 4—5 szemet.
Blaud-féle pilulák NIE-
MEYER után. 85 kr.
- 412 *Rp.* Syrup. Ferri jodati 20,0.
Syrup. simpl. 80,0.
MDS. 3 $\times$ napj. 1 kk.
60 kr.
- 413 *Rp.* Pilul. Ferri jodati.
Dent. No. 30.
S. 3 $\times$ napj. 2—3 szemet.
53 kr.

- 414 *Rp.* Ferratini 3,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 3 ór. egy port.
84 kr.

Gyermekek számára.

- 415 *Rp.* Ferri reducti 0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 4 port naponta.
Serdülőknék. Chlorosis.
41 kr.
- 416 *Rp.* Ferri carbon. sacchar. 1,0.
Chinin. sulf. 0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 3 $\times$ napj. 1 port.
45 kr.
- 417 *Rp.* Ferri lactici 0,5—1,0.
Calcariae carbon. prae-
cip. 1,0—2,0.
Sacchar. alb. 10,0.
M. f. pulv. det. in scat.
S. Naponta 3 késhegygyel.
1—3 évesnek. Rhachitis.
24 kr.
- 418 *Rp.* Ferri lactici 0,3—0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 3—4 port naponta.
4—8 évesnek scrophulosis
esetén, ha nagyobb fokú
oligaemia is van jelen.
41 kr.
- 419 *Rp.* Liquoris ferri oxyd. 2,0.
Aqua dest. 100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
3—4 éves gyermeknek.
26 kr.
- 420 *Rp.* Liquer. ferri oxyd. 1,0.
Aqua dest. 80,0.
Aqua Menthae pip.
Syrup. cort. Aurant.
 $\bar{a}\bar{a}$ 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
28 kr.

421 Rp. Tinct. malatis Ferri
Tinct. amar. $\bar{n}\bar{a}$ 10,0.
Solut. arsen. Fowl. 2,0.
MDS. Reggel-este evésután
5 cseppet emelkedőleg
15—20 cseppig.
Cachexia malarica.
30 kr.

423 Rp. Ferri sesquichlor. sol.
gtt. 10—12.
Tinct. Opii simpl. gtt.
1—3.
Aqua dest. $\bar{n}\bar{a}$ 40,0.
Syrup simpl. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—4 éves gyermek. Enteritis follicul. Dysenteria chron.
37 kr.

425 Rp. Syrup. Ferri jodati 10,0.
Det. in vitro coerul.
S. 4 $\times$ napj. 3—4 cseppet.
2—4 éves gyermek. Scrophulosis.
22 kr.

427 Rp. Syrup. Ferri jodati 2,0.
Syrup. simpl. 40,0.
MDS. 2—3 kk. napj.
2—4 éves gyermek. Scrophulosis. 31 kr.

422 Rp. Ferri sesquichlor. solut.
gtt. 8—10.
Aqua dest. 150,0.
MDS. Külsőleg.
Diphtheritisnél a torok kifejéskendésére.
24 kr.

424 Rp. Ferri sesquichlor. sol.
gtt. 10—15.
Aqua dest. 100,0.
Syr. simpl. 10,0—15,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
3—8 éves gyermek. Nephritis scarlatinosa esetén.
26 kr.

426 Rp. Spirit. Ferri sesquichlor.
aether. gtt. 10.
Aqua dest. 70,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
2—8 évesnek. Oligaemia.
23 kr.

428 Rp. Ferratiui 2,0.
Sacchar alb. 6,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqu. No. 20.
DS. 4 $\times$ napj. 1 port
90 kr.

*

H. Filicis Maris rhizoma. (*Aspidium Filix Mas.* Polypodiaceae.) Hatóanyagai filixsav és illó olaj. Anthelminticum taeniák ellen. 100,0 = 15 kr. (pulv.) 10,0 = 6 kr. Haszn. készítménye az

H. Extractum Filicis Maris aethereum. Félkörű, zöldesbarna, vízben oldhatlan. Adag felnőttek bels. caps. gelat. operculátában, pilulában, electuariumban 6,0—8,0 egy curához (éhgymorra); gyermeknek 2,0—4,0 electuariumban. Vigyázat! Mérgezés is fordult már elő. 1,0 = 14 kr.

429 Rp. Extr. Filicis Maris aeth.
6,0—8,0.
Pulv. Filic. Maris 2,0.
M. det. in caps. gelat. operculat. No. 12—16.
DS. 2 óra alatt bevenni.
Felnőttek.
1 frt 60 kr.

439 Rp. Extr. Filic. Mar. aether.
4,0.
Melis rosati 40,0.
M. f. electuar.
DS. 1 óra alatt 3-szorra bevenni.
4—8 éves gyermeknek.
88 kr.

- H. Filum sericeum antisepticum** l. Acid. carbol.
- H. Foeniculi fructus.** (Foeniculum offic. Umbelliferae.)
Hatóanyaga illó olaj. Stomachicum, carminativum, galactogogum.
Bels. adag porban 0,5—2,0 pro dos. napj. többször; infusumban 10,0—15,0: 150,0 2 ór. 1 evők. 100,0 = 14 kr.
- H. Aqua Foeniculi.** l. Aquae aromaticae.
- Formaldehydum solutum.** (Formol, formalin) ($H.CO.H$).
35%-os formaldehyd oldat. Tiszta, szintelen, szúrós szagú, közömbös v. kissé savi hatású, vízzel, szeszszel jól elegyíthető folyadék. Bacteriumellenes hatású oldatban ép úgy, mint gőzalakban. Desinficiens butorok, helyiségek, árnyékszék, kötőszerek, kezek, seb. eszközök számára 2—3 evők. 1 lit. vízre. Ezt permete alakjában is lehet alkalmazni. Nőgyógyászatban hüvely-, méhkifecskendésére a készítményből 1 kk. 1 lit. vízre. Szemvíznek 25—30 csepp 1 liter vízre. 1,0 = 2 kr.
- Formanilidum.** ($C_6H_5NH.CO.H$) Hosszú, szintelen jegeztük; vízben elég könnyen, alkoholban jól old. Helybeli anaestheticum a cocain helyett, bels. antipyreticum, analgeticum, antirheumaticum az antipyrin helyett. Küls. gégébe, torokba befűjni poralakban anyhummal aa, torokvíznek, húgycsőbe, hólyagba fecsk. 1—3%-os old. Bels. 0,15—0,25 pro. dos. napj. 3—4 × mint antipyreticum, 0,25—0,5 pro. dos. és die. mint analgeticum porban. 1,0 = 12 kr.
- H. Gallae.** Gubacs. Hatóanyaga csersav. Használtatik a tinct. gallarum készítésére. 100,0 = 24 kr. 10,0 = 6 kr. (pulv.).
- H. Tinctura Gallarum.** Adstringens. Csak küls. ecsetelésekre, tisztán v. tinct. jódival aa 10,0 = 7 kr.
- Gallanolum.** Gallussavas anilid. Szintelen, keserű, hideg vízben nehezen, melegben jól oldódó jegeztük. Antifermentativ, redukáló hatású. Bőrgyógyászatban pyrogallol és chrysarobin helyett. Hintő pornak 1:2 talcumra, kenőcsnek 1:5—10. Ecsetelésre 1:5 borszeszben oldva. 1,0 = 12 kr.
- H. Gaze carbolatum album Listeri** l. Acid. carbol.
- H. Gaze Hydrargyro bichlorato corrosivo impraegnatum** l. Hydrargyri praeparata.
- H. Gaze Jodoformio impraegnatum** l. Jodoformium.
- H. Gelatina animalis albissima.** Állati enyv. 1:50 forró vízzel kihűléskor kocsonyát ad. 10,0 = 8 kr.
- Gelsemii radix.** (Gelesmium septemvirens. Loganiaceae)
Hatóanyaga gelsomin (alcaloid). Erős mérge; gerinczvelőt, szívet bénítja. Antineuralgicum. 10,0 = 4 kr. Helyette készítménye használtatik a
- Tinctura Geisemii** (1:15 spiritusra). Bels. adag 5—10 csepp 2—3 × napj. (Vigyázat) (!) 10,0 = 8 kr.

431 Rp. Tinct. Gelsemii

Tinct. Colchici aa 10,0.

MDS. 3 × napj. 10 cseppet.

Neuralgia. (GERHARDT.)

28 kr.

H. Gentianae radix. (*Gentiana lutea*, *Gentianeae*.) Hatóanyaga gentiopictin (keserű anyag). Amarum. Bels. adag porban, pilulában, decoctumban 0,1—0,5 pro dos. 3—4 × napj. Egyik főszer keserű theakeverékekhez és tincturákhoz, 100,0 = 14 kr. 10,0 = 4 kr. pulv.).

H. Extractum Gentianae. Vizes kivonat. Amarum. Bels. pilulában, oldat . . . adag: 0,2—1,0 pro dos. 3—4 × napj. Alapanyag hashajtó pilulákhoz. 10,0 = 18 kr.

432 Rp. Rad. Gentianae

Rhiz. Calami aa 10,0.

Flaved. cort. Aurant. 5,0.

Conc. et cont. m. f. species.

DS. $\frac{1}{2}$ részét egy csésze theára, mely egy nap alatt fogyasztandó el.

Amarum.

17 kr.

433 Rp. Pulv. rad. Gentianae

1,0.

Natrii sulfur. 10,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

DS. 3 part napjában.

Idül gyomorhurut gyomor-
tonia.

43 kr.

H. Globuli martiales l. Ferrum.

H. Glycerinum [C_6H_5OH]. Színtelen, szagtalan, syrupálományú, átlátszó folyadék; íze édes, kémhatása semleges. Vízben, borszeszben min-egy viszony szerint, ellenben aetherben, chloroformban és zsíro-lajokban nem oldható. Küls. puhító fedőszer. Bels. diabetes mellitusnál cukor helyett ételek édesítésére. Csőrében 1,5—2,0 kiűritő hatású. Oldószer némely vízben oldhatlan anyag számára, mely v. a bőrre, v. a nyákhártyára, v. a bőr alá viendő. Kenőcs-alkoz, linimentumokhoz mint közömbös alapanyag. 10,0 = 3 kr.

H. Unguentum Glycerini. (*Tragacantha* 1 r. + *Spiritus* 5 r. + *Glycerin* 49 r.) Fedőszer. Kenőcsalapanyag. 10,0 = 8 kr.

H. Gossypium depuratum l. *Lana Gossypii* dep.

Gossypii herbacei cortex radicis. (*Malvaceae*.) Amerikában *cottonroot bark* név alatt népszerű. Hatóanyagai egy részletesebben még nem ismert gyantás anyag, kevés tannin. Emmenagogum, haemostaticum mint a *secale cornutum*. Adag bels. decoct. 60,0 : 300,0 vízre, $\frac{1}{2}$ ór. egy pirosboros pohárral. 10,0 = 5 kr.

Extractum fluidum corticis Gossypii. Emmenagogum, haemostaticum. Adag bels. 3—5 × napj. 1 kk. cukros vízben. 1,0 = 3 kr.

H. Granati Punicae cortex radicis. (*Myrtaceae*.) Hatóanyagai: pelletierin ($C_{16}H_{10}N_2O_6$, folyékony alkaloid) és isopelletierin ($C_{10}H_{16}N_2O_4$, folyékony alkaloid). Anthelminticum taeniák ellen. Nem hashajtó. Adag: maceratio-decoctum alakjában 30,0—60,0 : 600,0 vízre, 12 órai maceratio után felényire bepár-

landó; egy óra alatt elfogyasztandó éhgyomorral, utána ol. ricini.
10,0 = 5 kr., v. 10,0 = 7 kr. (pulv.).

El. Extractum Punicae Granati. Félstürű vizes kivonat. Adag 8,0—10,0 egy kurához, pilulában, caps. gelatiban. Utána ol. ricini. 1,0 = 6 kr.

Pelletierinum sulfuricum. } Adag oldatban, pilulában
Pelletierinum tannicum. } 0,3—0,8 egy kurához.
Utána ol. ricini. 0,01 = 2 kr.

434 *Rp.* Cort. rad. Punicae Granati 60,0.

Aquae fontis 600,0.

macera per 12 horas, dein coque

usque ad remanent. 300,0.

colaturae adde

Extr. Filicis Maris aeth. 3,0.

Syrup. cort. Aurant. 30,0.

DS. 3-szorra bevenni 1½ óra alatt,

reggel éhgyomorral. Émelygés ellen

citromos víz, rotulae menthae pip.

Felnőttnek.

1 frt 33 kr.

435 *Rp.* Cort. rad. Punicae Gra-

nati 15,0.

Aquae fontis 200,0.

macera per 12 horas,

dein coquae usque ad

remanent. 100,0.

colat. adde

Syrup. cort. Aurant.

20,0

DS. 3-szorra bevenni 1½

óra alatt, reggel, éh-

gyomorral.

4—8 éves gyermeknek

50 kr.

436 *Rp.* Pelletierini tannici 0,5.

Aquae dest. 80,0.

Syrup. simpl. 20,0.

DS. Reggel, éhgyomorral

bevenni 1 óra alatt.

1 frt 28 kr.

437 *Rp.* Extr. Punic. Granat. 8,0.

Tannini 1,0.

Pulv. rad. Althaeae qu. s.

ut f. l. a. pilul. No. 30.

Consp. pulv. rad. Al-

thaeae.

DS. 1½ óra alatt reggel,

éhgyomorral bevenni.

Felnőttnek.

87 kr.

Grindeliae herba. A grind. robusta és squarrosa (Compositae) leveli és virágai. Tartalmaz illó olajat, acid. robusticumot, s egy alkaloidot (grindelin) Fischer szerint. Úgy látszik sedatív hatása van, s mint ilyen haszn. bronchitiseknél a köhögés csillapítására, továbbá tussis convulsiva, asthma nerv., angina pector., Basedow-kór, ideges szívdobogás, hólyaghurut alkalmával. Adag bels. infus. 10,0: 200,0 vízre 2—3 ór. 1—2 evők. 10,0 = 5 kr.

Extractum fluidum Grindeliae. Haszn. mint a herba. Adag bels. 1,0—3,0 3—4 ór. Gyermekeknek (2—4 éves) tussis convuls. esetén 2 ór. 10—15 cseppet. 1,0 = 3 kr.

438 Rp. Extr. fluidi Grindeliae

15,0.
Kalii jodat. 5,0.
Aqua dest. 150,0.
Syrup. cort. Aurant. 30,0.

MDS. 3 ór. 1 evők.
Asthma nervos. és
cardiacum esetén.

1 frt 4 kr.

439 Rp. Infus. herb. Grindel. e.

10,0.
l. a p. ad colat 180,0.
Natrii hydrocarb. 4,0.
Tinct. Opii croc. gtt. 10.
Syrup. Ipecac. 20,0.

MDS. 2—3 ór. 1 evők.
Catarrh. bronch. chron.

56 kr.

440 Rp. Extr. fluidi Grindel.

10,0.
Syrup. cort. Aurant.
Aqua dest. aa 40,0.

MDS. 5—10 éves gyermek-
nek napj. 3—4 kk. v. gyk.
Pertussis, asthma nerv.
60 kr.

H. Guajacolum ($C_{10}H_{16}O_2$). A kreosot egyik alkotórésze. Szintelen, vízben nem, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban jól oldódó folyadék. Ize, szaga kellemesebb, mint a kreosoté. Oldaltai a világosságon megzavarodnak, azért fekete üvegben rendeltessék. Tuberculum bacillust 1: 2000 oldata megöli, 1: 4000 oldata gyengíti. (GUTTMANN). Haszn. a kreosot helyett tuberculosis eseteiben. Adag bels. 0,05 pro dos. és 0,2 pro die (GUTTMANN pro die 1,0 grmot ajánl caps. gelatin. pilula, borszeszes oldat, v. ol. jecorisban). Dos. max. sing. 0,05, pro die: 0,2. 1,0 = 6 kr.

441 Rp. Guajacoli (1,0)—2,0.

Aqua dest. 180,0.
Spir. vini dil. 20,0.
M. det. in vitro nigro.

S. 2—3 × napj. 1 kk., 1 evők. egy pohár vízben étkezés után.
Tuberculosis pulmon.

35 kr. (SAHLI)

442 Rp. Guajacoli 13,5.

Tinct. Gentianae 30,5.
Spir. vini dil. 250,0.
Vini Xerensis qu. s. ad. 1000,0.

MDS. 2—3 × napj. 1 evők. egy boros pohár vízben. Tuberculosis pulmon

9 frt 10 kr. (FRAENTZEL)

443 Rp. Guajacoli 2,0.
 Pulv. et extr. Liquir.
 aa qu s. ut f. pilul.
 No. 100.
 Obduc. foliis Argenti.
 DS. 3—5 × napj. 3—5
 szemet emelkedőleg. Egy
 pilulában körülb. 0,04
 guajacol.
 1 frt 70 kr.

444 Rp. Guajacoli 3,0.
 Olei Jecoris Aselli 150,0.
 MDS. Étkezés előtt 1 kk.
 napj. 3-szor. Egy kk.-ban
 körülb. 0,2 guajacol.
 76 kr.

Guajacolum carbonicum. Fehér, szagtalan, íztelen, jegces por. Vízben nem old. Gyomorból fel nem szívódik, belekben hasad guajacolra és szénsavra. Haszn. guajacol helyett. Adag 0,2—0,5 napj. 2—3-szor porban. Adaggal lehet emelkedni. 0,10 = 3 kr.

H. Guajacum. Mogyorónyi, diónyi, zöldes-szürke porral behintett, zöldes-feketés darabokban előjövő gyanta. Gyengén illatos, íze kesernyős, csipős. Borszeszben, maró kalilugban oldódik. Régen mint antidyscraticum haszn. Ma obsolet, 10,0 = 9 kr.

H. Tinctura Guajaci resinae. Kémszerek közt szerepel. 10,0 = 7 kr.

H. Guarana. A paullinia sorbilis (Sapindaceae) braziliai fának szárított és porrá tört magvaiból gyúrt tézsa (pasta). Barnásfekete, belül vörhenyesen márványozott, kemény, törése majdnem egyenes, csekély fényű. Vízben részben oldható, sajátos szagú, fanyar-kesernyős ízű. Hatóanyagai coffein (5%), tannin és zsíros olaj. Hatása, mint a colleiné, e mellett adringens is. Diarrhoea, dysenteria, hemicrania ellen bels. adag 0,5—2,0 pro dos. napj. 3—4-szer. 1,0 = 3 kr.

445 Rp. Guaranae pulv. 5,0.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No 10.
 Det. in chart. cerat.
 S. Hemicrania esetén ¼ ór.
 egy port a roham kezdé-
 tén. Összesen 3—4 port.
 60 kr.

446 Rp. Guaranae pulv. 0,5.
 Pulvis Doveri 0,1—0,3.
 Sacchar alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 Det. in chart. cerat.
 S. 2 ór. 1 port.
 1—5 éves gyermeknek.
 Idült bélhurut. 49 kr.

H. Gummi arabicum. Megszáradt növényi nedv. (Acacia-fajok. Mimosae). Gömbölyded, fehér vagy sárgás, a fölületen át nem tetsző, íztelen, szagtalan darabok. Borszeszben nem oldódik, kétszeres mennyiségű vízzel ragadós, savanyú, nyúlós oldat képződik. Küls. hintőporban, oldatban bevonó. Klystirhez 1 : 3, szájsz. és torokvízhez 1 : 5—10. Bels. nem, hacsak nem mint vivőszer. Gyógyszerészeti technikában fontos szer, különösen emulsiók készítésénél. 10,0 = 6 kr, vagy 10,0 = 9 kr. (pulv.).

H. Mucilago Gummi arabici. (1 : 2 vizre.) Segítőszer pilulák, pastillák készítésénél; vivőszer. 10,0 = 5 kr.

H. Pulvis gummosus. (amylum, rad. liquorit. pulv. gummi arab. és sacchar. alb. keveréke.) Vivőszer poralakú gyógyszerek számára sacchar. helyett. 10,0 = 6 kr.

H. Linctus gummosus. (Mucil. Gummi arab. + syrup. simpl. aa.) Keserű vagy csipős anyagok vivőszere.

H. Mixtura gummosa. (Mucil. Gummi arab., syrup. simpl. és aqua dest. keveréke.) Vivőszer keserű v. csipős anyagok számára. 10,0 = 3 kr.

Gummi Kino l. Kino.

H. Guttapercha depurata. (Isonaudra Gutta. Sapotaceae.) Légen megszáradt, tisztított tejnedv. 1,0 = 5 kr. Előállítatik belőle a

H. Lamina Guttapercha. Finom lemez. Vízátthatlan, zsíráthatlan fedőanyag. Sebészetben, bőrgyógyászatban szerepel 10,0 = 20 kr.

Gutti s. Gummigutti. Narancssárga, kagylós törésű, viaszfényű, szagtalan, édeses, majd égető ízű mézgyanta. Drasticum. Bels. adag pilulában 0,01—0,05—0,2! 2—3 × napj. Dos. maxim. pro die 0,8! (M. Gyk. I kiad.) Számos titkos szer, p. o. a Morrison-féle pilulák is tartalmazzák. (Nagy vigyázat!) 1,0 = 3 kr.

447 *Rp.* Gutti.

Pulv. tub. Jalapae
Aloes aa 2,0.
Pulv. rad. Rhei chin. 0,6.
Spirit dil. qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Obducant. balsamo to-
lutuano.

S. 1—3 szemet egyszerre.

D rasticum.

75 kr.

448 *Rp.* Gutti.

Folior. Digit. pulv.
Bulbi Scillae
Stibii sulf. aurant. aa 1,0.
Extr. Graninis qu. s.
ut. f. l. a. pilulae No. 50.
Consperg. Lycopodio.

DS. 2—3 ór. 1 szemet; az
adag emelhető.

Pilulae hydrogogae Heimi.

45 kr.

Haemolum. Kobert által előállított vaskészítmény. Létrejön, ha zinkpor hat vérfestenyre. Feketebarna por. Adag chlorosisnál 0,1—0,5 napj. 3-szor étkezés előtt, porban, pastillákban. 1,0 = 8 kr.

Haemogallolum. Kobert állította elő. Létrejön, ha pyrogallol hat vérfestenyre. Barnafekete por. Haszn. mint a haemolumnál. 1,0 = 10 kr.

Hamamelidis virginicae folia et cort-radice. (Hamamelideae.) Hatóanyaga csersav; a levelekben ezenkívül illó olaj. Amerikában divatos adstringens, haemostaticum (minden fajta vérzések ellen) 10,0 = 5 kr. Használtatnak készítményei.

Extractum Hamamelidis fluidum. Bels. adag 4,0—8,0 pro dos. 2—3 ór., vagy kávéskanalként cukros vízben, syrupban. Főleg menorrhagiák, metrorrhagiák és haemorrhoidalis vérzések ellen. 1,0 = 2 kr.

Tinctura Hamamelidis. Bels. adag 5—30 csepp pro dos. napj. 3—4-szer. 10,0 = 10 kr.

Hamamelin s. Hamamelidin. Beszárított borszeszes kivonat. Suppositoriumba 2,0 pro dos., pilulában 0,05—0,2 pro dos.

449 *Rp.* Extr. Hamamelid. fluidi 40,0.

Aquae dest.

Syrup. cort. Aurant.

aa 50,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.—evők.

1 frt 15 kr.

450 *Rp.* Tinct. Hamamel.

Tinct. Chinae. comp.

aa 20,0.

MDS. Czukros vízben 10

csepp — 1 kk. napj.

többször.

46 kr.

451 *Rp.* Decoct. cort. Hamamel.

e 20,0.

l. a. p. ad colat. 400,0.

Syrup. simpl. 40,0.

MDS. 2—3 ór. egy piros

boros pohárral.

57 kr.

452 *Rp.* Hamamelini 1,0.

Butyri Cacao qu. s.

ut. f. supposit. No. 5.

DS. 0,2 gmos. hamamelin

csapok. Napj. 2 db. hasz-

nálandó el.

Heleniu (C_6H_8O). Az inula helenium gyökeréből előállított camphor. Színtelen, tűfalakú, szagtalan, vízben oldhatlan, borszeszben, aetherben, zsíros és illó olajokban jól oldható jegeczek. Illó. Antisepticus hatású. Francia részről belégzéseket ajánlottak phthisis, pertussis, bronchitis capillaris eseteiben. Bels. bronchitisek, pertussis, hurutos hasmenések, malaría ellen 0,01—0,04 pro dos. 4—5 × napj. borszeszes oldatban, pilulában. 0,10 = 5 kr.

453 *Rp.* Helenini 1,0.

Cognac 40,0.

M. f. solut.

DS. 3 ór. 1 kk.

1 frt 13 kr.

454 *Rp.* Helenini 0,3.

Pulv. Amyli 2,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

Det. in caps. amylac.

S. 2—3 ór. 1 dbot,

82 kr.

455 *Rp.* Helenini 0,6.

Pulv. et extr. Liquir.

aa qu. s. ut f. pilul.

No. 30.

Consp. pulv. Liquir.

DS. 1—2 szemet 3—5 ×

napj.

69 kr.

456 *Rp.* Helenini 0,5.

Olei Jecoris Aselli

100,0.

M. f. solut.

DS. Napj. 1—3 kk.

72 kr.

Hellebori viridis radix. (Ranunculaceae.) Hatóanyaga shelleborein ($C_{26}H_{41}O_{15}$) és helleborin ($C_{26}H_{42}O_{16}$), glycosidák.) Drasticum. Szívre különben úgy hat, mint a digitalis. Népgyógyászatban Erdélyben) antihydropicum. Bels. adag porban, pilulában, decoctumban 0,02—0,1 pro dos. 2—3 ór. (Vigyázat! Erős mérég! Mint drasticum nem használandó!) 10,0 = 6 kr.

Helleboreinum ($C_{16}H_{15}O_{15}$). Különböző helleborus fajokból előállított glucosida. Színtelen v. fehéres tökből álló jegeczek, vízben könnyen oldódnak. Digitalis pótszerűen ajánlották. Cardiacum, diureticum. Könnyen okoz hasmenést. Cumulativ hatása nincsen. Adag bels. 0,01—0,02 grm. pro dos. 3—5 $\times$ napj. pilulában. 0,01 = 2 kr.

H. Hirudo medicinalis és H. officinalis. Piócza. (Annulatae) Csak egyszer használható. Használat után elpusztítandó. 1 db. = 10 kr.

Homatropinum l. Belladonna.

Hydracetinum l. Pyrodinum.

Hyrargyri praeparata.

1. Hivatalosak.

H. Hydrargyrum purum s. Mercurius vivus (Hg). Ezüstfehér színű, élénk fémsfényű, nehéz folyadék. Bels. ilousnál mint mechanicusan (súlyánál fogva) ható szer 100,0—200,0 mennyiségben. Különb. csak kenőcs és tapaszt előállítására haszn. 10,0 = 7 kr.

H. Emplastrum Hydrargyri l. Emplastra.

H. Unguentum Hydrargyri s. Unguentum cinereum. Antiphlogisticum, resolvens 2,0—3,0 gm. 1—2 $\times$ napj. bedörzsölve. Phthiriasis esetén a bőr beteg területére 2,0—3,0 dörzsölendő be egyszer. Syphilisnél a bedörzsölési gyógy módhoz 1,0—2,0-os csomagok charta ceratában rendelendők. 10,0 = 10 kr.

†† **H. Hydrargyrum bichloratum ammoniatum s. Mercur. praecipit. albus** [$Hg(NH_2)Cl$]. Igen fehér por, vízben nem oldható, sem borszeszben. Causticum. Bels. nem. Küls. kenőcsökben főleg lágy fekélyre és bujakóros fekélyekre mint izgató, maró és specificus szer (1: 10—30) 1,0 = 3 kr.

†† **H. Hydrargyrum bichloratum corrosivum s. Hydr. sublimatum** (Hg Cl₂). Apró, fényes, fehér jegeczekből álló, szagtalan tömeg; maró és undorító fémmizű; szétdörzsölve fehér por; 16 sr. hideg, 3 sr. forró vízben, ugyanannyi borszeszben és 4 sr. aetherben oldódik. Causticum, antisepticum, antisiphiliticum. Küls. sebkezelésben mint antisepticum 1: 1000—2000; condylomák edzésére 1: 10; permets alakban belégzésre vagy torok-, szájvíznek 0,2—0,5: 1000; húgyesőbe fecskendésre 0,05—0,1: 100; bujakóros száj-, torokfekélyek esetelésére 0,5—1,0: 100. Bels. pilulában, porban, bőr alá fecskendés alakjában 0,005—0,01 pro dos. 1—2-szer napj. Dos. maxim. sing. 0,03! Dos. maxim. pro die 0,1! Per os soha éhgyomorra! Por, pilula argillával készíthetők. Bőr alá fecskendésre szolgáló oldatba 1 r. Hg Cl₂-hoz 10 r. ClNa vétessék. Sublimatfürdőket l. Fürdők cz. a. 1,0 = 2 kr. 10,0 = 15 kr.

H. Gaze Hydrargyro-bichlorato-corrosivo impregnatum. Antisepticus sebkötéshez. 1 meteres csomag

= 30 kr., 5 meteres csomag = 1 ftl 20 kr., 10 meteres csomag
= 2 ftl 70 kr.

H. Lana Gossypii Hydrargyro-bichlorofo-rosivo impraegnata. Antisymphiliticus csatlószerekhez 10/0

13 kr., 25/0 = 20 kr., 50/0 = 33 kr., 100/0 = 56 kr.

††H. **Hydrargyrum bifidatum rubrum** (Hg₂Cl₂)
Skarlátvörös por, vízben alig, hideg borzszon 120, forró víz-
szesz 20 súlyrészében oldható. Kiseb. oldószerben emulsió, mint a
hydrarg. bichlor. ammon. Küls. kenőcsben 0,1-0,2; 0,5-1,0-
ritkán, méz leginkább gőrvélyes egyének hajaköréjébe. Belső adag-
porban, pilulában 0,005-0,01-0,03! pro die 1-2 adag, pro
die 0,1! 1,0 = 5 kr.

†H. **Hydrargyrum chloratum mitis seu Calo-
mel** (Hg₂Cl₂). Fínom, nárfafehér, nehéz por, mely vízben
nem oldható. Iz- és szagtalan. Vízben, forró vízben, szeszben
oldhatlan. Küls. substantiában, mint a nyálkahártyákra fektetendő
enyhén edző hintőpor haszn. Belső adagban az opiummal
(porban opiummal 0,02-0,05 pro die napj. 2-3 szor, emulsió-
ban laxans, diureticum 0,1-0,5 pro die napj. 2-3 szor, emulsió-
jalapával együtt). Cholera mártia és noxiar, valamint szék-
abdom-nál nagy adagban, mint a beleket tisztító készítmény
lőtték. Dos. maxim. sing. 0,5! Dos. maxim. pro die 1,0-1,5!

††H. **Hydrargyrum cyanatum** (Hg₂Cy₂)
sző, hasábalakú jegeczek, maró, undorító hatású. Vízben
13 r. hideg, 3 r. forró vízben, 15 r. hideg, 3 r. forró vízben
ben oldódik. Belső mint antisymphiliticum haszn. Belső adag-
dés alakjában a hydrarg. bichlor. ammon. gőrvélyes egyének
fölötté azonban előnyei nincsenek. Diphtheriának és szék-
gyerm. kor szerinti 0,005-0,001-0,002 pro die napj. 2-3 szor
maxim. sing. 0,03! Dos. maxim. pro die 0,1-0,2!

††H. **Hydrargyrum iodatum flavum** (Hg₂I₂)
sárga por. Haszn. mint a hydrarg. bifid. r. sz. 0,05!
0,05! Dos. maxim. pro die 0,2! 1,0 = 5 kr.

††H. **Hydrargyrum oxydatum flavum** (Hg₂O)
por, vízben nem oldható. Edző hatású. Küls. mint kenőcs, szék-
lyekre, syphiliticus fekélyekre 1:10-30, emulsióban 1:10-
20 1,0 = 4 kr.

H. **Hydrargyrum salicylicum.** Fehér, szagtalan
íztelen közönbös kémhatású, finom por, mely vízben
nem oldódik; jól oldódik konyhasó és natr. szulfid oldatok
folyadékokban. Igen állandó, ellentálló vegyület. Hígítatlan
59-59%. Haszn. küls. behintés alakjában syphiliticus fekély-
bekeszkodás alakjában (1:1000) gonorrhoea utáni kezelés-
Belső, syphiliticnél adag porban, pilulában emelkedőleg 0,005-
pro die. Bevétel után tejet igyék a beteg. Intravena-
kendésekre 1%-os oldat kali carb. v. natr. chloridummal
tendő; egyszerre 1 fecsk. Paraffin liquid-al készült emulsióval
használtatik e célra. Dos. max. sing. 0,03. pro die 0,1-0,2 = 5 kr.

†H. **Hydrargyrum sulfuratum rubrum.** I. Cinnabaris factitia.

457 *Rp.* Hydrarg. bichlor. ammon. 2,0.

Unguent. emoll. 30,0.

M. f. unguentum.

DS. Praecipitat-kenőcs. 62 kr.

458 *Rp.* Hydrarg. bichlor. ammon.

Bismuth. subnitr. aa 0,5.

Amyli.

Glycerini aa 10,0.

M. f. unguent.

DS. Kenőcs szeplő s az epidermis más festenyzettsége esetén. (HEBRA.)

37 kr.

460 *Rp.* Hydrarg. biochlor. corros. 0,1.

Collodii flexil.

10,0—15,0.

MDS. Corrosiv-collodium edzésre.

27 kr.

462 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,1.

Natrii chlorati 1,0.

Aquae destil. 10,0.

M. f. solutio; filtra.

DS. Corrosiv-oldat 1%-os.

Bőr alá fecskendésre. Sub sigillo. Az orvos kezéhez.

½—1 fecskendővel naponta.

34 kr.

465 *Rp.* Hydrarg. bijod. rubr. 0,05.

Kalii jodati. 3,0.

Aquae dest. 150,0.

Glycerini 10,0.

M. f. solutio.

DS. Reggel, este egy evőkanállal. Lehet emelkedni 3—4 evőkanál naponta.

44 kr.

459 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,5.

Aquae destil. 500,0.

M. f. solutio.

DS. 1 pro mille corossiv-oldat. Külsőleg. 51 kr.

461 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,2.

Glycerini 40,0.

MDS. Syphiliticus torok-, szájfékélyek ecsetelésére. 42 kr.

463 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,1.

Argillae alb. qu. s.

ut. f. cum guttis nonnullis.

Aquae dest.

pilul. No. 30.

Consp. pulv. Argillae

DS. 2—4 szemet naponta. 41 kr.

464 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,01—0,04 (l)

Albi ovi gallinac. No. 1.

Aquae dest. 100,0.

MDS. Felrázva 2 ór. 1 kk.—gyk.

Gyermeknek laryngitis

crouposa esetén.

(BURROW-RAUCHFUSS után BÓKAY J.) 42 kr.

466 *Rp.* Hydrarg. bijodati rubri 0,5.

Ungu. simpl. 20,0.

M. f. unguent.

DS. Kenőcs.

39 kr.

- 467 *Rp.* Calomelanos 10,0.
Det. in vitro cum epist.
vitreo clauso.
DS. Az orvos kezéhez
Calomel. Híntőpor.
40 kr.
- 468 *Rp.* Calomelanos 0,5.
Opii pur. pulv. 0,05.
Sacch. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 2—3 × napj. 1 port.
Felnőtteknek.
Syphilis.
43 kr.
- 469 *Rp.* Calomelanos 0,05—0,1.
Ferri lactici 0,2.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Reggel, este 1 port.
Csecsemőknek syphilis congenita esetén, ha nagyfokú vérszegénység is van jelen; ha nincs, úgy a ferrum lact. elhagyandó.
43 kr.
- 470 *Rp.* Calomelanos 0,05.
Pulv. Doveri 0,05—0,08.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Reggel, este egy port.
Csecsemőknek syphilis congen. esetén, ha bélhurut is van jelen. Ugyanez rendelendő cholera infantum ellen is, midőn a calomel összes adaga 0,08-ra emelhető és 2 ór. adandó 1 por.
43 kr.
- 471 *Rp.* Calomelanos 1,0.
Tubera Jalapae pulv. 2,5.
Sacchar. alb. 2,5.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 5.
DS. Naponta 1—2 port.
Drasticum.
29 kr.
- 472 *Rp.* Hydrarg. oxyd. flav. 0,15.
Unguent emoll. 5,0.
M. f. unguent.
DS. Külsőleg. Pagenstecher-féle szemkenőcs.
33 kr.
- 473 *Rp.* Calomelanos 2,0.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Naponta 3—4 port.
Diureticum.
43 kr.
- 474 *Rp.* Hydrarg. cyanati 0,01.
Aquae dest. 10,0.
Syrup. simpl. 90,0.
M. f. solut.
DS. 2—3 ór. 1 kk.
Gyerm. diphtheritis esetén.
52 kr.
- 475 *Rp.* Hydrarg. salicyl. 0,5.
Opii pur. pulv. 0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Napj. 2 port.
44 kr. (SCHWIBLMER E.)
- 476 *Rp.* Hydrarg. salicyl. 1,0.
Vaselinæ 30,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs syphil. fekélyekre. (PLUMERT.)
47 kr.

- 477 *Rp.* Hydrarg. salicyl. 1,0.
 Opii pur. pulv. 0,2.
 Extr. Gentian. qu. s.
 ut. f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Liquir.
DS. Napj. 2–3 szemet.
 46 kr. (SCHWIMMER.)
- 478 *Rp.* Hydrarg. salicyl. 0,1.
 Aquae dest. 250,0.
 Natrii bicarb. 1,0–1,3.
MDS. Gonorrhoeánál a
 húgycsőbe fecskend. 3 ×
 napj. (SZADEK.)
 35 kr.
- 479 *Rp.* Hydrarg. salicyl.
 Kalii carb. $\overline{aa}$ 0,1.
 Aquae dest. 10,0.
MDS. Bőr alá fecsk. 1
 fecsk. pro die.
 26 kr. (PLUMERT.)
- 480 *Rp.* Hydrarg. salicyl. 1,0.
 Magnes. carb. 20,0.
MDS. Hintőpor. syphil.
 fekélyekre. 32 kr.
- 481 *Rp.* Hydrarg. salicyl.
 Kalii carb. $\overline{aa}$ 1,0–3,0.
 Aquae dest. 1000,0.
MDS. Gonorrhoeánál napj.
 többször húgycsőbe fecsk.
 53 kr. (PLUMERT.)
- 482 *Rp.* Hydrarg. salicyl.
 Kalii carb. $\overline{aa}$ 1,0–3,0.
 Aquae dest. 1000,0.
MDS. Sebkiütéshez.
 (PLUMERT.)
 53 kr.
- 483 *Rp.* Hydrarg. salicyl. 1,0.
 Paraffin. lipid. 10,0.
MDS. Intramuscul. befecsk.
 (JADASSOHN és ZEISING.)
 24 kr.

2. Nem hivatalosak.

Hydrargyrum benzoicum oxydatum. [$C_6H_5CO_2$],
 $Hg + H_2O$]. Fehér, szag- és íztelen jégeczpor; hideg vízben nehe-
 zen, forró vízben, borszárszben könnyen oldódik. Konyhasós vízben
 könnyen oldódik, midőn egy kétfős só képződik. Antisyphiliticum.
 Bőr alá fecskendés alakjában adag 0,1 pro dos. és pro die. Oldat
Cl_{Na} segélyével készítettessék. 1,0 = 7 kr.

- 484 *Rp.* Hydrarg. benzoici.
 Natrii chlorati $\overline{aa}$ 0,25.
 Cocaini hydrochlor. 0,5.
 Aquae dest. 30,0.
MDS. Bőr alá fecsk.
 (STUKOWENKOFF.)

485 Rp. Hydrarg. benzoici
 Vaselineae aa 1,0.
 Ol. Paraffini 8,0.
MDS. Intramuscul. befecskendésre. A Lewin-féle fecskendőből 2 osztásnyi jobbra és balra a glutens izmok közé.
 (STUKOWENKOFF.)
 36 kr.

486 Rp. Hydrarg. benzoici 0,15.
 Argillae alb. qu. s.
 ut f. cum gtt. nonnull.
 Aquae dest.
 pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Argillae
DS. 1—2 szemet napj.
 41 kr.

487 Rp. Hydrarg. benzoici
 Natrii chlor. aa 0,06.
 Aquae dest. 400,0.
 M. f. solut.
DS. Gonorrhoeánál húgycsőbe fecskendésre.
 Napj. 3-szor.
 42 kr.

Hydrargyrum bichloratum carbamidatum solutum. (1,0 hydrarg. bichlor 100,0 forró, párolt vízben feloldatik, a lehült oldathoz 0,5 higany tetetik.) Hosszú időre nem rendelhető, mert megbomlik. Bőr alá fecskendésre igen alkalmas syphilis esetén. Napj. 1 fecskendővel. 1,0 = 1 kr.

Hydrargyrum carbolicum s. Hydrarg. carbol. oxyd. s. Hydrarg. diphenylicum (MERCK.) (OC_6H_5 , $Hg.OC_6H_5$). Szintelen jegeztük. Vízben, hideg borszeszben oldhatlan, 20 r. forró borszeszben oldódik. A higany erősen van a phenolhoz kötve ezen vegyületben, mely 51,80% higanyt tartalmaz. Haszn. bels. mint antisiphiliticum. Adag pilulában 0,02—0,03 pro dos. 3 × napj. Intramuscul. befecsk. alakjában ugyanennyi pro die. 0,10 = 2 kr.

488 Rp. Hydrarg. carbol. 1,2.
 Extr. et pulv. Liquir.
 qu. s.
 ut f. pilul. No. 60.
 Obduc. bals. Tolut.
DS. Napj. 2—4 szemet.
 (SCHADECK.)
 90 kr.

489 Rp. Hydrarg. carbol. 2,0.
 Mucil. Gummi arab. 4,0.
 Aquae dest. 100,0.
MDS. Felrázva napj. egy
 Lewin-téle fecsk. intramuscul. 63 kr.

Hydrargyrum formamidatum solutum. (LIEBREICH.) (1,0 frissen lecsapott higanyéleg oldata formamidben, az oldat felhigittatik vízzel 100 köbctmrig.) Bőr alá fecskendésre alkalmas syphilis esetén. Napj. 1 fecskendővel 1,0 = 1 kr.

Hydrargyrum iuidosuccinicum. ($Hg.N_2C_8H_8O_3$). Fehér, selyemfényű jegeczpor, mely 25 r. vízben és 300 r. bor-

szeszben tisztán oldódik. Antisymphiliticum. Bőr alá fecskendés alakjában 0,01—0,015 gm. pro dos. és pro die 1,0 = 12 kr.

490 Rp. Hydrarg. imido-succin.

2,0.
Aquaë dest. 98,0,
MDS. Bőr alá fecsk. Az
orvos kezéhez.
47 kr.

Hydrargyrum peptonatum. (BAMBERGER.) (1,0 hús-pepton 50 kctm. párolt vízben oldatik, az oldathoz 20 kctm. 5%-os sublimatoldat adatik; a megzavarodott folyadékhoz 20%-os konyhasóoldatból annyi adandó, hogy az egészen feltisztuljon: ezután a keverék vízzel 100 kctm.-ig felhigítandó.) Az oldat bőr alá fecskendésre igen alkalmas syphilis esetén. 1 kctm. megfelel 0,01 sublimátnak. Napj. egy fecskendővel. 1,0 = 5 kr.

Hydrargyrum tannicum oxydulatum. (LUSTGARTEN.) Sötétzöld. Szintelen, íztelen por, oldhatlan. Bels. porban syphilis ellen. Adag 0,1 pro dos. 3 × napj. 1/2—1 órával étkezés után. 1,0 = 10 kr.

491 Rp. Hydrarg. tannici
oxydul. 1,0.
Sacchar. lact. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 3 × napj. 1 port.
49 kr.

492 Rp. Hydrarg. tannici
oxydul. 4,0.
Pulv. rad. Althaeae.
Extr. Liquir. aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 60.
Consp. pulv. Liquir.

DS. Napj. 3—5 szemet.
84 kr.

Hydrargyrum thymico-aceticum. (Merck.) Fehér, szagtalan, íztelen, lemezes jegoczkékben fordul elő; vízben oldhatlan, alkáliákban jól oldódik. Újabb antisymphiliticum. Úgy látszik, e tekintetben egyenrangú a hydrarg. salicylicum-mal. Bels. nem igen haszn. Bőr alá v. intramuscul. fecsk. 5—10%-os suspensióban mucil. gummi arab. v. paraffin. liquid-ban; 1 kctm. egyszerre 3—5 napi id. közöttben. 1,0 = 10 kr.

493 Rp. Hydrarg. thymico
acet. 1,5.
Mucil. Gummi arab. 0,5.
Aquaë dest. 20,0.
M. f. suspensio.

DS. Bőr alá fecsk.
34 kr. (SZADEK.)

494 Rp. Hydrarg. thymico-acet
1,0.
Paraff. liquid. 10,0.
M. f. suspensio.

DS. Bőr alá fecsk.
(JADASSOHN és ZEISING).
28 kr.

495 *Rp.* Hydrarg. thymico-acet.

1,0.

Paraff. liquid. 10,0.

Cocaini hydrochlor. 0,1.

M. f. suspensio.

DS. Bőr alá fecsk.

(SENATOR-LÖWENTHAL).

38 kr.

Hydrargyrum-Zincum cyanatum. Fehér, kristályos por. Vízben nem, vérserumban oldható. Erős bactericid hatása. Kötőszereket impregnálnak vele. 1,0 = 8 kr.

H. Hydromel infantum. l. Senna.

H. Hydrastis canadensis rhizoma. (Ranunculaceae). Hatóanyagai berberin, hydrastin (alcaloidok). Méhvérvések, tüdővérvések, vesevérvések ellen haszn. tonicum, stomachicum cholagogum. 10,0 = 6 kr. Készítmények:

H. Extractum Hydrastis fluidum. Adag 2 ór. 20—10 csepp syrupban. 10,0 = 20 kr.

Hydrastininum hydrochloricum, $C_{11}H_{11}NO_3HCl$. Színtelen v. sárgás, vízben könnyen oldódó por; keserű. Hatása mint egyéb hydrastis készítményeké, csak hogy erősebb. Adag bőr alá fecsk. 10%-os oldatból $\frac{1}{4}$ —1 fecsk. Bels. pilulában 0,1 gm. pro dos. napj. 2—3-szor. 0,01 = 5 kr.

496 *Rp.* Extr. Hydrastis fluidi.

Syrupi simpl. aa 30,0.

MDS. 2—3 ór. 1 kk.

84 kr.

497 *Rp.* Extr. Hydrastis fluidi

Vini Malag. aa 30,0.

Syrup. Cinnam. 15,0.

MDS. 2—4 ór. 1—2 kk.

96 kr. (FELLNER.)

498 *Rp.* Hydrastinini hydro-

chlor. 1,0.

Aquae dest. 10,0.

MDS. Suo nomine. Bőr alá fecsk. $\frac{1}{4}$ 1 fecskendővel.

5 frt 20 kr.

499 *Rp.* Hydrastinini hydro-

chlor. 1,0.

Pulv. et. extr. Liquir.

aa qu. s.

ut. f. pill. No. 20.

Consp. pulv. Liquir.

DS. Napj. 3 × egy szemet. Metrorrhagia, menorrhagia.

5 frt 40 kr.

Hydrogenium hyperoxydatum (H_2O_2). Víztisztá folyadék keserű, összehúzó ízű, könnyen bomlik. Kereskedésbeli készítmények 5—10%-os vízoldatok. Helybeli izgató, desinficiens, élelítő (fekélyek ecsetelésére), cosmeticum (a barna haj aranyszőke színt nyer általa). Bels. nem. 10,0 = 5 kr.

†**H. Hyosciami folia.** (Hyoscyamus niger. Solanaceae.)

Hatóanyagai hyosciamin és hyoscin, melyek az atropinnal isome-

rek. Hatása, mint a folia belladonnae-nal. Dos. maxim. stng. 0,2! Dos. maxim. pro die 1,0! Nem használtatik; helyette készítményei. 10,0 = 2 kr.

†H. **Extractum Hyosciami foliorum.** Dextrinnel készült borszeszes kivonat. Bels. porban, pilulában 0,01—0,05—0,15! pro dos. napj. 3—4-szer. Dos. maxim. pro die 0,8! 1,0 = 5 kr.

H. **Oleum Hyosciami foliorum coctum.** Küls. mint fájdalomcsillapító bedörzsölések alakjában. 10,0 = 4 kr.

Hyoscinum hydrochloricum.

Hyoscinum hydrojodicum.

Hyoscinum hydrobromicum.

Hatásuk mint az atropiné. Használatuknál ajánlatos rendkívüli vigyázat, mérgező voltak miatt. Adag különben subcután 0,0001—0,0005, per os 0,005—0,001. pro dos. Ajánlották melancholicusok, morphinisták, potatorok, neurasthenicusok, idült elmebetegségek álmatlansága ellen, asthma nerv., neuralgiák, epilepsia, paralysis agitans eseteiben, 0,01 = 15 kr.

Hyoscinaminum crystallisatum ($C_{17}H_{21}NO_3$). Nem mindig tiszta készítmény, legjobb a Merck-féle. Selyemfényű jegecskék, vízben nehezen, savanyított vízben, borszeszben, aetherben könnyen oldódnak. A jó készítmény, mely hyosciint nem tartalmaz, hypnoticum, anodynum, antispasmodicum. Adag, mint hypnoticum subcután 0,001—0,005! (oldás glicerinnel segélyével). Per os pilulában mint anodynum 0,0005—0,001 pro dos. napj. 2—3-szor. Nagy vigyázat, különösen míg nem ismerjük a készítmény hatékonyságát és a beteg viselkedését a szer iránt. Jó lesz először a legalacsonyabb adaggal tenni kísérletet! 0,01 = 20 kr.

500 Rp. Extr. Hyosciami 0,5.
Pulv. rad. Ipecac. 0,2.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 2—3 ór. 1 port. Bronchitisnél, görcsös köhögéskor. 46 kr.

502 Rp. Hyoscinamini crystall.
Merck. 0,05.
Aquae dest.

Glycerini aa 5,0.
MDS. Hyoscinamin bőr alá fecskendezésre. Sub sigillo.
Az orvos kezéhez. $\frac{1}{3}$ —1 fecskendővel egyszerre.
1 ffr 24 kr.

501 Rp. Extr. Hyosciami
Sulfur. aurat. Antimonii aa 0,05—0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 4 port naponta.
2—6 éves gyermekeknek bronchitis sicca esetén.
43 kr.

503 Rp. Olei Hyosciami cocti
Chloroformii aa 20,0.
M. f. linim.
DS. Külsőleg bedörzsölésre.
44 kr.

504 Rp. Hyoscini hydrobrom. s.
hydrojodici 0,005.
Aquaе dest. 10,0.
M. f. solut. Filtra.

DS. Az orvos kezéhez.

Hyoscinsó-oldat bőr alá
fecskendésre. $\frac{1}{3}$ —1 fecs-
kendővel egyszerre.

34 kr.

505 Rp. Hyoscini hydrobrom. s.
hydrojod. (0,01)—0,02.
Aquaе dest. 70,0.
Syrup. cort. aurant.

30,0.

MDS. 1—2 $\times$ napj. 1 kk.

47 kr.

Hypnolum s. Monochloral-Antipyrin. Chloral-
hydrat és antipyrin egyesülése. Fehér. jegeczes, szag és íztelen
por. 15 r. vízben old. Hypnoticum (Bardet.) Kevéssé van kipró-
bálva. Bels. adag oldatban v. capsulában 1,0 gm. pro dos. 1,0 =
20 kr.

Hypnonum l. Acetophenon.

H. Ichthyocolla. Halenyv. Gyógyszerészeti technicában bír
fontossággal. 10,0 = 36 kr.

H. Ichthyolum. Fossil balak maradványait tartalmazó tyroli
bituminosus ásvány száraz lepárlási terménye, melyet helyesebben
sulfo-ichthyolsavnak kellene nevezni. Előállítják natrium, lithium,
zink, higany és ammon-sóit. *Ichthyolum* név alatt rendszeren az
ammonium sulfo-ichthyolicum értetik $C_{18}H_{16}S_2O_6(NH_4)_2$; mi is ezt
értjük az alantiakban, mivel nálunk ez hivatalos. Tiszta, vörös-
barna, syruyszerű, kellemetlen szagú folyadék. Vízben, aetherben,
borszeszben tisztán oldódik. Élettani hatását nem ismerjük még
kielégítőleg. Használata küls. kenőcsök alakjában 1: 5—10—20
idült eczema, psoriasis, prurigo, acné rosacea, favus ellen, azon-
kívül idült rheumatismus és köszvény eseteiben is. Substantiában is
beecsetelhető vele a bőr. Bels. javalatai még szigorúabban meg nem
állapítottak; adják pilulában, 0,1—0,3 pro dos. 1,0 pro die idült
bőrbántalmak, izületi s izomrheuma, hemicrania, cystitis és pyeli-
tis chron. eseteiben. 1,0 = 6 kr. 10,0 = 45 kr.

506 Rp. Ichthyoli 10,0.
Vaselinæ 90,0.
M. f. unguent.

DS. 10%-os ichthyolvaselin.

1 frt 15 kr.

507 Rp. Ichthyoli 10,0.
Aquaе dest. 20,0.

MDS. 2—3 $\times$ napj. 15—30
cseppet bels. (UNNA).

61 kr.

508 Rp. Ichthyoli 10,0.
Unguent. diachyl. 200,0.
M. f. unguent.

DS. Kenőcs.

Idült eczema. (UNNA).

2 frt 22 kr.

509 Rp. Ichthyoli 3,0.
Pulv. et extr. Liquirit.
aa qu. s.

ut. f. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Liquirit.

DS. Többször napj. 1 szemet

58 kr.

510 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
 Ol. Ricini 20,0.
 Spirit. vini 100,0.
MDS. Külsőleg. Bedörzsölésre.
 79 kr.

511 *Rp.* Ichthyoli
 Spirit. Aether aa 10,0.
 Collodii flexil. 200,0.
MDS. Ichthyol-collodium.
 Külsőleg.
 1 frt 87 kr.

512 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
 Ungu. Lanolini 90,0.
DS. Külsőleg.
 1 frt 33 kr.

H. Infusum laxativum l. Senna.

H. Infusum Rhei cum Natrio carbonico l. Rheum.

Ingluvin. Terhesek hányása és dyspepsiák ellen Amerikából ajánlott titkos szer. Állítólag a csirke gyomrából állítatik elő. Nem áll másból, mint víz, konyhasó, keményítő, pepsin (27%) és izomrosttörmelékből. Adag pro dos. 0,5, utána 2 evők. 1%-os higósavoldat. Pepsinhatása van, mit az olcsóbb pepsinnel is el lehet érni. 1,0 = 25 kr.

†**H. Ipecacuanhae radix.** (*Cephaelis Ipecacuanha*. Rubiaceae.) Hatóanyaga az emetin. Béls. porban 0,01—0,05 pro dos. 2—3-szor, v. infus. 0,2—0,5 : 150,0 2 ór. 1 evőkán., mint expectorans, antidarrhoeicum, diaphoreticum; 0,3—1,0 pro dos. porban, infusumban, electuariumban, mint emeticum. 1,0 = 4 kr. v. 1,0 = 5 kr. (pulv.).

†**H. Pulvis Doveri s. Pulvis Ipecacuanhae cum Opio** l. Opium.

†**H. Syrupus Ipecacuanhae.** Adjuvans és ízjavító köptető folyadékokhoz. 10,0 = 5 kr.

†**H. Tinctura Ipecacuanhae.** Expectorans adag 10—30 csepp napj. 3—4-szer; mint adjuvans köptető folyadékokhoz 3,0—5,0 : 150,0. 10,0 = 14 kr.

513 *Rp.* Infus. rad. Ipecacuanhae e 0,5.
 l. a. p. ad colat. 140,0.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 10.
 Natrii bicarbon. 3,0.
MDS. 2 ór. 1 evőkánál.
 Expectorans felnőttek.
 47 kr.

514 *Rp.* Rad. Ipecac. pulv. 0,3.
 Morphini hydrochlor. 0,05.
 Sacchar. alb. 5,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 2—3-szor napj. 1 port.
 Diarrhoea. Catarrh. bronch. Felnőttek.
 44 kr.

515 *Rp.* Pulv. rad. Ipecacuanbae 2,0.
 Tartar. stibiat. 0,08.
 Amyli. 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 4.
DS. 10 perczenként 1 port
 a hányás bekövetkeztéig.
 Emeticum felhőttnek.
 33 kr.

517 *Rp.* Infus. rad. Ipecac. e 0,1.
 l. a. p. ad colat. 80,0.
 Natrii bicarb. 0,4.
 Syrupi simpl. 8,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 Csecsemőknek expecto-
 rans. Izgatott köhögés
 esetén 1 csepp tinct. opii
 teendő hozzá.
 40 kr.

516 *Rp.* Infus. rad. Ipecac. e 1,0.
 l. a. p. ad colat. 60,0.
 Oxytel. Scillae 10,0.
MDS. 1/4 ór. 1 kk. v. gyk.
 a hányás bekövetkeztéig.
 Emeticum csecsemőknek
 (kk.) s 1—4 éves gyer-
 meknek (gyk.)
 37 kr.

518 *Rp.* Infus. rad. Ipecac.
 e 0,5—0,2.
 l. a. p. ad colat. 100,0.
 Liquor. Ammonii ani-
 sati gtt. 10—15.
 Syrup. simpl. 10,0—
 15,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 2—5 éves gyermeknek
 expectorans.
 38 kr.

Iridis florentinae rhizoma. (Iridiae). Hatóanyagai
 amyllum és illó olaj. Hintópor, pilulaanyag, fogporok alkotórésze.
 Lapoczkokká faragva, mint *iris mundata* gyermeknek fogzáskor
 rágni adatik. 10,0 = 4 kr. pulverat 10,0 = 6 kr.

Jaborandi folia. (Pilocarpus pennatifolius, Rutaceae). Ható-
 anyag pilocarpin (alcaloid). Hatalmas diaphoreticum, sialagogum.
 10,0 = 12 kr. Helyette használtatik a hiv.:

††H. **Pilocarpinum hydrochloricum.** ($C_{11}H_{15}N_2O_4$,
 $2HCl$). Színtelen, átlátszó, tű- v. lemezalakú kristályok; íze
 alig keserű, kevésbé összehúzó. Vízen, borszeszben könnyen
 oldódik. Hatása, mint a jaborandi leveleké. Adag subcután
 0,01—0,02—0,03! pro dosi; per os 0,02—0,03! pro dos. víz-
 ben v. borban oldva. Dos maxim. pro die 0,06! Szívbántalmak
 esetén vigyázat! Gyermeknek subcután 0,005—0,01 korukhoz
 képest. 0,01 = 14 kr.

519 *Rp.* Pilocarpini hydroclor. 0,2.
 Aquae dest. 10,0.
 M. f. solut. filtra.
DS. 2% pilocarpin-oldat bőr
 alá fecskendésre. Az orvos
 kezéhez.
 3 frt 6 kr.

520 *Rp.* Pilocarp. hydrochlor. 0,03.
 Pepsini german. 0,6.
 Acid. hydrochlor. dilut.
 gtt. 2.
 Aquae dest. 80,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 Gyermeknek diphttheritis.
 esetén. 70 kr (GUTTMANN).

521 *Rp.* Pilocarpini hydrochlor. 0,025.

Cognac 5,0.

Aquae dest. 70,0.

Syrup. cort. Aurant. 25,0.

MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

Gyermeknek pertussis esetén.

(ALBRECHT).

73 kr.

†**H. Jalapae tuber.** (*Ipomea purga*, Convolvulaceae). Hatóanyagai jalapin seu convolvulin (gyanta). Kisebb adagban (0,2—0,5) purgans, nagyobb adagban (0,5—2,0) drasticum; porban, pilulában. Legtöbbször más catharticus szerekekkel, mint aloë, rheum, calomel, együtt (l. calomel). 10,0 = 6 kr. (pulv.). 10,0 = 10 kr.

†**H. Resina Jalapae.** Sárgásbarna színű, fénylő törésű, könnyen szétmorzsolható. Vízben nem, borszeszben könnyen oldható. Porban, pilulában 0,05—0,15 pro dos. purgans. 0,3—0,5 pro dos. drasticum. Leggyakrabban más catharticus szerekekkel együtt. 1,0 = 13 kr.

H. Pilulae laxantes l. Aloe.

522 *Rp.* Pulv. tuber. Jalapae

2,0.

Kalii hydrotartar. 1,0.

M. f. pulv. div in dos.

No. 2.

DS. Egy port bevenni; ha

3 óra alatt nincs hatása,

a másik port is.

Drasticum.

17 kr.

523 *Rp.* Resin. Jalapae.

Pulv. tuber. Jalapae.

Extr. Aloes aquos.

Sapon. medic. aa 2,0.

Extr. Taraxaci qu. s.

ut f. l. a pilulae No. 10.

Consp. pulv. rad.

Liquirit.

DS. Reggel esto 1—2 sze-

met.

Obstip. habit.

74 kr.

Jequirity semina. (*Abrus precatorius*, Papilionaceae.) Főható-része az abrin, mérgező felérjenemű anyag. A magvak forrázata, ha a kötőhártyára ecseteltetik, genyes, sőt croupus conjunctivitist idéz elő. Ezen tulajdonsága idült lobos kötőhártyabántalmak gyógyítására használtatott fel némelyek által. SATTLER szerint az infusum következőképen készíttessék: A forró vízben héjuktól megfosztott magvakból 1,0 összezsúratik, s 200,0 vízzel 24 órán át maceráltatván, a kivonat leszűretik. A folyadékkal 4—6-szor napjában ecseteltessék a kötőhártya. Nem ajánlható! 1,0 = 2 kr.

†**H. Jodoformium crystallisatum** (*CHI*). Citromsárga színű, zsíros tapintású, hatszögű kristálylemezekből áll, melyek sáfrányra emlékeztető, de kellemetlen szagúak. Vízben nem, 50 sr. hideg és mintegy 10 sr. forró borszeszben oldódik, jól oldódik zsíros és illó olajokban, valamint vaselinában is. Külső sebekre, fekélyekre desiniciens hintőpor alakjában v. kenőcsben (1—5 : 20) Bels. subcután mint antiszphiliticum glicerinnel feloldva 0,2—0,3! pro

dos. Per os 0,05—0,3! pro dos. pilulában, capsulában. Dos. maxim. pro die 1,5! Szagtalanítására legjobb a porhoz egy átmetszett faba tonca-t tenni v. cumariut; kenőcsökhöz mint szagtalanító perubalzsam, ol. menthae pip., ol. eucalypti, v. carbolsav tehető. 1,0 = 6 kr. 10,0 = 50 kr. 1,0 pulv. = 6 kr.

H. Gaze jodoformio impraegnatum. Sebkezelésben használtatik. Van 10—20—30—50% jodoformot tartalmazó gaze. $\frac{1}{4}$ meternyi csomagokban 16, 18, 22, 26 kr. $\frac{1}{2}$ meternyi csomagokban 25, 32, 36, 45 kr. 1 meternyi csomagokban 42, 52, 62, 82 kr.

524 Rp. Jodoformii pulv. 20,0.
Cumarini 0,5.
M. f. pulvis det. in vitro.
S. Jodoform.
1 frt 73 kr.

525 Rp. Jodoformii pulv. 2,0.
Collodii flexil. 20,0.
MDS. Jodoform-collodium.
43 kr.

526 Rp. Jodoformii pulv. 2,0.
Balsami peruvian. 4,0.
Unguent. emollientis 20,0.
M. f. unguentum.
DS. Kenőcs.

527 Rp. Jodoformii pulv. 2,0.
Vaselinæ 20,0.
Ol. Menthae pip. gtt. 2.
M. f. unguent.
DS. Jodoformvaselin.
50 kr.

528 Rp. Jodoformii pulv. 6,0.
Glycerini qu. s.
ut mensura sit 20,0.
DS. Bőr alá fecskendezre.
1 ketmben 0,8 jodoform.
Syphilis. (THOMANN).
56 kr.

529 Rp. Jodoformii pulv. 1,5.
Extr. et pulv. Liquirit. qu. s.
ut f. l. a. pilul. No. 30.
Obduc. Bals. toluano.
Dent. in vitro bene clauso.
S. 2 X napj. 2—6 szemet, emelkedőleg
Syphilis. Diabetes mellitus.
90 kr.

Jodolum s. Tetrajodpyrrol (C_4J_4NH). Világossárga, jögezes, szagtalan, íztelen por, vízben nehezen, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban igen jól oldódik. Küls. sebészek által porban, kenőcsökben haszn. mint a jodoform pótszere; előnye szagtalanúsága és kevésbé mérgező hatása; a sarjadzást ép úgy előmozdítja, mint a jodoform. Bels. syphilisnél, scrophulosisnál kalium jodatun, natr. jodatun helyett. Adag 0,05—0,1 pro dos. 0,2—0,5—1,0 pro die pilulában, capsulában. 1,0 = 20 kr. 10,0 = 1 frt 60 kr.

530 Rp. Jodoli 0,5.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos, aequ. No. 10.
Dent in caps. amylac.
S. Napj. 2—3-szor 1 capsulát.
74 kr.

531 Rp. Jodoli 2,0.
Ungu. emoll. 18,0.
M. f. ungu.
DS. 10%-os jodolkenőcs.
84 kr.

532 Rp. Jodoli 1,0.
Spiritus 16,0.
Glycerini 34,0.

MDS. Jodololdat ecsetelésre.

55 kr.

534 Rp. Jodoli 3,0.
Pulv. et succi Liquir. āā qu s.
ut. f. pilul. No. 30.

DS. 2—4 × napj. 1 szemet.

99 kr.

533 Rp. Jodoli 10,0.
Spirit. 160,0.
Glycerini 340,0.

MDS. Tamponok beitatására, melyek széteső mélyvégbélrákra, tályogtüregekbe helyezendők.

3 frt 13 kr.

535 Rp. Jodoli
Aetheris sulf. āā 5,0.
Collodii flexil. 50,0.

MDS. Jodol collodium.

1 frt 56 kr.

Jodopyrinum. ($C_{11}H_{11}J.N_2O$) Színtelen, fénylő, prismaticus jageczek; hideg vízben, borszeszben nehezen, meleg vízben, meleg borszeszben könnyen oldh. Szagtalan, íztelen. Gyomorban bomlik. Jódhatás. Adag: porban 0,5—1,5 bels. 1,0 = 25 kr.

†H. **Jodum** (J_2). A rhombos rendszerbe tartozó, többnyire lemezalakú, feketésszürke, fémfényű, nem tapadó kristályokból áll. Vízben alig, jodkaliumoldatban, borszeszben, aetherben barna színnel, chloroformban ibolyavörös színnel oldódik. Jodkaliumos oldatban mint *Lugol-féle oldat* használtatik külsőleg részint mint bőrvörösítő, részint mint causticum, részint bels. scrophulosis, syphilis ellen. Kenőcsökbe vagy egyedül, v. kalium jodatummal együtt mint izgató, izzadmányokat oszlató. Dos. maxim. sing. 0,05! pro die 0,2! 1,0 = 6 kr.

†H. **Tinctura Jodi.** (1:10) Küls. haszn. ecsetelések alakjában mint derivans v. tisztán, v. glyceriumel, v. tinct. gallarummal; azonkívül parenchymába befecskendésre strumánál (1 Pravaz-fecskéudővel). Bels. ritkán, leginkább csillapíthatlan hányásnál 2—4 csepp pro dos. 2—3 × napj. Dos. maxim. sing. 0,2! Dos. maxim. pro die 1,0! 10,0 = 13 kr. 100,0 = 1 frt 20 kr.

H. **Unguentum jodatum.** (Tinct. jodi 1 r. + ungu. simpl. 9 r.) Küls. mint izgató, oszlató.

536 Rp. Jodi 10,0.
Kalii jodati 20,0
Aqua dest. 150,0.
M. f. solutio.

DS. Külsőleg.

Bőrvörösítő Lugol-oldat.

1 frt 58 kr.

537 Rp. Jodí 5,0.
Kalii jodati
Aqua dest. āā 10,0.

MDS. Külsőleg edzésre.
Causticus Lugol-oldat.

88 kr.

538 *Rp.* Jodi 0,2.
 Kalii jodati 2,0.
 Aquae dest. 50,0.
MDS. Hydrocele esetén be-
 fecskendésre. Lugol-oldat.
 35 kr.

540 *Rp.* Tinct. Jodi
 Tinct. Gallarum aa 30,0.
MDS. Külsőleg.
 Bőr, foghús ecsetelésére.
 78 kr.

539 *Rp.* Jodi 0,1.
 Kalii jodati
 Aquae dest. aa 3,0.
 f. l. a. solut.
 adde
 Ungu. emoll. 30,0
 M. f. unguent.
DS. Kenőcs. 70 kr.

541 *Rp.* Tinct. Jodi 1,0.
 Syrupi Diacodii 50,0.
DS. 2—3-szor napj. 1 kk.
 Csillapíthatlan hányás
 ellen. 35 kr.

Jodum trichloratum. (*ICl₃*.) Frissen előállítva narancs-
 színű tüket képez, később átlátszó rhombicus táblákat. Szaga
 szúrós, kellemetlen, 5 r. vízben oldódik. Sárga üvegben tartandó.
 Concentráltan bomlatlanul eltartható, higan hosszabb idő múlva
 bomlik. Desinficiens, antisepticum. Sebkezelésben 1,0: 1000,0—
 1500,0 oldatban. Gonorrhoeánál húgycsőbe fecsk. 0,2: 2000,0. 1,0 =
 20 kr.

H. Juniperi baccæ. (*Juniperus communis. Coniferae.*) Ható-
 anyagai illatos olaj, kevés gyanta. Diureticum. Bels. infus. 10,0—
 20,0: 150,0 2 ór. 1 evőkan.; legtöbbször más húgyhajtókkal együtt.
 100,0 = 5 kr. v. 100,0 = 11 kr. (rud. tus.).

H. Roob Juniperi. Diureticum, 2—3 ór. 1 kk. v. gyk.
 10,0 = 9 kr.

542 *Rp.* Infus. bacc. Juniperi
 e 15,0.
 l. a. p. ad. colat. 150,0.
 Kalii acetici soluti 10,0.
 Tinct. Digitalis 5,0.
 Oxymel. Scillae 15,0.
MDS. 2 ór. 1 evőkan.
 Erős diureticum.
 47 kr.

543 *Rp.* Roob Juniperi 50,0.
 Kalii acet soluti 15,0.
 M. f. electuarium.
DS. 2 ór. 1 kk.
 Diureticum.
 79 kr.

H. Kalium aceticum solutum (*C₂H₃KO₂*). Semleges
 kémbatású, szintelen, átlátszó folyadék! 3 srészben 1 srész eczet-
 savas kalium. Diureticum, diaphoreticum. Bels. adag 1,0—2,0 pro
 dos. 2—3 ór., legtöbbször más diureticus szerekekkel együtt. L.
 digitalis, juniperus. 10,0 = 6 kr.

544 *Rp.* Kalii acetici sol 10,0.
 Syrupi Scillae 40,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 32 kr.

545 *Rp.* Kalii acet. sol. 10,0.
 Tinct. Digitalis 3,0.
 Oxymel Scillae 40,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 40 kr.

- 546 *Rp.* Kalii acet. sol. 1,0—2,0.
 Aquae dest. 80,0—100,0.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 2—5 éves gyermekeknek. Diureticum.
 23 kr.

H. Kalium bromatum. (*KBr*). Köbalakú, színtelen és szagtalan, csipős-sós ízű kristályok; 2 sr. vízben, 200 sr. borszeszben oldódik. Antispasmodicum, sedativum, anodynum, hypnoticum. Bels. adag 0,5—1,0 pro dos. 2,0—5,0 pro die. Epilepsiánál kétszer ily nagy napi adagok is javáltak. Adagolás porban (charta cerata), oldatban. 10,0 = 7 kr. 100,0 = 56 kr. v. pulvi 10,0 = 10 kr. 100,0 = 74 kr.

- 547 *Rp.* Kalii bromati 5,0.
 Natrii bromati aa 5,0.
 Ammonii. bromati 3,0.
 Aquae dest. 100,0
 Syrup. cort. Aurant. 50,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
 Epilepsia. 60 kr.
- 548 *Rp.* Kalii bromati 5,0.
 Div. in dos. aequ. No. 10.
 Det. in chart. cerat.
 8. Naponta 3—4 port ezuk-
 ros vízben feloldva.
 48 kr.

- 549 *Rp.* Kalii bromati 0,5—1,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Tinct. Moschi gtt. 10.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kl. v. gyk.
 1—2 éves gyermekek
 asthma laryngeum, ec-
 clampsia esetén.
 66 kr.
- 550 *Rp.* Kalii bromati 2,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Syrupi simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 5—10 éves gyermek. Epi-
 lepsia.
 35 kr.

H. Kalium carbonicum crudum. Fehér, száraz, szemcsés por; egyenlő mennyiségű vízben tökéletesen oldódik; 90% kalium carbonatot tartalmaz. Csak küls. használatik. Teli fürdőhez 100,0—200,0, kéz-, lábfürdőhez 30,0, a bőr mosogatására 2—5%-os vízoldatok. 10,0 = 13 kr.

H. Kalium carbonicum purum. (K_2CO_3). Fehér, a levegőn megnedvesedő por; egyenlő mennyiségű vízben tisztán oldódik, oldata lúgos. Légtutak hurutjánál és croupnál belégzések permete alakjában 1/2% os oldattal. Bels. köszvény, hörghurut, pyrosis eseteiben adag 0,2—0,5 pro dos. 3—4 × napj. híg oldatban. Saturatiók készítésére gyakran haszn. A Bland-féle pilulák alkotórésze (l. ferrum sulfur.) 10,0 = 7 kr.

H. Kalium carbonicum solutum. (Kalii carbon. pur. 110,0 + Aqua dest. 200,0.) Színtelen, átlátszó, lúgos folyadék. Kalii carb. pur. helyett haszn. 3 részben 1 r. K_2CO_3 . 10,0 = 4 kr.

H. Potio Riveri. (Kali carbonicum 6,0 acid. citricum 5,4 grm.-jával víznek 170 grm.-jában telítve.) Hányás ellen. 100,0-ig = 30 kr. 200,0 = 39 kr.

551 *Rp.* Kalii carbon. solut. 3,0.
Aquae dest. 200,0.
MDS. Permete alakjában
belégzésre.
26 kr.

553 *Rp.* Potionis Riveri 200,0.
DS. 2-szerre elfogyasztani.
56 kr.

552 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae e
10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Kalii carbon. soluti 6,0.
Syrupi Senegae 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Expectorans.
40 kr.

†**H. Kalium chloricum** ($KClO_3$). Lemez v. táblaalakú, az egyhajlású rendszerbe tartozó kristályokból áll. 16 sr. hideg és 3 sr. forró vízben oldódik. Száj- és torokvíznek (stomatitisek és anginák különböző alakjainál) 2—5%-os oldatok; permete alakjában belégzésre 1%-os oldat haszn. Bels. diphtheritis, cystitis, pyelitis, gastritis catarrh.-nál adag oldatban (soha porban!) 2,0—4,0 pro die. Dos. maxim. sing. 0,5! pro die 5,0! Gyermeknek l. táblázat. (Vigyázat!) 10,0 = 4 kr. v. 10,0 = 5 kr.

Felnőttek:

554 *Rp.* Kalii chlorici 6,0.
Aquae dest. 300,0.
Syrup. Moror. 30,0.
MDS. Száj-, torokvíz.
54 kr.

555 *Rp.* Kalii chlorici 4,0
Aquae dest. 130,0.
Syrupi cort Aurant. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
43 kr.

Gyermeknek:

655 *Rp.* Kalii chlorici 2,0.
Aqua dest. 100,0.
Syrup. Moror. 10,0.
MDS. Száj-, torokvíz.
Lehet összekötni timsóval
is, melyből 2,0 teendő ez
oldathoz.
39 kr.

557 *Rp.* Kalii chlorici 1,0—2,0.
Aqua d. 80,0—100,0.
Syrupi simpl.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
2—6 évesnek diphtheritis
faucium esetén, szintúgy
stomatitiseknél is.
36 kr.

†**H. Kalium hydroxydatum** (KOH). Rudakba öntött készítmény. Fehéres színű, erősen lúgos kémhatású, felényi vízben oldható. Causticum. Leginkább haszn. mint pasta caustica vienn. (l. calcium oxydatum). A bőr mosogatására 1—2%-os oldat Bels. nem. 10,0 = 9 kr.

H. Kalium hydrotartaricum s. Cremor Tartari s. Tartarus depuratus ($KC_4H_4O_6$). Fehér, kristályos, savanykás ízű por; 192 sr. hideg, 20 sr. forró vízben oldható. Gyenge antipyreticum, inkább hűsítő; diureticum; nagyobb adagban laxans. Bels. adag 0,5—2,0 pro dos. 3—4 $\times$ napj. Mint laxans. 4,0—6,0 pro dos. leginkább porban, electuariumban. 10,0 = 6 kr.

H. Electuarium lenitivum l. Senna.

558 *Rp.* Kalii hydrotartar. 10,0.
Sacchar. alb. 40,0.
M. f. pulv. det. in scat.
S. 3—4 $\times$ napj. egy késhegy-
nyit.
Hűsítő, enyhe diureticum.

32 kr.

559 *Rp.* Decoct. pulp. Tamarind.
e 10,0.
l. a. p. ad. colat. 100,0.
colat. ferv. adde
Kalii hydrotartar. 2,0.
Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.4—8 éves gyermeknek
icterus catarrh.-nál.

43 kr.

560 *Rp.* Pulv. rad. Rhei 1,0.
Kalii hydrotartar. 4,0.
Sacchar. alb. 10,0.
M. f. pulv. det. in scat.
S. 4-szer napj. 1 késhegy-
gyel.

Nagyobb gyermeknek icterus catarrh.-nál.

24 kr.

†**H. Kalium hypermanganicum** ($KMnO_4$). Hasábalakú, sötétbarna, fémfényű jögecskékből áll. Ize gyengén összehúzó. 15 sr. vízben kékesvörösen oldódik. Élenyítő, desodorans, gyengén összehúzó, töményen a nyákhártyákat, hámfosztott helyeket edző. Gyengén antisepticus hatású! Küls. desodoráló mosásokra (carcinoma uteri, ozoena, cystitis chron., foetor ex ore, stomatitis ulcerosa) 0,5—1,0%-os oldatok haszn.; belégzésekre (bronchitis putrida, bronchiectasia, gangraena pulmonum) 0,1—0,5%-os oldatok rendeltetnek. Bels. acut phosphor-(gyufa) és kéksav, cyankalium mérgezésnél mielőbb $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ %-os oldatok öntendők be a gyomorba gyomorcsővön át $\frac{1}{2}$ —1 liternyi mennyiségben. $\frac{1}{2}$ óra múlva ismét $\frac{1}{2}$ liter, 1 óra múlva ismét ennyi viendő a gyomorba. 1,0 = 1 kr.

561 *Rp.* Kalii hypermangan. 0,5—2,0.
Aqua dest. 200,0.
MDS. Suo nomine. Kül-
sőleg.
30 kr.

562 *Rp.* Kalii hypermangan. 0,1—0,2.
Aqua dest. 100,0.
MDS. Szájvíz.
Gyermekek stomatitis ul-
cerosa esetén. A feké-
lyek edzése pokolkővel
szükséges. 25 kr.

†H. **Kalium jodatum** (JK) Koczkalakú, fehér kristályok. Ize csípős, sós, később kesernyész; $\frac{1}{4}$ sr. vízben és 12 sr. borszeszben oldódik. Küls. kenőcsben mint oszlató 1 : 10. Bels. syphilis, scrophulosis, asthma nervosum, rheumatism. chron., a központi idegrendszer idült lobos bántalmái, idült fémmérgezések esetén, s idült lobos izzadmányok eloszlatására. Adag porban, pilulában, oldatban 0,1—0,5 pro dos., 1,5—3,0—4,0 pro die; oldatokhoz izjavítónak csak glycerin. 10,0 = 33 kr.

H. **Unguentum Kalii jodati** (JK 1,0 + Ungu. simpl. 8,0). Oszlató kenőcs. (Jódos kaliumjod-kenőcs l. Jodum.)

563 Rp. Kalii jodati 4,0.
Sapon. medic. 6,0.
Solve in
Spir. dilut. 50,0.
addo
Olei Citri 0,4.
MDS. Külsőleg bedörzsölésre. 50 kr.

564 Rp. Kalii jodati 6,0.
Aquae dest. 150,0.
Glycerini 10,0.
MDS. 3× napj. 1 evőlk.

55 kr.

566 Rp. Kalii jodati 10,0.
Pulv. et extr. Liquir. aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 60.
Consp. pulv. Lycopod.

DS. 3 × napj. 3 szemet.
Syphilis. Idült fémmérgezések.
76 kr.

565 Rp. Kalii jodati pulv. 5,0.
Div. in dos. aequal. No. 10.

DS. 0,5-os jodkali porok. Asthma nervosum esetén, roham jelentkezésekor 1 por vízben feloldva elfogyasztandó. Szükség esetén ismét egy por.
60 kr.

567 Rp. Kalii jodati 5,0.
Aquae dest. 250,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.

MDS. száj-, torokvíz.
Syphiliticus száj- és torokbántalmaknál.
56 kr.

568 Rp. Kalii jodati 0,5—1,0—2,0.
Aquae dest. 100,0.
Glycerini 5,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.
4—8 éves gyermeknek scrophulosis torpida, meningitis basilaris esetén.
34 kr.

H. Kalium natrio-tartaricum s. Sal Seignetti, s. tartarus natronatus ($KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$). Hasábalakú, színtelen, átlátszó kristályokból áll. Egy súlyrész 1,4 sr. vízben oldódik. Bels. kis adag (0,5—2,0) hűtő, enyhén diureticus hatású, nagy adag (15,0—30,0) laxans. Porban, oldatban, electu-
riumban 10,0 = 3 kr., vagy 10,0 = 4 kr. pulv.).

569 Rp. Kalii natrio-tart. 10,0.

Aquae laxativ vienn. 40,0.

Syrup. mannati 10,0.

MDS. Két adagban egy óra alatt elfogyasztani.

Laxans. 52 kr.

570 Rp. Kalii natrio-tartar. 10,0

Aquae dest. 100,0.

Syrupi mannati, 20,0.

MDS. ór. 1 gyk.

3—6 éves gyermek. szék-szorulás esetén.

45 kr.

H. Kalium nitricum (KNO_3). Hasábalakú, átlátszó kristályok. 4 sr. hideg és 0,4 sr. forró vízben oldható. Enyhe antipyrcticum, diureticum; némelyek szerint antiphlogisticus hatása is van; gyakran digitalissal együtt rendeltetik. Bels. adag 0,2—0,5—1,0 pro dos. 2—3 ór., leginkább oldatban. Ellenjavalt gyomorbélbajok, vesebajok esetén. 10,0 = 4 kr.

571 Rp. Kalii nitrici 5,0.

Aquae dest. 140,0.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

32 kr.

572 Rp. Infus. fol. Digitalise 0,5.

l. a. p. ad. colat. 150,0.

Kalii nitrici 5,0.

Syrup. Althaeae 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

43 kr.

573 Rp. Decoct. rad. Ononidis spin. e 15,0.

l. a. p. ad. colat. 150,0.

Kalii nitr. 5,0.

Roob Juniperi 15,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

Diureticum 54 kr.

†**H. Kalium stibiato-tartaricum s. Tartarus emeticus** [$(K_2Sb_2C_4H_4O_6)_2 \cdot H_2O$]. Fehér, kezdetben édeses, később undorító fémizű, kristályos por. 15 sr. hideg. 2 sr. forró vízben oldható; borszeszben nem. Küls. kenőcsalakban 1:1—10 derivans, lobokozó. Bels. kis adagban 0,005—0,01 pro dos. napj. 3—4-szer expectorans, diaphoreticum; nagyobb adagban 0,03—0,05—0,15! pro dos. emeticum, porban, oldatban. Dos. maxim. pro die 1,0! Gyomor és bél lobos bántalmak, terhesség ellenjavallatok. Gyermekeknek nagy vigyázat! 1,0 = 2 kr.

H. Unguentum Autenriethi, (1 r. kalium stib. tartar. + 4 r. axung. porci.) Lobokozó, derivans. Borsónyi-, babnyi mennyiség dörzsölendő a bőrre.

†**H. Vinum stibiato-tartaricum s. Vinum Huxhami**. (0,25 : 60,0 borra.) Expectorans 5—10 csepp pro dos.

Mint emeticum nem. Dos. maxim. sing. 0,5! pro die 1,5! (1,0 = 20 csepp.) 10,0 = 8 kr.

574 *Rp.* Kalii stibiat. tartar. 0,05.
 Ammon. chlorat. 3,0.
 Aquae dest. 150,0.
 Syrup. Ipecac. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
 Expectorans.
 38 kr.

575 *Rp.* Kalii stibiat. tartar. 0,1.
 Aquae dest. 50,0.
 M. f. solutio.
DS. Felét egyszerre elfogyasztani; ha 10 p. múlva hányás nem jelentkezik, másik felét is. Emeticum felnőttek. 23 kr.

576 *Rp.* Kalii stibiat. tart. 0,1.
 Pulv. rad. Ipecac. 1,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 2.
DS. Egyszerre 1 port; ha 10 p. múlva hányás nem áll be, a második port is bevenni.
 Felnőttek emeticum.
 20 kr.

577 *Rp.* Kalii stibiat. tartar. 0,01.
 Aquae dest.
 Oxymel Scillae aa 20,0.
 Pulv. rad. Ipecac. 0,4.
MDS. Felrázva $\frac{1}{4}$ ór. 1 kk. a hányás beálltaig. Emeticum 1—3 éves gyermek számára. 29 kr.

†H. **Kalium sulfuratum pro balneo s. Hepar Sulfuris.** Barnás-sárga, májszínű, később zöldes-sárga színűvé váló, záptojás szagú, a levegőn megnedvesedő tömeg. 2 sr. vízben oldódik, csekély maradék hátrahagyásával. Csak fürdőkhöz haszn. rheumatismus, köszvény, idült fémmérgezések esetén. Fakád! Teli fürdőre 50,0—100,0. Ha H_2S -gázt akarunk a fürdőben fejleszteni, 15,0—30,0 acid. sulf. crud.-ot öntünk a fürdőhöz. 10,0 = 2 kr.
 H. **Kalium sulfuricum** (K_2SO_4). Tömör, hasábos kristályokból, vagy kristályos kérgեkből áll. 10 sr. hideg, 4 sr. forró vízben oldható; borszeszben nem. Bels. idült gyomor-, bélhurutnál 0,5—1,0 pro dos. 2—3 $\times$ napj. Nagyobb adagokban laxans, de mint ilyen ritkán használtatik, ha igen, jalapával, rheummal együtt. 10,0 = 2 kr., v. 10,0 = 4 kr. (pulv. subt.) (grosse pulveratum) 100,0 = 26 kr.

578 *Rp.* Kali sulfurici 5,0.
 Pulv. rad. Rhei 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 3 $\times$ napj. 1 port.
 43 kr.

H. **Kalium tartaricum** ($K_2C_4H_4O_6$). Tiszta, fehér, kristályos por; egyenlő sr. hideg, felényi meleg vízben oldható. Bels. diureticum, hűsítő 1,0—2,0 pro dos. Laxans. 5,0—10,0 pro dos. 10,0 = 9 kr.

579 Rp. Kalii tartar.	1,0.
Aquae dest.	130,0.
Syrup. Scillae	20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.	
Enyhe diureticum.	
35 kr.	

H. Kamala. (*Rottlera tinctoria*. Euphorbiaceae.) Gyantás, téglaszínű, íztelen, szagtalan por. Hatóanyaga rottlerin (gyanta). Helyette használandó kizárólag a

H. Kamala depuratum. Anthelminthicum taeniák elbajtására. A taeniát is megöli. Hashajtólag is hat. 8,0—12,0 porban, electuariumban 1 óra alatt elfogyasztandó éhgyomorral. Előkészítő étrend szükséges; kellemetlen mellékhatása az émelygés. 1,0 = 3 kr.

580 Rp. Kamala depur.	12,0.
Div. in dos. aequ. N. 4.	
DS. $\frac{1}{4}$ ór. 1 port.	
Felnőttnek.	
55 kr.	

581 Rp. Kamala depur.	10,0.
Mel. rosati	40,0.
M. exact. f. elect.	
DS. 1 óra alatt elfogyasztani.	
Felnőttnek.	
63 kr.	

582 Rp. Kamala depur.	6,0.
Extr. Filicis Maris	
aether.	4,0.
Syrup. cort. Aurant.	
Pulv. gummos. aa qu. s.	
ut f. l. a. electuarium.	
DS. Reggel éhgyomorral be-	
venni 1 óra alatt. 4—8	
éves gyermeknek.	
99 kr.	

583 Rp. Kamala depur.	2,0—
	4,0.
Aquae Menthae	
pip.	80,0.
Syrup. simpl.	15,0.
MDS. Felrázva 3-szorra be-	
venni $\frac{1}{2}$ órai időközökben.	
2—4 éves gyermeknek.	
39 kr.	

Kava-Kava l. *Piper methysticum*.

Kephir. Erjedésben levő tehéntej. Az erjesztés az ú. n. kephirmagvak (gomba) által történik. Sűrű, fehér, savanykás, csipős folyadék. Alkatrészei, használata, mint a kumysnak (l. e. cz. a.). Pótolja a kumyszt, s míg az utóbbi nálunk nem kapható, a kephir kapható, sőt házilag is készíthető, ha kephirgomba vagy ha egy üveg kephir rendelkezésünkre áll. Tartalmaz alkoholt 0,7—1,3%, tej savat 0,8—0,9%, hemialbumoset 0,2—0,4%, peptont, acidalbumint, szénsavat; ezenkívül még tejcukrot, caseint, zsírt, sókat. A kumysban több az alkohol és zsír, a kephirben több a fehérjeféle, s így táplálóbb. Egy pohárral kell kezdeni, később fel lehet menni 4—6 pohárig pro die.

Kino s. Gummi Kino. (*Pterocarpus Marsupium*. Papilionaceae.) Beszárított növényi nedv. Feketés-barna, törékeny, granulált, darabok; porítva pirosas. Íze összehúzó. Vízben csekély

maradékkal oldódik. Hatóanyaga kinocersav. Adstringens. Főleg a gyermekgyakorlatban haszn. mint antidiarrhoeicum. Bels. adag 0,3—0,5 pro dos. 3—4-szer napj. porban; gyermeknek 0,05—0,1 pro dos. porban. Legtöbbször opium-készítményekkel összekötve. 1,0 = 1 kr.

†**H. Kreosotum.** Guajakol és kreosolnak keveréke. Olajszerű, sárgás, átlátszó folyadék; erős füstszagú; égető ízű. Borszeszzsel, aetherrel átlátszó oldatokká elegyedik. Körülbelül 120 r. forró vízzel oldódik, kihűléskor az oldat zavarossá lesz. Küls. mint desiniciens használtatik, hasonlóan a carbolhoz, de igen ritkán. Fogászatban gyapotra felvéve, s a cariosus fogürbe helyezve fertőztelemt, fájdalmat csillapít. Fagydagاناتokra kenőcs vagy collodium alakjában (1:10). Bels. gyomorban levő erjedési folyamatoknál, hányásnál, diarrhoeáknál, phthisisnél adag 0,01—0,05! pro dos. pilulában. caps. gelatin.-ban, nyákos oldatban. Dos. maxim. pro die 0,2! 1,0 = 2 kr. 10,0 = 12 kr.

584 Rp. Kreosoti	1,0.	585 Rp. Kreosoti	1,0.
Ungu simpl.	10,0.	Collodii flexil.	10,0.
M. f. unguent.		MDS. Kreosot-collodium.	
DS. Kreosot-kenőcs.		22 kr.	
28 kr.			

586 Rp. Kreosoti	1,0.	587 Rp. Kreosoti	gtt. 2—3.
Pulv. et. extr. Liquir.		Aquae dest.	90,0.
aa qu. s.		Tinct. Opii simpl.	gtt. 2—3.
ut. f. pilul. No. 50.		Syr. cort. Aurant.	10,0.
Obduc. Foliis Argenti.		MDS. 2 ór. 1 kk.-gyk.	
DS. reggel, este 2 szemet.		2—4 éves gyermeknek	
Egy szemben 0,02 kreosot.		cholera infantum esetén.	
1 frt 10 kr.		26 kr.	

588 Rp. Kreosoti	1,0—2,0.	589 Rp. Kreosoti	2,5.
Olei Jecoris Aselli		Ol. Jecoris Aselli	200,0.
150,0.		Saccharini	0,1.
MDS. Étkezés előtt 1 kk.		MDS. Étkezés előtt 1—2×	
napj. 2-szer.		Phthisis pulm.	
Phthisis pulm.		80 kr.	
60 kr.			

Kumys. Erjedésben levő kanczatej. Fehér, tejszerű folyadék, pezseg, íze savanykás, csipős, hűtő. Tartalmaz tejsavat, szabad szénsavat, borostyánkősavat, borszeszt, kevés glycerint. Könnyen emészthető. Mint tápanyag használtatik phthisis pulm. esetén, de más idült betegségek következtében elgyöngült egyéneknek is. Adag napjában $\frac{1}{2}$ —2 liter, emelkedőleg.

H. Kusso flores. (Brayera anthelmintica. Rosaceae.) Hatóanyaga kussein (gyanta). Anthelminticum taeniák ellen. Adag porban, electuariumban, rázandó keverékben 15,0—20,0, mely 1 óra alatt 2-szerre, éhgyomorra fogyasztandó el. Előkészítő étrend

szükséges. Bevétel után $\frac{1}{2}$ órával ol. ricini nem fölösleges. Émelygés ellen citromvíz, *rotula menthae*. 10,0 = 7 kr. (pulv.). 10,0 = 11 kr.

†H. **Kusseinum crystallisatum.** Kénsárga, szagtalan, íztelen, rhombos, tűalakú jegecskék; hideg vagy meleg vízben alig, aetherben jól, borszeszben csekély mérvben oldódik. Haszn., mint a *flores kusso*. Adag: 1,0—2,0 porban éhgyomorra 1 óra alatt elfogyasztandó. Előkészítő étrend. Bevétel után $\frac{1}{2}$ órával ol. ricini. 0,01 = 3 kr.

590 *Rp.* Flor. Kusso pulv. 20,0.
Melis rosati 40,0.
M. f. electuarium.
DS. 1 óra alatt éhgyomorra
elfogyasztandó. Felnőtt-
nek 59 kr.

591 *Rp.* Flor. Kusso pulv. 20,0.
Vini rubri 200,0.
MDS. 1 ó. alatt éhgyomorra
elfogyasztandó. Használat
előtt felrázandó.
1 frt 1 kr.

592 *Rp.* Flor. Kusso 6,0.
Mel. depur. 40,0.
M. f. electuar.
DS. Reggel éhgyomorra 1
óra alatt elfogyasztandó
4—8 éves gyermeknek.
40 kr.

593 *Rp.* Kusseini crystall. 2,0.
Div. in dos. aequ. No. 4.
Det. in caps. amyloc.
S. $\frac{1}{2}$ ór. 1 capsulát reggel
éhgyomorra.
Felnőttnek.
6 frt 34 kr.

Lactopheninum. A phenacetinhez analog képzett vegyület. Az acetylesoportot benne tejsav helyettesíti. Fehér, vízben nehezen oldh. por. Haszn. hatása mint a phenacetiné. Adag. bels. porban 0,5—1,0 napj. többször. 1,0 = 15 kr.

†H. **Lactucarium germanicum.** (*Lactuca virosa*, Compositae.) Beszáradt tejnedv. Hatóanyaga lactucin (keserű anyag). Opium pótszere. Sedativum anodynum; főleg a köhögési inger csillapítására használatik. Hatása bizonytalan. Bels. adag 0,1—0,3! pro dos. porban, pilulában, esetleg emulsióban. Dos. maxim. pro die 1,0! 1,0 = 10 kr.

594 *Rp.* Lactucarii germ. 1,0.
iii bicarbon.
Sacchar. alb. aa 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
51 kr.

595 *Rp.* Lactucarii germ. 1,0.
Mucil. Gummi arab.
10,0.
f. l. a. emulsio cum
Aqua dest. 130,0.
admisce
Aqua Amygdalar.
amar. 5,0.
Syrup. emuls. 10,0.
DS. 2—3 ór. 1 evők.
46 kr.

Laminaria. (*Laminaria Cloustoni*, Algae). A nyélczének 1—2 deciméternyi hosszú s körülbelül $\frac{1}{2}$ —1 cmnyi átmérőjű darabjai.

Vízben duzzad. Nőgyógyászatban a spongia pressa helyett a canalis cervicalis uteri tágitására haszn.

H. Lamina Guttapercha l. Guttapercha.

H. Lana Gossypii depurata et a pinguedine liberata Brunsi. Bruns-watta. Sebészetben kötszerill használtatik. 10,0 = 9 kr., 25,0 = 14 kr., 50,0 = 22 kr., 100,0 = 40 kr.

H. Lana Gossypii carbolata, Hydrargyro bichlor, eorr. impraegnata, salicylata, l. Acid. carbol, Hydrarg. bichlor. corr., Acid. salicyl. cz. a.

H. Lanolinum. Gyapjából nyert és tisztított zsiradék. Cholesterolinsír, körülbelül 20% vízzel. Fehéres, kenőcsszerű anyag, közömbös vegyhatású, nem avasodik. 80% vizet képes még felvenni, ha azzal összegyúratik. Egyetlen zsiradék, mely nyákhártyákra tapad. Használtatik, mint kenőcs-alapanyag; kitűnő kenőcsöt ad, ha 10 részre 1—2 rész axungia porci vétetik. 10,0 = 7 kr., 100,0 = 62 kr.

596 Rp. Lanolini pur.

Olei Amygdal. dulc.

Sulfur. praecip. aa 5,0.

Zinci oxyd. 2,5.

Olei Bergam. 0,5.

M. f. l. a. ungu.

DS. Lanolinos crême cosmétique. Cosmétiqueum.

43 kr.

598 Rp. Lanolini pur.

Boracis venet. 1,0.

F. l. a. emuls. cum.

Aqua Rosar. 100,0.

DS. Lanolin pipere tej.

Cosmétiqueum. (FISCHER.)

58 kr.

600 Rp. Kalii jodat.

Jodi pur. 0,1.

Aquae dest. 3,0.

Axung. Porci 5,0.

Lanolini pur. 25,0.

M. f. ungu.

DS. Jodkali kenőcs.

60 kr.

602 Rp. Cocaini hydrochlor.

0,1—0,2.

Lanolini pur. 30,0.

Olei Sesami 20,0.

M. f. ungu.

DS. Cocainos-kenőcs.

62 kr.

597 Rp. Lanolini pur.

Olei Amygdal. dulc. 5,0.

Olei Rosar. gtt. 1.

M. f. l. ungu.

DS. Lanolin toilette-crême.

Cosmétiqueum. (FISCHER.)

72 kr.

599 Rp. Lanolini pur.

Aquae dest. 30,0.

Glycerini 10,0.

Olei Rosar gtt. 1.

M. f. ungu.

DS. Lanolin-arczkenőcs.

Cosmétiqueum. (DIETERICH.)

85 kr.

601 Rp. Empl. diachyl. simpl.

recent. part. 100,0.

Empl. adhuc. liquido

admisce

Olei Sesami

Lanolini pur. aa 50,0.

Olei Lavand. 5,0.

DS. Lanolinos diachylon-

kenőcs.

1 frt 46 kr.

603 Rp. Zinci oxyd.

Lanolini anhydr. 27,0.

M. f. ungu.

DS. Zink-kenőcs.

47 kr.

604 *Rp.* Jodoformii 3,0.
 Lanolini anhydr. 27,0.
 M. f. ungu.
DS. Jodoform-kenőcs.
 63 kr.

606 *Rp.* Acid. borici sub. pulv.
 Cerae alb. aa 20,0.
 Lanolini anhydrici 30,0.
 Olei Amygdalar. dulc. 50,0.
 M. f. ungu.
DS. Bőrkenőcs.
 1 frt 17 kr.

605 *Rp.* Extr. Belladonnae
 Aquae dest. aa 1,0.
 Lanolini pur. 10,0.
 M. f. ungu.
DS. Belladonna-kenőcs.
 47 kr.

607 *Rp.* Chrysarobini 1,0—2,0.
 Lanolini pur. 20,0.
 Axung. Porci 2,0.
 M. f. ungu.
DS. Chrysarobin-kenőcs.
 49 kr.

H. Lichen islandicus. (*Cetraria islandica*. *Parmeliaceae*.)
 Hatóanyagai cetrarsav (keserű anyag) és keményítő. *Amarum*,
stomachicum. Adag: decoct. 10,0—15,0 : 250,0 étkezés előtt 2—3
 evőkanálnyit egyszerre. 100,0 = 10 kr.

Cetrarinum s. acid. cetraricum. Kitűnő *amarum*, főleg
 chlorosisnál, reconvalescentiánál. Székletétet is rendezi. Adag pilu-
 lában, porban bels. 0,1 délből és este 1 órával az étkezés előtt
 (Terray Páti). 0,01 = 2 kr.

608 *Rp.* Decoct. Lichen. island. 2,0—4,0.
 l. a. p. ad. colat. 100,0.
 Natrii bicarb. 5,0.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 3—4.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 3—6 éves idült hörghurutban szen-
 vedő sorvadé gyermekeknek.
 45 kr.

H. Linctus gummosus l. *Gummi arabicum*.

H. Linimentum ammoniatum l. *Ammonium-készít-
 mények*.

H. Linimentum Styracis l. *Styrax liquidus*.

H. Lini semina. (*Linum usitatissimum*. *Lineae*.) Hatóanyagai
 zsíros olaj, növényi nyák. Bevonó. Infusum, decoctum alakjában
 (1 : 10). 100,0 = 6 kr., v. 100,0 = 24 kr. (pulv.), 1000,0 = 1 frt
 80 kr.

Farina seminum Lini s. Placenta sem. Lini.

Lenmagliszt. A zsíros olaj kipréselése utáni maradék. Meleg
 vízzel péppé alakítva cataplaszának használtatik. 100,0 = 7 kr.
 1000,0 = 50 kr.

H. Oleum Lini venale. 100,0 = 12 kr., 1000,0 = 1 frt.
 Tisztítva (mosás) haszn.

H. Oleum Lini lotum. Átlátszó, nyáktól mentes zsíros olaj. Küls. fedő, puhító szer. Égési sebekre aqua calcissal aa. Kiürítő csőrének 2—3 evőkanállal. Bels. 1—3 evőkanállal laxans. 100,0 = 23 kr. 1000,0 = 2 frt.

Liparin. MERING szerint az ol. jecoris aselli kitűnő pótszere. Nem más, mint igen finom ol. olivarium, melyhez 6%-nyi olajsav kevertetett. Betegnek szívesebben fogyasztják, mint a halmájolajat; igen könnyen emésztetik, talán mert könnyen képez fejetet. Adaga mint az ol. jecoris-nek.

H. Liquiritiae radix. Két fajta hív. a) Glycyrrhiza glabra (Papilionaceae) hámozatlan gyökere, 100,0 = 11 kr. b) Gl. glandulifera hámozott gyökere. Rendeléskor különbséget nem teszünk. Porítva pilula-constituens, pilulahintőpor, porvivőanyag, izjavító. decorticata. 100,0 = 24 kr. v. 10,0 = 6 kr. (subt. pulv.). Készítményei:

H. Succus Liquiritiae venalis. Fekete, hengerded rudacskák. 10,0 = 7 kr. (pulv.).

H. Succus Liquiritiae depuratus Híg kivonatanyag. Izjavító a syrupok helyett; pilulaconstituens. 10,0 = 9 kr.

H. Syrupus Liquiritiae. Izjavító. 10,0 = 3 kr.

H. Pulvis gummosus l. Gummi arabicum.

†**H. Liquor acidus Halleri** l. Acid sulfur.

H. Liquor Ammoniae l. Ammonii caustici liquor.

H. Liquor Ferri oxydati l. Ferri praeparata.

H. Lithium carbonicum (Li_2CO_3). Fehér, kristályos por; 150 sr. vízben oldható, oldata hűgös kémhatású. Bels. köszvény, húgyhomok, húgykövek eseteiben, valamint diureticus célból is haszn. Adag 0,05—0,25 pro dos. 3—4 X napj. porban. Urátokból álló húgykövek oldása céljából ajánlották, hogy 1,0—2,0 : 200,0—300,0 vízben oldva langyosan a hólyagba fecskendeztessék. (Műtétet természetesen nem pótolhatja.) 1,0 = 4 kr.

609 Rp. Lithii carbon. 1,0.

Sacchar. alb. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

D.S. 2—3 ór. 1 port.

43 kr.

Lithium citricum ($Li_2C_6H_5O_7$).

1,0 = 8 kr.

Lithium jodatum (LiJ). 1,0 =

10 kr.

Bels. mint a lith. carbon. Köszvény, idült ízületi rheumatismus, húgyhomok eseteiben.

Lithium salicylicum. ($LiC_7H_5O_2$)₂ + H_2O = 360. Fehér, szagtalan, selyemszerű tömegékké egyesült tük. Ize csipős, édeses utóízzel. Vízben, borszeszben könnyen oldódik. Haszn. natr. salicylicum helyett, de kisebb adagokban, köszvényes ízületlobok, polyarthriti rheumatica és progressiv félheveny ízületi rheumatismus, sőt idült rheumat. eseteiben is (VULPIAN). Adag: 0,5 pro

dos., 3,0—4,0 pro die. Szívbetegségnél, szívgyengeségnél nagy vigyázat (!) 1,0 = 6 kr.

610 *Rp.* Lithii salicyl. 5,0.
Div. indos. aequ. No. 10.
Det in caps. amylac.
S. Svo nomine. Rendelet
szerint.
90 kr.

611 *Rp.* Lithii salicyl. 6,0.
Aquaе Menthaе pip. 100,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.
MDS. Felét egy napra.
Egy evőkan.-ban $\frac{1}{2}$ grm.
lith. salicyl
80 kr.

†**H. Lobeliae herba.** (*Lobelia inflata*. Lobeliaceae.) Hatóanyaga lobelin (alcaloid). Antiasthmaticum. Adag; infus. 1,0—3,0; 150,0 2 ór. 1 evőkan. Dos. maxim. sing. 0,5! Dos. maxim. pro die 4,0! 10,0 = 3 kr. Ritkán használtatik, még leginkább készítménye a

†**H. Tinctura Lobeliae.** Adag 5—15 csepp pro dos.
2—3 $\times$ napj. Vigyázat (!) 10,0 = 7 kr.

612 *Rp.* Tinct. Lobeliae.
Tinct. Ipecac. aa 5,0.
Aquaе Amygdal. amar. 10,0.
MDS. 15—20 cseppet 2—3 $\times$ napj.
36 kr.

Loretinum. (*C₆H₅J. N. OH. SO₂H*). Halavány-sárga, szagtalan, nehezen oldh. por. Jodoform pótszere. Sebészeten hintőpor. Nem tekinthető veszélytelenebbnek, mint a jodoform. Kenőcselőz, collodiumhoz 5—10%-nyi veendő. 1,0 = 10 kr.

Losophanum. (*C₆H₅J₃. CH₃. OH*). Fehér, jegeces, vízben nehezen oldható, alkoholban nehezen, aetherben, chloroformban, zsíros olajokban jól oldh. por. Herpes, tonsurans, pityriasis, pediculosis, scabies, prurigo, idült eczéma, sycosis, acne vulg. et rosacea eseteiben (acut bőrbajoknál kerülendő). 1—2%-os vizes oldatok vagy kenőcsök. 0,10 = 4 kr.

H. Lupuli glandulae. (*Humulus Lupulus mirigyei*. Cannabinaeae.) nevezik lupulinnak is. Hatóanyagai keserű anyag, illatos olaj, némelyek szerint egy bódító alcaloid is. Kis adagban (0,1—0,2) amarum, nagyobb adagban (0,5—1,0 pro dos.) porban, pilulában, electuariumban, sedativum antaphrodisiacum; különösen az utóbbi értelemben haszn., de gyakran eredmény nélkül. 1,0 = 2 kr.

613 *Rp.* Gland. Lupuli 5,0.
Div. in dos. aequ. Nr. 10.
Dent. in caps. amylac.
S. Este 1—2 capsulát bevenni.
Antaphrodisiacum. 70 kr.

Lycetolum. Borkősavas dimethylpiperazin. Vízben könnyen old. fehér por. Hatás, haszn. mint a piperazin. Adag pro die 1,0—2,0 vízben. 0,10 = 6 kr.

H. Lycopodium. (*Lycopodium clavatum* csirszemcséi. *Lycopodiaceae*.) Hintőpor intertrigo, nedvező kiltegek, herpes Zoster eseteiben. Pilulahintőpor. 10,0 = 7 kr., 100,0 = 60 kr.

Lysidinum. Aethylenaetenyldiamin. Fehér, vízszívó, vízben könnyen oldh. por. Hatás, haszn. mint a piperazin. Gyógyszertárakban 50%-os vízoldatban tartatják, ebből adag 2—10 gm. pro die $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ liter szodavízben. 0,1 = 4 kr.

Lysolum. Magasabb phenolok alkali vegyületeinek keveréke gyanta- és zsírszappanokkal. Barna, olajos, tiszta, kreosotszagú folyadék; víz, borszesz, glycerin oldja. Antisepticum, desiniciens. Olyforma szerepe van, mint a creolinnak. Éjjeli edények, köpőcsészék, fal, padló, butordarabok fertőtlenítésére 5%-os, kezek mosására 1—3%-os, sebek mosására 0,3%-os oldatok haszn. 10,0 = 3 kr.

H. Magnesium carbonicum hydrooxydatum s.

Magnesia carbonica. [$(MgCO_3)_2$, $Mg(OH)_2$, $3H_2O$]. Elporló, hófehér, laza tömeg, v. igen könnyű por, vízben jóformán oldhatlan. Küls. fogporhoz v. mint pilulahintőpor. Bels. antacidum, nagy adagban enyhe laxans. Saturatóiókhoz gyakran haszn. mint szénsavat adó alkatrész. Adag bels. késhegyenként, kávéskanalanként. 10,0 = 4 kr.

614 Rp. Magnes. carbon. hydrooxyd. 20,0.

Rad. Rhei chin. pulv. 5,0.

Sacchar. alb. 10,0.

M. f. pulv. det in scat.

S. Késhegyenként v. kk.-ként.

Felnőttnek, nagyobb gyermeknek. Laxans.

38 kr.

615 Rp. Magnes. carbon. hydrooxyd. 2,0.

Rad. Rhei chin. pulv. 1,0.

Elaeosacch. Foenic. 10,0.

M. f. pulv. det. in scat.

S. 2—3 késhegynyi pont.

Csecsemőknek megrögzött székrekedés esetén.

31 kr.

616 Rp. Magnes. carbon. hydrooxyd.

Acid. citrici

Elaeosacch. Citri aa 5,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

DS. Szükség szerint 1 port $\frac{1}{4}$ pohár cukros vízben feloldani, pezsgés közben egyszerre elfogyasztani.

Potio Riveri helyett. 54 kr.

I. Magnesium hydrooxydatum s. Magnesia usta in aqua [$Mg(OH)_2$]. Tejszerű folyadék. M. Gyk. I. kiadásában

mint antidotum arsenici szerepelt. Antacidum. Savmérgezéséknél, főleg arsenessav-mérgezésnél mint antidotum chemicum. Adag evőkanalanként. Savmérgezéséknél 5—10 perczeként 1 evőkan. 10,0 = 2 kr.

617 *Rp.* Magnes hydrooxyd.
lagenam unam (120,0).
S. Rendelet szerint.
Statim !! Arsen-mérgezés.
37 kr.

H. Magnesium oxydatum s. Magnesia usta (MgO).
Hőfehér, könnyű, igen finom por, vízben nem oldható. Haszn. mint a magn. hydrooxyd. s a magn. carb. hydrooxyd. Adagolás mint az utóbbinál. 10,0 = 11 kr.

Magnesium salicylicum [$(C_7H_6O_2)_2Mg + 4H_2O$]. Színtelen, légálló jegeczek, melyek 10 r. vízben oldódnak. Izo édeses-keserű. Antipyreticum: úgy hat mint a natr. salicyl. és bismuth. subsalicyl. Huchard főleg typhus abd. eseteiben ajánlja. Jó polyarthritis rheumaticánál is. Nagy adagban (6—8 gm.) hashajtó hatás is észlelhető. Adag bels. porban oldatban 0,5 gm. pro dos. 3,0—6,0 gm. pro die. 1,0 = 5 kr.

618 <i>Rp.</i> Magnes. salicyl.	10,0.	619 <i>Rp.</i> Magnes. salicyl. pulv.	5,0.
Aquae dest.	180,0.		
Syrup. cort. Aurant.	20,0.	Div. in dos. aqu No. 10.	
		<i>DS.</i> 2 ór. 1 port.	
<i>MDS.</i> 4 × napj. 1 evők.		Typhus. abdom. Polyarth-	
Typhus abdom. Polyarth-		ritis.	
ritis.			62 kr.
93 kr.			

H. Magnesium sulfuricum ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$). Keserűső. Színtelen, vagy fehér, a levegőn kissé elmálló hasábos jegeczekből áll. Izo keserű, sós. 0,8 sr. hideg 0,15 sr. forró vízben oldható. Laxans. Adag 15,0—30,0 pro dos. porban vagy vízben (sodavízben) oldva. 100,0 = 10 kr. pulverat: 10,0 = 3 kr.

Malakinum. Salicylsavas p. phenetidín. Sárgás jegeczetűk, vízben nem, meleg borszeszben könnyen oldh. Antirheumaticum, antipyreticum. Adag porban 0,5—1,0 pro dos. 3,0—6,0 pro die. 0,10 = 2 kr.

H. Malvae folia.
H. Malvae flores.

(*Malva silvestris*. Malvaceae.) Ható-
anyaga növényi nyák. Decoct. 10,0—
15,0 : 150,0 nyákos folyadék, száj-, to-
rokviznek, vagy csipős, keserű anya-
gok számára vívőfolyadéknak. Folia
10,0 = 1 kr., 100,0 = 8 kr. Flores 10,0
= 3 kr., 100,0 = 20 kr.

620 Rp. Decoct. folior. Malvae e	20,0.
l. a. p. ad. colat.	300,0.
Kalii chlorici	6,0.
Tinct. Opii simpl.	2,0.
MDS. Száj-, torokviz.	
49 kr.	

H. Maganum hyperoxydatum (MnO_2). Barnakő. Hamvasfekete, kristályos törésű darabok. Chorfelesztésre használtatik 10,0 = 2 kr.

H. Manna. (Fraxinus Ornus kiizzadó nedve.) Hatóanyaga mannitum. Enyhe laxans. Adag: felnőttnek substantiában 30,0—60,0, gyermeknek 5,0—10,0, 10,0 = 3 kr.

H. Mannitum ($C_6H_{12}O_6$). Hasáb- vagy tőfalakú, tiszta fehér és fénylő kristályokból áll. 6,5 sr. hideg vízben és 80 sr. híg borszeszben oldható. Izjavító cukor helyett. Laxans terhes nők, gyermekek számára; adag porban, oldatban felnőttnek 20,0—40,0, gyermeknek 3,0—5,0. 10,0 = 16 kr.

H. Syrupus mannatus l. Senna.

621 Rp. Manniti	5,0.
Aquae dest. ferv.	50,0.
MDS. 2 ór. 2 gyk.	
Csecsemőknek székszorulás eset én.	
39 kr.	

H. Mastiche. Pistacea Lentiscus (Anacardiaceae) gyantás, beszáradt nedve. Aetherben oldva ideiglenes fogtörésre használtatik. 10,0 = 8 kr., vagy 10,0 = 12 kr. (pulv.).

622 Rp Mastiche pulv.	10,0.
Aetheris	20,0.
D.S. Gyapotdarabkára felitatra a kitisztított cariosus fogübe helyezendő.	
35 kr.	

Matico folia. (Piper angustifolia. Piperaceae.) Hatóanyagai illó olaj, csersav, gyanta. Adstringens, elválasztást csökkenti. (Közel áll a piper cubeba hatásához.) Küls. infus. (5,0—10,0: 100,0—150,0), alakjában gonorrhoea ellen húgycsőbe fecskendeztetik. Bols. gonorrhoea, cystitis, diarrhoea. vérzések ellen 0,5—2,0 pro dos. 3 × 5 napj. porban, pilulában, vagy infus. 10,0: 150,0: 2 ór. 1 evők. 10,0 = 6 kr.

H. Mel crudum. Syrupok helyett izjavító. Electuariumok alapanyaga. 100,0 = 12 kr.

H. Mel depuratum. Az előbbinél higabb. Haszn. mint a mel. crud. 100,0 = 22 kr.

H. Mel rosatum. Íz- és szagjavító. 10,0 = 3 kr.

H. Melissa folia. (Melissae officinalis. Labiatae.) Hatóanyagai: illatos olaj, kevés csersav, gyanta. Haszn. infus alak-

jában (1 : 10) mint diaphoreticum carminativum, stimulans. Illatos theakeverékek alkatrésze. 10,0 = 3 kr. 100,0 = 20 kr.

H. Menthae folia. (Mentha piperita. Labiatae.) Hatóanyaga illó olaj. Infusum (1 : 10) alakjában diaphoreticum, carminativum, stimulans. Illatos theakeverékek alkatrésze. 10,0 = 4 kr. 100,0 = 30 kr.

H. Aqua Menthae piperitae. 1. Aquae aromaticae.

623 Rp. Fol. Menthae pip.

Fol. Melissae

Rad. Valerianae āā 25,0.

Fruct. Anisi.

Fruct. Coriandri. āā 10,0.

Conc. cont. M. f. species

DS. 1 csésze theára 1—2 evőlk.

Diaphoreticus, antispasmodicus

thealegy. 40 kr.

H. Mentholum [$C_{10}H_{18}(OH)$]. Az előtt Po-ho néven árulták. Az ol. menthae pip. stearoptenje. Színtelen jegeczek, vízben nehezen, borszeszben, aetherben, glicerinben, zsíros olajokban könnyen oldódnak. Szaga, mint a menthaolajé. Helybelileg érzéstelenít; bels. véve a gerinczvelő reflextevékenységét csökkenti, s érzéstelenít. Antisepticus hatása is tetemes. Küls. hemicrania, neuralgiák ellen rudacskák (Migraine-Stift), kenőcsök (1 : 10) alakjában használtatik. Angináknál ecsetelések. Bels. tuberculosishál, influenzánál belégzések (melegítették, midőn elillan) alakjában haszn.; továbbá porban, pilulában (0,1—0,5—1,0 pro dos.) phthisis, cardialgia, hyperemesis, reflexneurosisok eseteiben. 10 = 7 kr.

624 Rp. Mentholi 1,0.

Ol. Sesami 0,5.

Lanolini 8,5.

M. f. ungu.

DS. Migrain-kenőcs.

(LANGGAARD.)

45 kr.

625 Rp. Mentholi 4,0.

Ol. Sesami 20,0.

M. f. linim.

DS. Gégébe, orrba cseppentésre. (ROSENHEIM.)

58 kr.

626 Rp. Mentholi 5,0.

Solve in

Ol. Sesami 45,0.

adde

Aquae Calcis 50,0.

M. f. linim.

DS. Külsőleg. Égési sebekre.

(LANGGAARD.)

74 kr.

627 Rp. Mentholi 2,0 -

Solve cum

Glycerino 1,0.

adde

Gummi arab.

Sacchar. lact. āā qu. s.

ut f. l. a. pilul. No. 40.

Obduc. Gelatina.

DS. 2—3 × napj. 1—2—3

szemet. Egy pilulában 0,05

menthol.

85 kr.

628 *Rp.* Empl. diachyl. simpl.
 75,0.
 Cerae flavae 10,0.
 Resin. Pini 5,0.
 leni calore liquef. adde
 Mentholi 10,0.
 f. emplastrum l. a.

DS. Tapasz.

Neuralgia, rheumatismus.

1 frt 33 kr.

629 *Rp.* Mentholi 1,0.
 Spirit. Vini 20,0.
 Aqua dest. 150,0.
 M. f. solut.
DS. ór. 1 evők.
 (Hyperemesis, tabeticusok.
 hányása.)

37 kr.

630 *Rp.* Mentholi^o 10,0.
 Solve in Toluol ad
 centimeub. 36,0.
 Spirit. vini conc. 60,0.
 Liquor. Ferri sesqui-
 chlor. 4,0.

MD. in vitro nigro

S. Diphtheritisnél esetelésre.

1 frt 25 kr.

Methacetin seu Acetanisidin. Színtelen, vagy kissé pirosas, szagtalan, keserű por. Vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Hatása, haszn. mint a phenacetiné, de az utóbbinál csekélyebb jelentőségű. Adag porban, pilulában 0,2—0,4 pro dos. 2—3 × napj. 1,0 = 14 kr.

Methylalum [$\text{CH}_3(\text{OCH}_3)_2$]. Színtelen, könnyen mozgó, igen illó, 42° C.-nál forró folyadék; chloroform és eczetaetherre emlékeztető szagú, csipős, aromaticus ízű; vízben, borszeszben, zsíros olajokban oldódik. Sedativum, hypnoticum. (Personali, Kraft-Ebing). Agyvérzés esetén bizonytalan hatású. Adaga subcután 0,1 pro dos többször napj.; per os, vagy klysmában 0,5—1,0 pro dos. 2—3-szor. 1,0 = 10 kr.

631 *Rp.* Methylali 1,0.
 Aqua dest. 9,0.
 M. f. solut.

DS. Bőr alá fecskendésre.

Egy fecskendő 0,1 methylalt tartalmaz.

26 kr.

632 *Rp.* Methylali 1,0—2,0.
 Mucil. Hummi arab.
 Aqua dest. āā 50,0.

MDS. Klysmá.

55 kr.

633 *Rp.* Methylali 5,0—8,0.
 Aqua dest.
 Syrup. cort. Aurant.
 āā 50,0.

MDS. Felét este lefekvés

előtt elfogyasztani.

85 kr.

634 *Rp.* Methylali 2,0.
 Tinct. folior. Cocae 8,0.
MDS. Fogcseppek. Anody-
 num.

44 kr.

635 *Rp.* Methylali 10,0.

Ol. Sesami 50,0.

M. f. linim.

DS. Külsőleg. Anodynum.

1 frt 27 kr.

Methylonum bichloratum (CH_2Cl_2). Szintelen, tiszta, kellemes szagú folyadék. Forrpontja $40^\circ C$. Chloroform helyett a sebészetben mint altató, érzéstelenítő használtatik. Különös előnyei nincsenek. Gyakran találni tisztátlan készítményeket, ezért vigyázat! 1,0 = 15 kr.

H. Miscella pro solutione Calcii ozysulfurati.

(Calc. oxyd. 30,0 + aqua commun. 20,0 + sulfur. subl. lotum 60,0.) 10,0 = 5 kr.

H. Solutio Calcii ozysulfurati s. Solutio Vlemineckx. 1. haszn. calc. sulfurat cz. a. 10,0 = 2 kr.

H. Mixtura gummosa 1. Gummi arabicum.

Mollinum. Túlzsirosított szappan, mely a bőrgyógyászatban részint tisztán haszn. más szappanok helyett, részint kenőcs alapanyagul szolgál. Fehér, enyhén szappanszagú, ceratum összeállású. Bőrre enyhébben, de hasonlóan hat, mint a sapo kalinus. Rendelnek carbol-mollint, mollin-creolint, mollinum hydrargyri cinereum-ot stb. A mollin gyorsan bomlik. Hámfosztott helyekre maró hatást gyakorol, s így sebekkel nem szabad érintkezésbe jönnie. Fölösleges készítmény. 10,0 = 8 kr.

††H. **Morphinum**

††H. **Morphinum hydrochloricum** } 1. Opium.

Morruhol. Az ol. jecoris aselli-ből 90%-os borsószszszel lepárlás útján előállított, kissé szagos, csipős, keserű, már közönséges hőnél jegecedő anyag, mely phosphort, jódot és brómot tartalmaz. A különféle halmajolajokból 2—1% nyerhető. Allítólag hatóanyaga az ol. jecoris-nak (?), s így helyette adatik (1. ol. jecoris). Adag: 8—10 éves gyermeknek 0,4 grm, 12—15 éves gyermeknek 0,6—0,8 grm., felnőtteknek 1,0—1,60 grm. pro die étkezés közben. Capsula gelatin.-ban rendelendő. Kereskedésben már készen vannak morruhol-capsulák, melyek 0,2 grmot tartalmaznak. Az ol. jecoris-t nem pótolhatja. Romlott halmajolajból készült morruhol mérges ptomatinokat is tartalmazhat. 1,0 = 7 kr.

H. Moschus. A moschus moschiferus praepuntium-mirigyének váladéka. Excitans, antispasmodicum. Adag porban 0,1—0,3—0,5 pro dos napj. 3—4 szer, gyakran camphorral összekötve. 0,1 = 48 kr.

Tinctura Moschi. 10—30 csepp 2—3 ór. 1,0 = 35 kr. 1 csepp = 3 kr.

636 *Rp.* Moschi 3,0.

Camphor. trit. 0,3

Sacchar lact. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2—3 ór. 1 port.

Excitans. 14 frt 87 kr.

637 *Rp.* Tinct. Moschi

Tinct. Valerian., spir.

aa 15,0.

MDS. 2—3 × napj. 20—30 cseppet.

Antihystericum, antispasmodicum. 5 frt 47 kr.

- 638 *Rp. Moschi* 0,1.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port.
 Csecsemőnek asthma laryngeum vagy
 eclampsia esetén.
 87 kr.

H. Mucilago Gummi arabici l. Gummi arabicum.

Mydrnium. Ephedrinből és homatropinből álló, fehér, vízben oldh. por. Mydriaticum az atropin helyett. Szemcseppeknek 1,0:10,0.

Myrtilli fructus s. baccæ. Kék áfonya. (*Vaccinium myrtillus*). Tartalmaz: csertsavat, alma és ezitromsavat, cukrot. Enyhe adstringens. Száritva evőkkan. napj. többször. 10,0 = 3 kr.

Myrtolum. A *Myrtus communis* illó olajának 160—170° C-nál forró része; nagyrészt eucalyptolból áll. Víziszta, kellemes, frissítő szagú folyadék. Haszn. bronchitis putrida, gangraena pulm. esetében jó eredménnyel (*Еиспиритъ*). Tuberculum bacillusokra hatástalan. Adag bels. 2—3 ór. 0,15 gmot (= 5 csepp) tartalmazó gelatin-tokocskákból 2—3 db. Étvágytalanság nagyobb adagokra gyakori. 1,0 = 20 kr.

- 636 *Rp. Myrtoli* gtt. 5.
 Det. in. caps. gelat.
 Dent. tal. dos. No. 20.
DS. 2—3 ór. 2—3 szemet. 5 csepp
 = 0,15 gm.
 Bronchitis putrida, Gangraena pulmonum.
 1 frt 90 kr.

Naphtalinum purissimum ($C_{10}H_8$). Színtelen, fénylő, kátrányszagú lemezcsekék. Illó. Vízben nem, hideg borszeszben nehezen, forróban könnyebben, aetherben, zsíros olajokban könnyen oldódik. Antisepticus, desinficiens hatású. ROSSBACH ajánlotta idült vékony- és vastagbélhurutok, cholera infantum, typhus abdomin., tuberculoticusok hasmenése ellen. Hólyagbajoknál czélszerűtlen, sőt ártalmas is lehet. Bőrgyógyászatban pityriasis, scabies ellen kenőcsalakban 1:2. Bels. adag porban 0,1—0,5 pro dos. 3—6 × napj. felnőttek; gyermeknek 0,05—0,1 pro dos. 3—4 × napj. Nem tévesztendő össze a Naphtollal (!!) 10,0 = 1 kr.

- 640 *Rp. Naphtalini puriss.*
 Sacchar alb. aa 5,0.
 Ol. Bergamottæ 0,03.
 M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 20.
 Det. in chartis ceratis.
 S. 5—10—15—20 port napjában (ostyában) bevenni. (ROSSBACH.
 Acut. v. idült bélhurut esetén felnőttek.
 74 kr.

†**H. Naphtholum.** ($C_{10}H_8O$). Szintelen, selyemfényű kristálylemezekből áll, v. fehér kristályos por. Gyenge, phenolra emlékeztető szaga, erős, égető íze van. 1000 sr. hideg, 75 sr. forró vízben oldódik, borszeszben, aetherben, chloroformban, zsíros olajokban könnyen. Bőrgyógyászatban küls. kátránykészítmények helyett idült eczema, psoriasis, pityriasis versicolor, scabies, favus, herpes tonsurans, prurigo ellen. Hosszas, v. kiterjedt bőrfelületen alkalmazása haemoglobinuriát hozhat létre, ezért vigyázat (!). Kenőcshez 1:10—30, borszeszes oldathoz 2—10:100. 1,0 = 3 kr. 10,0 = 20 kr.

641 *Rp.* Naphtholi pulv. 0,5.
Amyli 50,0.
M. f. pulv. det. in scat.

DS. Hintőpor.
Hyperhydrosis.
29 kr.

643 *Rp.* Naphtholi 5,0.
Axung. Porci. 10,0.
Lanolini. 80,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs.
1 frt 8 kr.

642 *Rp.* Naphtholi 1,0.
Ol Sesami 100,0.
M. f. linim.

DS. Ecsetelésre. 49 kr.

644 *Rp.* Naphtholi 15,0.
Axung. porci. 100,0.
Sapon. kalini venalis 50,0.
Cretae alb. 10,0.
M. f. ungu.

DS. 1—1-szer bedörzsölni.
Scabies. 1 frt 4 kr.



H. Natrium aceticum crystallisatum ($NaC_2H_3O_2 \cdot 3H_2O$). Szintelen, átlátszó jegecszekből áll, íze kesernyés és sós. 14 sr. hideg vízben, 30 sr. hideg és 2 sr. forró borszeszben oldható. Gyenge diureticum. Bels. adag 1,0—3,0 pro dos. napj. 3—4-szer oldatban. Gyakran mint más diureticus szerek adjuvansa kali acetic. solut. helyett. 10,0 = 5 kr.

H. Natrium benzoicum ($C_7H_5NaO_2$). Fehér, alaktalan por; 1,5 sr. vízben oldódik. Ma ritkán rendeltetik, még leginkább polyarthrit. rheum. ellen (jobb a natr. salicyl.). Mint antipyreticum már alig szerepel. Adag bels. porban 10,0—20,0 pro die. 1,0 = 6 kr.

H. Natrium bicarbonicum l. Natrium hydrocarbonicum.

H. Natrium boracie. s. Borax veneta $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$. Hasábalakú, szintelen, kemény kristályok, levegőn elmallnak. 17 sr. hideg $\frac{1}{2}$ sr. forró vízben oldódik, glycerinben könnyen, borszeszben nem. Desinficiens, gyenge diureticum; húgysavas sókat oldja. Küls. minden alakú stomatitisnél, angina catarrh. nál száj-, torokvizek (1—2% oldatok,) és ecsetelések (1:5—10) alakjában; acne disseminata, pityriasis versicolor, pruritus vulvae eseteiben kenőcsök alakjában (1:5—10). Bels. mint diureticum és köszvény ellenes szer 0,5—2,0 pro dos. porban, oldatban napj. 3—4-szer. 10,0 = 3 kr. (subt. pulv.).

645 Rp. Natrii boracici 1,0—2,0.
 Aque dest. 100,0.
MDS. Csecsemőknek soor
 esetén szájmosó víz.
 34 kr.

646 Rp. Natrii boracici 3,0.
 Glycerini 15,0.
 M. f. solut.
DS. Stomatitis aphthosa ese-
 tén ecsetelésre.
 35 kr.

H. Natrium bromatum (*NaBr*). Fehér, kristályos por,
 1,2 sr. hideg vízben oldható. Hatása, használata, adagolása, mint
 a kalium bromatumé, különbség, hogy a szívre még nagy adag-
 ban sem hat károsan. 10,0 = 10 kr.

647 R. Natrii bromati
 Ammon. bromati aa 5,0.
 Aquae dest. 150,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 20,0.

648 Rp. Natrii bromati 10,0.
 Div. in dos. aequ. No. 10.
 Det. in chart. cerat.
S. Naponta 3—5 port.
 53 kr.

MDS. 3 ór. 1 evők.
 51 kr.

H. Natrium carbonicum crystallisatum (*Na₂CO₃*
10H₂O). Színtelen, az egyhajlású rendszerbe tartozó, a levegőn
 elmálló jegecekből áll. 1,8 sr. hideg és 0,3 sr. forró vízben oldó-
 dik; oldata erősen lúgos hatású, maró ízű; borszeszben nem oldó-
 dik. Belső nem haszn., még leginkább saturációkhoz kali carbon.
 helyett. Helyette a natri. hydrocarb. 100,0 = 14 kr. 10,0 = 4 kr.
 (dílaps.).

H. Natrium hydrocarbonicum s. bicarbonicum
NaHCO₃. Fehér, nem átlátszó, a levegőn el nem málló jegeczes
 kérges. 13,8 sr. vízben oldható, íze gyengén lúgos. Küls. szájt-
 orokvíznek 2—5%-os oldatok, belégzésre 1/2—1%-os oldatok.
 Bels. adag porban, oldatban 0,3—1,0 pro dos. 3 × napj. 10,0 =
 2 kr. 100,0 = 14 kr.

649 Rp. Natrii hydrocarb. 3,0.
 Pulv. rad. Rhei 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
DS. 2—3 ór. 1 port.
 Gyomorhurut. Icterus ca-
 tarrh. 43 kr.

650 Rp. Natrii hydrocarb. 20,0.
 Elaeosacchar. Foenic.
 5,0.
 M. f. pulv. div. in scat.
S. 3 × napj. 1 késhegynyi.
 Pyrosis, gyomorhurut,
 diabetes, köszvény, húgy-
 homok. 31 kr.

651 Rp. Natrii hydrocarb. 0,5.
 Aquae dest. 100,0.
 Aquae Amygdal. amar.
 gtt. 10.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 3—4 éves gyerm. hörg-
 hurut ellen.
 34 kr.

652 Rp. Natrii hydrocarb. 0,4.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 1.
 Aquae dest. 80,0.
 Syrup. simpl. 8,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 Csecsemőknek lieveny
 hörghurut esetén.
 30 kr.

653 Rp. Natrii hydrocarb.	0,4.
Aquae Poniculi	
Aquae dest.	āā 40,0.
Syrup. simpl.	8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.

Csecsemőknek dyspepsia acida esetén. Kolika esetén 1—2 csepp tinct. nucis vom. is teendő hozzá.
32 kr.

†H. **Natrium hydroxydatum solutum s. Natrium causticum solutum.** Színtelen, átlátszó folyadék; 200 srészen 32 sr. natr. hydroxyd. Erősen lúgos hatású. Maró (!) Bels. nem. Küls. bőrgyógyászatban 1:—1% os oldatok mosogatásokra, ecsetelésre. 10,0 = 3 kr.

†H. **Natrium jodatum (NaJ).** Fehér, jegeczes por, levegőn hosszabb idő múlva megnedvesedik és vöröses színű lesz. 0,6 sr. vízben és 3 sr. borszeszben oldható. Hatása, használata, adaga, mint a kalium jodatumé. Előnye az utóbbi felett, hogy a szívre nem hat károsan. 10,0 = 48 kr.

H. **Natrium nitricum (NaNO₃).** A rhomboedricus rendszerbe tartozó, csaknem kockaalakú, színtelen jegeczeket alkot. 1,0 sr. vízben és 50 sr. borszeszben oldható. Használata tévesen olyan, mint a kalium nitricumé; szívre, diuresisre, hőre alig hat. Adag bels. oldatban 0,5—2,0 pro dos. 3—4 × napj. 10,0 = 3 kr. pulvis: 10,0 = 5 kr.

Natrium nitrosum (NaNO₂). Fehér, jegeczes, gyengén lúgos kémhatású, vízben könnyen, borszeszben nem oldódó, hűtő, sós ízű por. Úgy hat és úgy használtatik, mint az amylum nitrosum. Adag bels. oldatban 0,5—2,0 : 150,0 3—4 × napj. 1 evők., vagy szükség szerint (angina pectoris és asthma rohamok alkalomával) 1—2 evőkanállal. Vigyázat. (!!) 1,0 = 2 kr.

H. **Natrium phosphoricum (Na₂HPO₄ · 12H₂O).** Színtelen, áttetsző, hasábos jegeczekből áll; levegőn igen könnyen elmallik. Ize enyhén sós, kémhatása lúgos. 5,8 sr. hideg vízben, 2 sr. forróban oldódik. Enyhe laxans 20,0—30,0-os adagban; adják rhachitis, osteomalacia, köszvény, lithiasis eseteiben is 0,5—2,0—3,0-os adagokban, de kevés haszonnal. 10,0 = 4 kr.

654 Rp. Natrii phosphor. 30,0.
Aquae dest. 160,0.
Syrup. mannati 20,0.
MDS. Reggel 2—3-szorra
elfogyasztani. Enyhe
laxans.

57 kr.

655 Rp. Natrii phosphor. 10,0.
Acid. benzoici 1,0.
Aquae dest. 100,0.
Syrup. simpl. 30,0.

MDS. 2. ór. 1 evők.

Köszvény, húgyhomok
eseteiben

56 kr.

656 <i>Rp.</i> Natrii phosphor.	1,0—2,0.
Aquae dest.	100,0.
Syrup. simpl.	10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

Gyermekeknek lithiasis esetében, ha a vizelet savas vegyhatású. Fájdalmas vizelésnél 2—4 csepp tinct. opii simpl. tehető hozzá.
31 kr.

H. Natrium salicylicum ($2NaC_7H_5O_2, H_2O$). Sós és édeses ízű, fehér, jegeczes pikkelyekből álló por. Egyenlő sr. vízben, 6 sr. borszeszben oldható. Antipyreticum, antirheumaticum. Adag porban, oldatban 0,5—1,0 pro dos., 3,0—10,0 pro die. Antipyreticus czélból az egyes adagok óránként, polyarthrit. rheum. eseteiben $\frac{1}{4}$ óránként adandók. Hemigrania eseteiben roham kezdetén 1,0—1,5 pro dos. Vastagbélhurut, dysenteria chron. eseteiben bélmosások 1—2%-os oldattal. 1,0 = 2 kr., 10,0 = 15 kr.

657 <i>Rp.</i> Natrii salicyl.	1,0—2,0.	658 <i>Rp.</i> Natrii salicyl.	10,0.
Aquae dest.	80,0.	Aquae dest.	170,0.
Syrup. simpl.	10,0.	Tinct. Opii simpl.	1,0.
<i>MDS.</i> ór. 1 gyk.		Syr. cort. Aurant.	20,0.
2—4 éves gyermeknek		<i>MDS.</i> 2—3 óra alatt felét	
heveny lázas fertőző be-		elfogyasztani evőkanalan-	
tegségek esetén antipy-		ként polyarthrit. rheum.	
reticum.		acuta esetén.	
28 kr.		53 kr.	

659 <i>Rp.</i> Natrii salicyl.	10,0.	660 <i>Rp.</i> Natrii salicyl.	10,0.
Div. in dos. aequ No. 10.		Butyri Cacao	
<i>DS.</i> 1 gmos natr. salicyl		qu. s.	(15,0).
porok,		ut. f. suppos. No. 10.	
52 kr.		<i>DS.</i> Napj. 5—6 dbot elhasz-	
		nálni.	
		1 frt 21 kr.	

II. Natrium silicicum liquidum. Vízüveg. Színtelen, vagy kissé sárgás színű, lúgos hatású folyadék. Sebészetben contentiv kötések készítéséhez használtatik. 100,0 = 18 kr.

H. Natrium sulfuricum crystallisatum. Glaubersó. $Na_2SO_4, 10H_2O$. Színtelen, hasábalakú, csíkos jegeczekből áll. Légen könnyen elmállik; íze kesernyés sós, 3 sr. hideg és 0,4 sr. forró vízben oldható. Bels: 15,0—30,0 pro dos. laxans 1,0—2,0 pro dos. 3—4 $\times$ napj. idült gyomor-, bélhurut, gyomorbélátónia, icterus catarrhalis, ulcus ventriculi eseteiben. 100,0 = 14 kr., 1000,0 = 1 frt 20 kr. vagy 10,0 = 4 kr. (dilaps).

II. Sal thermarum Carolinarum. Karlsbadi só. Főalkotórésze natr. sulf. Haszn. és adaga mint az utóbbinak. 10,0 = 12 kr., vagy 10,0 = 25 kr. (dilaps).

661 *Rp.* Natrii sulf. dilapsi 10,0.
 Kalii sulf. 2,0.
 Natrii chlor. 18,0.
 Natrii hydrocarb. 36,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. Mesterséges karlsbadi
 só, 6,0 feloldva 1000,0
 vízben, mesterséges karls-
 badi vizet adl. 52 kr.

662 *Rp.* Natrii sulf. dilapsi 10,0.
 Pulv. rad. Gentianae 1,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
 DS. 3-szor napj. 1 port.
 Idült gyomor-, bélhurut,
 gyomor- és bélatonia ese-
 teiben. 43 kr.

Natrium tartaricum (Na_2O, H_2O, H_2O). Színtelen, vízben könnyen oldható jegeczek. Laxans, mint a kalium tartaricum. Bels. adag 10,0—30,0 vízben oldva. 10,0 = 6 kr.

Neurodinum. (Acetyloxyphenylurethan). Vízben nehezen oldh. fehér, szagtalan jegeczek. Analgeticum, neuralgiák, hemicrania, tabes eseteiben. Adag 1,0—2,0 porban. Bels. 1,0 = 20 kr.

Nitroglycerinum ($C_3H_5(NO_3)_3$). Színtelen, olajszerű, hidegen szagtalan édeses-aromaticus ízű, könnyen robbanó folyadék. Hatása, használata, mint az amylium nitrosomé és a natri. nitrosomé. *Teljesen fölösleges, e mellett veszélyes* (l. czélszerűtlen, veszélyes gyógyszerkeverékek cz. a.) készítmény. Ne rendeltessék! Adaga különben 1% borszeszes oldatból 3 cseppből pro dos. emelkedőleg 10 cseppig pro dos. 1,0 = 3 kr.

Nosophenum. (Tetraiodphenolphthalein) Antisepticum sebkeze-
 lésben. Hintőpor talcummal v. tisztán eczema, intertrigo, balanopost-
 hitis, herpes proenitalis, ulcus molle esetén. Kenőcs vaseliinnel v.
 lanolinnal égési sebekre stb. Befúvások orr és garatbántalmaknál.
 Vele állítják elő az *antinosint* (natrium-tetraiodphenolphthalein)
 és az *eudoxint* (bismuth-tetraiodphenolphthalein) *Antinosinból* hintő-
 pornak mint az nosophenből; oldatnak 1: 500—1000 hólyagmosásra,
 0,5—2,0:100 orr, húgyeső kifecskendésére. Bels. 1,0—2,0:150,0
 ór. evők. Eudoxinból adag bels. 0,3—0,5 pro dos. porban.

H. **Nux moschata.** Szerecsendió. (Myristica fragrans. Myris-
 ticaceae). Hatóanyaga illatos olaj. Carminativum szagjavító. Obso-
 let. 10,0 = 10 kr., vagy 10,0 = 13 kr. (pulv.)

†H. **Nux vomica.** (Strychnos nux vomica magvai). Hatóanya-
 gai: strychnin, brucin. 10,0 = 3 kr., vagy 10,0 = 6 kr. (subt.
 pulv.). Készítményei haszn.

††H. **Strychninum nitricum** ($C_{12}H_{22}N_2O_2HNO_3$). Finom,
 fehér, selyemfényű kristályokból áll, 90 sr hideg és 3 sr. forró
 vízben, 70 sr. hideg és 5 sr. forró borszeszben, 26 sr. glycerin-
 ben oldható. Oldata igen keserű. Körzeti és központi motor.
 hűdés (különösen zárizomhűdés) esetén, azután a szemé-
 szetben bőr alá fecskendés alakjában adag 0,001—0,01! Dos.
 maxim. pro die 0,02! 0,10 = 3 kr.

†H. **Extractum Nucis vomicae.** Borszeszes kivonat.
 Kis adagban bels. mint amarum, tonicum; nagyobb adagokban
 hűdés esetén. Adag pilulában, porban 0,01—0,04! Dos. maxim.
 pro die 0,2! 1,0 = 10 kr.

†H. **Tinctura Nucis vomicae.** Haszn. mint az extr. nuc. Adag bels. 2—5—10! csepp pro dos. 2—3 × napj. Dos. maxim. sing. 0,5! (10 csepp!) Dos. maxim. pro die 1,5! (30 csepp.) 10,0 = 7 kr.

663 *Rp.* Strychnini nitr. 0,05.
Apuae dest. 10,0.
M. f. solut. filtra.
DS. Bőr alá fecskendésre.
Sub sigillo. Sub signo veneni. Az orvos kezéhez.
Egy fecskendőben 0,005.
strychn. nitr.
28 kr.

664 *Rp.* Extr. Nuc. vom. 0,1.
Natrii hydrocarb. 2,0.
Pulv. rad. Rhei 1,0.
Sacch. albi 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ No. 10.
DS. 3 ór. 1 port.
Gyomorhurut.
45 kr.

665 *Rp.* Extr. Nucis vom. 0,2.
Ferri lactici 2,0.
Sacchar alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 2—3 × napj. 1 port.
Hűdésék, impotentia.
47 kr.

666 *Rp.* Extr. Nucis vom. 0,03—0,05.
Aquae dest. 100,0.
Syrup. simpl. 15,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—5 éves gyermeknek
prolapsus ani esetén
33 kr.

667 *Rp.* Tinct. Nucis vom.
Tinct. Opii crocat. aa 3,0.
Tinct. Chinae comp. 10,0.
MDS. 3—4-szer napj. 15—20 csepp.
pet. Diarrhoea.
30 kr.

Nutrose. Fehértejből készül. A casein könnyen oldható natrium összekötetése. Ételekhez teendő hozzá, mint tápszer (tejhez, chokoladehoz, leveshez, rizshez, darához stb.). 1 kg. megfelel 4 kg. hús tápértékének. Elgyengiült betegek, reconvelescensek táplálását javítani van hivatva. A Höchsti gyár állítja elő. Adag: felnőtteknek 3—4 × napj. 1 kk. gyermeknek 1—2 gm.

Olea aetherea.

H. **Oleum Anisi.** 1,0 = 5 kr.

H. **Oleum Aurantiorum corticum.** 1,0 = 4 kr.

H. **Oleum Caryophyllorum.** 1,0 = 4 kr.

H. **Oleum Cinnamomi Cassiae.** 1,0 = 5 kr.

H. **Oleum Citri.** 1,0 = 4 kr.

H. **Oleum Eucalypti amygdalinum** l. Eucalypti folia.

H. **Oleum Foeniculi.** Szagjavító. Elaeosaccharum készítéséhez haszn. 1,0 = 3 kr.

Szagjavítók.
Elaeosaccharum
készítéséhez
használatnak.

Oleum Gaultheriae. (ol. Vintergreen) Gaultheria procumbens (Ericaceae). illó olaja. Szintelen, légen megpirosodó, kellemes illatú, édeses ízű folyadék. Hatóanyaga methylsalicylsav (90%). salicyl. helyett polyarthrititis rheum. ellen. Adag 10—20 csepp 2—3 ór. caps. gelat.-ban, borban, tejben. Natr. salicyl. fölött előnyei nincsenek, melléktünetek mint az utóbbinál. Küls. fertőztelenítő száj- és torokvizekbe. 1,0 = 6 kr.

668 Rp. Olei Gaultheriae gtt. 15.

Det. in caps. gelat.

Dent. tal. dos. No. 10.

S. 2—3 ór. 1 tokot bevenni.

Polyarthrititis rheumatica.

60 kr.

669 Rp. Spirit. vini dil. 100,0.

Acid. benzoici 3,0.

Tinct. Eucalypti 15,0.

Olei Gaulther. gtt. 25.

(1,0).

MDS. 2 kk. egy pohár vízre.

Száj- és torokvíz. Diphteritis faucium.

73 kr.

H. Oleum Juniperi. Küls. bőrizgató. Bels. diureticum. Adag bels. 2—4 csepp czukorra cseppentve, v. cognacban, v. más szeszes oldatban. 1,0 = 2 kr.

670 Rp. Olei Juniperi 3,0.

Ungu simpl. 30,0.

M. f. ungu.

D.S. Bőrizgató kenőcs.

42 kr.

671 Rp. Olei Juniperi 2,0.

Tinct. Digitalis 5,0.

Spirit. Aetheris 13,0.

MDS. 3 ór. 20—30 cseppet

Diureticum

27 kr.

H. Oleum Lavandulae. 1,0 = 4 kr.

H. Oleum Macidis. 1,0 = 5 kr.

H. Oleum Majoranae. 1,0 11 kr.

H. Oleum Menthae crispae. 1,0 = 6 kr.

H. Oleum Menthae piperitae.

1,0 = 16 kr.

Szagjavítók. Elaeosaccharum készítéséhez haszn.

H. Oleum Pini silvestris pro inhalatione. Az Ol. terebinthinai helyett 10—25 csepp forró vízre cseppentve belégzendő idült légső, hörghurut esetén, ha sok a váladék. 10,0 = 12 kr.

H. Oleum Rosae. Szagjavító. Elaeosacchar. és Mel rosatum készítéséhez haszn. 1 csepp = 8 kr. 0,10 = 17 kr.

H. Oleum Rosmarini. Szagjavító. 1,0 = 2 kr.

Oleum Santali ligni. Santalum album fa illatos olaja. Hurutellenes szer. Különösen bronchitisek s acut gonorrhoe eseteiben 10—20 csepp gelatin capsulában 3—4 × napj. jó sikerrel adható. 1,0 = 3 kr.

†**H. Oleum Sinapis aethereum** l. Sinapis semina 1,0 = 12 kr. 1 csepp = 1 kr.

H. Oleum Succini rectificatum. Bals. vitae Hoffmanni készítéséhez haszn. 1,0 = 2 kr.

H. Oleum Terebinthinae rectificatum. Színtelen, hig, közömböskémhatású, fenyőszagú, csipős, égető ízű illó olaj. Küls. tisztán v. kenőcsben (1 : 3) a bőrre dörzsölve bőrvörösítő, tisztán beecsetelve haemostaticum. Belégezve. (15—30 cseppet forró vízre cseppentve) légcső-, hörghurutnál az elválasztást csökkenti. Bels. hurutellenes, haemostaticum, anodynum, excitans, diureticum. Adag 5—10—15 csepp pro dos. 2—3 ór. capsula gelatinosában, electuáriumban, v. egyszerűen cukorra cseppentve. Heveny phorphor-mérgezésnél *nem retificált u. n. franczia terpentin adandó*, mint vegyi ellenmérég 15—20—30 cseppnyi adagokban (??). 100,0 = 20 kr.

672 Rp. Olei Terebinth. 20,0.

Olei camphor. 40,0.

M. f. linim.

DS. Külsőleg.

Bőrvörösítő.

47 kr.

673 Rp. Olei Terebinth. gtt. 10.

Det. in caps gelat.

Dent. tal. dos. No. 20.

S 3—4 × napj. 1 capsulát.
50 kr.

674 Rp. Olei terebinth.

Olei Amygdalar. dulc.

aa 5,0.

Mucil. Gummi arab.

Syrup simpl. aa 20,0.

Aquae dest. 200,0.

M. f. l. a. emulsio.

DS. ½ ór. 1 evők.

Haemoptoë. (BAMBERGER.)

55 kr.

675 Rp. Olei Terebinth. 5,0.

Cerae alb. 15,0.

Sacchar. alb. qu. s.

ut f. l. a. pilul. No. 100,0

Consp. pulv. Cinnam.

DS. 3—4 × napj. 5—10
szemet.

Cystitis chron. Gonorrhoea
chron eseteiben.

60 kr.

H. Oleum Valerianae. Zöldessárga, v. barna, kissé sűrű, savanyú kémhatású, átható szagú illó olaj. 100 sr. vízben oldódik, borszeszben minden arányban, Antispasmodicum, antihystericum. Bols. adag 1—3 csepp pilulában, capsula gelatinosában. 10,0 = 7 kr.

*

H. Oleum Amygdalarum dulcium l. Amygdalae dulces.

Oleum Anda-assu. Johannesia princeps (Vell.) magvaiból préselt zsíros olaj. Színtelen, átlátszó, szag- és íztelen olaj. Ricinusolaj pótszere. Hashajtó adag 50 csepp.

H. Oleum Cacao s. Butyrum Cacao. Végbélcsapok alapanyagául szolgál. 10,0 = 6 kr.

H. Oleum Cadinum s. Ol Juniperi empyreumaticum. Sötétbarna, sűrű, kátrányhoz hasouló, füstös szagú folyadék. Bőrgyógyászatban a pix liquida helyett mint bőrizgató és antipa-

rasiticum használtatik psoriasis, prurigo, idiilt eczemák, herpes tonsurans, favus, scabies ellen. Bels. nem. 10,0 = 2 kr. 100,0 = 15 kr.

676 *Rp.* Olei Cadini
Olei Sesami $\bar{a}\bar{a}$ 50,0.
MDS. Külsőleg.
37 kr.

678 *Rp.* Empl. diachylon simpl.
Ungu. emoll. $\bar{a}\bar{a}$ 25,0.
Olei Cadini 5,0.
M. f. ung.
DS. Kenőcs.
Gyermekek prurigo esetén. 65 kr.

679 *Rp.* Olei Cadini
Sapon. kalini venalis
 $\bar{a}\bar{a}$ 20,0.
Spiritus 40,0.
MDS. 2 $\times$ napj. szőrecsettel beecsetelni.
Idiilt eczema. (HEBRA).
32 kr.

677 *Rp.* Olei Cadini 2,0.
Sapon. kalini ven.
Ungu. simpl. $\bar{a}\bar{a}$ 50,0.
M. f. ung.
DS. Kenőcs. Sűrteecsettel vékonyan ecsetelendő a beteg bőrfelületre.
Gyermekeknek herp. tons., favus esetén.
62 kr.

680 *Rp.* Sulfur. subl. loti
Olei Cadini $\bar{a}\bar{a}$ 50,0.
Sapon. kalini venalis
Auxung. porci $\bar{a}\bar{a}$ 100,0.
Pulv. Cretae alb. 10,0.
M. f. ung.
DS. Módosított Wilkinson-kenőcs. 1 frt 14 kr.

H. **Oleum camphoratum** l. Camphora.

†H. **Oleum Crotonis** l. Crotonis semina.

H. **Oleum Fagi empyreumaticum s. Pix Fagi liquida s. Bitumen Fagi l. Pix liquida.**

H. **Oleum Hyosiami foliorum coctum** l. Hyosciami folia.

H. **Oleum Jecoris Aselli flavum.** Csukamájolaj. Minden zsíros olaj közt legkönnyebben emészthető. Tápanyag rhachiticus, scrophuloticus (erethicus alak) gyermekeknek, phthisikusoknak. Ellenjavalt láznál és gyomor-bélbajok eseteiben. Adag gyermekeknek napj. 2 $\times$ 1 kk., felnőttnek 2 $\times$ 1 gyk. v. 1 evők., mindig étkezés közben, soha éhgyomorra. 100,0 = 27 kr. 1000,0 = 2 frt 30 kr.

681 *Rp.* Olei Jecoris Aselli 250,0.
Sacchar. alb. pulv. 20,0.
Natrii chlorat. pulv. 10,0.
Rhum. 60,0.
MDS. Haszn. előtt összerázandó.
Felnőttnek 2 $\times$ napj. 1 gyk.—evők.
1 frt 51 kr.

H. **Oleum Juniperi empyreumaticum l. Ol. Cadinum.**

H. Oleum Lauri. Friss babérmagvakból sajtolt zöld, lágy, kenőcshez hasonló, szemcsés, babérszagú olaj. Kenőcsökhöz, kül. hajkenőcsökhöz mint alapanyag haszn. 10,0 = 3 kr.

H. Oleum Lini lotum et venale l. Lini semina.

H. Oleum Ricini. A ricinus communis magvaiból sajtolt, átlátszó, kissé sűrű, majdnem színtelen, v. sárgás, sajátságos szagú és ízű zsíros olaj. Laxans. Adag 20,0—30,0 pro dos. (1—2 evőlk.) Kellően ízét javítjuk, ha a kanálban levő olajra néhány csepp rhumot v. citromnedvet öntünk. Rendelhető tisztán, v. emulsióban, v. capsulában (az utóbbiak különböző adagokban készletben is szokták tartatni nagyobb forgalmú gyógyszárakban). 100,0 = 20 kr.

682 Rp. Olei Ricini 30,0.

̄ Pulv. Gummi arab. qu. s.

Aquae dest. 180,0.

Syrup emuls. 20,0.

M. f. l. a. emulsio.

DS. 1 óra alatt 3-szorra bevenni.

63 kr.

683 Rp. Olei Ricini

Syrupi mannati aa 10,0.

MDS. 2 ór. (felrázva) 1 kk.

v. gyk. a hatás bekövetkeztéig.

Csecsemőknek v. 1—3 éves gyermekeknek.

20 kr.

684 Rp. Olei Ricini

30,0.

Olei Jecoris Aselli 20,0.

Gummi arab. 5,0.

M. f. l. a. emuls. cum

Aqua dest. 150,0.

Syrup. simpl. 20,0.

DS. ór. 1 kk.

Gyermekeknek hashajtó acut

dyspepsia esetén. (SOLTMANN.)

54 kr.

Oleum Rusci rectific. s. Pix liquida betulina.

Nyirkátrány. Higan folyó, átható bagaria szagú, sötétbarna anyag. Haszn. a bőrgyógyászatban küls. mint bőrizgató és antiparasiticum psoriasis, prurigo, idült eczemák, herpes tonsurans, favus, scabies ellen pix liquid v. ol. cadin. helyett. Bels. nem. 10,0 = 3 kr.

685 Rp. Olei Rusci rectific. 25,0.

Spirit. aether. 10,0.

Olei Lavand. gtt. 20.

M. f. linim.

DS. Bőr beecsetelésére.

30 kr.

686 Rp. Olei Rusci rectific. 30,0.

Spirit. vini conc.

Aetheris sulf. aa 4,0.

Olei Lavand.

Olei Rutae.

Olei Rosmar. aa gtt. 20.

MDS. 2 × napj. sörteecsettel bőrre dörzsölendő psoriasisnál. (HEBRA.)

44 kr.

H. Oleum Sesami. Az oleum olivarum helyett hiv. zsiros olaj. 100,0 = 24 kr. 200,0 = 40 kr.

H. Ononidis spinosae radix. (Papilionaceae). Hatóanyagát pontosan nem ismerjük. Diureticumnak mondatik (?) Adag decoct. 15,0—20,0: 150,0 2 ór. 1 evők. Gyakran más diureticus szerekekkel összekötve. 100,0 = 10 kr.

• 687 Rp. Decoct. rad. Ononid. spin. e 15,0.

l. a. p. ad colat. 130,0.

Kalii acet. sol. 10,0.

Oxymel. Scillae 20,0.

M.D.S. 2 ór. 1 evők.

Diureticum.

47 kr.

†**H. Opium.** Papaver somniferum gyümölcsének tejüedve. Főbb hatóanyagai: morphinum (10%) codeinum (0,3—0,5%), thebainum (0,2—1,0%), narceinum, narcoticum, papaverinum. Anodynum, anaestheticum, hypnoticum, antispasmodicum, antidiarrhoeicum. Colica saturnina eseteiben nagy adag a fájdalmakkal együtt a székszorulást is megszünteti, diabetes mellitusnál nagy adagok erősen csökkentik a cukor kiürülést. Adag bels. porban, pilulában igen különböző; fájdalmak, köhögési inger, hasmenés csillapítására 0,01—0,02 pro dos. 3—5 × napj.; hypnoticus, antispasmodicus célból, v. colica saturn. és diabetes mellitusnál 0,03—0,10 pro dos. 3—5 × napj. Dos. maxim. sing. 0,15! pro die 0,5! Gyermekeknél nagy vigyázat. 1. táblázat (11). 1,0 = 5 kr.

†**H. Extractum Opii.** Dextrinnel beszárított vizes kivonat. Hatás, használat, mint az opiumnál. Még egyszer oly hatékony, mint az opium. Adag bels. porban, pilulában *felényi* mint az opiumból. Dos. maxim. sing. 0,05! pro die 0,3! Gyermekeknek nem! 1,0 = 15 kr.

†**H. Tinctura Opii simplex.** 1,0 = 1 kr., 10,0 = 9 kr.

†**H. Tinet. Opii crocata.** 10,0 = 23 kr.

Egyenlő mennyiségű opiumot tartalmaznak. Hatás, használat, mint az opiumnál. Bels. kis adag 2—5 csepp pro dos. 3—5 × napj., nagy adag 6—10! csepp pro dos. 3—5 × napj. Dos. maxim. sing. 0,5! (10 csepp)! pro die 2,0! (40 csepp)!.

†**H. Pulvis Doveri.** (Opium 5 r. + pulv. rad. ipecac. 5 r. + sacchar. 40 r.) Expectorans, köhögést csillapító, antidiarrhoeicum. Adag porban, pilulában 0,1—0,3 pro dos. ór. v. 2 ór. Dos. maxim. sing. 1,0! pro die 4,0! 1,0 = 2 kr.

††**H. Morphinum** ($C_{17}H_{19}NO_2 \cdot H_2O$). Hasáb- v. tűalakú, színtelen, fénylő kristályokból áll. Ize keserű, kémhatása lúgos. 1000 r. hideg vízbe, 500 r. forró vízben oldódik. Rossz oldékonysága miatt nem haszn. helyette haszn. sósavas sója. 0,1 = 5 kr.

††**H. Morphinum hydrochloricum** ($C_{17}H_{19}NO_2 \cdot HCl \cdot 3H_2O$). Vékony, tűalakú, gyakran kéve módjára egyesült, selyem-

fényű jegeczekből, v. koczkaalakú, kristályos tömegekből áll. Íze igen keserű, kémhatása semleges. 20 sr. hideg, majdnem egyenlő sr. forró vízben és 50 sr. borszeszben oldható. Hatása, mint az opiumé. Küls. fájdalomcsillapító kenőcsnek, linimentumnak 0,1—0,3: 10,0. Bels. porban, pilulában, suppositoriumban, oldatban, bőr alá fecskendés alakjában kis adag 0,005—0,01 pro dos. 3—5 × napj., nagy adag 0,02—0,03! pro dos. 3—4 × napj. Dos. maxim. pro die 0,12! Gyermekeknek nem! 0,1 = 3 kr.

†H. **Codeinum** ($C_{18}H_{21}NO_3, H_2O$). Fehér, v. sárgásfehér, gyakran jól kifejlődött rhombos hasábalakú jegeczekből áll; 80 sr. hideg és 17 sr. forró vízben oldódik. Hatása, használata, mint a sósavas morphiné, csak hogy a bélmozgásokra nem hat. Bels. adag porban, pilulában, 0,01—0,03—0,05! pro dos. 3—5 × napj. Dos. maxim. pro die 0,2! 0,01 = 1 kr.

††H. **Codeinum hydrochloricum**. $C_{18}H_{21}NO_3, HCl + 2H_2O$. Fehér, finom. keserű ízű vízben könnyen oldódó hasábos alakú kristályok. Hatás, haszn. mint a codeinnél. Adag bels. 0,03—0,05 pro dos. pilulában, porban, oldatban. Bőr alá 0,02—0,05 pro dos. Dos. max. sing. 0,05, pro die 0,2. 0,10 = 1 kr.

Narceinum ($C_{15}N_2, NO_2, 2H_2O$). Fehér, prismaticus tűkből álló jegeczek; hideg vízben, hideg borszeszben nehezen, forró víz és borszeszben könnyen oldódik. Hatása mint a morphiné, csak kissé gyengébb, de kellemetlen mellékhatása is kevesebb. Bels. mint hypnoticum 0,05—0,1 pro dos.; mint sedativum, anodynum, antispasmodicum 0,02 pro dos. 3—5 × napj. porban, pilulában v. eczetsav segítségével készített oldatban. 3—4 éves gyermeknek tussis convulsiva esetén 0,01—0,015 lefekvés előtt (LABORDE.) 0,01 = 3 kr.

688 Rp. Opii pulv. 0,1.
Sacchar alb. 5,0
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. Napj. 3—4 × 1 port.
41 kr.

689 Rp. Extr. Opii 0,05.
Alumin. pulv. 2,0.
Elaeosacch. Menthae 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
Diarrhoea
50 kr.

690 Rp. Opii pur. 0,6.
Pulv. et extr. Liquir. aa
qu. s.
ut. f. l. a. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Lycopod.
DS. Diabetes mellitus esetén
napj. 3 × 1 pilulát, majd
emelkedőleg egészen 3 × 3
szemig napj. Egy pilulában
0,02 opium.
43 kr.

691 Rp. Extr. Opii 0,05.
Butyri Cacao qu. s.
ut. f. l. a. supposit. No. 5.
DS. Naponta 2 × 1 csap
alkalmazandó.
Végbél- és hólyagtenes-
mus, prostatitis, acut go-
norrhoea eseteiben.
61 kr.

692 *Rp.* Extr. Opii 0,05.
Sulfur. aurat. Antimon. 0,5.
Natrii hydrocarb. 3,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port. Köhögés-
csillapító, köptető.
45 kr.

694 *Rp.* Tinct. Opii simpl.
Chloroformii $\overline{\text{an}}$ 5,0.
MDS. Fogcseppek.
28 kr.

696 *Rp.* Mixtur. Gummosae 100,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 3.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
3—5 éves gyerm. izgatott
köhögés esetén.
46 kr.

697 *Rp.* Pulv. Doveri 1,0—2,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
Felnőttek.
41 kr.

699 *Rp.* Morphini hydrochlor. 0,4.
Ung. emoll. 20,0.
M. f. ung.
DS. Morphinkenőcs. Fájdal-
lomcsillapító.
53 kr.

701 *Rp.* Morphini hydrochl. 0,5.
Gummi arab. pulv. 10,0.
M. exact. f. pulv. det.
in scat.
S. Gégébe befúvásra por.
42 kr.

693 *Rp.* Tinct. Opii crocatae 5,0.
Tinct. Ipecac. 3,0.
Tinct. Valerian. aeth. 10,0.
Olei Menthae pip. gtt. 10.
MDS. 2—3 ór. 15—20
cseppet. Colica, diarrhoea
eseteiben. Hasonló össze-
állítású cseppek, mint cho-
leracseppek is ismeretesek.
52 kr.

695 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae 15,0.
l. a. p. ad colat. 100,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 5—10.
MDS. Langyosan klysmá-
nak. Tenesmus.
34 kr.

698 *Rp.* Tinct. Opii croc. 1,0.
Tinct. Castorei 2,0.
Tinct. Valerian. spir. 5,0.
MDS. $\frac{1}{2}$ —1 ór. 10—15 csep-
pet szükség esetén.
Hystericus görcsök.
48 kr.

700 *Rp.* Pulv. Doveri 0,1—0,3.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
1—5 éves gyermeknek.
41 kr.

702 *Rp.* Morphini hydrochl. 0,06.
Butyri Cacao qu. s.
ut. f. suppos. No. 4.
DS. 0,015 gmos morphinsup-
pos.
52 kr.

703 Rp. Morphini hydrochlor.
 0,2.
 Aquae dest. 10,0.
 M. f. sol. filtra.
DS. 2^o/_o-os morphinoldat
 bőr alá fecskendésre. $\frac{1}{2}$ —1
 fecskendővel egyszerre.
 32 kr.

705 Rp. Morphini hydrochlor.
 0,05.
 Sacchar. alb. 5,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
 41 kr.

707 Rp. Morphini hydrochlor.
 0,15.
 Pulv. rad. Althaeae
 Mucil. Gummi arab.
 aa qu. s.
 ut. f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Lycopod.
DS. 0,005 grmos morphin-
 pilulák.
 2—4—6 szem este bevéve
 hypnoticum.
 44 kr.

709 Rp. Codeini hydrochlor 0,5.
 Aquae dest. 10,0.
MDS. Bőr alá fecsk. Suo.
 nomine. $\frac{1}{2}$ —1 fecsk.
 egyszerre.
 76 kr.

704 Rp. Morphini hydrochlor.
 0,05.
 Aquae Amygdalar.
 amar. 15,0.
MDS. 2—3 ór. 10—15 csep-
 pet. 35 kr.

706 Rp. Emuls. oleosae 100,0.
 Aquae Amygdalar.
 amar 5,0.
 Morphin. hydrochlor.
 0,05.
MDS. ór. v. 2 ór. 1 kk. las-
 san lenyelni. Fájdalmas
 nyelésnél, anginák, epiglot-
 tis fekélyek eseteiben.
 46 kr.

708 Rp. Codeini hydrochlor.
 0,1—0,2.
 Pulv. rad. Ipecac. 0,3,
 Sacchar. alb. 4,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 2—3 ór. 1 port.
 Köhögés-csillapító, köp-
 tető, antidiarrhoeicum.
 51 kr.

710 Rp. Narceini 0,12.
 solve ope
 Acid. acet. dil. gtt. 10.
 in
 Infus. sem. Coffeae.
 Syrup. simpl. aa 125,0.
MDS. Napj. többször 1 gyk.
 v. kk. Tussis sonvuls.
 (LABORDE.)
 1 frt 5 kr.

711 Rp. Codeini hydrochlor.
 0,10—0,20.
 Syrup. simpl. 30,0.
MDS. Napj. 3 kávéskan.
 Gyerme. diabetes insipid.
 38 kr.

Orexinum hydrochloricum. Sósavas phenyldihydro-
 chinazolin. Színtelen, fénylő tüket képez. Meleg vízben könnyen
 oldódik. Keserű, égető utóízzel. Penzoldt szerint stomachicum.

Gyomorra helybelileg erősen izgató. Ellenjavallat hányás, fájdalmak. Szabatos indiciók még nincsenek. Adag 1—2 × napj. 0,3—0,5 caps. amylac.-ban, pilulában, porban. Utána egy csésze meleg leves. 0,10 = 4 kr.

712 *Rp.* *Orexini hydrochlor.* 2,0.

Extr. *Gentianae*

Pulv. rad. *Althaeae* aa

qu. s. ut f. pilul No. 20.

DS. Napj. 1—2 × 3—5

szemet. Bevétel után

csésze leves.

1 frt 20 kr. (PENZOLDT.)

713 *Rp.* *Orexini hydrochlor.* 3,0.

Sacchar. alb. 2,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

Det. in caps. amyl.

S. Napj. 2 × 1 dbot, utána

csésze levest.

1 frt 82 kr.

Ovarium készítmények. A természetes és mesterséges climacterium alkalmával előforduló ideges tünetek ellen rendelik ezeket. 1) *Ovaria siccata Merck.* Tabletták. Tehén petefészkekből készíllnek. 5 ovarium 7,5 gm. ovaria siccata ad. Egy tablettában 0,1 ovar. sicc. van. Adag 3 × napj. 10—15 dbot bevenni. 2) *Ovaraden.* Knoll u. Co. Ludwigshafen. Sertés ovariumból készül. Porból 1 gm. = 2 gm. friss ovariummal, 1 db. tableta = 0,5 gm. friss ovariummal. Adag porból 1,0—1,5 gm. pro dos. napj 3—4-szer, tablettákból 2—3 db. pro dos. napj. 3—4-szer.

† **H. Oxytel Scillae.** I. Scilla.

H. Oxytel simplex. Izjavító, mint a syrupok. 10,0 = 3 kr.

Pancreatium. Sokféle készítmény van forgalomban. Kivonata a sertés v. szarvasmarha hasnyálmirigyének. Legtöbbször e mirigy mindhárom fermentumát tartalmazza; néha hiányzik a zsírfementum. Fehérjét csak alkalikus közegben emészt. A száraz készítmény a mirigynek v. beszáritott vizes, v. borszeszszel kicsapott vizes kivonata; a folyékony készítmény glicerines kivonat. Digestivum. Per os nem használható, gyomorban nem emészt. Leginkább végbélen át való táplálásnál használtatik vagdalt pancreas helyett. (L. Klysma cz. a.) 1,0 = 6 kr.

Pannae s. Uncomocomo rhizoma. (*Aspidium athamanticum.* Filices.) Anthelminticum. Főleg taeniák ellen. Adag 8,0—10,0 porban, éhgyomorra. Előkészítő étrend czélszerű. 1,0 = 4 kr.

Papainum. Carica Papaya nedvéből előállított, fehéres porból álló erjanyag, mely fehérjét és fehérjeféléket ép úgy emészt savanyú, mint alkalikus közegben. Feloldja 5%-os oldatban a croup-hártyát. Küls. 5—10%-os oldat ecsetelésére croup, diphtheritis eseteiben, esetleg belégzésre is. Bels. pepsin helyett 0,1—0,5 pro dos. borban, 0,1 = 5 kr.

714 *Rp.* Papaini 2,0.

Aquae dest.

Glycerini aa 9,0.

MDS. 10%-os papainoldat.

Ecsetelésre.

1 frt 25 kr.

715 *Rp.* Papaini 3,0.

Div. in dos. aqu. No. 10.

DS. Napj. 3 × egy port

tokaji pohár borban fel-

oldva étkezés előtt.

1 frt 87 kr.

†H. **Papaveris somniferi capsulae s. capita.** (Papaveraceae.) Opiumalcaloidokat tartalmaz. Syrupus diacodii készítésére használtatik. 100,0 = 9 kr.

H. **Paraffinum.** Fehér, merev, kristályos, viasznemű, zsíros tapintatú, petroleumszagú, íztelen, 74—80° C.-nál olvadó tömeg; vízben nem, 35 r. víztelen és forró borszeszben odódik, aetherben, benzolban, zsíros és illó olajokban jól. Gyógyszerészeti technikában fontos szer. Néha kenőcsülkhöz vétélik mint alapanyag. 10,0 = 3 kr.

Paraffinum liquidum. Vaselineolaj. Petroleumgyártásnál mellékterményül nyerik a vaselinával együtt. Tiszta, olajos, szagtalan folyadék. Kenőcsülkhöz haszn. 10,0 = 3 kr. Velo készül az **Unguentum Paraffini.** 1 r. paraffinum solidum + 4 r. paraff. liquid. Haszn. mint a vaselináé. Az utóbbi jobb kenőcs-alapanyag.

†H. **Paraldehydum** ($C_4H_{12}O_2$). Színtelen, sajátos fűszeres és egyszersmind fojtó szagú folyadék. 10 sr. vízben oldódik; aetherrel, borszeszszel elegyíthető. Sedativum, hypnoticum chloralhydrat helyett. Szívre hatása alig van. Strychnin és más görcsokozó mérgek hathatós pharmacologicus ellenszere. Bels. sedativ adag 1,5—2,0 pro dos.; hypnoticus adag 3,0! pro dos. Ha alvás nem állana be, $\frac{1}{2}$ —1 óra múlva ismét ennyi adandó. Dos. maxim. pro die 6,0! Morphinnal néha sikerrel kombinálható. 1,0 = 4 kr.

716 Rp Paraldehydi 6,0.
Aqua dest. 100,0.
Syrup cort aurant. 20,0.
Olei Menthae pip. gtt. 2.
MDS. Este felét bevenni;
ha 30 percz alatt álom
nem jelentkezik, másik fe-
le is elfogyasztandó.

58 kr.

717 Rp. Paraldehydi
Rhum aa 10,0.
Ol. Citri. gtt. 5.
Aqua dest. 90,0.
Syrup simpl. 20,0.
MDS. $\frac{1}{2}$ részét egyszerre
bevenni, ha nem jön létre
alvás, ismét $\frac{1}{2}$ részt.

84 kr.

H. **Pasta Guarana.** l. Guarana.

Pelletierinum l. Granati Punicae cort.

H. **Pepsinum germanicum solubile.** Kevéssé tapadós, finom sárgásfehér por, sós savanyú ízű, nem vízszívó; vízben oldódik. Hatása (a peptonképzés) csak savanyú közegben jelentkezik. Bels. dyspepsia bizonyos alakjainál. Adag porban, pilulában, pastillákban 0,1—0,5—1,0 pro dos. étkezés közben vagy után. Egyidejűleg acid. hydrochlor. dilut. vagy acid. tartar. is rendelendő. 1,0 = 4 kr.

H. **Vinum Pepsini.** (Tartalmaz 40 gm. folyadékban 1,0 pepsint és 0,1 hig sósavat.) Adag étkezés után $\frac{1}{2}$ —1 tokaji pohárral. 10,0 = 14 kr.

I.

718

II.

Rp. Pepsini germ. 3,0.
 Sacchar. alb. 2,0.
 M. f. pulv. div in dos.
 aequ. No. 10.
DS. Étkezés után 1 port.
 Utána acid. hydrochlor. di-
 lut. I. II. 51 kr.

Rp. Acid. hydrochlor. dil. 10,0.
 Det. in vitro cum epi-
 stom. vitreo clauso.
S. Étkezés után 1/2 pohár víz-
 ben 5—8 cseppet.
 22 kr.

I.

719

II.

Rp. Pepsini germ. 0,5.
 Sacchar. alb. 2,0.
 M. f. pulv. div in dos.
 aequ. No. 10.
DS. Étkezés után 1 port.
 Utána acid. hydrochlor. dil.
 I. II.
 Csecsemőknek.
 41 kr.

Rp. Acid. hydrochlor. dil. gtt. 5—8.
 Aquae dest. 80,0.
 Syrup. simpl. 8,0.
MDS. Étkezés után 1 kk.
 v. gyk.
 Csecsemőknek.
 22 kr.

720 *Rp.* Pepsini germ. 10,0.
 Acid. hydrochlor. dilut. 1,5.
 Pulv. Gummi arab. 25
 Sacchar alb. aa qu. s.
 ut f. cum Aqua dest.
 gtt. nonnull. pastilli
 No. 30.
DS. Étkezés után 1 dbot.
 81 kr.

721 *Rp.* Pepsini germ. 5,0.
 Acid. hydrochlor. dil. 1,0.
 Tinct. Aurant. 5,0.
 Syrup. simpl. 20,0.
 Aquae dest. 200,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
 63 kr.

H. Petroleum rectificatum. Színtelen, híg, közömbös kémhatású, átható szagú, kesernyész, csipős ízű folyadék. Haszn. mint az aether petrolei, l. e cz. a. 100,0 = 15 kr.

H. Phenacetinum l. Acetphenetidin.

Phenocellum hydrochloricum. Sósavas amidoacetparaphenetidin. Fehér jegeczpor, 16 r. vízben oldódik. Antipyre-ticum, antineuralgicum, antirheumaticum, mint a phenacetin. Adag bels. porban v. oldatban 0,5—1,0 gm. pro dos. 3,0—5,0 gm. pro die 1,0 = 25 kr.

Phosphorus. Fehér, vagy sárgás, áttetsző rudacsókákban fordul elő. Főleg csontbántalmak esetében, nevezetesen rachitisnél, osteomalaciánál rendelik olajoldatban, emulsióban, pilulában. Bels. adag felnőtteknek 0,0005—0,001 pro dos. és 0,002—0,003 pro die, gyermekeknek 0,0002—0,0005 pro dos. és pro die. 1,0 = 2 kr.

722 Rp. Phosphori 0,02.
Mucil. Gummi arab.
Pulv. Tragacanthae
aa qu. s.
ut. f. l. a. pillul. No. 30.
Consp. pulv. Lycopod.
DS. 2—3-szor napj. 1 szemet.
Felnőtteknek,

50 kr.

724 Rp. Phosphori 0,01.
Olei Jecor. Aselli 100,0.
M. f. solutio.
DS. Napj. 1 kk.
Gyermekeknek rhachitis esetén.
57 kr.

723 Rp. Phosphori 0,01.
Olei Amygdalar. dulc. 30,0.
Pulv. Gummi arab.
Sacchar alb. aa 15,0.
Aquae dest. 40,0.
f. l. a. emulsio.
DS. Napj. 1 kk.
Gyermekeknek rhachitis esetén. 76 kr.

†† **H. Physostigminum salicylicum** ($C_{11}H_{21}N_3O_7$, H_2O). A calaburbab egyik hatóanyagának sója. Szintelen, vagy kissé sárgás jegeczekből áll. 150 sr. vízben és 12 sr. borszeszben oldható. A szemészetben használtatik mint myoticum becseppentések alakjában; oldat 0,02—0,05 : 10,0. Bels. ajánlották 0,0005—0,001! adagban tetanus, epilepsia, atropin és strychnin-mérgezés ellen, de nem vált be. Dos. maxim. pro die 0,003! 0,01 = 4 kr.
Picrotoxinum ($C_7H_{10}O$). Anamirta Cocculus (Menispermaceae) magvainak hatóanyaga. Szintelen, fénylő, szagtalan, igen keserű, mérges anyag; 400 sr. hideg vízben oldódik, meleg vízben, valamint borszeszben könnyen. Görcsokozó nagy méreg. Strychnin készítmények helyett haszn. Angliában, Amerikában körzeti hűdéseknél, sphincterhűdéseknél, éjjeli ágybavizelésnél; ajánlatos heveny morphinmérgezésnél is paraldehyddel kombinálva. Senator tuberculoticusok éjjeli izzadása ellen használta. Régen pediculosisnál, fejszörmőnél, prurigónál is alkalmazták kenőcsök, tincturák alakjában. Adag bels. oldatban, pilulában v. bőr alá fecskendve 0,0005—0,001 pro dos. 2—3-szor napj. Külsőleg felesleges, de veszélyes is (!). 0,1 = 10 kr.

725 Rp. Picrotoxini 0,01.
Aquae dest. 20,0.
M. f. solut.
DS. 15—20 cseppet egyszerre. Subcután 1 fecskendőben 0,0005 picrotoxin.
23 kr.

726 Rp. Picrotoxini 0,1.
Extr. et. pulv. Liquir. qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. c. pulv. Liquir.
DS. 1—2 pilulát este bevenni. Hyperhydrosis.
49 kr.

†† **Pilocarpinum hydrochloricum** l. Jaborandi fol.
H. **Pilulae ferratae**
H. **Pilulae Ferri-jodati** } l. Ferri praeparata.

H. Pilulae laxantes l. Aloe.**Piper methysticum s. Cava-Cava s. Kava.**

Kava. A gyökér bódító gyantás anyagokat tartalmaz; a Sandwich és Fidji szigetek benszülöttjei bódító italt készítenek belőle. Haszn. készítménye az

Extractum fluidum Kavae. Gonorrhoea, cystitis catarrh. eseteiben adag 30—60 csepp pro dos. 3—4 × napj. Kisérletek még nem kielégítő számúak. 1,0 = 2 kr.

Piperazinum hydrochloricum. $(C_2H_4)(NH)_2$, C_2H_4 . Szintelen, vízben jól oldódó jegesztük. Oldja a húgysavat és húgysavas sókat. Kőszvénynél, húgysavas diathesisnél 0,5—2,0 pro dos. és die szódavízben. 0,10 = 6 kr.

Piscidia erythrinae cortex. (Leguminosae.) Hatóanyaga a piscidin $(C_{22}H_{34}O_8)$. Amerikában mint anodynum, sedativum, hypnoticum szerepel. Opim helyett fájdalomk, köhögés, dysmenorrhoea, álmatlanság eseteiben. Adag a kéreg porából bels. 0,5—1,0 pro dos. 3—5 × napj. 10,0 = 4 kr., 10,0 = 5 kr. (pulv.) Czélszerű készítményei az

Extractum Piscidia fluidum. Adag 0,3—0,5—2,0 pro dos. 3—5 × napj. 1,0 = 2 kr.

Tinctura Piscidia. Gyengébb az előbbinél. 2—3 ór. 30—40 csepp. 10,0 = 8 kr.

727 Rp. Extr. Piscidia fluidi 10,0.

Syrup. cort. Aurant.

MDS. 1—3 × napj. 1 kk.
40 kr.

728 Rp. Extr. Piscid. fluidi 10,0.
Aqua Menthae pip.

Syrup. simp. 120,0.
MDS. 3—4 × napj. 1 evők.
Dysmenorrhoea.
65 kr.

729 Rp. Pulv. cort. Piscidia 0,5.

Det. in caps. aml.

Dent. tal. dos No. 10.

S. 3—5 × napj. 1 dbot.

63 kr.

730 Rp. Tinct. Piscidia

Aqua Amygdalar.

amar. aa 20,0.

Det. in vitro coarul.

S. 2 ór. 20—40 cseppet kis pohár cukros vízben.

47 kr.

H. Pix liquida. Erdei bükkfából száraz átpárlás útján állítatik elő; folyékony, nyúlós, víznél nehezebb, olajos, feketebarna, félig átlátszó, füstös- kreosotszagú, undorító, keserű ízű. Küls. haszn. bőrgyógyászatban idült bőrbántalmaknál (eczema, psoriasis, prurigo, pityriasis, herpes tonsurans, favus, scabies). Tisztán v. inkább kenőcsök, linimentumok alakjában szőrecsettel beecsetelendő. Bels. nem, helyette a kreosot czélszerűbb. 100,0 = 9 kr.

731 *Rp.* Picis liqu. 60,0.
 Cretae albae 20,0.
 Sapon. kalini venal.
 Spiritus aa 120,0.
 M. f. linim.
D.S. Ecsetelésre. (HERBA.)
 Scabies.
 85 kr.

732 *Rp.* Picis liqu. 5,0—10,0.
 Vaselineae 15,0.
 M. f. ungu.
D.S. Külsőleg.
 31 kr.

733 *Rp.* Picis liqu. 20,0.
 Aetheris 10,0.
M.D.S. Külsőleg ecsetelésre.
 18 kr.

Pix liquida betulina l. Ol. Rusci.

†H. **Plumbum aceticum basicum solutum.** Ólom-eczet ($Pb, C_2H_3O_2$). Szintelen, átlátszó, édeses, később fanyar ízű folyadék; kémhatása lúgos. Causticum. Bels. nem. Küls. készítményei. 10,0 = 3 kr.

H. **Aqua plumbica.** (Plumb. acet. bas. sol. 1 r., + Aqua dest. 50 r.). Külsőleg borongatások alakjában hűtő, összehúzó, gyuladást, elválasztást csökkentő. 100,0 = 10 kr., 1000,0 = 70 kr.

H. **Aqua vegeto-mineralis Goulardi. s. Aqua Goulardi.** (Plumb. acet. bas. sol. 2 r., Spir. dil. 5 r., Aqua font. 100 r.). Külsőleg haszn. mint az aqua plumbica. 100,0 = 6 kr., 1000,0 = 50 kr.

†H. **Plumbum aceticum depuratum s. Saccharum Saturni** [$Pb(C_2H_3O_2)_2, 3H_2O$]. Szintelen, áttetsző jegecsek-ből áll; légen elmállik. Íze eleinte édes, később összehúzó, fém-s; kémhatása gyengén savas. 1.75 sr. vízben, 8 sr. borszeszben oldó-dik. Küls. adstringens; szemcseppeknek 0,05: 10,0, szemvíznek 0,05—0,1: 100,0, húgycsőbe fecskendésre 0,1—0,3: 100,0, hólyag-mosásra 0,05—0,1: 100,0. Bels. mint adstringens, stypticum, haemate-mesis, melaena, haemoptoe, vesevérzések eseteiben; czélszerű phthisicusok izzadása, valamint azok csillapíthatlan hasmenése ellen is. Adag porban, pilulában 0,01—0,03—0,1! pro dos. 3—4 × napj. Dos. maxim. pro die 0,5! 10,0 = 4 kr.

H. **Unguentum Plumbi acetici.** Összehúzó, gyuladást csökkentő. 10,0 = 5 kr.

734 *Rp.* Plumb. acet. depur. 0,05.
 Aquae dest. 10,0.
M.D.S. Szemcseppek.
 Conjunct. catarrh.

23 kr.

735 *Rp.* Plumb. acet. depur. 0,2.
 Aquae Rosar. 100,0.
 Tinct. Opii simpl. 1,0.
M.D.S. Húgycsőbe fecsken-désre.
 Gonorrhoea. 40 kr.

736 *Rp.* Plumb. acet. depur.
0,1—0,3.

Morphin. hydrochlor
0,05—0,1.

Sacchar. alb. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

Haematemesis, haemop-
toe, diarrhoea. 43 kr.

737 *Rp.* Plumb. acet. 0,15—
0,25.

Sacchar. alb. 2,0.

M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 5.

DS. Oedema pulmon, es-
tén 1—2 port szűkség
szerint.

26 kr.

†**H. Plumbum carbonicum s. Cerussa** [2*PbCO*.,
Pb(HO)]. Tiszta fehér, nehéz por v. darabok. Vízben nem oldható.
Bels. nem. Küls. hintóporban szárító. Főleg készítményei haszn.
10,0 = 3 kr.

H. Emplastrum Cerussae. 1, Emplastra.

H. Unguentum Cerussae s. Unguentum album.

Szárító kenőcs, 10,0 = 4 kr.

**H. Plumbum hyperoxydatum rubrum s. Mi-
nium.** (*Pb, O*). Nehéz, élénk vörös színű por; vízben nem old-
ható. 10,0 = 2 kr. Haszn. az

H. Emplastrum Minii adustum készítéséhez 1. Em-
plastra.

†**H. Plumbum oxydatum s. Lithargyrum** (*PbO*).
Vörössárga porból v. pikkelyalakú olajokból áll. Vízben nem
oldható. Készítményei haszn. 10,0 = 3 kr.

**H. Emplastrum diachylon sim-
plex**

**H. Emplastrum diachylon com-
positum**

} 1. Emplastra.

H. Unguentum diachylon dr. Hebra. (Empl. dia-
chyl. simpl. 100 r. Ol. Sesami 100 r. Ol. Lavand. 5 r.) Fedő,
szárító kenőcs, különösen nedvező bőrbántalmak ellen haszn.
10,0 = 7 kr.

†**H. Podophyllum.** *Podophyllum peltatum* (Berberideae)
gyöktörzsének hatóanyaga. Gyantás anyag. Sárgás por, v. laza,
könnyen szétdörzsölhető, sárgás, v. barnásszürke, alakatlan tömeg,
mely borszeszben, forró kalilugban teljesen, aetherben részben
oldódik. Kis adagban laxans, nagy adagban drasticum. Kolikát
okoz. Laxans adag porban 0,02—0,05 pro dos., drasticus adag
0,1. Obstip. habit.-nál elegendő naponta reggel v. este 0,01 pilu-
lában. 0,1 = 1 kr.

738 *Rp.* Podophyllini 0,3.

Extr. Belladonnae 0,1.

Pulv. rad. Liquirit.

Extr. Taraxaci aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Lycopod.

S. Reggel v. este 1—2 sze-
met, Obstip. habit. 44 kr.

739 *Rp.* Podophyllini

Extr. Hyosciami

aa 0,2.

Sacchar. alb. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 1—2 port egyszeri
hashajtásra. 43 kr.

740 Rp. Podophyllini	0,2.
Spirit. Vini dil.	1,5.
Syrup. Rubi Idaei	60,0.

MDS. 3 ór. 1 kk. — gyk.

Nagyobb gyermeknek obstipatio esetén.
43 kr. (REITZ.)

H. Potio Magnesiae citricae effervescens s. Limonada solvens. Enyhe laxans nők, gyermek számára. Felnőtteknek egész üveggel, 'gyermeknek kor szerint $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ üveg-
gel. Egy üveg = 60 kr.

H. Potio Riveri l. Kalium carbonicum.

H. Pulpa Prunorum. Izjavító. Electuariumok alapanyaga.
Indifferens. 10,0 = 4 kr.

H. Pulpa Tamarindorum. l. Tamarindus.

H. Pulvis aërophorus. Pezsgő por. (Kék papirban natr. hydrocarb. 2,0, fehér papirban acid. tartar. 1,5.) Hűtő, hányást csillapító. Dos. 1 = 3 kr. Dos. 12 = 35 kr.

†**H. Pulvis Doveri** l. Opium.

H. Pulvis aerophorus Seidlitzensis. (Kék papirban kalium natrio-tartaricum 10,0 + natr. hydrocarb. 3,0, fehér papirban acid. tartar. 3,0.) Enyhe laxans. Dos. 1 = 8 kr. Dos. 12 = 90 kr.

H. Pulvis gummosus l. Gummi arabicum.

H. Punica Granatum l. Granati Punicae cort. rad.

Pyoktanin s. Methylviolette. Anilinszinek bizonyos arányú keveréke. Vízben kékes ibolyaszinben oldódik, de nehezen. Stilling szerint antisepticum és genyét pusztító hatású. Haszn. rosszindulatú, nem műtethető tumorokba fecskendésre, valamint gümős fekélyek kezelésére. Adagok küls. 1:1000—5000 oldatban, 0,1—1,0:100 hintőporban. 1,0 = 12 kr.

Pyridinum (C_4H_5N). Állati anyagok száraz átpárlási terménye. Tiszta, szintelen, illó, kellemetlen szagú folyadék, égető ízű. Víz-
zel, borszeszszel, aetherrel, zsirokkal keverhető. Antiasthmaticum. (Főleg asthma nervosum.) A légzési központ ingerlékenységét s a reflexingerlékenységet lefokozza. Alkalmazás: 3,0—5,0 (1,0 = 28 csepp) pyridin tányérra üntendő s párái belélegzendők 3 × napj. 15—30 perczen át. Szívbántalmaknál, elgyengült betegeknél ne alkalmazzuk. 1,0 = 3 kr.

†**H. Pyrogallolum** l. Acidum pyrogallicum.

Quassiae lignum. (Quassia amara. Simarubeae.) Hatóanyaga quassin (keserű anyag). Amarum. Haszn. mint a rad. Gentianae. Adag bels. decoct. v. maceratum 5,0—10,0:150,0, mely tokaji poharanként fogasztandó. Keserű theakeverékek alkatrésze. 10,0 = 2 kr.

Extractum Quassiae. Vizes kivonat. Adag porban, pilu-
lában, oldatban 0,1—0,5 pro dos. 2—3 × napj. 1,0 = 6 kr.

Quebracho cortex. (Aspidosperma Quebracho. Apocynae.)
Quebracho blanco. Főhatóanyagai aspidospermin és quebrachin

($C_{21}H_{26}N_2O_4$), alkaloidok, melyek a légzőközpont ingerlékenységét csökkentik; ezenkívül csersav. Antidyspnoeicum. 10,0 = 3 kr. Haszn. készítménye az

Extractum fluidum Quebracho. (Penzoldt.) 10 gm. quebracho-kéreg 100 gm. töm. borszeszszel 8 napig pállítatik, a szilárdék vízfürdőn szárazra bepároltatik, s 20 gm. vízben oldatik. leszűretik. Adag ezen kivonatból 1—2 kk. 2—4 × napj. 1,0 = 2 kr.

Aspidospermin. ($C_{21}H_{20}N_2O_2$). Szintelen, vékony jegesztűk; alkoholban, benzinban, chloroformban oldhatók, hideg vízben nehezen. Haszn. mint a cort. quebracho. Adag bels. 0,001—0,002 gm pro dos. napj. 3szor, főleg sósavas sója alakjában, tehát aspid hydrochlor. 0,01 = 6 kr.

H. Quercus cortex. (Quercus robur. Cupuliferae.) Hatóanyagai csersav és keseranyag (quercin). Adstringens. Adag bels. decoct. 1 : 10. ritkán; helyette inkább tannint rendelünk. 100,0 = 8 kr. vagy 10,0 = 4 kr. (subt. pulv.) (ruditer tusus). 100,0 = 16 kr., 1000,0 = 1 frt 20 kr.

H. Quillajae cortex. (Quillaja Saponaria. Rosaceae.) A senegagyökér pótszere. Hatóanyagai mint a senegának u. i. quillajasav és sapotoxin, melyekből azonban 5-ször több van benne, mint senegában. Expectorans. Vigyázat (!), mert helybelileg erősen izgat; ellenjavallják alkalmazását gyomor-, bélbántalmak, garat-fekélyek, valamint erős köhögési inger. Adag bels. decoct. 3,0—4,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. felnőtteknek, 1,0 : 100,0 nagyobb gyermeknek. Csecsemőnek s 1—3 évesnek nem. 10,0 = 2 kr. pulvis 10,0 = 4 kr.

741 Rp. Decoct. cort. Quillajae
e 3,0—4,0.

l. a. p. ad. colat. 150,0.

Natrii hydrocarb. 3,0.

Syrup. cort. Aurant.

10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

43 kr.

742 Rp. Pulv. cort. Quillajae

1,5.

Pulv. Doveri 1,0,

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 3 × napj. 1 port.

43 kr.

H. Ratanhae radix. (Krameria triandra. Polygaleae.) Hatóanyaga csersav. Adstringens. Küls. helyette tannin haszn. Bels. adag decoct. 7,0—10,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. mint antidiarrhoeicum, gyakran opium-készítményekkel összekötve. 10,0 = 4 kr. vagy 10,0 = 9 kr. (subt. pulv.).

H. Extractum Ratanhae depuratum. Beszárított vizes kivonat. Adstringens. Küls. száj-, torokviznek 2—5%-os oldatok, kenőcsnek 1 : 5. Bels. porban, oldatban 0,4—1,0 pro dos. 3—5 × napj. 1,0 = 4 kr.

H. Tinctura Ratanhae. Küls. mint adstringens ecsetelésekre; bels. 15—30 csepp pro dos. 10,0 = 5 kr.

743 Rp. Decoct rad. Ratanhae
e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Opii simpl. 0,5.
Syrup. Cinnamomi 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Diarrhoea.
42 kr.

745 Rp. Infus. sol. Sálviae 15,0.
l. a. p. ad colat. 300,0.
Extr. Ratanhae dep.
6,0.
Spirit. aromat. 20,0.
MDS. Száj-, torokviz.
Adstrigens. 76 kr.

747 Rp. Tinct. Ratanhae gtt. 10.
Tinct. Opii simpl.
gtt. 1—2.

Aquae dest. 80,0.
Syrup. simpl. 8,0.
MDS. 3 ór. 1 kk.
Csecsemőknek bélhurut
esetén. 25 kr.

744 Rp. Extr. Ratanhae dep. 4,0.
Extr. Opii 0,05.
Elaeosacch. Menthae 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
Diarrhoea. 64 kr.

746 Rp. Extr. Ratanhae dep.
0,2—0,4.
Tinct. Opii simpl. gtt. 1.
Aquae dest. 80,0.
Syrup. cort. Aurant.
8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.
Csecsemőknek bélhurut
esetén. 30 kr.

748 Rp. Tinct. Ratanhae
Tinct. Myrrhae aa 20,0.
MDS. Foghús ecsetelésére.
34 kr.

749 Rp. Tinct. Ratanhae
Aquae dest. aa 10,0.
MDS. Külsőleg ecsetelésre
Gyermekeknek gingivitis ulce-
rosa esetén.
21 kr.

†**H. Resina Jalapae.** l. Jalapae tubera.

H. Resina Pini burgundica. Tisztított fenyőgyanta. Tapa-
szok készítéséhez szükséges a gyógyszerészeti technikában. 100,0 =
5 kr.

Resorbinum. Jó kenőcsanyag, különösen higanyos bedőrszülő
gyógymód alkalmával. Összetétele: lanolin, ol. amygdal. dulc.
cera, gelatina, sapo. 10,0 = 12 kr.

†**H. Resorcinum** ($C_6H_6O_2$). Majdnem színtelen, vagy kissé
sárgás, hasáb- vagy lemezalakú jegecekből áll. Sajátságos gyenge
szagú s kellemetlen, karczó, édes ízű. Vízben, borszeszben,
aetherben könnyen oldódik. Eleinte mint antipyreticum szerepelt,
ma ezen használata obsolet. Mint antisepticum jól használható az
acid. carbol. pótszeréül, mert az utóbbinál kevésbé mérges. Seb-
kezelésben 0,5—5%-os oldatai haszn. Pora lágy fekélyek edzésére
jól haszn. Hólyagmosásra 3—6%-os oldatok. Bels. sarcina ventri-
culi, vagy a gyomorban székelő erjedési folyamatok ellen 0,5—1,0

pro dos. 3—4 $\times$ napj. oldatban. vagy caps. amylaceában. Dos. maxim sing. 3,0! pro die 10,0! Resorcin-kütszerek jól használhatók. 1,0 = 4 kr.

750 *Rp.* Resorcini 10,0.
Aqua dest. 300,0.
M. f. solutio.
DS. Hólyagmosásra. Langyosan használandó.
80 kr.

751 *Rp.* Resorcini 5,0—10,0.
Div. in dos. aequ. No. 10.
Det. in caps. amylac.
DS. 3 $\times$ napj. 1 capsulát.
80 kr.

H. Rhei radix. (Rheumfajok gyökere. Polygoneae.) Főalkatrészei chrysophan ($C_{21}H_{18}O_{10}$), chrysophansav ($C_{15}H_{10}O_8$), phaeoretin ($C_{16}H_{16}O_7$), emodin ($C_{15}H_{10}O_9$), rheumcsersav ($C_{16}H_{16}O_{11}$) stb. Kis adagban (0,1—0,5 pro dos. napj. 3—5-ször) adstringens, tonicum, stomachicum, nagy adagban (1,0—2,0 pro dos) laxans. Adagolás porban. 10,0 = 19 kr. (sciss.), 10,0 = 20 kr. (subt. pulv.).

H. Extractum Rhei. Beszárított vizes kivonat. Haszn. mint a radix. Kis adag 0,1—0,2 pro dos. 3—5 $\times$ napj., nagy adag 0,5—1,0 pro dos. porban, pilulában, oldatban. Gyakori alkatrésze hashajtó piluláknak aloeval, jalapával együtt. 1,0 = 8 kr.

H. Tinctura Rhei Darelli s. vinosa. Főleg mint tonicum, stomachicum. Adag 3 $\times$ napj. 1 kk. 10,0 = 11 kr. 100,0 = 90 kr.

H. Infusum Rhei cum Natrio carbonico. Laxans. Adag ór. 1—2 evők. a székürítés beálltáig 10,0 = 4 kr.

H. Syrupus Rhei. Gyermekeknek kk. vagy gyk. hashajtó, különben mint ízjavító haszn. hashajtó folyadékokhoz. 10,0 = 4 kr.

752 *Rp.* Pulv. Rhei
Extr. Rhei aa 5,0.
Mucil. Gummi arab. qu.
s. ut f. pil. No. 50.
Consp. pulv. Lycopod.
DS. Beggel, esto 1—2—3
szemet. Obstip. habit.
88 kr.

753 *Rp.* Pulv. Rhei 1,0.
Extr. Nucis vom. 0,1.
Natrii sulfur. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 3—4 $\times$ napj 1 port.
Idült gyomor- v. bélhurut.
43 kr.

754 *Rp.* Pulv. Rhei 1,0.
Kalii hydrotart. 4,0.
Sacchar alb. 10,0.
M. f. pulv. det in scat.
S. 4 $\times$ napj. 1 késhegygel.
Nagyobb gyermeknek icterus catarrhal esetén.
24 kr.

755 *Rp.* Pulv. Rhei 0,5.
Natrii hydrocarb. 1,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
3—8 éves gyermeknek
icterus catarrh. esetén.
43 kr.

756 *Rp.* Extr. Rhei
 Extr. Gentianae
 Extr. Ferri pomati
 aa 3,0.
 M. f. pilul. No. 50.
 Consp. pulv. Cinna-
 momi
D.S. Napj. 3 × 3—5 szemet.
 Tonicum. 68 kr.

757 *Rp.* Tinct. Rhei Darelli 10,0.
 Syrup. Rhei 30,0.
M.D.S. 2 ór. 1 kk., — 1 gyk
 míg hashajtás bekövet-
 kezik.
 1—2 éves gyermeknek
 hashajtó. 37 kr.

758 *Rp.* Infus. Rhei cum Natr. carb.
 100,0.
 Olei Menthae pip. gtt. 2.
 Syrup. Rhei 20,0.
M.D.S. Ór. 2 evőlk. míg hashajtás
 beáll. Enyhe laxans. 68 kr.

H. **Ricini semina.** (*Ricinus communis*. Euphorbiaceae.) Haszn. az ol. ricini előállítására.

H. **Roob Juniperi** l. *Juniperi fructus*.

H. **Roob Sambuci** l. *Sambuci fructus*.

H. **Rosae petala.** (*Rosa centifolia*. Rosaceae.) Haszn. az aqua rosar., ol. rosarum és mel. rosatum előállítására. 10,0 = 5 kr., 10,0 = 8 kr. (pulv.).

H. **Rosmarini folia.** (*Rosmarinus offic.* Labiatae.) Haszn. az ol. rosmarini előállítására. 10,0 = 1 kr.

Rubidium ammonium-bromid. (*Rb Br.* (*NH*), *Br.*). 100 sr.-ben van 36 sr. rubid. bromid és 64 sr. ammon. brom. Febér v. kissé sárgás, jegezes por; ize kezdetben kissé hűtő, majd csipős-sós. Egyenlő sr. vízben oldódik. Bromkali pótszere. Antiepilepticum. (Laufenauer). Enyhe sedativ és hypnoticus hatása is van. Adag bels. oldatban 4,0—7,0 pro die mint antiepilepticum; többszörre bevenni. Insomnia ellen 4,0—5,0 pro die és pro dos. 1,0 = 22 kr.

759 *Rp.* Rubidii Ammonii bro-
 mati 6,0.

Aquae dest. 100,0.

Syrup. simpl. 20,0.

M.D.S. Egy napra. Egy
 evőkanál 1 gmot tartal-
 maz a készítményből.

Epilepsia.

1 frt 68 kr.

760 *Rp.* Rubidii Ammonii bro-
 mati 5,0.

Aquae dest. 50,0.

Syrup. simpl. 15,0.

M.D.S. Este egyszerre
 bevenni. Insomnia.

1 frt 41 kr.

†H. **Sabadillae semina.** (*Schoenocaulon offic.* Melanthaceae.) Hatóanyaga veratrin. Bels. nem. Küls. pediculosis ellen kenőcs-
 alakban. 10,0 = 6 kr. (pulv.) Hiv. kenőcs az

H. **Unguentum Sabadillae s. Ungu. contra
 pediculos.** (50 : 200) 10,0 = 7 kr.

†**H. Sabinae summitates.** (Sabina offic. Coniferae.) Hatóanyaga az oleum sabinae. Kenőcsalakban (1 : 1—5) izgató, bőrvörösítő. Bels. Infus. 4,0 : 150,0 diureticum. Ritkán haszn. Dos. maxim. sing. 1,0! pro die 2,0! 10,0 = 2 kr. vagy 10,0 = 5 kr. (pulv.).

Saccharinum. ($C_7H_{12}SO_4N$). Fahlberg-féle. Fehér alaktalan, kevésbé keserűmandula szagú, rendkívül édes por, hideg vízben nehezen, forróban könnyen oldódik, borszeszben, aetherben szintén. Nem tápszer, a cukrot nem pótolhatja. Izjavító, mennyiben 280-szor oly édes, mint a sacchar. alb. A szervezetet változatlanul hagyja ol. Diabetikusok étkeinek, italainak édesítésére alkalmas, ép úgy chinakészítmények ízének javítására is. Készítenek chininum saccharinicum-ot (36 r. saccharin + 64 r. chinin), morphinum saccharinicumot (61.4 r. morphin + 39.1 r. saccharin). 1,0 = 18 kr.

761 Rp. Saccharini 3,0.
Natr. carb. 2,0.
Manniti 60,0.
M. f. l. a. pastilli
No. 100.

DS. Egy pastilla egy csésze kávé, thea stb. édesítésére elegendő. Diabetes mellitus. 1 frt 97 kr.

762 Rp. Saccharini 0,2.
Antipyrini 10,0.
Natr. bicarb. 0,1.
Infus. Coffeae 150,0.

DS. napj. 2—3 evőkl.
Diabetes mellit.
1 frt 47 kr.

763 Rp. Saccharini 10,0.
Natrii carb. 11,0.
Aqueae dest. 1000,0.

MDS. Saccharin szörp.
2 frt 32 kr.

764 Rp. Saccharini 1,0.
Spir. Vini 50,0.

MDS. 1 kávéskanállal $\frac{1}{2}$ pohár vízre. Ezzel napj. 5 × ecsetelni. Soor.
44 kr.

H. Saccharum album. Izjavító, vivőanyag. 100,0 = 11 kr. (pulv.) 10,0 = 2 kr.

H. Saccharum lactis. Tejczukor. Haszn. mint a sacchar. alb. Különösen vízszívó porokhoz célszerű, mint vivőanyag 10,0 = 5 kr.

Sal Alembroth. s. Ammonium higanychlorid. (NH_4), $HgCl_2 + 2H_2O$. Vízben nehezen oldható, légen elmalló, szintelen jegeczek. Lister a sublimát helyett használta antisepticus sebkészítésnél. Oldatok mint a sublimatból.

H. Sal thermarum Carolinarum l. Natrium sulfuricum.

H. Salep tubera. (Különböző Orchis-fajok gumója.) Hatóanyagai növényi nyák, keményítő. Decoctum 0,5—1,0 : 100,0 bevonó és jó vehiculum csipős, keserű, savanyú anyagok számára. 10,0 = 8 kr. v. 10,0 = 10 kr. (subt. pulv.).

765 Rp. Decoct. tub. Salep e 1,0.
 l. a. p. ad colat. 140,0.
 Tinct. Opii simpl. 1,0.
 Syrup. Ipecac. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
 Diarrhoea.
 40 kr.

766 Rp. Decoct. tub. Salep e 0,4.
 l. a. p. ad colat. 80,0.
 Aluminis 0,4.
 Tinct. Valerian. gtt. 10.
 Syrup. simpl. 8,0.
MDS. ór. 1 kk.
 Csecsemőknek heveny gyomor-, bélhurtt esetén, ha collapsus jelentkeznék.
 42 kr.

Salacetolum. (Salicylacotol). Szintelen jegeztük. Keserű ízű vízben nehezen oldh. Belekben salicylsav hasad le belőle. Hatása, haszn. bels. mint a salolé. Adag bels. felnőttnek porban 2,0—3,0 pro dos. napj. többször. Gyer. 0,3—0,5 pro dos. 1,0 = 22 kr.

Salicylamidum. ($C_6H_4.OH.CONH_2$). Szintelen, táblás jegczek; hideg vízben nehezen, melegben könnyen oldh. A szervezetben salicylsav hasad le belőle. Antirheumaticum és analgeticum mint a salicylsav. Adag bels. porban. 0,15 ór. vagy 0,253 ór. Pro die 1,0. 1,0 = 12 kr.

†H. **Salipyrin.** Salicylsavas antipyrin. ($C_{11}H_{12}N_2O.C_6H_5O_2$). Fehér, jegezes, szagtalan, tintaízü por; vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Antipyreticum, antineuralgicum. Adag bels. 0,5—2,0 gm. pro dos. napj. többször. 1,0 = 8 kr., 10,0 = 65 kr.

†H. **Salolum** ($C_{11}H_{10}O_2$). Salicylsavas phenylaether. Fehér, jegezes, vízben majdnem oldhatlan, csaknem íztelen, aromaticus szagú por. Borszeszben, aetherben, zsíros olajokban könnyen oldható. Gyomorból nem szívódik fel, a bélben salicylsavvá és phenollá esik szét. Hintőpor, v. olajos oldat, v. kenőcs alakjában, v. borszeszes oldatban desiniciens. Főleg mint a salicylsavas natrium pótszere használtatik polyarthrititis rheumatica, rheumatismus musculorum acuta, neuralgiák eseteiben, azonkívül mint antipyreticum, nemkülönbön mint desiniciens bélhurutoknál, midőn a bélben nagyfokú rohadási folyamat áll fenn. Jó hatású bels. cystitis catarrh. és gonorrhoea, pyelitis catarrh. eseteiben is (Feilchenfeld). Kellemetlen mellékhatásai vannak, de csekélyebb mérvben, mint a natr. salicyl-nak. Adag bels. porban 1,5—2,0 pro dos. 3—5 × napj. felnőtteknek. 0,3—0,5 pro dos. 3—5 × napj. gyermekeknek. Küls. poralakban, v. talcummal, amylummal (1—2: 10) hintőpornak, olajjal v. kenőccsel (1: 10—20) ecsetelésre, bekenésre, száj-, torokvíznek 5—10%-os borszeszes oldatból kávéskanálnyi 1 pohár langyos vízbe. 1,0 = 4 kr. 10,0 = 35 kr.

767 Rp. Saloli 5,0.
 Amyli 50,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. Hintőpor. (SAHLI.)
 Fekélyekre, decubitusra.
 49 kr.

768 Rp. Saloli 3,0—4,0.
 Ol. Sdsami 40,0.
 M. f. linini.
DS. Külsőleg. (SAHLI.)
 Eczema. Pruritus.
 17 kr.

769 Rp. Saloli 10,0.
Olei Menthae pip. gtt. 2.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
Det. in chart. cerat.
S. 1—2 ór. 1 port. (SAHLI.)
 80 kr.

771 Rp. Saloli 10,0.
Gummi arab. 5,0.
Aquae dest. 200,0.
M. f. l. a. emuls.
DS. Külsőleg. Gonorrhoeá-
nál húgycsőbe fecsk. 3 ×
napi.
 73 kr. (SAHLI.)

773 Rp. Saloli 0,5—5,0.
Spirit dil. 100,0.
Tinct. Coccionell. 3,5—5,0.
Ol. Rosar. gtt. 1.
Ol. Menthae pip. gtt. 2.
MDS. Száj- és torokvízhez. Egy
küvéskan. 1 pohár vízre.
 49 kr.

770 Rp. Saloli 5,0
Amyli 0,5.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
Comprimantur.
DS. 1—2 ór. 1—4 darabot.
 80 kr. (SAHLI.)

772 Rp. Saloli 6,0.
Spirit. dil. 100,0.
MDS. Külsőleg. Egy pohár
langyos vízbe 1 kávés-
kanállal. Száj-torokvíznek,
stomatitis, angina esetei-
ben. (O. SEIFERT.)
 54 kr.

Salophenum. (Acetparamidosalol). Fehér, szag- és íztelen, vízben nem old. por. A bélben salicylsavra és acetylparamidophenolra hasad. Haszn. mint a salolé és natr. salicylicumé. 51% salicylsav van benne. Adag pro dos. 1,0 napj. 4—6-szor porban. 1,0 = 18 kr.

H. Salviae folia. (Salvia offic. Labiatae.) Hatóanyagai illó olaj és csersav. Gyenge adstringens. Leginkább száj- és torokvíznek. Infus. 1: 10. 10,0 = 3 kr. 100,0 = 20 kr. v. 10,0 = 5 kr. (pulv.)

H. Sambuci cymae s. flores. (Sambucus nigra. Caprifoliaceae.) Hatóanyaga illatos olaj. Diaphoreticum. Infus. 1: 10. 10,0 = 3 kr. 100,0 = 20 kr.

H. Sambuci fructus. Bolőle készül a

H. Roob sambuci. Izjavító, electuariumok alapanyaga
 10,0 = 4 kr.

Santali ligni oleum l. Oleum Santali ligni.

†**H. Santonium** l. Cinae flores.

Sapones officinales.

H Sapo albissimus droguistarum. A sapo szegediniensis helyett. 100,0 = 15 kr. v. 10,0 = 4 kr. (pulv.)

H. Sapo kalinus albus. Kenőcsszerű, fehér, v. kissé sárgás-színű, szagtalan; meleg vízben és szeszben lúgos hatással oldódik.

Bőrgyógyászatban mint bőrizgató, pörköket oldó, antiparasiticus hatású szer haszn. Külsőleg bedörzsölések, mosások alakjában seborrhoea, psoriasis, eccema chron., pytiriasis versicol., herpes tonsurans, favus, scabies eseteiben tisztán v. kenőcsökben. (L. o l cadini és pix liquid.) Bels. nem. 10,0 = 7 kr.

H. Sapo kalinus venalis s. viridis. Szegénygyakorlatbau v. fürdőklöz. 100,0 = 12 kr.

H. Sapo medicinalis s. amygdalinus. Natronszappan, mely éles mandulaolajjal készül. Küls. haszn. a bőr tisztán tartására. Bels. hashajtó pilulákhoz. 10,0 = 8 kr. v. 10,0 = 13 kr. (pulv.).

H. Sapo Picis. Natronszappan, mely pix liquidát tartalmaz Bőrgyógyászatban haszn. a bőr tisztogatására ott, ahol a kátrány különben is javulva van. 10,0 = 8 kr.

Sapo sulfuratus. Natronszappan, mely kénalkalit tartalmaz. Bőrgyógyászatban haszn. a bőr tisztogatására ott, ahol a kénalkali különben is javulva van. 10,0 = 10 kr.

H. Sapo venetus. Natronszappan, mely faolajjal készül. 100,0 = 15 kr. v. 10,0 = 4 kr. (pulv.).

H. Sarsaparillae radix. (Különböző forróövi amerikai smilax-fajok gyökerei.) Hatóanyagai smilacin v. parillin. Csekély értékű diureticum, diaphoreticum. Adag bels. decoct. 10,0—30,0: 250, egy nap alatt elfogyasztani. 10,0 = 7 kr. 100,0 = 50 kr. Belőle készül:

H. Decoctum Zittmanni fortius. Egyszerre 8 üveg (1000 gmos) rendelendő. Antidyscraticum, antisiphiliticum. Adag reggel melegen $\frac{1}{2}$ —1 üveggel, napközben vagy este a gyengébb decoctumból (l. köv.) szintén $\frac{1}{2}$ —1 üveggel. A gyógy mód 2—4 hétig tart. 8 üveg = 10 frt 20 kr.

H. Decoctum Zittmanni mitius. Egyszerre 8 üveg (1000 gmos) rendelendő, használatát l. fent. 8 üveg = 7 frt 60 kr.

774 Rp. Rad. Sarsaparillae
Ligni Guajaci
Ligni Sassafras aa 25,0.
Aquae font. 500,0.
Macera per 24 horas,
dein coque ad reman.
250,0.

DS. Délelőtti 3-szorra elfogyasztani.

Decoct. Zittmanni helyett.
75 kr.

775 Rp. Rad. Sarsaparillae 50,0.
Aquae fontis 500,0.
Macera per 24 horas,
dein coque usque ad reman.
300,0.
adde

Aquae laxat. viennens.
Syrupi mannati aa 40,0.

DS. Egy nap alatt elfogyasztani.

Decoct. Zittmanni helyett.
1 frt 11 kr.

†**H. Scillae bulbus.** (Scilla maritima. Asphodeleae.) Hatóanyagai scillitoxin, scillipicrin, scillin; a két előbbi oly hatású mint a digitoxin; scillin a szívre nem hat, hanem hánytató hatású.

Diureticum, némely egyéneknél (gyermekek) emeticum. Főleg készítményei haszn. 10,0 = 1 kr.

†H. **Scilla sicca**. (Összemetélt szárított tengeri hagymalevelek.) Bels. adag porban, pilulában, infusumban 0,02—0,2! pro dos. 3—5 × napj. Dos. maxim. pro die 1,0! 10,0 = 4 kr. 1,0 = 1 kr. (pulv.).

†H. **Extractum Scillae**. Dextrinnel beszárított borszeszes kivonat. Bels. adag porban, pilulában, 0,02—0,2! pro dos. 3—4 × napj. Dos. maxim. pro die 0,8! 1,0 = 3 kr.

†H. **Acetum Scillae**. Adjuvans diureticus szerekekhez. Bels. adag 20—30 csepp pro dos. 10,0 = 1 kr.

H. **Oxymel Scillae**. Adjuvans diureticus v. hánytató szerekekhez. Kis gyermekek 1—2 kk-tól már hánynak. 10,0 = 4 kr.

776 Rp Scillae sicca 3,0.
Folior. Digitalis 6,0.
Baccar. Junip. 30,0.
Kalii acet. sol. 20,0.
Spir. diluti 50,0.
Vini albi gener. 400,0.
Macer. per 12 dies et
colat. express. filtra.

DS. Vinum diureticum. Or.
v. 2 ór. 1 evők.
1 fjt 33 kr.

777 Rp. Extr. Scillae 1,0.
Roob. Juniperi 50,0.
M. f. electuarium.
DS. 3 × napj. 1, kk.
81 kr.

778 Rp. Extr. Scillae 0,5.
Chinin. sulf. 1,0.
Elaeosacch. Junip. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
DS. 2 ór. 1 port.
59 kr.

779 Rp. Aceti Scillae 50,0.
Kalii carbon. dep. qu. s.
ut f. l. a. saturatio
admisce
Spir. Aether. nitrosi
5,0.
Roob Juniperi 50,0.
DS. 2 ór. 1 kk.
83 kr.

780 Rp. Oxymel Scillae.
Kalii acet. sol. aa 50,0.
Aqua dest. 100,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
71 kr.

Scopolaminum hydrobromicum. Scopolia atropoides hatóanyaga. A hyoscinkészítmények főleg ezen anyagból állanak. Hatása tehát, mint a hyoscinnak nevezett anyagé. Főleg mint mydriaticum haszn. atropin helyett. 0,01—0,02 : 10,0 szembe csep-pentésre Bels. L. hyoscinum hydrobrom. Igen mérgező. 0,01 = 8 kr.
H. **Sebum ovile**. Juhfaggyú. Kenőcsökhöz alapanyag. 100,0 = 15 kr.

†H. **Secale cornutum**. (Claviceps purpurea. Pyrenomyces.) Hatóanyagait az egyes szerzők más-más névvel s különböző vegy-képlettel jelölik. Egyik hatóanyaga a sphacelotoxin, mely úgy látszik főalkatrésze az ergotin név alatti készítményeknek; azután az ergotoxin; egy harmadik a cornutin (KÖBERT), alkaloid. Bels., mint haemostaticum, méhösszehúzóásokat előmozdító szer haszn. Tapasztalatilag némely idegbántalomnál is jól hat, különösen azok-

nál, melyek edénymozgató zavarokon alapulnak. Dos. maxim. sing. 1,0! pro die 3,0! Főleg készítményei hasz. 10,0 = 4 kr. v. 1,0 = 1 kr. (pulv.).

†H. **Extractum Secalis cornuti spissum pro solutione, s. Ergotina.** Bels. adag. 0,1—3,0 pro dos. szükség szerint ór. v. 2 ór. oldatban per os v. subcután. 1,0 = 6 kr.

†H. **Extractum Secalis cornuti siccum pro pulvere.** Bels. adag porban, pilulában 0,1—0,25! pro dos. ór. v. 2 ór. Dos. maxim. pro die 1,0! 1,0 = 5 kr.

781 Rp. Extr. Secalis cornuti spiss. 1,0.

Aquae dest.

Glycerini aa 5,0.

M. filtra.

DS. 10%-os ergotin-oldat.

Bőr alá fecskendésre.

Egy fecskendőben 0,1

ergotin. 35 kr.

782 Rp. Extr. Secalis corn. spiss. 1,0.

Aquae Cinnamomi 100,0.

Syrup. cort. Aurant. 10,0.

MDS. ór. v. 2 ór. 1 kk.—evők. 50 kr.

783 Rp. Extr. Secalis corn. sicci 0,5.

1,0.

Pulv. folior. Digitalis 1,5.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

51 kr.

784 Rp. Extr. Secalis corn. sicci 0,5.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

5 éven túli gyermeknek.

haematuria, haemoptoe

esetén.

44 kr.

785 Rp. Extr. Secalis corn. spissi 4,0.

Extr. Cannabis ind. 0,5.

Extr. fluid. Hamamelidis

Tinct. Chamomillae aa 15,0.

MDS. 3 × napj. 1 kk.

Metrorrhagia, menorrhagia.

93 kr

H. **Senegae radix.** (Polygala Senega. Polygaleae.) Hatóanyagai, mint a quillaja kéregnek. Expectorans. Bels. adag decoct. 10,0—15,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 8 kr.

786 Rp. Decoct. rad. Senegae e 10,0.

l. a. p. ad colat. 140,0.

Natrii hydrocarb. 3,0.

Tinct. Opii simpl. gtt. 10.

Syrup. Senegae 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

Expectorans.

53 kr.

787 Rp. Decoct. rad. Senegae e 4,0.

l. a. p. ad colat. 100,0.

Liquor Ammon. anis.

gtt. 10—15.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

Gyermekeknek küptető.

39 kr.

H. Sennae folia. (*Cassia acutifolia* et *angustifolia*. *Caesal-pinea*.) Hatóanyaga a cathartinsav. Kis adagban laxans, nagy adagban drasticum. Bels. infus. 5,0—15,0 : 150,0 ór. 1 evők., míg székiürülés jelentkezik (enyhén hat), v. felét, esetleg az egészet egyszerre elfogyasztani (drasticusan hat). (*Alexandrin*): 10,0 = 5 kr; 100,0 = 36 kr; (scissa) 10,0 = 8 kr. (pulv.). (*Indicae de Tinevelly*): 10,0 = 3 kr., 100,0 = 22 kr. (scissa.).

H. Species laxantes St. Germain. Hashajtó theaelegy. Házilag vele infusum (thea) készíthető. 1—2 kk., esetleg 1 evők. veendő 1 csésze vízre. A forrázat édesítendő s 1—2-szerre elfogyasztandó. 10,0 = 8 kr. 100,0 = 57 kr.

H. Infusum laxativum s. Aqua laxat. viennensis s. Infus. Sennae comp. Hashajtó. Felnőtteknek 2 evőkanállal, gyermeknek 1—2 kk. 10,0 = 4 kr.

H. Syrupus mannatus. s. Syrupus Sennae cum Manna l. Syrupi omnes.

H. Electuarium lenitivum. Laxans gyermekeknek, nőknek. Adag gyermek. kávéskanálanként, felnőtteknek evőkanálanként. 10,0 = 6 kr.

H. Hydromel infantum. (Infus. laxat. 3 r. + Syrup. mannat. 1 r.) Hashajtó gyermekeknek. Adag ór. 1 kk. 10,0 = 5 kr.

788 Rp. Infus. fol. Sennae 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Natrii sulfur. 15,0.
Syrup. mannati 10,0.
Olei Menthae pip gtt. 2.

MDS. 2 óra alatt elfogyasztani. Erősebb laxans. 53 kr.

789 Rp. Aquae laxat. vienn. 40,0.
Aquae Amygdal. amar. 1,0.
Syrup. mannat. 10,0.

MDS. 1 óra alatt elfogyasztani. Gyengébb laxans. 38 kr.

790 Rp. Elect. lenitivi 20,0.
Syrup Rubi Idaei 10,0.

MDS. 1—2 kk. ór. míg a hatás beáll.

3—6 éves gyermeknek hashajtó.

. 36 kr.

791 Rp. Aquae laxat. vienn.

60,0.

Syrup. Rubi Idaei 20,0

MDS. Ór. 1 gyk. míg a hatás beáll.

6—10 év. gyermek hashajtó.

45 kr.

792 Rp. Hydromel. infant. 40,0.

DS. 2 ór. 1 gyk. míg a hatás beáll.

2—3 éves gyermek hashajtó.

30 kr.

793 Rp. Syrup. mannat. 20,0.

Salis Seignetti 10,0.

Aquae dest. 100,0.

MDS. Ór. 1 gyk. míg a hatás beáll.

3—5 éves gyermek hashajtó.

45 kr.

Serum antidiphtheriticum v. Diphtheria-antitoxin. Nálunk négy származású van jelenleg használatban

1). a höchsti-gyár ú. n. Behring-féle seruma. 2). a berlini Sche-

ring-gyár Aronson-féle seruma. 3). a budapesti ú. n. magyar serum. 4. A párizsi Roux-féle.

1). A höchsti Behring-féle serumnak 4 fajtája van: 0, 1, 2, 3 számú sárga, zöld, fehér és piros czímkés üvegesekben, melyek 200, 600, 1000, 1500 *immunítási egység* értékkel bírnak. (Egy ötödik fajta a legújabb höchsti magas egységű serum, mely 1 köbctmben 500 egységet tartalmaz, s ebből az üvegesekben 2000—3000 egységet tartalmazó mennyiség van. Magas áránál fogva egyelőre kiterjedtebb használatban nincsen). Az egységet Behring és Ehrlich a következőleg számítják: Normalis toxin-oldat azon tenyész-bouillon-toxinoldat, melyből 0,4 köbctm. 1 kilogrammos tengeri malacztot bizton megöl; normalis antitoxin-oldat az, melynek 0,1 köbctmje a 1 köbctm. normal-toxinoldat ölő hatását meggátolja; ezen *normal antitoxin-oldatból 1 köbctm az ú. n. immunítási egység*. Az üvegesék tartalma egészben és egyszerre használandó el bőr alá fecskendés alakjában. A 0 számú körülmöbbség nélkül prophylacticus oltásra; az 1. számú körülmöbbség nélküli torokdiphtheriánál; a 2. számú kiterjedtebb torokdiphtheriánál; a 3. számú súlyos torok, gége és orrdiphtheriánál. 2—3 nap múlva a befecskendést ismételni lehet. Befecskendés a kulcsalatti tájon, vagy a mellkas oldalsó részletén alkalmazható. Fecskendőtől legkedveltebb a fém dugattyús Jetter és Scheerer-féle (Tuttlingen). Minden használat előtt a fecskendőt sterilizálni kell és pedig kifőzéssel, vagy úgy, hogy előbb alkohol abs.-al, majd azután aether sulfuricus-al öblítjük át. Befecskendés előtt a befecskendésiül választott helyét a bőrnek szappannal, majd alkohollal s végre aetherrel kell lemosni. A befecskendés után a folyadékot nem szabad elmasszírozni. A fecskendés helyére gyapottampont s erre ragtapaszcsíkot helyezünk.

2). A berlini Schering-gyár Aronson-seruma fehér és kék czímkével ellátott üvegesekben jó forgalomba. A fehér czímkés 10 köbct.-ében 1000 egység, a kék 10 köbctmében 2000 egység van. Az első egészben, egyszerre enyhébb, a másodikat súlyosabb esetben használjuk körülmöbbség nélkül. Befecsk. cautelák mint a Behring-serumnál.

3). A magyar serum megfelel a Behring 2. számú és a Schering fehér czímkés serumának.

4). Roux-féle ritkán haszn. mai nap.

Gégestenosis esetén intubálás sürgős javallatot képez; ezen esetben a serum az intubációt nem teszi nélkülözhetővé.

H. Serum lactis commune. Tejsavó. Igen csekély értékű tápszér. Fülösleges.

H. Sinapis semina. (Sinapis nigra Cruciferae.) Ha összezúzva és vízzel elagyítva langyos helyen áll, ol. sinapis aether. képződik benne. Készítményei használatnak.

H. Farina seminum Sinapis. (Hevenyében összetört magvak.) Mustárliszt. Langyos vízzel péppé alakítva cataplasmák alakjában bőrvörösítő. Bels. 0,5—1,0 pro dos. porban stomachi-

cum, 5,0—10,0 pro dos. emeticum. 100,0 = 17 kr. 1000,0 = 1 frt 50 kr.

H. **Charta sinapisata.** Mustárliszt-pép helyett. Meleg vízbe mártva s nedvesen a bőrre kötve bőrvörösítő. 1 drb = 9 kr.

†H. **Oleum Sinapis aethereum.** Szintelen vagy sárgás. közömbös kémhatású, átható, csipős szagú és égető ízű illó olaj, 150 r. vízben, 10 r. híg borszeszben, tűmény borszeszben minden arányban oldható. Erős izgató, lobokozó. Önállóan nem használtatik, csak borszeszes oldatban. 1,0 = 12 kr. 1 csepp = 1 kr.

H. **Spiritus sinapis.** (1 : 50). Küls. bedörzsölések alakjában, vagy itatópapírra cseppentve s a papír a bőrre helyezve bőrizgató és vörösítő. 10,0 = 7 kr.

††H. **Solutio arsenicalis Fowleri** l. Acidum arsenicosum.

H. **Solutio Calcii oxysulfurati** l. Miscella Calcii oxysulfur.

Somatose. Tápanyag. Roborans. Húsból állítják elő. Szagtalan, íztelen por, melyet tápanyagokhoz kevernek (l. nutrose.) Adag: felnőtteknek 3—4 × napj. 1 kk. gyermeknek 3 × napj. 1—2 gm. 1,0 = 10 kr.

Sozodolum. E néven két szer szerepel a **Natrium sozodolicum** ($C_6H_5J_2(OH)SO_3Na + H_2O$) és a **Kalium sozodolicum**. ($C_6H_5J_2(OH)SO_3K$) Előbbinek 6 része 100 r. vízben oldódik és szintelen jegecztűket képez; utóbbi 50 r. vízben oldódó szintelen prismákban jeged. Szagtalanok. Jodoform helyettesítői, ennél kevésbé mérgezők. Küls. bőrmycosisok, renyhe fekélyek, zúzott, égési sebeknél hintőpor (1 : 15 talcumra) kenőcs (1 : 10 vaselina) alakjában. Ozaena, gonorrhoea, vaginitisnél 1—3%-os oldatok. 1,0 = 15 kr. Bels. nem.

794 Rp. Natrii sozodol. 6,0.
Aqua dest. 200,0.
M. f. solut.

DS. Külsőleg az orr kifekcskendésére. Ozaena.
1 frt 19 kr.

795 Rp. Natrii sozodol. 3,0.
Vaselinæ 30,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs.

86 kr.

796 Rp. Kalii sozodol. 4,0.
Ungu. emollient. 50,0.
Olei Bergamottæ gtt. 2.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs. 1 frt 42 kr.

0797 Rp. Kalii sozodol. 3,0.
Talc. venet. 40,0.
M. f. pulv. det in scat.

S. Hintőpor.

68 kr.

Sparteium sulfuricum ($C_{12}H_{16}N_2.H_2SO_4 + 8H_2O$). A spartium scoparium hatóanyagának kénsavas sója. Szintelen, áttetsző, rhomboedricus jegeczek, vagy szintelen, por; vízben jól oldódik. Hasonlóan hat, mint a digitalis, csak hogy nem oly megbízható; csekély narcoticus hatása is van. Haszn. a digitalis pótszeréül. Bels. adag pilulában, cseppekben 0,01—0,05 pro dos. 3—5 × napj. 0,01 = 1 kr.

798 *Rp.* Sparteini sulfur. 0,2.
Aquae Amygdal. amar.
10,0.
MDS. 2—3 ór. 15—20
cseppet.
49 kr.

799 *Rp.* Sparteini sulf. 0,5.
Pulv. et extr. Liquir.
na qu. s
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
DS. 2—3 ór. 1—2 pilulát.
90 kr.

800 *Rp.* Sparteini sulf. 0,2—0,5.
Syrup. cort. Aurant. 50,0.
MDS. 2—4 × napj. egy gyk.
54 kr.

H. Species Althaeae l. Althaeae rad.

H. Species amaricantes. Keserű theaelegy. Stomachicum.
Infus. vagy maceratum készítendő házilag vízzel vagy borral Adag:
1 csészére 1 evőkanállal. 10,0 = 8 kr. 100,0 = 57 kr.

H. Species laxantes St. Germain l. Sennae folia.

Sperminum. (Poehl). Ménlovak heréjéből készült ($C_4H_{11}N_2$).
Tonicum. Kétféle készítmény van. a) *Essentia spermini* Poehl.
Adag: 20—30 csepp napj. 2—3-szor meleg égvényes ásványvízben.
b) *Sperminum Poehl* 2%-os, in solutione physiologica sterilisata.
Bőr alá fecskendésre szolgál. Napjában 1 fecskendővel. Összesen
10—12 fecskendő egy curára.

H. Spiritus s. Spiritus vini. Tömény borszesz. Aethylal-
cohol (C_2H_6O). 90—91 térfogat % aethylalcoholt tartalmaz. 100,0 =
12 kr. 200,0-túl 100,0 = 12 kr., 200,0 = 22 kr. Állami adóval
100,0 = 18 kr., 200,0 = 34 kr.

H. Spiritus dilutus. Hígított szesz. 70 térfogat % aethyl-
alcoholt tartalmaz. 100,0 = 10 kr. 200,0-túl 100,0 = 10 kr.,
200,0 = 18 kr. Állami adóval: 100,0 = 14 kr., 200,0 = 26 kr.

H. Spiritus Aetheris. (Aether dep. 100 r. + Spiritus 300 r.)
Hoffmann-cseppek. Szaglószer ájulásnál stb. Bels. excitans aether
helyett 10—20—40 csepp pro dos. czukorra cseppentve, vagy
czukros vízben. 10,0 = 3 kr.

Spiritus Aetheris chlorati. Keveréke alcoholnak, aethyl-
chlorürnek, chloralnak és acetylchlorürnek. Haszn. mint a spir.
aetheris, ezenkívül mint gyenge diureticum. 10,0 = 6 kr.

Spiritus Aetheris nitrosi. Tartalmaz aethylalcohol mel-
lett aethylnitritet, aldehydét és eczetaethert. Bels. excitans, diure-
ticum, diaphoreticum. Adaga bels. 10—20—30 csepp pro dos. szük-
ség szerint. 10,0 = 5 kr.

H. Spiritus aromaticus. Küls. bedörzsölések alakjában
mint bőrizgató. 10,0 = 4 kr., 100,0 = 35 kr.

H. Spiritus camphoratus l. Camphora.

Spiritus Cochleariae. Küls. scorbuticus szájbántalomnál
szájvizokbe 1 kkanállal 1 kisebb pohár vízre. 10,0 = 4 kr.

H. Spiritus Ferri sesquichlorat aethereus l.
Ferri praeparata

Spiritus formicarum. Hangyasav 2 r. + borszesz 35 r. + víz 13 r. Színtelen, tiszta, savanyú folyadék. Küls. bőrvörösítő bedörzsölésekre mint a spir. sinapis. 10,0 = 5 kr.

H. Spiritus salis ammoniaci anisatus l. Ammonii anisati liquor.

H. Spiritus sapouatus. (Sapo venetus borszeszes oldata.) Küls. bőrre dörzsölve izgató. Bőrgyógyászatban seborrhoea, idült eczema és psoriasisnál mosogatások alakjában haszn. 100,0 = 24 kr., 200,0-túl 100,0 = 25 kr. 1000,0 = 2 frt 10 kr.

H. Spiritus saponis kalini. (Sapo kalinus albus borszeszes oldata.) Haszn. mint a spir. saponatus, de annál erősebb hatással. 100,0 = 49 kr. 1000,0 = 4 frt 10 kr.

H. Spiritus Sinapis l. Sinapis semina.

H. Spongia pressa. Ha vizet szív fel, megduzzad. Használatik a méh-nyakcsatorna, sipolymentek stb. tágitására. 1,0 = 10 kr.

H. Stibium sulfuratum aurantiacum s. Sulfur auratum Antimonii (Sb_2S_3). Igen finom, narancsvörös színű, szagtalan és íztelen por. Vízben nem oldódik. Expectorans. Bels. adag porban, pilulában 0,03—0,05—0,1 pro dos. 3—5 × napj. felnőtteknek. 1,0 = 1 kr.

801 Rp. Stibii sulfur. aurant. 0,5.

Acid. benzoici 1,5.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2—3 ór. 1 port. 55 kr.

802 Rp. Stibii sulfur. aurant.

Extr. Hyosciami

aa 0,05—0,1.

Sacchar. alb. 3,0

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

803 Rp. Stibii sulfur. aurant. 0,5.

Pulv. Doveri 1,0.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port. 43 kr.

DS. 3 ór. 1 port.

2—6 éves gyermeknek

idült hörghurut esetén.

43. kr.

†**H. Stibium sulfuratum nigrum** (Sb_2S_3). Súlyos, szürkés-fekete, fémfényű, jégezes darabok. A stib. sulf. rubr. készítéséhez használtatik. 100,0 = 15 kr., v. 10,0 = 3 kr. (subt. pulv.).

†**H. Stibium sulfuratum rubrum s. Kermes mineraie** ($Sb_2S_3 + Sb_2O_3$). Finom, könnyű, vörösbarna színű, szagtalan és íznélküli por. Expectorans, nagyobb adagban emeticum. Ritkán használtatik. Bels. adag 0,01—0,05 pro dos. porban 3—5 × napj. 1,0 = 11 kr.

Stigmata Maydis. A zea mays szárított hegei. Diureticum, némelyek szerint litholythicum. Adják húgyhomok, vesekövek, hydrops eseteiben. Decoct. 5,0—10,0 ; 100,0—150,0.

††**H. Strophanthi hispidi semina.** (Apocynae.) Hatóanyaga a strophantin ($C_{10}H_{14}O_4$). Digitalis pótszere. Szívre úgy hat, mint a digitalis, csak hogy gyorsabban s tartósabban; edényzetre

nincs hatással. (FRASER.). Állítólag nem cumulativ hatású. Mint diureticum nemcsak szívbántalmaknál, hanem némelyek szerint vesébántalmaknál is beválik. Gyomor-belekre alig van kellemetlen hatással. Dos. max. sing. 0,05, pro die 0,15. Magvából tinctura készül és az használtatik; a hatóanyag rendelése nem czélszerű, mert a különböző forrásokból származó készítmények. különböző tiszta ságúak és erőlyűek. 10,0 = 17 kr.

††H **Tinctura sem. Strophanthi** (1 : 20). Adag bels. 4—5—10 csepp pro dos. 2—4 × napj. Igen keserű lévén, ízjavítóról gondoskodni kell. Subcután nem alkalmazható, mert erős fájdalmat okoz. Dos. max. sing. 0,5 (körülbelül 10 csepp), pro die. 2,0. Vigyázat (!!)

804 Rp. Tinct. Strophanthi hisp.

Aquae dest. 1,0.
Syrup. cort. Aurant. 80,0.
20,0.

MDS. 3 ór. 1 evők.
28 kr.

805 Rp. Tinct. Strophanthi hisp.

Aquae Amygdalar. 5,0.
amar. 15,0.

MDS. 3 × napj. 10—20
cseppet.
33 kr.

806 Rp. Infus. folior. Digit. e 1,0.

l. a. p. ad. colat. 150,0.
Tinct Strophanthi hisp. 2,0.
Kalii acet. sol. 10,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 3 ór. 1 evők.
Erős diureticum, cardia-
cum. 47 kr.

807 Rp. Tinct. Strophanthi

gtt. 6 (!)
Aquae dest. 80,0.
Syrup. Moror. 20,0.

MDS. 3—4 ór. 1 gyk.
5—10 éves gyermeknek
26 kr.

††H. **Strychninum nitricum** l. Nux. vomica.

H. **Styrax liquidus depuratus**. Liquidambar orientale (Balsamiferae) balzsama. Mézszerű, kevésbé nyúlós, szürkés, v. szürkésbarna anyag; sajátos erős illatos szagú és fűszeres, csipős, alig keserű ízű. Küls. haszn. a bőrgyógyászatban állati parasiták (phthiriasis és scabies) ellen úgy, mint a bels. peruvianum. Scabies-nél előkészítő eljárás (zúldszippan, fürdő) szükséges. 10,0 = 9 kr. Czélszerű a

H. **Linimentum Styracis** (Styrax 3 r. + ol. sesami 1 r.) melyből egyszeri bedörzsülésre 80,0—50,0 szükséges. 10,0 = 12 kr.

H. **Succus Liquiritiae depuratus** } l. Liquiritiae radix.
H. **Succus Liquiritiae venalis** }

Sulfaminolum. (Thiooxydiphenylamin). Világos sárga, szag- és íztelen, alkaliákban, borszeszben, eczetsavban jól old. por. Antisepticum. Por alakban befúvások gégetuberculosis eseteiben; hintőpor sebekre, fekélyekre. Bels. cystitisnél 0,25 pro dos. 3—4 × napj. 1,0 = 8 kr.

†**H. Sulfonal** ($C_7H_{10}S_2O_4$). Szintelen, szagtalan, íztelen, prismaticus jegescek v. táblácskák. Oldódik 500 r. hideg és 15 r. forró vízben, borszószeben könnyen. Sedativum, hypnoticum, s mint ilyen a chloralhydrat pótszere. Anodyn hatása nincs, szívre, edényekre (?) nem hat, s így szívbántalmak esetén is használható. Kellemetlen mellékhatások csekélyek. Adag bels. porban 1,0—2,0—3,0 pro dos. 1—2 $\times$ este lefekvés előtt, s ezen mennyiség forró levesben, v. tejben, v. gyöngye theátan oldva veendő be. Gyermekeknek 0,25—0,5 pro dos. koruk szerint. Éjjeli izzadás ellen elegendő 0,3—0,5 este. Dos. maxim sing. 2,0, pro die 4,0. 1,0 = 6 kr. 10,0 = 45 kr.

808 Rp. Sulfonali subtiliss. pulv. 10,0.

f. pulv. div. in dos.

No. 10.

DS. Este lefekvés előtt

1—2 port.

87 kr.

809 Rp. Sulfonali subtiliss. pulv. 2,5—4,0.

Div. in. dos. aequ. No. 10.

DS. 1 port este pohár forró

tejben v. mák-kávéban.

5—10 éves gyermeknek

hypnoticum. 57 kr.

810 Rp. Sulfonali subtil. pulv.

3,0.

Sacchar. alb.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. Este lefekvés előtt

meleg italban 1 port.

57 kr.

811 Rp. Sulfonali subtil. pulv. 3,0.

Sacchar. alb. 5,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 20.

DS. 3 $\times$ napj. 1 port kisebb

gyerm. nagyobbak 5 $\times$

napj. mindig meleg folya-

dékban. (Chorea minor.)

78 kr.

H. Sulfur praecip. atum s. Lac sulfuris. Alaktalan, sárgás-fehér por. Küls. Jrgyógyászatban növényi és állati parasiták ellen kenőcs úgy indeltessék, hogy a kenőcsben kénalkali képződjék (szappannal, szénsavas kalium v. natriummal). Diphtheritisnél, croupnál por befúvatik a torokba, gégebe. Bels. laxans. Adag porban, pilulában electuariumban 0,5—1,0—3,0 pro dos. 10,0 = 7 kr.

812 Rp. Sulfur. praecip.

Kalii carb.

Glycerini

Spiritus

Aetheris

M. f. linim.

aa 5,0.

DS. Comedók, acné disse-

minata ellen. Este a beteg

helyek beecsetelendők,

le mosás csak reggel.

(HEBRA).

39 kr.

813 Rp. Sulfur. praecip. 5,0.

Magnes. ustae 10,0.

M. f. pulv. div. in dos.

aequ. No. 10.

DS. 1—2 port napj.

Laxans. Obstip. habit.

52 kr.

814 Rp. Sulfur. praecip. 10,0.

Melis. rosati 30,0.

M. f. electuar.

DS. Napj. 1—3 kk.

Laxans. 36 kr.

†H. **Sulfur sublimatum.** 100,0 = 9 kr.; 1000,0 = 70 kr.
Belőle állítatik elő a

H. **Sulfur sublimatum lotum s. Sulfur. depur. s. Flores Sulfuris.** Világossárga, finom por. Haszn. küls. és bels. mint a sulf. praecip. Adag bels. mint laxans 3,0—5,0—8,0 pro dos. 10,0 = 3 kr.

H. **Unguentum sulfuratum s. Unguentum ad scabiem.** Tartalmaz pix liquidát, sapo kalinus venalist és creta albat. Haszn. főleg scabiesnél, de használható herpes tonsurans, favus, pytiriasis versicolor ellen is. 10,0 = 5 kr.

815 Rp. Sulfur. subl. loti 20,0.
Kalii carbon. depur. 10,0.
Axung. porci 80,0.
M. f. unguent.

DS. Zöld szappannal ledörzsölés és fürdő után a beteg helyek $\frac{1}{2}$ órán át dörzsölendők a kenőccsel. Ezután fürdőben lemosandó a kenőcs.
Scabies. 63 kr.

816 Rp. Sulfur. sublim. loti
Pix liquidae aa 15,0.
Cretae alb. 10,0.
Sapon. kalin. 30,0.
Spir. dilut. 60,0.

MDc. Bedörzsölésre scabies esetén; 3-szorra elhasználni 12 órai időközben. Utána fürdő.
Hebra-féle rüchinctura módosítva. 53 kr.

Syrupi officinales.

H. **Syrupus Althaeae.** Illatos izjavító. 10,0 = 3 kr.

H. **Syrupus amygdalinus.** Fejets erű. Izjavító fejetekekhez. 10,0 = 5 kr.

H. **Syrupus corticum Aurantiorum.** Illatos izjavító, különösen jó kellemetlen szagú folyadékokhoz. 10,0 = 3 kr.

H. **Syrupus capillorum Veneris.** Igen kellemes illatú izjavító. 10,0 = 4 kr.

H. **Syrupus Cinnamomi.** Illatos izjavító. 10,0 = 5 kr.

H. **Syrupus Citri.** Savanykás limonade-ízű. 10,0 = 6 kr.

†H. **Syrupus Diacodii.** Kevés morphiint tartalmaz. Izjavító opiatokat tartalmazó folyadékokhoz l. Opium. 10,0 = 3 kr.

H. **Syrupus Ferri-jodati** l. Ferri praeparata.

†H. **Syrupus Ipecacuanhae.** Izjavító köptetőkhez. 10,0 = 5 kr.

H. **Syrupus Liquiritiae.** Izjavító köptetőkhez, különösen ammon. chlorat. oldatához. 10,0 = 3 kr.

H. **Syrupus mannatus.** Izjavító hashajtó folyadékokhoz. Gyermekeknek kk. v. gyak. hashajtó. 10,0 = 4 kr.

H. **Syrupus Mororum.** Szép piros színű íz- és színjavító. Különösen a savakat tartalmazó folyadékokhoz szokásos. 10,0 = 3 kr.

- H. Syrupus Rhei.** Izjavító hashajtó folyadékokhoz. 10,0 = 4 kr.
- H. Syrupus Rubi Idaei.** Piros színű íz- és színjavító; különösen savaltat tartalmazó folyadékokhoz szokásos. 10,0 = 3 kr. 100,0 = 20 kr.
- H. Syrupus Senegae.** Izjavító köptetőkhöz. 10,0 = 5 kr.
- H. Syrupus simplex.** Közömbös izjavító. Különösen a szegény gyakorlatban rendelendő. 10,0 = 3 kr., 100,0 = 20 kr.

*

Syzygium Jambolanum. Jambul. A növény magvai haszn. Adstringens. Ujabban diabetesnél is rendelik. Főleg az **Extractum Syzygii Jambulani** haszn. Adag 5,0—6,0 gm. pro dos. 15,0—20,0 gm. pro die.

H. Tamarindorum pulpa. (Tamarindus indicus, Caesalpiniae.) Barnás-fekete, kissé szívós, lágy tömeg. Kellemes savanyú s kevésbé összehúzó ízű. Gyenge hashajtó nagyobb adagban (10,0—30,0) v. decoctum alakjában (30,0 : 300,0). Külömben mint electuarium-alapanyag haszn. 100,0 = 13 kr. depurata 10,0 = 6 kr.

817 Rp. Decoct. pulp. Tamarindor e	10,0.
l. a. p. ad colat.	100,0.
colat. fervid. adde	
Kalii hydrotartar.	2,0.
Syrup. simpl.	10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.	
4—8 éves gyermek hashajtó icterus catarrh.	
esetén.	43 kr.

Tanninum solubile. (Aluminium tannico-tartaricum.) Sárga, vízben és glicerinen jól oldható por. Adstringens alumen v. tannin helyett; orr, gége ecsetelésére haszn. 20—30%-os glicerin oldata, belehelésre 30%-os vizes oldata, gargarismának 1—2%-os oldata. 1,0 = 7 kr.

Tannigenum. (Diacetyltannin). Sárgás-szürke, szagtalan, íztelen por. Nehezen oldh. Adstringens. Por alakban befúvásra az orrba, gégebe. Bels. 1,0—2,0 porban. Gyomorból változatlanul megy át a bélbe, hol tannin válik le belőle. 1,0 = 15 kr.

H. Tanninum. l. Acid. tannicum.

H. Taraxaci radix et folia. (Leontodon Taraxacum. Compositae.) Hatóanyaga taraxacin (keserű anyag). Amarum. Radix 100,0 = 11 kr., folia 100,0 = 10 kr. Használtatik az

H. Extractum Taraxaci. Folyékony vizes kivonat. Főleg mint pilula-constituens haszn. hashajtó pilulákhoz. 10,0 = 13 kr.

H. Tela sericea protegens l. Acid. carbolicum.

H. Terebinthina communis. Pinus silvestris és más pinus és picea-fajok balzsama. Halványsárga v. sárgásfehér, zavaros, át nem látszó, nyúlós, mézsiürűségű, kevésbé szemcsés, ragadós, fenyűszagú, keserű ízű balzsam. Borszeszben, aetherben, illó

és zsíros olajokban oldódik. Küls. főleg a népgyógyászatban mint derivans haszn., különben tapasztok készítéséhez a gyógyszerészeti technikában. 100,0 = 7 kr.

H. Terebinthina veneta. Pinus larix balzsama. Az előbbinél több ol. terebinthinae-t tartalmaz és ezért drágább. 10,0 = 3 kr.

Terpinol ($C_{10}H_{16}O + C_{10}H_{16}$). Terpinhydratból állítatik elő. Színtelen, könnyen mozgó, erősen fénytörő, jácint szagú folyadék, mely vízben oldhatlan, borszeszben, aetherben jól oldható. Légutak váladékát csökkenti. Adag bels. kapszulában v. pilulában 0,1–0,15 pro dos. 2–3 ór. v. 2–5 csepp pro dos. 1,0 = 4 kr.

818 Rp. Terepinoli 1,0.
Ol. Sesami 3,0.
M. f. soluto.
Det. in caps. gelatin.
No. 10.

DS. 0,1 gnos terpinol-capsulák. 2–3 ór. 1 darabot.

Expectorans.

80 kr.

819 Rp. Terpinoli
Natrii benzoici aa 2,5.
Sacchar. alb. 1,0.
Mucil. Gummi arab.
qu. s.

ut f. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Liquir.

DS. 1–2 ór. 1–2 szemet.

Expectorans. 65 kr.

Terpinum hydratum ($C_{10}H_{16} \cdot 2H_2O + H_2O$). Színtelen, rhombicus, fénylő, kissé szagos, aromaticus ízű jegeczek. Hideg vízben alig, forróban 32 r.-ben oldódik, borszeszben jól oldódik. Az ol. terebinthinae pótszere. Kis adagban expectorans, a váladékot elfolyósítja. Nagy adagban edényösszehúzó, miért is a légutak váladékát csökkenti. Haemostaticum, ezért haemoptoe esetén. indicált. Diureticumnak nem ajánlható. Jól hat cystitis és gonorrhoea eseteiben is. Bels. pilulában, v. vizes és borszeszes oldatban mint expectorans 0,1–0,2 pro dos.; mint haemostaticum és váladék csökkentő 0,2–0,5 pro dos. 2–3 $\times$ napj. 1,0 = 3 kr.

820 Rp. Terpini hydrati 2,0.
Spiritus
Aquae dest.
Syrup. cort. Aurant.
aa 50,0.

MDS. 3 ór. 1 evők.

Expectorans.

53 kr.

821 Rp. Terpini hydrati 3,0.
Sacchar alb.
Mucil. Gummi arab. aa
qu. s.

ut f. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Lycopod.

DS. 3 $\times$ napj. 1–2 szemet

48 kr.

822 Rp. Terpini hydrati 0,5.

Aquae dest.

Syr. cort. Aurant.

aa 40,0.

Spir. vini dil. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyermek.

Gyerm. catarrh. bronch.
ha a köpet sűrű, szívós.

40 kr.

Tetronalum. Parallel vegyület a sulfonallal, csakhogy 4-szer van aethylizálva. Nagy, színtelen, rhomos jegeczlemezkek. Vízben nehezen old. Hypnoticum. Oly értékű mint a sulfonal. Adag u. az.

Thallinum sulfuricum $[(C_{10}H_7NO)_2H_2SO_4]$. Sárgásfehér jegeczes por, kellemes szagú, keserű, sós, aromaticus ízű. 8 r. hideg vízben oldódik, borszeszben nehezen. Küls. mint antisepticum, antizymoticum gonorrhoea ellen befecskendések alakjában 1—2%-os oldatok. Bels. antipyreticum. Gyakran sokáig tartó izzadás jelentkezik használatára. Szívre erősen deprimáló hatású, ezért szívgyengeség eseteiben ellenjavalt. Adag bels. oldatban, porban 0,25—0,5 pro dos. ór. v. 2 ór. szükség szerint. Kiment divatból. 0,1 = 4 kr.

823 Rp. Thallini sulfur. 4,0.
Aqua dest. 200,0.

MDS. Húgycsőbe fecskendésre.

Gonorrhoea.

1 frt 89 kr.

824 Rp. Thallini sulfur. 2,0.
Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

Det. in caps. amylac.

S. 0,2 gmos thallin-capsulák.
1 frt 44 kr.

Thallinum tartaricum $(C_{10}H_7NO.C_4H_4O_6)$. Sárgásfehér, kellemes szagú, keserű, aromaticus ízű por. 10 r. hideg vízben oldódik, borszeszben nehezen. Hatása, haszn. bels. mint a thall. sulf. Küls. rossz oldékonysága miatt nem haszn. Gyengébb hatású, mint a thall. sulf. ezért némileg nagyobb adagok rendelendők. Kiment divatból. 0,1 = 4 kr.

†**H. Theobrominum natrio salicylicum. s. Diuretinum.** Fehér, amorph, néha jegeczes, enyhén édeses, majd sós-keserű, lúgos ízű por, hideg vízben nehezen, melegben jól old. Húghajtó. Jobb oldatban rendelni. Adag 0,5—1,0! pro dos. 4,0—8,0! pro die. 1,0 = 15 kr. 10 = 1 frt 40 kr.

825 Rp. Diuretini 8,0.
Aqua Menthae

pip. 130,0.

Syrup. cort. Aurant. 20,0.

MDS. 1—2 Jr. 1 evők.

1 frt 77 kr.

826 Rp. Diuretini 8,0.
Sacchar. lact. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

D. in caps. amylac.

S. 2 ór. egy dbot.

1 frt 82 kr.

Thermodinum. (Acetylaethoxyphenylurethan). Fehér, szagtalan, vízben nehezen old. jegeczek. Gyengébb antipyreticum. Egyes adag 0,5—0,7 napj. többször. Antipyrinnel nem mérkőzhet. Gyakran kanyarószerű kiütés mint mellékhatás; izzadás, ismétli hőemelkedésnél borzongás mindig. 1,0 = 22 kr.

Thilanium. Lanolin és kén 230°-nál történő összeolvasztásából származó, 3% ként tart. sárgás-barna, kenőcsszerű anyag. Bőrbajoknál kül. eczemánál bedörzsölés alakjában haszn. 1,0 = 2 kr.

Thiolum. Nem egységes test. A barnaszén destillatio-terméke. Az ichthyol pótszere. Kereskedésben kétféle alak van, 1). **Thiolum liquidum**, mely szörpsűrűségű 40%-os vizes oldat 2). **Thiolum siccum**, barna fényű pikkelyek. Mindkettő kátrányos szagú, kesernyész, összehúzó ízű. Vízelvouó, keratoplasticus, edényszűkítő, gyöngén antisepticus hatású. Haszn. az ichthyol helyett. Adag küls. kenőcsben, linimentumban 30,0—50,0: 100,0, a folyékonyból; hintőpornak a száraz tisztán. Liquidum 1,0 = 4 kr.; siccum 1,0 = 10 kr. 10,0 = 80 kr.

827 Rp. Thioli liqu. 30,0—50,0.
Aqua dest. 100,0.
MDS. Külsőleg.
1 frt 40 kr.

829 Rp. Thioli liqu. 50,0.
Glycerini 100,0.
MDS. Külsőleg.
2 frt 47 kr.

828 Rp. Thioli liqu. 10,0.
Ungu simpl. 50,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.
90 kr.

830 Rp. Thioli sicci pulv. 30,0.
Det. in scat.
S. Hintőpor. 2 frt 46 kr

Thioform. (Bázisos dithiosalicylsavas bismuth). Szürkés-sárga, íz- és szagtalan por, vízben nem old. Por alakban sebekre mint a jodoform v. dermatol hintőpor alakjában antisepticum. Szembe, orrba szintén poralakban. Eczemánál, viszketésnél 10%-os kenőcs alakjában. 1,0 = 10 kr.

Thiophenum bijodatum. ($C_4H_2J_2S$). 75-5% J-ot tart. Vízben oldhatlan, aetherben oldh. kellemes szagú jegecztáblák. Sebészetben jodotorm, jodol helyett hintőpor, sebekben egy idő múlva égő érzés.

H. **Thymolum** ($C_{10}H_{14}O$). Tábla alakú, színtelen, kakúkfű-olaj szagú, fűszeres, csipős ízű jegeczek. Vízben alig, borszeszben, aetherben, zsíros olajokban, glycerinben könnyen oldható. Antisepticum. Sebkezelésben 1:1000 oldatban haszn. Bronchitis putrida, bronchiectasia, gangraena pulm., phthisis eseteiben belégzésre 0,5—1,0:1000. Bels. ritkán. Kereskedésben thymolos kötszerek vannak forgalomban. 1,0 = 8 kr.

831 Rp. Thymoli 1,0.
Glycerini 20,0.
Spiritus 10,0.
Aqua dest. 1000,0.
M. f. solutio.
DS. 1% thymololdat.
Külsőleg. (RANKE.)
67 kr.

832 Rp. Thymoli 0,2.
Spiritus qu. s. ad solut.
Aqua dest. ferv. 200,0.
MDS. Belégzésre.
(LEYDEN.)
12 kr.

Thyreoidea készítmények. A juh pajzsmirigyéből előállított különféle készítmények, struma paranechym. myxoedema, cachexia strumipriva, morbus Basedowi (?), polysarcia (?) és cretinismus eseteiben, nemkülönben psoriasis és ichthyosissal (?) adagoltattak oddig. 1). *Thyraden* seu *Extractum thyreoidae Haaf*. Knoll et Comp. Ludwigshafeni gyárából. a) Tejczukorral készült por. 1 rész megfelel kétannyi súlyrész mirigynek, azonkívül b) pilulák és c) tabletták, mindenik darabja 0,3 gm. mirigynek megfelelő. Adag felnőtteknek Kocher szerint a porból 1,0—1,5 gm. pro die emelkedőleg 5,0 pro die; a pilulákból és tablettákból 6—9 db. Gyermekek részére enuek. 2). *Thyreoidinum siccatum. Merck*. Tabletták. Egy üvegcsőben 50 db. 1 db 0,1 juhmirigynek felel meg. Adag felnőtteknek: pro die. 4—6 db. 3). *Tabloids of compressed ary thyroid gland. Burroughs, Wellcome et Co. London*. Egy db 0,3 gm. juhmirigynek felel meg. Adag $\frac{1}{2}$ db — 3 db napj. 3-szor, étkezés után meleg tejjel, v. levestel, v. vízzel. 4). *Thyreoidin-Pastillen. Hofapothek, Dresden*. Egy db. tartalmaz 0,3 gm. vacuumban 30° C-nál szárított juhmirigyet. Adag első 3 nap napj. 1 db teli gyomorral, később 2 db. pro die, majd 3 db. pro die de nem egyszerre. 5) *Thyrojodin. Ferd. Bayer. Eberfeld. Baumann E.* által előállított valószínű hatóanyaga a pajzsmirigynek. a) *Porlakban* adag 0,002 gm. — 0,05 pro die. b) *Tabletták alakjában*. Egy db. megfelel 0,3 gm. mirigynek. Adag pro die 1—3 db. emelkedőleg. b) Magyar tabletták Egger-féle; 3 db felel meg egy mirigynek. Adag 1—3 db pro die. Mellékhatások és mérgezési tünetek gyakoriak: pulsus szaporaság, szívgyengeség, ájulások, stenocardia, palpitatio, collapsus, lesoványodás, eclampsia, comatosus állapot, glycosuria, albuminuria, lázak. Nagy vigyázat! Az egyes készítmények árai igen különbözöek.

H. Tiliae flores. (*Tilia grandifolia* et *parvifolia*. Tiliaceae.) Hatóanyaga illó olaj. Diaphoreticum. Házilag készíthető belőle infusum. Egy csésze tea-ára 1—2 evőkanál veendő; melegen fogyasztandó el. 10,0 = 3 kr. 100,0 = 17 kr.

H. Tinctura amara. Amaram. Stomachicum. Adag bels. 20—30 csepp. 10,0 = 4 kr.

H. Tincturae omnes l. a megfelelő drogok címei alatt.

H. Tragacantha. Különböző astragalus fajok mézgája. Gyógyszerészeti technikában fontos szer. Haszn. mint a gummi arabicum. 10,0 = 14 kr. (pulv.).

H. Trifolii fibrini folia. (*Menyanthes trifoliata*. Gentianeae.) Hatóanyaga menyanthin (keserű anyag). Amaram. Keserű theakeverékek alkotórésze. 100,0 = 12 kr.

Extractum Trifolii fibrini. Haszn. mint az extr. Taraxaci. 1,0 = 2 kr.

Trionalum. A sulfonallal parallel vegyület, csakhogy 3 × van aethylizálva. Szintelen jegeczpor. Vízben nehezen old. Hypnoticum, mint a sulfonal. Adag 1 sulfonal. 1,0 = 20 kr.

Tropacocainum hydrochloricum. Az alcaloid előfordul egy jávai cocanövényben, de syntheticus úton is előállítható.

Szintelen, vízben jól oldh. jegeztük. Hatása, mint a cocainé. Kevésbé mérges. Eddig a szemészek haszn. 2—3%-os steril élet-tani konyhasó oldatban érzéstelenítésre. Bels. nem. 0'01 = 20 kr.

H. Tubuli praeparati carbolati l. acid carbolicum.

Tumenolum venale. Bitumenes kőzetből nyert barna, sűrű, kátrányszerű, vízben oldh. anyag, melyben tumenol-olaj (tumenolsulfon) és tumenolsulfonsav foglaltatik. Bőrgyógyászok alkalmazzák szárító, lobellenes hatásáért. A viszketést is csillapítja. Nedvező eczemánál, pruritushál 10%-os oldat ecsetelésre, vagy 5%-os kenőcs. Borongatásokra. 3—5%-os oldat. 1,0 = 8 kr.

833 Rp. Tumenoli 3,0.
Aetheris sulfur.
Spir. vini.
Glycerini aa 10,0.
MDS. Ecsetelésre.
47 kr.

834 Rp. Tumenoli.
Zinci oxyd. aa 3,0.
Ungu emoll. 30,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.
82 kr.

Tussolum. (Phenylglycolsavas antipyrin). Szintelen, vízben jól old. por. Pertussishál csökkenti és rövidíti a rohamokat. Adagok: egy éven alóli gyermek 0,05—0,1, 1—2 évesnek 0,1, 2—4 évesnek 0,25—0,4, 5 éven felülinek 0,5 napj. 3—4-szer, oldatban. Égvényes italok, tej kerüldendők. 1,0 = 18 kr.

835 Rp. Tussoli 3,0.
Aquae dest. 80,0.
Syr. cort. Aurant 20,0.
MDS. Napj. 2—3 × 1 kk.
2—3 éves gyermek.
Pertussis.
87 kr.

Unguenta.

H. Unguentum aromaticum. Illatos kenőcs-alapanyag. Tisztán a bőrre dörzsölve gyengén izgató, elvonó) 10,0 = 6 kr.

H. Unguentum Autenriethi l. Kalium stibiato tartaricum.

H. Unguentum Cerussae l. Plumbum carbonicum.

H. Unguentum diachylon Dr. Hebra l. Plumbum oxydatum.

H. Unguentum emolliens s. Crème céleste. Közömbös kenőcs-alapanyag. A gazdag gyakorl. haszn. 10,0 = 10 kr.

H. Unguentum Glycerini. (Tragacantha 1 r. + Spiritus 5 r. + Glycerini 49 r.) Bevonó, védő kenőcs. Közömbös kenőcs-alapanyag. Kül. nyáron használandó, midőn zsíros kenőcsök könnyen avasodnak. 10,0 = 8 kr.

H. Unguentum Hydrargyri l. Hydrargyrum.

H. Unguentum jodatum l. Jodum.

- H. **Unguentum Kalii jodati** l. Kalium jodatum.
 H. **Unguentum Plumbi acetici** l. Plumbum aceticum.
 H. **Unguentum Plumbi tannici s. Ungu. contra decubitum.** (Acid. tannicum. 1 r. + Plumb. acet. bas. 2 r. + Vaseline 17 r.) Decubitusokra mint összehúzó kenőcs. 10,0 = 10 kr
 H. **Unguentum rosatum.** Illatos kenőcs-alapanyag. A gazdag gyakorlatban. 10,0 = 8 kr.
 H. **Unguentum Sabadillae** l. Sabadillae semina.
 H. **Unguentum simplex.** Közömbös kenőcs-alapanyag. 10,0 = 5 kr. 100,0 = 35 kr.
 H. **Unguentum sulfuratum** l. Sulfur. sublim. lot.
 H. **Unguentum Zinci oxydati** l. Zincum. oxyd.

*

†H. **Urethanum** ($C_2H_4NO_2$). Szintelen. oszlopos, hűtő ízű jegécek; vízben, borszeszben, aetherben jól oldódik. Sedativum, hypnoticum. Chloralhydrat pótszere. Kevésbé biztos hatású, mint a paraldehyd. Szívre nem hat. Nem anodyn hatású, ezért oly álmatlanságnál, mely fájdalmak, köhögés miatt áll fenn, nem használható. Adag bels. oldatban 2,0—4,0 pro dos. felnőtteknek, 0,1—0,3 gyermekeknek. Dos. maxim. sing. 3,0, pro die 6,0. 1,0 = 6 kr.

- | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------|
| 836 Rp. Urethani | 6,0. | 837 Rp. Urethani | 0,5—1,5. |
| Aquae dest. | | Aquae Menthae pip. | |
| Syrup. capill. Veneris | | Syrup. cort. Aurant. | |
| | aa 30,0. | | aa 25,0. |
| <i>MDS.</i> Este lefekvéskor 2 | | <i>MDS.</i> 1—2 kk. egyszerre. | |
| evők.; ha álom nem jelentkeznék még egy kánállal. | | 1 kk.-ban körülbelül 0,1 gm. urethan. | |
| | 79 kr. | Gyermekeknek. | 35 kr. |

- | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 838 Rp. Urethani | 10,0. | 839 Rp. Urethani | 5,0. |
| Aquae dest. | 30,0. | Aquae dest. | 100,0 |
| M. f. solut. | | Syrup. capill. Vener. | |
| <i>DS.</i> Bőr alá fecskendésre. | | | 20,0. |
| 2—3 fecsk. Hypnoticum. | | <i>MDS.</i> Ór. 1 evők. | |
| | 80 kr. | Sedativum. | |
| | | | 72 kr. |

Ustilago Maydis. A Zea Mays magvának helyén fejlődő s néha nagy tömeggé növő gomba. Alkotórészei egy alkaloid (ustilagin), sclerotinsav, trymethylin. Amerikában a secale cornutum helyett használják szülészetben, nőgyógyászatban. Készítménye az

Extractum fluidum Ustilaginis Maydis. Adag bels. méhvérvések, ameuorrhoea, dysmenorrhoea eseteiben 1, — 1 kk. pro dos. napj. többször szükség szerint.

Uvae Ursi folia. (Arbutus Uva Ursi. Ericaceae). Hatóanyagai arbutin és csersav. Adstringens. Miután az arbutin a szervezetben hydrochinonra és cukorra hasad s a hydrochinon részint tisztán,

részint kénsavval párosulva ürül ki a vizelettel, *pyclitis*, *cystitis* bizonyos eseteiben a medveszőlő-levél mint antizymoticum ajánlatik; ehhez járul még a cseersav jelenlétéhez kötött adstringens hatás is. Adag bels. decoct. 10,0—15,0 : 150,0 ór. 1 evők. 10,0 = 1 kr.

Arbutinum ($C_{12}H_{16}O_7 + H_2O$). Selyemfényű, tűalakú jegeczek, hideg vízben nehezen, forróban könnyebben oldhatók. Haszn. mint a fol. *uvaes ursi*. Adag bels. porban, pilulában 0,5—1,0 pro dos. 3—5 × napj. 0,10 = 3 kr.

840 Rp. Decoct. folior. *Uvae Ursi* e 15,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. *Opii simpl.* gtt. 10.
Syrup. capill. *Veneris* 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők. 39 kr.

841 Rp. *Arbutini* 5,0.
Div. in dos. aequ. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port.
1 frt 87 kr.

H. Valerianae radix. (*Valeriana officin. Valerianeae*). Hatóanyaga illó olaj és valerianasav. Excitans, antispasmodicum (*hysteria, epilepsia* stb.) Adag: klysmának infus. 8,0—10,0 : 100,0. Bels. infus. 10,0—15,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. más excitans vagy antispasmodicus szerekekkel összekötve. 10,0 = 2 kr., 100,0 = 16 kr. (pulv). 10,0 = 5 kr.

H. Tinctura Valerianae aetherea. (Rad. valer. 10 : spir. aether. 50 r.) Adag bels. 15—30 csepp pro dos. 3—5 × napj. 10,0 = 12 kr.

H. Tinctura Valerianae spirituosa. Adag bels. 15—40 csepp pro dos 3—5 × napj. 10,0 = 5 kr.

842 Rp. Infus. rad. *Valerianae* e 10,0.
l. a. p. ad colat. 100,0.
Tinct. *Opii simpl.* gtt. 5.
MDS. Csőrének.
Antispasmodicum. 33 kr.

843 Rp. Tinct. *Valerian. aeth.*
Tinct. *Castorei* āā 15,0.
MDS. Ór. v. 2 ór. 20—30 cseppet.
Excitans.
2 frt 42 kr.

844 Rp. Infus. rad. *Valerian.* e 15,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. *Castorei* 1,5.
Syrup. cort. *Aurant.* 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Antispasmodicum (*hysteria*). 58 kr.

845 Rp. Rad. *Valerianae*
Fol. Aurantior.
Fol. Menthae pip.
Fol. Trifolii fibr. āā 20,0.
Conc. cont. m. f. species.
DS. 1 evők. 3 csésze vizre.
Heim-féle thea hysteriá-
soknak. 28 kr.

H. Vaselina. Sárgás, áttetsző, kissé fluoreskáló, lágy, szagtalan, közömbös kémhatású, kenőcsösszeállású anyag. Vízben, glycerinben nem oldódik, borszeszben kevésbé, aetherben, chloroformban könnyen; zsíros és illó olajokkal összeolvasztva, azokkal minden arányban elegyíthető. Közömbös kenőcs-alapanyag. 10,0 = 5 kr. 100,0 = 30 kr.

††**H. Veratrinum.** A tiszta veratriumnek vegyképlete: $C_{17}H_{17}NO_{11}$, azonban forgalomban csak tisztátalan készítmények vannak, ilyen az is, melyet a M. Gyl. II. kiad. megjelöl Fehér, laza, igen csipős ízű por, szaga nincs, de erősen tűzszűgítendő. Vízben alig oldható, 3 sr. borszeszben, 2 sr. chloroformban lúgos kémhatású folyadékká oldódik. Küls. kenőcsök (0,1—0,3 : 10,0) alakjában mint erős izgató, derivans haszn. Bels. ma már ritkán, ezelőtt mint anti-pyreticum, cardiacum volt divatban. Adag bels. 0,001—0,005! pro dos. pilulában, porban 2—3 × napj. Dos. maxim. pro die 0,02! Nagy vigyázat! Szívméreg! 0,1 = 5 kr.

846 Rp. Veratrini	0,2.	847 Rp. Veratrini	0,1.
Chloroformii	1,0.	Chloroformii	10,0.
f. solut. adde		M. detur. ad vitr. nigr.	
Ungu. simpl.	20,0.	S. Külsőleg bedörzsölésre.	
M. f. ungu.		38 kr.	
DS. Kenőcs.	48 kr.		

448 Rp. Veratrini 0,06.
 Pulv. et extr. Liquir. añ qu. s.
 ut. f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Liquirit.
DS. 0,002 gmos veratrin-pilulák.
 3 ór. 1 szemet.
 42 kr.

H. Vinum Chinae l. Chinae succirubr. cort.

†**H. Vinum Colchici** l. Colchici semina.

H. Vinum Condurango. l. **Condurango cortex.**

H. Vinum malagense. A hiv. gyógyborok előállítására haszn. 10,0 = 4 kr. 100,0 = 30 kr.

H. Vinum Pepsini l. Pepsinum german.

†**H. Vinum stibiato-tartaricum** l. Kalium stibiato-tartaricum.

H. Vinum Tokajense. 10,0 = 10 kr. 0,5 literes üveggel 4 frt.

Xylolum (C_8H_{10}). Szintelen, tiszta, erősen fénytörő, kátrányszagú és ízű folyadék, mely kőszénkátrányból állítatik elő fractionált lepárlás útján. Zülzer ajánlotta variolanál 10—20 cseppnyi adagban (nyákos vagy illatos mixturában vagy capsulában); szerinte és Örvös tr. szerint a himlőanyagok tartalmát gyorsan megalkasztja, a hegképződés ritka, a leszáradás szövődmények nélkül történik. 10,0 = 5 kr.

849 Rp. Xyloli pur. gtt. 10.
 Det. in caps. gelat.
 opercul.
 Dent. tales dos. No. 10.
 S. Napj. 3×1 capsulát.
 70 kr.

851 Rp. Xyloli pur. 0,5—1,0.
 Aquae Foenic. 30,0.
 Vini malag. 60,0.
 Syrup. Menthae pip.
 30,0.
 MDS. Ór. 1 kk.
 Gyermeknek.
 60 kr.

850 Rp. Xyloli puri 3,0.
 Aquae Menthae pip.
 Aquae dest. aa 50,0.
 Syrup. Cinnamomi
 Mucil. Gummi arab.
 aa 10,0.
 MDS. 2 ór. 1 evők.
 Gyermeknek. (Löbisch.)
 42 kr.

852 Rp. Xyloli pur. 2,0—3,0.
 Aquae Foeniculi
 Vini malag. aa 60,0.
 Syrup. simpl. 30,0.
 MDS. 2 ór. 1 evők.
 59 kr.

H. Zedoariae rhizoma. (Curcuma Zedoaria, Scitamineae.)
 Hatóanyagai illatos olaj, gyanta, keményítő. Stomachicum, carminativum. Adag bels. porban, pilulában 0,5—1,0 pro dos $2-3 \times$ napj. 100,0 = 16 kr.

†**H. Zincum aceticum** [$Zn(C_2H_3O_2)_2, 3H_2O$]. Finom, szíutelen, lemezalakú jegecekből áll; 3 sr. hideg, $\frac{1}{2}$ sr. forró vízben és 30 sr. borszeszben oldható. Küls. substantiában hámfosztott helyeket, nyákhártyákat edző, higabb oldatokban adstringens. Bels. nervinum, mint a zinkkészítmények általában. Szemvíznek, húgycsőbe fecskendésre 0,1—0,2: 100,0. Bels. 0,05—0,1! pro dos. $2-5 \times$ napj. Dos. maxim. pro die 0,5. Mint emeticum ne rendeltessék. 10,0 = 24 kr.

853 Rp. Zinci acet. 0,4.
 Aquae dest. 200,0.
 Tinct. Opii simpl.
 gtt. 10.
 DS. Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhoea.
 34 kr.

854 Rp. Zinci acet.
 Extr. Belladonnae
 aa 1,0.
 Pulv. rad. Valerianae
 qu. s.
 ut. f. l. a. pilul. No. 50
 Consp. pulv. Liquir.
 DS. $2-3 \times$ napj. 2 szemet.
 Lehet emelkedni is az adaggal.
 Epilepsia. 50 kr.

†**H. Zincum chloratum** ($ZnCl_2$). Fehér, v. kissé szürkés-fehér por; vízben és borszeszben igen könnyen oldódik. Légen megnedvesedik és szétfolyik. Substantiában causticum. Oldatokban desiniciens, antisepticum. Bels. nem haszn. Causticus czélokra szolgálnak a bacillusok (kali nitr.-al összeolvasztva és formába öntve), azután a pasta Canquoini és a pasta Laudolfii. Sebkezelésben mint desiniciens 1,0: 100,0—500,0, szemvíznek 0,02: 100,0, húgycsőbe fecskendésre 0,05: 100,0. 10,0 = 10 kr.

855 *Rp.* Zinci chlorat
Farinae Secalis $\bar{a}\bar{n}$ 10,0.
M. f. c. Aqua dest.
qu. s. pasta.

DS. Késhátvastagon fel-
kenni. Külsőleg. Pasta
Canquoini. I. sz.
35 kr.

857 *Rp.* Zinci chlorati
Stibii chlorati
Acid. hydrochlor. conc.
 $\bar{a}\bar{n}$ 10,0.
Lycopodii qu. s.
ut. f. pasta.

DS. Külsőleg. Pasta cau-
stica Landolfii HEBRA mó-
dosítása szerint. 68 kr.

856 *Rp.* Zinci chlorati 5,0.
Farinae Secalis 10,0.
Glycerini 1,0.
M. f. pasta.

DS. Késhátvastagon fel-
kenni. Külsőleg. Pasta
Canquoini II. sz.
MENTÉRE módosítása
szerint.
30 kr.

858 *Rp.* Zinci chlorati 1,0.
Aquae dest. 1000,0.
MDS. Külsőleg.
Sebmosó folyadék.
51 kr.

†**H. Zincum oxydatum s. Flores Zinci (ZnO).** Finom,
fehér alaktalan por; vízben nem oldható. Kills. mint hintőpor a
bőrön szárító, izgalmat csökkentő, a nyákhártyákon enyhén edző,
izgató. Kenőcsben szárító. Bels. nervinum, antispasmodicum, főleg
epilepsia, chorea, hysteria, eclampsia eseteiben. Adag bels. por.
ban, pilulában 0,05—0,1—0,3 pro dos. napj. 3—5-ször. 10,0 = 7 kr.

H. Unguentum Zinci oxydati (1:9). Szárító, fedő kenőcs.

859 *Rp.* Zinci oxydati 2,0.
Lycopodii 30,0.
M. exact. f. pulv.
det. in scat.

S. Hintőpor.
Intertrigo, pruritus pu-
dendi. 41 kr.

860 *Rp.* Zinci oxydat. 1,0
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 3—4 $\times$ napj. 1 port.
Epilepsia, chorea.
41 kr.

861 *Rp.* Ziuci oxyd. 0,2.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 4 $\times$ napj. 1 port.
Csecsemőknek eclampsia
esetén. 41 kr.

862 *Rp.* Zinci oxyd.
Asae foetid.
Pulv. Valerianae.
 $\bar{a}\bar{n}$ 2,5.

Mucil. Gummi arab.
qu. s.
ut f. l. a. pilulae No. 50.
Obduc. foliis Argent.

DS. 2—3 $\times$ napj. 2—5 sze-
met. Hysteria.
1 frt 20 kr.

863 *Rp.* Zinci oxyd. 0,3.
Calomelanos 0,1.
Sacchar alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. 2 ór. 1 port.

6—8 hónapos csecsemő-
nek eclampsia, laryngo-
spasmus esetén.

43 kr. (BÓKAI J.)

865 *Rp.* Zinci oxyd. 1,0.
Magnes. carb.
Talci aa 5,0.
M. f. pulv.
DS. Hintőpor.
Intertrigo gyerm.
24 kr.

864 *Rp.* Zinci oxyd. aa 0,3.
Moschi aa 0,3.
Sacchar. alb. 3,0
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.

DS. Napj. 3—4 port.

Gyermeknek antispasmo-
dicum. (BÓKAI J.)

1 frt 91 kr.

Zincum sulfo-carbolicum. $Zn.(C_6H_5SO_3)_2.8H_2O$. Szín-
telen, áttetsző, légen elmalló, oszlopos v. lemezes jegeczek. 2 r.
vízben oldh. Egyesíti a desiniciens és összehúzó hatást. Haszn.
a sebkezelésben és a húgycsőtakár gyógykezelésénél. Befecsken-
désekre $\frac{1}{4}$ —1%-os oldatok. 1,0 = 2 kr.

†H. **Zincum sulfuricum** ($ZnSO_4.7H_2O$). Szintelen, hasábos,
v. tűalakú jegeczekből áll. Hideg és meleg vízben egyaránt könny-
nyen oldódik. Vizes oldata csipős, undorító fémízű és savanyú
kémhatású. Substantiában edző, de ezen hatását fel nem használ-
juk. Híg oldatokban desiniciens, de gyengébben, mint a chlórzink;
jó adstringens és mint ilyen haszn. szemvíznek 0,03—0,1 : 10,0,
húgycsőbe fecskendésre 0,3—0,5—1,0 : 100,0, száj-, torokvíznek,
sebek, hüvely mosására 0,5—1,0 : 100,0. Bels. emeticum, adag
0,3—1,0! pro dos. Dos. maxim. pro die 5,0! 10,0 = 2 kr. pulvis
10,0 = 4 kr.

866 *Rp.* Zinci sulf. 0,3.
Aquae dest. 30,0.
Tinct. Opii croc. gtt. 10.
MDS. Szemecseppek.
Conjunct. catarrh. 26 kr.

867 *Rp.* Zinci sulf. 0,5.
Aquae dest. 200,0.
Acid. carbol. liquid. 1,0.
MDS. Húgycsőbe fecsken-
désre. Gonorrhoea.
34 kr.

868 *Rp.* Zinci sulf. 0,5.
Plumb. acet. bas. sol.
1,0.
Aquae dest. 200,0.
MDS. Húgycsőbe fecsken-
désre gonorrhoea esetén.
Használat előtt felrázni.
34 kr.

869 *Rp.* Zinci sulf.
Aluminis aa 0,3.
Aquae dest. 200,0.
Tinct. Opii croc. 1,0.
MDS. Húgycsőben fecsken-
désre. Gonorrhoea. 73 kr.

- 870 *Rp.* Zinci sulf. 0,5.
 Aquae dest. 100,0.
 Tinct. Opii simpl. 1,0.
MDS. Belégzésre.
 Laryngitis catarrhalis.
 30 kr.
- 871 *Rp.* Zinci sulf. 0,5—1,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 25,0.
MDS. 10—15 perczenként
 1 évőkan. míg hányás
 nem jelentkezik.
 Emeticum. 36 kr.

†**H. Zincum valerianicum** [$Zn(C_8H_7O_2)_2 \cdot 2H_2O$]. Zsírfényű, lemezes kristályokból áll, valerianaszagú tömeg. 90 sr. vízben, 40 sr. borszeszben oldható. Nervinum, antispasmodicum, mint a zink. oxyd. Adag bels. 0,05—0,1 pro dos. porban, pilulában. Dos. maxim. pro die 0,5! 1,0 = 5 kr.

- 872 *Rp.* Zinci valerian. 0,5.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 3—4 × napj. 1 port.
 Epilepsia, hysteria.
 48 kr.
- 873 *Rp.* Zinci valerian. 0,2.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aequ. No. 10.
DS. 4 × napj. 1 port.
 5 éven túli gyermeknek
 chorea minor esetén...

H. Zingiberis rhizoma. (Zingib. offic. Scitamineae.) Hatóanyagai illó olaj, gyanta. Stomachicum, carminativum. Keserű és illatos theák alkatrésze. 10,0 = 3 kr.

H. Tinctura Zingiberis. Adag bels. 10—30 csepp.
 Keserű v. illatos tincturák alkatrésze. 10,0 = 7 kr.

XI. Betegek asztala.

1. Üdülők étrendje.

Lázas betegségek után a láz múltával az emésztőszervek működése még korántsem tökéletes és az emésztőcső nyákhártyája még erősen sérülékeny; ezért nagy vigyázat, különösen typhus abdom. peritoneitis, dysenteria után. Az üdülő éhsége, étvágya félre ne vezessen. Ételek kezdetben folyékonyak, később félfolyékonyak, majd laza összeállásúak legyenek. Szabály, fokozatosan haladni a szokott étrend felé s inkább napjában többször keveset, mint ritkábban, de sokat nyújtani.

Folyékony ételek: erős húsleves, rántott leves, tejleves, becsínált lé, (mindez tojássárgával vagy a nélkül) tej (!), gyenge tejes kávé, chocolate, zsírtalanított cacao-forrázat; *félfolyékonyak*; lágytojás, tejes pépek, sűrű becsínáltak; *laza összeállásúak*; vagdalt borjúhús (hâché), sódar- vagy nyers vesepecsenye vakarék, csirkesült fehér húsa, gyenge borjúsült, fogoly, fázán, császármadár, halak közül fogas, kecsge (ízgató mártások nélkül). Húsételekhez alma-, vagy aszalt szilva compote adható. Tészták helyett tojáshabfelfújt, citromfelfújt, omlette, piskotatészta (rizsliszttel készítve) adandók. Friss gyümölcsök közül csakis a szőlő (magja és héja nélkül) engedhető meg. Kenyér helyett kétszersült, pirított vizes- v. császárszemle.

Italul délelőtt kis pohár tokaji, ruszti, malagabor, délben kis pohár könnyű veres bor, vagy fehér bor vízzel, vagy kis pohár sör. Az üdülés 3-ik hetében térhetni át a megszokott rendes étrendre, midőn a táplálék fehérjedús legyen.

Nem valók üdülőknek: Zsírok (vaj), zsíros hús, erősebb összeállású hús, saláta, gomba, főzelékek, gyúrt- vagy zsírban kisült, vagy élesztős tészták, rétesek, puha kenyér.

Ugyanezen szabályok állanak a *gyermekágyasokra* nézve is.

2. Heveny-lázas betegek étrendje.

Ezen betegek összes emésztőnedvei csökkent mennyiségben választatnak el, az emésztőcső nyákhártyája hyperaestheticus, a gyomor-bélizomzat tonusa gyengült; mindezért nagy vigyázat (! !). Folyékony vagy félfolyékony, igen könnyen emészthető, hűvös vagy langyos (nem meleg) ételek adassanak. Étrend lehetőleg változatos legyen s fehérjefélékben dús, míg a zsírok és szénhidrátok hátterbe szorítandók. Adjunk napjában 5—7-szer keveset s ne ritkán, de sokat. A lázas hőmérsék napi remissiójakor (reggel) jobb az étvágy, jobb az emésztés. Elkezés előtt és után a száj vízzel kimosandó. *Üzelszerű ételek*: rántott leves, tejleves, húsleves, enyvtartalmú levesek (borjúlábból), becsínált lé, mindezekbe tojás habarható, vagy

árpadara, rizs, sagó főzhető; lefőlözött édes tej, tejjel nélküli aludt tej (ha nincs hasmenés), gyenge tejes kávé, succus carnis recenter pressus, beef-tea, húspepton, LEUBE-féle húsoldat, tojáshabfelfújt. *Célszerű italok:* friss víz, jeges víz, (szükség szerint), limonade, málnaszörpös víz, fehérjés víz rizsvíz, cukros víz, sodavíz, vizes bor, cognacos víz, gyenge orosz tea langyosan tejjel vagy hidegen.

Öregknél, vagy nagyon elgyengültoknál, ha stimulantiák szükségesek, borleves, ó-bor, tokaji, pezsgő, cognac adhatók. Iszákosoknál, a fenti ételek mellett, az általuk megszokott italokat, az általuk megszokott mennyiségben kell adnunk.

Ezen szabályok általánosak s az egyes betegségek, de a beteg egyénisége szerint is módosítandók.

3. Idült lázas betegek, főleg tüdővészések étlendje.

A láz következtében támadt napi testsúly-fogyást célszerű módon pótolni kell, sőt ha lehet, túlpótolni. Ezen betegek emésztőképesége általában jobb, mint a heveny-lázas betegeké; az emésztőcső nyákhártyája sem oly sérülékeny, a felszívódás is tökéletesebb; mindez különösen a lázas mozgalmak remissiója, s még inkább intermissiója alatt észlelhető. A táplálát javulása, a testsúly növekedése csökkenti a lázat, sőt az a betegség lefolyására is kedvező befolyású.

A táplálék főleg zsirokat, szénhidratokat és enyvyanyagokat tartalmazzon nagy mennyiségben, míg fehérjéket csak középennyiségben; azon élvezeti anyagokra, melyek az étvágyat, emésztőképességet serkentik, nagy gond fordítandó. Változatosság az étrendben elengedhetlen. Testsúlymérések ellenőrizték az étrend célszerűségét. Étkezés naponta 5–6-szor.

Célszerű ételek és italok: Tej (1 l), iró, gyenge tejes kávé, tejszínes tea, cacao-forrázat, chocolate, kumys, kephir, nem erős sajtok, különösen zsiros sajtok (liptói, szepesi túró), vaj, fiüstölt és nem paprikázott szalonna, sódar zsírjával, csontvelő, tojás nyersen vagy lágyan, erős és zsiros húslevesek belefőtt tészttákkal, enyvdús becsinált levesek, bab-, borsó-, vagy lencselisztelt készült levesek, vagy ily liszttekkel készült pépek, burgonya különböző alakban, LEUBE-féle húsoldat, peptonok, sülték, főleg szárnyas, vad, borjú, bárány, puhább marhasülték, soványabb sertéssült, halak közül kecsge, fogas, harcsa aspikkal, sardina és thunhal-conservék, tejbefőtt rizs, darás-metélt, omlerte, palacsinta, felfújtak, írósvajas könnyű tészták, rizslisztos sütemények (piskóta tészta), fehér buzalisztból készült kávé-sütemények piritva, kétszersült, friss vagy párolt gyümölcs, befőttek; italul gyengébb sör, veres bor, édes borok, pezsgő, cognac.

Indigestio, hasmenés felléptével azonnal csak folyékony vagy félfolyékony ételek adassanak s kerültessenek zsiros ételek- és édességek. Haemoptoe jelentkezésekor kerültessenek szeszes italok, szénsavas italok, kávé, tea, meleg ételek.

DETTWEILER tr. *Falkensteini* intézetében (tüdővészesek sanatoriuma) körülbelül következő a tüdővészesek átlagos étrendje: *Reggel* 7—8 ó. Tejes kávé, vagy tejes tea, vagy cacao-forrázat javalatok szerint; kétszersült vagy zsemlye vajjal s kávé-sütemény a jólakásig, erre egy pohár tej kortyonként. *D. e.* 10 ó. 1—2 pohár tej kortyonként elfogyasztva, vagy 1 üveg kumys (jól helyettesítheti ezt a nálunk itt-ott már kapható kephir), vajas kenyér; külön javalatra bouillon tojással és vajas kenyér, vagy hideg hús és vajas kenyér, 1 pohár borral; ha lehet még ezután 1 pohár tej kortyonként. *Déli* 1 ó. Ebéd, mely áll sültből, főzelékből és csemegéből; italul bor tisztán vagy Seltersi (nálunk Szolyvai, Bikszádi Bartfai Orvos, v. Luhi Margit források) vízzel. *D. u.* 4 ó. 1 pohár frissen fejt tej, vagy kumys (kephir), sonkás vajas kenyér, 1 pohár borral, vagy 1 pohárka cognac-al. *Este* 7—7½ ó. Meleg húsétel burgonyával, rizsszel, metélttel, vagy hideg hús, vagy szárnyassült saláta és compote-al. Bor. *Este lefekvés előtt* 1 pohár tej, egy kávé kanál cognac-al.

A DEBOVE-féle „*alimentation forcée*“ tüdővésznél gyomorszivattyún át történik. A gyomor előbb a gyomorszivattyún át jeges víz segítségével kimosatik s ugyancsak a gyomorszivattyún át tej nyers tojással, vagy tej hússporral (100 gramm hússpor + 500 grm. tej) vitetik a gyomorba; mindez 3-szor napjában történik. Az eljárás sokat kizozhatja a beteget. Jobb az előbbi étrend!

4. Heveny gyomor- és bélhurutban szenvedők étrendje.

Ha a gyomor nagyon hyperaestheticus (hányás, fájdalmak), kapcsoljon a beteg 1 napig, legfeljebb jéglabdacok, vagy jeges víz, vagy behűtött sodavíz adassék neki evőkanalankint; másnap már nyújtható behűtött tojásfehérjés víz ¼ ór. 2—3 evőkanállal. A hányás szüntével megengedhető nagyobb mennyiségű tojásfehérjés víz, kevés sovány és tiszta rántott leves (kömény nélkül). További javulás beálltával rántott leves tojással, lágytojás, sódar-vakarék, sült csirke fehér húsa rendelő. Tej tapasztalat szerint nem tesz jót!

5. Idült gyomorbántalmakban szenvedők étrendje.

a) *Idült gyomorhurut, idült dyspepsia.* Étrend a szerint határozandó meg, amint a nyákhártya vérbő, vagy vérszegény, vagy izgalmi tünetek, v. atonia vannak jelen, v. csökkent a gyomorsav elválasztása, v. fokozott az, v. esetleg erjedési folyamatok jelei mutatkoznak.

Általános szabályok: óra szerinti pontos étkezés, lassú evés, az ételek jól megrágandók, kerülni kell a hideg és forró ételeket és italokat, egyszerre keveset szabad csak enni, száműzni kell a complikált ételeket.

Ha *vérsegeny* a nyákhártya, vagy ha *dyspepsia atonica* van jelen, könnyű, de kissé izgató animalis étrend van javalva; erős húslevesek, esetleg LEBIG-kivonattal, barna leves, sovány sódar, csirkesült, szárnyas vad, borjusült, tej, tejben rizs, piritott fehér buzakenyér vagy zsemlye, kétszersült, (barna kenyér kerülendő), könnyű piros bor, vagy fehér bor vízzel. Izgató hozzáátétel az ételekhez lehet konyhasó, szegfűszeg, macisvirág, zimmer, kevés bors, szerecsendió (paprika nem).

Ha a nyákhártya *vérbő*, vagy ha *hyperaestheticus*, szigorúan kerülni kell az izgató anyagokat, mint a fűszereket, szeszeket, erős húsleves, fekete kávé; elvetendő a könnyen erjedő ételek, italok is. *Célszerűek*: tej, zsírtalanított cacao forrázata, gyenge tea lefőlőzött tejjel, tejeves, rántott leves (kőmény nélkül), babliszt és borsóliszt leves, becsináltak (nem savanyúan), hideg csirkesült, hideg borjusült, tejben rizs, és dara, kétszersült, piritott zsemlye. Étkezés ritka legyen, legfeljebb 3-szor napj.

Ha *erjedés* van a gyomorban, az étrend általában olyan legyen, mint azt az imént előadtuk, csak szigorúan kerülni kell a zsirokat, amylaceákat cellulose tartalmú ételeket, édességeket, édes bort, liqueurt, sört, tejet (!), tejes ételeket.

b) *Gastrozynsis*. Roham alkalmával $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ liter langyos vizet kell inni (ROSSBACH).

c) *Dyspepsia nervosa*. Fő az általános kezelés. Roborans, könnyű étrend, olyanforma, mint ha *hyperaestheticus* a gyomornyákhártya. WEIR-MITCHELL-gyógymód tapasztalat szerint nem tesz jót (!).

g) *Ulcus ventriculi*. Erőművi-, vegyi-, hőingerektől gondosan óvni kell a fokélyt s így persze a gyomrot. Csak folyékony és könnyen emészthető ételek nyújtassanak, főleg tej (!); lehet adni LEUBE-féle húsoldatot, KEMMERICH-féle húspepton, tojáshabot is. A súlyos tünetek múltával félfolyékony vagy laza összeállású ételeket is meg lehet engedni; ilyenek a csirke- és borjú-becsináltak (de nem savanyúan), sódarvakarék, tejben rizs. Vérzés esetén jéglabdacskok, koplálás; vérzés szüntével egyideig csak hideg, esetleg jeges tej.

e) *Gastrectasia*. Az italok a legkisebb mennyiségre szállítandók le, kerülendő a könnyen erjedő és puffasztó ételek, italok. Ajánlatók: híg tojás, sovány sódar, hideg sovány szárnyas-, borjú-, marhasült, húspepton, cacao, piritott zsemlye, piros bor.

f) *Carcinoma ventriculi*. A szenvedések enyhítése mellett a táplálást lehetőleg fentartandó folyékony, nem izgató, könnyen emészthető ételek segítségével, milyenek a LEUBE-féle húsoldat, KEMMERICH-féle húspepton, vad haché, borjú haché, rizs, híg tojás, jeges tej, tojásfehérjés víz, kétszersült. Mindez napj. többször, de mindig kis mennyiségben adandó. Élvezeti szerek közül megengedhető a tea; erősítőnek jó az ó-bor (nem édes bor). Szomjúság és égető érzés ellen kanalkint jeges víz. Ha végbélien át táplálás szükséges lenne l. klysma cz. a.

6. *Diarrhoea chronicában szenvedők étrendje.*

Kerültessenek: gyümölcs, organicus savakat tartalmazó ételek, italok, szénsavas vizek, cukros dolgok, kávé, tej, főzelékek, zsirok, fekete kenyér, durva összeállású ételek, sós ételek, fűszerek.

Előnyösek: amylaceák s azokkal készült levesek, nyers hús- és sódarvakarék, westfaliai sódar, híg tojás, tojásfehérjés víz, fanyar piros bor, hosszan állott orosz tea (cukor nélkül), makk-kávé.

Szabály: órára étkezni, egyszerre keveset enni (inkább többször napjában), kevés folyadékot inni.

7. *Szokványos székszorulásban szenvedők étrendje.*

Előnyösek: friss hideg víz egyszerre bőven (főleg reggel éhgyomorral), vagy kortyonként, de hosszabb időn át, sódavit, friss gyümölcs, gyenge fehér bor, iró, méz, korpakenyér, Grahamkenyér, tej tejcukorral édesítve. *Kerültessenek:* piros bor, tea, gyúrt tészták, burgonya.

8. *Scorbutban szenvedők étrendje.*

Ajánlatos ételek: burgonya (!), friss vagy conserv zöldségfélék-ből készült ételek, friss hús, húskivonattal készült erős levesek, leves gyümölcs, nyáron az itthon termettek, télen citrom, narancs. *Ajánlatos italok:* limonade (!), bor, sör.

9. *Köszvényes bántalmakban szenvedők étrendje.*

Az ajánlott étrendek közül ma leginkább az *Elstein*-féle van alkalmazásban, mely szerint a tápanyagok bevitelére általában mérséklendő, kerülendő a szénhidrátok, tehát a cukor és az amylaceák; a zsirok bevitelére mérsékelt mennyiségben meg van engedve, ezek t. i. ha más tápanyagokkal kevertetnek, a jóllakottság érzetét gyorsabban létrehozzák. Különben vegyes legyen az étrend. Sör legyen eltöltve, bor megengedhető napj. két kis pohárával. Tiszta vizet vagy gyenge égvényes ásványvizet igyék a beteg napj. 2—3 litert. A részletes étrendet l. alantabb az *Elstein*-féle soványító étrend címe alatt (213. l.). Kiadós testmozgás szigorúan követeltessék; ha az activ mozgás ki nem vihető, massage rendelő el. Különben individualizálni kell.

10. Diabetes mellitusban szenvedők étrendje.

Csak az étrend szigorú megtartása biztosítja a jó eredményeket.

Tiltott dolgok: répa-, nád-, szőlő- és tejcukor, amylaceák, valamint ezekkel készült, vagy ezeket tartalmazó ételek és italok, p. o. tészták, torták, kenyér, tejes kávé, édes gyümölcs, burgonya, édes bor, sör, liquor, pezsgő, cacao, chocolate. Ételek, italok édesítésére használhatók inosit, mannit, levulose, glycerin, saccharin (l. o. cz. a. vénygyűjt).

Megengedvek bármily mennyiségben (lisztet nem tartalmazó) levesek, minden fajta húsétel a szükséges mennyiségű zsírral, (de lisztet tartalmazó mártások nélkül), tojás, tojásételek; mérsékelt mennyiségben zöld saláta, paraj, spárga, carfiol, zeller, kis retkek, gomba, zöld bab; kis mennyiségben aludt tej, kephír, tojsűrű, idős sajtok, savanyú gyümölcs (ribizke, eper, málna, savanyú narancs), dió, mandula; továbbá fekete kávé, tea, limonade, mindhárom esetleg saccharinnal édesítve; savanyú borok. Kenyér helyett készíteszünk *diabetes kenyereket*, melynek a SEEGEN-féle *mandulakenyér*, vagy a KÜLZ-féle *inulinkenyer*. A SEEGEN-féle mandulakenyér következőleg készítendő: Mozsárban $\frac{3}{4}$ font hámozott édes mandulát $\frac{3}{4}$ órán át finomra kell törni, amint csak lehet; a mandulaliszt sok czukrot tartalmazván, belőle a czukrot úgy kell eltávolítanunk, hogy a lisztet vászonzacskóba kötjük s a zacskót $\frac{1}{4}$ órára forrásban levő vízbe helyezzük, miután a vizet néhány csepp eczetsavval vagy erős eczettel megsavanyítottuk. A czukortól megszabadított mandulalisztet most 6 lat vajjal s 2 egész tojással jól összekeverjük s e keverékhez hozzáelegyítünk 3 tojássárgát és kevés konyhasót. Ha ez megtörtént, 3 tojás fehérjét habbá verünk, s a tésztával összehabarjuk. Az így elkészült tésztaanyagot vajjal kikent formába helyezzük s enyhe tűznél megsütjük. A KÜLZ-féle *inulinkenyer* következőleg készül: 50 grm. inulint vízfürdőn porcelláncsészében kevés meleg vízzel és mintegy 30 grmnyi tejjel, 4 tojássárgával s kevés konyhasóval péppé kell összehabarni. Ezután habot kell verni 4 tojás fehérjéből, mely habot az előbbi péppel erősen össze kell elegyíteni. Az így elkészült tésztaanyagot vajjal kikent pléhformában meg kell sütni.

Diabeticus egy napi étrendje p. o. a következő lehetne: *Reggel* 7—8 ó. Csésze tea vagy kávé tojszínnel, saccharinnal (l. o. cz. a. vénygyűjt.) s egy db. diabeteskenyérrel. *Délután* 10—11 ó. Beefsteak ökörszemmel s 1 pohár piros bor. *Déli* 1—2 ó. Húsleves tojással; kevés főzelék a megengedett zöldségnekeműek közül, de liszt (rántás) és cukor nélkül elkészítve; sült böven, hozzá zöld saláta (cukor nélkül készítve); tojás hab felfutt mannittal vagy saccharinnal édesítve, kevés dió, savanyú gyümölcs, savanyú bor. *Délután* 5 ó. Fekete kávé tojássárgával és esetleg saccharinnal, 1 db. diabetes kenyér. *Este* 8 ó. 2 db. sardina, vagy 2 db. híg tojás, utána sült vagy hal, vizes bor, tea, esetleg saccharinnal vagy mannittal édesítve.

11. Lipomatosisban (hájkór, túlságos kövérség) szenvedők étrendje.

Soványító gyóymód, illetve étrend, többféle áll rendelkezésünkre; mindenik terhes, sőt néha kínos is a betegnek, mindeniknek vannak hátrányai, de ha szigorúan megtartatnak, mindeikkel lehet eredményeket elérni.

a) *Banting-Harvey-féle gyóymód.* Főelve a zsirok és szénvizegyek elvonása. *Reggel:* orosz tea vagy kávé, tej és cukor nélkül, 50 grm. sovány sódar vagy hideg hús, Grahamkenyér. *Délben:* 60—100 grm. sovány hús (marhabús, vagy vad, vagy szárnyas, vagy hal), friss zöld főzelék (sós vízben megfőzve, vaj vagy rántás nélkül), savanyú gyömböles párolva (cukor nélkül), 2—3 pohárka piros vagy fehér bor. *Délután:* 1 pohár tej 1—2 drb. kétszersüttel. *Este:* 40 grm. sovány sült vagy hal, 1—2 pohárka bor. Külömben testsúly, alkat, klíma, évszak szerint módosítandó az étkek és italok mennyisége. Nagyobb fokú erőhianyatlás esetén a gyóymódot meg kell szakítani. Testmozgás szükséges.

b) *Ebstein-féle gyóymód.* A betegek szívesebben alávetik magukat ezen gyóymódnak, mint a BANTING-félének. Szigorúan eltiltandók a szénvizegyek (tészták, cukor, édességek, burgonya); egyedül kenyér van megengedve 80—100 grm. pro die. Zsirok nemcsak megengedvők, sőt rendeltetők, ezek u. i. étkekhez keverve, hamar előidézik a jóllakottság érzetét. Étkezés 3-szor napj. Étrend a következő: *Reggel* 7^{1/2} ó. Nagy csésze orosz tea cukor, tej és rum nélkül, 50 grm. fehér pirított kenyér, vagy fekete kenyér bőven vajjal. *Délben.* 120—180 grm. tiszta húsleves, melléje vagy beléje csontvelő (kenyér nélkül), 120—150 grm. kövér főtt vagy sült hús, zsiros mártással, zöld főzelék angolosan készítve, mérsékelt mennyiségben (kizárva: burgonya, sárgarépa, répa), saláta, sült alma, vagy friss alma, vagy meggy compote cukor nélkül elkészítve, 2—3 pohárka könnyű fehér bor. Ebéd után nagy csésze erős orosz tea keserűen. *Este:* nagy csésze orosz tea keserűen, hozzá egy drb. híg tojás, vagy kevés zsíros sült, vagy kövér sódar, vagy hal; 30 grm. kenyér, sok vajjal, néha kevés sajt, friss gyömböcs.

Körültessék az ételek erős sózása, fűszerezése. Ha dyspepsia jelentkeznék, ami nem ritkaság, a táplálék soványabb legyen.

c) *Oertel-féle gyóymód.* Főleg a lipomatosis azon esetében ajánlatik, midőn a szíven történt zsír felhalmozódás folytán szívgyengeség s így keringési zavarok vannak jelen. LEYDEN és LICHTHEIM bírálatai óta szívbántalmak eseteiben a javalatok nagyon meg vannak szorítva. A gyóymód három részre oszlik: 1. *Étrend.* Főelv a víznek lehető megvonása, hogy így a test víztartalma csökkentessék, továbbá oly táplálék nyújtása, mely a zsír felrakódásának nem kedvez, de a test fehérjetartalmát gyarapítani tudja. Ily étrend lenne a következő: *Reggel.* 120 grm tea vagy fekete kávé, 30 grm. tejjel, 5 grm. cukorral és 35 grm. buzakorpa kenyérrel. Víz semmi. *Délben.* Az egyéniség szerint semmi leves, vagy legfeljebb 100

grammnyi, 200—250 grm. főtt vagy sült marhahús, vagy borjúhús, vagy vad zöld salátával, 25—50 grm. friss zöld főzelék sós vízben megfőzve (vaj vagy rántás nélkül), 25 grm. kenyér, vagy helyette ugyanannyi tésztaemű, 100 grm. friss gyümölcs; italul eleintén 1—1½ decilit. sör, vagy gyenge fehér bor, később semmi ital. *Délután*, 100 grm. fekete kávé, 25 grm. tejjel, 5 gramm csukorral, egy-két korty víz. *Este*. 2 híg tojás, 150 grm. sült, 25 grm. zöld saláta, 10 grm. sajt, 25 grm. kenyér, kevés gyümölcs, 2 decilit. bor és 5 köbcentim. víz. A szomjúság ezen étrend mellett erősen kinozza a betegeket, collapsus néha előfordul. 2. *Rendszeresen végzett testi munka*, mely főleg abból áll, hogy a betegek állapotához képest majd sík úton, majd emelkedő utakon sétálva (*Terrainkur*) fokozatosan emelni igyekszik szívizomzatának munkáját. 3. *Ütőgyógymód*, melynek célja megakadályozni a már megfogyott testnek újra hízását, miért is az ol nem hanyagolandó rendszeres testi munka mellett, a táplálék a fenti elvek értelmében választandó meg.

12. Weir-Mitchell-féle hizlaló gyógymód.

Javulatok: idiült betegségek utáni nagy súlyfogyás, olygaemia, chlorosis, vérvesztések utáni kimerülés, hysteria bizonyos alakjai, neurasthenia.

Ellenjavulatok: csillapíthatlan hányás, dyspepsia nervosa, hystericus görcsök, agyizgalmak, különböző elmobántalmak.

A cél a betegnek testsúlyát, táplálását javítani. A gyógymód 4—6 hétig tart; ha a beteg azt nem tűrné, az vagy megszakítandó, vagy egészen megszüntetendő. A beteget szokott környezetéből el kell távolítani s melléje sympathicus, értelmes és ügyes ápoló személyzetet rendelni. Nyugodt ágyban fekvés az egész gyógymód alatt szigorúan követeltessék. Az activ testmozgást a passivnak kell helyettesítenie, ezért napjában többször ¼—1 órai massage-t kell elrendelni, melyet a beteg neme szerint férfi vagy nő végezzen; ezenfelül az orvos napj. egyszer faradicius árammal villamozza a beteget.

A táplálék mennyiségét fokozatosan kell emelni. Az első napokban kizárólag tej nyújtassék, és pedig 2 óránként 60 grm. A 3—5-ig napon már 3 litert tegyen ki az elfogyasztott napi tejmenyiség. Ha a beteg undorodnék a tiszta tejtől, akkor ahhoz kevés tea vagy kávé vagy cognac teendő. 6 nap múlva köv. legyen az étrend: *Reggel* 7 ó. ½ liter tej, mely ½ óra alatt kortyonként fogyasztandó el, 8 ór. ½—¾ liter tejszínes kávé, fehér kenyér vagy kávésiutemény vajjal, 80 grm. hideg sült, 1 tányér zsírban kisütött burgonya (pommes de terre frites). 10 ór. ½ liter tej kétszersülttel. *Déli* 12 ór ½ liter tej, mely ½ óra alatt fogyasztandó el, 1 ór. Húsleves, sült bőven, főzelék, édes tészta, compot. 3 ór. 30 p. ½ liter tej kortyonként, 5 ór. ½ liter tej, vajas kenyér, 80 grm. hideg hús. 8 ór. Meleg sült, kenyér vajjal, ½ liter tej. 9 ór. 30 p. ½ liter tej, kétszersült.

A levesekben, húsban, főzelékben, édes tésztákban változatosság.

PLAYFAIR, LEYDEN, BINSWANGER, TAUFFER V. kísérletei igen jó eredményeket mutatnak fel.

XII. Az egészséges és beteg gyermek étrendje.

Irta : *Dr. Bókay János,*

egyetemi rk. tanár, „Stephián” gyermekkórházi
igazgató-főorvos.

1. A gyermek táplálása az első életévben.

A legtermészetesebb táplálék az anyatej. Az anya nem szoptathat, ha görvélyes, gümőkóros, nagy fokban vérszegény, vagy erősen sápkóros; nem szoptathat oly betegségek esetén sem, melyek nagy mértékben gyengítik (idült veselő, diabetes stb.). Ideges bántalmak, mint hysteria, epilepsia hasonlóképp tiltják a szoptatást. Vele-született syphilisben szenvedő csecsemőt szoptassa anyja, ha a szoptatásra különben képességgel bír.

Az anyatej legjobban dajkatejjel pótolható. Dajkaválasztásnál a dajka gyermeke mindig megvizsgálandó. A dajka tejének kora és a szoptatandó gyermek kora lehetőleg egyezzenek. Újszülöttnél két-három hónapos tejű dajkának előnyt adunk, hogy a congenitalis lues-t a dajka gyermekénél kizárhassuk. Idősebb, több hónapos gyermekhez két-három hónappal fiatalabb tejű szoptató nőt szerezzünk. A dajka életkora húsz-harmincz év között álljon; előnyben részesüljön a másodszor szülő.

A szoptatás rendszeresen történjék, és pedig: az első hetekben két óránként, később három óránként. A havi vérzések tartama alatt az emlő nagyobb időközökben nyujtassék, mert a tej ekkor casein-dúsabb. Újabb terhesség az elválasztást, illetőleg a szoptatandó változtatását teszi szükségessé.

Az. elválasztás a fogzástól tétessék függővé. Legalkalmasabb időpont az elválasztásra a második fogzási szünet (9—10 hónap). Főcsoport jelentkezése alatt az elválasztás lehetőleg kerülendő. Az elválasztás lassan, fokozatosan, négy-hat hét alatt történjék. Az elválasztásra legalkalmasabb időszakok az ősz és tavasz. Diarrhoea ab lactatorum szükségessé teheti a gyermeknek újból emlőre vételét.

A mesterséges táplálásra legalkalmasabb tápszer a tehéntej (a számrtej vegyi összetételét illetőleg közelebb áll a női tejhez, de nehezen hozzáférhető). A tehéntejet jól felforralva adjuk a csecsemőnek; a felforralás pontosan végezhető a SOLTSMANN-féle tejforralóval, még jobban a SOXLETH-féle tejsterilizáló készülékkel. Moslékkal táplált tehén teje csecsemő táplálására ne használtassék. A forralt tehéntejnek forralt vízzel hígítása az első élethónapokban következőképp történjék:

Az 1-ső és 2-ik napon 3 rész víz + 1 rész tej,
 a 3-ik naptól a 4-ik hétig 2 rész víz + 1 rész tej,
 a 4-ik héttől a 3-ik hónapig 1 rész víz + 1 rész tej,
 a 3-ik hónaptól a 6-ik hónapig $\frac{2}{3}$ rész víz + 1 rész tej,
 a 6-ik hónaptól kezdve tiszta tehéntejet kaphat a gyermek.

A tiszta, valamint a hígított tehéntejet közönséges cukorral édesítsük meg. A hetedik hónaptól kezdve a tejet makk-kávéval vagy árpa-kávéval keverhetjük össze.

A tehéntejet a csecsemőnek szópóüvegéből adjuk. Szópóüveg használata az első hetekben sokkal célszerűbb, mint a kanállal etetés. A szópóüveget, annak csövét és bimboját minden szopás után tiszta vízben jól kiáztassuk, illetve pontosan kitisztítottassuk. Az a szópóüveg a legjobb, a melyik legtisztábban tartható.

Sűrített tej állandó mesterséges táplálásra nem alkalmas. Rövid időre azonban (p. o. utazáskor) használható. A sűrített tejek közül jobbak azok, melyek cukor hozzájárulása nélkül kondenzáltattak; ilyenek az: *Oelli-tej* és *Komanshorni-tej*.

Pépeket mesterséges táplálásra a 7—8-ik hónapig ne engedjünk használni. Ezen időn túl kétszersültből, valamint pirított zsemlyehéjből tejjel készült pép adható, de természetesen csak akkor, ha a gyermek emésztése rendes. Közönséges lisztpépet mesterséges táplálásra használni ne engedjünk.

Gyermekliszteket (NESTLE-féle stb.) az első élethónapokban ne rendeljünk; a 7—8-ik hónaptól kezdve a gyermeklisztekből készült higabb vagy sűrűbb keverékeket a gyermekek általában jól tűrik.

Tiszta húslevest a gyermek már a 6-ik hónaptól kezdve kaphat. Tojást a gyermek a 7—8-ik hónapig nehezen emészt. Ezen időn túl a leveshez fél tojássárga keverhető.

Ha a gyermeknek 6 tejfoga van (10-ik hó körül), finomra vágott húst levessel leforrázva, vagy hirtelen kisütve is adhatunk neki.

2. A gyermek táplálása a második életévben.

Ezen korban a gyermek emésztőcsöve még nem tűri a tömött összeállású és a cellulose-dús táplálékot; ezért a táplálék híg folyékony vagy pépszerű legyen, s inkább állati, mint növényi eredetű. Kerülendők továbbá eczetes és savanyú ételek, édességek, nehéz zöld főzelékek, héjas gyümölcs, durva kenyér, kávé, orosz tea, sőr. A táplálék álljon a következőkből: Forralt tehéntej, esetleg keverve makk- vagy árpakávéval vagy cacaoval, egészen híg tojás, húslevesek, becsinált lé, lágy és finomra vágott sülték (csirke-, marh- vagy borjúsült), reszelt sonka, jól kisütött zsemlye, fehér kenyér, kétszersült, gyermeklisztekből készült pépek, tejes ételek. Étkezés 24 óra alatt öt-hatszor. Túlságos hosszú szünetek nem célszerűek, mert különben a gyermek mohón eszik.

3. *A gyermek táplálása a 3—4. életévben.*

A gyermek ezen korban a cellulose-tartalmú táplálékot még mindig nehezen emésztí, e mellett a túlnyomóan növényi eredetű táplálék görvélykór kifejlődését is elősegítheti. Kávé, sör, orosz tea rendes körülmények között kerültessenek. Alkalmas táplálék: Tehéntej makk-kávéval vagy cacaoval, lágytojás, húslevesek, sültetek, vaj, búza- vagy rozskenyér, tejes ételek, burgonya kis mennyiségben, könnyű zöld főzelékek, hüvelyes veseemények áttört alakban, érett gyümölcs. Az étkezések száma 24 óra alatt 5 legyen.

A negyedik év befejeztével a gyermek a felnőttekkel étkezik.

4. *A rhachiticus gyermek táplálása.*

Az első életévben lehetőleg női tejjel tápláltassék a gyermek; ha ez elháríthatlan akadályokba ütköznék, megbízható tehéntejjel (lásd mesterséges táplálás). Az első éven túl, az életkor tekintetbevételével előnnyel nyújthatók: Vakart nyers hús (vesepeccsenyéből), reszelt sonka, csirke-, marha-, vagy borjúsült hálé alakban, OPPEL-féle kétszersült (Nährzwiback), fehér kenyér, kávéskanalként ó-bor (tokai). Kerülendők: édességek (czukorral besűrített tej), savanyú és eczetes ételek, gyümölcs, cellulose tartalmú táplálék (pl. rozskenyér) s keményítődús tápszerek (gyermeklisztek).

5. *A scrophuloticus gyermek táplálása.*

A táplálék legyen könnyen emészthető, fehérjedús, nem zsírszegény, lehetőleg cellulosementes; keményítő és cukros anyagok nagyobb mennyiségben ne szerepeljenek. A legfőbb tápszer a jó tehéntej, mely lehetőleg nagy mennyiségben naponta többször adassék (esetleg makk-kávéval vagy cacaoval), továbbá reszelt sonka, sültetek (szárnyas- marha- és borjúsült), zsemlye, fehér kenyér, kétszersült, rizs, tejes ételek, érett gyümölcs, bor, esetleg sör. A görvélykór erethicus alakjánál helyezzük a fősúlyt tejnek nagy mennyiségben fogyasztására, míg a torpid alaknál kevesebb folyadékot és kevesebb zsírt nyújtunk. Az erethicus görvélyes gyermek bort ne kapjon, míg a torpid gyermeknél a borivás ajánlatos.

6. *A csecsemő táplálása a gyomor- és bélhuzam megbetegedései esetén.*

a) *Dyspepsia.* Rendezett szoptatás. Menstruatio esetén ritkább szoptatás. Idült, makacs dyspepsiánál a szoptató nő változtatása. Nemrég elválasztott gyermeknél újbóli szoptatás. Nem régen mesterségesen táplált csecsemőknél emlőre tétel. Mesterségesen táplált

csecsemőknél a tej hígítása vagy a hígítás fokozása. Víz hozzátétel helyett esetleg nyálkás folyadékok használtassanak a tej hígítására (rizsvíz, zabfőzet, borjúhúslé). Súlyosabb acut dyspepsiáknál a tehéntej hagyassék ki rövid időre és helyettesíttessék fehérjés vízzel, vagy gelatinoldattal (10 grm. gelatin $\frac{1}{2}$ liter vízre), ezeken kívül marhahús- vagy borjúhúslé. Idült dyspepsiánál naponta néhányszor palaczkbouillon (beaf tea). A „beaf tea” következőleg készíttetik: zsirtalan marha- vagy borjúhús apró kockákra vagdaltatik össze, s széles nyakú üvegbe (befőttes üveg) tétetik. A palaczk gyengén beköttetik, meleg vízbe helyeztetik s forraltatik. A forralás 20 perczig tart s forralás után a képződött húsleves leöntetik. 200 grm. hús 90—100 kcm. húsleves ad. A fehérjés víz következőleg készül: 1 tojás fehérje $\frac{1}{4}$ liter vízzel összekevertetik s 3—4 kávéskanál tört cukorral édesíttetik. A víz előzetesen felforralt s lehűtött legyen. A fehérjés vízhez szükség esetén cognac, madeira vagy tokaji bor vegyíthető.

b) *Enterocatarrhus acutus*. Rendezett szoptatás. Ha a gyermek vegyesen tápláltatnék, kizárólagos szoptatás. Diarrhoea ab lactatorum esetén újbóli szoptatás. Mesterségesen táplált csecsemőknél a tej hígítása, vagy a hígítás fokozása; a víz hozzátétel helyett nyálkás folyadékokkal (l. dyspepsia), esetleg makk-kávéval vagy makk-cacaoval hígítása a tejnek. A makk-cacaoból (MICHAELIS- vagy TRIMPE-féle) 1—2 kávéskanálnyi forraltatik fel egy csésze tehéntejjel, vagy tehéntej és víz keverékével s cukorral édesíttetik. A makk-kávé úgy készül, mint a közönséges kávé. Gyermeklisztek kerülendők.

Súlyos esetekben megkísérthető a BREDET-féle tejsűrűkeverék, esetleg szükséges lehet a tehéntej kihagyása rövid időre s pótlása húsleves (a „beaf tea”-val), nyálkás levesekkel, fehérjés vízzel, vízzel felforralt makk-cacaoval (1—2 kávéskanál egy csésze vízre).

A BREDET-féle tejsűrűkeveréknek következő fokozatai vannak:

I.	$\frac{1}{8}$ liter tejsűrű,	$\frac{3}{8}$ liter víz,	15 grm. tejcukor	
II.	$\frac{1}{8}$ „	„	$\frac{3}{8}$ „	$\frac{1}{16}$ liter tej.
III.	$\frac{1}{8}$ „	„	$\frac{3}{8}$ „	$\frac{1}{8}$ „
IV.	$\frac{1}{8}$ „	„	$\frac{3}{8}$ „	$\frac{1}{4}$ „
V.	$\frac{1}{8}$ „	„	$\frac{3}{8}$ „	$\frac{3}{8}$ „
VI.	$\frac{1}{8}$ „	„	$\frac{1}{4}$ „	$\frac{1}{2}$ „

Idősebb gyermekeknél: nyálkás húsleves. becsinált lé, a tehéntej mennyiségének csökkentése, esetleg elhagyása, zsírmentes táplálék, orosz tea, friss, egészséges ivóvíz, kevés vörös bor. A reconvalescentiában könnyen emészthető sovány hús, tehéntej makk-kávéval vagy makk-cacaoval.

c) *Enterocatarrhus chronicus*. Rendszeres szoptatás. Súlyos esetekben a szoptatónő változtatása. Mesterségesen tápláltaknál, ha kivihető, emlőre tétel, különben megbízható tehéntej, a tej hígítása, vagy a hígítás fokozása, víz hozzátétel helyett nyálkás folyadékokkal való hígítás stb. stb. (l. heveny bélhurut.)

Cukorral kondenzált tej, gyermeklisztek, praeparált lisztek kerülendők.

A második életévben előnnyel nyújtható nyers hús (TROUSSEAU, WEISSE). Főszabály, hogy a beteg gyakrabban kapjon táplálékot, de egyszerre csak keveset. Zsirus ételek, főzelékek, gyümölcs ki vannak zárva.

d) *Enteritis acuta et chronica (follicularis)*. Csecsemőknél lehetőleg természetes táplálás (női tej). A tiszta tehéntejet nem igen tűrik a gyermekek. A gyermeklisztek enteritisnél (NESTLE, GLACOMELLI stb.) jól hatnak. Ajánlatos a LIEBIG-féle leves (WIDERHOFFER), melynek készítése következő: 1 lat búzaliszt 1 lat malátaliszttel kevertetik s 30 csepp 11%-os szénsavas kalioldat tétetik hozzá; ezen keverékhez hozzáadatik 10 lat tehéntej és 2 lat víz s pontos összevegyítés után gyonge tűzön melegítetik, folytonosan kavarás mellett mindaddig, míg a keverék sűrűsödni kezd; erre a tűzről levétetik, öt perczig így kavartatik, majd ismét tűzre helyeztetik, s folytonos kavarás mellett újból melegítetik, míg a keverék besűrűsödik, s végül forralásig hevítetik. A forralás addig tart, míg a „leves“ édes ízt nem nyer. Ezután át kell azt szűrni s egyenlő mennyiség vízzel keverni. Pontos készítés mellett a leves amylumot nem tartalmaz. A leves elkészítése legjobban gyógyszerárban történhetik meg.

A második életévben előnnyel nyújtható a nyers hús. Zsirtartalmú tápszerrek, így a tojás is, kerülendők.

e) *Enteritis choleraformis (cholera infant.)*. Mesterségesen táplált csecsemőknél a rendes tápszer, a tehéntej kihagyandó, s táplálék gyanánt csak fehérjésvíz (l. dyspepsia) nyújtandó cognac-al; ezenkívül orosz tea, fekete kávé s erősebb borok (tokaji) adagoltasának izgatók gyanánt. Természetesen táplált csecsemőknél olykor az emlő is elvonandó, s helyette kizárólag fehérjés víz nyújtandó a betegnek.

XIII. Tápanyagok és élvezeti anyagok értékét feltüntető táblázatok. *)

Playfair szerint egészséges felnőtt ember napi tápanyagszükséglete :

	Fehérje	Zsír	Szén- vizegyek
Legkisebb szükséglet (fentartási szükséglet)	57 gm.	14 gm.	340 gm.
Szükséglet nyugalomban	71 "	28 "	340 "
" mérsékelt mozgásnál	119 "	51 "	530 "
" erős munkánál	156 "	71 "	567 "
" erőltető munkánál	184 "	71 "	567 "

* Nagyrészt König I. és Bauer I. nyomán.

1. Húsfélék tápértéke.

Húsféle	Víz	N. tartalmú anyagok	Zsír
Igen kövér ökörhús	54.76%	16.93%	27.23%
Közép " "	72.25 "	21.39 "	5.19 "
Sovány " "	76.61 "	20.61 "	1.50 "
Kövér tehénhús	70.96 "	19.86 "	7.70 "
Sovány " "	76.35 "	20.54 "	1.78 "
Sovány borjúhús	78.82 "	19.76 "	0.82 "
Kövér " "	72.82 "	18.88 "	7.41 "
Közép-kövér juhús	75.99 "	18.11 "	5.77 "
Igen " "	47.91 "	14.30 "	36.39 "
Ózhús	74.63 "	19.24 "	1.3 "
Nyúlhús mezei	74.16 "	23.34 "	1.07 "
Kövér sertéshús	47.40 "	14.54 "	37.34 "
Sovány " "	72.57 "	19.91 "	6.81 "
Kövér sódar	48.71 "	15.98 "	34.62 "
Sovány " "	69.60 "	20.97 "	8.29 "
Sovány tyúkhús	76.22 "	19.72 "	1.42 "
Kövér " "	70.06 "	18.49 "	9.34 "
Fiatal hizott kakas húsa	70.03 "	23.32 "	3.15 "
Hizott liba húsa	38.02 "	15.91 "	45.59 "
Fogolyhús	71.96 "	25.26 "	1.43 "
Galambhús	73.00 "	22.14 "	1.00 "
Csukahús	83.89 "	14.81 "	0.15 "
Folyami sügér húsa	80.06 "	18.11 "	0.44 "
Pontyhús	76.97 "	21.86 "	1.09 "
Lazaczhús (folyami)	74.36 "	15.01 "	6.42 "



A marhának legértékesebb része a sovány, át nem nőtt (nem inas) eleje és az ú. n. hátsó negyede (farrészek), valamint a nyaki és az ágyéki részek; legértékesebb az átnőtt, inas mellső rész. A borjúnak legértékesebb része a szegydarab, a nyaki carbonado és bordacarbonado, legkevesbbé tápláló a vesés.

2. Tejfélék tápértéke.

T e j f é l e	Víz	Casein	Albu- min	Zsír	Tej- cukor	Sók
	százalékokban					
Tehéntej nem főlő- zött	87.41	3.01	0.75	3.66	4.92	0.70
Kecske tej	86.91	2.87	1.19	4.09	4.45	0.86
Juhtej	81.63	4.09	1.42	5.83	4.86	0.73
Kanczatej	90.71	1.24	0.75	1.17	5.70	0.37
Főlözött tehéntej	90.63	3.06		0.79	4.77	0.75
Tejsavó átlag tehen és juhtejből	93.31	0.82		0.24	4.98	0.65

3. Sajtok tápértéke.

S a j t f é l e	Víz	N. tart. anyag	Zsír	Extract anya- gok
	százalékokban			
Zsíros sajt	35.75	27.16	30.43	2.53
Félzsíros sajt	46.82	27.62	20.54	2.97
Sovány sajt	48.02	32.65	8.41	6.80

Zsíros sajtok az Imperial, Roquefort, Eidami, Emmenthali, fél-
zsíros a Gruyères, Brie; sovány a Parmesan, Neufchatell

4. Tojás tápértéke.

a) Tyúktojás súlya átlag 50 gm., ebből 7 gm. a héja, 27 gm. a fehérje, 16 gm. a sárgája.

b) Tyúktojás-fehérjében van: 85.75% víz, 12.67% fehérje, 0.25% zsír, 0.59% hamu.

c) Tyúktojás sárgájában van: 50.82% víz, 16.24 N. tart. anyag. 31.75% zsír. 1.09% hamu.

d) Kaviarban van: 45.05% víz, 31.90% N. tart. anyag, 14.14% zsír, 8.91% sók (főleg NaCl.)

5. Lisztfélék tápértéke.

Lisztfélék	Víz	N. tart. anyag	Zsír	Keménye, cukor, gummi	Cellulose	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n					
Legfinomabb buza- liszt	14·86	8·91	1·11	74·28	0·33	0·51
Durvább buzaliszt	12·18	11·27	1·22	73·65	0·84	0·84
Buzadara	12·52	10·43	0·38	75·95	0·22	0·50
Finom rozsliszt	13·99	10·22	1·64	73·54	0·64	0·98
Durva	14·77	11·06	2·09	67·78	2·61	1·69
Finom árpadara	14·83	10·89	1·23	71·85	0·47	0·63
Durva dara	12·82	7·25	1·15	76·19	1·36	1·23
Kukoriczaliszt	10·60	14·0	3·80	70·68		0·86
Rizsliszt	14·15	7·43	0·89	77·62		

6. Kenyér tápértéke.

Kenyérféle	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Cukor	N. nélküli extract anyagok	Cellulose	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n						
Friss, fehér buza- kenyér	38·51	6·82	0·77	2·37	40·97	0·38	1·18
Friss, feketébb buza- kenyér	41·02	6·23	0·22	2·13	48·69	0·62	1·09
Zsemlye fehér	37·0	8·1	1·6	3·6	47·4	—	2·3
Kenyér, friss	44·02	6·02	0·48	2·54	45·33	0·30	1·31

7. Hüvelyesek tápértéke.

Hüvelyes-féle	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Keménye, cukor	Cellulose	Hamu
s z á z a l é k o k b a n						
Mezei bab	14·81	23·66	1·63	49·25	7·47	3·15
Kerti bab	13·60	23·12	2·28	53·63	3·84	3·53
Borsó	14·31	22·63	1·72	53·24	5·45	2·65
Lencse	12·51	24·81	1·85	54·78	3·58	2·47

8. Gyökérfelek tápértéke.

Gyökérfele	Víz	N. tart. anyag	Zsír	Keményítő, cukor	N. nélkül extr. anyag	Cellulose	Hamu
s z á z a l é k o k b a n							
Burgonya	75·77	1·79	0·16	20·56	—	0·75	0·95
Murokrépa	88·32	1·04	0·21	1·60	7·16	0·95	0·71
Fehér répa	91·24	0·96	0·16	4·08	1·90	0·91	0·75
Vörös répa	87·07	1·37	0·03	0·51	9·02	1·05	0·92
Kalaráb	85·01	2·97	0·22	0·40	8·45	1·76	1·21
Czeller	84·09	1·48	0·39	0·77	11·03	1·40	0·84
Apró retek	93·34	1·23	0·15	0·88	2·91	0·75	0·74
Hagyma	85·99	1·68	0·10	2·78	8·01	0·71	0·70

9 Zöldségfélék tápértéke.

Zöldség- neműek	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Cukor	Egyéb N. nél- küli anya- gok	Cellulose	Hamu
s z á z a l é k o k b a n							
Káposzta (nem sava- nyított)	89.97	1.89	0.20	2.29	2.58	1.84	1.23
Vörös ká- poszta	90.06	1.83	0.19	1.74	4.12	1.29	0.77
Carloli	90.39	2.53	0.38	1.27	3.74	0.87	0.82
Kelkáposzta őszi	80.03	3.99	0.90	1.21	10.42	1.88	1.57
Spenót	90.26	3.15	0.54	0.08	3.26	0.77	1.94
Endivia	94.13	1.76	0.13	0.76	1.82	0.62	0.78
Fejes saláta	94.33	1.41	0.31	—	2.19	0.73	1.03
Spárga	93.32	1.98	0.28	0.40	2.34	1.14	0.54
Zöld borsó	80.49	5.75	0.50	—	10.86	1.60	0.80
Zöld bab	88.36	2.77	0.14	1.20	6.82	1.14	0.57

10. Gombafélék tápértéke.

Gombaféle	Víz	N. tart. anyag	Zsír	Cukor és Mannit	Egyéb szén- hydrát.	Cellu- lose	Hamu
s z á z a l é k o k b a n							
<i>A) Frissen.</i>							
Champignon (csi- perke, v. urigomba v. vörös galócza)	91.11	2.57	0.13	1.05	3.71	0.67	0.76
Szarvasgomba (trüffli)	72.8	8.91	0.62	—	7.54	7.92	1.21
Kucsmagomba (mor- chella escul.)	90.0	3.48	0.24	0.72	3.95	0.67	0.94
Tinórú v. hiripi gomba (boletus edulis).	90.79	3.83	0.15	1.0	3.63	0.87	0.95
<i>B) Száritva.</i>							
Champignon (csi- perke)	17.54	23.84	1.21	9.59	34.56	6.21	7.05
Szarvasgomba (trüffli)	17.0	27.18	1.89	—	23.05	24.16	6.72
Kucsmagomba (mor- chella escul.)	19.04	28.48	1.93	5.80	31.62	5.50	7.63
Tinórú v. hiripi (bole- tus edulis)	12.81	36.12	1.72	4.47	32.79	5.71	6.38

11. Friss gyümölcsfélék tápértéke.

Gyümölcsfélé	Víz	N. tart. anyagok	Szabad sav	Cukor	Egyéb N. nélküli anyagok	Cellulose és mag	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n						
Alma	83.58	0.39	0.84	7.73	5.17	1.98	0.31
Körte	83.03	0.36	0.20	8.26	5.54	4.30	0.31
Szilva	84.86	0.40	1.50	3.56	4.68	4.34	0.66
Őszi barack	80.03	0.65	0.92	4.48	7.17	6.06	0.69
Kajszinbarack	81.22	0.49	1.16	4.69	6.35	5.27	0.82
Szőlő	78.17	0.59	0.79	24.36	1.96	3.60	0.53
Cseresznye	80.26	0.62	0.91	10.24	1.17	6.07	0.73
Eper, földi	87.66	1.07	0.93	6.28	0.48	2.32	0.81
Málna	86.21	0.53	1.38	3.95	1.54	5.90	0.49
Pöszméte	85.74	0.47	1.42	7.03	1.40	3.52	0.42
Ugorka	95.60	1.02	—	0.95	1.33	0.62	0.39
Sárgadinnye	95.21	1.06	—	0.27	1.16	1.07	0.63

12. Aszalt gyümölcsfélék tápértéke.

Gyümölcs- féle	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Szabad sav	Cukor	Egyéb N. nélküli anyagok	Cellulose és mag	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n							
Alma	27.95	1.28	0.82	3.60	42.83	17.0	4.95	1.57
Körte	29.41	2.07	0.35	0.84	29.13	29.67	6.86	1.67
Szilva	23.00	2.35	0.53	2.72	44.35	17.89	1.48	1.38
Cseresznye	49.88	2.07	0.30	—	31.22	14.29	0.61	1.63
Mazsola	32.02	2.42	0.59	—	54.56	7.48	1.72	1.21
Füge	31.20	4.01	1.44	1.21	49.79	4.51	4.98	2.86

13. Mandula, dió, mogyoró, gesztenye, chocolate tápértéke.

	Víz	N. tart. anyagok	Zsír	Szénve- gyek	Cellulose	Hamu
	s z á z a l é k o k b a n					
Édes mandula	5·39	24·18	53·68	7·23	6·50	2·96
Dió	4·68	16·37	62·86	7·89	6·17	2·03
Mogyoró	3·77	15·62	66·47	9·03	3·28	1·83
Gesztenye frissen	51·48	5·48	1·37	38·34	1·61	1·72
Chocolate	1·55	5·06	15·25	63·81	1·15	2·15
		theobro- min is közte		czukor		

15. Élvezeti italok összetétele.

A) Fekete kávéban, ha azt közönséges módon készítik, átlag 1,74% coffein van.

B) Orosz thediban, ha azt közönséges módon készítik, átlag 1,35% coffein van.

C) Cognac, arac, szesztartalma 60 vol. % körüli, legtöbbször fülüli.

D) Liqueur-ök szesztartalma 45—50 vol. %

E) Borok.

A borok fajta, évfolyam, termőhely, készítés, kezelés szerint igen változó szesz, sav, extractiv anyag, czukor és hamu, valamint aethericus olaj tartalmúak.

Általában a következőket jegyezhetjük meg:

A főhatóanyag a szesz; e mellett tekintetbe jöhet a czukor, mely főleg az aszúborokban, a csersav, mely főleg a piros borokban (0,15—0,25%), s a szabad sav, mely főleg az asztali és pecsenyeborokban (0,4—0,7%), foglaltatik tetemesebb mennyiségben.

A hazai közönségesebb fehér asztali boraink 6—8 vol. % szeszt, fehér pecsenyeborok 9—12 vol. % szeszt tartalmaznak; közönségesebb piros borok 8—9 vol. %, nemesebbek 9—13 vol. % szeszszel bírnak. Az aszúborok szesztart. 12 vol. %-on felüli; legerősebbek a Sherry, Madeira, Marsala, fehér és piros Port, melyekben 20 vol. %-felül, gyengébbek a Malaga s a Tokai, melyekben 11—17 vol. % között van szesz. A pezsgők szesze 10—12 vol. % közt ingadozik; ezeknél a szénsav is számításba veendő hatás tekintetében. A nálunk még alig szereplő almaborok 5—7 vol. % szeszt tartalmaznak, ezenkívül jelentékeny mennyiségű almasavat.

F) Sörök.

	Víz	CO ₂	Szesz vol. ‰	Fehérje	Extract anyag	Hamu
Téli sör	91.81‰	0.23‰	3.21‰	0.81‰	4.99‰	0.20‰
Nyári sör	90.71 „	0.22 „	3.68 „	0.49 „	5.61 „	0.23 „
Dupla márciusi	88.72 „	0.25 „	4.07 „	0.71 „	7.31 „	0.27 „
Porter és Ale	88.52 „	0.21 „	5.16 „	0.73 „	6.32 „	0.27 „

XIV. Heveny mérgezések kezeléséről.

Gyomron át történt mérkezés eseteiben első dolog a mérget a gyomorból, belekből eltávolítani. A gyomorból eltávolíthatjuk gyomormosással és hánytatással. Nagyobb tömeget képező mérges anyagok p. o. gombák, gyökök, bogyók könnyebben távolíthatnak el hánytatással, finomabban eloszlott mérgek p. o. morphin, strychnin, atropin stb. gyomormosással. Kénsav, légenysav, sósav, kalilug, natronlúg, ammonia-mérgezéseknél nem szabad a gyomrot mosni, hánytatókat sem célszerű rendelni. Trismus esetén mechanicus okból nem lehet a gyomrot mosni, strychnin-mérgezésnél pedig nem szabad gyomormosást végeznünk, nehogy tetanus rohamot váltsunk ki; ez esetekben csak az apormophinnal hánytatás van helyén. Addig, míg a gyógytárból hánytatók érkeznek, a hánytatást a garatnak ujjal, olajos tollal izgatása útján eszközöljük, vagy meleg olajat, olvasztott vajat itatunk (kivéve kőrisbogar- és phosphor-mérgezésnél, melyeknél zsirok tiltva vannak); meleg víz itatása, burnót, mustárliszt, konyhasó nyelése (az utóbbi ellenjavalt corrosívval és hánytató borkővel mérgezésnél) is célhoz vezethetnek. Medicinalis hánytatónak legjobb az apormophinum hydrochlor. (0,005—0,01) bőr alá fecskendése; rendelkezők pulv. ipecac., cupr. sulf., tartar. emet. is. Phosphor-mérgezésnél mindig cupr. sulf. legyen a hánytató. A belekből az esetleg oda jutott mérgeket gyorsan ható hashajtókkal távolítjuk el. Phosphor- és kőrisbogar-mérgezésnél nem szabad hashajtóul ol. ricini-t rendelni. — További feladat a gyomorban vagy belekben még ott maradt mérgeket ártalmatlanná tenni. Ezt vegyi ellenméreggel (antidota chemica) tehetjük meg, melyek a mérgeket v. vízben oldhatlan vegyületbe, vagy vízben oldható, de a testre ártalmatlan, különösen helybelileg ártalmatlan, vagy az eredeti méregnél kevésbé ártó vegyületbe viszik át. Nem szabad oly anyagokat mint elienszereket adnunk,

melyek magukban is erős mérgek. A vegyi ellenszereket igen gyakran előbb adjuk, s azután ürítjük vagy üríttetjük ki a gyomrot és beleket.

Vegyi ellenszerek: kénsav-, légenysav-, sósav-, cihromsav-, ecetsav-mérgezésnél a magnes usta, natr. bicarb., tojásbéj, kréta, fehérje, tej, szappanvíz; arsén-készítményekkel mérgezésnél az antidotum arsenici (vasoxydhydrat); oxalsav- és carbol-mérgezésnél az aqua calsis saccharata, calc. carb. praecipitatum, czukormész; kéksav-, cyanálium-mérgezésnél az aqua chlorig, calc. hypochlorosum (2%-os oldat), kaliom hypermangan-, $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ %-os oldata; lúg-mérge-zéseknél ecet, citromlé, zsírok; phosphor-mérgezésnél terpentín-olaj, cupr. sulfur, kali hypermanganicum $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ %-os oldatai (l. ezen cím alatt a vényg, titoményben); pokolköd-mérgezésnél konyhasó; fémsókkal-mérgezéséknél általában fehérje, tej, carbo animalis; alkaloidákkal- és mérges glucosidákkal-mérgezéséknél tan-nin, jodjodkaliom (Lugol-oldat), carbo animalis.

A vegyi ellenmérgek alkalmazása után, ha mérgezési távol-hatási tünetek jelentkeznek (p. o. atropin-, morphin-mérgezésnél), a dynamicus vagy pharmacologicus ellenszerekkel való kezelésnek van helye, vagy ha a mérgezés olyan volt, mely helybeli lobosító vagy maró hatást gyakorolt (p. o. maró lúgok, ásvénysavak), tüneti kezelést kell bevezetni; ha helybeli és távolhatási mérgezési tüne-tek vannak jelen, mindkét irányú legyen a kezelés (p. o. körisbogár-mérgezésnél).

Hevenymérgezésék tünetei és kezelése.

Mérég	Tünetek	Kezelés
Acidum carboli-cum.	Fájdalom a hastájon, hányás, collapsus, coma, néha convulsiók, trismus.	Emetica, gyomormo-sás, aqua calcis saccharata, kréta, czukormész, fehérje, jég, natrium sulfur., magnes. sulfur. (keserű viz.)
Acidum oxali-cum és oxal-savas sók.	Hányás, hányadék feketetés (haematin), fájdalom a gyomor és epigastrialis tájon, bőr hideg, nyirkos, dispnoe, eszméletlenség, pulsus alig tapintható, trismus, tetanus.	Hánytatás, gyomormo-sás, aqua calcis saccharata, kréta, sok magn. usta. — Excitantumok.
Acidum sulfuri-cum (vitriol). Acid. nitricum. Acidum hydro-chloricum. Acid. aceticum.	Száj, torok megmart, nyelési képtelenség, fájdalom a gyomor- és hastájon, esetleg peritoneitis tünetei; hányás, hasmenés, convulsiók, kicsiny, gyér pulsus, collapsus.	Magn. usta, natr. carb. v. bicarb., kréta, tojásbéj, fehérje, tej, szappanvíz. Tüneti kezelés. (Antiphlogosis, excitantia.)


M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
Aconitum válfajok (Sisakvirág) Aconitin.	Tünetek gyorsan fejlődnek ki. Egő érzés a szájbán, nyál-folyás, cardialgia, hányás, hasmenés, nyelv és ujjak érzéketlenek, hangyamászás, szédülés, mydriasis, vakság, némaság, süketség, főfáját, arczfájdalmak. pulsus gyér, légzés nehéz, eszméletlenség, görcsök. — Néha az eszmélet megmarad.	Gyomor és belek kiürítése. — Carbo animalis, tannin (?) jodjodkalium (?) Excitantia (cognac, aether, camphor).
Aether.	Hypnosis, anaesthesia totalis, asphyxia; ha a szív nem ver, életmentés kétséges.	Friss levegő, mester-séges légzés. nerv. phrenici villamozása, strychnin nitr. bőr alá fecskendése (0,001), bőr izgatása dörzsöléssel. hideg vízzel, mustárszeszszel.
Agaricus muscarius (Légygomba). Muscarin.	Émelygés, hányás, szomj, kolika, nyákos és véres szék. Salivatio, ájulási rohamok, részségesség, bódultság, izomgyengeség, tág pupilla, látási zavarok, delirium, görcsök, pulsus gyér, kicsi, arhythmicus.	Ilánytatók, hashajtók, esetleg gyomormosás. Vegyi ellenmérgek nincsen. Atropin. sulf. bőr alá fecskendése.
Alkaliák (marók), mint kalilug, natronlúg, ammonium, maró mész.	Szájnyákhártyán, nyelven maró hatás jelei, nagy fájdalom a sternum mentén és gyomorbán, kolika, nyúlós-véres-alkalicus kémhatású hányadék és szék.	Eczet, citromlé, zsírok, jéglabdacok. — Fájdalmak enyhítése opiatokkal.
Alkohol és azt tartalmazó italok.	Coma, convulsiók, hányás, önkénytelen székelés, szűk pupilla, gyér és kicsiny érverés, hányadék s ihelet borszesz szagú.	Apomorphin. — Szabad levegő. — A testnek, fejnek hideg vízzel locsolása. — Excitantia (ammon carbon, liquor ammonii anisatus, ol. camphor. bőr alá fecsk.), erős fekete kávé.
Antimon-készítmények, köztük a hánytató borkő.	Émelygés, fémiz, bő expectoratio, csillapíthatlan hányás, fájdalom a nyelésnél, gyomor- és hasfájdalom, hasmenés, choleraszerű szék, szapora, kicsi pulsus, dyspnoe. Hideg bőr, szédülés, coma, ikraizomgörcs, ált. convulsiók. Collapsus.	Gyomormosás, tannin. erős orosz tea, fekete kávé, jéglabdacok, opiatok.

Méreg	Tünetek	Kezelés
Argentum nitricum (pokolkő).	Edzés jelei a szájban, torokban, hányás, ahányadék levegőn megicketedik, hasmenés, gyomor- bélfájdalmak. Később szédülés, convulsiók, hűdések.	Emetica, gyomormosás, konyhasó, tej, fehérje. Tüneti kezelés.
Arsenessav, (arsenicum, egerkő) és más arsen-készítmények.	Kaparó érzés a torokban, szomj, nyelés nehezített, nagy fájdalom a gyomor és alhasi tájakon, hányás, hasmenés, rizlészerű vagy dysentericus székletét tenesmus, keves és néha véres vizelet. Szédülés, főfájás, gyenge, szabálytalan, szapora érverés, cyanosis, bőr hideg, ájulások, coma, convulsiók, általános hűdés.	Emetica, gyomormosás, antidotum arsenici, magn. usta in aqua. — Kerülendők alkáliák, fehérje. — Tüneti eljárás.
Baryum-készítmények (chlorbaryum, szénsavas baryum, barythydrát).	Hányás, nagy hasmenés, tonicus és clonicus görcsök, gyér pulsus, főfájás, fulladás, szédülés, kettő látás, tág pupilla, ischuria.	Emetica, gyomormosás, natrium sulfur. magnes sulf. — Tüneti kezelés.
Belladonna és készítményei (maszlagos nadragulya). Atropin.	Szárazság szájban, torokban. nyelési nehézségek, arczon és a bőrön skarlatpiros foltok, üterek erősen lüktetnek, pulsus igen szapora, pupilla igen tág, szemek kidülledtek, accommodation zavarok, főfájás, szédülés, bódultság, hallucinatio, lármás nevetés, jó kedv, furibund delirium, járás nehéz. izomgyengeség. Ritkán heves convulsiók, trismus. — A datura mérgezésnél hevesebb a delirium mint belladonnamergezésnél, hyosciamusnál erősebbek a narcoticus tünetek.	Hánytatás, gyomormosás, tannin, jodjodkalium, carbo animalis, pilocarpinum mur. bőr alá fecskendése (0.02) addig ismételve, míg nyálazás és izzadás nem mutatkoznak. — Morphin. Hideg víz a fejre.
Datura Stramonii és készítményei (maszlagos redősirom).		
Hyosciamus és készítményei (bolondító csalmatok).		
Cantharides (kőrisbogár). Cantharidin.	Fájdalom a nyelven, garatban, étcsőben, gyomorban. hólyagok a szájban. Hányás, hasmenés, esetleg véres szék. stranguria, haematuria. fájdalom priapismus, főfájás, bódulat, delirium. convulsiók.	Gyomormosás, apomorphin, mucilago gumini arabici, jéglabdacok, morphin; bódulat esetén excitansok. — Kerüld a zsirokat, olajokat, tejet, tojást.

Méreg	Tünetek	Kezelés
Chlorgáz	Spasmus glottidis, fájdalom a sternum mentén. Haemoptoe	Forró vízgőzők belégzése.
Chloralhydrat .	Hypnosis. Szívgyengeség, mely szívűdással fenyeget.	Emetica. — Strychninum nitr. bőr alá fecsk. (0,001). Bőr izgatása dörzsöléssel, hideg vízzel locsolással, mustárszesszel. L. aether.
Chloroform . . .	Hypnosis, anaesthesia totalis, asphyxia. Ha a szív nem ver, életmentés kétséges.	
Cicuta virosa (gyilkos csomorika).	Émelygés, hányás. hasfájdalom, szédülés, bódultság, me-rev és tág pupilla, gyenge pulsus, rohamokban epilepsiaszerű göresök.	Hánytatás, gyomormosás, hashajtók. — Tannin. — Paraldehyd, chloralhydrat v. chloroformnarcosis.
Cocain sók . . .	Szédülés, elhalványulás, émelygés, ájulási érzés, praecordialis félelem, légszomj, szapora erverés, szívdobogás, lelki izgatottság, gyengeség, remegés, agrypnia. Súlyos esetben mydriasis, coma, gyér légzés és erverés.	Gyomron át történt mérgezésnél gyomormosás, emetica, tannin, jodjodkalium. — Különben, akárhogy történt a mérgezés, amylnitrit belégzés.
Colchicum (őszi kikerics). Colchicin.	Tünetek 2—3 óra múlva. Égő érzés a szájon, fojtó érzés a torokban, szomj, gyomor-fájás, kolika, hányás, hasmenés, néha veres szék, praecordialis félelem, szédülés, bódultság, delirium, gyengeség, kicsiny szabálytalan pulsus, gyengébb convulsiók, collapsus.	Hánytatás, gyomormosás, hashajtók. — Tannin, jodjodkalium. — Excitantia.
Conium maculatum (foltos bűrrök). Coniin.	Szédülés, csekély bódultság, pupilla tág, nyálfolyás, nagy izomgyengeség, clonicus convulsiók, respir. nehezített, pulsus gyér. Neha hányás, hasmenés.	Gyomor kiürítése. — Tannin, jodjodkalium, carbo animalis, excitantia, mesterséges légzés.
Cuprum-készítmények, akár oldhatók vízben, akár nem.	Tünetek gyakran órák múlva. Kellemetlen fémérzés a szájon, émelygés, hányás, hányadék zöldes v. kékes, kolika, hasmenés, szék gyakran veres, később feketés, tenesmus. főfájás, szédülés, hideg és érzéketlen bőr, delirium. hűdések, néha ictericus bőrszín.	Gyomormosás, belbeöntések. — Magnes, usta, fehérje, szőlőcukor, méz, szén, natr. carbon., sárga vérlúgsó, limatura ferri. — Olajok, zsírok kerülendőek.

Méreg	Tünetek	Kezelés
Cyanhydrogen sav (kéksav). Cyankalium. Cyan-fémek.	Görcsös, nehéz, ritka légzés, gyér, gyenge szivverés, érzéketlenség, akaratlagos mozgás hiánya, eszméletlenség, clonihus és tonicus görcsök, pupilla tág, szemek kidülledtek, mozdulatlanok, néha nyálfolyás, habos száj. — Kéksav szaga a leheletnek (cyanfémeknél ritkán).	Hánytatás, apua chlori, vagy calc. hypochlorosum 20%-os oldata kanalanként, antidot. arsenici keverve natr. carbonattal. Kalihypermangan. $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ %-os oldata $\frac{1}{2}$ poharanként. — Mesters. légzés. — Excitans gyógyszerek és eljárások.
Cytisus Laburnum (Aranyeső). Cytisin. Digitalis purpurea (Gyüszünke) és készítményei. Gombák, mérgesek v. romlottak. Gummi Gutti.	Mint strychnin-mérgezésnél. Hányás, hasmenés, szapora és irregularis pulsus, myosis, coma, esetleg convulsiók. Cholerszerű tünetek. — Agyi tünetek. — Collapsus. Gyomor- és belfájalmak. hányás, igen erős hasmenés. Hányadék, széketét sárga színű. Collapsus.	L. strychnin. Hánytatók. Tannin. — Excitansok (pezsgő, cognac, camphor, aether, fekete kávé). Hánytatás, gyomormosás. Hashajtók. Excitansok (strychnin bőr alá). Hánytatás. Gyomormosás. — Bő Hegar-féle beöntés. Olaj, fehérje. Collapsus esetén excitantia. Fájdmak ellen morphin.
Helleborus v. fajok (Hu-nyor).	Salivatio. émelygés, hányás, gyakori hasmenés, szűrés a nyelvben, gyomorfájás, kolika, halványság, szédülés, fülcsengés, delirium, pupilla tág, kicsi pulsus. dyspnoe, somnolentia.	Hánytatás, hashajtás, gyomormosás, tannin, jodjodkallum, tüneti kezelés, főleg opiatok.
Hydrargyrum-készítmények, főleg sublimat.	Fémiz a szájban, hányás, kolika, hasmenés, tenesmus, néha véres hányadék, albuminuria, haematuria, stomatitis, convulsiók, remegés, collapsus.	Hánytatás, gyomormosás, hashajtók, fehérje, tej, csiriz, szén, vaspor, morphik.
Kélgáz (N ₂ O).	Veszedelemes tünetek: cyanosis, coma, mely hosszan tart, epileptiform görcsök, delirium a belégzés megszüntetésével, görcsös kinyulása a testnek, rángások.	Mest. légzés. A nervi phrenici faradizálása. — Izgatók.

M é r e g	T ü n e t e k	K e z e l é s
Kénhydrogen gáz (kloaka v. latrina lég).	Elgyengülés, émelygés, főfájás, ájulás, eszméletlenség, anaes- thesia, convulsiók, midriasis, respiratio és pulsus gyér. Ha sok mérég van a levegőben asphyxia, rögtöni halál.	Friss levegő. Mest. lég- zés, ha szükséges.
Kigyó mérég . .		Seb kiszopása, a vég- tag ligaturája. Seb- kimosása kali hy- permangannal, aqua chlorival.
Methylenum bi- chloratum.	Hypnosis, anaesthesia totalis, asphyxia; ha a szív nem ver, életmentés kétséges.	L. aether.
Nerium Olean- der (Leander levelekkel mérgezés).	Hányás, dysentericus szék, pu- pilla tág, kicsiny, kihagyó pulsus, gyenge convulsiók, sopor.	Hánytatás, hashajtás, tannin(?), cognac, fe- kete kávé.
Nicotin és azt tartalmazó dohány, bur- nót, szivar, pipamocsok mérgezés.	Torokban fojtó érzés, hányás, vizenyős, néha véres szék, nyálfolyás, hideg nyirkos bőr, nagy gyengeség, nehéz légzés, ájulás, stupor, reme- gés, convulsiók, pulsus gyér és arhythmicus.	Gyomor kiürítése, tan- nin, jodjodkalium, excitantia, (kávé, liquor ammon. anis., cognac), mest. légzés.
Opium és ké- szítményei. Morphin.	Szédülés, ellankadás, nagy ál- mosság, bódulat, érzéstelen- ség, eszméletlenség, izomhü- dés, alig érezhető és gyér pul- sus, igen gyér, néha Cheyne- Stokes légzés, hortyogás, pupilla szűk. — Ritkán toni- cus görcsök.	Hánytatók, gyomormo- sás, gyorsan ható has- hajtók. Tannin, jod- jodkalium. Jég a fej- re, eczetes klysma, coffein v. erős fekete kávé, cognac, cam- phor; nem szabad el- aludni engedni a be- teget (sétáltatás), at- ropin, picrotoxin bőr alá fecskendése.
Phosphor (gyufa).	Heves hányás, gyomor-, bél- fájdalmak, májpuffadás, máj- táji fájdalom, icterus, veres szék. — Hányadék, székletét, kilégzett levegőjében világ- gitanak.	Cupr. sulf. mint hány- tató. Gyomormosás. Ol. terebinth. Kali hypermanganicum $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ %-os oldatai. Zsírok, fehérje, tej, tojás kerültessenek.

Méreg	Tünetek	Kezelés
Plumbum acetikum (ólomezu-kor).	Néhány óra múlva fémíz, égető érzés a gyomorban. tejfehér hányadék, kolika, szorulás; fájdalom és hűdés az alsó végtagokban, szédülés, anaesthesia, stupor. pulsus igen gyér. (40 körül) néha hasmenés, nyálfolyás.	Hánytatás. Gyomormosás, hashajtók, natr. v. magnes. sulfuricum, natr. phosphor, fehérje. tej, tannin, carbo animalis. Opia-tok.
Sabina	Hányás, hasmenés, véres szék. vizeleti tenesmus, haematuria, hörgő légzés, anaesthesia, eszméletlenség. — (Abortus).	Hánytatás. gyomormosás. Hashajtók. Jég-labdacsok, nyákos italok.
Secale cornutum (Anyarozs). Ergotin.	Nyálfolyás, hányás, kolika, hasmenés, szédülés, főfájás, látási zavar, myosis v. mydriasis, gyengeség, pulsus gyér, delirium, bódulat, coma. Fokozott reflex. Tetanus, trismus, dyspnoe.	Hánytatás, hashajtás, gyomormosás. Tannin. Acid. salicyl. nagyobb adagai.
Strychnin. Strychnin tartal-mú készit-mények.		Gyomormosás, hányta-tók, tannin, jodjodkaliun, tinct. jodi. Apomorphin (hányta-tási célból). Absolut nyugalom, sötét szoba, csend. Paral-dehyd v. chloralhyd-rat v. urethan oly adagokban, hogy hypnosis jöjjön létre, v. hosszú nyujtan-dó chlorof. narcosis. Szabad levegő. Mes-ters. légzés. Excitans eljárás. Eleny v. ozon belélegeztetés. — Ele-nyes víz.
Szénéleg (vilá-gító gáz, szén-gőz, aknalég).	Főfájás, fülzúgás, szédülés, émelygés, hányás, piros arc, tompultság, izomgyengeség, érzéstelenség, akaratlagos mozgásra képtelenség, áju-lás, tonicus és clonicus gör-csök teljes hűdés, asphyxia, coma. Pulsus eieinte szapora, később gyenge, gyér, kiha-gyó.	
Veratrum album (zsásza), viri-de, Sem. Saba-dillae, Verat-rin.	Égető érzés a szájban. gyomorban nyálfolyás, hányás, hasmenés, gyomor- és belfájda-lom, tenesmus, véres szék, főfájás, szédülés, pupilla tág, pulsus gyenge és gyér. nehéz légzés. hőesés, viszkettség, remegés, inugrálás, arczán-torok, ritkán tetanus.	Hánytatás, gyomormo-sás, hashajtók. Jod-jodkaliun. Tüneti-kezelés. főleg fájda-lomesillapítók és ex-citansok.

XV. Gyógyhelyek és gyógyvizek átnézete.*

Az alábbiak a nálunk gyakrabban használt bel- és külföldi gyógyvizekre és betegeink által leginkább látogatott bel- és külföldi gyógyhelyekre vonatkoznak.

A gyógyhelyek és gyógyvizek egyszerű felsorolása helyett helyesnek tartottam némi útbaigazító jellemzést is adni. A mennyire javakat vagy ellenjavakat bővebb indokolás nélkül adni lehet, igyekeztem azokat is összeállítani. Nagy súlyt fektettem a hazai gyógyhelyekre és ásványvizekre. Fontos nemzetgazdasági szempontok parancsolják, hogy hacsak a beteg igazi érdekeivel megegyeztethető, hazai gyógyhelyet ajánljuk és hazai gyógyvizet rendeljünk, feltéve mindig, hogy a gyógyhelyen a beteg a kellő ellátást méltányos árak mellett megtalálhassa, s feltéve, hogy az ajánlandó ásványvíz kezelése a kívánalmaknak tökéletesen megfeleljen.

I. Klimatikus gyógyhelyek.

1. Subalpin gyógyhelyek nyári tartózkodásra.

Hazaiak: *Lucivna* (800 méter magasságban), *Marillavölgy* (790 m.), *Leibitz* (732 m.), *Tusnád* (650 m.), *Gándász* (635 m.), *Fekete-hegy* (632 m.), *Előpatak* (624 m.), *Borszék* (882 m.), *Lubló* (556 m.), *Jegenye* (556 m.), *Stubnya* (518 m.), *Baldóc* (486 m.), *Szklénó* (382 m.), *Szliács* (360 m.), *Tarcsa* (347 m.), *Bártfa* (319 m.), *Vihnye* (310 m.), *Iglófüred*, *Barlangliget*, (739 m.), *Tátraháza*, (730 m.), *Virágvölgy* *Poprád* mellett (757 m.).

Külföldiek: Nálunk ismertebbek és magyarok által látogatottabbak *Steiermarkban*, *Karinthiában*, *Salzkammergutban* és *Tyrolban*: *Reichenau* (480 m.), *Gmunden* (417 m.), *Kammer*, *Unterach*, *Mondsee* (470 m.), *Ischl* (484 m.), *Aussee* (650 m.), *Tobelbad* (330 m.), *Törtschach* és *Velden*, mindkettő a *Wörthi tó* mellett (439 m.), *Tarvis* (734 m.), *Zell am See* (752 m.), *Achensee* (930 m.).

Németországban: *Görbersdorf* *Porosz-Sziléziában* (540 m.). *Reiboldsgrün* az *Érc-hegységben* (688 m.), *Thale*, *Harzburg*, *Suderode*, *Hubertusbad*, *Alexisbad* a *Harzban*, *Falkenstein* a *Taunusban*, *Triberg* (618 m.) és *Badenweiler* a *Schwarzwaldban*, *Berchtesgaden* (580 m.), *Tegernsee* (732 m.), *Kreuth* (512 m.), *Felső-Bajorországban*.

Számos helyei közül ismertebbek nálunk: *Interlaken*, *Weggis*, *Viznau*, *Beatenberg* stb. stb.

* Az adatokat *BOLEMAN*, *REIMER*, *DUJARDIN-BEAUMETZ*, *HIRSCHFELD* és *PICHLER* munkái, valamint az 1892., és 1894. és 1897. évi balneol. congressuson tartott előadásaim alapján közlöm.

2. Alpin gyógyhelyek nyári tartózkodásra. 1000 méteren túl a tenger színe felett.

Hazaiak: *Keresztlyénsziget* (Kurhaus auf der hohen Rinne) Nagy-Szeben mellett (1420 m.). *Csorbai tó* Liptóban. (1350 m.), *Ó, Új-, és Alsó-Tátrafüred* Szepesben (átlag 1000 m.).

Külföldiek: Tyrolban: *Niederdorf* (1158 m.). *Toblach* (1250 m.), *Cortina* (1219 m.). *Innichen* (1332 m.). — Svájcban: *Davos* — két helység *D.-Dörfli* és *D.-Platz* — (1652 m.), *Pontresina* (1828 m.), *Szt-Moritz-Dorf* (1856 m.). *Rigi* (1460 m.), *Bormio* (1396 m.), *Arosa* (1850 m.).

3. Alpin és subalpin gyógyhelyek téli tartózkodásra.

A felsorlandó alpin és subalpin helyek jellege, télen aránylag enyhe és állandó középhőmérsék, tiszta levegő, szélmentesség, az alpin helyeken csekély légnyomás.

a) Alpin helyek.

Hazai: nincs.

Külföldiek: Svájcban: *Davos* (1625 m., középhő — 5:8 C.). *Samaden* (1740 m.), *Szt-Moritz* (1856 m.).

b) Subalpin helyek.

Hazai: nincs.

Külföldiek: *Gorbersdorf*, *Falkenstein*, *Reiboldsgrün*, *Wiesbaden*.

4. Délen fekvő igen enyhe égaltjú helyek téli tartózkodásra.

Hőm. Télen 2°—4° C. között ingadozik, szélsérend, kevés csapadék.

Hazai: *Czirkvenicza*.

Külföldiek: *Abbazia*, *Lovrana Fiume* mellett a tengerparton. *Lussin*, *Piccolo*, *Lussin grande*. *Bozen* és *Gries* Meran mellett, 270 m., 2° C. téli átlag. hőm. *Meran* 319 m., 1:8 C. téli átlag hőm., derült ég, kevés csapadék, szélsérend. *Arco*, a tyroli alpesek déli lejtőjén, 73 m., 3:7° C. téli átlag. hőm., kissé nedvesebb, mint Meran. *Montreux* és *Vevay* a genfi tó partján. Még enyhébb égaltjúak télen a Riviera di Ponente számos helye (Genuától nyugatra), mint *Iegli*, *San-Remo*, *Ospedaletti*, *Bordighera*, *Mentone*, *Monte-Carlo*, *Monaco*, *Nizza*, *Cannes*, továbbá a Riviera di Levante számos helysége (Genuától keletre, mint *Nervi*, *Spezzia*, *Pisa*. Sziciliában látogatott helyek *Cantania*, *Palermo*.

5. Tél nélküli helyek.

Cairo, Alexandria, 13° C. átl. hőm. Algier 15·3° C. átl. téli hőm. Nagy napi ingadozások. Madeira, portugál sziget (fővárosa Funchal), 16·9° C. átl. hőm. télen, egyenletesen nedves, reggel 8 órától este 6-ig szabadban lehet tartózkodni. Corfu.

II. Hidegvíz-gyógyintézetek.

Javalatok e helyen csak nagyon általánosságban állíthatók fel. Hypochondria, neurasthenia, hysteria némely alakja, tabes dorsalis, idült gyomor- és bélhurut, idült csúzos bántalmak, a köszvény némely alakja, idült syphilis, utógógymód higanykezelése után, test edzése meghűlések ellen.

Hazuiak: Budapest városmajori és svábhegyi Vaskovits-féle. Budapest várostigeti Glück-féle, Batizfalvy-féle, azonkívül több kisebb intézet. Igen kiváló berendezésű és kies helyen fekszik Marillavölgy (Krassó-Szörénymegyében Oravicza mellett). Ó-, Új és Alsó-Tátrafüred (Szepes megyében, Poprádtól 1½ órányira). Feketehegy v. Schwarzenburg (Szepes megyében Igló mellett) Iglófüred. Lucivna (Liptó- és Szepesmegye határán). Ezekon kívül más fürdőhelyek is be vannak rendezve hidegvízgyógymódra.

Ausztriában nevesebbek. Girschhübel-Puchstein, Karlsbad mellett. Gräfenberg, Sziléziában. Helenenthal, Bécs melletti Badenben. Kultenleutgeben, Bécs mellett. Kreuzen, hasonnevű városka mellett, a Duna melletti Greinhez egy órányira, szép fenyvesek, kitünő berendezés. Priessnitzthal, Mödling mellett, Bécsről nem messze. Szt. Radegund Stájerországban, Gráztól 2 órányira. Salzburg-Parsch.

Németországban: Boppard (Marienberg és Mühlbad), a Rajna mellett. Elgersburg, Gotha mellett. Go esberg, Bonn mellett. Herrenalb, Württembergben Gernsbach mellett. Ilmenau, Thüringiában. Königstein, a Taunausban. Lauterberg, a Harzban. Liebenstein Thüringiában. Dietenmühle és Nerothal, Wiesbaden mellett, Wilhelms-höhe, Gassel mellett.

Svájcban: Albisbrunn, Zürich mellett. Rigi Kaltbad, Schönbrunn és Sekoneck, a Wierwaldstädti tó mellett. Buchenthal, St. Gallenben.

III. Tengeri fürdők.

Gyógyhatányok: a tengervíz hőmérséke, NaCl-tartalma, a hullámvérés, az állandó légmozgás, a lég nedvessége és NaCl, valamint ozontartalma, a léghőmérsék egyenletessége. A víz hőmérséke 16—27° C. között ingadozik hely és évszakok szerint; legmelegebb a Földközi-tenger (22—27° C.), után jő az Atlanti oceán (20—23° C.), leghűvösebb az Északi tenger. A NaCl tartalom igen változó; a Földközi-tengerben 0·3—2·6‰ között ingadozik, az Atlantiban 2·5—3·3‰ között, az Északiban 3·0—3·9‰ között, a Keleti tengerben

pedig 0.6—2.0% között. Évad a nyár és főleg az őszelő. *Javalatok:* Bőr edzése; hajlam hyperidrosisra, meghűlésre, csúzos bántalmakra; utógyógymód meleg fürdőzés után; hemicrania, idült neuralgiák, neurasthenia bizonyos alakjai, scrophulosis torpida, olygaemia, reconvalescentia, szellemi túlerőltetés. *Ellenjavatok:* Gyomorbántalmak, minden fajta vérzés, szívbántalmak, edénybajok, agyizgalom, nagyfokú gyengeség, aggkor, zseuge gyermekek.

Hazai: *Cirkwenitz.*

Külföldiek. Ausztriában: *Abazzia, Lovrana, Volosca* szinte Fiume mellett. *Lussinpicolo* a Quarnero egy szigetén. A monarchián kívüliek közül nálunk ismertebbek: *Velence* (Lido), *Castellamare* *Monaco, Nizza, Cannes* (Földközi tenger). *Biarritz, Arcachon* (Atlanti tenger), *Boulogne, Étréat, Trouville, Dieppe*, (La Manche-csatorna). *Wight szigete, Brighton, Ramsgate* (Anglia), *Ostende, Blankenberghe, Scheweningen, Norderney, Syll, Helgoland* (Északi tenger) *Heringsdorf, Misdroy, Colberg, Zoppot, Cranz* (Keleti tenger).

IV Gyógyvizek.

1. Egyszerű égvényes ásványvizek.

Leginkább ivógyógymód; néha fürdő. *Javalatok:* gyomor-, bélhurut, gyomorfekély, alhasi pozsga, epékövek, idült icterus, zsírmáj, húgykövek, vesekövek, húgyhomok, idült pyelitis és cystitis, köszvény, diabetes mellit., légutak idült hurutja. — Főhatóanyaga: kettő szénasavas natrium; némely vízben, különösen a hidegekben, sok szabad szénasav.

a) Melegek.

Hazai: *Lipik.* Fürdőhely Pozsega megyében, Pakráctól 1/2 órányira; tulajdonképen égvényes konyhasós víz, de e helyen is joggal szerepelhet. 1.9‰ natr.; bicarbonicum, kevés konyhasós és jodnatrium, Hőm. 64° C. Mint jódos víz is használtatik.

Külföldiek: *Vichy.* Fürdőhely Franciaországban 4—5‰ natr. bicarb. Legerősebb forrás a Celestins, kissé gyengébb a Grande Grille. Hőm. midőn legmelegebb 45° C. — *Neuenahr.* Fürdőhely Németországban (Rheinpreussen), kevés natr. bicarb. 40° C. hőm.

b) Hidegek.

Hazai: *Szolyvai víz* (Bereg m.), 8.4‰ natr. bicarb. igen sok szabad CO₂. Mértékzik minden e nemű külföldi vízzel. Ennél még koncentráltabbak a Polenai és Olenyovai vizek. *Luhí Erzsébet-forrás* és *Luhí Margit-forrás* (Bereg m.), mindkettőben 4‰ natr. bicarb., középmenyiségű szabad CO₂. A *Petúnczi víz* olyan, sőt tartalmasabb, mint a *Bilini*. Mindkettőnél erősebb kissé a *bodoki Mathild-forrás*. A *Tarcsai Károly* és a *Németkereszturi* igen jól pótolhatják a *Giesshüblit* és a *Krondorfi* vizet. Mindezen vizek elszállítva használatnak.

Külföldiek: *Bilini József-forrás* (Csehország), 4.7‰ natr. bicarb. — *Bilini Karolina-forrás*, 3.03‰ natr. bicarb. és kevés natr. sulf. — *Fachingen* (Németország), 3.5‰ natr. bicarb. — *Preblau* (Karinthia) 2.8‰ natr. bicarb. — *Obelsalzburg* (Szilézia) 1.7‰ natr. bicarb., kevés natr. sulfur. — *Giesshübel-Puchstein* (Csehország) 1.1‰ natr. bicarb., sok szabad CO_2 . E helyek vizei részint elszállítva, részint helyben használatnak.

Függelék. Egyszerű savanyú vizek.

Nagyrészt diaeteticus célra, vagy mint luxus-vizek használatnak, de rendelkezhetjük mint enyhe gyomor- és bélizgatókat, esetleg mint gyenge diureticumokat is. Mindannyia bő szabad CO_2 -tartalmú, míg szilárd alkotórészekben igen szegény.

A számos hazai forrás közül általános forgalomban vannak a *Borszéki borvíz*, *Mohai Ágnes*, *Véghlesi Vera*, *Balatonfüredi*, *Borhegyi*, *Radna-Borbereki*, *Káoszon-Jakabfalvi*, *Szlatvini Anna*-források, és a *Szántói* savanyú vizek. Különben minden vidéknek megvan a maga savanyú vize.

Külföldiekre hazánkban éppen nem szorulunk.

2. Égvényes-konyhasós ásványvizek.

Főleg ivógyógymód. *Javallatok:* Légutak és emésztőszerek idült hurutjai, vesekő, húgyhomok, pyelitis és cystitis catarrh. chron., scrophulosis torpida, régi izzadmányok. *Ellenjavallatok:* Lázás állapotok. Főhatóanyanyagok: ketted szénsavas natrium és konyhasó, szabad szénsav.

a) Melegek:

Hazai: kiváló a *Lipiki*, mely ép úgy használható, mint az *Emsi*.

Külföldi: *Ems*. Fürdőhely Coblenctől nem messze. Több forrás. Átlag 2‰ natr. bicarb. 1‰ NaCl . középminységű szabad CO_2 . Források hőfoka 27.9°C .— 50.4°C .

b) Hidegek:

Hazaiak: *Czigelkai Lajos-forrás* (Sárosm.), 16.7‰ natr. bicarb., 5‰ natr. chlorat., sok szabad CO_2 . Víz elszállítva használatnak. *Bikszád*. Fürdő Szathmár megyében. Több forrás. Átlag 6‰ natr. bicarb. 2.5‰ natr. chlorat. Kevés szabad CO_2 . Kitünő, szinte páráját ritkító víz. — *Bártfai Orvosforrás*, melynek vizében 4.8‰ natr. bicarb. 1.1‰ natr. chlorat. (Kevés szénsavas vasoxydul 0.04‰). *Dombháti Livia* hasonló az *Emsi* és *Gleichenbergi* vizekhez. — *Stojkai víz*, hasonló a *Niederseltersi*hez. Többi forrás vasas.

Külföldiek: *Sczawnicza.* Fürdő Galicziában. 3 forrás; legerősebb a Magdalena-forrás, melyben 8.4‰ natr. bicarb., 4.6‰ natr. chlorat, középminnyiségű szabad CO_2 . — *Luhatschowitz.* Fürdő Morvaországban. Legerősebb a Johannisbrunnen, 8.3‰ natr. bicarb. 3.6‰ natr. chlorat., kevés NaJ és NaBr , középminnyiségű szabad CO_2 . — *Nieder-Selters.* (Németországban). Viz elszállítva. 1.2‰ natr. bicarb., 2.3‰ natr. chlorat. — *Gleichenberg.* Fürdő Stájerországban, Legerősebb a Constantin-forrás, 3.5‰ natr. bicarb., 1.8‰ natr. chlorat.; gyengébb az Emma-forrás. Sok szabad CO_2 , mindkettőben.

3. Glaubersós ásványvizek.

Ivógyógymód. *Javolatok:* Idült gyomor- és bélhurut, gyomor- és bélfekélyek, aranyér, idült májbántalmak, epék, köszvény, diabetes mellitus, plethora abdominalis, zsírkór. *Ellenjavolatok:* carcinoma, tuberculosis.

a) Melegek.

Hazai nincs.

Külföldi: *Carlsbad.* Fürdő Csehországban. 18 hévforrás. Legmelegebb a Sprudel. Átlag 2.3‰ natr. sulfur., 1‰ natr. chlorat. Elszállítva a Sprudel, Schlossbrunn, Mühlbrunn vize használtatik leginkább. Carlsbadi sót és mesters. sót és vizet l. Natrium sulf. cz. a. Vénnyújt.

b) Hidegek.

Hazaiak. A Marienbadi és Franzensbadihoz hasonló erősségű nincs eddig. A Rohitsch jól pótolhatják a Baldóczi fürdő-forrás és a Koritnyiczai vizek.

Külföldiek: *Marienbad.* Fürdőhely Csehországban. A Ferdinandsbrunnen és Kreuzbrunnen vizében átlag 5‰ natr. sulf. 2‰ natr. chlor., 1.8‰ natr. bicarb., igen sok szabad CO_2 . — *Franzensbad.* Fürdő Csehországban. A Salzquelleben 2.8‰ natr. sulf., 1.1‰ natr. chlor., 0.9‰ natr. bicarb. foglaltatik. A többi forrás vasas. — *Rohitsch.* Fürdő Stájerországban. 1.9‰ natr. sulf., 1‰ natr. bicarb., kevés natr. chlor., sok szabad CO_2 . — *Tarasp-Schuls.* Fürdő Svájcban (1300 m. m.). Legerősebb a Luciusquelle; 2.1‰ natr. sulf., 3.6‰ natr. chlor., 0.8‰ natr. bicarb., e mellett tartalmaz még 2.4‰ kétszer szénsavas meszet és 2‰ kétszer szénsavas ammon. Vannak vasas forrásai is. — *Elster.* Fürdő Szászországban. A Salzquellenben van 5.2‰ natr. sulf., 1.6‰ natr. bicarb., 0.8‰ natr. chlor. Vannak vasas forrásai is.

4. Keserű vizek.

Ivógyógymód. *Javolatok:* egyszerű és szokványos székrekedés, aranyér, plethora abd., májvérbőség, elhízás.

Hazaiak mindenek fölött állanak. A budai Hunyadi János, Ferencz József, Rákóczy, Hunyadi László, Árpád, Victoria, Király, Loser János stb.

vizekben átlag körülbelül 20‰ natr. sulf. és ugyanannyi magn. sulf. — *Igmándi víz* (Komáromm.) 14‰ magn. sulf., 7·4‰ natr. sulf. Kevés szabad CO_2 . — *Ivándai víz* (Tórontálm.) 15‰ natr. sulf.; magn. sulfur. nincs benne. *Petőfi keserűvíz* kevésbé tömény.

Erzsébet sósfürdő Budán a Gellérthegy alatt. Fürdőgyógymód főleg a női ivarszervek idült lobos bántalmai eseteiben. Ivásra szolgál az Erzsébet-forrás, melyben 14‰ natr. sulf., 9‰ magn. sulfur.

Külföldiekre nem szorulunk. Gyengébbek és drágábbak a mi vizeinknél.

5. Egyszerű gyenge konyhasós vizek.

Konyhasótartalom nem haladja túl a 15‰-ot. Részint ivó-, részint fürdőgyógymód. Némelyik forrásnak sok szabad CO_2 tartalma is támogatja a hatást. Fürdők mint erős bőrizgatók szerepelnek. — *Javallatok ivógyógymódra*: idült gyomor- és bélhurut, gyomor- és béltonia, obstipatio habitualis, plethora abdominalis, aranyér, scrophulosis torpida, köszvény, idülten fennálló izzadmányok. *Ellenjavallatok*: carcinoma, tuberculosis.

Javallatok fürdőkre: Idülten fennálló izzadmányok, köszvény, scrophulosis torpida, idült rheumatismus, idült neuralgiák, körzeti idegrendszer idült bántalmai. *Ellenjavallatok*: bőrbántalmak, eccemára hajlamos bőr, szív- és edénybántalmak, vértolulások az agy felé.

a) Melegek.

Hazai: *Mehádiai Hercules-forrás.* (Mehádián vannak kénes források is.) Fürdő és ivógyógymód. 1·9‰ natr. chlor. Hőmérsék 56° C. Vetekedik a legtöbb külföldi fürdőhelyely.

Külföldiek: *Baden-Baden.* Fürdőhely a badeni nagyhercegségben a Schwarzwald tövében (210 m.). 2‰ natr. chlor. Hőmérsék 40—69° C. között. Ivásra a Hauptquelle szolgál. *Viesbaden.* Fürdőhely Németországban a Taunusban (117 m.). Ivásra a Kochbrunnen vize használtatik, 6·8‰ natr. chlor. tartalommal és 69° C. hőmérsékkel.

b) Hidegek.

Hazai: *Csizi víz* (Gümmör.), elszállítva használtatik, 15·5‰ natr. chlor., 0·04‰ jodkalium. 0·08‰ bromkalium tartalommal. Mint jódos víz is szerepel. Hatását konyhasó tartalmának köszöni. Kiváló gyógyhatású. A Kissingeni vizeket jól pótolhatja a *Czigelkai Lajos-forrás.*

Külföldiek: *Kissingen* Fürdő Bajorországban. Az ivásra használt Rükóczy- és Pandur-forrásokban átlag 5·5‰ natr. chlor. és igen sok szabad CO_2 . Fürdőkhöz a többi 10‰ natr. chlor.-ot tartalmazó szénsav-dús források használtatnak. — *Homburg.* Fürdő Majna-Frankfurt mellett a Taunusban (190 m.). Ivásra a gyengébb

Louisenbrunnen (3‰ natr. chlor.) és az erős Elisabethbrunnen (10‰ natr. chlor.) használatnak. Fürdőknek más források. — *Dürkheim*. Fürdő Bajorországban. Ivásra a Bleichbrunnen vize használatnak, melyben 8·8‰ natr. chlor., 0·0019‰ natr. jod., 0·019‰ natr. brom. foglaltatik. Fürdők más forrásokkal készíttetnek. Mint jódos víz is szerepel. — *Kreuznach*. Fürdő Németországban. Ivásra a Elisabethquelle használatnak, melyben 9·5‰ natr. chlor., 0·0008‰ magnes. jod., 0·039‰ magnes. brom. van. A többi források fürdésre használatnak. Mint jódos víz is szerepel. — *Neuhaus*. Bajorországi fürdő. Források 9—18‰ natr. chlor.-al, sok szabad CO_2 -al. — *Hall*. Fürdő Felső-Ausztriában. Ivásra a Tassiloquelle vize használatnak. 14‰ natr. chlor., 0·05‰ magnes. jod., 0·04‰ magnes. brom., kevés szabad CO_2 . A források fürdésre szolgálnak. Mint jódos víz is ismeretes.

6. Erős konyhasós vizek.

15‰-tól 300‰-ig terjedő natr. chlor. tartalommal. Ivógyógymódra nem használatnak, csupán fürdőkre. Az igen tömény vizek megfelelően hígítatnak. Hatást, használatot l. az egyszerű konyhasós vizeknél.

a) Melegek.

Hazai: nincs megfelelő.

Külföldiek: *Nauheim*. Fürdő Németországban (Hessen-Darmstadt). Sok forrás közül a fürdőkhez a Friedrich-Vilhelms-Sprudel (29‰ NaCl , 37° C. meleg) és a Grosser Sprudel (21‰ NaCl , 27° C. meleg) használatnak. Gyengébb források ivógyógymódra szolgálnak. Minden forrásban sok szabad CO_2 . — *Oeynhausen-Rehme*. Fürdő Németországban (Westphalia). Fürdőkhez használt források 29‰—35‰ NaCl -t tartalmaznak s 26°—33° C. melegek, bő szabad CO_2 tartalommal. Hígított vízzel ivógyógymód.

b) Hidegek.

Hazánkban sok alkalmas forrás van, különösen Erdélyben, de jól berendezett fürdő sajnos egy sincs. — Igen szerény igényeknek felelhetnek csak meg: *Polhora* (Árvam.), *Szováta* (Maros-Tordam.), *Görgény-Sóakna* (Maros-Tordam.), *Vizakna* (Alsó-Fehérn.), *Felső-Bajom* (Kis-Küküllőm.) és *Maros-Ujvár* (Alsó-Fehérn.).

Külföldiek igen nagy számmal vannak nálunk ismeretebbek; *Aussee*. Fürdő Stájerországban (650 m.). Vize 3·44‰ NaCl tartalmú; fürdőkhez használatkor hígítatnak. — *Ischl*. Fürdő Salzkammergutban (484 m.). Fürdőkhez használt vizei 2·46‰—2·55‰ NaCl tartalmúak, melyek fürdő-használatra megfelelőleg hígítatnak. Ivógyógymód gyengébb. 5—17‰ NaCl -ot tartalmazó vizekkel. — *Reichenhall*. Fürdő Bajorországban (457 m.). 19 sósforrása van. Az Edelquellenben 2·28‰ NaCl . *Harzburg*. Fürdő Németországban a Harzban (238 m.). Vize 6·6‰ NaCl -t tartalmaz.

7. Jódos és brómos vizek.

Azon ásványvizek, melyek e czim alatt szerepelnek, oly csekély jód és bróm tartalmúak, hogy ezt gyógyhatás szempontjából számításba venni önámítás. E vizek többnyire konyhasós vizek, néha égvényes konyhasós vizek, s mint ilyenek hatnak jótékonyan ivógyógymód vagy fürdők alakjában, torpid scrophulosis, némely idiült bőrbántalom, inveterált syphilis, idiült izzadmányok eseteiben.

Mint jódos vizek vannak forgalomban a sok közül a következők:

Hazaiak: melyek kereskedelmi cikket is képeznek, a *Csizi* és a *Lipiki* víz.

Külföldiek: a *Kreuznachi*, *Halli* (Felső-Ausztria), *Dürkheimi* stb.

8. Földes vagy meszes ásványvizek.

Jellegüket tetemesebb kétszer szénsavas mész, kétszer szénsavas magnesiüm és gyps jelenléte adja meg, míg más sók elenyésző csekély mennyiségben vannak jelen. — E vizek egy része meleg, más része hideg, de többnyire sok szabad CO_2 -at tartalmaznak. — A meleg fürdőkül használnak u. a. javulatok alapján, mint a tiszta hévízek, miután lényegileg u. a. hatással is bírnak. A hidegekkel ivógyógymód: Bright-kór, cystitis és pyelitis catarrhalis chronica, lithiasis, húgyfővény, kőszvény, rhachitis, légutak idiült hurutja eseteiben.

a) Melegek.

Hazaiak: *Szklénó*. Fürdő Bars megyében (382 m.). Hőm. 37—53·5° C. Kénsavasmész 1·6‰—2‰. Egyéb szilárd részek csekély mennyiségben. Fürdő- és ivógyógymód. *Budapest*: *Sáros-fürdő*. Hőm. 50° C. Iszapfürdő is. *Rácz-fürdő*. Hőm. 43·5° C. Gőzfürdők is. *Rudas-fürdő*. Hőm. 45° C. Gőzfürdők is.

Külföldiek: *Leuk* (*Loèche*). Fürdő Svájcban. (Cant. Wallis. 1415 m.). Hőm. 34—51° C. Kénsav. mész 1·3‰ Zord alpesi klíma. Fürdő- és ivógyógymód. *Bagnères de Bigorre*. Fürdő Franciaországban (Dép. Hautes. Pyrenées, 579 m.). Hőm. 18—51° C. Sok forrás; meszes hévízek mellett kénes és vasas források is.

b) Hidegek.

Hazaiak: *Szinnye Lipóczy Salvator* forrás. Víz kereskedés útján palaczkozva árusítatik el. Kitűnő víz, olyan mint a Wildungeni. Hasonló hozzá a *Baldóczy*. Fürdő Szepesmegyében, a szepesi vár mellett. Deák-forrásban 2·1‰ kétszer szénsavas mész, 0·8‰ natrium sulfur.; igen sok szabad CO_2 ; a fürdőforrásban 3·7‰ kétszer szénsavas mész, 1·4‰ natr. sulf.; ez utóbbi forrás, mint glaubersós víz is szerepelhet.

Külföldiek: *Wildungen.* Fürdő Németországban a Waldeck hercegségben (300 m.). Legerősebb a Helonenquelle, melyben 1.3% kétszer szénsavas mész, 1.4% kétszer szénsavas magnesium, 0.9 natr. bicarbonic., 1% konyhasó és sok szabad CO_2 . — *Lippspringe.* Fürdő Németországban. Az Arminiusquelle-ben 0.6% kétszer szénsavas mész, 0.8% gipsz, u. a. natr. sulf., sok szabad CO_2 és légencyáz. Enyhe klímája folytán különösen tuberculoticusok gyógyhelye. — *Inselbad.* Fürdő Németországban Lippspringe-től nem messze. Földes-konyhasós források sok légencyázzal. Tuberculoticusok gyógyhelye, mint Lippspringe. — *Weissenburg.* Fürdő Svájcban. (896 m.).

Franciaországban látogatottak: *Cransac* (Dép. Aveyron.), *Contrex ville* és *Vittel* (Dép. Vosges.), *Saint-Armand* (Dép. Nord).

9. Vasas ásványvizek.

A vas mint kétszer szénsavas vasoxydul van jelen, legalább 0.03% mennyiségben. Többnyire hideg vizek, meleg csak néhány van. *Tiszta vasas savanyú vizeknek* nevezzük azokat, melyekben a kétszer szénsavas vasoxydul és tetemes szabad CO_2 mellett, kevés más számbavehető alkatrész van; ezek mellett ismerünk és használunk: *földes-vasas savanyú vizeket*, *égyényes-vasas savanyúvizeket*, *égyényes-konyhasós-vasas savanyúvizeket*, s végül *glaubersós-vasas savanyú vizeket*. A melegek főleg fürdőgyógyomódra szolgálnak, midőn a fürdő hőmérséke s a jelenlevő szabad CO_2 a gyógyhatány; a kétszer szénsavas vasoxydul a bőrön át föl nem szívódik. Javulatok nagyrészt mint az egyszerű hévívizeknél. Hideg vasas vizekkel főleg ivógyógyomód, néhol melegítő fürdőgyógyomód is. — Ivógyógyomódra a javulatok sokfélék lehetnek a víz vegytartalmához képest. Általánosabb javulatok: chlorosis, olygaemia, általános gyengeség, idült neurosisok vérszegény alapon. Ellenjavulat: lázas bántalmak, tuberculosus, gyomorbántalmak.

a) Melegek.

Hazaiak: *Vihnye.* Fürdő Bars megyében (310 m.). Víz-hőmérsék $35-38.3^\circ \text{C}$. főleg fürdőgyógyomód, de a források ivógyógyomódra is használtatnak. Régi forrásban 0.03% kétszer szénsavas vasoxydul, kis mennyiségű szabad CO_2 . Az új ártézi forrásban kevesebb a vas. — *Szliács.* Fürdő Zólyommegyében (360 m.). Hideg, langyos és meleg források. Az ivásra szolgáló hideg források közül a József-forrás a legfontosabb, mely tiszta vasas savanyú víz Vaunak langyos, ivásra is használt földes-vasas szénsavdús források is (Lenkey-, Dorottya-forrás). Fürdőit $25-30^\circ \text{C}$. hőjű források szolgálnak, bő szabad CO_2 tartalommal. Legmelegebb az I. sz. tükröfürdő, mely földes-vasas víz.

Külföldiek főleg Franciaországban találhatók; ilyenek: *Rennes*, *Bagnères de Bigorres*, *Barbolan*.

b) *Hidegek.*

Hazaiak: *Buziás.* Fürdő Temesmegyében. Forrásai vasasavanyúvizek. Ivógyógymód. Fürdők mesterségesen és észszerűen melegített ásványvizzel. József-forrásban 0.16% kétszer szénsavas vasoxydul, tetemes szabad CO_2 . Kissé gyengébb, de még mindig hatalmas vastartalmú a Mihály-forrás. — *Körötnyicza.* Fürdő Liptó-megyében (847 m.). Főleg ivógyógymód. A forrásokban kétszer szénsavas vasoxydul 0.084 — 0.097% , e mellett tetemes gipsz, kétszer szénsavas mész, kénsavas magnesium és közép mennyiségű szabad CO_2 . — *Borszéki Kossuth-kút.* Fürdő Csikmegyében (882 m.). A Kossuth-kút vize 0.09% kétszer szénsavas vasoxydult tartalmaz. Ivógyógymód. — *Új-Lubló.* Fürdő Szepesmegyében (556 m.). A forrásokban kétszer szénsavas vasoxydul 0.01 — 0.05% . E mellett tetemes kétszer szénsavas magnesium és mész; igen sok szabad CO_2 . Ivógyógymód. Fürdők is melegített ásványvizzel. — *Parád.* Fürdő Hevesmegyében. A *Clarisse*-forrás tiszta vasas savanyú víz. Kétszer szénsavas vasoxydul 0.05 , dús szabad CO_2 tartalom. — *Éltőpataka.* Fürdő Háromszék megyében (624 m.). Ivógyógymód. Források égvényes-vasas savanyúvizek. Ha az elomzések nem tévesek, a források tartalmazzák: kétszer szénsavas vasoxydult 0.079 — 0.468% -ig, kétszer szénsavas natriumot 1.2% — 2.0% -ig, kétszer szénsavas magnesiumot és meszet szintén tetemes mennyiségben, ép úgy szabad CO_2 -at is. — *Tusnád.* Fürdő Csikmegyében (635 m.). Ivóforrásokban 0.1 — 0.19% kétszer szénsavas vasoxydul; ezek közül a Rezső-forrásban 2% NaCl . A főkút vize, mely szintén ivásra szolgál, égvényes-sós-vasas savanyúvíz, 0.04% kétszer szénsavas vasoxydul és 1.2% kétszer szénsavas natrium tartalommal. Melegített vízzel fürdőgyógymód. — *Bártfa.* Fürdő Sáros megyében (318 m.). Ivógyógymód s mesterségesen melegített ásványvizzel fürdőgyógymód. Források többsége égvényes-sós-vasas savanyúvíz, a lobogó forrás pedig égvényes-vasas savanyúvíz, 0.08% kétszer szénsavas vasoxydullal, 1.6% natr. bicarb.-al, sok szabad CO -val. Az Orvos-forrás erős égvényes-sós savanyúvíz 4.8% natr. bicarb.-al, 1.1% NaCl -al, kevés vassal.

Külföldiekre hazánk rá nem szorul ugyan, mégis legyenek megemlítve itt a következő ismertebbek: *Spaa.* Fürdő Belgiumban. Tiszta vasas savanyúvíz források 0.05 — 0.2% kétszer szénsavas vasoxydul tartalommal. — *Pyrawarth.* Alsó-Ausztriában, Bécestől nem messze. Tiszta vasas víz, szabad CO_2 benne kevés, 0.1% kétszer szénsavas vasoxydul tartalommal. — *Schwalbach.* Fürdő Németországban, Nassauban. Ivógyógymódra szolgál a Stahlquelle, 0.08% kétszer szénsavas vas tartalommal, sok szabad CO_2 -al. Tiszta vasas savanyúvíz. — *Pyrmont.* Fürdő Németországban, Waldeck hercegségben. A Stahlquelle vize, mely a kereskedésben forgalomban van 0.077% kétszer szénsavas vasoxydult tartalmaz és sok szabad CO_2 -at. Gyengébb sokkal a Helenenquelle. Konyhasós ivóforrások is vannak, dús szabad CO tartalommal. Sós fürdők. — *Elster.* Fürdő Szászországban. Sok forrás, melyek — kivéve

a Salzquelle-t, mely égvényes-glaubersós savanyúvíz kevés vassal, — mind glaubersós-vasas savanyú vizek, $0.056-0.085\%$ kétszer szén-savas vasoxydul tartalommal $2.0-5.0\%$ natr. sulfur-al és sok szabad CO_2 -al. — *Franzenbad*. Fürdő Csehországban. Számos glaubersós-vasas savanyúvíz. A Stahlquelle 0.07% kettő szén-savas vasoxydult tartalmaz. A Salzquelle égvényes-glaubersós savanyúvíz. *Maricnbadi Ambrosiusquelle* olyan mint a Buziási vizek, csak hogy Na_2SO_4 tartalmú.

Függelék a vasas vizekhez. Vagsáliczos vizek.

Kénsavas vasoxydot és oxydult, kénsavas aluminiumot, némelyike arsenotrioxydot, vagy arsenessavas natriumot is tartalmaz. Töményebbek fürdőül, gyengébbek vízzel vagy borral erősen hígítva ivásra is használatnak. nagyrészt ugyanoly javulatok alapján, mint a tiszta vasas savanyúvizek

Hazai: *Purádi vasas-arsénos víz*, hasonló a Levicoi ivótorráshoz. Fürdő Hevesmegyében.

Külföldiek: *Roncegno*. Fürdő déli Tyrolban (535 m.). Kénsavas vasoxydul 4.2% , kénsavas aluminium 1.2% , arsenessav 0.067% . Mint arsenes víz nagyhirű, nemcsak vérszegénység, hanem idült bőrbajok, idült idegbántalmak eseteiben is. Ivó és fürdőgyógymód. — *Levico*. Fürdő déli Tyrolban (520 m.). Az erős vízben, mely fürdőkhöz vétetik 4.9% kénsavas vasoxydul, 0.88% kénsavas aluminium, 0.0015% arsenessavas atrium van; ivóvízben 0.48% kénsavas vasoxydul, 0.0016% arsenessavas natrium foglaltatik. Javulatok, mint a Roncegno-i víznél. *Guber-forrás*. (Srebenica, Bosniában).

10. Kénos vizek.

Nagyrészüik hévvíz. A kén mint H_2S , CO_2 , azután mint natrium-, kalium-, calcium- és magnesium-kénmáj foglaltatik e vizekben; az utóbbi vegyületekből folyton fejlődik H_2S . Tartalmaztatnak e vizek még tetemesebb szabad CO_2 -at is, midőn kénos savanyú vizeknek nevezetnek — konyhasót, s ekkor konyhasós-kénos vizek — mészsókat, midőn meszes-kénos víz a nevük — végre kettő szénsavas natriumot, ez utóbbiak az égvényes-kénos vizek. A meleg vizek főleg fürdő alakjában, néha ivógyógymód czéljaira is használatnak; a hidegek főleg ivógyógymódra szolgálnak, de mesterségesen melegítve fürdők alakjában is alkalmazásba vétetnek.

Javulatok a fürdőkre: idült rheumaticus bántalmak, idült neuralgiák, idült fémmérgezések, körzeti hűdésesek, caries, csont necrosis, köszvény, idült fennálló lobos izzadmányok, pityriasis versicolor, prurigo.

Javulatok ivógyógymódra: plethora abdominalis, légutak idült hurutjai, idült fémmérgezések, idült bőrbántalmak.

a) Melegek.

Hazaiak: *Harkány.* Fürdő Baranyamegyében. Fürdőgyógymód. Egyszerű kénes hévíz. Hőmérsék 62-2° C. — *Budapest*en a következő fürdők meszes-kénes hévízű forrásokkal bírnak, melyek főleg fürdésre, de néha ivógyógymódra is használatnak: *Császár-fürdő.* Különböző hőfokú források. Gyógyforrás hőmérséke 59° C. *Iszapfürdő is. Lukács-fürdő.* Különböző hőfokú források. Buzogó 60° C. *Iszapfürdő is. Margitsziget.* Hőmérséke 43° C. *Városligeti artézi fürdő.* Hőmérséke 73° C. — *Pöstyén vagy Pistán.* Fürdő Nyitra megyében. Meszes-kénes hévíz. Hőmérséke 60—64° C. *Iszapfürdők is.* — *Varasd-Toplitz.* Fürdő Varasdmegyében. Meszes-kénes hévíz. Hőmérséke 57° C. — *Trencsén-Teplitz.* Fürdő Trencsén-megyében. Meszes-kénes hévíz. Hőmérséke 38—40° C. — *Mehádiai Hercules-fürdő.* Krassó-Szörénymegyében. A Szupáry-, Erzsébei- és Lajos-források konyhasós-kénes hévizek, 45—48° C. hőmérsékkel; NaCl-tartalmuk 1.8‰—3.7‰ között. A Herkules-forrás egyszerű konyhasós-hévíz. (l. e. cz. a.).

Külföldiekre nem vagyunk utalva. Megemlítendők: *Baden* Bécs mellett, számos földes-konyhasós-kénes hévforrással, melyek hőmérséke 24—26° C. — *Achen.* Nagy város Németországban (80,000 lakossal). Forrásokban kénvegyületek mellett tetemes mennyiségű konyhasó, natr. bicarb. és kevés natr. sulf. Hőmérsékük 47—55° C. Ivó-, fürdő- és belehelési gyógymód. — *Schützen.* Fürdő Svájcban. (Aargau.) Meszes-kénes hévíz, sok calcium-sulphiddal. Hőmérséke 25—34° C. Ivó- és fürdőgyógymód. — Franciaországi nevezetesebb fürdőhelyek: *Aix le Bains, Luchon, Barèges, Chatelets, Eauz Bonnes, Eauz Chaudes.*

b) Hidegek.

Hazaiak: *Parád.* Fürdő Heves megyében. A Csevice égvényes kénes savanyú víz sok szabad CO₂-al. Ivógyógymód. — *Leibitz.* Fürdő Szepesmegyében (754 m.). Egyszerű kénes víz kevés szabad CO₂-al. Mesterségesen melegített vízzel fürdőgyógymód. — *Soboráncz.* Fürdő Ungmegyében. Konyhasós-kénes savanyúvíz; a főforrásban 6‰ NaCl és középennyiségű CO₂. Ivó- és fürdőgyógymód.

Külföldiek: *Weilbach.* Fürdő Németországban. Egyszerű kénes víz. — *Nenndorf.* Fürdő Németországban. (Hessen). Meszes-kénes víz. — *Enghien.* Fürdő Franciaországban (Seine et Oise dép.). Meszes-kénes víz.

11. Egyszerű hévizek.

Fürdőgyógymód. Források hőmérséke 22—80° C között. A 40—45° C-nál melegebbek fürdőzés céljaira lehűtetnek. Hőmérsék szerint hűvösek (22—28° C.), langyosak (28—35° C.), melegek (35—40° C.), forrók (40—45° C.). Jellemző rendkívüli szegénységük

gáztartalomban és szilárd részekben. A hűvös fürdők az anyagcserét enyhén fokozzák; a javalatok ezen hatásból indulnak ki. A langyos hévizek javalatai igen sokfélék, legtöbb javalatot az idült idegbántalmak szolgáltatják: neurasthenia, hypochondria, hysteria oly esetei, melyek izgalmi tünetekkel járnak, tabes, dorsalis, neuralgiák, körzeti hűdések, idült fennálló lobos izzadmányok, különösen medenczobeliak, hosszúra nyúló reconvalescentia, korai elaggás, általános gyengeség. — Meleg és forró hévizeket illető javalatok: idült izom- és ízületi rhomatismus, kőszvény, s azok következményei, csontcaries és necrosis, idült lobos izzadmányok, súlyosabb neuralgiák (ischias), idült fémmérgezések.

Hazaiak: Hévíz. Fürdő Zalamegyében, közel Keszthelyhez. Hőm 33° C. Iszapfürdők is. — Krapina-Teplisz. Fürdő Horvátországban Varasdmegyében. Hőmérséke $41-43^{\circ}$ C. Erdei klíma. — Daruvár. Fürdő Szlavoniában Pozsegamegyében. Hőmérséke $42-45^{\circ}$ C. Iszap- és lápfürdők is. — Sztubnya. Fürdő Turócsmegyében (518 m.) Hőmérséke $40-46.5^{\circ}$ C. Subalpin klíma. — Rajecz-Teplisz. Fürdő Turócsmegyében (420 m.) Hőmérséke 33° C. Újonnan berendezett csinos fürdő.

Külföldiek: Tobelbad. Fürdő Stájerországban Grácztól nem messze. Hőmérséke $25-29^{\circ}$ C. Erdei klíma. — Neuhaus. Fürdő Stájerországban Cilli mellett. Hőmérséke $34-35^{\circ}$ C. Enyhe klíma. — Pfäfers és Ragaz. Fürdők Svájcban. Pfäfers (623 m.) zord klímájú; víz hőmérséke 37° C., mely innen facsüveken Ragazba (521 m.) vezettetik, hol 34° C. Ragaz klímája subalpin. — Römerbad. Fürdő Stájerországban (237 m.) Víz hőmérséke $36-38^{\circ}$ C. Enyhe klíma, dús növényzet. — Tüffer. Fürdő Stájerországban. Hőmérséke a víznek $35-39^{\circ}$ C. Erdei klíma. — Wildbad-Gastein. Salzburg tartományban (1047 m.) Hőmérséke a víznek 50° C. Alpin klíma. Víz elvezettetik Hofgasteinba is, hol szintén vannak fürdők. — Teplisz-Schönau. Fürdő Csehországban. Víz hőmérséke $28-48^{\circ}$ C. — Plombières. Fürdő Franciaországban a Vosges-hegységben (44 m.) Hőmérséke a víznek $20-70^{\circ}$ C. — Luxeuil. Fürdő Franciaországban a Vosges-hegységben. Víz hőmérséke $30-56^{\circ}$ C.

12. Lápfürdők.

Javalatok: Idült neuralgiák, körzeti hűdések, idült lobos izzadmányok, különösen a női ivarszervek idült lobos bántalmai, az impotentia némely alakja, idült ízületi és izomszűz, kőszvény.

Hazánkban Alsó-Tátrafüreden, Daruvárott, Buziáson.

Külföldön: Franzensbadban, Elsterben, Pyrmontban, Spaaban, Kissingenben, Marienbadban, Karlsbadban, Teplitz-Schönauban.

GYÓGYSZEREK TÁRGYMUTATÓJA.

(L. = lapszám, R. = vényszám.)

- Absinthii herba** L. 30. R. 1.
Acetanilid L. 30. R. 3, 4. L. 31.
 R. 5, 6.
Acetanisidin l. Methacetin.
Acetophenon L. 31. R. 7, 8.
Acetphenetidín L. 31. R. 10, 11.
Acetum L. 31. R. 12.
Acetum aromaticum L. 32. R.
 13.
Acetum pyrolignosum rectifi-
catum L. 32.
Acetum Scillae L. 184. R. 779.
Acetum vini l. Acetum.
Acidum arsenicosum L. 32. R.
 14, 15. L. 33. R. 16, 17.
Acidum benzoicum L. 33. R.
 22, 23. L. 34. R. 24, 25, 26, 27.
Acidum boricum L. 34. R. 28,
 29, 30, 31, 32. L. 35. R. 31.
Acidum camphoricum L. 35.
 R. 31.
Acidum carbolicum L. 35. R.
 35, 36, 37, 38. L. 36. R. 39,
 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Acidum carbolicum crudum L.
 36.
Acidum carbolicum liquidum
 L. 36.
Acid. cetraricum l. Cetrari-
 num.
Acidum chloronitrosus L. 37.
Acidum chromicum L. 37. R.
 46.
Acidum cinnamylicum L. 37.
 R. 47, 48.
Acidum citricum L. 37.
Acidum hydrochloricum dilu-
tum L. 38. R. 49, 50, 51.
Acidum lacticum L. 38. R. 52,
 53, 54, 55. L. 39. R. 56.
Acidum nitricum concentr. pu-
rum L. 39.
Acidum nitricum dilutum L.
 39. R. 57, 58.
Acidum nitricum fumans L. 39.
Acidum oxynaphtholicum s. a
 Naphtholcarbolsavi L. 39.
Acidum phenylicum l. Acid.
 carbolicum.
Acidum phenylo-aceticum L. 39.
Acidum phenylo-propionicum
 L. 39.
Acidum phosphoricum L. 40.
 R. 59, 60, 61.
Acidum pyrogallicum s. Pyro-
 gallolum L. 40. R. 62, 63, 64.
Acidum salicylicum crystallisa-
tum L. 41. R. 65, 66, 67, 68,
 69, 70, 71, 72, 73.
Acidum sozolicum l. Asepto-
 lum.
Acidum sulfuricum concentra-
tum L. 42.
Acidum sulfuricum dilutum L.
 42. R. 74, 75, 76, 77.
Acidum sulfurosum L. 42.
Acidum tannicum s. Tanninum
 L. 43. R. 80, 81, 82, 83, 84,
 85, 86, 87. L. 44. R. 88, 89,
 90, 91.
Acidum tartaricum L. 44.
Aconitinum germanicum L. 44.
 R. 92.
Aconitum Napellus. Tubera L.
 44.
Adonidinum L. 45. R. 94.
Adonis vernalis. Herba L. 45.
 R. 93.
Aether aceticus L. 45.
Aether bromatus s. Aethylum
 bromatum s. Bromoethyl. L.
 45.
Aether depuratus s. sulfuricus
 L. 45. R. 95, 96.
Aether Petrolei s. Ligroine L. 46.
Aethoxy-coffeinum L. 46. R.
 97, 98, 99.
Aethylechlorür l. Aethylum
 chloratum L. 46.
Aethylenum chloratum s. Li-
 quor hollandicus L. 46.
Aethylidenum bichloratum l.
 Aethylidenum chloratum L.
 46.

- Aethylidenum chloratum s.
 Aethylidenum bichloratum L.
 46.
 Aethylum bromatum l. Aether
 bromatus L. 45.
 Aethylum chloratum s. Monochloro-
 ethan s. Aethylchlorür
 L. 46.
 Agaricinum L. 47. R. 100, 101,
 102.
 Agaricus chirurgorum L. 47.
 Alantol l. Helenin.
 Aloë L. 48. R. 103, 104.
 Aloinum L. 48.
 Althaeae folia L. 48.
 Althaeae radix L. 49. R. 109,
 110, 111.
 Alumen L. 49. R. 113, 114, 115,
 116, 117, 118, 119, 120, 121,
 122, 123.
 Alumen ustum L. 49.
 Aluminium acetici liquor L. 51.
 R. 124, 124.
 Aluminium acetico-tartaricum
 L. 51. R. 126, 127, 128, 129,
 130.
 Aluminium hydrooxydatum L.
 51.
 Alumnolum L. 51.
 Ammoniacum. Gummi-resina L.
 52.
 Ammonii Annisati liquor L.
 52. R. 133, 134.
 Ammonii caustici liquor L. 52.
 Ammonii succini liquor L. 54.
 R. 147, 148.
 Ammonium aceticum solutum
 L. 52. R. 131, 132.
 Ammonium bromatum L. 53.
 R. 135, 136.
 Ammonium carbonicum L. 53.
 R. 137, 138, 139, 140.
 Ammonium chloratum L. 54.
 R. 141, 142, 143, 144.
 Ammonium chloratum ferra-
 tum L. 54. R. 145, 146.
 Ammonium higanychlorid l.
 Sal Alembroth.
 Ammonium készítmények L. 52.
 Amygdala amara L. 55.
 Amygdala dulcis L. 55.
 Amyle nitrosa L. 56. R. 157.
 Amylenum hydratum L. 55. R.
 151, 152, 153, 154, 155, 156.
 Amylium nitrosum l. Amyle
 nitrosa.
 Amylnitrit l. Amyle nitrosa.
 Amylum tritici L. 56.
 Analgen L. 56.
 Angelicae radix L. 56.
 Anisum vulgare. Fructus. L.
 57.
 Anisum stellatum Fructus L.
 56.
 Anthrarobin L. 57. R. 158, 159,
 160, 161.
 Antifebrin l. Acetanilid.
 Antidotum Arsenici L. 57. R.
 162.
 Antipyrin L. 58. R. 163, 164,
 165, 166, 167, 168, 169.
 Antiseptin L. 58.
 Apium album crystallisatum
 L. 59. R. 170.
 Apomorphinum hydrochlori-
 cum L. 59. R. 171, 172, 173,
 174.
 Aqua amygdalarum amararum
 L. 55. R. 149, 150.
 Aquae aromaticae L. 59.
 Aqua Aurantii florum L. 59.
 Aqua Calcis L. 60. R. 177, 178,
 179, 180, 181.
 Aqua Calcis saccharata L. 60.
 Aqua carbolata L. 36.
 Aqua Chlori L. 60.
 Aqua Cinnamomi simplex L.
 59. R. 91.
 Aqua Cinnamomi spiritiosa
 L. 59. R. 91.
 Aqua cresolica L. 98.
 Aqua Foeniculi L. 59. R. 175,
 176.
 Aqua Goulardi l. Aqua vegeto-
 mineral. Goulardi.
 Aqua Laurocerasi l. Aqua
 Amygdalarum amar.
 Aqua laxativa Viennensis l.
 Senna.
 Aqua Menthae piperitae L. 60.
 Aqua phagedaenica L. 61.
 Aqua phagedaenica nigra L.
 61.
 Aqua plumbica L. 173.
 Aqua regia l. Acid. chloronit-
 rosum.
 Aqua rosarum L. 60.
 Asa foetida L. 61. R. 198, 199,
 200, 201.

- Asepsin l. Antisepsin.
 Aseptolum L. 61. R. 202, 203.
 Aspidospermin L. 176.
 Aqua vegeto-mineralis Goulardi s. Aqua Goulardi L. 173.
 Aqua vulneraria Thedeni L. 42. R. 74.
 Araroba L. 61.
 Arbutinum L. 201. R. 841.
 Argentaminum L. 61.
 Argentum nitricum crystallisatum L. 62. R. 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191.
 Argentum nitricum cum Kalio nitrico L. 61.
 Argentum nitricum fusum L. 61.
 Argilla alba L. 62.
 Argoninum L. 62.
 Aristolum L. 63. R. 192, 193.
 Arnicae montanae flores L. 63. R. 194, 196.
 Arnicae montanae folia L. 63.
 Arnicae montanae rhizoma L. 63. R. 195.
 Arsenicum album l. Acid. arsenicosum.
 Atropinum sulfuricum L. 66. R. 220, 222, 223, 224.
 Auro-Natrium chloratum L. 65. R. 204, 205.
 Barosmae folia l. Bucco.
 Balsamum canadense L. 65.
 Balsamum Copaivae L. 65. R. 206, 207, 208, 209.
 Balsamum peruvianum L. 65. R. 210, 211, 212, 213.
 Balsamum Styracis l. Styrax liquid.
 Balsamum vitae Hoffmanni L. 66.
 Belladonnae radix L. 66.
 Benzamilidum L. 68.
 Benzoë L. 68.
 Benzolum L. 68. R. 228, 229.
 Benzonaphtholum L. 68.
 Berberinum hydrochloricum L. 76.
 Berberinum phosphoricum L. 76.
 Betolum L. 68. R. 230.
 Bismuthum salicylicum l. B. subsalicylicum.
 Bismuthum subgallicum l. Dermatolum.
 Bismuthum subnitricum L. 69. R. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238.
 Bismuthum subsalicylicum L. 70. R. 229, 240, 241, 242.
 Bismuthum tannicum L. 70. R. 244, 245.
 Bitumen Fagi l. Pix liquida.
 Blatta orientalis L. 71. R. 246.
 Boldo L. 71.
 Boldoa folia l. Boldo.
 Boldu l. Boldo.
 Bolus alba l. Argilla alba.
 Borax venetus l. Natrium boracicum.
 Bromaeethyl l. Aether bromatus L. 45.
 Bromalum hydratum L. 71. R. 247, 248.
 Bromkalium l. Kalium bromatum.
 Bromoformium L. 71.
 Bucco L. 72.
 Buchu l. Bucco.
 Bulbus Scillae l. Scilla.
 Butyl-chloralum hydratum L. 72. R. 249, 250.
 Butyrum Cacao l. Ol. Cacao.
 Calamus Acorus, Rhizoma L. 72. R. 251, 252.
 Calcaria canotica l. Calcium oxydatum.
 Calcaria chlorata L. 73. R. 253, 254.
 Calcaria usta l. Calcium oxydatum.
 Calcium carbonicum nativum L. 73. R. 255.
 Calcium carbonic. praecipitatum L. 73. R. 256, 257, 258.
 Calcium chloratum fusum L. 74. R. 259.
 Calcium cresolicum L. 98.
 Calcium hypochlorosum l. Calcaria chlorata.
 Calcium hypophosphit l. Calcium hypophosphorosum.
 Calcium hypophosphorosum L. 74.
 Calcium oxydatum L. 74. R. 260.
 Calc. oxysulfurat. solut l. Solutio Vlemingx.
 Calcium phosphoricum l. 75. R. 261, 262, 263.

- Calcium sulfid l. Calcium sulfuratum.
 Calcium sulfuratum L. 75.
 Calcium sulfuricum ustum L. 75.
 Calomel l. Hydrargyr. chlorat. mite.
 Camphora L. 77. R. 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276.
 Camphora monobromata L. 77. R. 277, 278.
 Cannabis indicæ summitates L. 78.
 Cantharides L. 79.
 Carbo animalis L. 80.
 Carbo osium L. 80.
 Cardamomi fructus L. 80.
 Calambæ radix L. 76. R. 265, 266.
 Cannabinum L. 78. R. 282.
 Cannabinum tannicum L. 78. R. 283, 284.
 Cantharidinum L. 79.
 Capilli Veneris frondes L. 80.
 Carbo ligni depuratus L. 80.
 Caragaheen L. 80.
 Caryophylli flores L. 80.
 Cascaræ sagradæ cortex L. 80. R. 287.
 Cascarillæ cortex L. 81.
 Castoreum L. 81. R. 294, 295.
 Catechu pallidum L. 82. R. 298, 299.
 Cava-Cava L. Piper-Methysticum.
 Cera alba L. 82. R. 300, 301.
 Cera flava L. 83.
 Ceratum Cetacei L. 83.
 Cerium oxalicum L. 83. R. 302.
 Centaurii herba L. 82.
 Cerussa l. Plumb. carbonic.
 Cetaceum L. 83.
 Cetrarinum L. 144.
 Chamomillæ vulgaris flores. L. 83.
 Charta sinapisata L. 188.
 Chinæ Calisayæ cortex convolutus L. 83.
 Chinæ Calisayæ cortex planus L. 83. R. 304.
 China regii plana L. Chinæ Calisayæ cortex planus.
 Chinæ succirubrae cortex L. 84. R. 303, 305.
 Chininum L. 85.
 Chininum aethylo-sulfuricum L. 87.
 Chininum bimuriaticum carbamidatum L. 87. R. 321.
 Chininum bisulfuricum l. 85. R. 313, 314.
 Chininum ferro-citricum L. 87. R. 322, 323.
 Chininum hydrobromic. L. 87.
 Chininum hydrochloricum L. 85. R. 315, 316.
 Chininum salicylicum L. 87.
 Chininum sulfuricum L. 85. R. 311, 312, 317, 318.
 Chininum tannicum insipidum Rozsnyai L. 85. R. 319, 320.
 Chinidinum sulfuricum L. 87.
 Chinolinum L. 88.
 Chinolinum tartaricum L. 88.
 Choralamid L. 89. R. 328, 329, 330.
 Chloralimidum L. 89.
 Chloralose L. 89.
 Chloralum formamidatum L. Chloralamid.
 Chloralum hydratum L. 88. R. 324, 325, 326, 327.
 Chlorodine L. 89.
 Chloroformium e Chloralo L. 89. R. 331, 332, 333, 334.
 Chorda carbolata L. 37.
 Chrysarobinum L. 61. R. 182, 183.
 Cinæ flores L. 90.
 Cinchoninum sulfuricum l. Chinakészitmények.
 Cinnabaris factitia L. 91.
 Cinnamomi Cassiæ cortex L. 91.
 Citri cortex fructus L. 91.
 Citri flavedo corticis L. 91.
 Citrophenum L. 91.
 Cocainum hydrochloricum L. 91. R. 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348.
 Codeinum L. 165.
 Codeinum hydrochloricum L. 167. R. 708, 709, 711.
 Coffeinum L. 93.
 Coffeinum citricum L. 93. R. 349.
 Coffeinum natrio-benzoicum L. 93. R. 350, 351.
 Coffeinum natrio-salicylicum L. 93. R. 352, 353.
 Cognac L. 94.
 Colchicinum L. 94. R. 354.

- Colchici semina L. 94.
 Collodium L. 95.
 Collodium flexile L. 95.
 Collyrium adstringens luteum L. 95.
 Colocynthis fructus L. 95. R. 357.
 Colombo radix l. Calumbae radix.
 Colomphonium depuratum flavum L. 96.
 Concbinium sulfuricum L.
 Chinidinum sulfuricum.
 Condurango cortex L. 96. R. 360, 361.
 Conii maculati herba l. 96.
 Coninum L. 96.
 Coninum hydrobromicum L. 96. R. 362, 363.
 Convallariae majalis herba L. 96.
 Coriandri fructus L. 97.
 Coto cortex L. 97.
 Cotoinum L. 97. R. 367.
 Creolin L. 97. R. 368—372.
 Crème céleste l. Ung. emolliens.
 Cremor tartari L. Kalium hydrotartaricum.
 Cresolum purum L. 98.
 Cresolum purum liquidum L. 98.
 Creta alba l. Calcium carbon. nativum.
 Croci gallici stigmata L. 99.
 Crotonis semina. L. 99.
 Cubebae fructus L. 99. R. 375.
 Cucurbitae peponis semini. L. 99. R. 377.
 Cuprum aluminatum L. 100.
 Cuprum sulfuricum L. 100. R. 378—81.
 Daturae stramonii semina et folia L. 100.
 Decoct. Zittmanni fortius L. 183.
 Decoct. Zittmanni mitius L. 183.
 Dermatolum L. 101. R. 382—388.
 Dextrinum L. 101.
 Digitalis folia. L. 100. R. 384—91.
 Dimethylaethyl-carbinol lisd. Amylenum hydratum.
 Dimethyloxychinizin l. Antipyrin.
 Diosmae folia l. Bucco.
 Diphtheria antitoxin l. Serum antidipterit.
 Diuretinum l. Theobromin. natrio-salicyl
 Doveri pulvis L. opium.
 Duboisinum sulfuricum L. 102.
 Durand-féle szer L. 45. R. 95.
 Electuarium lenitivum l. Senna.
 Elaeosacchara L. 102.
 Elixirium acidum Halleri l. Li-
 quor acidus Halleri L. 42.
 Emplastra L. 102.
 Emplastrum adhaesivum. L. 102.
 Emplastrum adhaesivum exten-
 sum americanum elasticum L. 103.
 Emplastrum adhaesivum linteo
 extensum L. 102.
 Emplastrum anglicanum L. 103.
 Emplastrum Cantharidum l.
 Cantharides.
 Emplastrum Cantharidum per-
 petuum l. Cantharides.
 Emplastrum diachylon simplex
 L. 103.
 Emplastrum diachylon compo-
 situm L. 103.
 Emplastrum Cerussae L. 103.
 Emplastrum Hydrargyri L. 103.
 Emplastrum minii adustum L.
 103.
 Emplastrum saponatum L. 103.
 Emplastrum vesicatorium con-
 suetum l. Emplastrum Can-
 tharidum.
 Emulsio amygdalina l. Amyg-
 dala dulcis.
 Emulsio oleosa l. Amygdala
 dulcis.
 Ergotina l. Secale cornutum.
 Erythropheinum hydrochlori-
 cum L. 103.
 Eserinum salicylicum l. Phy-
 sostigminum salicyl.
 Eucalypti folia L. 103.
 Eucalyptolum L. 103. R. 394.
 Eulyptol L. 104.
 Euphorbium L. 104.
 Euphorinum L. 104.
 Euophenum L. 104.
 Evonyminum L. 104. R. 395, 396.
 Exalginum L. 105. R. 397, 398,
 399, 400.
 Extractum Aconiti L. 44.

- Extractum Aloes L. 48. R. 105, 106, 107.
 Extractum Belladonnae L. 66. R. 214, 215, 216, 217, 218.
 Extractum Calumbae L. 76. A. 267, 268.
 Extractum Cannabis indicae L. 78. R. 279, 280.
 Extractum Cascarae sagradae fluidum L. 80. R. 288, 290, 291.
 Extractum Cascarillae L. 81. R. 293.
 Extractum Centaurii L. 82.
 Extractum Chinae L. 84. R. 306, 307, 309.
 Extractum Colocynthis L. 95. R. 358.
 Extractum Conii L. 96.
 Extractum Cubebae aethereo spirituosum L. 99. R. 376.
 Extractum malatis Ferri L. 107. R. 407.
 Extractum Ferri pomati l. Extractum malatis Ferri.
 Extractum Filicis Maris aethereum L. 110. R. 429, 430.
 Extractum Gentianae L. 112.
 Extractum Hyoscyami foliorum L. 127. R. 500, 501.
 Extracta fluida L. 105.
 Extractum fluidum Boldo L. 71.
 Extractum fluidum corticis Gossypii L. 112.
 Extractum fluidum Grindeliae L. 114. R. 438, 440.
 Extractum Hamamelidis fluidum L. 116. R. 449.
 Extractum Hydrastis fluidum L. 125. R. 496, 497.
 Extractum fluid. Kavae L. 172.
 Extractum Piscidia fluid. L. 172. R. 727, 728.
 Extractum fluid. Quebracho L. 176.
 Extractum fluid. Ustilag. Maydis L. 200.
 Extractum Nucis vomicae. L. 159. R. 664, 665, 666.
 Extracta omnia l. a megfelelő drogue-ok ezimeí alatt.
 Extractum Opii L. 165. R. 689, 681. L. 116. R. 692.
 Extr. Punniciae Granati L. 113. R. 437.
 Extract. Quassiae L. 175.
 Extract. Ratanhae dep. L. 177. R. 744, 745, 746.
 Extract. Rhei L. 179. R. 756.
 Extract. Secalis cornuti siccum pro pulvere L. 185. R. 783, 784.
 Extract. Secalis cornut. spiss. pro solutione s. Ergotina L. 185. R. 781, 782, 785.
 Extract. Scillae L. 184. R. 777, 778.
 Extract. Syzigii Jambulani L. 194.
 Extract. Taraxaci L. 194.
 Extract. Trifolii febrini L. 198.
 Farina seminum lini L. 144.
 Farina seminum Sinapis L. 187.
 Fel tauri inspissatum L. 105.
 Ferratinum L. 106. R. 414, 428.
 Ferripyrinum L. 106.
 Ferrum carbonicum saccharatum L. 106. R. 404, 416.
 Ferrum lacticum L. 106. R. 405, 417—18.
 Ferrum natrio-pyrophosphoricum L. 106. R. 406.
 Ferrum oxydatum dialysatum solutum L. 106.
 Ferrum oxydatum sulfuricum solutum L. 107.
 L. 107.
 Ferrum pulveratum L. 106, R. 401.
 Ferrum reductum L. 106. R. 402, 403, 415.
 Ferrum sesquichloratum solutum L. 107. R. 410, 422—24.
 Ferrum sesquichloratum crystall. L. 107. R. 409.
 Ferrum sulfuricum oxydulatum L. 107. R. 411.
 Filicis Maris rhizoma. L. 110.
 Filum sericum antisepticum L. Acid. carbol.
 Flores Benzoës l. Acid. benzoicum.
 Flores salis ammoniaci martialis l. Ammonium chloratum ferratum.
 Flores Sulfuris l. Sulfur sublim. lot.
 Foeniculi fructus. L. 111.
 Formaldehydum solutum L. 111.
 Formanilidum L. 111.

- Fucus Carragaheen** l. Carragaheen.
Gallanolum L. 111.
Gallae L. 111.
Gaze carbolatum album Listeri L. Acid. carbol.
Gaze Hydrargyro-bichlorato-corrosivo impregnatum l. Hydrargyri praeparata.
Gaze Jodoformio impregnatum L. Jodoformium.
Gaze salicylatum L. 41.
Gelatina animalis albissima L. 111.
Gelsemii radix L. 111.
Gentianae radix L. 112. R. 432—33.
Glaubersò l. Natrium sulfuric. crystall 43.
Globuli Martiales. l. Ferrum.
Glycerinum L. 112.
Gossypium depuratum l. Lana Gossypii dep.
Gossypii herbacei radiceis cortex L. 112.
Granati Punicae radiceis cortex L. 112. R. 434—435.
Grindeliae herba L. 113. R. 439.
Guajacolum L. 114. R. 441—44.
Guajacolum carbonicum L. 115.
Guajacum L. 115.
Guarana L. 115. R. 445—46.
Gummi arabicum L. 115.
Gummigutti L. Gutti.
Gummi Kino l. Kino.
Guttapercha depurata L. 116.
Gutti L. 116. R. 447—48.
Gypsum ustum l. Calcium sulfuric. ustum.
Haemogallolum L. 116.
Haemolum L. 116.
Hamamelidin L. Hamamelin.
Hamamelin L. 117. R. 452.
Hamamiledis virginicae folia et cort.-radice L. 116. R. 451.
Haschisch purum L. 78.
Helleboreinum L. 118.
Hellebori viridis radix 117.
Helenin L. 117. R. 453, 454, 455, 456.
Hepar sulfuris l. Kalium sulfuratum pro balneo.
Hirudo medicinalis es H. officinalis L. 118.
Homatropinum l. Belladonna.
Homatropinum hydrobromicum L. 66. R. 225.
Homatropinum sulfuricum L. 66.
Hydraceticum l. Pyrocinum.
Hydrargyrum benzoicum oxydatum L. 122. R. 484, 485, 486, 487.
Hydrargyrum bichloratum ammoniatum L. 118. R. 457, 458.
Hydrargyrum bichlorat. carbamidat. solutum L. 123.
Hydrargyrum bichloratum corrosivum L. 118. 459, 460, 461, 462, 463, 464.
Hydrargyrum bijodat. rubrum L. 119. R. 465, 466.
Hydrargyrum carbolice L. 123. R. 488, 489.
Hydrargyr. carbolice. oxyd. l. Hydrargyrum carbolice.
Hydrargyrum chlorat. mite L. 119. R. 467, 468, 469, 470, 471.
Hydrargyrum cyanatum L. 119. R. 474.
Hydrargyrum diphenilicum l. Hydrargyr. carbolice.
Hydrargyrum formanidatum solut. L. 123.
Hydrargyrum imidosuccinicum L. 123. R. 490.
Hydrargyrum jodat. flavum. L. 119.
Hydrargyrum oxydat. flavum. L. 119. R. 472.
Hydrargyrum peptonatum L. 124.
Hydrargyrum purum L. 118.
Hydrargyrum salicylicum L. 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483.
Hydrarg. sublimatum l. Hydrarg. bichlorat. corrosiv.
Hydrargyrum sulfuratum rubrum l. Cinnabaris factitia.
Hydrargyrum-thymico-aceticum L. 124. R. 493, 494, 495.
Hydrargyrum tannicum oxydulat. L. 124. R. 491, 492.
Hydrargyrum-Zincum cyanatum L. 125.
Hydrastis canadensis rhizoma. L. 125.
Hydrastininum hydrochloricum L. 125. R. 498, 499.

- Hydrogenium hyperoxydatum L. 125.
 Hydromel infantum l. Senna.
 Hyosciami folia L. 125.
 Hyoscinaminum crystallisatum L. 126. R. 502.
 Hyoscinum hydrobromic. L. 126. R. 504, 505.
 Hyoscinum hydrochloricum L. 126.
 Hyoscinum hydrojodicum L. 126.
 Hypnalbum L. 127.
 Hypnonum l. Acetophenon.
 Ichtyocolla L. 127.
 Ichtyolum L. 127. R. 506, 507, 508, 509, 510, 511.
 Infus. laxativ. s. Aqua laxat. viennensis s. Infus. Sennae comp L. 186. R. 789, 791.
 Infus. Rheic. c. natrio-carbonico L. 179. R. 758.
 Inglavin L. 128.
 Ipecacuanhae radix L. 128. R. 513, 514, 515, 516, 517, 518.
 Iridis florentinae rhizoma L. 120.
 Jaborandi folia L. 129.
 Jalapae tuber L. 130. R. 522.
 Jecquirity semina L. 130.
 Jodoformium crystallisatum L. 130. R. 524, 525, 526, 527, 528, 529.
 Jodolum s. Tetrajodopyrol L. 131. R. 530, 531, 532, 533, 534, 535.
 Jodopyrinum L. 132.
 Jodium L. 132. R. 536, 537, 538, 539.
 Jodium trichloratum L. 133.
 Juniperi baccae L. 133. R. 542.
 Kalium acetic. solut. L. 133. R. 544, 545, 546.
 Kalium bromatum L. 134. R. 547, 548, 549, 550.
 Kalium carbonicum crudum L. 134.
 Kalium carbonic. purum L. 134.
 Kalium carbonicum solutum L. 134. R. 551, 552.
 Kalium chloricum L. 135. R. 554, 555, 556, 557.
 Kalium hydrooxydatum L. 135.
 Kalium hydrotartaricum L. 136. R. 558, 559, 560.
 Kalium hypermanganicum L. 136. R. 561, 62.
 Kalium jodatum L. 137. R. 563, 564, 565, 566, 567, 568.
 Kalium natrio tararicum L. 138. R. 569, 570.
 Kalium nitricum L. 138. R. 571, 572, 573.
 Kalium stibiato-tartaricum L. 138. R. 574, 575, 576, 577.
 Kalium sozodolum L. 188. R. 796, 797.
 Kalium sulfuratum pro balneo L. 139.
 Kalium sulfuricum L. 139. R. 578.
 Kalium tartaricum L. 139. R. 579.
 Kamala L. 140.
 Kamala depuratum L. 140. R. 580, 581, 582, 583.
 Kava-Kava l. Piper methysticum.
 Kephir L. 140.
 Kino L. 140.
 Kreosotum L. 141. R. 584, 585, 586, 587, 588, 589.
 Kumys L. 141.
 Kusseinum crystallisatum L. 142. R. 593.
 Kusso flores L. 141. R. 590, 591, 592.
 Lac sulfuris l. Sulfur praecipit.
 Lactophenium L. 142.
 Lactucarium germanicum L. 142. R. 594, 595.
 Lamina Guttapercha l. Gutta-percha.
 Laminaria L. 142.
 Lana Gossypii carbolata l. Acid. carbolic.
 Lana Gossypii depurata et a pinguedine liberata Brunsi L. 143.
 Lana Gossypii Hydrargyro bichlor. corros. impraegnata l. Hydrarg. bichlor. corrosiv.
 Lana Gossypii salicylata l. Acid. salicyl.
 Lanolinum L. 143. R. 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607.
 Lapis divinus l. Cuprum aluminatum.

- Lapis ophthalmicus l. Cuprum
 . aluminatum.
 Lichen Islandicus L. 141. R.
 608.
 Ligroïne l. Aether Petrolei L.
 46.
 Limonada solvens l. Potio Mag-
 nes. citricae effervescens.
 Linctus gummosus l. Gummi
 arabicum.
 Linimentum ammoniatum l.
 Ammonium készítmények.
 Linimentum saponato campho-
 ratum L. 77.
 Linimentum Styracis. l. Styrax.
 liquidus.
 Linimentum volatile l. Lini-
 mentum ammoniatum.
 Lini semina L. 144.
 Lipanin L. 145.
 Liquiritiae radix L. 145.
 Liquor acidus Halleri l. Acid.
 sulfur.
 Liquor Ammonii Acetici l.
 Ammoniumaceticum solutum.
 Liquor Ammoniae l. Ammonii
 caustici liquor.
 Liquor anodynus Hoffmanni l.
 Spiritus aethereus L. 46.
 Liquor cresoli saponatus L. 98.
 Liquor Ferri oxydati l. Ferri
 praeparata.
 Liquor hollandicus l. Aethyle-
 num chloratum L. 46.
 Liquor Kalii arsenicosi l. solu-
 tio arsenic. Fowleri.
 Lithargyrum l. Plumb. oxydat.
 Lithium carbonicum L. 145. R.
 609.
 Lithium citricum L. 145.
 Lithium iodatum L. 145.
 Lithium salicylicum L. 145. R.
 610, 611.
 Lobeliae herba L. 146.
 Loretinum L. 146.
 Losophanum L. 146.
 Lupuli glandulae L. 146. R. 613.
 Lycetolum L. 147.
 Lycopodium L. 147.
 Lysdinum L. 147.
 Lysolum L. 147.
 Magisterium Bismuthi l. Bismu-
 thum subnitricum.
 Magnesia usta l. Magnesium
 oxydatum.
 Magnesia usta in aqua l. Mag-
 nesium hydrooxydatum.
 Magnesium carbonicum hydro-
 oxydatum s. Magnesia carbo-
 nica L. 147. R. 614, 615, 616.
 Magnesium hydrooxydatum s.
 Magnesia usta in aqua L. 148.
 R. 617.
 Magnesium oxydatum s. Mag-
 nesia usta L. 148.
 Magnesium salicylicum L. 148.
 R. 618, 619.
 Magnesium sulfuricum L. 148.
 Malakinum L. 148.
 Malvae flores L. 148.
 Malvae folia L. 149. R. 620.
 Manganum hyperoxydatum L.
 149.
 Manna L. 149.
 Mannitum L. 149. R. 621.
 Mastiche L. 149. R. 622.
 Matiao folia L. 149.
 Mel crudum L. 149.
 Mel depuratum L. 149.
 Mel rosatum L. 149.
 Melissa folia L. 150. R. 623.
 Menthae folia L. 150. R. 623.
 Mentholum L. 150. R. 624, 625,
 626, 627. L. 151. R. 628, 629,
 630.
 Merc. praecipitatus albus l.
 Hydrarg. bichlorat corrosiv.
 Mercurius vivus l. Hydrargy-
 rum purum.
 Methacetin s. Acetanisidin L.
 151.
 Methylacetanilid l. Exalginum.
 Methylalum L. 151. R. 631, 632,
 633, 634. L. 152. R. 635.
 Methylenum bichloratum L. 152.
 Methylviolette l. Pyoktanin.
 Minium l. Plumb. hyperoxyd.
 rubrum.
 Miscella pro solutione Calcii
 oxysulfurati L. 152.
 Mixtura gummosa l. gummi
 arabicum.
 Mixtura oleoso-balsamica l.
 Balms. vitae Hoffmanni.
 Mollinum L. 152.
 Monochloraethan l. Aethylum
 chloratum L. 46.
 Monochloral-Antipyrin l. Hyp-
 nalum.
 Morphinum L. 164.

Morphinum hydrochlor L. 166.
R. 699, 701, 702. L. 167. R. 703,
704, 705, 706, 707.

Morrhuol L. 152.

Moschus L. 152. R. 636. L. 153.
R. 638.

Mucilago gummi arabici l.
Gummi arabicum.

Mydrinum L. 153.

Myrtilli fructus s. baccae L. 153.

Myrtolum L. 153. R. 639.

Naphtolum L. 154. R. 641, 642,
643, 644.

Naphtalinum purissimum L.
153. R. 640.

Naphtalolum l. Betolum.

Narceinum L. 167. R. 710.

Natrium aceticum crystallisa-
tum L. 154.

Natrium benzoicum L. 154.

Natrium bicarbonicum l. Nat-
rium hydrocarbonicum.

Natrium boracic. s. Borax ve-
neta L. 155. R. 645, 646.

Natrium bromatum L. 155. R.
647, 648.

Natrium carbonic. crystallisa-
tum L. 155.

Natrium caustic. solut. l. Nat-
rium hydrooxyd. solut L. 156.

Natrium hydrocarbonicum s.
bicarbonicum L. 155. R. 649,
650, 651, 652. L. 156. R. 653.

Natrium hydrooxyd. solut. s.
Natrium causticum solut L.
156.

Natrium jodatum L. 156.

Natrium nitricum L. 156.

Natrium nitrosum L. 156.

Natrium phosphoricum L. 156.
R. 654, 655. L. 157. R. 656.

Natrium salicylicum L. 157. R.
657, 658, 659, 660.

Natrium silicicum liquid L. 157.

Natrium sozodolum L. 188. R.
794, 795.

Natrium sulfuric. crystall. s.
Glaubersó L. 158. R. 661, 662.

Natrium tartaricum L. 153.

Neurodinum L. 158.

Nitroglycerinum L. 158.

Nosophenum L. 158.

Nux moschata L. 158.

Nux vomica L. 158.

Nutrose L. 159.

Oleum Amygdal. dulcium l.
Amygdalae dulces.

Oleum Anda-assu L. 161.

Oleum Anisi L. 159.

Oleum Aurant. cort. 159.

Oleum Cacao s. Butyrum Cacao
L. 161.

Oleum Cadinum s. Ol. Juniperi
empyreumaticum L. 162. R.
676, 677, 678, 679, 680.

Oleum Camphoratum l. Camp-
hora.

Oleum Cayrophill. L. 159.

Oleum Cinnamomi Cassiae L.
91.

Oleum Citri L. 91.

Oleum Crotonis l. Crotonis se-
mina.

Oleum Eucalypti amygdali-
num l. Eucalypti folia.

Oleum Fagi empyreumaticum
s. Pix Fagi liquida s. Bitu-
men Fagi l. Pix liquida.

Oleum Foeniculi L. 159.

Oleum Gaultheriae L. 160. R.
668, 669.

Oleum Hyosciami folior. coc-
tum l. Hyosciami folia.

Oleum Jecoris Aselli flavum
L. 162. R. 681.

Oleum Juniperi L. 160. R. 670,
671.

Oleum Juniperi empyreuma-
tic. l. Oleum Cadinum.

Oleum lavandulae L. 160.

Oleum Lauri L. 163.

Oleum Lini lot. et venal. l.
Lini semina.

Oleum Macidis L. 160.

Oleum Majoranae L. 160.

Oleum Martis l. Ferrum ses-
quichloratum solutum.

Oleum Menthae crispae L. 160.

Oleum Pini silvestris pro inha-
latione L. 160.

Oleum Ricini L. 163. R. 682,
683, 684.

Oleum Rosae L. 160.

Oleum Rosmarini L. 160.

Oleum Rusci rectif. s. Pix li,
quida betulina L. 163. R. 685,
686.

Oleum Santali ligni L. 160.

Oleum Sesami L. 164.

Oleum Sinapis aetherum L. 160.

- Oleum Succini rectific. L. 161.
 Oleum Terebinthinae rectific. L. 161.
 Oleum Valerianae L. 161.
 Ononidis spinos. radix L. 164. R. 687.
 Opium L. 164, 165. R. 688. 690.
 Opodeldoc. l. Liniment. saponato-camphor.
 Orexinum hydrochloricum L. 158. R. 712, 713.
 Ovarium készítmények L. 168.
 Oxychloridum Ferri solutum l. Liquor Ferri oxydati.
 Oxyssel Scillae l. Scilla.
 Oxyssel simplex L. 168.
 Pancreatinum L. 168.
 Pannae s. Uncomocomorhizoma L. 168.
 Papainum L. 168. R. 714, 715.
 Papaveris somnifer. capsulae s. capita L. 169.
 Parabromacetanilid l. Antisepsin.
 Paraffinum L. 169.
 Paraffinum liquidum 169.
 Paraldehydum L. 169. R. 716, 717.
 Pasta Guarana l. Guarana L. 169.
 Pelletierinum l. Granati Punicae Cort.
 Pelletierinum sulfuricum L. 113.
 Pelletierinum tannicum L. 113. R. 436.
 Pepsinum german. solubile L. 170. R. 718, 719, 720, 721.
 Petroleum rectific. L. 170.
 Phenacetinum l. Acetphenetidin.
 Phenocollum hydrochloricum L. 170.
 Phenolum l. Acid. carbolicum.
 Phenylurethan l. Euphorinum.
 Phosphorus L. 171. R. 722, 723, 724.
 Physostigminum salicylicum L. 171.
 Picrotoxinum L. 171. R. 725, 726.
 Pilocarpinum hydrochlor. lásd Jaborandi flora.
 Pil. Blancardi l. Pilulae ferri jodati.
 Pilulae ferratae l. Ferri praeparata.
 Pilul. Ferri jodati l. Ferri praeparata.
 Pilul. laxantes l. Aloë.
 Piperazinum hydrochlor. L. 172.
 Piper methysticum s. Cava-Cava s. Kava-Kava L. 172.
 Piscidae erythrin. cortex L. 172. R. 729.
 Pix Fagi liquida l. Pix liquida.
 Pix liquida L. 173. R. 731, 732.
 Pix liquida betulina l. Ol. Rusci rectific.
 Placenta seminum lini l. Farina seminum lini.
 Plumbum acetic. depurat. s. Saccharum Saturni L. 173. R. 734, 735. L. 174. R. 736, 737.
 Plumbum acet. basic. solut. L. 173.
 Plumbum carbonic. s. Cerussa L. 174.
 Plumbum hyperoxyd. rubrum. s. Minium L. 174.
 Plumbum oxydatum s. Lithargyrum L. 174.
 Po de Bahia l. Araroba.
 Podophyllum L. 174. R. 738, 739. L. 175. R. 740.
 Potio Magnes. citric. effervesc. s. Limonada solvens L. 175.
 Potio Riveri l. Kalium carbon.
 Pulpa prunorum L. 175.
 Pulpa Tamarindorum l. Tamarindus.
 Pulvis Goa l. Araroba.
 Punica Granat. l. Granati Punic. cort. rad.
 Pulvis gummosus l. Gummi arab.
 Pulvis Ipecacuanhae cum Opio l. Opium.
 Pulvis aëroph. Seidlitz. L. 175.
 Pulvis Doveri l. opium.
 Pyridinum L. 175.
 Pyrogallolum l. Acid. pyrogall.
 Pyoktanin s. Methylviolette L. 175.
 Quassiae lignum L. 175.
 Quebracho Cortex L. 175.
 Quercus Cortex L. 176.
 Quillajae Cortex L. 176 R. 741, 742.
 Ratanhae radix L. 177. R. 743.
 Resina Jalapae L. 180. R. 523.
 Resina Pini burgundica L. 177.
 Resorbinum L. 177.

- Resorcinum L. 178. R. 750, 751.
 Rhei radix L. 178. R. 752, 753, 754, 755.
 Ricini semina L. 179.
 Roob Juniperi L. 133. R. 543.
 Roob Sambuci L. 182.
 Rosae petala L. 179.
 Rosmarini folia L. 179.
 Rubidium ammonium-bromid. L. 179. R. 759, 760.
 Sabadillae semina L. 179.
 Sabinæ summitates L. 180.
 Saccharum album L. 180.
 Saccharum lactis L. 180.
 Saccharinum L. 180. R. 761, 762, 763, 764.
 Saccharum Saturni l. Plumb. acet. depurat.
 Sal Alembrothi s. Ammonium higanychlorid. L. 180.
 Sal ammoniacum depur. lisd Ammonium chloratum.
 Sal thermarum Carolinar. l. Natrium sulfuric.
 Sal-Seignetti l. Kalium natrio tartaricum.
 Salacetolum L. 181.
 Salep tubera L. 181. R. 765, 766.
 Salicylamidum L. 181.
 Salipyrin L. 181.
 Salmiak l. Ammonium chloratum.
 Salolum L. 181. R. 767, 768. L. 182. R. 769, 770, 771, 772, 773.
 Salophenum L. 182.
 Salvinae folia L. 182.
 Sambuci cymae s. flores L. 182.
 Sambuci fructus L. 182.
 Santali ligni ol. l. Oleum Santali ligni.
 Santoninum L. 90. R. 335, 336, 337, 338.
 Sapo albusissimus drogistarum L. 182.
 Sapo kalinus albus L. 182.
 Sapo kalinus venalis s. viridis L. 183.
 Sapo medicinalis s. amygdalinus L. 183.
 Sapo Picis L. 183.
 Sapo sulfuratus L. 183.
 Sapo venetus L. 183.
 Sarsaparillae radix L. 183. R. 774, 775.
 Scillae bulbus L. 183.
 Scilla siccata L. 184. R. 776.
 Scopolaminum hydrobromicum L. 184.
 Sebum ovile L. 184.
 Secale cornutum L. 184.
 Senegae radix L. 185. R. 786, 787.
 Sennae folia L. 786. R. 788.
 Serum antidiphtheriticum s. Diphtheria-antitoxin L. 186.
 Serum lactis Commune L. 187.
 Sinapis semina L. 187.
 Solutio arsenicalis Fowleri L. 32. R. 18, 19, 20.
 Solutio Calcii oxysulfurati s. Solutio Vlemingx L. 152.
 Solutio Vlemingx L. 75. R. 264.
 Somatose L. 188.
 Sozodolum L. 188.
 Sparteinum sulfuricum L. 189. R. 798, 799, 800.
 Species Althaeae L. 49.
 Species amaricantes L. 159.
 Species laxant. St. Germain L. 186.
 Sperma Ceti l. Cetaceum.
 Sperminum L. 189.
 Spiritus s. spiritus vini L. 189.
 Spiritus aethereus s. Liqueur anodynus Hoffmanni L. 46.
 Spiritus Aetheris L. 189.
 Spiritus Aetheris chlorati L. 189.
 Spiritus Aetheris nitrosi L. 189.
 Spiritus aromaticus L. 189.
 Spiritus camphoratus L. 77.
 Spiritus Cochleariae L. 189.
 Spiritus dilutus L. 189.
 Spiritus Ferri sesquichlorati aethereus L. 107. R. 426.
 Spiritus Formicarum L. 190.
 Spiritus Mindereii l. Ammonium aceticum solum.
 Spiritus salis ammoniaci anisatus l. Ammonii anisati liquor.
 Spiritus saponatus L. 190.
 Spiritus saponis kalini L. 190.
 Spiritus sinapis L. 188.
 Spiritus Vini gallici l. Cognac.
 Spongia pressa L. 190.
 Stibium sulfurat. aurant s. Sulfur aurat. antimon L. 190. R. 801, 802, 803.

- Stibium sulfurat. nigrum L. 190.
 Stibium sulfurat. rubrum L. 190.
 Stigmata Maydis L. 190.
 Strophanti hispidi semina L. 190.
 Strychninum nitricum L. 159. R. 663.
 Styrax liquid. dep. L. 191.
 Succus Liquiritiae venalis L. 145.
 Succus Liquiritiae depuratus L. 145.
 Sulfaminolum L. 191.
 Sulfonal L. 192. R. 808, 809, 810, 811.
 Sulfur aurat. Antimon. l. Stibium sulfurat. Antimon.
 Sulfur praecipit. s. Lac sulfuris L. 192. R. 812, 813.
 Sulfur sublimatum L. 193.
 Sulfur sublinat. lot. s. Sulfur depurat. s. Flores Sulfuris L. 191. R. 815, 816.
 Syrupus Althaeae L. 49. R. 112.
 Syrupus amygdalinus L. 55.
 Syrup. capillor. Veneris L. 193.
 Syrupus Cinnamomi L. 91.
 Syrupus Citri L. 193.
 Syrup. Cort. Aurant. L. 193.
 Syrupus Diacodii L. 193.
 Syrupus Ferri-jodati L. 107, 412, 425, 427.
 Syrupus Jpecacuanhae L. 193.
 Syrupus Liquiritiae L. 145.
 Syrupus mannatus s. Syrupus Sennae c. Manna l. Syrupi omnes.
 Syrup. Mororum L. 193.
 Syrupus Rhei L. 178.
 Syrupus Rubi Idaei L. 194.
 Syrup. Senegae L. 194.
 Syrup. simplex L. 194.
 Syzgium Jambolanum. Jambul. L. 194.
 Tamarindor. pulpa L. 194. R. 813.
 Tannalum solubile L. 194.
 Tannigenum L. 194.
 Tanninum l. Acid. tannicum.
 Tanninum l. Acid. tannic.
 Taraxaci rad. et folia L. 194.
 Tartarus depuratus l. Kalium hydrotartar.
 Tartarus emeticus l. Kalium stibiato-tartaricum.
 Tartarus natronatus l. Kalium natrio-tartaricum.
 Tela sericea protegens l. Acid. carbonic.
 Terebinthina communis L. 194.
 Terebinthina veneta L. 195.
 Thermodinum L. 196.
 Terpinol L. 195. R. 818, 819.
 Terpinum hydratum L. 195. R. 820, 821, 822.
 Tetronalum L. 196.
 Thallinum sulfuricum L. 196. R. 823, 824.
 Thallinum tartaricum L. 196.
 Theobrominum natrio-salicyl. s. Diuretinum L. 196. R. 825, 826.
 Thioform L. 197.
 Thiophenum bijodatum L. 197.
 Thilapinum L. 197.
 Thymolum L. 197. R. 831, 832.
 Thyolum L. 197.
 Thyolum liquidum L. 197. R. 827, 828, 829.
 Thyolum siccum L. 197. R. 830.
 Thyreoidea készítmények L. 198.
 Tiliae flores L. 198.
 Tinctura Absinthii composita L. 30. R. 2.
 Tinctura Aconiti L. 44.
 Tinctura Aloës L. 48. R. 109.
 Tinctura amara L. 198.
 Tinctura Arnicae L. 63. R. 197.
 Tinctura Belladonnae L. 66. R. 219, 221.
 Tinctura benzoës L. 68. R. 226, 227.
 Tinctura Boldo L. 71.
 Tinctura Cannabis indicae L. 78. R. 281.
 Tinctura Cantharidum L. 79. R. 285.
 Tinctura Cascarillae L. 81. R. 292.
 Tinctura Castorei L. 81. R. 296, 297.
 Tinctura Chinae simplex L. 84.
 Tinctura Chinae composita L. 84. R. 308, 310.
 Tinctura Cinnamomi L. 91.
 Tinctura Colchici seminum L. 94. R. 355.
 Tinctura Colocynthidum L. 95. R. 359.

- Tinctura Convallariae majalis L. 97. R. 365.
 Tinctura Coto L. 97. R. 366.
 Tinctura Digitalis L. 101. R. 388, 389, 390.
 Tinctura Eucalypti L. 104. R. 393.
 Tinctura Ferri acetici aetherea L. 107.
 Tinctura Ferri pomati l. Tinctura malatis Ferri.
 Tinctura Gallarum L. 111.
 Tinctura Gelsemii L. 111. R. 431.
 Tinctura Guajaci resinae L. 115.
 Tinctura Hamamelidis L. 117. R. 450.
 Tinctura Ipecacuanbae L. 123.
 Tinctura Jodi L. 132. R. 540, 541.
 Tinctura Lobeliae L. 146. R. 612.
 Tinctura malatis Ferri L. 107. R. 408, 421.
 Tinctura moschi L. 152. R. 637.
 Tinctura nervino-tonica Bestucheffi l. Spiritus Ferri sesquichlorati aethereus.
 Tinctura Nucis vomicae L. 159. R. 667.
 Tincturae omnes L. 198.
 Tinctura Opii simpl. L. 166. R. 694, 695.
 Tinctura Opii crocata L. 166. R. 693, 695.
 Tinctura Piscidiaae L. 171. R. 730.
 Tinct. Ratanhae L. 177. R. 747, 748, 749.
 Tinct. Rhei Darelli s. vinosa L. 179. R. 757.
 Tinctura roborans Whyti l. Tinctura Chinae composita.
 Tinctura Stramonii L. 100.
 Tinctura sem. Strophanthi L. 191. R. 804, 805, 806, 807.
 Tinct. Valerian. aetherea L. 201. R. 843.
 Tinct. Valerian. spirituos L. 201.
 Tinctura Zingiberis L. 206.
 Tragacantha L. 198.
 Tricresolum L. 98.
 Trifolii febrini folia L. 198.
 Trionalum L. 198.
 Tropacocainum hydrochloricum L. 198.
 Tubuli praeparati carbolati Acid. carbolic.
 Tumenolum venale L. 199. R. 833, 834.
 Tussolum L. 199. R. 835.
 Uncomocomo rhiz. l. Pannae Unguent. ad scabiem l. Ung. sulfurat,
 Unguent. album l. Unguentum Cerussae.
 Unguent. aromatic. L. 199.
 Unguent. Autenriethi l. Kalium stibiato-tartaric.
 Unguent. Cerussae l. Plumb. carbonic.
 Unguentum cinereum l. Unguentum Hydrargyri.
 Unguent. contra decubitus l. Ung. Plumb. tannic.
 Unguent. contra pediculos l. Ung. Sabadillae.
 Unguent. diachyl. dr. Hebra l. Plumb. oxydat.
 Unguent. enolliens s. Crème céleste L. 199.
 Unguent. Glycerini L. 199.
 Ung. Hydrargyri l. Hydrargyrum.
 Ung. jodat. l. Jodum.
 Ung. Kalii jodat. l. Kalium jodat.
 Unguentum Paraffini L. 169.
 Ung. Plumb. acet. l. Plumb. acetic.
 Ung. Plumb. tannic. s. Ung. contra decubitus L. 200.
 Ung. rosatum L. 200.
 Ung. Sabadillae L. 200.
 Ung. simplex L. 200.
 Ung. sulfurat. l. Sulfur. sublimat. lotum,
 Ung. Zinci oxydat. l. Zincum oxydat.
 Urethnum L. 200. R. 836, 837, 838, 839.
 Ustilago Maydis L. 200.
 Uvae Ursi folia L. 201. R. 840.
 Valerianae radix L. 201. R. 812, 844, 845.
 Vaseline L. 202.
 Veratrinum L. 202. R. 846, 847, 848.
 Vinum Cascarae sagradae L. 80. R. 289.
 Vinum Chinae L. 84.

- Vinum Colchici** L. 94. R. 356.
Vinum Condurango L. 96.
Vinum Huxhami L. **Vinum stibiato-tartaricum**.
Vinum malagense L. 202.
Vinum Pepsini L. 169.
Vinum stibiato-tartaricum L. 188.
Vinum Tokajense L. 202.
Xylolum L. 203. R. 849, 850, 851, 852.
Zedoariae rhizoma L. 203.
Zincum aceticum L. 203. R. 853, 854.
Zincum chloratum L. 204. R. 855, 856, 857, 858.
Zincum oxydatum s. Flores Zinci L. 204. R. 859, 860, 861, 862. L. 203. R. 863, 864, 865.
Zincum sulfo-carbolicum L. 205.
Zincum sulfuricum L. 205. R. 866, 867, 868, 869. L. 206. R. 870, 871.
Zincum valerianicum L. 206. R. 872, 873.
Zingiberis rhizoma L. 206.



HASZNÁLAT SZERINTI TÁRGYMUTATÓ.

(A számok a megfelelő vényeket jelzik.)

- Abscessus pulmon.** 40.
Álmatlanság 152.
Alopecia 285.
Anacmia 318, 323.
Amenorrhoea 178.
Angina catarrhalis 109.
Angina tonsill. 369.
Ascaris 338.
Asthma nervosum 17, 438, 440, 565, 638, 549.
Atonia ventriculi 423.
Atonicus fekélyek 67.
Bélhurut 90, 640, 662, 746, 747.
Bélhurut idült 446.
Bélvérzés 129.
Bronchiectasia 91.
Bronchitis capillaris 134.
Bronchitis foetida 39, 40, 91, 394, 130, 639.
Cachexia malarica 421.
Cardialgia 234, 341.
Caries dentium 34.
Catarrhus bronch. 111, 145, 146, 147, 194, 280, 281, 514, 651, 652, 822.
Catarrh. bronch. chron. 439, 608.
Chlorosis 19, 318, 323, 15, 105, 145, 146, 415.
Cholera 275, 276.
Cholera infantum 587.
Chorea 18, 21, 204, 860, 873.
Colica 334.
Colica saturnina 227.
Collapsus 195, 196.
Conjunctivitis catarrh. 113, 80, 734, 866.
Coryza 42, 347.
Croup 178.
Csillapíthatlan hányás 541.
Cystitis 186, 61, 675.
Delirium tremens 135, 136.
Diabetes insipidus 20, 711.
Diabetes mellitus 18, 45, 54, 223, 529, 690, 761, 762.
Diarrhoea 85, 87, 120, 122, 233, 235, 236, 237, 240, 242, 244, 245, 265, 266, 267, 293, 299, 300, 514, 667, 689, 693 736, 743, 744.
Diphtheritis 36, 52, 180, 422, 474, 520, 630, 669.
Dysenteria catarrh. 124, 125, 187.
Dysenteria chronica 423.
Dysmenorrhoea 173.
Dyspepsia 51, 55, 175, 176, 181.
Dyspepsia acida 653.
Dyspepsia acuta 684.
Dyspepticus hasmenés 292.
Eclampsia 549, 638, 861, 863.
Eczema 508, 679, 65, 66, 64, 177, 768, 67.
Égési seb 192, 177.
Enteritis follicularis 423, 191.
Enuresis nocturna 216.
Epekökölika 95.
Epilepsia 547, 550, 218, 223, 854, 872, 135, 136, 157, 759, 860.
Erysipelas 36.
Excitantia 25, 27.
Excoriatio 177.
Expectorantia 513, 517, 552, 23, 26.
Fagydaganatok 58, 128.
Favus 677.
Febris intermitt. malarica 312, 313, 315, 319.
Flour albus 379.
Gangraena pulmonum 39, 40, 130, 394, 639.
Gastralgia 345.
Gingivitis ulcerosa 749.
Gonorrhoea 478, 481, 487, 123, 127, 215, 675, 853, 823, 735, 867, 868, 869, 251.
Göresös köhögés 342.
Gümös gégefekélyek 53.
Gyomorhurut 56, 662, 664, 753.
Gyomorvérzés 129.
Haematemesis 736.
Haematuria 784.
Haemoptoe 120, 129, 784, 674, 736.
Herpes tonsurans 30, 677.
Hólyaggöres 215.
Húgyhomok 650, 655, 656.
Hyperemesis 629, 341, 345.

- Hyperhydrosis 382, 641, 726,
 Hysteria 862, 872.
 Hystero-epilepsia 135, 136, 296,
 343.
 Haemophilia 78.
 Hajhullás 89, 212.
 Hemicrania 11, 445, 334, 349,
 98, 99.
 Hydrocele 538.
 Ichthyosis 15—65.
 Icterus 559—60, 649, 817, 752,
 754, 755.
 Icterus cum obstipatione 107.
 Idült bőrbajok 18, 19.
 Impotentia 665.
 Intermittens malarica 15.
 Intertrigo 859, 865.
 Insomnia 760.
 Izgatott köhögés 279, 150.
 Köptető 112.
 Köszvény 650, 655.
 Laryngitis catarrh. 870.
 Laryngitis crouposa 464.
 Lábizadás 69.
 Láz 59.
 Lupus 62.
 Lymphoma 18.
 Lymphoma malignum 15.
 Lymphosarcoma 18.
 Malaria 18.
 Méhszáji erosiók 81.
 Meningitis basilaris 568.
 Menorrhagia 499, 785, 60.
 Metrorrhagia 499, 60, 785, 79.
 Morbus Brighti 88.
 Morb. maculos. Werlhofi 304,
 77.
 Nephritis scarlatinosa 424, 86.
 Neuralgia 11, 18, 92, 431, 628,
 315, 33.
 Neuralgia trigemini 99.
 Obstipatio 290, 291, 614, 615,
 616, 621.
 Obstipatio habitualis 105, 395,
 523, 813.
 Oedema pulmon, 194.
 Oligaemia 426.
 Omphalitis 72.
 Ozaena 794.
 Palpitatio cordis nervosa 388.
 Phagedaenicus fekély 63.
 Phthisis 311, 320, 488, 489.
 Phthisicusok éjjeli izzadása 69,
 223.
 Phthisicusok hasmenése 121,
 239.
 Phthiriasis 370.
 Pneumonia catarrh. 134, 140.
 Polyarthritus rheumatica 41,
 73, 618, 619, 658, 668.
 Prolapsus ani 666.
 Prostatitis 215, 691.
 Prurigo 44, 678.
 Pruritus 119, 332, 768, 859.
 Psoriasis 15, 44, 62, 61, 686.
 Putrid sebek 305.
 Pyrosis 257, 650.
 Rachitis 417, 258, 261, 263, 723,
 724.
 Rheumatismus 628, 331.
 Salivatio 223.
 Scabies 228, 370, 644, 731, 815,
 816.
 Scorbut 304.
 Serophulosis 18, 418, 425, 427.
 Serophulosis torpida 568.
 Seborrhoea 227.
 Soor 645.
 Spasmus glottidis 200.
 Stenocardia 157.
 Stomatitis 557, 563.
 Stomatitis aphthosa 179, 646.
 Stomatitis catarrhalis 109.
 Syphilis 468, 528—29, 566.
 Syphilis congenita 469—70.
 Syphiliticus fekélyek 461, 476,
 480, 566.
 Tabes dorsalis 205.
 Taeniák 333, 377.
 Tenesmus 215, 339, 343, 691,
 695.
 Tengeri betegség 334.
 Tic douloureux 249.
 Trichinosis 229.
 Tussis convulsiva 165, 221, 393,
 346, 449, 621, 710, 835.
 Tuberculosis 18.
 Tuberculosis pulmonum 411,
 442.
 Typhus abdominalis 241, 618,
 619.
 Tyukszem 68.
 Ulcus umbilici 70.
 Ulcus ventriculi 234, 242.
 Vesevérzés 120.
 Vulvitis diphtheritica 253.

TARTALOM.

	Lap.
Előszó az V-ik kiadáshoz	3
Vényszerkesztési jegyzetek	5
Némely mértékről	11
Cseppek súlya	11
Czélszerűtlen és veszélyes gyógyszerkeverékek	12
Fürdők. Mesterséges fürdők	14
Bőr alá fecskendésre használt szerek oldatai	15
Belégzésre használt szerek oldatai	17
Gyermekgyógyászati gyakorlatban fontosabb szerek adagai	18
Legnagyobb adagok táblázata M. Gyk. II. kiad.	27
Legnagyobb adagok a M. Gyk. II. kiad. Pótfüzetében	28
Legnagyobb adagok táblázata M. Gyk. I. kiad.	29
Vénygyűjtemény	30
Betegrek asztala	207
Üdülők étrendje	207
Heveny lázas betegek étrendje	207
Idült lázas betegek, főleg tüdővészések étrendje	208
Heveny gyomor és bélhurutban szenvedők étrendje	209
Idült gyomorbántalmakban szenvedők étrendje	209
Diarrhoea chronicában szenvedők étrendje	211
Szokványos székszorulásban szenvedők étrendje	211
Scorbutban szenvedők étrendje	211
Köszvényes bántalmakban szenvedők étrendje	211
Diabetes mellitusban szenvedők étrendje	212
Lipomatosisban szenvedők étrendje	213
Weir-Mitchell-féle hizlaló gyógymód	214
Az egészséges és beteg gyermek étrendje dr. Bókai János egyet. tanártól	215
Tápanyagok és élvezeti anyagok értéke	219
Heveny mérgezések tüneteiről és kezeléséről	227
Gyógyhelyek és gyógyvizek átnézete	235
Gyógyszerek tárgymutatója	249
Használat szerinti tárgymutató	264

Dr. med. Hommel-féle

 Hämatogen

(Haemoglobinum depuratum sterilisatum
liquidum. D. R.-Pat. Nr. 81,391.) 70,0.

Izjavítónak : Glys. puriss. 20,0. Vini malag. 10,0.

A legkötelesebb valamennyi hämoglobin-készítmény közt. Hatásra nézve felülmúl minden csukamájolaj- és vaskészítményt. Rendkívüli erősítő szer gyermekeknek s felnőtteknek. Erélyes vértképző. Hatásos étvágygerjesztő. Az emésztést erősen elősegíti.

■ Nagy sikerek rachitisnél, görvélynél, általános gyöngeségnél, vérszegénységnél, szív- és ideggyengeségnél, üdülőkénél (Pneumonia, Influenza stb.) Kiváltképen hatásos a tüdő megbetegedéseinél mint erősítő gyógymód.

Kitünő íze van. Gyermekek is szívesen veszik. Adagok : csecsemőknek 1—2 kávéskanállal tejben (langymelegen); nagyobb gyermekeknek 1—2 kávéskanállal (tisztán). Felnőtteknek 1—2 evőkanállal naponta, tekintettel sajátos erélyes étvágygerjesztő tulajdonságára, az evés előtt. Kísérleti adaggal a t. orvos urak részére ingyen és bérmentve szívesen szolgálunk.

Egy eredeti üveg (250 gr.) ára 2 forint 0. é.

Raktárak a gyógyszertárakban.

NICOLAY és TÁRSA vegyészeti-gyógyszerészeti laboratorium

Zürich és Hanau M/m.

Syr. Hypophosph. Comp. Fellows.

Tartalmazza az emberi szervezet leg-
lényegesebb elemeit:

Kaliumot és meszet.

Élénnyítő hatányokat, vasat és magnant.

Zsongítókat, chinint és strychnint.

Agytápláló hatóanyagot, phosphort, gyenge
alkalikus hatással.

Hatásában minden mástól különbözik, a
mennyiben igen alkalmas légzés útján való élénnyü-
lésre, kellemes ízzel bír, könnyen tűri a gyomor
és huzamos használata sem hátrányos.

Kitünő hírnek örvend, kiváltkép tüdőgümőkór,
idült hörghurut és a légzőszervek egyéb bántal-
mainak gyógykezelésénél. Sikerrel alkalmazzák
különböző idegbetegségnél és senyves álla-
potknál.

Gyógyereje főleg izgató, zsongító és tápláló hatá-
sainak tulajdonítható, melyek folytán a külön-
böző szerveket regenerálja.

Hatása azonnali, élénkíti az étvágyat és emész-
tést, elősegíti az áthasonítást és a tápanyagokkal
együtt jut a vérkeringésbe.

A jólét érzetét kelti föl s megszünteti a levertséget és búskomorságot, azért nagy becses hír agy- és idegbántalmak gyógykezelésénél. Nagyfokú zsongító hatásánál és az elválasztások egészséges lefolyására gyakorolt kedvező befolyásánál fogva, a betegségek egész soránál javálva van.

Jegyzet. — Óvás.

A Fellows-féle Hypophosphit szörp sikerei sokakat ösztönöztek utánzásra. Fellows megvizsgálván néhányat ezek közül, nem talált két azonos összetételűt sem, mind különböztek a valóditól összetételükben, savmentességre, oxigén hatása iránti fogékonyságukra nézve, midőn hőnek vagy világosságnak tétetnek ki, s végül azon tulajdonságban, hogy a **strychnint oldatban** nem képesek megtartani, továbbá gyógyhatásukra nézve.

Fellows ennél fogva ajánlja, hogy syrupját a valódi üvegekben rendeljék (500 grammos üveg 3 frt 50 kr., 250 grammos 2 frt), midőn is a megkülönböztető jelek a felcserélést kizárják.

Felcserélés vagy tévedés elkerülése czéljából, a rendelésnél kéretik „**Syr. Hypophosph. Fellows**” nevet írni.

Orvosoknak mintaüvegek ingyen.

Magyarországi főraktár:

TÖRÖK JÓZSEF GYÓGYSZERTÁRÁBAN,
Budapesten, Király-utca 12.

Tannalbin

*javalva felnöttek és gyermekek heveny vagy idült
Enteritidise minden alakjánál.*

A Tannalbint minden hozzáadás nélkül poralakban
rendelik :

felnötteknek	1·0 pro dosi	az 1-ső napon 3—5- szór naponta egy órányi időközökben, a 2., esetleg további napokon az egész napra elosztva.
nagyobb gyermekeknek	0·5—1·0 - "	
csecsemőknek	0·25—0·5 " "	

*Gyermekeknél nyálkás vívőszerben, szörpben,
mézben stb. eldörzsölve. Tej hozzáadása a por
könnyűsége folytán kevésbé alkalmas.*

Elégtelen hatás esetén gyorsan fokozható, így bél-
hurutnál 24 óra mulva pro dosi 2·0-ig és pro die
10·0-ig lehet emelni felnötteknél.

Lásd a szakvéleményeket :

Dr. Engel primariustól, Brünn
(D. Med. Wochenschrift 1896. Nr. 11.)

Dr. Vierort tanártól, Heidelberg
(D. Med. Wochenschrift 1896. Nr. 25.)

Dr. Holzapfel K.-tól, Strassburg
(D. Med. Wochenschrift 1896. Nr. 50.)

Dr. Rey J. G.-tól, Aachen
(D. Med. Wochenschrift 1897. Nr. 3.)

Scognamiglio tanártól, Nápoly
(D. Med. Wochenschrift 1897. Nr. 2.)

A Tannalbin tökéletes ártalmatlansága mellett akár
adagolt porban, akár dobozban késhegyenkint való
bevételre rendelhető.

Knoll és Társa, Ludwigshafen a. Rh.

Codein-Knoll

javalva Morpium helyett Bronchitisnél és különböző eredetű köhögésnél, e szerint nélkülözhetlen phthisikusoknál, továbbá mint szelíd narcoticum álmatlanságnál.

Codein-Syrup

Rp. Codein-Knoll	0·2	Rp. Cod. phosph. Knoll	0·2
Spir vini	5·0	Spir. vini	5·0
Syr simpl. ad.	100·0	Syrup. simpl. ad	100·0

10 ccm. = 2 centigr. Codein.

Diuretin-Knoll

kitünő diureticum, cardialis Asthmánál is Angina pectoralisnál is javalva.

Rp. Diuretin-Knoll	5—7·0	Rp. Diuretin-Knoll	5—7·0
Aquae dest ad	100·0	Aquaementh. pip.	100·0
		Syrup. simp.	10·0
		Aquae dest. ad	200·0

Egy nap alatt elhasználni.

A zürichi klinika rendelése	}	Rp. Fol digital pulv.	0·1
		Diuretin-Knoll	1·0
		Sacchari albi	0·3
		M. F. pulv. D. t. dos. Nr. X.	
		S. 3-szor naponta 1 port.	

Knoll és Társa, Ludwigshafen a. Rh.

Török József gyógyszerháza, Budapest, Király-utca 12.

NUTROSE

(Casein Natrium) szabadalmazva és a név védve
új tápkészítmény

túlnyomólag olcsóbb, mint a fejtérje pótlására
eddig használt készítmények.

Nutrose a tej fejtérje anyaga, tiszta és minden
hozzáadástól mentes.
Nutrose ugyanoly táperővel bír, mint a hús
fejtérje-testei.
Nutrose könnyen oldható, könnyebben és töké-
letesebben emésztetik meg, mint a hús.
Nutrose igen alkalmas a gyomor és belek meg-
betegedéseinek a betegek táplálására.
Nutrose igen alkalmas üdülők, sapkórosak és
görvélyesek erőteljes táplálására.
Nutrose igen alkalmas táplálkozásra a bélben és
gyomorban végzendő műtétek előtt és után.
Nutrose a gyermekek táplálására és erősítésére
legkiváltképen ajánlatos.

Klinikai és kísérleti vizsgálódások a Nutroso, illetőleg Casein
táptértékére nézve:

Salkowsky E. tanár, Berlin, klin. Wochenschrift, 1891 No. 47.

Röhmnn F. tanár, ugyanott, 1895 No. 24., 519. lap.

Marcuse G., Pflüg. Archiv 1896.

Dr. Bernstein—Landeck K., Deutsche Medicinalztg. 1896
No. 41. 454. old., Allg. Centralztg. 1896 No. 60., 724. old.,
No. 65. és 66.

Stüve R. (Noorden tanár osztályán), Berliner klin. Wochenschrift 1896, No. 20. 429 old.

Irodalom és próbák a **NUTROSE**-ból
kísérleti célokra az orvos uraknak rendelkezésre
állanak.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M.

Török József gyógyszerháza, Budapest, Király-utca 12.

Dr. Overlach-féle Migränin.

Oroszlánjegy.

(Citromsavas Antipyren-Coffein.)

1. Kitünőnek bizonyult a Migrän legsúlyosabb eseteiben, továbbá alcohol-, nicotin- és morphium-mérgezésből eredő fejfájásnál, neurastheniánál, influenzánál, grippenél stb. stb.

2. Legjobb Antipyreticum fenyegető collapsusnál is, mert a Migränin Coffein tartalma egyidejűleg mint Analepticum kitünően bat.

 Csak Dr. Overlach-féle oroszlánjegyű Migränin használható és a recepten mindig „Migränin Höchst” irandó.

Legjobb közepadag felnőtteknél 1—1 gramm naponta egyszer vagy többször porban vagy oldatban.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M.

Argonin

bevált szer Gonorrhoea ellen.

Az Argonint egész sora a kitünő dermatologusoknak megvizsgálta. Ez az egyetlen szer, mely a Gonorrhoea kórokat rövid idő alatt eltávolítja, a nélkül, hogy a húgyeső nyálkahártyáját irritálná. Teljesen ártalmatlan és fájdalommentes.

Útmutatás a Gonorrhoeának Argoninnal való gyógykezelésére, valamint próbák az orvos és gyógyszerész uraknak rendelkezésére állanak.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M.

Török József gyógyszertára, Budapest, Király-utca 12.

Loretin

(Jodoxychinolinsulfóssav)

valamint sói teljesen méregmentesek, szagtalanok és nem izgatnak; legnagyobb mértékben antiseptikusok.

A jodoform legjobb helyettesítője..

A Loretingazet 180°-ra fel lehet hevíteni, tehát tökéletesen sterilizálni, a nélkül, hogy hatékony voltából veszítene.

Loretin-Natrium

vízben könnyen oldódik, gyógyító sebfelületek és mély sebek öblítésére, gonorrhoeánál, száj- és torokbántalmaknál öblögetőnek, továbbá nedves kötésekhöz stb.

Loretin-Bismut

vízben oldhatlan, a sebészeti gyakorlatban, különösen szembajoknál és belsőleg gyomor és bélbántalmaknál bámulatos eredménnyel alkalmazzák.

Farbwerke vormals Meister Lucius & Brüning Höchst. a. M.

Török József gyógyszertára, Budapest, Király-utca 12.



Védőjegy.

D. R. No. 88,520.

Új, vízben oldható, méregmentes
Antisepticum és Desinficiens
CHINOSOL

Nem maró, szilárd test, kellemes és kényelmes
kezelésű.

Fejődéggátló 1 : 40.000 Staphylococcus = Steenhuisen, Leiden, — a müncheni egyetem hygieniai intézete, — bivat. intézet Halberstadt, — Dr. Enoch C., Hamburg. — Wysman és Plugge tanár Appeldorn és több más.

1 : 50.000 Anthrax = Enoch, Hamburg.

30–50-szeresen mulja felül a
Carbolsavat különböző tenyész- } = Beddies – Fischer,
talajon, a Creolint, Lysolt, Kresolt, } Halberstadt.
Saprolt pedig még nagyobb mértékben

40-szer erősebb a Carbol- } = Emmerich, München,
savnál } = Chattaway, London.

Sok esetben felülmulja a } = Steenhuisen, Leiden.
Sublimatot } = Chattaway, London.

ALKALMAZÁSA :

Orvosi használatra, sebek, fekélyek, a nyákhártyák lobja, bőrbetegségek, a fogak és a foghús betegségei, scorbut, torok, fül-, orr- és szembajok, szülészeti gyakorlatnál, ivarszervek bajai, kéz-desinficiens, prophylacticus mosásokra és leöblítésekre.

Állatgyógyászati használatra : mutatis mutandis mint az embernél, ajánlva Völlers altónai városi állatorvos, Wedekind altónai kerületi hatósági állatorvos. Clausen, Bergedorf és több más állatorvostól.

Hygieniai használatra : desodorisatio, permetezés, mosások, fürdők, szájk-, bőr és hajápolásra.

Hygieniai készítmények előállítására : kötszerekhez, szappanokhoz (orvosi-, illat-, borotváló- és finom pipere-szappanokhoz), szájvíz, hajvíz, fogpor stb.

Conserváló szer organikus anyagokhoz.

Irodalom kívánatra bérmentve :

FRITSCHÉ F. és TÁRSA vegyészeti gyára, **HAMBURG U.**

Nagybani eladás Ausztria-Magyarország részére :

MAAGER VILMOS, BÉCS, III/3. HEUMARKT 3.

Török József gyógyszerháza, Budapest, Király-utca 12.

20 díszoklevél. Arany és ezüst érmek.

LIEBE SAGRADA BORA

Vinum sagrae genuin: 1 kem. = 1 gr. friss Cascara sagra. Erjedésmentes Cascara sagraéból déli borral készül és ezért nem kellemetlen ízű és enyhe tartós hatású. — Öregkorban, terhesség alatt és a gyermekpraxisban kiváló hashajtó. — Eredeti.

Liebe kola-bora, az afrikai kola dió minden ható alkotórészt tartalmazza finom csomageborban

Liebe, Condurango-, China- és Pepsinbora feltétlenül megbízhatóknak elismerve.

Leguminose-Cacao és csokoládé „Liebe“ (20% oldható leguminose) gyöngédű, vérszegény egyéneknek kiterjedt mérvben rendelve s a háztartásban fokozott mérvben alkalmazva.

Extractum malti pur. conc. „Liebe“ vacuumban elpárologatva, kombinálva chininsulfáttal, ferrochininsulfáttal, vassal, mészszel, csukamájolajjal, csukamájolaj és vassal, csukamájolaj és mészszel, lipanin, mangauvas, vaspepton és pepsinnal stb.

Liebe J. Pál Tetschen E|m.

Minták a gyárból D. ezdről vagy Tetschen n/E. ingyen és bérmentve. — Főraktár Török Józsefnél Budapesten.



Orvosi hőmérők jénai normál-üvegből $\frac{1}{10}^{\circ}$ osztott tej-üveg fokszórával. Ugyanazok, a charlottenburgi „Phys. techn. Reichsanstalt“ által hitelesítve. Hitelesített másodpercz-hőmérők kis higanyedénnyel.


A t. cz. orvos uraknak, úgyszintén kórházaknak árleengedéssel szolgálunk.

Továbbá ajánlunk: szemüvegek, mindennemű kivételben, orvosi rendelet szerint spharikus, prismatikus és cylindrikus üvegekkel; szemtűkrök különféle szerkezetben; szemüvegszekerények különböző összeállításban; mikroszkopok Zeiss, Reickert, Hartnack stb. műhelyeiből, eredeti gyári áron; tejmérők; húgymerők; dr. Késmárczy tanúr-féle Irrigatorok; Soxhlet-féle készülékek a tej racionális felforralására és csecsemők módszeres táplálására stb.; Constans-áramú batteriák és inductió villamozó-készülékek; szobai-, ablak- és fürdő-hőmérők; műszerek dús választékban stb.

Calderoni és társa, Budapest.

Látszerek raktára: Váci-utca 30. ♦ Műszerraktár: Kishid-utca 8.

Átmérő-táblázat Noffke Urethral-pálczikához spirale nélkül:



OLDÓ- BOUGIEK

dr. LOHNSTEIN H. szerint
Gonorrhoea

kezelésére.

(Urethritis anter. és post.
és Prostatitis chronica).

Noffke-féle oldó-bougiek

(törvényileg védve).

Nr. 1, 3, 3a, 5, 7, 8, 8a c. $33\frac{1}{3}\%$ (jodoform helyett) és Nr. 9, 6 mm. vastag, ezek igen jó eredménnyel alkalmaztattak dr. Lohnstein által az ő magángyógyintézetében és a poliklinikán, továbbá a kir. egyetem bőrgyógyászati osztályán, Boroszlóban.

A pálczikáknak a hátsó húgyvesébe való bevezetésére, ajánlom a rugalmas (hajlítható) **gyógyszer-pálczika-vívót („Urethralpistole“)** dr. Körbner tanár szerint előállítva.

Készletben 20—30 Nr.-ig.

Kapható — kizárólag orvosi rendelésre:

NOFFKE HENRIK, gyógyszerésznél,
BERLIN, SW., Ritterstr. 41.

Főraktár: Török Józ. gyógysz., Budapest, Király-u. 12.

LOEFLUND

MALÁTA-KIVONATA

tiszta, tömény,

alkoholmentes, ismeretes, mint kiváló diætetikum a légzőszervek hurutjánál.

— MALÁTA-KIVONATOK —

vassal, mésszel, chininnel, pepsinnel,
jódvassal.

CSUKAMÁJOLAJ-MALÁTA-KIVONAT

emulsió-alakban

igen könnyen emészthető és kellemes, gyermekek nagyon kedvelik.

Loeﬂund-féle tejczukor

vegytisztá.

Dr. SOXHLET tanár eljárása szerint előállítva kiválóan

őseősemők táplálására

Heubner és Hofmann szerint *higított tehéntejben adandó.*

Loeﬂund-féle tejkétszersült

gyenge, csontgyenge gyermekeknek két éves korig, erősítő, kiválóan jó láplálék, gazdag tejalkatrészekben, lápsóban.

LOEFLUND EDE és Tsa. STUTTGART.

Kaphatók **BUDAPESTEN:** Török József,
Dr. Rosenberg Sándor, Dr. Egger L. és
Egger J. gyógyszerláraitban.

Preblai savanyúvíz

(Forráseredet 828 méternyire a tenger színe fölött krystallikus közetből).

A Preblai savanyúvíz a legújabb vegyelemzés szerint, melyett Dr. Ludwig E. tanár, udvari tanácsos 1889-ben, Bécsben hajtott végre, tiszta, alkalikus, természetes Alp-savanyúvíz, kitűnő hatású a tüdő és gyomor idült hurutjánál, epekő képződésnél, idült csúznál, különösen húgysav képződésnél, a hólyag idült hurutjánál, hólyag és vesekőnél és Bright-kórnál, összetételénél és jóízénél fogva ajánlható, mint diätetikus, üdítő ital. Megrendeléseket elfogad bármely ásványvízkereskedő és a

Preblai kútkezelőség

Preblauban.

Pósta: St. Leonhard (Karintia).

Preblau gyógyhely Karintiában per Judenburg vagy Wolfsberg 828 méternyire fekszik a tenger színe fölött pompás és védett Alpeshely kiterjedt fenyvesek közepette.

Ivó- és belégzési gyógymód. Hideg és meleg zuhanyok. Savanyúvíz-, fenyves-, hidegvíz és villanyos fürdők. Szobaárak 80 krtól 3 frt 50 krig. Állandó fürdőorvos. Naponkénti posta-összeköttetés föltétlen felvétellel a judenburgi és wolfsbergi vasút- és postaállomásokon.

Közelebbit a gyógyintézet kezelőségénél

Preblau, pósta: St. Leonhard.

Karintia.

KELETI J.


Budapest, IV., Koronaherczeg-utca 17.

A mély, tiszt. orvos uraknak ajánlom dúsan felszerelt gyár- és raktáramat orvos-sebészeti műszerekben, orthopaedial gépekben, valamint minden a betegápoláshoz szükséges, legújabb és szolid szerkezetű eszközökben, a legolcsóbb árak mellett.

Az általam ismert m. t. orvos uraknak nagyobb kényelem kedvéért készséggel évi számlát nyitok. Kezdő orvosoknak havi részletfizetések mellett, teljes berendezéseket szállítok.

Egyszersmind bátorkodom a mélyen tisztelt orvos urakat gyár- és raktáram szives megtekintésére tiszteletteljesen meghívni.

◀ • Képes árjegyzőkek ingyen. • ▶



C. REICHERT

WIEN,

VIII., Bennoßasse 26.

Spezialität:

Mikroscope Prima-Qualität.

Ferrometer nach Dr. Jolles.

Preiscourante Nr. 17 auf Verlangen gratis und franco.

KEFIR

kizárólag részünkre termelt legkitünőbb
steril tejből, valódi kaukázusi gombával
készült

legtökéletesebb tápszer.

Ajánlva különösen:

Tüdő-, gyomor- és vesebajoknál, chlorosis
és anaemiánál s minden nagyobb betegség
alatt és után.

Gyors erő- és súlyszaporodás.

Kellemes üdítő íze miatt azok is szívesen
iszszák, kik a tejet nem tűrik.

Orvosoknak prospectussal, próbákkal és minden fel-
világosítással szívesen szolgálunk. — Budapesten
házhoz küld, vidékre postán szállít a

KEFIR-INTÉZET,
Budapesten, Teréz-körút 31.

Tulajdonos:

Dr. Pápay Vilmos-féle oltóintézet.

Vezető orvos:

Dr. Székely Ádám.

Rohitsch-Sauerbrunn

országos gyógyfürdő Stájerországban.

Vasúti állomások:

Pölschach (déli vasút) és Krapina (m. kir. államvasut).

Fürdő-idény: május 1-től októberig.

228 méter magasan a tenger színe felett, enyhe subalpin klíma, elragadó fekvés, gyönyörű hegyes vidéken, terjedelmes erdők között.

Glaubersós szénsavas források (Styria- és Tempel-forrás), világszerte úgy ismerve, mint elsőrangú gyógyvizek az emésztőszervek megbetegedései ellen, különösen idült gyomor- és bélhurut, idült szokványos székrekedés, a gyomor és belek atóniája eseteiben: továbbá váltóláznál és következményeinél, elhízásnál, aranyérnél, májbajoknál stb.

Kényelmes, elegáns és igen olcsó tartózkodási hely!

Orsz. fürdőorvosok:

Benczenzi Dr. Gámán Béla és Dr. Hoisel József.

A rohitsch-sauerbrunni ásványvizek

(Styria-forrás és Tempel-forrás)

mindig friss töltésben kaphatók: BUDAPESTEN;

Hoffmann Józsefnél

Báthory-utóza 8. sz.

Kitüntetést nyert
Budapesten, Párisban, Londonban és Nápolyban.

Syr. ferri albuminati (Wiederhoffer) *Hazslinszky.*
4 1/2% vasalbuminat tartalommal.
Ára 100 grmos üvegnek 1 frt.

Syr. ferri albuminat phosphor *Hazslinszky.*
Kellemes ízű
szörp, a phosphort nem lehet kiérezni. 4 1/2% ferrum album 100
grmban és 1 centgrm tiszta phosphor. *Ára 1 üvegnek 1 frt.*

Syr. ferri albuminat arsenic *Hazslinszky.*
4 1/2% vasalbumen és
10% Fowler tartalommal, o szerint egy kávé kanálynnyiban van
(1 Mlgr. arsenitrioxyd).

Syr. ferri albuminat arsen fortius *Hazslinszky.*
Ugyanaz mint a fenti 20% Fowler
oldattal. *Mindegyiknek ára üvegneként 1 frt.*

Pastilli ferri phosphor *Hazslinszky.* Kellemes ízű
cukorka, drbonként 1/2 mlgrm.
tiszta phosphorral és 2 ctgrm tejsavas vassal. *Ára dobozon-
ként 90 kr.*

Pastilli coccaini *Hazslinszky.* Gége, burat, rekedtség
és göresös köhögés ellen biztos sikerrel
alkalmazható, drbonként 2 mlgrm tartalommal. *Ára 1 doboz-
nak 75 kr.*

Áfonya-kivonat Extr. Myrthylli. A legmakaesabb ótvart,
levedző ekzemat legrovidebb idő alatt meg-
gyógyítja. *Ára vattával és ecsettel 1 frt 50 kr.*

Fucus V. L. Tengeri növény kivonatja, klinikailag elismert
szer *hízás* ellen és a kövér egyéneknek elő-
forduló asztma megszüntetésére. *Ára 1 üvegnek 2 frt.*

Chelidonium-szappan. A Chelidonium növény nedvéből
készítve kitűnő hatással van
idült száraz izzag (ekzema), de különösen a pikkelysömör ellen.
Arczra az 50%, testre pedig a 100% szappan alkalmazandó. *Ára
1 darabnak 70 kr.*

Kimerítő prospektusokat mindenkinek
szívesen küld

Hazslinszky Károly

gyógyszerész

Budapest, VIII. ker., Sándor-tér.

Gyártmányaink közül a következő új
gyógyszereket ajánljuk:

Argentamin, (Aethylendiamin-ozüstoldat = 100% ezüstnitrát)
az eddig használatban volt pokolkő oldatokat
jóval fölülmulja.

Chloralamid, teljesen ártalmatlanul ható altatószer.

Eucain-hydrochloricum, helyettesíti a cocaint. s
tetemesen olcsóbb, mint
amaz. — Az eucain-hydrochloriumot élettanilag és therapeutiku-
san megvizsgálták dr. Liebreich tanár, titkos orvosügyi tanácsos,
dr. Reichert egészségügyi tanácsos, dr. Schleich C. L., War-
nekros tanár és Kiesel fogorvos Berlinben. — Az eucain thera-
peutikus adagokban teljesen ártalmatlan, gyorsan és kielégítően
érzéstelenít.

Dr. Schleich-féle Glutol, (formalingelatine-por) ki-
válóan sebek gyógyítá-
sára alkalmas a dr. Schleich C. L. (Berlin) közlései szerint.

Formalin, kiváló antisepticum és desinfectans.

Laevulose, nádcukor helyett, kiválóan alkalmas diabetiku-
sok táplálására.

Phenokoll, láz- és csúszellenes, a phenokoll Vargás tanár szerint
a szaruhártya- és ellenkötő szer; néhány orvos
észlelete szerint pedig váltóláznál a chintint fölülmulja.

Piperazin, hathatós szer húgysavas diathesis kezelésénél.

Urotropin, (Hexamethylentetramin) kiváló szer a húgysavns
diathesis kezelésénél és húgyvezeték bacte-
rium okozta megbetegedésekénél.

Kimerítő irodalommal kívánatra szívesen
szolgálunk

Chemische Fabrik auf Actien
(ezelőtt Schering E.)

Berlin N., Müllerstrasse 170. 71.

*A t. cz. orvos urak
szíves figyelmébe!*

*Mindazon esetekben, hol Ol.
Santali vagy Balsam Copaiva
van indicálva*

Santal Egger

*a leghathalósabb és teljesen
megbízható készítmény, a
mennyiben a legtisztább és
legértékesebb Ol. Santali
ostinalból készült. Minden
Capsula 0.25 gramm essen-
cziát tartalmaz.*

1 üveg = 40 Capsula frt 1.50.

Kapható minden nevesebb gyógytárban.

Főraktár

az Egger-féle gyógyszerárban,

a „Nádorhoz,”

Budapest, vácsi-körút 17. sz.

A
Magyar Aszfalt-
részvénytársaság

Budapest, Andrásy-út 30. sz.

elvállalja jótállás mellett legolcsóbban

aszfalt-burkolatok

fektetését és **nedves lakások**, pinczék stb.
gyökeres szárazzá tételét.

— ♦ TELEFON. ♦ —

SZT.-LUKÁCSFÜRDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

♦ BUDAPEST. ♦

MELEG ÉS LANGYOS KÉNES FORRÁSOK.

TÉLI ÉS NYÁRI GYÓGYHELY. ♦ TÉLI KURA.

KÉNES ISZAPFÜRDŐ

rheumatikus bajok, csúsz, izzadmányos folyamatok, csont és izü-
letek bántalmai, bármily eredetű csontthártyalobok, ischias, syphi-
lis, bőrfekélyek és köszvény ellen. Massage és villamos gyógy-
kezelés. Nehéz betegeknek felvonó-készülék a vízben.

Meghülés kizárva. ♦ Mindenütt jól fűtve.

Douche-massage és iszap-borogatások. Gőzfürdők,
kő- és kádfürdők, uri- és női uszodák stb.

Szt.-Lukácsfürdő Nagy Szálloda.

„THERMAL“ SZÁLLODA.

Mérsékelt árak, kényelmes szobák, fekvés keletnek, kilátás a Dunára,
felvonó, villamos világítás, zárt folyosók a fürdőkhoz. — A fürdő főorvosa:

Dr. Bosányi Béla.

PRIVAT-HEILANSTALT

Privat-Heilanstalt

für

Nerven- und
Gemüths-Kranke

Prof. H. Obersteiner

zu

OBER-DÖBLING

(WIEN, XIX. B.)

→ OBER-DÖBLING. ←

Dr. Schmith's

Kuranstalt

Schloss Marbach a/ Bodensee.

Specialanstalt für

Alkohol- u. Morphiumkranke.

—  Prospecte.  —

Az 1896-ik ezredéves országos kiállításon

Haladásért és versenyképességért kitüntetve.

Vonatkozva már előzőleg megjelent hirdetéseimre, van szerencsém tisztelt ügyfeleimmel tudatni, hogy a Magyar Gyógyszerkönyv legújabbán megjelent Függelékében előírt módszer szerint készített kötőszerek nálam már kaphatók.

Nevezetesen sterilisált és szabályszerűen csomagolt Brunsgyapot és hydrophil kötőgázék. Szabályszerűen csomagolt és készített Jodoform, Sublimát és Carbolgázék, Moull, Organtin és Moussolinpólyák, Catgutok és selymek carbololajban és szeszben beforrasztott végű kémlőcsővekben; nemkülönben Draincsővek légmentesen elzárt üvegekben.

Az itt felsorolt s a Ph. H. II. után előírt csomagolásban kiállított kötőszerek minden áremelés nélkül szolgáltatnak ki.

Moldoványi Sándor

II. ker., Lánchíd-utca 15.

SINGER és WOLFNER kiadása Budapesten.

A NŐGYÓGYÁSZAT TANKÖNYVE.

Orvosok és orvostanhallgatók számára.

Irla: Dr. Fritsch Henrik. Ford.: Dr. Berczeller Imre.

216 fametszetű ábrával . . . 6 frt.

Tartós vászonkötésben . . . 7 „

PSYCHOPATHIA SEXUALIS.

Orvos-lörvényszéki tanulmány.

Irla: Dr. Krafft-Ebing R. báró. — A VIII. kiadásból
fordította Dr. Fischer J.

Ára 5 frt. — Tartós vászonkötésben 6 frt

(Az eredeti német kiadás ára füzve 7.20., kötve 8.40.)

Só- és tengeri fürdő

Porto rose Pirano mellett Isztriában.

Triesztből hajóval 1 órányira

Egyidejűleg klimatikus gyógyhely, a legkellemesebb téli
tartózkodási hely, északi szelek ellen védett.

Ausztria-Magyarországban az egyedüli sófürdő tengeri sóval, 20 % só,
nagy bromtartalom, ennél fogva hasonlíthatatlanul erős felszívódási képes-
ségű minden exsudatumnal, csont, ízület, izombántalomnál (rheuma-
tismusnál, s az ízületi lobok különböző alakjainál) uterus bajoknál,
rhachitisnél, scrophulosisnál, anaemiánál stb.

Iszapsó alkalmazás és fürdők.

Igen szép tengeri fürdő puha fővénnyel, különösen alkalmas
gyengébb nők és gyermekeknek, szintűgy mint utógymógymód a só-
fürdők után, vagy ezekkel együttesen használva.

Szép vidék, pompás növényzet, igen kellemes, úgy télen, mint
nyáron enyhe égalj.

Nagy, kényelmes szálloda, az utolsó évben átalakítás, építés
által szebbé, jobbá téve, villanyos világítás, jó konyha, olcsó árak.

Prospectussal, felvilágosítással **FREDIANI G. O.**, fürdőbérő
és szállodatulajdonos szolgál.

KIVÁLÓ VAS PREPARATUM.

A Kriegner-féle Tokaji china-vashor

az egyedüli magyar vas speczialitás,
mely az orsz egészségügyi tanácsjaves-
latára belügyminiszteri engedéllyel
lett ellátva kitünő sajátágaiért. ú. m.
rendkívül könnyű és gyors felszívódás,
étvágy gerjesztés, kellemes íz. Az ered-
mény feltétlenül biztos

Készítményem országszerte a leg-
jobb névnek örvend, minden nagyobb
forgalmú gyógyszerárban kapható. Van
számtalan utánzat is, de egyik sem
azonos az én preparatummommal; külön-
bözik mindegyik tartalmában úgy minő-
legesen mint mennyilegesen, különbözik
már az előállítási módban, melyet csak
magam, mint nagyban készítő követ-
hetek, miért is rendeléskor kérem, méltó-
táztassék mindenkor névaláírásomat
követelni a készítményen.

KRIEGNER GYÖRGY,

gyógyszerész

BUDAPEST, Kálvintér.

Nagyérdekű orvosi vállalat!

ORVOSI KÉZI ATLASZOK.

A magyar orvosi karnak és ezzel együtt a magyar
medikai irodalomnak vélünk szolgálatot tenni, a mikor a

LEHMANN-FÉLE

világbíró

Orvostani Atlaszokat

magyar nyelven is kiadjuk.

A Lehmann-féle atlaszok képeit és az ezekhez tartozó
szöveget neves egyetemi tanárok és elsőrendű szak-
emberek írták meg, maguk a *színes* képek pedig a
lehető legtökéletesebb reproductiók, a szó legszorosabb
értelmében művészi alkotások. Azt mondta az *Aertzl.*
Vercinsblatt ezekről a képekről:

Anatomie und Pathologie gelangen auf diese
Art zu einer anschaulichen Wirkung und prägen
sich dem Gedächtniss besser ein, als ein wich-
tigster Text es vermag.

Lehmann orvostani atlaszai a német eredetin kívül,
angol, francia, olasz, orosz, spanyol, holland, dán
és svéd nyelvre fordítottak, csaknem valamennyi
kötetből rövid néhány év alatt 3--4 kiadás jelent
meg. S ha még tekintetbe vesszük, hogy Németország-
ban, a hol egész sora a színes és színezetlen orvosi
atlaszoknak létezik s Lehmann atlaszai ennek dacára
is igen nagy kelendőségnek örvendenek, ott látjuk

Folytatása a következő oldalon.

azokat az egyetemi tanár, a gyakorló orvos, az orvos-tanhallgatók kezében, úgy biztosra vesszük, hogy nálunk, a hol ilyen atlaszok még egyáltalán nem jelentek meg, az orvosi kar örömmel fogja látni vállalkozásunkat.

Lehmann atlaszait magas tudományos érték, kitünő kompendikus szöveg, könnyen kezelhető alak s végül mintaszerű kiállítás jellemzik.

A fordítást kiváló szaktekintélyek, nagyjából egyetemi tanársegédek végzik és a hol szükséges, a magyar viszonyokhoz, a magyar orvosi egyetem előadásaihoz alkalmazzák úgy, hogy a magyar szöveg is minden tekintetben tökéletes és megbízható lesz, miáltal méltóan sorakozhatik a kitünően sikerült ábrákhoz.

A szövegre nézve kell még megjegyeznünk, hogy az nem pusztán magyarázatot kíván lenni a képekhez, hanem egyúttal rövid vonásokban megírt, de azért minden részletre kiterjedő vezérfonala annak a tárgynak, a melyet az illető kötet kimerítően felölel.

A vállalat tervezete.

Az atlaszok közül egyelőre a következő tíz kötetnek a kiadását tervezzük:

A szülészeti atlasza, a szülészeti alapvonalaiival 284 színes ábrával. — 2 kötet. Irta: *dr. Schaeffer Oszkár*, egyet. magántanár a heidelbergi egyetemen. Ford.: *dr. Bäcker József*, egyetemi tanársegéd.

A kórboneztan atlasza, a kórboneztan alapvonalaiival, 120 színes táblával. — 2 kötet. Irta: *Dr. Bollinger O.* Ford.: *dr. Kelen Béla*, *dr. Minich Károly* és *dr. Krömpecher Ödön*.

A nőgyógyászat atlasza, a nőgyógyászat alapvonalaiival, 64 színes táblával. — 1 kötet. Irta: *dr. Schaeffer Oszkár*. Ford.: *dr. Becker József*, egyetemi tanársegéd.

Folytatása a következő oldalon.

A belgyógyászat és klinikai kórisme atlasza, a belgyógyászat alavonalaival. — 1 kötet. 182 színes táblával és 64 színezetlen ábrával a szöveg közt. Irta: *dr. Jakob Chr.*, volt első tanársegéd az erlangeni klinikán. Ford. *dr. Rítőók Zsigmond*.

A csonttörések és ficzámok atlasza, csonttörések alapvonalaival. 200 színes és 110 színezetlen ábrával. 1 kötet. Irta: *dr. Helferich H.* Ford.: *dr. Kuzmik Pál*, egyetemi tanársegéd.

A sebészeti műtétan atlasza, sebészeti műtétan alapvonalaival. Körülbelül 150 képpel. — 1 kötet. Irta: *dr. Zuckerkandl O.*

A törvényszéki orvostan atlasza. Magyarázó szöveggel 200 színes és színezetlen képpel. — 1 kötet. Készítette: *dr. Hoffmann E.*

A nemi betegségek atlasza. Magyarázó szöveggel. — 1 kötet. Készítette: *dr. Mraček*, prágai egyetemi tanár.

A felsorolt tíz kötet kihoesátását 16–20 hónapon belül tervezzük. Ezek közül a szülészet és kórboneztan első kötetei 1897. június hó elején, — a második kötetek egy-két hónappal később. Ezek után minden 1–2 hónapban egy kötet fog következni.

Árak és megrendelési föltételek:

A felsorolt tíz kötet előfizetési ára, helyesebben, ha a tíz kötet egyszerre rendeltetik meg, 65 frt, mely összeg azonban

négy frtos havi részletekben

is törleszthető, még pedig oly módon, hogy a megrendelés alkalmával az első részlet beküldendő, aztán minden következő hónap elsején 4 frt fizetendő.

Folytatása a következő o'dalon.

ORVOSI KÉZI ATLASZOK.

A kik egy vagy más okból az orvosi atlaszoknak csak egyes köteteit kívánják megszerezni, azok a következő árakon kaphatók:

Szülészet, két kötet . . .	9.40	frt.
Kórbonecztan, két kötet . .	16.40	»
Nőgyógyászat	7.20	»
Belgyógyászat	6.80	»
Csonttörések	8.—	»
Sebészeti műtéttan	7.20	»
Törvényszéki orvostan . . .	10.—	»
Nemi betegségek	10.—	»

Összesen . 75.— frt.

Ime, lehető röviden összefoglalt tervezete legközelebb meginduló, a magyar orvosi karra nézve nagyfontosságú vállalatunknak. Bízunk sikerében, mert a legkiválóbb hazai és külföldi szaktudósok véleménye szerint, ezek az atlaszok minden tekintetben a tudomány magas színvonalán állanak, mert tökéletesek a szó legszorosabb értelmében s főleg, mert a magyar orvosi irodalom terén nagy hézagot pótolnak.

Akár a gyakorlat, akár a tanulmányozás szempontjából, megbecsülhetetlenek, nélkülözhetetlenek a gyakorló orvos, a szigorló orvos, az orvostanhallgató kezében.

Budapesten, 1897. május havában.

Kiváló tisztelettel

Singer és Wolfner

könyvkereskedése

Budapest, VI., Andrásy-út 10.



VEGYÉSZETI GYÁR **Rhenania** Aachen.

NOSOPHEN.

Tetraiodphenolphthalein. Nem mérgező hatású, nem izgat, szagtalan Antisepticum, különösen sarjadzó sebekre. Égési sebeknél, s a kisebb sebészeti műtéteknél tapasztalták hatásosnak. Használható az orr és fülkezelésnél.

Specificum rhinitis ellen

3% **Nosophengaze** 200 C.-ig sterilizálható bomlás nélkül.

ANTINOSIN

A nosophen natronsója. Mint hintőpor sebekre, inficiált sebekre igen megbízható hatású, úgyszintén phlegmonosus folyamatoknál, lágy fekélynél stb. 2—3% vizes oldat a száj és garat fokélyes megbetegedésénél, 2% gonorrhoeánál 0.5% hólyag kimosásánál.

EUDOXIN.

A nosophen wismuthsója. Bél- és gyomor megbetegedéseknél és gyermekek hasmenésénél. Adag: 0.3—0.5 felnőtteknek, 0.1—0.2 gyermekeknek 5—10 évig 0.01—0.04 csecsemőknek 1—4 hónapig. A gyomor minden nehézség nélkül tűri, nem izgat, íztelen.

Kísérletezési próbák, erre vonatkozó irodalom, kíváncsra ingyen küldetők.

Raditz Róbert gyógyszerháza az „Apostolhoz“, Budapest, VIII., József-körút 64.
Kiállításra az ezredévi kiállításon elismerő oklevéllel.

TABLETTAE CASCARADINI RADITZ

tanárok és gyakorló orvosok által emésztési bántalmaknál, székrekedésnél (főképp obstipatio habituálisnál)



kipróbált és ajánlott *javított ízű, kellemesen ható készítmény*. Csakis azon tabletták *eredetiek*, melyeken *e hatoldaltú védjegy domború nyomásban látható*. Egy egész doboz ára 1 frt 10 kr., egy fél doboz ára 60 kr.

Kapható **RADITZ R.** gyógyszerházában, Budapesten VIII., József-körút 64. Raktárak: *Török, dr. Jármai, Fajcsik, Egger* gyógyszerészeknél Budapesten és nagyobb vidéki gyógytárakban.

Rpe: *Tablettae Cascaradini Raditz* scat: *original.*
 S. Este, reggel 2—2 darabot (gyermeknekél 1—1 darabot).

Tablettae Cascaradini RADITZ előnyei a legtöbb hasonló nevű készítmények fölött:

1. *Cascara hój összes ható anyagait tartalmazzák.* 2. *Azonnali oldhatóságuk a gyomorban.* 3. *kellemes ízűek, habár megelőző* vannak oly izjavító szerek, pl.: *chocoládé*, melyek a hatást csökkentenék, vagy az oldhatóságot megakadályoznák.

Védjegy minden eredeti tablettán.

Az „Apostol“ *gyógyszertárban* orvosi rendelvényre mindennemű egyszerű és összetett porok *comprimáltatnak*. A comprimált gyógyszerek főleg kézi gyógyszerházzal bíró orvosok részére igen czél szerűek, általuk a poroknak elosztása szükségtelené válik.

Minden orvosi várószobába
 okvetlenül szükséges a

Telefon Hirmondó

a világ egyetlen beszélő ujsága.

Előfizetés 4 óra 6 frt.

Kiadóhivatal:

VII., Kerepesi-út 22. sz.





KARLSBAD

VILÁGHIRŰ SPRUDELJEI ÉS FORRÁSTERMÉKEI

a legjobb és legbiztosabb

gyógyszer

a gyomor, máj, lép, vesék, húgyszervek, prostata belegségei, diabetes mellitus, epe-, vese- és húgyhólyagkövek, köszvény, idült rheumatismus stb. ellen.

A háznál tartandó ivókurák számára kaphatók:

Karlsbadi

ásványvizek

Sprudelsó kristályokban és poralakban

Sprudelpastillák

Sprudelszappan

Sprudellúg és lúgsó,

minden ásványvízkereskedésben, drogueria- és gyógyszertárban.

A karlsbadi ásványvíz szétküldési iroda:

LÖBEL SCHOTTLÄNDER

KARLSBAD, CSEHORSZÁG.

Saxlehner András, Budápest



csász. és kir. udvari szállító.

A világ legjobb keserűvize. ✱ Páratlan a maga nemében.

Hunyadi János

Legjelesebb orvosok véleményei szerint
kiváló előnye:

Gyors, biztos és enyhe hatás.

Hatása fájdalom nélküli. Utánszorulás nem áll be. Használata nem kellemetlen. Rendszeresen használva nem hat fárasztóan a gyomorra. — Kis adagban is elégséges.

„A Hunyadi János keserűviz mindig egyenletes összetétele folytán a legmegbízhatóbb hatású, s mint ilyen különös figyelmet érdemel az orvosi gyakorlatban.” (1891.)

Dr. Bókai Árpád,

a gyógyszer-tanának tanára a budapesti egyetemen.

Bevásárlásnál a palaczk czimképén olvasható

„Saxlehner András“

név figyelembe ajánlatik.

—☞ Telefon 54-20. ☜—

Budapesti
Gyógymechanikai (Zander-)
Intézet

VIII., Múzeum-körút 2. sz.

Rendelő orvosok:

Dr. Reich Miklós. Dr. Sümegi József.

ZOLTÁN BÉLA

gyógyszertára a „Szűz Máriához“

BUDAPEST,

V., Nagy-korona-utca 23. sz.

Ajánlja

az igen tisztelt orvos uraknak a gyógyhatás tekintetében felülmulhatatlannak kipróbált teljesen szag és íz nélküli **Zoltán-féle csukamáj olaját**, mely az ország összes gyógyszertáraiban kapható, és a készítőnél fenti címen megrendelhető.

Egy üveg ára 1 frt.

