

Dr. BOKAI ÁRPÁD

EGYETEMI TANÁR

VENYGYÜJTEMÉNY

Budapest Singer és Wolfner kiadása

MATTONI-FÉLE

GISSHÜBLER

legtisztább égvényes

SAVANYU-KÚT

legjobb asztali- és üdítő ital,
kitünő hatásnak bizonyult köhögésnél,
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghu-
rutnál.

LÁPFÜRDŐK A HÁZBAN

MATTONI

LÁP-KIVONATAI

**LÁP-SÓ
LÁP-LUG**

küldetik

MATTONI HENRIK

által Franzensbadból, Karlsbadból, Bécsből.

Kapható minden gyógyszerertárban, ásványviz- és fűszerkereskedésben.

55.632

ELŐSZÓ.

18 JUN 26 1904

E kis könyvecske megírásánál főleg gyakorlati szempontok vezettek. Használható útmutatót nyújtani a kórodákat látogató tanulóknak és a gyakorlat terén működő orvostársaimnak, ez volt kitűzött célom, melyet úgy véltem elérhetni, hogy lehető rövidsége és egyszerűsége törekedtem, feltételezve természetesen azt, hogy a gyógyszer-tan lényeges tételeivel már ismerős az, ki e könyvecskét használni akarja. Orvostársaim szükségleteinek szempontjából lehetőleg minden új gyógyszer felvettem tárgyalásom keretébe, nem-mintha mind-egyiknek használatát helyeselhetném, hanem, hogy esetleges szükség esetén megkínéljem ügylársaimat a folyóiratokban utánkeresés fáradságaitól. Nagy gondot fordítottam a gyermekgyógyászati gyakorlat követelményeire is. Nem titok, hogy mily nehézséget okoz — különösen fiatalabb orvosnak — a gyermekek számára rendelés. Köszönettel kell megemlítenem, hogy nagy segítségemre volt e tekintetben öcsém, dr. Bókai János, «Stephania» gyermekkórházi igazgató, ki megengedte, hogy már úgy is Fogytán levő «Gyermekekórházi vénygyűjteményének» anyagát felhasználhassam, s így könyvecském úgy is tekinthető, mint annak 2-ik bővített kiadása. Köszönetemet kell még kifejeznem e helyen

dr. Hintz György úrnak, kolozsvári gyógyszerész és egyet.
m. tanárnak, ki a vények árát volt szives kérésemre
kiszámítani, s ki különben is sok szakavatott tanácssal
látott el. A betűrendes beosztást azért választottam a
gyakran szokásos therapeuticus beosztás helyett, mert
az utóbbi tapasztalatom szerint könnyen ráviszi a fiatal
orvost az oly veszedelmes schematikus gyógykezelésre.

Kolozsvárott, 1889 január hó 26-án.

Dr. Bókai Árpád,
egyetemi tanár.



I. Vényszerkesztéstani jegyzetek.

A vény az orvos írásos rendelete a gyógyszerészhez. A vényen legelőre leendő a rendelés helye és napja. Összeletti vénynél az egyes szerek között első helyen álljon a főszer (basis), erre következzen a segítőszer (adjuvans), majd a corrigens virium, azután a constituens, végre a corrigens odoris, vel coloris, vel saporis. A gyógyszerek neveinek rövidítése úgy történjék, hogy összecszerelések ne eshessenek meg; egyéb megszokott rövidítések betűrendben a következők:

<i>āā</i> = analica quantitas, egyenlő mennyiség.	<i>f.</i> = fiat v. fiant.
<i>c</i> = cum.	<i>gm.</i> = gramma v. grammata.
<i>conc. cont.</i> = concide, contunde.	<i>gtt</i> = gutta v. guttæ.
<i>colat.</i> = colatura.	<i>infus.</i> = infusum.
<i>consp.</i> = consperge.	<i>inf.</i> = infunde.
<i>coq.</i> = coque.	<i>l. a.</i> = lege artis.
<i>D</i> = delur vagy da.	<i>M</i> = misce v. misceatur.
<i>decoct.</i> = decoctum.	<i>p.</i> = pulvis.
<i>disp.</i> = dispensa vagy dispensentur.	<i>P. p.</i> = pro paupero.
<i>div.</i> = divide.	<i>qu. s.</i> = quantum satis.
<i>div in dos. aequ.</i> = divide in doses aequales.	<i>R. v. Rp.</i> = recipe.
	<i>reit.</i> = reiteretur.
	<i>rep.</i> = repetatur.
	<i>S</i> = signa v. signetur.

A súlyok jelzése sohasem egyedül számokkal, hanem szóval is történjék (1875. évi 23,717. sz. belügm. rendelet), tehát nem 0'05, hanem centigm. quinque, s nem 0'20, hanem centigm. viginti.* Decagm., hectogm. kifejezések ne használtassanak, hanem *gm. decem.*, *gm. centum.* A beteg neve s lehetőleg lakása is jelezve legyen a vényen, ha csak különös tekintetek nem követelik az elhagyást. Az orvos neve tisztán, olvashatólag legyen aláírva. Egy papírszeletnek mindkét oldalára vény ne irassék. Sürgősség esetén a vényre felül *cito!* vagy *statim!* szavak irassanak feltűnő, erős betűkkel. Szegényeknek rendelés alkalmával a vény bal alsó szélére *P. p.* (pro paupero) jegyeztessék.

* A vénygyűjtemény vényeiben a súlyok helykimélés céljából csak számokkal jeleztek. Ha az ott közölt vények használat alkalmával másoltatnak, a súlyok szóval jelzendők.

Minden vény csak egyszer készíthető el, ismétlés esetén minden egyes alkalommal reit. vagy rep. jelzéssel, az orvos új aláírásával s kelettel lálandó az el.

Species. Theakeverék. Ily alakban csak oly szerek rendeltessenek, melyek még nagyobb adagban sem okozhatnak mérgezési tüneteket; kizárva tehát p. o. fol. belladonnae, fol. digitalis vagy fol. jaborandi. Speciesből egy csészére tetézell evőkanálnyi vehető (7—10 grm.).

Pulveres. Elosztatlanul dobozban hevesebb hatású port p. o. kali chloricumot, morphint, rad. ipecacuanhael nem szabad rendelni. Vízszívó vagy illó anyagokat tartalmazó elosztatlan porok üveg dugós üvegben irassanak (vitrum cum epist. vitr. clausum). Osztott porok ne a dispensáló, hanem a dividáló módszer szerint rendeltessenek; tehát nem M. f. pulv. dent. tal. dos Nr. X, — hanem M. f. pulv. div. in dos. aequ. Nr. X. Osztott porok súlya rendszerint 0.3—0.5 gm. legyen, kivételesen több, de legfeljebb csak 1.5 gm. Vízszívó szerek vívőanyagául ne sacch. alb., hanem sacch. lactis vetessék, s a porok charta cerata- vagy paraffinataban rendeltessenek. Hydrarg. bichlor. corros., argent. nitr., auro-natrium-chloratum, hyoscinum, acónitinum, cocainumnak s az utóbbi alcaloidok sóinak vívőanyaga argilla alba legyen, mint-hogy az említett szerek szerves anyagok jelenlétében könnyen bomlanak s így hatásukból veszítenek. Vagyonosabb betegeknek az osztott port papírhüvely helyett capsula amygdacea-ban rendelhetjük; capsula gelatin. operculata-ban inkább sűrű kivonatokat p. o. extr. filicis maris aeth.-ot szoktunk rendelni.

Pilula súlya 0.1—0.15 gm. legyen. A pilulagépek rendszeren 30 rovátkára lévén osztva, lehetőleg 30 labdacs és ne 35—40 rendeltessék. Gyermeknek és oly felnőtteknek, kik a labdacsot lenyelni nem tudják, pilula ne irassék. Jó pilula-excipiensek a következők: 1. Argilla alba néhány csepp vízzel, vagy víz és glycerin aa. Kizárólag ezen excipiens használandó a poroknál már említett fémsók és alcaloidok rendelésekor, midőn azután a behintés is argillával történjek. 2. Növényi porok és ungu. glycerini vagy mucil. gummi arab. qu. s. 3. Pulv. liquir. és succus liquir. depur. aa, ha kevés a basis; ha az utóbbi sok, úgy pulv. liquir. kevesebb veendő. 4. Ha a basis rosszul ragadó por s kiteszi a pilulatömeg felét, jó excipiens sacchar. alb. és gummi arab. pulv. aa. néhány csepp vízzel. 5. Balzsamokhoz, aetheres kivonatokhoz, illó olajokhoz cera flav. pulv. és sacch. alb. aa. vetessenek. 6. Száraz gyanták, gummigyanták, vagy száraz gyantaszerű növényi kivonatok néhány csepp borszeszszel már jó labdacsanyagot adnak; néha jó lesz kevés növényi port (p. o. pulv. rad. althaeae) is hozzákeverni. 7. Natronszappan kevés növényi porral és mucil. gummi arab.-val vagy borszeszszel könnyen alakítható labdacsokká. 8. Száraz vizes kivonatok néhány csepp vízzel vagy borszeszszel lesznek gyúrhatókká. 9. Sűrű kivonatok-

hoz kevés növényi por vételessék. 10. Felsőrű kivonatokhoz két-annyi növényi por veendő. Behintés argillával, lycopodiummal, pulv. rad. liquirit.-vel, pulv. rad. althaeaevel, pulv. cort. cinnamomival, magnes. carb. v. üstával szokott történni. Labdacsok bevonása költséges és így az csak rossz szagú, vagy kellemetlen ízű, vagy légen könnyen bomló szereknél rendelendő el; gazdag betegek labdacsait mindig bevonathatjuk. Legegyszerűbb a bevonás collodiummal, gelatinával, körülményesebb tolu balzsammal, drágább ezüsttel, arannyal; csinosak a dragirozott labdacsok (obd. mucil. gummi arab. et amylo saccharato). Ha azt akarjuk hogy a labdacsok a gyomorban ne oldódjanak fel, hanem csak a bélhuzamban, keratinisáltassuk azokat (obd. l. a. keratino).

Trochisci, pastilli, tablettae compressae csak vagyonosoknak rendelhetők.

Emplastra. Ha valamely emplastrum felkenve nem hivatalos, ily alakban szegényeknek azt ne rendeljük, kivétel az empl. canthar. ordin., mely bőrdarabra (corium) vastagon (crasse) felkenve irandó; a bőrdarab hossza, szélessége, vagy formája jelzendő, p. o. «extende crasse super corium extensione longit. centimetr. 10, latitud. centimetr. 8, vagy magnitudine chartae lusoriae, v. volae manus».

Suppositorium súlya 2.5—5.0 grm. szokott lenni. Ha a végbécsap csak arra szolgál, hogy a széketlételt könnyítse, tisztán sebum ovile-ből v. nátronszappanból is állhat; ha mint vivőanyag szerepel, úgy butyrum cacao-ból készitendő. Suppositorium a hüvelybe is bevezethető; némelyek cacao-vajból globuli vaginales név alatt 5.0—20.0 grm. súlyú golyókat készítettnek.

Electuaria. Ily alakban nem szabad könnyen bomló vagy elenyülő szereket rendelni, valamint olyanokat sem, melyek már kis adagban erősen hatékonyak. Növényporok 3—5 rész syrappal, mel depur.-al, 4—6 r. pulpa tamarind.-al jó electuariumot adnak; nehezen oldható porokhoz = r. syrup. vagy 2 r. pulpa tamarind. vételessék. Mint vivőanyag szerepelhetnek még pulpa prunor, mel rosatum, electuar. aromath., hashajtókhoz az electuar. lenitivum. Egyszerre 50 grm.-nál többet ne rendeljünk. Bevétel kávéskanálankint történik.

Unguenta. Zsiros kenőcsökhöz, hogy ne avasodjanak (nyáron) kevés acid. benzoicumot lehet tételni. Hosszú időre ne rendeljünk kenőcsöt, legfeljebb 3—4 napra. Szagjavítóul 30—50 grm. kenőcsre 1 csepp illó olaj, (ol. rosar, ol. lavand.) elegendő. Jodoformos kenőcs szagát legjobban elveszi a cumarin (1 grm. jodoformra 0.1 grm. cumarin). A hivatalos indifferens kenőcsökhöz kívül, melyek mint excipiensek használtatnak, jó kenőcs-alapanyagot ad lanolin és axung. porci aa + aqua dest. qu. s. A kenőcs-alapanyaghoz az excipendum csak bizonyos határok közötti mennyiségben keverhető, így p. o. még illó olajok s camphora csak 1:10 12. addig causticus alkaliák 1:3 is vehetők; száraz

vagy sűrűn folyó anyagok, mint a gyanták, porok, balzsamok, kivonatok 1:3—4, tincturák, chloroform 1:6, ammon. sulfo-ichthyolicum és natrium sulfo-ichthyolicum 1:2.

Linimenta. Jó linimentumot adnak: 1. Ammonia pura liquida 1 r. és oleum sesami 4 r. 2. Chloroform 1 r. és ol. sesami 4 r. Camphora, illó olajok 1 r., axungia porci s más szilárdabb zsírok vagy hivatalos kenőcs-anyagok 5 r. 4. Ol. lini és aqua calcis aa.

Mixturæ ordinariæ et solutiones ad usum internum. Rossz szagú anyagokat illatos vízben, csipős szereket nyákos folyadékban (decoct. rad. althææ, decoct. tuber. salep) rendeljünk. Izjavítókat a szirupok (1:15). Rendelés 1—2 napra történjék. Erjedésre hajlandó folyadékok hűvös helyen, nyáron jeges vízben tartásának. Savanyú mixturák, jódos vagy sublimatos oldatok porcellán vagy üvegkanalból vétessenek be. A bevételre szánt folyadék összes mennyisége 50—200 gm. leglőbbször 150 gm. szokott lenni, gyermekeknél 80—100 gm. Világosságon bomló anyagoknak vitrum nigrum vagy coeruleum rendeltessék edényül. Bevétel evő-, gyermek-, kávéskanálankint.

Guttæ. L. a táblázatot a cseppek súlyviszonyairól. A rendelt mennyiség 15—30 gm. szokott lenni. Izjavító leglőbbször nem kell. Csak értelmes betegeknek rendeljünk cseppeket. Az oldat teljes legyen; ha idővel csapadék mutatkoznék, a szer elvetendő. Erősen ható szerekből oly mennyiség cseppek alakjában ne adassék a beteg kezébe, melyvel mérgezés történhetnék. Erős mérgek, mint p. o. strychnin, nitr., atropin, sulf., eserin, salicyl. ily alakban sohase adassanak a beteg kezébe; az ily cseppeket tartsa az orvos magánál. Acid, hydrochlor. dilut. üveg dugós üvegben rendeltessék. Ha lehet 20%-os cseppoldatok rendeltessenek, ekkor egy csepp vizes oldatban megközelítőleg 1 milligramja a hatékony anyagnak van jelen.

Collutorium és gargarisma mennyisége 200—300 gm. Felnőttek egyszeri használatkor 25—30 gmot fogyasztanak el. Gyermekeknél, kik e folyadékokat esetleg lenyelnek, ezeket puha vászondarabbal felítatva mosogatások alakjában kell használni.

Mixturæ agitandæ seu mediæ. Nem czélszerű gyógyszeralak. Ha írjuk, ne felejtjük el a vényre jegyezni: „*S. Használat előtt felrázni.*”

Injectiones subcutaneæ. Fecskendől soha se adjunk a beteg kezébe; a befecskendés műveletére sem a beteget sem laicus környezetét meg ne tanítsuk, így nem nevelünk morphinistákat. Bujakórosok és tuberculosusok számára külön-külön fecskendőket tartunk. Helybelileg erősen izgató vagy épen maró szerek ily módon ne használtassanak. Mily töménységű oldatok, s mily szerek használata a megszokott, arra nézve l. a táblázatot. Az oldat mindig tiszta legyen, ezért vénnyírásakor a szűrést (filtra) elrendelni ne felejtjük. Ha a folyadék idővel megzavarodik, úgy vagy az oldott szer csapódott ki, vagy gombavegetatio támadt.

ott, s a szer mindkét esetben elvetendő. A szer mindig „*sub sigillo, az orvos kezéhez*” rendeltessék; legjobb, ha azt az orvos azonnal magához veszi, s nem hagyja a beteg kezében.

Saturatioes. Vényen mindig jelzendő „*f. saturatio*”, hogy a gyógyszerész az elkészítést szabály szerint eszközölhesse. A készítés részletes körülírása a vényen szükségtelen. A telíték vívőanyaga 180—200 gm. víz. Szénsavas sóból (káli carbon., natr. carbon., natr. bicarbon.) 5—10 gm. rendeltessék, míg a telítő szerves savból (acid. citricum, vagy succus citri, vagy acid. tartaric.) „*qu. s. ut fiat saturatio*”. Körülbelül 1 gm. szénsavas só 0.65 gm. acid. citricum és 0.625 gm. acid. tartar. telít; a succus citri változó savtartalmú. Ha a jelzett savak helyett hatékonyabb savtartalmú anyagok képezik a telítő anyagot, p. o. acet. scilla, úgy a mennyiség megadandó. A telítésnek különben nem kell teljesnek lenni.

Emulsiones. Zsíros olajat tartalmazó magvak (amygdae dulces, sem. lini, sem. papaveri) 8—10 r. vízzel jó fejetet képeznek (emulsiones verae); az emulgens itt a növényi fehérje. Emulsio spuria készítésénél az emulgens gummi arab. pulv. (nem mucilago!), v. pulv. tragacanthae v. vitellum ovi. A mi a fejetképező erőt illeti, gummi arab. 10 gm. = tragacantha 1 gm. = vitellum ovi unius. Illatos olajokhoz gummi arab. 33 vételessék, zsíros olajokhoz, gyanták és balzsamokhoz 12 r. gummi arab. Víz 8-szor annyi vételessék, mint mennyi az emulgendum. Syrupok. sacchar. album, mel depur. emelik a fejet tartósságát, sók, savak csökkentik azt, s ezért hozzátételük kerülendő. Gyantákhoz legjobb a vitellum ovi mint emulgens. Mindkét fajta emulsio írásakor „*f. emulsio*” kiteendő.

Maceratum. Illatos anyagoknál elegendő 2—3 órai maceratio. keserű anyagoknál 12—14 órai szükséges; szegények házilag készíthetők, s a kivonandó anyagot species alakban írja fel az orvos.

Digestum s. Infusum digestionis. A digestio 12—24 órán át történjék. Jelzés a szerek felsorolása után következő: „*Stent in loco tepido in vaso l. a clauso per horas 12 (v. 24) saepius agitando. Cola et filtra*”

Infusum. Lazább szövetű (levél, fű, virág, vékonyabb gyökök, p. o. rad. ipecacuanhae, rad. valerianae) vagy illatos olajat tartalmazó növényrészek kivonására alkalmas gyógyszeralak. Colatura legyen 150 gm., gyermekeknél 80—100 gm. Izjavítóul syrupok 1:15.

Decoctum. Tömöltebb szövetű növényrészek (keményebb gyökök, kérgek) kivonására alkalmas gyógyszeralak. Illatos olajtartalmú anyagok kivonására ne használtassék. Colatura, izjavító mint az infusumnál.

Klysma. Kiürítő csőrének elég 200—400 gm. víz hűvösen vagy langyosan; lehet használni ugyanannyi infus. rad. valerianae-t, vagy infusum chamomillae-t is. Növeli a hatást 1—2

kávéskanál konyhasó, glaubersó, keserűsó hozzááttele. Ha zsíros olajat is akarunk a csőréhez keverni, 1 evőkanál olajat dörzsöljünk össze $\frac{1}{2}$ kávéskanálnyi szappanreszelékkel, s úgy keverjük azt a folyadékhoz. Oxyuris vermicularis ellen jó klysmát nyerrünk, ha 100—150 gm. foghagymaforrázathoz (háziilag készí-tendő) 1—2 kávéskanál eczetet elegyítünk. Tenesmus ellen jó klyσμα langyos keményítőfőzet 200 gmja 2—3 csepp tinct. opii simpl.-el. Tápláló csőrének legjobb a *Leube-, Rosenthal-féle hús-pankreas klystír*, mely következőleg készí-tendő el: Végy finomra vág-dalt húsvakaréket 150—300 gmot, adj hozzá friss és lehető finomra vág-dalt marhapankreast (fehér máj a mészárosok nyelvén), mely zsíros kötőszövet borítékától előzetesen meg-tisztítatott; keverd össze kanállal és gyúrd 150 gm. meleg víz segélyével sűrű péppé, s fecskendezd melegen az előbb már bélsártól megtisztított végbélbe alkalmas fecskendő segélyével. Lehet 25—50 gm. zsírt is (lőbhet nem) hozzátenni.

II. Jegyzetek némely mértékről.

Egy evőkanál víz 15·0—20·0 gmot tesz ki.

Egy gyermekkanálnyi víz = $\frac{1}{2}$ evőkanállal = 7·5—10·0 gmmal.

Egy kávé-s. thea-s kanálnyi víz = $\frac{1}{2}$ gyermekkanállal = 3·5—5·0 gmmal.

Egy csész-e víz 120·0—150·0 gmot tesz ki.

Egy késhegyny-i por = $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ kávéskanál-nyival.

Egy Pravaz-féle fecskendő körülbelül 1 köbcentimnyi folyadékot vesz fel.

III. Jegyzetek a cseppekről.

Lehetőség szerint cseppentő üvegek vagy cseppentő csővec-sék használtassanak. Hozzávetőleg:

Víz és nehezebb vizes folyadékokból	}	1 gm. = 16 csepp.
Savakból		
Balzsamokból		
Nehezebb illatos olajokból		
Tincturákból	}	1 gm. = 20 csepp.
Zsíros olajokból		
Könnyebb illatos olajokból		
Chloroformból		
Aether aceticusból	}	1 gm. = 25 csepp.
Szeszes vizekből (aqua spirituosae)		
Aetherből		
		1 gm. = 50 csepp.

Pontosabb adatok néhány fontos szerről.

Szer neve	1 gmra esik	Szer neve	1 gmra esik
Acid. hydrochloricum dilut.	16 csepp	Oleum crotonis	25 csepp
Aether depur. vel sulfur...	50 "	Oleum menthae piper...	25 "
Aether aceticus	25 "	Oleum sesami	20 "
Aqua destill.	16 "	Oleum ricini	20 "
Aqua amygdalar. amar.	25 "	Oleum terebinthinae rect.	25 "
Aquae spirituosae	25 "	Spiritus aetheris	25 "
Balsamum peruvianum	16 "	Spirit. ferri sesquichlor.	
Chloroformium	25 "	aether	25 "
Elixirium acidi Halleri	30 "	Spiritus (90%)	30 "
Kreosotum	25 "	Spiritus dil. (70%) ...	25 "
Liquor ferri sesquichlorati	12 "	Tinctura spirituosae ...	20 "
Liquor kali arsenicosi seu		Vina medicamentosa ...	20 "
Solutio Fowleri	16 "		

IV. Czélszerűtlen és veszélyes gyógyszerkeverékek.

1. Alkaloidok hatását szabad Cl., Br., J., valamint más erősen élenyítő anyagok gyengítik, sőt meg is szüntetik.

2. Belladonna- és aconitumkészítmények maró lúgokkal érintkezve elvesztik hatásukat, aconitumkészítmények már akkor is, ha vízzel hosszabb ideig állanak.

3. Tannin és tannintartalmú készítmények fém sókkal, alkaloidokkal, fehérnyékkel, enyvvvel, dextrinnel, növényi nyakkal csapadékot adnak.

4. Zsíros olajok és más zsíradékok aljakkal, erős savakkal, fém sók savanyú oldataival ne kevertessenek.

5. Tincturák, melyek balzsamokat vagy gyantás anyagokat tartalmaznak, víz hozzáadására tejszerűen megzavarodnak.

6. Aqua chlori csak vízzel vagy legfeljebb syrupus simplexel elegyíthető.

7. Kalium sulfurátumhoz, calcium sulfuratumhoz, ha savak vagy savanyú sók kevertetnek H_2S fejlődik kén kiválása mellett, vagy a nélkül. A nevezett szerek rendelésekor kerültesse-nek fémélegek, azok sói, Cl., Br., J., tannin és tannintartalmú anyagok.

8. Lúgos kémhatású folyadékok édesítésére csak szintelen syrupok használtassanak.

9. Vasoldatokhoz ízjavításra csak syrupus simplex vagy syrupus corticum aurantior. használtassék.

10. Savak, savanyú sók, savanyú syrupok és tincturák rendelésekor kerültesse nek szénsavas sók, szappanok, jodkalium, bromkalium. Kivétel a szénsavas sókat illetőleg, ha saturaliók állítandók elő.

11. Ezüstsókhhoz, ólomsókhhoz, higanyoxydulsókhhoz nem szabad chlór-, bróm-, jódvegyületeket keverni.

12. Ólomkészítményekhez nem szabad kénsavas sókat keverni.

13. Plumbum acelicum s más fémsók is növényi kivonatokkal csapadékot adnak.

14. Argentum nitricumhoz, jodkaliumhoz, auro-natrium-chloratumhoz sem syrupokat, sem más szerves anyagokat keverni nem szabad, *izjavítóul egyedül glycerin használandó.*

15. Higanysókok elbomolhatnak a legkülönbözőbb szerves vegyületek jelenlétében. Hydrargyrum bichlor. corrosivum, ha porban vagy pilulában rendeltetik, vívőanyagul csupán argilla alba használtassék; ugyanez áll a légenysavas ezüstre nézve is.

16. Jodkalium vagy bromkalium ne rendelkezék soha kali chloricummal egyidejűleg, vagy az utóbbival keverve.

17. *Robbanó gyógyszerkeverékek* (KOBERT után).

a) 1 r. chromsav keverve 2 r. glycerinnel azonnal robban.

b) Kalium chloricum szénport tartalmazó fogporral keverve még a szájbán is robbanhat. Kén jelenléte még növeli a robbanó képességet.

c) Kalium chloricum catechuval, gubacsporral, tanninnal keverve a dörzsölő csészében explodálhat. Ha előbb még glycerint is teszünk a keverékhez, az explosio multhatatlanul beáll.

d) Kalium chloricum és natrium subsulfurosus porrá elegyítve robbannak.

e) Kalium chloricum, tinctura ferri chlorati, glycerin aa (Angliában kedvelt elegy), melegben igen könnyen robban.

f) Jód és ammonium semmi esetre sem keverhetők, mivel ekkor robbanó jodnitrogen keletkezik.

g) Brom, ha alcoholal kevertetik, gyakran a robbanó brom-aether keletkezik.

h) Acid. nitr. + acid. hydrochlor. + tinct. nucis vomicae aa néhány óra múlva robban. éppen úgy acid. nitr. + acid. hydrochlor. aa 10:0, tinct. Cardammomi 20:0.

i) Salétrom, ha keverékekben csészében dörzsöltetik, bár nehezebben robban, mint a kalium chloricum, mégis gyakran okozott szerencsétlenséget.

j) Acid. picricum porban rendelve csaknem minden más anyaggal keverve robban.

k) Nitroglycerin nemcsak tisztán robban könnyen, hanem erős hígításokban is.

V. Fürdők.

	liter
Teli fürdőhöz (balneum totale) szükséges vízmennyiség	= 200—300
Félfürdőhöz (semicupium)	" " = 100—150
Ülőfürdőhöz (insessus)	" " = 40—50
Lábfürdőhöz (pediluvium)	" " = 10—20
Karfürdőhöz (brachiluvium)	" " = 5—10

Hideg fürdő hőmérséke $10^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 8^{\circ}\text{R} - 16^{\circ}\text{R}.$

Hűvös fürdő " $20^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C} = 16^{\circ}\text{R} - 22^{\circ}\text{R}.$

Langyos fürdő " $28^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C} = 22^{\circ}\text{R} - 27^{\circ}\text{R}.$

Meleg fürdő " $35^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C} = 27^{\circ}\text{R} - 32^{\circ}\text{R}.$

Forró fürdő " $40^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{R} - 36^{\circ}\text{R}.$

Mesterséges fürdők.

Ásványsavas fürdő. Teli fürdőhöz kell acid. nitr. crud. 500—1000, vagy acid. nitr. crud. és acid. hydrochlor. crud. aa 300—500; lábfürdőhöz harmadresze. Fakád!

Diófalevél-fürdő. Friss diófalevelekből 5000—10000, szárazakból kétszer annyi forráztassék le. Forrázat gyorsan átszűrve egy teli fürdőhöz elegyítendő. Gyermekek teli fürdőjéhez 3000 friss diófalevél vagy 6000 száraz vételessék.

Enyves fürdő. $\frac{1}{2}$ —1 kilogm. enyv vagy gelatine egy teli fürdőre.

Fenyőlevél-fürdő. 2000—3000 fenyőlevél-kivonat (droguistától) egy fürdőhöz.

Hangyafürdő. Azelőtt erdei hangyák forrázatával készült; jól pótolhalók a hangyák, ha egy fürdőhöz 100—150 acidum formicicum tételik.

Il atos (aromathicus) fürdő sokféle módon készíthető: a) Species aromathicæ 2000—5000 gmjából 2 liter vízzel forrázat készíttetik s az a fürdőhöz öntetik. b) Tinct. arnicæ 1000 öntetik a fürdőhöz, vagy c) Ol. Terebinthinæ 400—500 gm., vagy d) Aqua coloniensis $\frac{1}{2}$ —1 üveg.

Jódos fürdő. Pharmacologice irrationalis; különben következő módokon készíthető: a) Kalium jodatum vagy natrium jodatum 1000—1200 egy fürdőhöz; b) 100—150 jodum purum 200—250 kalium jodatum vagy natrium chloratum segélyével oldandó elegendő mennyiség vízben, s ez oldat öntendő a fürdőhöz. Fakád!

Kénés fürdők. Kalium sulfuratum pro balneo (kali kénmáj), vagy helyette natrium vagy calcium sulfuratum 500—2000 oldasék fel a fürdőben. Kénhydrogen fejlesztése sósavval felesleges, üüs fejlődésnél ártalmas is. Fakád!

Konyhasós-fürdő v. sósfürdő. A fürdő 2—3%-nyi sótartalmú

legyen. Teli fürdőben oldassék fel 4—6 kilogm anyalugsó, vagy konyhasó, vagy tengerisó, vagy a mi legolcsóbb, marhasó. Gyermekeknek sósfürdője ne legyen töményebb, mint 1—1½-nyi sótartalmú.

Korpafürdő. Korpá, (legjobb, ha buzakorpa) 2—3 kilogmja vászonzacskóba kötve 5—8 liter vízzel ½ órán át főzetik. Főzet a fürdőhöz öntetik és a korpás zacskó a fürdőben kifacsartatik.

Lúgos fürdő. Teli fürdőben 2000—5000 kereskedésbeli sóda feloldatik, v. natrium hydrooxydatum solutumból 5000 öntetik a fürdőhöz.

Malátafürdő. Árpamalátának 2—3 kilogmja 5—8 liter vízben ½ órán át főzetik. Főzet gyorsan szűrve a fürdőhöz öntetik. Maláta a sör- és szeszgyárakban kapható.

Szappanfürdő. Egy fürdőre 1000—2000 sápo kalinus venalis v. sápo szegediniensis 2000—3000.

Szénsavas fürdő v. pezsgő fürdő. Oldassék fel a fürdőben 1500—2000 natrium bicarbonic s fürdés közben folytonos keverés mellett óvatosan a testtől távol öntessék bele 1500—2000 acid. hydrochlor. crud.

Sublimátfürdő. Fürdő vétele orvos jelenlétében! Fakád! Sublimat sub sigillo, sub signo veneni, orvos kezéhez rendellessék!

a) Felnőtteknek teli fürdőre 50—100 Hydrarg. bichlor. corros.

b) Csecsemőknek — 2 éves gyermeknek 0.5—0.8. Hydrarg. bichlor. corros. — Fürdés tartama 10 percz. Gyermeket óvni, nehogy fürdővíz a szájába jusson!

Vásfürdő v. aczélfürdő. Pharmacologicé irrationalis.

VI. Bőr alá fecskendésre használt szerek oldatainak töménysége.

A Pravaz-féle fecskendők, melyek bőr alá fecskendéskor használtatnak, nem mindig 1 köbcm. ürtartalmúak, ezért megvételkor ürtartalmuk meghatározandó. Befecskendés előtt és után a fecskendő és tüje 2%-os carbololdattal fecskendeztessék át, így elkerüljük a befecskendés helyén lótnak keletkezését.

Szer	Szer menny- nyisége	Oldó folya- dék menny- nyisége	Egyes adag	Jegyzet
Acid. carbolicum li- quid.	0.1-0.2	10.0 Aqu.	0.01-0.04	Polyarthrit. rheumati- cánál, orbáncznál.
Acid. hyperosmicum	0.1	10.0 Aqu.	0.002-0.01	Neuralgiáknál, epilepsiá- nál.
Acid. sclerotinicum	0.4-0.5	10.0 Aqu.	0.01-0.05	Ergotin helyett.
Aether ulfar.	...	...	½-1 fecsk.	Excitans.

Szer	Szer- meny- nyisége	Oldó folya- dék meny- nyisége	Egyes adag	Jegyzet
Antipyrinum...	5'0	5'0 Aqu.	1'5-2'0	Fecskendés előtt felmele- gitendő.
Apomorphin. hydro- chlor....	0'1	10'0 Aqu.	0'005-0'01	
Apomorphin. hydro- chlor. gyermeknek	0'02	10'0 Aqu.	0'001-0'002	3 éven alóli gyermeknek
Atropin. sulfuricum	0'02	10'0 Aqu.	0'0004-0'0008	nem!
Camphora ...	1'0	10'0 Ol. se- sami	0'1	Borszeszben oldva fájdalom- s.
Chininum bisulfur.	1'0	12'0 Aqu.	0'3-0'8	Fájdalmas. Ha per os nem lehet, jobb klysmában.
Chinin. muriat. carb- amidat. ...	2'0	10'0 Aqu.	0'5-1'0	Nem fájdalom.
Cocain. hydrochlor.	0'1-1'0	10'0 Aqu.	0'01-0'1	Fenyegető tünetek jelent- kezése esetén amynit- rit 4-8 cseppjét belé- legeztetni.
Coffein. uatrio ben- zoicum ...	2'0	10'0 Aqu.	0'1-0'2	
Coffein. uatrio sali- cylic. ...				
Ergotinum s Extr. se- calis cornuti spis- sum ...	1'0	5'0 Aqu. + 5'0 Glycerin	0'1-0'2	
Ferrum citric. oxydat.	1'0	10'0 Aqu.	0'05-0'1	
Hydrarg. bichlor. corros. ...	0'1	10'0 Aqu. + 0'3 Nalr. chlor.	0'01-0'015	
Hydrarg. bichlor. carbamid. solut. ...	—	—	—	I. e. czimalatta vénygyűj- teményben.
Hydrarg. formamidat. solut. ...	—	—	—	I. e. czimalatta vénygyűj- teményben.
Hyoscinum hydro- chlor....	0'005	10'0 Aqu.	0'0002-0'0005	Nem ajánlatos. Rendki- vüli vigyázat!!
Hyosciaminum crys- tallis. ...	0'05	5'0 Aqu. + 5'0 Glycerin	0'001-0'005	Nem megbízható készít- mények is jönnek for- galomba. Legjobb a Merek-féle. Vigyázat!
Liquor ammonii aui- satus ...	...	...	1/2-1 fecsk.	
Liquor kali arsenicosi l. sol. Fowleri ...	—	—	—	
Morphinum hydro- chlor....	0'2	10'0 Aqu.	0'005-0'01	

Szer	Szer- meny- nyisége	Oldó folya- dék meny- nyisége	Egyes adag	Jegyzet
Pilocarpinum hydro- chloric.	0·2	10·0 Aqu.	0·01-0·02	Atropin-mérgezés esetén több; annyi, hogy izzá- dás, nyálazás jelent- kezzék.
Pilocarpinum hydro- chlorio.gyermeknek	0·1	10·0 Aqu.	0·001-0·005	
Solutio Fowleri ...	5·0	10·0 Aqu.	2·4 gtl.	
Strychninum nitricum	0·05	10·0 Aqu.	0·001-0·005	Vigyázat! kellemetlen tü- netek esetén paralde- hyd 3·0-5·0.
Tinct. Moschi ...	...	...	Egy fecsk.	

VII. Belégzésre használt szerek oldatainak töménysége.

<i>Acid. carboticum</i>	0·5—4·0 : 200·0	Aqua dest.
<i>Acid. lacticum</i>	5·0—15·0 : 200·0 ¹	"
<i>Acid. tannicum</i>	0·5—4·0 : 200·0	"
<i>Amylnitrit</i>	2—8 csepp	gyapotra v. ken- dőre cseppentve légzendő be.
<i>Aqua amygdalar. amar.</i> ...	0·5—5·0 : 200·0	Aqua dest.
<i>Aqua calcis</i>	tisztán v. 100·0 : 50·0	"
<i>Aqua chlori</i>	2·0—10·0 : 200·0	"
<i>Argentum nitr. cryst.</i> ...	0·04—1·0 : 200·0	"
<i>Chininum bisulfuric.</i> ...	0·2—0·5 : 200·0 ²	"
<i>Extractum Belladonnae</i> ...	0·02—0·1 : 200·0	"
<i>Hydrargyr. bichlor. corros.</i> ...	0·04—0·2 : 200·0	"
<i>Kalium bromatum</i>	0·4—4·0 : 200·0	"
<i>Kalium chloricum</i>	0·4—4·0 : 200·0	"
<i>Kalium hypermanganicum</i> ...	0·2—2·0 : 200·0	"
<i>Kalium jodatatum</i>	0·5—1·0 : 200·0	"
<i>Liquor ferri sesquichlorati</i> ...	0·5—3·0 : 200·0	"
<i>Natrium benzoicum</i>	5·0—20·0 : 200·0	"
<i>Natrium bicarbonicum</i> ...	0·4—4·0 : 200·0	"
<i>Natrium chloratum</i>	0·4—4·0 : 200·0	"
<i>Oleum pini silvestri</i>	15—30 csepp ³	
<i>Oleum terebinthinae</i>		
<i>Thymolum</i>	0·2—0·4 : 200·0 ⁴	"
<i>Tinctura opii simplex s. crocata</i>	0·1—1·0 : 200·0	"

¹ Wiederhofer tanár tracheotomisált croupos betegnél a canule-on
át óránként 1 perczen át belélegeztet Acid. lact. gtl- 10 : 30·0 vízre.

² Tussis convulsivánál.

³ Párolgó meleg vízre csepegtetni.

⁴ Vízben nem oldódik, ezért néhány csepp borszeszben oldandó
előbb, azután hígítandó fel csak vízzel.

VIII. Gyermekgyógyászati gyakorlatban fontosabb és hatékonyabb szerek adagolása.*

Rövidítések: *gyerm.* = gyermeknek; *kk.* = kávéskanál; *gyk.* = gyermekkanál; *ór.* = óránként; *gtt.* = gutta; *l.* = lásd; *m.* = mint. A súlyokat jelző számok mellől a gm. többnyire elhagyatott.

S z e r	A d a g
Acid. benzoicum	3—6 éves gyermek. 0'05 pro dos. 0'25—0'3 pro die.
Acid. carbolicum	Helybelileg is nagy vigyázattal. Torokvizben nagyobb gyermeknek $\frac{1}{2}$ % -os oldat aqua calcissal; ha lenyelné, ne rendeltesék. Torokcsetelésre 1:10 glicerin. Bels nem!
Acid. citricum... ..	0'5—1'0: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Acid. hydrochlor. dilut.	Korhoz képest 5—8 gtt.: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Acid. phosphor.	1,0: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Acid. pyrogallicum l. Pyrogallol	
Acid. sulfur. dilut.	5—6 éves gyermek. 10 gtt.: 80,0 2 ór. gyk.
Acid. tannicum	Korhoz képest 0'01—0'03 pro dos; 0'05—0'15 pro die.
Acid. tartaricum... ..	Mint az acid. citricum.
Althææ rad.	Decoct. 5,0: 80,0 2 ór. gyk.
Alumen	Száj-, torokviz 2,0: 100,0. Belsőleg 1—2 éves gyermek. 0'4: 80,0 2 ór. kk.
Ammonium chlorat.	} 3—6 éves gyermek. 0'5: 80,0 2 ór. gyk.
Ammonium chlorat. ferrat.	
Antimonium sulfuratum auratum	2—6 éves gyermek. 0'005—0'01 pro dos. 2 ór.; 0'025—0'05 pro die.
Antipyrinum... ..	Mint antipyreticum annyi decim. pro dos., a hány éves a gyermek. 3—4-szer, v. egyszerre 3-szor annyi decim., a hány éves.
Apomorph. hydrochlor.... ..	Mint emeticumot csak nagyobb (5—6 éven felüli) gyermeknek nagy szükség (!!) esetén subcután 0'001—0'002 gm. pro dos. Mint expectoranst nem!

* Nagyrészt a budapesti Stephánia szegény gyermekkorházban elfogadott adagolás alapján.

S z e r	A d a g
Aqua amygdalar. amar. ...	2 éven alóli gyermek. 5 gtt.: 50,0 2 ór. 1 kk.
Aqua laurocerasi	2 éven felüli gyermek. 5–10 gtt.: 50,0 2 ór. 1 gyk.
Aqua calois	Száj-, torokviznek 100,0: 50,0 v. 100,0: 100,0
Aqua laxativa viennensis ...	3–6 éves gyermek. ór. 1 gyk. míg hatás jelentkezik.
Arnica flor.	4–8 éves gyermek. infus 1,0: 80,0 2 ór. 1 gyk.
Argentum nitricum	Belsőleg 3–6 éves gyermek. 0'002–0'003 pro dos. 2–3-szor pro die.
Arsen-készítmények l. Solutio arsen. Fowleri.	
Atropinum sulfur.	Ne rendeltessek!
Belladonna l. Extract. bellad.	
Benzoe l. Acid. benz.	
Bicarbon. natrii l. Natr. hydrocarb.	
Bismuthum subnitricum ...	1–6 éves gyermek. 0'05–0'1 pro dos.; 0'25–0'5 pro die.
Bismuthum tannicum... ..	Mint a bismuth. subnitr.
Borax veneta l. Natr. boracicum.	
Calcium carbon. præcipit....	Belsőleg 1–3 éves gyermek. 0'1–0'2 pro die.
Calomel	Mint hashajtó 4–8 éves gyermek. 0'05 pro dos., míg hatás nem jelentkezik. Bélhurtnál, syphilis congenitánál csecsemőnek, — 2 éven alóli gyermek. 0'005–0'008 pro dos. 2 ór.; 0'025–0'04 pro die. 2–5 éves gyermek. 0'008–0'01 pro dos. 2 ór. 0'04–0'05 pro die.
Camphora	3–6 éves gyermek. 0'01–0'02 pro dos. 2 ór. 0'05–0'1 pro die.
Cannabis indica l. Extr. cannabis.	
Cascarilla l. Tinct. cascarillæ	
Chinæ cortex	4–6 éves gyermek., decoct. 4,0: 100,0 2 ór. 1 gyk.
Chininum ferro-citricum ...	3–6 éves gyermek. 0'03–0'05 pro dos. 2 ór.; 0'15–0'25 pro die.

S z e r	A d a g
Chininum sulfur.	Mint antimalaricumot 2—6 éves gyermek. 0'2—0'3, 6—10 éves gyermek. 0'3—0'5 a lázrohammentes időben. Mint anti-pyreticumot ugyanannyit pro die 4—5 részre elosztva. Chinin. tannicumból kétszer annyit.
Chininum bisulfur.	
Chininum hydrochlor.	
Chininum tannicum	
Chloralhydrat	Csecsemőnek 0'2—0'5; 80,0 2 ór. kk. v. gyk.; csőrében 0'2—0'3 egyszerre nyakos oldatban.
Cocainum hydrochloric. ...	Bels. nem. Küls. mint felnőtteknél.
Cremor tartari l. Kalium hydrotartaricum.	
Cuprum sulfuricum	Mint emeticumot 2—6 éves gyermek. 0'3—0'4; 80,0 1/4 ór. kk. v. gyk. a hatás beálltaig.
Digitalis folia	Csecsemőnek infus. 0'1; 80,0 2 ór. kk.; 3—6 éves gyermek. infus. 0'2—0'3; 80,0 2 ór. gyk.
Electuarium lenitivum	3—6 éves gyermek. 1—2 kávéskanállal; ha hatása nincs 3—4 óra múlva ismét ugyanannyit.
Elixirium acidi Halleri	Mint az acid. sulf. dil.
Ergotinum	5 éven túli gyermek. 0'05 pro dos. 2 ór.; 0'25—0'3 pro die.
Extractum belladonnæ	3—10 éves gyermek. 0'005—0'01 pro dos. napjában 1—2-szer.
Extractum canuabis indicæ	4—8 éves gyermek. 0'005—0'02 pro dos. 2 ór.; 0'025—0'1 pro die.
Extract. flicis maris æthereum.	4—8 éves gyermek. electuariumban 2'5—4'0, egy óra alatt elfogyasztani.
Extract. hyosciami	2—6 éves gyermek. 0'005—0'01 pro dos. 2 ór.; 0'025—0'05 pro die.
Extract. opii aquos.	Nem rendeltetik, helyette tinct. opii simpl.
Extract. nucis vomicæ	1—6 éves gyermek. 0'003—0'005 pro dos. 2 ór.; 0'015—0'025 pro die. 6—10 éves gyermek. 0'005—0'007 pro dos. 2 ór.; 0'025—0'035 pro die. Enuresis nocturna esetén nagyobb gyermeknek este 0'01 pro dos.
Extract. ratanbæ dep. ...	Csecsemőnek s 3 éven aluli gyermek. 0'2—0'4; 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Extr. secalis cornuti spiss. l. Ergotin.	
Ferrum hydrogenio reduct.	Serdülő gyermeknek 0'03 pro dos., 0'15 pro die.

S z e r	A d a g
Ferrum jodatum l. Syrupus ferri jodati.	
Ferrum lacticum... ..	(Csecsemőnek 0'01—0'02 pro dos.; 0'02—0'05 pro die. 2—6 éves gyermek. 0'03—0'05 pro dos.; 0'15—0'3 pro die.
Ferrum natrie-pyrophosphoric.	
Ferrum sesquichlorat. solutum	1—4 éves gyermek. 8—10 gtt.: 80,0 2 ór. gyk. 4—8 éves gyermek. 10—15 gtt.: 80,0 2 ór. gyk.
Filix mas l. Extr. filic. mar. æth.	
Flores salis ammoniaci martiales l. Ammon. chlor. ferrat.	
Flores Zinci l. Zincum oxydat.	
Fructus tamarindorum l. Tamarindus.	
Granati cortex l. Punica granati cortex	
Gummi Kino	Mint az extr. ratanhiæ.
Hydrargyr. bichlorat. corrosivum	Csak fürdőben, l. mesterséges fürdők.
Hydrargyr. chlorat. mite l. Calomel.	
Hydrargyr. jodatum flavum	4—6 éves gyermek. belsőleg 0'005—0'01 pro dos. porban 2-szer napjában.
Hydromel infantum	2—3 éves gyermek. 2 ór. gyk. míg hatás jelentkezik.
Hyosciamus l. Extr. hyosciami	
Ipecacuanhæ radix	Mint expectorans infusumban csecsemőnek 0'1: 80,0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyermek. 0'15—0'25: 80,0 2 ór. gyk. Mint emeticum infusumban 1'0—2'0: 50,0 1/4 ór. csecsemőnek kk., 2—6 éves gyermek. gyk. míg hatás jelentkezik.
Jodoformium	Bels. nem. Kenőcs, hintőpor mint felhőttnek.
Kalium aceticum solutum...	3—6 éves gyermek. 1'0—2'0: 80,0 2 ór. kk. v. gy.
Kalium bromatum	Csecsemőnek 0'5—1'0: 80,0 2 ór. kk. 2—6 éves gyermek. 1'0—2'0: 80,0 2 ór. gyk. Porban 2—6 éves gyermek. 0'1—0'2 pro dos. 0'5—1'0 pro die.

S z e r	A d a g
Kalium chloricum	Vigyázati Száj-, torokvizben 1'0—3'0: 150,0; ha a gyermek lenyelné, mosogatások puha vászondarabbal. Belsőleg 2—6 éves gyerm. 1'0—2'0: 80,0 2 ór. gyk.
Kalium hydrotartaricum ...	4—8 éves gyerm. 1'0—2'0 pro die.
Kalium hypermanganicum	Száj-, torokviznek 0'2—0'3: 150,0; ha lenyelné a gyermek, mosogatások puha vászondarabbal.
Kalium jodatum	Kenőcsnek 2'0: 30,0 hozzá 0'1 jodum purum. Belsőleg 1—4 éves gyermeknek 0'5—1'0: 80,0 2 ór. kk. v. gyk., 4—8 éves gyerm. 1'0—2'0: 80,0 2 ór. gyk.
Kalium natrio-tartaricum...	3—5 éves gyerm. 10'0: 100,0 ór. gyk.
Kalium stibio-tartaricum ...	Mint emeticum. 1—2 éves gyerm. 0'05. 50,0 1/4 ór. kk. míg hatás jelentkezik: Gyenge gyermekeknél v. gyomor- és bélizgalom jelentésében ne rendeltessék(!).
Kamala depuratum	2—6 éves gyerm. 2'0—4'0 electuariumban 1 1/2 óra alatt elfogyasztani.
Koso flores s. Kusso flor. ...	4—8 éves gyerm. 8'0—10'0 electuariumban 1 1/2 óra alatt elfogyasztani.
Lactas ferri l. Ferrum laetic,	
Lactucarium germanicum...	4—6 éves gyerm. 0'02—0'03 pro dos.: 0'1—0'15 pro die.
Lichen islandicus	Decoctumban 2'0—4'0: 80,0 2 ór. gyk.
Liquor ammonii anisatus ...	Csecsemőnek — 2 éven aluli gyerm. 8—10 gtt.: 80,0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyerm. 10—15 gtt.: 80,0 2 ór. gyk.
Liquor ferri sesquichlor. l. Ferrum sesquichlor. sol.	
Liquor kalii acet. l. Kalium acet. solut.	
Magisterium bismuthi l. Bismuth. subnitr.	
Magnesium carbonicum hydroxydatum	Késhegynyit napjában 2—3-szor.
Magnesium oxydatum s. Magnesia usta... ..	
Mannitum... ..	Csecsemőnek 5'0: 50,0 (aqua ferv.) ór. gyk. míg hatás jelentkezik.

S z e r	A d a g
Morphinum hydrochloricum	Gyermekeknek egyáltalán ne használtassék (11).
Moschus	0'01—0'02 pro dos. 0'05—0'1 pro die.
Natrium hydrocarbon. seu bi-carb.	Csecsemőnek 0'4:80,0 2 ór. kk. 2—6 éves gyermek. 0'5—1'0:80,0 2 ór. gyk.
Natrium boracicum	Száj-, torokviznek (soor) 1'0—2'0:100,0. Puha vászondarabbal mosogatások.
Natrium nitricum	3—6 éves gyermek. 0'5—1'0:80,0 2 ór. gyk.
Natrium phosphoricum ...	3—6 éves gyermek. 1'0—2'0:80,0 2 ór. gyk.
Natrium salicylicum	Mint antipyreticum 2—4 éves gyermek. 1'0—2'0:80,0 ór. gyk.
Nux vomica l. Extr. nucis vom. és tinct. nuc. vom.	
Opium purum	Ne rendeléssék; helyette tinctura opii simpl.
Oxymel scillæ	Hánytatókba syrup helyett 10'0—20'0.
Oleum jecoris aselli	Napjában 1—2-szer korhoz képest kk. v. gyk.
Oleum ricini	Korhoz képest kk. v. gyk.
Oleum terebinthinæ	1. belégzésre szolgáló szerek tábláját.
Paraldehydum	0'5—1,0 pro dos. és pro die.
Paullinia sorbilis s. Pasta Guarana	1—5 éves gyermek. 0'03—0'05 pro dos.; 0'15—0'25 pro die.
Pepsinum germanicum ...	Csecsemőnek 0'05 pro dos. szopás előtt; 2—5 éves gyermek. 0'1 pro dos. étkezés előtt. Utána sósav.
Pilocarpinum hydrochlor. ...	Subcutan 1—5 éves gyermek. 0'002—0'005 pro dos.; 5—12 éves gyermek. 0'005—0'01 pro dos.
Polygalæ Senegæ rad. ...	3—5 éves gyermek. decoct. 4'0:80,0 2 ór. gyk.
Protojoduretum hydrargyri l. Hydrarg. jodat. flav.	
Pulpa tamarindorum l. Tamarindus.	
Pulvis Doveri... ..	Nagy vigyázattal Csecsemőnek 0'005—0'008 pro dos. 0'025—0'04 pro die; 1—5 éves gyermek. 0'008—0'03 pro dos. 0'04—0'15 pro die; 6—10 éves gyermek. 0'04 pro dos. 0'2 pro die.

S z e r	A d a g
Punica Granati cortex radiceis.	4—8 éves gyermek. 15:0 grmból macerato-decoctum 150,0 vízre 1½ óra alatt bevenni.
Pyrogallol... ..	Kenőcs. 1: 20. (Vigyázat!)
Ratanhæ radix l. Extr. ratanh. dep. és tinct. ratanhæ.	
Rhei chinensis radix... ..	3—8 éves gyermek. 0'05—0'1 pro dos. 0'25—0'5 pro die.
Sal ammoniacus dep. l. Ammon. chlor.	
Sal Seignetti l. Kalium natrio-tartar.	
Salep tubera	0'5: 80,0 decoct. 2 ór. kk. v. gyk.
Santonium	2—4 éves gyermek. 0'02—0'03 pro dos.; 0'06—0'08 pro die. 4—8 éves gyermek. 0'03—0'04 pro dos.; 0'09—0'12 pro die.
Senega l. Polygalæ Senegæ radix.	
Solutio arsenicalis Fowleri	5—12 éves gyermek. 1 gtt. pro die., fokozatosan emelkedőleg 3—5 gtt.-ig pro die oldatban.
Strychninum nitricum	Ne rendeltessék!
Sulfur auratum antimonii l. Antimon. sulfur. aurat.	
Syrupus ferri jodati	2—4 éves gyermek. 3—5 gtt. 3—4-szer napjában cukros vízben.
Tamarindus	4—8 éves gyermek. decoctum 10:0: 100,0 2 ór. gyk.
Tanninum pur. l. Acid. tannic.	
Tannaschininil. Chinin. tannic.	
Tartarus emeticus l. Kalium stibio-tartaricum.	
Tinctura belladonnæ	1—5 éves gyermek. 1—3 gtt.: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Tinctura cascariillæ... ..	1—2 éves gyermek. 10 gtt.: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Tinct. castorei	Mint a tinct. moschi.
Tinct. chinæ composita... ..	1—3 éves gyermek. 1'0: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Tinct. moschi	1—2 éves gyermek. 10 gtt.: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.

Szer	Adag
Tinct. nucis vomicae	Csecsemőnek 1 gtl.: 80,0 2 ór. kk.; 1—3 éves gyermek. 1—3 gtl.: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.; 3—6 éves gyermek. 3—5 gtl.: 80,0 2 ór. gyk.
Tinct. opii simplex	Nagy vigyázat!! Csecsemőnek 1 gtl.: 80,0 2 ór. kk.; 2—6 éves gyermek. 2—4 gtl.: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.; újszülöttnak az első 2 hónapban ne rendellessék.
Tinct. opii crocata	
Tinctura ratanhia	Csecsemőnek 10 gtl.: 80,0 2 ór. kk.
Tinct. rhei aquosa	
Tinct. rhei vinosa s. Darelli	Csecsemőnek 1'0—2'0:80,0 2 ór. kk.
Tinct. valerianae spirit.	Csecsemőnek 10 gtl.: 80,0 2 ór. kk.; 2—5 éves gyermek. 15 gtl.: 80,0 2 ór. kk. v. gyk.
Unguentum hydrargyri cinereum	Bedörzsölési gyógymódra 3—6 éves gyermeknek 0'3—0'5 pro die unguent. simplex-el aa
Uvae ursi folia	4—8 éves gyermek. decoct. 5'0: 80,0 2 ór. gyk.
Valerianae radix	4—8 éves gyermek. infus. 4'0: 80,0 2 ór. gyk.
Zincum oxydatum	Csecsemőnek 0'02 pro dos.; 0'08—0'1 pro die; 2—5 éves gyermek. 0'03—0'04 pro dos.; 0'1—0'15 pro die.
Zincum valerianicum	

IX. Legnagyobb adagai

a Magyar Gyógyszerkönyv II-ik kiadásába felvett mérgekként ható gyógyszereknek.

A Magyar Gyszk. II. kiadásában az általános szabályok 2-ik pontja így hangzik: „Ha valamely gyógyszerből nagyobb adagot rendel az orvos a mellékelt táblában feltüntetett legnagyobb adagnál, a gyógyszerésznek csakis azon esetben szabad a gyógyszert kiszolgáltatnia, ha annak mennyisége mellé az orvos felkiáltó jelt (!) tett.”

Szer neve	Grammata		Szer neve	Grammata	
	pro dosi	pro die		pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum	0'005	0'02	Amyle nitrosa ...	0'20	0'60
Acidum carbolicum ...	0'10	0'50	Apomorphinum hydro-		
Aconitinum	0'001	0'002	chlorium	0'01	0'05
Aconitum (tubera) ...	0'10	0'50			

Szer neve	Grammata		Szer neve	Grammata	
	pro dosi	pro die		pro dosi	pro die
Aqua amygdalarum amararum	1'00	5'00	Hydrargyrum chlora- tum mite	0'50	1'00
Argentum nitricum	0'03	0'20	Hydrargyrum cyana- tum	0'03	0'10
Atropinum sulfuricum	0'002	0'006	Hydrargyrum jodat- um flavum	0'05	0'20
Belladonna (radix) ...	0'07	0'30	Hydrargyrum oxyda- tum flavum	0'03	0'10
Cantharides	0'05	0'20	Hyosciamus (folia)	0'20	1'00
Chloralhydratum ...	3'00	6'00	Jodoformium (pro usu interno)	0'30	1'50
Chlorodine	1'50	6'00	Jodum	0'05	0'20
Cocainum hydrochlo- ricum	0'05	0'20	Kalium chloricum ...	0'50	5'00
Codeinum	0'05	0'20	Kalium stibio-tartari- cum	0'15	1'00
Coffeium	0'10	0'60	Kreosotum	0'05	0'20
Coffeinum citricum	0'10	0'60	Kusseinum	1'00	3'00
Colchicinum	0'003	0'016	Lactucarium	0'30	1'00
Colocynthis	0'30	1'00	Lobelia (herba) ...	0'50	4'00
Cuprum sulfuricum	0'15	0'50	Morphinum	0'02	0'10
Digitalis (folia) ...	0'20	1'00	Morphinum hydrochlo- ricum	0'03	0'12
Extractum aconiti tu- berum	0'03	0'12	Oleum crotonis' ...	0'05	0'10
Extractum belladonnæ radicis	0'05	0'20	Opium pulveratum	0'15	0'50
Extractum cannabis indicæ	0'10	0'30	Paraldehydum ...	3'00	6'00
Extractum colocynthi- dis	0'10	0'40	Physostigminum sali- cyclicum	0'001	0'003
Extractum hyosciami foliorum	0'15	0'80	Pilocarpinum hydro- chloricum	0'03	0'06
Extractum nucis vo- micæ	0'04	0'20	Plumbum aceticum depuratum	0'10	0'50
Extractum opii ...	0'05	0'30	Pulvis Doveri	1'00	4'00
Extractum scillæ ...	0'20	0'80	Resorcinum	3'00	10'00
Extractum secalis cor- nuti	0'25	1'00	Sabina (frondes) ...	1'00	2'00
Hydrargyrum bichlo- ratum corr.	0'03	0'10	Santonium	0'10	0'30
Hydrargyrum bijoda- tum rubrum	0'03	0'10	Scilla siccata	0'20	1'00
			Secale cornutum ...	1'00	3'00

Szer neve	Grammata		Szer neve	Grammata	
	pro dosi	pro die		pro dosi	pro die
Solutio arsenicalis			Tinctura nucis vo-		
Fowleri	0'50	1'20	micæ	0'50	1'50
Strychninum nitricum	0'01	0'02	Tinctura opii crocata	0'50	2'00
Tinctura aconiti ...	0'50	1'50	Tinctura opii simplex	0'50	2'00
Tinctura belladonnae.	1'00	4'00	Veratrinum	0'005	0'02
Tinctura cannabis in-			Vinum colchici... ..	1'00	3'00
dice... ..	1'00	4'00	Vinum stibiato tar-		
Tinctura cantharidum	0'50	1'00	taricum	0'50	1'50
Tinctura colchici ...	2'00	6'00	Zincum aceticum ...	0'10	0'50
Tinctura colocynthi-			Zincum sulfurium		
dum... ..	1'00	3'00	qua emeticum... ..	1'00	5'00
Tinctura digitalis...	1'00	5'00	Zincum valerianicum	0'10	0'50
Tinctura jodi	0'20	1'00			

X. A Magyar Gyógyszerkönyv

II-ik kiadásába felvett kémiai készítmények oldékony-
sága a gyakorlat céljaira kikerekítve.

Egy rész oldódik	Rész		Rész		Rész æther- ben
	hideg	forró	hideg	forró	
	vízben		borszeszben		
Acidum benzoicum	400	30	könnyen	könnyen	könnyen
" boricum	30	5	20	—	—
" carbolicum	20	—	könnyen	könnyen	könnyen
" citricum	1	igen könnyen	1	igen könnyen	50
" salicylicum crys- tallisatum	600	könnyen	igen könnyen	"	igen könnyen
" tannicum	könnyen	1	2	"	—
" tartaricum	1	igen könnyen	4	könnyen	—
Aconitinum germanicum	—	50—60	könnyen	"	könnyen
Alumen	12	könnyen	—	—	—

Egy rész oldódik	Rész		Rész		Rész ether- ben
	hideg	forró	hideg	forró	
	vizben		borszeszben		
Alumen ustum	25	könnyen	—	—	—
Ammonium carbonicum ...	4	"	—	—	—
" chloratum...	4	2	—	—	—
Antipyrinum	igen könnyen	igen könnyen	2	—	60
Apomorphinum hydrochlo- ricum cryst.	40	—	30	—	nem
Argentum nitricum cryst.	1	igen könnyen	12	könnyen	—
Argentum nitricum fusum	1	"	12	"	—
Atropinum sulfuricum ...	1	"	3	"	nem
Calcium oxydatum ...	1000	1500	—	—	—
" sulfuricum ustum	4—500	—	—	—	—
Chininum	2000	1000	8	3	könnyen
" bisulfuricum	12	könnyen	35	könnyen	—
" hydrochloricum	40	"	35	igen könnyen	—
" sulfuricum ...	800	30	90	8	—
" tannicum insipi- dum	alig	—	50	könnyen	—
Codinum	80	20	könnyen	"	könnyen
Coffeinum	80	3	50	"	—
Colchicinum	3	igen könnyen	könnyen	"	nehezen
Caprum sulfuricum ...	4	1	—	—	—
Ferrum lacticum	50	15	alig	—	—
Hydrargyrum bichlorat. corrosivum	20	4	3	igen könnyen	4
Hydrargyrum bijodatum rubrum	alig	alig	130	20	—
Hydrargyrum cyanatum	20	4	20	6	—
Jodoformium crystallisatum	nem	nem	50	10	6
Kalium bromatum... ..	2	igen könnyen	200	—	—
" carbonicum crudum	1	"	—	—	—
" " purum	1	"	—	—	—
" chloricum	20	4	—	—	—

Egy rész oldódik	Rész		Rész		Rész aether- ben
	hideg	forró	hideg	forró	
	vizben		borszeszben		
Kalium hydrooxydatum	1	igen könnyen	—	—	—
• hydrotartaricum ...	200	30	nem	nem	—
• hypermanganicum	25	könnyen	—	—	—
• jodatum... ..	1	igen könnyen	12	könnyen	—
• natrio-tartaricum	3	"	—	—	—
• nitricum	5	1	—	—	—
• stibio-tartaricum	20	3	nem	nem	—
• sulfuratum pro bal- neo	3	igen könnyen	—	—	—
• sulfuricum... ..	12	5	nem	nem	—
• tartaricum	2	1	—	—	—
Kreosotum	—	150	igen könnyen	igen könnyen	—
Lithium carbonicum ...	150	—	—	—	—
Magnesium sulfuricum ...	1	0.5	—	—	—
Mannitam	10	igen könnyen	100	—	—
Morphinum	1000	500	50	30	nem
• hydrochloricum	25	2	50	—	—
Naphtolum	1000	80	könnyen	könnyen	könnyen
Natrium aceticum crystall.	3	2	30	3	—
• benzoicum ...	2	—	nehe- zebben	nehe- zebben	—
• boracicum	20	1	nem	nem	—
• bromatum ...	2	igen könnyen	—	—	—
• carbonicum cryst.	2	1	—	—	—
• hydrocarbonicum	20	—	—	—	—
• jodatum	1	igen könnyen	3	igen könnyen	—
• nitricum	2	"	50	—	—
• phosphoricum	10	3	—	—	—
• salicylicum... ..	1	igen könnyen	6	igen könnyen	—
• sulfuricum cryst.	4	1	—	—	—

Egy rész oldódik	Rész		Rész		Rész æther- ben
	hideg	forró	hideg	forró	
	vízben		borszeszben		
Paraldehydum	12	könnyen	könnyen	könnyen	könnyen
Physostigminum salicyli- cum	150	—	12	könnyen	—
Plumbum aceticum depurat.	3	—	10	—	—
Pyrogallolum	5	igen könnyen	3	igen könnyen	3
Santoninum	5000	250	50	4	100
Strychninum nitricum ...	100	5	100	8	—
Veratrinum	alig	—	4	igen könnyen	—
Zincum aceticum	3	1	40	könnyen	—
" sulfuricum	1	0.5	—	—	—
" valerianicum	100	—	50	—	—



XI. Vénygyűjtemény.

(Az árak kiszámítását dr. Hirtz Gyöngy úr, kolozsvári gyógyszerész és egyet. m. tanár volt szíves eszközölni. A hivatalos gyógyszerek az 1889. évi január hó 1-én életbe lépett árszabvány szerint, a nem hivatalosak pedig a magy. orsz. gyógyszerész-egylet által 1884-ben kiadott és jelenleg is használatban levő, azóta többször kibővített árszabvány szerint vétettek számításba. Némely legújabb vagy ritkább szernél, melynek árát illetőleg még nem történt a gyógyszerészek közt megállapodás, az ár elhagyatott. Az adagokra vagy osztott porokra nézve a munkát illetőleg a hiv. árszabvány 14-ik pontja alkalmaztatott; dobozok, portárczák csak kivételesen számítottak. Folyadékoknál, kenőcsöknél, nyalatoknál mindenütt fehér üvegek, illetőleg közönséges tégelyek számítottak, csak a mely szernél különösen szükséges, vétetett vitrum hyalinum, míg a munkára nézve a hiv. árszabvány 31., 32. és 33. tételei vétettek figyelembe. Oly vényeknek, melyeknél kisebb és nagyobb adagok jelezvék, mindig a kisebbnek ára tételet ki.)

H = hivatalos; † = kézi eladásban ki nem adható gyógyszer, melyek a többiektől elkülönítve tartandók; †† = erősen ható mérgek, melyek külön és elzárt helyen tartandók.

A hol a szövegben az adagok után ! látható külön megjegyzés nélkül = *dos. maxim. singula*.

H. Absinthii herba. (*Artemisia absinthium*. Compositae.)

Hatóanyagok: 1. absinthin, jegezhető keserű anyag; 2. illó olaj, mely a camphorral isomer absinthol is magában foglalja. Amarum, excitans. Porban 0.5—1.0 pro dos. napj. 3—4-szer; infusumban 5.0 : 150.0 2 ór. evőkanállal. 100.0 = 9 kr.

H. Tinctura absinthii composita. Amarum. 20—40 csepp napj. 2—3-szor, borban, liqueurben. 10.0 = 3 kr.

1 <i>Rp.</i> Infus. herb. Absinthii e 5.0—10.0. l. a. p. ad colat. 150.0. Syr. cort. Aurantior. 10.0. <i>℞℞℞</i>. 2 ór. 1 evőkan. 35 kr.	2 <i>Rp.</i> Tinct. Absinthii comp. 5.0. Tinct. Rhei Darelli 40.0. <i>℞℞℞</i>. 3—4-szer napj. 30—50 cseppet. 60 kr.
---	--

Acetal. Diaethylacetal ($C_6H_{14}O_2$) és **Dimethylacetal** ($C_4H_{10}O_2$). Mindkettő illó, aetherhez hasonló szagú, keserű ízű folyadék. Hypnoticum. Chloralhydrát pótszeréül ajánlották mindkettőt. Adag 10.0—12.0 egyszerre. Drágák, nem megbízhatóak. Dimethylacetal és chloroform aa beléjeztetve műtéteknél jó anaestheticum (Fischer) tiszta chloroform helyett.

H. Acetanilid. s. Antifebrin. (C_8H_9NO). Színtelen selyemfényű, szagtalan rhombicus jegeczlapocskák, csípős ízűek. Vízben nehezen (1 : 189) borszeszben, (erős borban, cognacban) aetherben könnyen oldható. Antipyreticum, antirheumaticum, anodynum (?). 1 r. acetanilid antipyreticus hatása = 4 r. antipyrinnel. Adag 0.1—0.2—0.5 pro dosi 1—2 ór.; 0.5—2.0 pro die. porban, tokajiban, cognacban. 1,0 = 3 kr.

3 Rp. Acetanilidi s. Antifebrini	4 Rp. Acetanilidi s. Antifebrini
1,0—2,0.	3,0.
Sacchari alb. 3,0.	Pulv. et succi Liquir. aa
M. f. pulv. div. in dos.	qu. s.
aequ. No. 10.	F. pilul. No. 30.
℞. 1—2 ór. 1 port.	℞. 1—2 szemet ór. v. 2 ór.
32 kr.	37 kr.

Acetophenon seu Hypnon (C_8H_8O). Színtelen, olajszerű folyadék, keserű mandolalajra s gyöngyvirágra emlékeztető szagú, csípős ízű, vízben nem, borszeszben, chloroformban, aetherben, zsíros olajokban jól oldódik. Egy csepp súlya 0.025. Hypnoticum. Chloralhydrát pótszere. Értéke felől eltérő vélemények. Helybeli lobokozó hatása folytán vigyázat! Adag 3—6 csepp egyszerre fejthet v. caps. gelat.-ban. 1,0 = 60 kr.

5 Rp. Hypnoni gtt. 10.	6 Rp. Hypnoni gtt. 3—6.
Olei Amygdal. dulc.	Spirít. vini 1,0.
Gummi arab. pulv. aa 10,0.	Syr. cort. Aurant. 10,0—
Syr. cort. Aurant. 60,0.	20,0.
Aquae dest. 120,0.	℞℞. Egyszerre bevenni.
F. l. a. emulsio.	34 kr.
℞. Egyszerre felét bevenni.	
90 kr.	

7 Rp. Hypnoni gtt. 12.
Glycerini 10,0.
℞℞. in caps. gelat. No. 6.
℞. 1—2 tokocskát egyszerre bevenni. 71 kr.

Acetphenetidiu ($C_9H_{13}NO_3$). Gyengén pirosas, szagtalan, íztelen, jegeczes por, vízben nehezen, glycerinben könnyebben, borszeszben könnyen oldódik. Antipyreticum; hasonlóan hat, mint az acetanilid. Egyszeri nagyobb adag p. o. 0.50—0.70 osztályában czélszerűbb, mint ór. v. 2 ór. kis adagok p. o. 0.15—0.20. (KOBLER.)

H. Acetum seu Acetum vini. Eczet. 6^{um} eczetsavat tartalmaz. Lázas betegeknek hűtő mosogatások acetum + víz aa; kiűrtő v. analepticus czélból csőrének 20,0—30,0 eczet + 150,0

víz; száj- és torokvíznek infus. malvae- v. salviae-hez 10,0—20,0. Antidot. chemicum maró és szénsavas égvényekkel mérgezések alkalmával. 100,0 = 3 kr.

H. **Acetum aromathicum.** Füstölő szer; különben úgy használtatik, mint az acetum. 100,0 = 12 kr.

8 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae e
10,0.
l. a. p. ad colat. 200,0.
Aceti vini 30,0.
3/4 *Ds.* Csőrének.
35 kr.

9 *Rp.* Infus. fol. Salviae s. Malvae e 20,0.
l. a. p. ad colat. 300,0.
Aceti aromath. 10,0.
Syr. simpl. 20,0.
3/4 *Ds.* Száj-, torokvíz.
39 kr.

H. **Acetum pyrolignosum rectificatum.** Barnás színű eczet- és kátrányszagú folyadék. Vizes oldata eczetsavnak, methtylszesznak, brenzcatechinnek, hangyasavnak, kresol-, phenol- és kreosotnak. Adstringens, gyenge desinficiens. Küls. üszkös sebek borogatására 1 : 20, hüvelyirrigációkra 1 : 50. Bels. nem. 100,0 = 10 kr.

† H. **Acetum scillae.** l. Scilla.

†† H. **Acidum arsenicosum seu Arsenicum album.** (As_4O_6) Fehér, porcellánszerű v. áttetsző darabok; szagtalan; vízben nehezen, borszeszben alig oldódik. Küls. kenőcsben causticum 1 : 20—30. Bels. pilulában (soha sem üres gyomorba) 0,001—0,005! pro dos. napj. 3—4-szer; 0,02! pro die. 1,0 = 1 kr. (subtil. pulv.).

H. **Solutio arsenicalis Fowleri s. Liquor Kalii arsenicosi.** Kalium arsenicosum oldata. Szintelen, állatsző, erősen lúgos kémhatású folyadék. 100 részben 1 r. arsenessav foglaltatik. Bels. acid. arsenicosum helyett. Felnőtteknek adag 2—8! csepp pro dos. 2—3-szor napj. (8 csepp = 0,50) nem éhgyomorra! Adagot a dos. maxim. határán belül fokozatosan emelni lehet. Dos. maxim. pro die 1-2! azaz 11 csepp. Gyermekeknek (5—12 éves) adag 1 csepp. pro die, melyet fokozatosan emelhetni 3—5 cseppig pro die oldatban. 1,0 = 1 kr.

10 *Rp.* Acid. arsenic. 1,0.
Cinnabaris fact. 3,0.
Ungu. emoll. 24,0.
M. f. pasta.

Ds. Vászonnra kenve lupusnál a beteg helyre alkalmazni, s 24 óránként változtatni, míg a lupusgöcsök el nem pörkösödnek. Hebra módosított pasta Cosmi-ja.
52 kr.

11 *Rp.* Acid. arsen. 0,33.
Piperis nigri 1,0.
Succi et pulv. Liquir. aa qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.

Ds. Naponta 3-szor 1 szemet. Emelni lehet az adagot 3×3 szemig. Egy pilulában 0,001 acid. arsen. Intermittens malarica, ichthyosis, psoriasis. lymphoma malignum, chlorosis. 40 kr.

- 12 *Rp.* Acid. arsenic. 0,5.
Morphini hydrochlor 1,5.
Kreosoli. qu. s.
ut. f. pasta.
℞S. Fogideget ölü pasta, fog-
orvosok számára; belőle a
fogba gombostűfejnyi helye-
zendő, az új gyapot- s fog-
gyantával elzárandó.
88 kr. (SCHEFF.)
- 13 *Rp.* Acid. arsen. 0,12.
Chinini sulf.
Extr. Gentianae $\overline{aa}$ 4,0.
M. f. pilul. No. 60.
℞S. Napj. 2 szemet; fokoza-
tosan emelkedhetni 6 sze-
mig pro die.
Asthma nervosum.
(BAMBERGER.)
82 kr.
- 14 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri 5,0.
Tinct. amara. 10,0.
℞℞S. 3-szor napj. 3—9 csep-
pet.
Lymphoma, lymphosarco-
ma, tuberculosis, scrophu-
losis, idült bőrbajok, neu-
ralgiák, malaria, diabetes,
chorea. 19. kr.
- 15 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri 2,0.
Tinct. Ferri pomati
Aque Menthae piper.
 $\overline{aa}$ 50,0.
℞℞S. 3-szor napj. 1 kk.
Chlorosis, idült bőrbajok.
72 kr.

16 *Rp.* Solut. arsen. Fowleri gtt. 2.
Aque dest. 30,0.
℞℞S. Reggel este 1 evők.

5—12 éves gyermek chorea minor. Minden 3-ik nap
1 cseppel növeljük az adagot, felmenve 8 cseppre
pro die; ezen arányban a víz mennyisége is sza-
porítandó 60,0-ig. 8 cseppről ismét visszatérünk
2 cseppig. 2—3 ily turnust végeztethetünk. Torok-
fájás, emésztési zavarok esetén a szer néhány
napra kihagyandó. 16 kr.

H. Acidum benzoicum seu Flores Benzoës ($C_7H_6O_2$).

Fehéres sárgás, lemezes v. tűalakú, selyemfényű, benzoegyan-
tához hasonló szagú jegecekből álló por. Vizben nehezen, bor-
szeszben, aetherben könnyen oldódik. Expectorans, excitans.
Bels. osztyában, ladbaesban 0,05—0,3 pro dos. napj. többször.
Bőr alá fecskendve híg borszeszes oldatban (RONDE.) 1,0 = 9 kr.

- 17 *Rp.* Acid. benzoici 0,5—2,0.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.
℞S. 1—2 ór. 1 port.
47 kr.
- 18 *Rp.* Acid. benzoici.
Rad. Ipecac. pulv. $\overline{aa}$ 1,0.
Pulv. et. extr. Liquirit.
 $\overline{aa}$ qu. s.
F. pilul. No. 30.
Consp. cum pulv. Liquirit
℞S. 2 ór. 1—2 szemet.
Expectorans. 49 kr.

19 *Rp.* Acid. benzoici.
Camphor. trit. āā 0,5.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqu. No. 10.

℞. 1—2 ór. 1 port.
Excitans. 29 kr.

21 *Rp.* Acid. benzoici 3,0.
Camphor. trit.
Sulfur aurat. Antimonii
āā 0,5.
Eleosacchar. Fœnic. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqu. No. 10.

℞. in chart. cerat.

℞. 2 ór. 1 port.

Expectorans tüdővízenyőnél.
59 kr. (BEHREND.)

20 *Rp.* Acid. benzoici 1,5.
Camphoræ 1,0.
Spirít. dil. 12,0.

℞. Bőr alá fecskendésre.
Egyszerre 1 fecskendővel.

Excitans. (ROND.)
37 kr.

22 *Rp.* Acid. benzoici.
Mosehi āā 0,5.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqu. No. 10.

℞. 2 ór. 1 port.

Excitans.
2 frt 73 kr.

H. Acidum boricum [$B(OH)_3$]. Fehér, lemezes, gyöngyházfényű, alig savanyú ízű jegeczipor. 25 r. hideg, 3 r. forró vízben. 15 r. borszeszben oldódik. Antisepticum. Bels. ritkán (hányásnál, sarcina ventriculi esetén); adag porban 0,3—1,0 pro dos.; vagy 4%-os vizes oldatban evőkanalanként; pro die 1,0—3,0. Helybelileg s külsőleg használat: sebkezelésnél, torok- és szájvíznek 2—4%-os oldat, hólyagmosásra 2%-os langyos oldat; gégebe, fülbe befúvásokra substantiában; kenőcsökhöz 1:5—10. Ara 10,0 = 6 kr. (crystall) v. 10,0 = 8 kr. (pulver.)

23 *Rp.* Acid. Borici pulv.
Cere alb. āā 5,0.
Olei Amygdal. dulc.
Paraffini āā 10,0.
M. f. ungu.
℞. Kenőcs. (LISTER.)
46 kr.

25 *Rp.* Acid. Borici.
Sulfur. præcip. āā 1,0.
Vasellini 48,0.
M. f. ungu.

℞. Kenőcs. Herpes tonsuransnál 2-szer napj. a beteg helyeket szappannal lemosás után bedörzsölni. (BESNIER.)
60 kr.

24 *Rp.* Acid. Borici 10,0.
Vasellini 50,0.
M. f. ungu.
℞. Kenőcs égési sebekre.
69 kr.

26 *Rp.* Acidi Borici 10,0.
Aquæ dest. 500,0.
℞. Hólyagmosásra. Használat előtt langyossá melegítendő.
55 kr.

27 *Rp.* Acid. Borici 6,0.
Aquæ font. 300,0.
Olei Menthae pip. gtt. 3.
℞. Száj-, torokvíz.
37 kr.

†II. Acidum carbolicum seu Acid. phenylicum, s. Phenolum [$C_6H_5(OH)$]. Fehér v. kissé vöröses, áttetsző, jegezes tömeg; szaga jellemző, íze maró. 35–40° C.-nál megolvad. Oldható 20 r. vízben, borszeszben, ætherben, chloroformban, glycerinben, zsíros és illó olajokban minden arányban. Antisepticum, antirheumaticum. Bőrről, nyákhártyákról, sebekről könnyen felszívódik, ezért vigyázat! különösen gyermekeknél!! Sebek mosására, öblítésére, borongatásokra, eszközök tisztítására 2½–5%-os oldatok, hólyagmosásra, húgycsőbe fecskendésre 1½–5%-os oldat, torok-szájvíznek 1%-os, belégzésre permete alakjában ½–1%-os, bőr alá fecskendésre v. parenchymába hefecskendésre 1–2%-os oldatok. Catgut 5%-os olajoldatban, szivacs, drainsövek, selyem, 5%-os vizes oldatban tartandók. Belsőleg 0.01–0.101 pro dos. napj. többször. Dos. maxim. pro die 0.50! 10,0 = 5 kr.

28 Rp. Acid. carbol. 3,0–15,0.
Aquæ dest. 300,0.
MDS. Külsőleg. Sebkezeléshez. 45 kr.

30 Rp. Acid. carbol. 1,0–2,0.
Olei Terebinth. 30,0.
MDS. Külsőleg.
3–4-szer napj. a torok ki-
ecsetelendő diphtheritis-
nél; a bőr ecsetelendő ery-
sipelasnál.
26 kr.

32 Rp. Acid. carbol. 5,0.
Collodii aa 5,0.
MDS. Caries dentiumnál gya-
potra felvéve a fogűrbe.
24 kr.

34 Rp. Acid. carbol. 5,0.
Spiritus 10,0.
MDS. 5–8 cseppet a Cursch-
mann-féle álarcz segélyével
belélegezni.
Gangrena pulmon. Bron-
chitis foetida.
24 kr.

29 Rp. Acid. carbol. 0.5–1,0.
Aquæ Calcis.
Aquæ dest. aa 100,0.
MDS. Torokvíz gyermekek-
nek diphtheritisnél.
25 kr.

31 Rp. Acid. carbol. 1,0.
Glycerini 10,0.
MDS. Torok ecsetelésre diph-
theritisnél.
23 kr.

33 Rp. Acid. carbol. 1,0.
Ungu. simpl. 10,0.
M. f. ungu.
DS. Bőrre dörzsölni parasiti-
cus bőrbántalmaknál.
30 kr.

35 Rp. Acid. carbol. 2,0.
Aquæ dest. 150,0.
Olei Menthae pip. gtt. 5.
Spir. dil. 20,0.
MDS. Belégzésre. Siegle-fele
készülékkel.
Gangrena pulmon. Absces-
sus pulmon.
39 kr.

36 *Sp.* Acid. carbol. 0,2.
Aqua dest. 10,0.
M. filtra.

DS: Bőr alá fecskendésre.
 $\frac{1}{2}$ 1 fecskendővel polyarth-
ritis rheumaticánál.
24 kr.

38 *Sp.* Acid. carbol. 0,5.
Aqua dest. 150,0.

MDS: 2 ór. 1 evőkan.
Gyomorban erjedés ellen.
28 kr.

40 *Sp.* Acid. carbol. 5,0.
Aqua dest. 150,0.

Aqua Menthae pip. 50,0.
MDS: 2—4-szer napj. 1. kk.
Diabetes mellit. (Esterl.)
41 kr.

37 *Sp.* Acid. carbol.
Ammon. pur. liquid.
aa 5,0.

Spiritus.
Aqua dest. aa 10,0.
MDS: Szaglószer heveny co-
ryzánál.
22 kr.

39 *Sp.* Acid. carbol. 1,5.
Extr. Liquir. dep.
Pulv. rad Liquir. aa qu. s.
ut. f. Pilul. Nr. 30.
consp. pulv. Liquir.

DS: 2 ór. egy szemel.
Prurigo, psoriasis.
38 kr.

H. Acidum carbolicum crudum. Sárgásbarna folyadék.
Csupán desinfectióra használtatik (árnyékszék, pöczegödörök,
istállók stb.) vízdíjatban (5%) v. gypsszel, szénmel, krétával porrá
alakítva. Jó keverék p. o. Acid. Carbol. crud. 2 r., calcium
hydroxyd. 5 r., gypsum ust. 20 r., kőszén 10 r. Szobák me-
szelésére 100 r., mésztejhez 2 r. acid. carbol. crud. 100,0 = 11 kr.,
200,0 túl 100,0 = 9 kr.

H. Acidum carbolicum liquidum. Ebből 1,1 grm. =
1,0 grm. acid. carbol. 10,0 = 5 kr.

H. Aqua carbolata. 1%-os oldat. 100,0 = 8 kr.

Carbolic költözőszerek.

H. Gaze carbolatum album Listeri. 1 meter = 40 kr.,
5 meter = 170 kr.

H. Tela sericea protegens. (Silk protective Listeri)
600□ cm. = 40 kr.

H. Lana gossypii carbolata (carbolwatta) 25,0 = 20 kr.,
50,0 = 35 kr., 100,0 = 65 kr.

H. Chorda carbolata. (Catgut.) Egy üveggel = 85 kr.

H. Filum sericeum antisepticum. (Carbolic varróselyem)
Egy üveg = 60 kr.

H. Tubuli praeparati carbolati. (Drainage-csővek.)

Acidum chloro-nitrosus s. Aqua regia. Keverék, mely-
ben acid. hydrochlor. conc. 3 r., acid. nitric. conc. 1 r. fog-

laltatik. Csupán lábfürdőkhez icterus chronicus esetén. (30,0—50,0 10—20 liter vízre. Fakád!) 10,0 = 3 kr.

†H. **Acidum chromicum** (CrO_3). Piros, fénylő, szagtalan, légen elfolyósodó prismaticus jegeczek; vízben, borszeszben jól oldódik. Causticum. Küls. condylomák, szemölcsök, teleangiectasiák, polypusok ételésére. Kutaszra ráolvasztandó. Ha oldatban alkalmaztatik, a környező bőr v. nyákhártyafelület olajjal beecsetelendő védelmi szempontból. Bels. nem. 1,0 = 2 kr.

†H. *Ap. Acid. chromici.*

Aque dest. aa 5,0.

℞ in vitro cum epist. vitreo bene clauso.

§. Külsőleg edzésre. 37 kr.

Acidum chrysophanicum ($C_{15}H_{10}O_4$). Bronzsárga finom tűk, vízben nem, borszeszben nehezen, aetherben, chloroformban, benzolban jól oldódnak. Nem azonos a chrysarobinnal, azonban úgy és oly czélokra használtatik. Használatot l. Chrysarobin. cz. a. Adag kenőcshez 0,5—1,0; 10,0. 1,0 = 5 kr.

†H. **Acidum citricum** ($C_6H_8O_7 + H_2O$). Nagy, színtelen, rhombos jegeczek, savanyú ízűek, vízben, borszeszben jól oldódnak. Gyenge antipyreticum, inkább hűtőszér; substantiában kevésbé maró. Bels. oldatban adag: 2,0—5,0; 150,0 2 ór. 1 evők. Saturatiókhoz succus citri helyett; 1,0 szénsavas sőt telít 0,65 acid. citricum. 10,0 = 11 kr., (crystall) 10,0 = 1/4 kr. (pulver).

Acidum fluoricum, s. fluorhydricum (FHH). Az orvosi czélokra szolgáló készítmény a FHH-nak vizes oldata, mely tiszta, színtelen, erősen savanyú, üveget edző folyadék, s ezért vulkanisált kautschuk-edényekben tartandó. Ujabban tüdőtuberculosisnál használják belégzések alakjában; a folyadékból elillanó gáz levegővel erősen hígítandó (1 r. FHH: 5000—6000 r. levegővel); az ily légkeverék külön e czélra berendezett készülék segítségével légzendő be.

†H. **Acidum nitricum concentratum purum** (HNO_3). Színtelen, maró, hevítve elillanó folyadék. Küls. lábfürdőkhez icterus chronicus esetén, mint az acid. chloro-nitrosum. Mint causticum condylomák, szemölcsök, marási sebek, méhészajerosiók, noma ételésére; üvegbot v. üvegecsét! Bels. nem. 10,0 = 3 kr.

Acidum nitricum fumans. Keveréke légenysavnak és allégenysavnak. Pirosas barnás v. sárgás, fojtó szagú, sárga gőzöket bocsátó folyadék. Küls. mint az acid. nitr. conc pur. Bels. nem. 10,0 = 3 kr.

†H. **Acidum nitricum dilutum.** (200,0 töm. légenysav + 800,0 víz) Küls. edzésre. Bels. gyenge antipyreticum; adják morbus Brighti-nél és icterus catarrh. chron.-nál is. Adag oldatban: 1,0—2,0; 150,0 2 ór. 1 evők. 100,0 = 11 kr.

- 42 *Rp.* Acid. nitrici dil. 2,0.
 Aquæ dest. 150,0.
 Syrupi simpl. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
 28 kr.
- 43 *Rp.* Acid. nitrici dil.
 Aquæ dest. aa 15,0.
MDS. Külsőleg.
 Fagydagاناتok 2 × napj.
 üvegeccsettel ecsetelendők.
 17 kr.

11. **Acidum hydrochloricum dilutum** (*HCl*). Tömény só-sav 4 r. + víz 6 r. Víziszta, savanyú folyadék. Bels. mint gyenge antipyreticum 2,0 : 150,0 2 ór. 1 evök. Digestivum dyspepsiák bizonyos eseteiben; adag 10–15 csepp 1 pohárka vízre, étkezés közben fogyasztandó el. 100,0 = 18 kr.

- 44 *Rp.* Acid. hydrochlor. dil. 2,0.
 Aquæ dest. 150,0.
 Syrup. Rubi Idavi 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
 27 kr.
- 45 *Rp.* Acid. hydrochlor. dil.
 20,0.
 D. in vitro cum epist.
 vitreo bene clauso.
 §. 10 cseppel 1 vörösburos
 pohár vízre. 21 kr.

- 46 *Rp.* Acid. hydrochlor. dil. gtt 5–8.
 Aquæ dest. 80,0.
 Syrup. simpl. 8,0.
MDS. 2 ór. 1 kk., gyk.
 Gyermek dyspepsiájánál, ha a hányadék alcalicus kémhatású.
 26 kr.

Acidum hyperosmicum (*OsO₄*). Fénylő, átlátszó, sárgás jegeztük, szürös szaggal, illók. Vízben könnyen oldódik. Világosságon fémosmium válik ki, ép úgy szerves anyagok jelenlétében is. Üveg dugós fekete üvegben rendelendő. Antineuralgicum, antiepilepticum. Bőr alá fecskendések alakjában rendeltek. Fecskendések az arezon ne történjenek! Adag 0,002–0,01 pro dos.

- 47 *Rp.* Acid. hyperosmici 0,1.
 Aquæ dest. 10,0.
MDS. in vitro nigro cum epist. vitreo bene clauso.
 §. Bőr alá fecskendésre. Az orvos kezéhez.
 1/5–1 fecskendővel egyszerre.
 40 kr.

Acidum lacticum (*C₃H₆O₃*). Színtelen, szörpsűrűségű, savanyú, szagtalan folyadék; vízben, borszeszben, ætherben, glycerinben jól oldódik. Oldja a croup hártját. Töményen maró. Concentráltabb oldatokban gümös gégefekélyek edzésére. Bels. mint hypnoticum megbízhatlan; diabetes mellit.-nál CANTANI

ajánlja. Adag: belégzésekre 5,0—15,0 : 200,0, bels. 5,0—10,0 : 150,0. 1,0 = 6 kr.

48 *Rp.* Acid. lactici 10,0.
Aque dest. 200,0.
MDS. Belégzésre (Siegle-féle
porlasztóval) $\frac{1}{2}$ —1 órán-
ként. Group, diphtheritis.
80 kr.

49 *Rp.* Acid. lactici
Aque dest. aa 30,0.
MDS. Gümös gégefekélyek
ecsetelésére.
1 frt 96 kr.

50 *Rp.* Acid. lactici 5,0.
Aque dest. 150,0.
Syrup. cort. Aurant. 50,0.
MDS. 3-szorra elfogyasztani 1 nap
alatt. Diabetes mellit.
90 kr.

II. **Acidum phosphoricum** (H_3PO_4). Orthophosphorsav vizes
oldata. Szintelen, szagtalan, savanyú folyadék. Bels. gyenge
antipyreticum. Adag 2,0—4,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 4 kr.

51 *Rp.* Acid. phosphor. 3,0.
Aque dest. 130,0.
Syrup. Rubi Idaei 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők. mérsékes
láznál.
30 kr.

52 *Rp.* Decoct. tuber. Salepe 1,5.
l. a. p. ad colat. 120,0.
Acid. phosphor. 3,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
Tinct. Cinnamomi 10,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
Menorrhagia, metrorrhagia.
43 kr.

53 *Rp.* Acid. phosphor. 1,0.
Aque dest. 100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
Gyermekeknek cystitis ca-
tarrh.-nál alkalikus kém-
hat. vizelet esetén.
24 kr.

III. **Acidum pyrogallicum s. Pyrogallolum** ($C_6H_6O_3$).
Fehér, könnyű, erősen fénylő lemez vagy túalakú jegeczek. Víz-
ben elég könnyen, borszeszben, ætherben igen jól oldódik.
Bels. nem. Küls. némely idült bőrbaj ellen kenőcs 1 : 10—20.
Nagyobb bőrfelületeket óvakodjunk bekenni, felszívódik a bő-
rön át, vesevérzések nem ritkák. Phagedenicus fekélyekre hintő-
por alakjában. 1,0 = 8 kr.

- 54 *Rp.* Acid. pyrogallici 1,5—
3,0.
Vaselinæ 30,0.
M. f. ungu.
D^S. Kenőcs.
Psoriasis, lupus.
57 kr.
- 55 *Rp.* Acid. pyrogallici 10,0.
Amyli 40,0.
M. f. pulv. det in vitro
cum epist. vitreo clauso.
S. Hintőpor.
Kautschuk-ballon segítségével
1—3 millimeter vastagon
ráhinteni phagedenicus fe-
kélyre, gyapottal befödni.
1 frt 14 kr. (VIDAL.)

H. Acidum salicylicum crystallisatum ($C_7H_6O_3$). Fehér, lüalakú jegeczekből álló por, íze édeses savanyú, fanyar; 538 r. hideg vízben oldódik, melegben könnyebben, ép úgy glycerinben, borszeszben igen könnyen. Küls. mint antisepticum. Kenőcshöz 1 : 20—30, sebmosó vízhez 1 : 300, hintőporba 1 : 30 talcum v. amyllum, v. bolus alba-hoz, hólyagmosásra 1 : 500—1000. Bels. antipyreticum, antirheumaticum, de helybeli maró hatása miatt ma már ritkán rendeltek, helyette sokkal célszerűbb a natr. salicyl. vagy a salol. 1,0 = 3 kr. 10,0-tól 10,0 = 25 kr.

- 56 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
Axung. porci 2,0.
Lanolini 7,0.
M. f. ungu.
D^S. Kenőcs.
Eccema, ichthyosis. (RABOW)
36 kr.
- 57 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
Vaselinæ 25,0.
Amyli
Zinci oxyd. aa 12,5.
M. f. pasta.
D^S. Külsőleg.
Eccema. (LASSAR.)
60 kr.
- 58 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
Vaselinæ 30,0.
Tinct. Benzoes 2,0.
M. f. ungu.
D^S. Kenőcs. 3-szor napj. használandó.
Atonicus fekélyek, eccema capitis. 39 kr.
- 59 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
Collodii flexil. 10,0.
MⁱD^S. Külsőleg ecsetelésre.
Tyükszemek kiirtására.
35 kr.
- 60 *Rp.* Acid. salicyl. 3,0.
Amyli 10,0.
Talc. venet. 87,0.
M. f. pulv.
Det in scatula.
S. Hintőpor. Lábak izzadása, phthisicusok éjjeli izzadása ellen. 39 kr.
- 61 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
Aquæ dest. 500,0.
MⁱD^S. Hólyagmosásra. Használat előtt langyosra melegítendő. 39 kr.
- 62 *Rp.* Acid. salicyl. 1,0.
Acid. borici 6,0.
Aquæ dest. ferv. 300,0.
MⁱD^S. Sebkitőzéshez. Használat előtt langyosra melegítendő. 40 kr.

Salicylsavas költözöszerrek.

II. Lana Gossypii salicylata. (Salicylwatta.) 25,0 = 25 kr.
50,0 = 45 kr. 100,0 = 75 kr.

Gaze salicylatum. Nem hiv.

Acidum sozolicum l. Aseptolum.

Acidum sclerotinicum ($C_{12}H_{19}NO_9$). A secale cornutum egyik hatóanyaga. Sárgás, néha sárgásbarna, gyengén savanyú kémhatású, vízszívó por; vízben jól, borszeszben igen nehezen oldódik. Vizes oldatban könnyen bomlik. Vérzéseknél ergotin helyett bőr alá fecskendés alakjában. Adag: 0,04–0,05 pro dos. 0,1 = 15 kr.

63 Rp. Acid. sclerotinici 0,5.

Aquæ dest. 10,0.

M. filtra.

℞. Bőr alá fecskendésre.

Az orvos kezéhez.

1,2–1 fecskendővel egyszerre.

96 kr.

III. Acidum sulfuricum concentratum (H_2SO_4). Szintelen, szagtalan, olajszerű folyadék. Mint gyógyszer nem haszn. 10,0 = 2 kr.

IV. Acidum sulfuricum dilutum. Tömény kénsav 106,4 grm., + víz 1000 gm. Szintelen, áttetsző folyadék. Küls. mint izgató, összehúzó vérzékeny fekélyekre 1 : 10–30. Bels. gyenge antipyrelicum; szokásos szer palpitation cordis nervosa s metrorrhagia eseteiben. Adag 2,0–3,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 100,0 = 7 kr.

64 Rp. Acid. sulfur. dil. 50,0.

Aceti 300,0.

Spirit. dil. 130,0.

Mel. dep. 100,0.

℞℞. Külsőleg.

(Aqua vulneraria Thedeni.)

72 kr.

66 Rp. Acid. sulfur. dil. gtt. 10.

Aquæ dest. 80,0.

Syrup. Rubi Idæi. 20,0.

℞℞. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

3–6 éves gyermeknek.

26 kr.

65 Rp. Acid. sulfur. dil. 2,0.

Aquæ dest. 130,0.

Syrup. Rubi Idæi 20,0.

℞℞. 2 ór. 1 evők.

26 kr.

67 Rp. Decoct. cort. Chinae suc-

cirubr. e 4,0.

l. a. p. ad colat. 100,0.

adde.

Acid. sulfur. dil. gtt. 10.

Syrup. cort. Aurant. 15,0.

℞℞. 2 ór. 1 gyk.

5 éven túli gyermekeknek morbus maculosus Werlhofii esetén. 40 kr.

II. Liquor acidus Halleri s. Elixirium acidum Halleri. Spiritus conc. 150 grm. + acid. sulfur. conc. 50 grm. Atlátszó, sárgás színű, szesz és aether szagú folyadék. Küls. a a bőr mosogatalására urticariánál 1 : 100; scorbuticus foghús esetelelésére 1 : 10. Bels. mint az acid. sulfur. dilut. melynél az étvágyat állítólag kevésbé romlja. 10,0 = 3 kr.

Acidum sulfurosum (SO_2). Keletkezik, ha ként elégetünk. Színtelen fojtó szagú gáz. Erős desiniciens. Helyiségek desinfectiójára 1 köbméter légtérre 9—10 grm. kén kell, mely agyagedényben égetendő el; lehet a ként szénporral keverve vastálczán is elégetni. Bels. az 5%-os vizes oldat Angliában gyakran használtatik e név alatt, gyomorban erjedés, typhus abdom. scarlatina, cholera eseteiben; adag ezen készítményből: 0,5—4,0 pro dos. 3—4 × napj. erősen hígítva. 5%-os oldalból 10,0 = 2 kr.

II. Acidum tannicum s. Tanninum ($C_{14}H_{10}O_9, 2H_2O$). Sárgásfehér, fanyar, összehúzó ízű por. Egyenlő mennyiségű langyos vízben, kétannyi borszeszben oldódik, 6 r. glycerinben. Adstringens, stypticum. Küls. száj-, torok-, szemvíznek, klysmának, hügyesőbe fecskendésre, hólyagmosásra 1 : 100—200, permete alakjában belégzésre 0,5—4,0 : 200, kenőcsbe 1 : 5—10, torok, gége esetelelésére 1 : 5—10. Bels. 0,05—0,5 pro dos. többször napj. porban, pilulában. Gyomoremésztést megrontja, pep-sint, peptonokat lecsapja. 10,0 = 15 kr. 100,0-tól 10,0 = 13 kr.

68 Rp. Acid. tannici	1,0.	69 Rp. Acid. tannici	2,0
Aquae amygdalar. amar.	20,0.	Ungu. simpl.	20,0—30,0.
Aquae dest.	100,0.	M. f. ungu.	
℞℞ Szemviz.		℞℞ Kenőcs.	
Conjunctivitis catarrh.		Mehszáj erosioknál tamponirozásra.	
39 kr. (DESMARRES.)		39 kr.	

70 Rp. Acid. tannici	1,5.	71 Rp. Acid. tannici	0,2—1,0.
Butyri Cacao. qu. s.		Aquae dest. seu Vini rubr.	
ut. f. l. a. suppositoria			200,0.
No. 5.		℞℞ Hügyesőbe fecskendésre.	
℞℞ Tanninesapocskák.		22—56 kr.	
61 kr.			

72 Rp. Acid. tannici	0,3—0,4.	73 Rp. Acid. tannici	2,0.
Pulv. Doveri	0,1—0,3.	Pulv. Doveri	1,0.
Sacchar alb.	3,0.	Elaeosacchar. Menthae	3,0.
M. f. pulv. div. in dos.		M. f. pulv. div. in dos.	
aqu. No. 10.		aqu. No. 10.	
℞℞ 2 ór. 1 port.		℞℞ 2 ór. 1 port.	
1—5 éves gyermeknek bélhurul esetén.		Felnőttek diarrhoeánál.	
31 kr.		39 kr.	

74 *Rp.* Acid. tannici 0,3—0,5.
Sacchari alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.

℞. 2 ór. 1 port.

1—5 éves gyermeknek nephritis scarlatinosa esetén.
30 kr.

75 *Rp.* Acid. tannici 1,0.
Opii pur. 0,5.
Extr. Nucis vom. 0,15.
Extr. Cascariillæ qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Cassiæ Cinnamomi.

℞. 3 × napj. 2 szemet.

Diarrhœa. (GERHARDT.)
64 kr.

76 *Rp.* Acid. tannici 3,0.
Extr. Alæs aquos. 1,0.
Extr. Graminis qu. s.
ut. f. pilul. Nr. 100.
Consp. Lycopod.

℞. 3 × napj. 4 szemet.

Morbus Brighti. (FRERICHs.)

II. **Acidum tartaricum** ($C_4H_6O_6$). Hasábalakú, gyakran kéreggő összenőtt, szintelen, áttetsző, légálló jegeczek; íze savanyú. Oldódik = sr. vízben, $2\frac{1}{2}$ sr. borszeszben. Használat: adag mint az acid. citricum. 10,0 = 6 kr. (cryst.). 10,0 = 8 kr. (pulver.)

III. **Aconitum Napellus. Tubera.** (Ranunculaceæ). Hatóanyagai 1. aconitin. 1. alatt. 2. pseudoaconitin ($C_{36}H_{49}NO_{12}$). Nem használtatik, helyette készítményei.

III. **Extractum Aconiti.** Borszeszes kivonat dextrinnel szárítva. Fájdalomcsillapító neuralgiáknál; haszn. mind küls., mind bels. Kenőcshez 1 : 5—10. Bels. 0,005—0,03! pro dos. 0,025—0,12! pro die. Változó erélyű, megbízhatlan készítmény. 1,0 = 7 kr.

III. **Tinctura Aconiti.** Haszn. mint az extractum. Adag bels. 3—5 csepp pro dos. többször napj. Dos. maxim. sing. 0,5! Dos. maxim. pro die 1,5! 10,0 = 7 kr.

III. **Aconitinum germanicum** ($C_{30}H_{47}O_7N$). Fehér v. sárgás, szagtalan por, keserű, égető ízű; hideg vízben kevésbé, forróban 50—60 részben, borszeszben, sósavas vízben jól oldódik. Haszn. mint az extr. aconiti. Küls. kenőcshez 0,02—0,04 : 10,0, melyből borsónyi használandó el egyszerre. Bels. 0,0005—0,001! pro dos. 2—3 × napj. Dos. maxim. pro die 0,002! 0,1 = 3 kr.

Aconitinum nitricum, mint az aconitin. german.

77 *Rp.* Aconitini german. 0,05.
 solve in
 Chloroform. qu. s.
 adde.
 Ungu. emollient. 20,0.
 M. f. ungu.

℞S. Aconitin-kenőcs. Borsó-
 nyi használandó el 2 ×
 naponk.

Neuralgia.

48 kr.

78 *Rp.* Aconitini german. 0,02.
 Extr. Hyosciami 0,5.
 Argillæ alb. qu. s.
 ut. f. cum gtt. nonnull.

Aquæ dest. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Argillæ alb.

℞S. 2 × napj. 1 szemel.

Neuralgia.

39 kr.

Adonis vernalis. Herba. (Ranunculaceæ). Hatóanyaga az adonidin (glucosida), melynek vegyképlete még nincs pontosan meghatározva. Hatása mint a fol. digitalisé, de erősebb diureticum, s e tekintetben közel áll a scillához. Nem cumulativ hatású. Adag: infus. 3,0—6,0; 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 8 kr.

Adonidinum. Szintelen v. fehéressárga, amorph por, keserű, borszeszben jól, vízben, ætherben kevésbé oldódik. Hatás, mint a herba adonis vern. Adag porban, pilulában 0,005 pro dos. 2—4-szer napj. 0,01 = 20 kr.

79 *Rp.* Infus. herb. Adonis
 vern. e 3,0—6,0.
 l. a. p. ad colat 140,0.
 Oxytel Scilla 10,0.

℞℞S. 2 ór. 1 evők.

41 kr.

80 *Rp.* Adonidini 0,15.
 Pulv. et extr. Liquirit.
 qu. s.

ut. f. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Liquir.

℞S. 3 ór. 1 szemel.

3 frt 37 kr.

H. **Aether aceticus** ($C_4H_8O_2$). Tiszta, átlátszó, könnyen mozgó, erősen illó, kellemes zamatu folyadék. Küls. bedörzsölésre rheumaticus fájdalmaknál, Bels. mint az æther. sulfur. 10,0 = 9 kr.

H. **Aether depuratus seu sulfuricus** ($O_4H_{10}O$). Tiszta, átlátszó, szintelen, könnyen mozgó, erősen illó folyadék, sajátos szaggal, 34—36° C.-nál forr. Küls. haszn. bedörzsölésre rheumaticus fájdalmaknál, bőrön véghez viendő kisebb műtéteknél érzéstelenítésre a Richardson-féle spray segélyével. Bels. 5—20 csepp v. 1/2—1 fecskendővel subcután mint excitans. Tisztán, vagy chloroformmal aa belégeztetve jó narcosist ad. 10,0 = 4 kr.

81 *Rp.* Aether. dep. 20,0.
 Olei Terebinth. 8,0.

℞℞S. 15—30 cseppet

3—4-szer napjában.

Durand-féle szer epekökő-
 lika ellen.

31 kr.

82 *Rp.* Aether. dep.
 Tinct. Valerian. æth. aa
 15,0.

℞℞S. 15—30 cseppet egy-
 szerre.

Excitans.

37 kr.

II. Spiritus æthereus s. Liqueur anodynus Hoffmanni.

(Aether dep. 100 grm. + Spiritus 300 grm.). Szaglószer. Bels. excitans 10–30 csepp czukorra cseppentve v. mixturában. 50,0 = 15 kr.

Aether petrolei s. Ligroine. [$C_nH_{(2n+2)}$ képletű szén-kőenyek keveréke; főleg anylkőeny]. Szintelen, illó, könnyen lobbanó folyadék (vigyázat gyertyával, gyufával!). Haszn. helyi anaesthesia eszközlésére. A Richardson-féle «Compound anaesthetic fluid for local anaesthesia» című szerben van: aether petrolei 4 r. + aether dep. 1 r. 10,0 = 3 kr.

Aethoxy-cafeinum [$C_8H_9(OC_2H_5)_4O_2$]. Olyforma hatása van mint a cocainnak. 20%-os vízdoldatból 1 fecskendővel lór alá fecskendve helybeli érzéketlenség jelentkezik. (Ceola.) Dujardin-Beaumez hemicraniánál dicséri hatását. 0,2–0,5-os adagokra az üterekben a feszülés emelkedik, pulsus 2–6 ütéssel szaporodik, emelt közérzet; később az arcz kipirul, csekély izzadás. Némelyek szerint az alvást is előmozdítaná. (?)

33 Rp. Aethoxy-cafeini 0,2.
Aque dest. 10,0.
Midd. 20% oldat bőr alá fecskendésre; az orvos kezéhez.

34 Rp. Aethoxy-cafeini
Natr. salicylici aa 0,25.
Cocaini hydrochlor. 0,02.
Aqua dest. 20,0.
Syrup. simpl. 10,0.
Midd. Egyszerre bevenni.
(Dujardin-Beaumez.)
Hemicrania.

Aethylenum chloratum s. Liqueur hollandicus. ($C_2H_4Cl_2$). Szintelen, chloroformszagú folyadék. Küls. mint elvonó bedörzsölésekre tisztán v. mint linimentum 1:3–5. Belégezve narcosis. Ritkán használtatik. 1,0 = 8 kr.

Aethylidenum chloratum s. Aethylidenum bichloratum ($C_2H_4Cl_2$). Isomer az aethylen. chlorat.-al. Szintelen, chloroformra emlékeztető szagú folyadék. Belégeztetve jó narcosist ad; állítólag a szívre kevésbé veszélyes mint a chloroform. (Liebreich.) 1,0 = 15 kr.

Aethylum bromatum s. Bromæthyl (C_2H_5Br). Szintelen, kellemes szagú, illó, könnyen mozgó folyadék; 39° C.-nál forr. Küls. spray alakjában helyi anaesthesiára haszn. Belégeztetve általános anaesthesia az eszmélet épsége mellett. Adag nagyon változó. Szívbjak esetén ellenjavalt. Hystericus, epilepticus görcsök ellen 4–5 gm. lassanként kendőre csepegtetve belégzendő. 1,0 = 10 kr.

Agaricinum. A fungus laricis v. agaricus albus hatóanyaga; valószínűleg azonos az agaricinsavval ($C_{16}H_{30}O_5 + H_2O$). Fehér, jegeczes por. Antihydroticum, különösen phthisicusok éjjeli izzadásánál. Hatás 5–6 óra múlva. Gyenge diureticum. Adag bels.

0,005—0,01 pro dos. egyszer-kétszer. Subcután igen fájdalmas!
0,01 = 1 kr.

85 *Rp.* Agaricini 0,15.
Pulv. Liquirit.
Mucil. Gummi arab aa
qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
℞. Este lefekvés előtt 2—3
órával 1—2 szemet; hajnal-
ban ismét.

51 kr.

86 *Rp.* Agaricini 0,1.
Morphini hydrochlor.
0,05.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqu. No. 10.
℞. Este 1 port.

41 kr.

H. Agaricus chirurgorum. (Polyporus fomentarius. Fungi. Hymenomyces.) Taplógomba. Hajszáledényes vérzéseknél vér-
zésesillapító. 10,0 = 4 kr.

†**H. Aloe.** Külömböző aloefajok leveleinek besűrített tejnedve.
Gyantászerű, fénylő, fekete vagy feketésbarna, kagylós törésű,
keserű ízű darabok. Hatóanyaga az aloin ($C_{34}H_{36}O_{14} + H_2O$
a barbadosi aloeből), mely hideg vízben nehezen, forró vízben,
borszeszben könnyen oldódik, jegecses. Bels. 0,02—0,05 pro
dos. 2—4-szer napj. mint amarum, 0,2—0,3 pro dos mint
laxans, 0,5—1,0 pro dos. mint drasticum hat; utóbbi adagok-
ban ellenjavallt használat, terhesség, könnyen vérző aranyér ese-
teiben. 10,0 = 3 kr. v. 10,0 = 4 kr. (pulv.).

†**H. Extractum Aloes.** Vizes kivonat, száraz, porítható.
Kétszer oly hatékony mint az aloe, ezért felényi adagok
adandók. 10,0 = 16 kr.

†**H. Tinctura Aloes.** Amarum. Adag 5—20 csepp pro dos.
10,0 = 5 kr.

H. Pilulae laxantes. Tartalmaznak aloet, jalapa-gumót,
natronszappant. Hashajtó adag 2—3 szem. 1 db = 1 kr.

87 *Rp.* Aloes pulv.
Extr. rad. Rhei chin
aa 2,0.
Extr. Belladonn. 0,1.
Extr. Taraxaci qu. s.
ut. f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Cassiae Cin-
nam.

℞. 2—3 szemet egyszerre.
Laxans.

49 kr.

88 *Rp.* Aloes pulv. 10,0.
Extr. China 5,0.
Pulv. cort. Cinnam. 2,0.
Syr. cort. Aurant. 3,0.
M. f. pilul. No. 100.
Consp. pulv. Cassiae Cin-
nam.

℞. Evés előtt 1—2 szemet.
Tonicum, stomachicum.
1 frt 9 kr.

89 *Rp.* Extr. Aloes.
 Extr. rad. Rhei chin.
 Ferri lactici $\overline{aa}$ 2,0.
 Pulv. et. succi Liquirit.
 $\overline{aa}$ qu. s.
 ut f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Liquirit.
 28. 1—2 szemet reggel, este.
 Chlorosis et obstip. habit.
 61 kr.

91 *Rp.* Extr. Aloes.
 Fel tauri inspiss. $\overline{aa}$ 2,0.
 M. f. pilul. No. 30.
 Obduc. Keratino.
 28. 3 $\times$ napj. 3 szemet.
 Icterus cum obstipatione.
 90 kr.

90 *Rp.* Extr. Aloes.
 Pulv. rad. Rhei chin.
 $\overline{aa}$ 1,0.
 Extr. Colocynth.
 Gummi Gutt $\overline{aa}$ 0,5.
 Pulv. rad. Althææ
 Mucil. Gummi arab. $\overline{aa}$
 qu. s.
 ut. f. pilul. No. 30.
 28. 1—2 szemet naponta.
 Drasticum.
 48 kr.

92 *Rp.* Tinct. Aloes.
 Tinct. Chinæ comp.
 $\overline{aa}$ 15,0.
 28. 3 $\times$ napj. 15—30 cseppet.
 Amarum.
 31 kr.

H. **Althææ radix.** (Malvaceæ.) Hatóanyagai növényi nyák, keményítő. Pora pilula alapanyag mucil. gummi arab.-al, pilulahintő por. Decoct. 1 : 10 nyákos, bevonó folyadék száj-, torokvíznek, különben csipős anyagoknak jó vehiculum. 100,0 = 20 kr. 200,0-tól 100,0 = 17 kr. 10,0 = 6 kr. (subt. pulv.).

H. **Althææ folia.** Hatóanyaga növényi nyálka. Decoct. 1 : 10 nyákos, bevonó folyadék. 100,0 = 10 kr. 200,0-tól 100,0 = 8 kr.

H. **Species Althææ.** (Rad. és fol. althææ, rad. liquirit. flor. malvæ.) Egy csésze theára (infus.) egy tetézt evőkanálnyi veendő. 100,0 = 16 kr. 200,0-tól 100,0 = 14 kr.

H. **Syrupus Althææ.** Kellemes izjavító. 10,0 = 3 kr.

93 *Rp.* Decoct. rad. Althææ e 10,0.
 l. a. p. ad. colat. 300,0.
 Tinct. Opii simpl. 2,0.
 Syrup. Althææ 20,0.
 28. 28. Száj-, torokviz.
 Stomatitis- v. angina catarrh.-nál.
 44 kr.

H. **Alumen** [$K_2Al_2(SO_4)_4 \cdot 24H_2O$]. Szintelen, áttetsző, kemény octarderek vagy kristálydarabok, levegőn könnyen elmalnak. 10 $\frac{1}{2}$ sr. vízben oldódik, oldat savanyú kémhatású, összehúzó, édeses savanyú ízű. Adstringens, stypticum, gyenge antisepticum. Küls. teli fürdőre 100—150 gm., száj-, torokvízhez, hüvely kimosására 2,0—5,0 : 100,0, húgycsőbe fecskendésre 0,5 : 100,0, kenőcsre 1 : 10—20. Bels. porban, pilulában, nyá-

kos oldatban 0,1—0,5 pro dos., 0,5—2,0 pro die. 10,0 = 2 kr. (subt. pulv.).

H. Alumen nustum [$K_2Al_2(SO_4)_4$]. Fehér por, 25 sr. vízben lassan oldódik. Substantiában hintőpor vérző sebekre. 10,0 = 3 kr. (subt. pulv.).

94 *Rp.* Aluminis 0,5.
Aque Feniculi 50,0.
MdS. Szemcseppek.
Conjunct. catarrh.
25 kr.

96 *Rp.* Aluminis
Zinci sulfur.
Acid. carbol. $\overline{aa}$ 0,3—0,6.
Aque dest. 200,0.
MdS. Húgycsőbe fecskendésre.
33 kr.

98 *Rp.* Aluminis 5,0.
Aque dest. 300,0.
Syrup. Moror. 30,0.
MdS. Száj-, torokvíz.
45 kr.

100 *Rp.* Aluminis 1,0.
Camphora trit. 0,5.
Ungu. emoll. 30,0.
M. f. ungu.
Ds. Kenőcs.
Pruritus vulvæ et ani.
51 kr.

101 *Rp.* Aluminis 1,0—2,0.
Pulv. Doveri 1,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
Ds. 2 ór. 1 port.
Diarrhœa, hæmoptœ, vesevérzés.
29 kr.

95 *Rp.* Aluminis
Plumb. acet. basic. solut. $\overline{aa}$ 1,0.
Aque dest. 200,0.
MdS. Húgycsőbe fecskendésre. Használat előtt felrázandó.
33 kr.

97 *Rp.* Aluminis 0,6.
Cupri sulfur. 0,03.
Aque dest. 200,0.
MdS. Húgycsőbe fecskendésre.
31 kr.

99 *Rp.* Aluminis
Kalii chlorici $\overline{aa}$ 3,0.
Aque dest. 150,0.
Syrup. Moror. 20,0.
MdS. Gyermekeknek száj-, torokvíz.
Stomatitis catarrh.-aphthosa, angina catarrh. tonsillitis follicul. Ha lenyelnek, puha rongyra itatni a folyadékot, s úgy mosogatni a beteg helyet.
45 kr.

102 *Rp.* Aluminis 4,0.
Morphini hydrochlor. 0,05.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
Ds. 3—4 port naponta.
Phthisicusok csillapíthatlan hasmenése ellen.
30 kr.

103 *Rp.* Decoct. tuber. Salep e 0,5.
 l. a. p. ad colat. 80,0.
 Aluminis 0,4.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 1—2.
 Syrup. simpl. 8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.

1 éves gyermeknek heveny bélhurut ellen. Ha collapsus lenne jelen, tinct. opii helyett tinct. valerian. gtt. 10.

43 kr.

H. Aluminium hydroxydatum [$Al_2(OH)_6$]. Fehér, könnyű, nyelvhez tapadó por, vízzel semleges hatású péppé elegyedik. Csak mint szárító hintőpor használtatik. 10,0 = 28 kr.

H. Ammoniacum. Gummi-resina. Izgató, oszlató tapaszok alkatrésze. Bels. azelőtt mint expectorans használtatott einulsio vagy pilula alakjában. Adag 0,3—0,5 pro dos. 1,5—3,0 pro die. 10,0 = 5 kr. (pulv.).

H. Ammonii caustici liquor (H_3N). Tiszta, átlátszó, színtelen, átható szagú, maró folyadék. 100 részben 10 sr. ammonia gáz van. Causticum. Küls. rovar-, -scorpio-csípések kiegészítésére. Bels. készítményei, főleg az ammon. carbon. 100,0 = 14 kr.

Ammonium-készítmények.

H. Ammonium aceticum solutum s. Liquor Ammonii acet. s. Spiritus Mindereri ($C_2H_7NO_2$). 15% ammonium aceticumot tartalmaz. Tiszta, átlátszó, színtelen, illó folyadék. Küls. mint desiniciens sebek kötözéséhez 1 : 5, száj, orr, hüvely kiöblítésére 1 : 20—30. Bels. mint diaphoreticum nyákos folyadékokban, syrupban 0,5—1,0 pro dos. napj. 3—4-szer. 10,0 = 5 kr.

104 *Rp.* Infus. flor. Sambuci e 10,0.
 l. a. p. ad colat. 150,0.
 Ammon. acet. solut. 10,0.
 Syrup. simpl. 20,0.

MDS. ór. 1—2 evők.

Diaphoreticum.

41 kr.

H. Ammonii anisati liquor s. Spiritus salis ammoniaci anisatus. (Ammonia 7,5 + Spirit. 30,0 + Ol. anisi 1,25.) Bels. kitűnő expectorans. Adag 5—20 csepp pro dos. napj. többször, nyákos oldatban. Köptetők hathatós adjuvansa. 10,0 = 5 kr.

105 *Rp.* Decoct. rad. Althææ e
 10,0.
 l. a. p. ad colat. 150,0.
 Liquor. Ammon. anisat.
 Vini stibiat. āā 5,0.
 Syrup. Ipecac. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
 Expectorans.
 45 kr.

106 *Rp.* Liquor. Ammon. ani-
 sat. 1,0.
 Syrup. Althææ 50,0.
 Syrup. Ipecac. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 2—4 éves gyermeknek.
 Bronchitis capill. Pneum-
 on. catarrh.
 32 kr.

Ammonium bromatum (NH_4Br). Fehér, jegeczes por, vízben könnyen oldódik. Antispasmodicum, sedativum. Adag: 0,1—1,0 pro dos. 3—4-szer napj. oldatban; leginkább kalium bromat. v. natrium bromat.-al együtt. 1,0 = 3 kr.

107 *Rp.* Ammon. brom.
 Natr. brom. āā 5,0.
 Aquæ Menthæ pip. 150,0.
MDS. Reggel, este 1 evök.
 68 kr.

108 *Rp.* Ammon. brom.
 Kalii brom. āā 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.
 Del. in. chart. cerat.
S. Naponta 2—3 port czuk-
 ros vízben. 44 kr.

Epilepsia, hysteropilepsia,
 delirium tremens.

H. Ammonium carbonicum ($C_2H_{11}N_3O_5$). Ammonium szagú, erősen lúgos, színtelen, kemény, szálasan jegeczes, légen elmálló illó anyag. 4 r. vízben lassan oldódik. Küls. mint bőr-izgató; kenőcshöz, linimentumhoz 1 : 30—50. Bels. mint ana-lepticum, excitans oldatban 1,0—2,5 : 150,0. 2 ór. 1 evök. 10,0 = 2 kr.

109 *Rp.* Ammon. carb. 5,0.
 Camphoræ trit. 1,0.
 Ungu. simpl. 30,0.
 M. f. ungu.
Ds. Kenőcs.
 31 kr.

110 *Rp.* Ammon. carb. 2,0.
 Aquæ dest. 130,0.
 Syrup. simpl. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
 33 kr.

111 *Rp.* Ammon. carb. 2,0.
 Camphoræ trit. 0,2.
 Gummi arab. pulv. 10,0.
 Subige et solve in
 Aqua dest. 130,0.
 adde
 Syrup. Althææ 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evőkan.
 54 kr.

112 *Rp.* Infus. rad. Ipecac. e 0,3.
 l. a. p. ad colat. 80,0.
 Ammon. carb. 0,5.
 Syrup. simpl. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
 2—5 éves gyermek. Pneumon.
 catarrh.
 42 kr.

H. Ammonium chloratum s. Sal Ammoniacum depur. s. Salmiak ($H_4.NCl$). Fehér, jegezes por, szagtalan, sós ízű, egyenlő r. forró vízben, 3 r. hidegben oldódik. Expectorans. Ellenjavallt magas láznál. Adag: permete alakjában belégzésre 1%-os oldat; bels. oldatban 2,0–4,0: 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 3 kr.

113 *Rp.* Ammon. chlorati 4,0.
Aque dest. 150,0.
Syrup. Ipecac. 10,0.
℞℥℥ 2 ór. 1 evők.
34 kr.

115 *Rp.* Decoct. rad. Althææ e
5,0.
l. a. p. ad colat. 100,0.
Ammon. chlor. 0,5.
Tinct. Opii simpl. gtl. 3.
Succi. Liquirit. dep. 5,0.
℞℥℥ 2 ór. 1 gyk.
3–6 éves gyermeknek.
45 kr.

114 *Rp.* Ammon. chlorati 5,0.
Tartar. stibiat. 0,03–0,05.
Aque Feniculi 150,0.
Syrup. Senegæ 10,0.
℞℥℥ 2 ór. 1 evők.
Erős expectorans.
46 kr.

116 *Rp.* Ammon. chlor. 0,4–0,5.
Aque dest. 100,0.
Syrup. Althææ 15,0.
℞℥℥ 2 ór. 1 gyk.
3–6 éves gyermeknek.
32 kr.

Ammonium chloratum ferratum s. Flores salis ammoniaci martiales. Pirosas sárga, vízszívó, vízben jól oldódó por. Kombinálja az ammon. chor. és vas hatásait. Adag bels. mint az ammon. chlor. 10,0 = 7 kr.

117 *Rp.* Ammon. chlor. ferrat. 2,0.
Chinin sulf. 2,5.
Extr. Aloës 1,25.
Succi Liquirit. dep. qu. s. ut. f. pilul. No. 60.
Consp. Lycopod.
℥℥ 3 × napj. 4–6 szemet.
(FRERICHS.)
Chlorosis és mellette fennálló hörghurut esetén.
61 kr.

118 *Rp.* Ammon. chlor. ferrat. 0,5.
Aque dest. 100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
℞℥℥ 2 ór. 1 gyk.
3–6 éves gyerm. Idült
hörghurut és vérszegénység esetén.
33 kr.

Ammonii succinici liquor. [$C_4H_4O_4(NH_4)_2$]. Tiszta, barnás, igen kellemetlen szagú folyadék. Használat, adag mint a liquor ammonii anisatusnál. 10,0 = 15 kr.

119 *Rp.* Liquor. Ammon. succin. 1,0.
Aque Melissæ 80,0.
Syrup. simpl. 20,0.
℞℥℥ 2 ór. 1 evők. (OPPOLTZER.)
Hagymázosak hörghurutjánál.
30 kr.

H. Linimentum ammoniatum s. Linim. volatile. (Liquor. ammon. 40,0 + Ol. Sesami 160,0.) Bőrvörösítő, bőrizgató. 10,0 = 4 kr.

H. Amygdala amara. Tartalmaz zsíros olajt, emulsint, amygdalint. 10,0 = 2 kr. Belőle készül:

†**H. Aqua Amygdalarum amararum.** 0,1% kéksavat tartalmaz, ezenkívül benzaldehydet. Bels. az érzékenység, visszahajlási tevékenység csökkentésére. Adag 10—20 csepp pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. sing. 1,0! dos. maxim. pro die 5,0! Kék v. fekete üvegben rendeltessék. 10,0 = 6 kr.

120 <i>Rp.</i> Aquae Amygdal. amar.	121 <i>Rp.</i> Emuls. amygdal.
15,0.	100,0.
Morphini hydrochlor.	Aquae Amygdal. amar.
0,05.	5,0.
<i>M.D.</i> in vitro cœrul.	Extr. Hyosciami 0,1.
<i>S.</i> 3 × napj. 10—15 cseppet.	Syrup. amygdal. 10,0.
34 kr.	<i>M.D.S.</i> 2 ór. 1 kk.
	Izgatott köhögésnél.
	56 kr.

H. Amygdala dulcis. Tartalmaz zsíros olajt, fehérjét, cukrot, mézgát. 10,0 = 2 kr. Belőle készül:

H. Emulsio amygdalina. Mandulatej. Bevonószer. Adag: evőkanalanként. 100,0 = 29 kr.; 200,0 = 34 kr.

H. Syrupus amygdalinus. Tejszerű, kellemes ízű, nyákos ízjavító. Főleg fejetekhez. 10,0 = 5 kr.

H. Oleum amygdalarum dulcium. Áttetsző, sárgás, szagtalan zsíros olaj. 10,0 = 7 kr. Belől készül:

H. Emulsio oleosa. Bevonószer. Adag: evőkanalanként. 100,0 = 23 kr.; 200,0 = 32 kr.

Amylenum hydratum seu Dimethylæthylcarbinol. ($C_6H_{12}O$). Színtelen, könnyen mozgó, camphor és mentha-szagú és ízű folyadék. 8 r. vízben oldódik, borszeszben minden arányban. Hypnoticum; a chloralhydrátnál gyengébb. Adag 2,5—5,0 pro dos. vízben ízjavítóval, v. csőrében.

122 <i>Rp.</i> Amyleni hydrati	7,0.	123 <i>Rp.</i> Amyleni hydrati	6,0—7,0.
Aquae dest.	60,0.	Morphini hydrochlor.	0,02—0,03.
Extr. Liquirit.	10,0.	Aquae dest.	60,0.
<i>M.D.S.</i> Este lefekvés előtt		Extr. Liquirit.	10,0.
felét bevenni.		<i>M.D.S.</i> Este lefekvés előtt	
(MERING.)		felét bevenni.	
		Álmatlanságnál, mely fáj-	
		dalmak következtében áll	
		fenn. (MERING.)	

II. Amylo nitrosu n. Amylinitritu s. Amylum nitrosum [$C_5H_{11}(NO_2)$]. Közömbös kénhidrogén $1:2$ arányban könnyen mozgó, sárgás, enyhén szaga gyöngyöztető, vízben nem, borszeszben jól oldható, felengedhető, $1:2$ arányban zésnél dynamicus ellenszer. Adag: kevéssé cseppenként 3—6 csepp pro dos. (Vigyázat!) Poros formában nem telik. Fekete v. kék üvegben egyenlőre kevéske tartályokban. 100 maxim. sing. 0,2! Dos. maxim. pro die 0,6! 100! = 5 kr.

124 Rp. Amylii nitrosi 300.

Det. in vitro nigro.

DS. 3—6 cseppel rendelet szerint beleegyen.

Stenocardia. Epilepsia. 100 kr.

II. Amylum tritici. Buzakeményítő. Finom, fehér, poros és iztelen, hideg vízben és borszeszben oldhatatlan, forró vízzel mézgás, átlatszó, tejszerű, szagtalan folyadék képez. Hintőpor. Forró vízzel készült oldata levonó vértelenítő, szűrésnél chemicus ellenmérég. 100,0 = 15 kr. (subt. pulv.).

II. Angelicæ radix. (Archangelica offic. Umbelliferae. Hőanyagai: illó olaj, angelicasav, angelicin, camphorment, anyag. Stomachicum, stimulans. Adag: infus. 1:100, 100,0 = 15 kr. v. 10,0 = 5 kr. (subt. pulv.).

II. Anisum stellatum. Fructus. (Elettum stellatum. Scagnoliaceae.) Hatóanyaga illó olaj. Illatos (keverékben 100,0 = 48 kr. v. 10,0 = 8 kr. (pulv.).

II. Anisum vulgare. Fructus. (Elettum vulgare. Scagnoliaceae.) Hatóanyaga illó olaj. Carminativum, gasztrikum, izjavító. Adag porban, infusumban 0,5—2 pro die 100,0 = 15 kr. v. 10,0 = 5 kr. (pulv.).

II. Antidotum arsenici (vízben keverke fennmarad, vízben oldat. és magnes. hydrooxydatum-nak. Hatóanyag: a keverékben képződő vasoxydhydrat [$Fe_2(OH)_6$]. Belső méreg elleni. Adag arsén-mérgezés esetén 10 perczenként napi 3—5 perczenként 2—3—5 evőkanállal. Használatkor kímélendő. Hatólatókat, gymormosást nem teszi feleslegessé. 100,0 = 1 kr.

125 Rp. Antidoti arsenici 300.

DS. Rendelet szerint.

Exped. statim!!

74 kr.

Anthrarobin (keveréke $C_{10}H_{10}O_3$ és $C_{10}H_{12}O_3$ szénhidrogénből állítottak elő. Sárgásfehér por, vízben nem, borszeszben, glycerinban, zsírokban, éterben, vízben nem oldható, csak hogy gyengébb, míg a pyrogallussav, arsenicum, n. s. s.

gyuladást, ált. hatása nem mérgező. (PICK, WEYL, BEPPEND.)
 Kenőcsben, tincturában 1,0—2,0: 10,0. eccema margin. psoriasis,
 herpes tonsurans, pityriasis versicolor ellen. Olesó szer.

126 *Rp.* Anthrarobini

10,0—20,0.

Ol. Sesami 30,0.

Lanolini 60,0.

M. f. ungu.

℞. Kenőcs.

127 *Rp.* Anthrarobini

10,0—20,0.

Spiritus dil. 90,0—80,0.

solve ebulliendo.

℞. 10—20%-os anthrarobin

linctura.

II. Antifebrin 1. Acetanilid.

H. **Antipyrin s. Dimethyloxychinicin** ($C_{11}H_{12}N_2O$). Fehér, jegezes por, v. nagyobb, hasábos, színtelen, csaknem szagtalan jegeczek. Vízben igen jól, egyenlő r. borszeszben oldódik. Antipyreticum, antirheumaticum, anodynum, helybelileg haemostaticum. Szívbjajoknál, szívgyengésnél vigyázat!! Adag bels. 0,5—2,0 pro dos. 2,0—6,0 pro die porban, oldatban. Subcután igen fájdalmas. 1,0 = 16 kr.

128 *Rp.* Antipyrini

5,0.

Div in dos. aqu. No. 10.

Det. in caps. amylac.

℞. Rendelet szerint.

1 frt 15 kr.

129 *Rp.* Antipyrini

5,0.

Aquæ Menthæ pip.

100,0.

Syrup. cort. Aurant.

45,0.

℞. Rendelet szerint.

1 evőkanálban 0,5 antipyrin.

1 frt 32 kr.

III. Apomorphinum hydrochloricum ($C_{17}H_{17}NO_2.HCl$).

Kristályos, szürkés por, nedves levegőn, világosságon könnyen zöldül, bomlik; 30 r. vízben, 20 r. borszeszben oldódik. Subcután alkalmazva 0,005—0,01! hánytató; per os 0,001—0,003 pro dos. expectorans. 5—6 éves gyermeknél nagy szükség esetén hánytatónak subcután 0,001—0,002. Kisebb gyermeknek nem (!) Dos. maxim. pro die felnőttnek 0,05! Fekete üvegben rendeltessék. 0,01 = 4 kr.

130 *Rp.* Apomorphini hydro-

chlor. 0,1.

Aquæ dest. 10,0.

M. filtra. Det. in vitro nigro.

℞. Bőr alá fecskendésre. Az orvos kezéhez.

$\frac{1}{2}$ —1 fecskendővel emeticum felnőttnek.

32 kr.

131 *Rp.* Apomorph. hydrochlor.

0,02.

Aquæ dest. 10,0.

M. filtra. Det. in vitro nigro.

℞. Bőr alá fecskendésre. Az orvos kezéhez.

$\frac{1}{2}$ —1 fecskendővel emeticum 5—6 éves gyermeknek. 36 kr.

- 154 *Rp.* Asæ foetidae 8,0, 155 *Rp.* Asæ foetidae 6,0.
 Vitelli ovi unius.
 f. l. a. emulsio cum.
 Aqua dest. 200,0.
 Ds. Csórének; egyszerre felét elfogyasztani.
 44 kr.

Obduc. Collodio.
 S. 3×napj. 3–5 szemet.

- 156 *Rp.* Infus. flor. Chamomillæ e 8,0.
 l. a. p. ad. colat. 100,0.
 f. l. a. cum.
 Asa foetida 1,0.
 Vitello ovi unius
 emulsio.

Ds. Csórének.
 Gyermekeknek. Spasmius glottidis.

53 kr.

Aseptolum s. Acidum sozolicum ($C_6H_4SO_2.OH$). A kereskedésbeli 33 $\frac{1}{2}$ % savat tartalmazó pirosas-barna folyadék keveréke az ortho- és parasozolsavnak. Vízben, borszeszben, glicerinben oldható, zsíros olajokban nem. Antisepticum. Ajánlott sebkezelési célokra 5%-os oldata. Nem megbízható, mert rövid időn a hatásos orthosav a hatástalan parasavba megy át.

Aspidosperminum l. Quebracho cortex.

+ **H. Atropinum sulfuricum l. Belladonna.**

Auro-natrium chloratum ($AuNaCl_4 + 2H_2O$). Sárga, jegezes por, vízszívó, vízben könnyen oldható. Bels. hysteria, chorea, tabes dorsalis ellen ajánlották. Adag pilulában argilla alba-val 0,003–0,006 pro dos. 2–3×napj. 0,01 = 4 kr.

- 157 *Rp.* Auro-natr. chlor. 0,1.
 Argillæ albæ qu. s.
 f. cum. gtt. nonnull.
 Aquæ dest. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Argillæ.

Ds. 2–3×nap. 1 szemet.

75 kr.

H. Balsamum Copaivæ. Illó olajos és gyantás, sárgás-barna, állátszó, faolaj sűrűségű, balzsamos illatú, kesernyés csípős ízű. borszeszben, ætherben oldható növénynedv. Bels. adag emulsióban, vagy caps. gelat. opercul.-ban, vagy pilulában gonorrhœa, idült cystitis, pyelitis, bronchoblennorrhœa ellen 0,5–2,0 pro dos. 3–4-szer, vagy 20–40 csepp. 2–4-szer napj. 10,0 = 7 kr.

- 158 *Rp.* Bals. Copaiv. gtl. 10.
Det. in caps. gelat. opercul.
Dent. tal. dos. No. 30.
§. 3×napj. 2—4 capsulát.
- 159 *Rp.* Bals. Copaiv. 20,0.
Mucil. Gummi arab. qu. s.
Aquæ Menthæ pip. 160,0.
f. l. a. emuls. adde
Syrup. cort. Aurant. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
78 kr.
- 160 *Rp.* Bals. Copaiv. 15,0.
Det. in lagen.
§. 3×napj. étkezés után 15 cseppel ostyában.
21 kr.
- 161 *Rp.* Ceræ flav. 2,0.
leni calore liquefact. adde
Bals. Copaiv. 8,0.
refrigerat. admisce
Cubebæ. pulv. 8,0.
M. f. l. a. pilul. No. 100.
Consp. pulv. Cinnamomi.
§. 3×napj. 5—10 szemet.
77 kr.

H. Balsamum peruvianum. Sötétbarna, kissé áttetsző, sűrű, levegőn nem száradó, savi kémhatású, kellemes illatú, nem ragadós, keserű, csipős ízű növénynedv. Keveréke fahéjsavas benzylæthernek, fahéjsavnak, benzoesavnak, gyantának. Küls. antisepticum, antiparasiticum (scabies, phthiriasis). Bels. mint a bals. copaivæ porban, (cukorral) pilulában, emulsióban, capsul. gelat. opercul. ban; adag 3—16 csepp. pro dos. napj. többször. 10,0 = 17 kr.

- 162 *Rp.* Bals. peruvian. 2,0.
Ungu. simpl. 80,0.
M. f. ungu.
DS. Hajkenőcs.
64 kr.
- 163 *Rp.* Bals. peruvian. 5,0.
Spir. dil. 200,0.
MDS. Külsőleg Hajhullás ellen. 2×napj. a fő hajás része bedörzsölendő.
42 kr. (HEBRA.)
- 164 *Rp.* Bals. peruvian. gtl. 4.
Det. in caps. gelat. opercul.
Dent. tal. dos. No. 20.
§. 3—4×napj. egy capsulát.
- 165 *Rp.* Bals. peruvian. 2,0.
Pulv. Gummi arab. qu. s.
Aquæ dest. 130,0.
f. l. a. emuls. adde
Syrup. simpl. 20,0.
DS. 2 ór. 1 evökön.
40 kr.

H. Balsamum Styracis l. Styrax liquid.

H. Balsamum vitæ Hoffmanni s. Mixtura oleoso-balsamica. Spiritus aromathicus-ban oldata több illó olajnak s bals. peruvianum-nak. Küls. mint bőrvöröslő. 10,0 = 6 kr.

†**H. Belladonnæ radix.** (Atropa belladonna. Solanaceæ.) Főhatóanyaga az atropin. Készítményei használatnak. 10,0 = 2 kr., vagy 10,0 = 5 kr. (pulv.).

†H. **Extractum Belladonnæ.** Borszeszes kivonat dextrinnel beszárítva. Küls. kenőcsben 1 : 10—20 fájdalomcsillapító. Bels. colica saturnina, cardialgia, izgatott köhögés, pertussis, epilepsia, hyperhydrosis, salivatio, enuresis nocturna, diabetes ellen porban, pilulában adag 0,01—0,05 ! pro dos. 3—4×napj. Dos. maxim. pro die 0,2 ! 1,0 = 7 kr.

†H. **Tinctura Belladonnæ.** Haszn. mint az extractum. Küls. kenőcshez 1 : 10. Bels. adag 2—10 csepp pro dos. 2—4×napj. Dos. maxim. sing. 1,0 ! (25 csepp !) Dos. maxim. pro die 4,0 ! 10,0 = 7 kr.

††H. **Atropinum sulfuricum** [(C₁₇H₂₃NO₃)₂ · H₂SO₄]. Fehér, jegeces por. Egyenlő r. vízben, 3 r. borszeszben oldható. Mydriaticum 0,01—0,1 : 20,0 a kötőhártya redőbe cseppentve. Bels. haszn. mint az extr. bellad. Adag 0,0005—0,001 pro dos. 2—3×napj. (Nagy vigyázat. !), pilulában vagy subcután. Dos. maxim. sing. 0,002 ! Dos. maxim. pro die 0,006 ! 0,01 = 2 kr.

Homatropinum hydrobromicum

Homatropinum sulfuricum

Szemészetben mydriaticum. Oldat mint az atropinnal. Kevésbé mérges mint az atropin. 0,01 = 4 kr.

166 Rp. Extr. Belladonn. 1,0.
Ungu. emollient. 20,0.
M. f. ungu.
℞S. Belladonna kenőcs.
51 kr.

168 Rp. Extr. Belladonn.
Extr. Nucis vomic. āā 0,05—0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
℞S. Este lefekvéselőtt 1 port.
3—10 éves gyermeknek.
Enuresis nocturna.
28 kr.

170 Rp. Extr. Belladonn. 1,0.
Zinci oxyd.
Pulv. rad. Valerian. āā 2,5.
Extr. Liquirit. qu. s.
ut. f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Cinnamomi.
℞S. 3×napj. 2 szemet.
Chorea, epilepsia.
41 kr.

167 Rp. Extr. Belladonn. 0,1.
Bulyri Cacao qu. s.
ut. f. l. a. supposit.
No. 5.

℞S. Belladonna-kúpok.
Tenesmus, prostaticus, gonorrhæa, hólyaggörcs.
59 kr.

169 Rp. Extr. Belladonn. 0,2.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
℞S. 3—4 port naponta.
27 kr.

171 Rp. Tinct. Belladonn. gtt. 2—4.
Kalii bromati
Natrii bicarb. āā 0,5—1,0.
Aquæ dest. 80,0—100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
℞S. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—5 éves gyermeknek.
Pertussis.
32 kr.

172 *Rp.* Atropini sulf. 0,01—0,1.
Aqua dest. 20,0.
M. filtra.

Ds. Atropincseppek, szembe
cseppentésre. Sub sigillo.
Sub signo veneni. Az orvos
kezéhez.

23 kr.

174 *Rp.* Atropini sulf. 0,01.
Aqua dest. 10,0.
M. filtra.

Ds. 0,1%-os atropin-oldat
bőr alá fecskendésre. Sub
sigillo. Sub signo veneni.
Az orvos kezéhez. 1 fecskendőben 0,001 atrop. sulf.
22 kr.

176 *Rp.* Atropin sulf. 0,01.
Morphini hydrochlor. 0,3.
Extr. Taraxaci qu. s.
ut f. pilul. No. 20.
Consp. pulv. Liquirit.
Ds. 3×napj. 1 szemét.
Colica saturnina.
58 kr.

173 *Rp.* Tinct. Belladonn.
gtt. 2—5.
Aqua dest. 80,0.
Syrup. Rubi Idæi 10,0.
DiDs. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—5 éves gyermeknek.
Pertussis. 22 kr.

175 *Rp.* Atropini sulf. 0,01.
Pulv. rad. Liquirit.
Extr. Liquirit. aa qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquir.
Ds. Este 1—, legfeljebb 2
szemet.
Phthisicusok izzadása ellen.
U. e. pilulák (3×napj. 1 szemét) diabetes, epilepsia,
salivatio ellen is. 39 kr.

H. **Benzoe resina.** Vörösbarna, fénylő, kellemes illatú, szemcsés darabok. Hatóanyaga a benzoésav. 5 r. borszeszben csekély maradékkal oldható. 10,0 = 8 kr. Nem haszn. helyette az acid. benzoicum s készítménye a:

Tinctura benzoës. Szépítő szerek gyakori alkatrésze. 10,0 = 4 kr.

177 *Rp.* Tinct. Benzoes 10,0.
Aqua Rosar. 100,0.
DiDs. Lac virginum. Külsőleg. Mosdóvízhez egy evőkanálnyi öntendő. Cosmeticum. 31 kr.

178 *Rp.* Tinct. Benzoes 5,0.
Spirít. æther. 50,0.
DiDs. Külsőleg. A fej hajás részének bedőrszölésére.
Seborrhœa.
30 kr.

Benzolum (C_6H_6). Színtelen, kellemetlen szagú, könnyen mozgó folyadék. Küls. scabies ellen (nem megbízható). Bels. sarcina ventriculi, trichiniasis ellen. (Mosler.) Adag 0,5—1,0 pro dos. 3—4-szer napj. nyákos folyadékban, emulsióban, caps. gelat.-ban.

179 <i>Rp.</i> Benzoli	20,0.	180 <i>Rp.</i> Benzoli	10,0.
Ungu. rosati	40,0.	Mucil. Gummi arab.	
M. f. ungu.		Aquæ Menthæ pip.	
℞. Kenőcs. Scabies.		aa	30,0.
		Aquæ dest.	180,0.
		℞. Felrázva 2 ór. 1 evők.	
		Trichiniasis.	(MOSLER.)

H. **Bismuthum subnitricum s. Magisterium bismuthi.**

Keverék ($\text{NO}_3\text{BiO} + \text{H}_2\text{O}$) és [$\text{NO}_3\text{BiO} + \text{BiO}(\text{HO})$]. Fehér, szagtalan, jegeczes por, gyengén savi hatású; vízben oldhatlan. Küls. fedőszer, kissé összehúzó. Bels. haszn. cardialgia, ulcus ventriculi, diarrhœák némely alakja, bélfekélyek esetén. Adag porban 0,2—1,5 pro dos. 3—5×napj. 1,0 = 8 kr.

181 <i>Rp.</i> Bismuth. subnitr.	5,0.	182 <i>Rp.</i> Bismuth. subnitr.	2,0.
Aquæ dest.	200,0.	Morphini hydrochlor.	
℞. Hügyesőbe fecskendésre. Használat előtt felrázandó.	69 kr.	Gummi arab. pulv.	3,0.
		M. f. pulv. det. in scat.	
183 <i>Rp.</i> Bismuth. subnitr.	3,0.	℞. Gégebe befűvésére.	35 kr.
Pulv. Doveri	1,0.		
Elaeosacchar. Menthæ.	2,0.	184 <i>Rp.</i> Bismuthi subnitr.	3,0.
M. f. pulv. div. in dos.		Extr. Nucis vom.	0,1.
aqu. No. 10.		Magnes. carbon.	2,0.
℞. 2 ór. 1 port.		M. f. pulv. div. in dos.	
Diarrhœa.		aqu. No. 10.	
53 kr.		℞. 2 ór. 1 port.	
		Cardialgia, ulcus ventriculi.	52 kr.
185 <i>Rp.</i> Bismuth subnitr.			
	0,5—1,0.	186 <i>Rp.</i> Bismuth. subnitr.	
Pulv. Doveri	0,1—0,4.		0,5—1,0.
Sacchar. alb.	3,0.	Pulv. Doveri	0,1—0,4.
M. f. pulv. div. in dos.		Extr. Nucis vom.	0,03—
aqu. No. 10.			0,05.
℞. 2 ór. 1 port.		Sacchar. alb.	3,0.
1—6 éves gyermek. Heveny-bélhurut.		M. f. pulv. div. in dos.	
35 kr.		aqu. No. 10.	
		℞. 2 ór. 1 port.	
		1—8 éves gyermek. Idült bélhurut.	36 kr.

Bismuthum subsalicolicum [$\text{Bi}_2\text{O}_3(\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2)_2 + \text{Bi}_2\text{O}_3(\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3)_3$]. Alaktalan, sárgás, vízben oldhatlan por. Savak könnyen felbontják. Küls. nem. Bels. mint a bismuth. subnitr. Vulpian typhus abdominalisnál jó eredményt látott, ha 1,0—2,0

pro dos. 3—4-szer napj. rendelt; mások phthisicusok hasmenésénél rendelnek 0,5 pro dos. 2—3×napj. 1,0 = 10 kr.

187 *Rp.* Bismuth. subsalicyl. 5,0.
Morphini hydrochlor. 0,05.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.
℞. 3 ór. 1 port.
Phthisicusok hasmenése ellen.
78 kr.

H. Bismuthum tannicum. Sárgás v. barnássárga por, íztelen, vízben oldhatlan. Antidiarrhœicum. Adag porban: 0,2—1,0 pro dos. 3—5×napj. 1,0 = 9 kr.

188 *Rp.* Bismuthi tannici 3,0. 189 *Rp.* Bismuthi tannici 0,5—1,0.
Morphini hydrochlor. 0,05. Pulv. Doveri 0,1—0,4.
Sacchar. alb. 3,0. Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10. M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.
℞. 2 ór. 1 port. ℞. 2 ór. 1 port.
Diarrhœa. 1—8 éves gyermek. Idült belhurut.
55 kr. 36 kr.

Blatta orientalis. Svábbogár. Szárlott, porított rovarok. Oroszországban népies antihydropicus szer. Diaphoreticum, diureticum. Adag: 0,3—1,0 pro dos. 3—4×napj. porban, pilulában. 1,0 = 24 kr.

190 *Rp.* Blattæ orient. pulv. 3,0.
Div. in dos. æqu. No. 10.
℞. in caps. amylac.
℞. 2 ór. 1 port.
1 frt 13 kr.

H. Bolus alba l. Argilla alba.

H. Borax venetus l. Natr. boracicum.

Bromaethyl l. Aethylenum bromat.

Bromalum hydratum ($C_2Br_3HO + H_2O$). Színtelen, közömbös, túalakú, vízben oldható jegeczek. Chloralhydrat pótszere, de annál gyengébb hypnoticum és sedativum. Szívre hevesen hat. Adag bels. oldatban 0,1—0,2 napj. többször, mint sedativum; 0,5—1,0 pro dos. mint hypnoticum. 1,0 = 50 kr.

191 <i>Rp.</i> Bromali hydrati	1,0.
Aquæ dest.	100,0.
Mucil. Gummi arab.	
Syrup. Rubi Idæi aa	50,0.
<i>℞℞</i> 3 × napj. 1 evök.	
Sedativum.	(STEINAUER.)
1 frt 28 kr.	

H. Bromkalium l. Kalium bromatum.

†H. Bulbus Scillæ l. Scilla.

Butyl-chloratum hydratum ($C_4H_5Cl_3O + H_2O$). Kicsiny, selyemfényű, fehér jegeczlapocskák, jellegző szagúak, hideg vízben nehezen, melegben könnyebben, borszeszben könnyen oldódnak. Chloralhydrát pótszere. Sedativum, hypnoticum, anodynum (?). Szívre alig hat. Bels. adag vízes-glycerines oldatban, v. porban, v. pilulában 0,2–0,4 pro dos. 2 ór. sedativ., anodyn.; 0,5–2,0 pro dos. hypnoticum.

192 <i>Rp.</i> Butyl-chlorali hydrati	5,0–10,0.	193 <i>Rp.</i> Butyl-chlorali hydrati	2,0.
Glycerini	20,0.	Glycerini	10,0.
Aquæ dest.	130,0.	Aquæ Fœniculi	90,0.
<i>℞℞</i> Egyszerre 1 evök., ha		<i>℞℞</i> Este lefekvés előtt	
kell 5 p. múlva ismét, s		2–3 evökánállal.	
10 p. múlva ismét.		Hypnoticum.	
Anodynum.			
Tic douloureux. (LIEBREICH.)			

H. Butyrum Cacao l. Ol. Cacao.

H. **Calamus Acorus.** Rhizoma. (Aroideæ). Hatóanyagok: acorin (keserű anyag) és illatos olaj. Amarum. Belső adag: porban 0,5–1,5 pro dos. 2–3 × napj. v. infus. 8,0–10,0; 100,0 2 ór. 1 evök. 100,0 = 13 kr.

194 <i>Rp.</i> Infus. rhizom. Calami e	10,0.	195 <i>Rp.</i> Rhizom. Calami	30,0.
l. a. p. ad colat.	150,0.	Rad. Gentianæ.	
Tinct. Rhei Darelli	8,0.	Rad. Rhei chin.	
Syrup. cort. Aurant.		Semin. Cardamomi.	
	15,0.	Flaved. cort. Aurant.	
<i>℞℞</i> 2 ór. 1 evök.		aa	10,0.
46 kr.		Conc. et. cont. m. f.	
		species.	
		<i>℞</i> Keserű theakeverék.	
		Házilag 1 liter fehér borral	
		maceratum készítendő.	
		Ebből 3 × napj. egy tokaji	
		pohárral.	
		64 kr.	

II. Calcaria chlorata s. Calcium hypochlorosum

[$\text{Ca}(\text{OCl})_2$]. Fehér v. fehéres, gyakran összegomolyodó, nyirkos por, mely chlór-szagú; íze kesernyész, fanyar. Levegőn nedveséget vesz magához, vízben tökéletlenül oldódik. Desinficiens. adstringens szárító. Helyiségek fertőztelenítésére substantiában elhintve; erősebb Cl. fejlesztés céljából tányérban, valamely savval (eczet) leöntve, v. konyhasóval és barnakővel keverve (aa) s híg kénsavval leöntve. Küls. sebmosó v. borongató folyadéknak 2%-4%-os szűrt oldatok, száj-, torokvíznek, v. orrba fecskendésre 2%-5%-os oldatok, húgyesőbe fecskendésre 0.05–0.1:100.0. Bels. nem. 100.0 = 7 kr. 200.0-túl 100.0 = 6 kr.

H. Calcium carbonicum nativum s. Creta alba. Iszapolt kréta. Tiszta krétából előállított igen finom fehér por. Küls. fogporba mint mechanicusan ható anyag. Bels. nem. 10.0 = 2 kr. (subt. pulv.).

H. Calcium carbonicum præcipitatum (CaCO_3). Hófehér, igen finom por. Küls. fogporba. Bels. porban mint antacidum (pyrosis, némely diarrhoea, savmérgezések) kávéskanalanként, késhegyenként; rhachitisnél 0.1–0.3 pro dos. 2–3 × napj. 10.0 = 2 kr.

196 *Ap.* Calc. carb. præcip. 30.0.

Magnes. carb. 5.0.

Natrii bicarb.

Sapon. medic. ras.

aa 3.0.

Olei Menthae pip. gtt. 5.

M. f. pulv. subtil.

2*S.* Fogpor.

27 kr.

198 *Ap.* Calc. carb. præcip.

Gummi arab. pulv. aa 5.0.

tere c.

Aqua Cinnamomi 150.0.

adde.

Syrup simpl. 10.0.

2*S.* 1–2 evők. 3–4-szer

napj. Pyrosis.

57 kr.

197 *Ap.* Calc. carb. præcip. 5.0.

Pulv. rad. Rhei 2.0.

Elaeosacchar. Fornic. 3.0.

M. f. pulv. div. in dos.

aq. No. 10.

2*S.* 3–4 × napj. 1 port.

34 kr.

199 *Ap.* Calc. carb. præcip.

1.0–2.0.

Ferri lact. 0.5–1.0.

Sacchar. alb. 10.0.

M. f. pulv. del. in scat.

3 késhegygyei napj.

1–3 éves gyermek. Rhachitis.

22 kr.

H. Calcium chloratum fusum (CaCl_2). Színtelen v. fehér,

áttetsző, szilárd, kristályos szerkezetű tömeg; íze csipős és keserű. Vízben, borszeszben könnyen oldódik, aetherben nem. Levegőn vizet vesz fel és szétfolyik. Substantiában causticum, híg oldatokban adstringens. Szemvíznek 1/2%-1%-os oldat, sebmosó folyadéknak 4–5%-os oldat. Bels. ritkán; 0.2–0.5 pro dos.

3—4 × napj. lúg oldatban scrophulosisnál, phthisisnél, makacs hányásnál. 10,0 = 6 kr.

200 <i>Rp.</i> Calc. chlorat.	5,0.
Spiritus aromath.	30,0.
M. f. solut.	
℞. 3—4 × napj. 25—30 cseppet kis pohár vízben.	
31 kr.	

H. Calcium oxydatum s. Calcaria caustica, s. usta (*CaO*). Fehér v. szürkés, szilárd darabok. Félannyi vízzel megnedvesítve erősen megmelegszik és finom fehér porrá mállik szét, melyből négyannyi vízzel egynemű sűrű pép támad. Causticum. Csak küls. mint *pasta caustica viennensis*. 100,0 = 4 kr. v. 10,0 = 1 kr. (pulv.).

201 *Pasta caustica viennensis.*

1. <i>Rp.</i> Kalii caust. pulv.	5,0.	2. <i>Rp.</i> Calc. oxyd. pulv.	5,0.
Det. in lagen.		Det. in lagen.	
℞. Suo nomine.		℞. Suo nomine.	
32 kr.		18 kr.	
3. <i>Rp.</i> Spiritus	10,0.		
℞. Suo nomine.			
10 kr.			

Az 1. és 2. sz. a. anyagok összedörzsöltetnek s a borszesz lassú hozzáadása mellett pastává alakíttatnak, mely lapocz v. kanál segítségével az edzendő helyre kenetik fel. A környezet, melyet a maró hatástól óvni akarunk, ragtapsz csíkokkal beragasztandó. A pastát 10 percig kell a bőrön rajta hagyni, azután bő vízzel lemosni.

H. Calcium phosphoricum [$Ca_2H_2(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$]. Fehér, könnyű, kristályos por, vízben nem oldható. Bels. felnőttek csontbántalmak esetén porban, pastillákban 0,5—1,5 pro dos. 3—4 × napj.; gyermeknek rhachitis ellen 0,2—0,5 pro dos. 3—4 × napj. 10,0 = 45 kr.

202 <i>Rp.</i> Calc. phosphor.	203 <i>Rp.</i> Calc. phosphor.	3,0.
Sacchar. alb. aa.	Ferri reduct.	0,5.
M. f. pulv. det. in scat.	Sacchar. alb.	2,0.
℞. 3 × napj. 1 késhegygyel.	M. f. pulv. div. in dos.	
Gyermeknek. Rhachitis.	æqu. No. 10.	
1 frt 13 kr.	℞. 3 × napj. 1 port.	
	Felnőttek.	
	42 kr.	

204 Rp. Calc. phosphor.	
Ferri lact. 3ā	3,0.
Sacchar. lactis	10,0.
M. f. pulv. det. in scat.	
§. 3 × napj. 1 késhegygyel.	
Gyermeknek. Rhachitis.	
42 kr.	

Calcium sulfuratum s. Calcium sulfid. Keveréke CaS és $CaSO_4$ -nek. Szürkésfehér v. sárgásfehér, záptojás szagú por, légen bomlik, savakkal leöntve H_2S -t fejleszt; lúgos kémhatású, vízben kevésbé, borszeszben nem oldódik. Fürdőhez 50,0—100,0 vételik, s a vízhez kevés HCl adatik (idült fémmérgezések, rheumatismus, némely idült hörbaj). 50,0 = 24 kr.

H. Solutio Vlemingckx s. Calc. oxysulfurat. solut.

Calcium sulfuratum oldata. Haszn. scabies, psoriasis, prurigo ellen. 50,0 = 10 kr., 250,0-tól 50,0 = 8 kr.

SCHEIDER módosított yénje köv.:

205 Rp. Calc. oxydat.	30,0.
Sulfur. subl.	60,0.
Aque dest.	600,0.
M. coque ad remanent.	360,0.
filtra.	

28. Külsőleg. Ecsetelésre.

Arczon nem szabad ecsetelni. A beteg fürdőben zöld szappannal ledörzsölte-tik, s $\frac{1}{2}$ óráig a fürdőben marad; ez után a beteg helyek az oldattal be-dörzsöltetnek, s a beteg ismét fürdőbe száll $\frac{1}{2}$ órára.

H. Calcium sulfuricum ustum s. Gypsum ustum ($CaSO_4$).

Fehér, alaktalan, íztelen és szagtalan por. 1 r. 400—500 r. vízben oldódik. Felényi vízzel péppé keverve 5 p. alatt meg-merevedik. Contentivum. Kemény kötesek készítésére haszn. 100,0 = 4 kr.

H. Calumbæ radix s. Colombo radix. (Cocculus palmatus. Menispermaceæ.) Hatóanyagai: berberin, calumbin (keserű anyag), keményítő. Amarum, tonicum, antidiarrhœicum. Bels. adag: decoct. 5,0—10,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 100,0 = 23 kr., vagy 10,0 = 6 kr. (pulv.).

H. Extractum calumbæ. Borszeszes kivonat. Vízben za-varosan oldódik. Bels. adag porban, pilulában, oldatban 0,3—1,0 pro dos. 1,5—3,0 pro die. 1,0 = 12 kr.

Berberinum hydrochloricum ($C_{20}H_{17}NO_4 \cdot HCl + 2\frac{1}{2}H_2O$). Sárgás, finom tűkből álló jegeces por. Keserű ízű. 80 r. hideg vízben oldódik, könnyebben forró vízben, borszeszben. Tonicum, amarum. Adják tumor lienis malaricus ellen, valamint méhvérvérzések ellen is, hydrastis canadensis helyett. Bels. adag porban vagy borszeszes oldatban 0,03–0,05 pro dos. 3×napj. 0,1 = 12 kr.

Berberinum phosphoricum ($C_{20}H_{17}NO_4 \cdot 2H_3PO_4$). Sárgás, jegeces, keserű por. Hideg vízben is jól oldódik. Haszn. mint a berber. hydrochlor.

- | | |
|---|--|
| 206 Rp. Decoct. rad. Calumbæ e
80,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Opii crocat.
gtt. 10.
Syrup. simpl. 15,0.
℞℥℥S. 2 ór. 1 evők.
Felnőttek. Diarrhœa.
37 kr. | 207 Rp. Decoct. rad. Calumbæ e
2,0.
l. a. p. ad colat. 80,0.
Extr. Ratannhæ dep.
0,2–0,4.
Tinct. Opii simpl.
gtt. 2. — gtt. 3.
Syrup. simpl. 10,0.
℞℥℥S. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1½–3 éves gyermeknek.
Diarrhœa chron.
39 kr. |
| 208 Rp. Extr. rad. Calumbæ 3,0.
Pulv. Doveri. 1,0.
Sacchar alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
℞S. 2 ór. 1 port.
Felnőttek. Diarrhœa.
64 kr. | 209 Rp. Extr. rad. Calumbæ 5,0.
Aque Cinnamomi simpl.
150,0.
M. f. solut.
℞S. 2 ór. 1 evők.
Felnőttek. Tonicum, amarum.
1 frt 9 kr. |

H. Camphora ($C_{10}H_{16}O$). Stearopten. Fehér, jegeces, áttetsző, fénylő, szívós tömeg, átható szagú, fűszeres ízű, illó; vízben nem oldódik, borszeszben, ætherben, zsiros és illó olajokban jól old. Borszeszszel nedvesítve porítható (camph. trita). Küls. gyenge antisepticum, izgató; sebekre substantiában, hintőpor alakjában, vagy kenőcs v. linimentum alakjában (1 : 5–10). Bels. excitans 0,05–0,2 pro dos. 4–5×napj. porban, emulsióban; sedativum nagyobb (0,5–0,8) adagokban. 10,0 = 4 kr.

H. Linimentum saponato camphoratum s. Opodeldoc. Küls. derivans bedörzsölésekre. 10,0 = 3 kr.

H. Oleum camphoratum. Küls. derivans bedörzsölésekre. 10,0 = 6 kr.

H. Spiritus camphoratus. Küls. mint az előbbie. 100,0 = 18 kr.

210 *Rp.* Ol. camphor.
Chloroformii aa 15,0.
M. f. linim.
D^s. Külsőleg bedörzsölésre.
55 kr.

212 *Rp.* Camphor. trit. 1,0.
Gummi arab. pulv. 10,0.
Aque dest. 150,0.
Syrup. simpl. 10,0.
F. l. a. emuls.
D^s. 2 ór. 1 evök.
Excitans. 49 kr.

214 *Rp.* Camphor. 2,5.
Ol. Amygdal. dulc. 10,0.
M. f. solut. filtra.
D^s. Bőr alá fecskendésre.
1 fecskendővel egyszerre.
Excitans. 38 kr.

216 *Rp.* Camphorae 1,0.
Aetheris acet. 12,0.
Tinct. Opii simpl. 3,0.
D^s. 10–30 perczenként
10–15 cseppel. (OPPOLTZER)
Choleránál excitans.
40 kr.

211 *Rp.* Camphor. trita
Moschi aa 0,5.
Sacchar. lactis 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aegu. No. 10
Det in chart. cerat.
S. 2 ór. 1 port.
Excitans.
2 frt 73 kr.

213 *Rp.* Camphor. trit. 0,5.
Vitelli ovi unius
Aque dest. 150,0.
F. l. a. emuls.
D^s. Csőrének. Egyszerre fel-
lét elhasználni.
Excitans. 43 kr.

215 *Rp.* Camphor. trit. 0,1.
Sacchar. lactis. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aegu. No. 10.
Det. in chart. cerat.
S. 2 ór. 1 port.
3–6 éves gyermeknek. Ex-
citans. 34 kr.

Camphora monobromata ($C_{10}H_{15}BrO$). Színtelen, pris-
maticus tűk vagy jegecslapok, légálló, gyenge camphorszagúak,
vízben oldhatatlanok, borszeszben, aetherben, chloroformban, zsí-
ros olajokban jól oldódnak. Sedativum delirium tremens, hyste-
ria, epilepsia eseteiben. Bels. adag 0,1–0,5 pro dos. napj.
3–4-szer, caps. amylac. v. gelatin.-ban, emulsióban. 1,0 = 5 kr.

217 *Rp.* Camphor. monobroma-
ta 2,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aegu. No. 10.
Det. in caps. amylac.
S. 3×napj. 1 capsulát.
59 kr.

218 *Rp.* Camphor. monobrom.
2,0.
Ol. Sesami 20,0.
Gummi arab. 10,0.
Aqua dest. 150,0.
Syrup. simpl. 15,0.
F. l. a. emulsio.
D^s. 3 ór. 1 evök.
56 kr.

†H. **Cannabis indicæ summitates.** (Cannabineæ.) Háló-
anyagok: cannabin s. haschischin (gyantás anyag), cannabinon
(lágy gyantás anyag), illó olaj. Sedativum, gyenge anodynum

(opium pótszere antispasmodicum, nagy adagban hypnoticum (?) 10,0 = 2 kr. Haszn. készítményei:

†H. **Extractum cannabis indicæ.** Borszeszes kivonat. Küls. kenőcsben 0,2–0,5 : 10,0–20,0. Bels. porban, pilulában 0,05–0,1 ! pro dos. 3–4-szer napj. Dos. maxim. pro die 0,3 ! 1,0 = 7 kr.

†H. **Tinctura cannabis indicæ.** Küls. nem. Bels. 5–20 csepp pro dos. 3–4×napj. Dos. maxim. sing. 1,0 (25 csepp) ! Dos. maxim. pro die 4,0 ! 10,0 = 6 kr.

Cannabinum tannicum. Vegyileg nem tiszta készítmény. Sárgásbarna, vízben oldhatlan, nem kellemetlen szagú por, íze keserű, összehúzó. Hypnoticum (LEYDEN, HILLER, FROHMÜLLER). Adag 0,25–0,5 pro dos. porban, este lefekvés előtt. 0,1 = 6 kr.

219 Rp. Extr. Cannabis ind. 0,5.

Extr. Hyosciami 0,1.

Sacchar alb. 5,0.

M. f. pulv. div. in dos.

æqu. No. 10.

Ds. 3×napj. 1 port.

Izgatott köhögés ellen.

31 kr.

221 Rp. Tinct. Cannabis ind.

Tinct. Ipecac. aa 5,0.

Ds. 3–4×napj. 10–15

cseppet.

Felnőttnék. Catarrh. bronch.

24 kr.

220 Rp. Extr. Cannabis ind.

Pulv. rad. Ipecacanhæ

aa 0,06.

Sacchar. lactis 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

æqu. No. 10.

Ds. 3×napj. 1 port.

3–6 éves gyerm. Catarrh.

bronch. acut. 29 kr.

222 Rp. Cannabini tannici 1,0.

Sacchar. alb. 2,0.

M. f. pulv. div. in dos.

æqu. No. 10.

Ds. Este lefekvés előtt 1–2

port. (HILLER.)

Hypnoticum. 86 kr.

†H. **Cantharides.** (Lytta vesicatoria. Coleoptera.) Hatóanyaga cantharidin ($C_5H_6O_4$) mely savi természetű anyag. Haszn. készítményei. 10,0 = 21 kr. (pulv.).

†H. **Tinctura cantharidum.** Küls. mint bőrizgató kenőcsben, linimentumban 1 : 20–50. Bels. diureticum (nem ajánlható mérgező hatása miatt). Dos. maxim. sing. 0,5 ! dos. maxim. pro die 1,0 ! 10,0 = 10 kr.

H. **Emplastrum cantharidum s. Empl. vesicatorium consuetum.** Hólyaghúzó tapasz. Bőron hólyagot húz 8–10 óra múlva : előbb, ha a bőrt kevésbé megzsíroztuk. Cantharidin a tapasz alkalmazásakor felszívódik (ezért vigyázat !). 10,0 = 16 kr.

H. **Emplastrum cantharidum perpetuum.** Gyengébb az előbbinél, hólyagot csak igen sokára húz. Bőrvörösítő. 10,0 = 18 kr.

223 *Rp.* Tinct. Canthar. 2,0.
 Olei Sesami 50,0.
 Olei Bergamottae 5,0.
℞℞S. Külsőleg. Hajolaj.
 Alopecia.
 55 kr.

224 *Rp.* Empl. Cantharid. qu. s.
 Extende crasse super
 corium (s. linteum)
 magnitud. volae manus.
℞S. Hólyaghúzó.
 57 kr.

11. **Capilli Veneris frondes.** (Filices.) Hatóanyaga illatos olaj. Haszn. a hasonnevű syrup készítéséhez. 10,0 = 2 kr.

H. **Caragaheen s. Fucus caragaheen.** (Algæ floridæ.) Hatóanyagai növényi nyák, igen kevés bróm. jód. Belőle nyákos főzet készíttetik (1 : 100), mely mint vehiculum szerepel csipős, izgató anyagok adagolásánál. 10,0 = 2 kr.

H. **Carbo ligni depuratus.** Szárazon desodorans. Bels. antidotum alkaloid-mérgezések s keserű anyagokkal mérgezések eseteiben. Adag 0,5–2,0 porban, ostyában 5–10 perczenként. Más indicatiók (typhus, pyrosis stb.) meg nem állhatnak. Fogpornak fölötté ártalmas. 10,0 = 2 kr.

Carbo animalis |
Carbo ossium | mint a carbo ligni.

H. **Cardamomi fructus.** (Elatteria cardamomum. Scitamineæ.) Hatóanyaga illó olaj. Carminativum, stomachicum. Önállóan nem haszn.; főleg illatos vagy keserű theakeverékekhez. 10,0 = 22 kr.

H. **Caryophylli flores.** (Caryophyllus aromathicus. Myrtaceæ.) Hatóanyaga illó olaj. Haszn. mint a cardamomum. 10,0 = 5 kr. vagy 10,0 = 10 kr. (pulv.).

Cascaræ sagradæ cortex. (Rhamnus Purshiana. Rhamnææ.) Hatóanyaga több gyanta. Ujabban használt hashajtó. Adaga porban (caps. amyl.) 0,25 pro dos. 10,0 = 12 kr. Főleg a köv. készítménye használtatik:

Extractum Cascaræ sagradæ fluidum. Adag 20–30 csepp pro dos. 1–4×napj. 1,0 = 4 kr.

225 *Rp.* Extr. Cascaræ sagrad.
 fluid.
 Syrup. cort. Aurant.
 Aquæ dest. āā 15,0.
℞℞S. 3×nap. 1 kk.
 Obstip. habit.
 85 kr.

226 *Rp.* Extr. Cascaræ sagrad.
 fluidi 30,0.
 Glycerini 60,0.
 Aquæ dest. 30,0.
℞℞S. 3–4 ór. 1 kk.
 Obstip. (CAMPBELL.)
 1 frt 59 kr.

Cascarillæ cortex. (Croton eluteria. Euphorbiaceæ.) Hatóanyagai: illó olaj, gyanta, cascarillin (keserű anyag). Amarum, tonicum, ezenkívül jó szer hasmenésekkel összekötött dyspepsiáknál. Adag porban 0,5–1,0 pro dos., infusumban 10,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 50,0 = 10 kr. v. 10,0 = 6 kr. (pulv.).

Extractum Cascarillæ. Borszeszes kivonat. Pilulában, oldatban (zavarosan oldódik) adag 0,2—0,5 pro dos. napj. 3—4-szer. 1,0 = 12 kr.

Tinctura Cascarillæ. Adag 20—50 csepp pro dos 3 × napj.

227 *Rp.* Tinct. Cascarillæ gtt. 10.
 Aquæ dest. 80,0.
 Syrup. simpl. 10,0.
℞℥℥. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
 1—2 éves gyermekeknek
 dyspeptikus hasmenésnél.
 20 kr.

228 *Rp.* Extr. Cascarillæ.
 Pulv. cort. Cascarillæ
 aa 3,0.
 M. f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Cinna-
 momi.
℞℥. 3 × napj. 3—5 szemet.
 72 kr.

11. **Castoreum.** Kiszáradva gyantaszerű, kemény, sötétbarna, fénylő, sajátos erős szagú, illatos-kesernyész ízű, borszeszben oldható, porrá törhető állati váladék. Hatóanyagok: 1. Gyantás anyag. 2. Illatos olaj. Excitans, antispasmodicum. Bels. adag porban, pilulában, pastillában 0,1—1,0 pro dos. napj. többször. 0,1 = 3 kr.

H. **Tinctura Castorei.** Haszn. mint a castoreum. Bels. adag: 20—30 csepp pro dos. napj. többször. 1,0 = 7 kr.

229 *Rp.* Castorei 1,0.
 Elaëosacch. Menthae 4,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aqu. No. 10.
℞℥. ór. 1 port.
 Excitans.
 62 kr.

231 *Rp.* Tinct. Castorei.
 Tinct. Valerian. spiril.
 aa 10,0.
℞℥℥. 3 × napj. 20—30
 cseppet.
 Hystericus görcsöknel.
 90 kr.

230 *Rp.* Castorei
 Camphoræ trit. aa 2,0.
 Extr. et pulv. rad. Li-
 quirit. aa qu. s.
 ut. f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Lycopod.
℞℥. 3—4 × napj. 2—3 szemet.
 Excitans. 98 kr.

232 *Rp.* Tinct. Castorei 5,0.
 Aquæ Cinnamom. simpl.
 50,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 25,0.
℞℥℥. 2 ór. 1—2 kk.
 Excitans. 68 kr.

Catechu pallidum. Az acacia catechu fájából készült kivonat. Könnyű, barnásszürke, kagylós törésű darabok; íze összehúzó, fanyar. Legnagyobb része oldódik vízben, borszeszben. Hatóanyaga catechu-csersav. Adstringens. Haszn. mint az acid. tannicum. Adag bels. porban, pilulában 0,1—1,5 pro dos. napj. többször. 10,0 = 3 kr., v. 10,0 = 4 kr. (pulv.).

233 <i>Rp.</i> Catechu pallid.	4,0.
Pulv. Doveri	1,0.
M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.	
Det. in caps. amylac.	
℞. 2 ór. 1 port.	
Diarrhœa ellen.	53 kr.

H. Centaurii herba. (Gentianaceæ.) Hatóanyaga erythrocentaurin (keserű anyag). Amarum. Adag infusumban 5,0—15,0; 150,0 2 ór. 1 evők. Keserű theakeverékek egyik megszokott alkatrésze. 100,0 = 20 kr.

H. Extractum Centaurii. Sűrű vizes kivonat. Amarum. Adag 0,5—2,0 pro dos. oldatban. Gyakran haszn. mint pilula-alapanyag. 10,0 = 26 kr.

H. Cera alba. Protectivum. Bels. emulsióban diarrhœánál, dysenterianál. Vele készül számos kenőcs, emplastrum, a charta cerata s a cereoli medicati (bougies medicales). 100,0 = 52 kr.

234 <i>Rp.</i> Cera alba	15,0.
leni calore liquefact.	
in mortario calefacto	
f. l. a. emulsio cum.	
Gummi arab.	10,0.
Aquæ dest.	150,0.
eni adde.	
Extr. Opii aquos.	0,1.
Elaeosacch. Menthae	10,0.
℞. 2 ór. 1 evők.	
Diarrhœa.	70 kr.

H. Cera flava. Mint a cera alba. 100,0 = 42 kr.

H. Ceratum cetacei. Részint mint protectivum, részint mint a bőrre alkalmazandó szerek vivőanyaga haszn. 10,0 = 7 kr.

Cerium oxalicum [$CeC_2O_4 \cdot 3(H_2O)$]. Fehér, szemcsés, légálló por, szagtalan, sem vízben, sem borszeszben nem oldódik, sósavban igen. Cardialgia, csillapíthatlan hányás (terhesek) ellen bels. adag porban 0,06—0,2 pro dos. napj. 3—4-szer. 1,0 = 5 kr.

235 <i>Rp.</i> Cerii oxal.	1,0.
Elaeosacchar. Menthae	4,0.
M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.	
℞. 3 ór. 1 port.	
	37 kr.

H. Cetaceum s. Sperma Ceti. Hófehér, fénylő, lemezesen jégcses, áttetsző, zsíros tapintatú, szagtalan, íztelen állati zsíradék. Főleg palmitinsavas cetylket. Kenőcsök, ceratumok készítésénél fontos anyag. 10,0 = 7 kr.

H. **Chamomillæ vulgaris flores.** (Compositæ.) Hatóanyag illó olaj. Illatos theakeverékek gyakori alkotórésze. Infusuma (15,0—20,0 : 150,0) jó vivőanyag. 100,0 = 27 kr. 200,0-túl 100,0 = 23 kr. 10,0 = 6 kr. (pulv.).

H. **Charta sinapisata** l. **Sinapis nigra.**

H. **Chinæ Calisayæ cortex planus s. China regia plana.** Cinchona calisaya (Rubiaceæ) törzsének kérge. Fő hatóanyagok chinin ($C_{20}H_{24}N_2O_2$), chinidin (isomer a chininnel), cinchonin ($C_{20}H_{24}N_2O$), cinchonidin (isomer a cinchoninnel). Az alkaloidokból legalább 20%-ot tartalmazzon mindhárom hivatalos kéreg. Amarum, tonicum. Adag: decoctum 1:10 vízzel, vörös borral. 10,0 = 15 kr. v. 10,0 = 20 kr. (pulv.).

H. **Chinæ Calisayæ cortex convolutus.** Cinchona calisaya (Rubiaceæ) ágainak kérge. Hatóanyagok, használat, adag, mint a törzsnek kérgénél. 10,0 = 12 kr. v. 10,0 = 17 kr. (pulv.).

H. **Chinæ succirubræ cortex.** Cinchona succirubra (Rubiaceæ) törzsének és nagyobb ágainak kérge. Hatóanyagok, használat, adag, mint fentlebb. 10,0 = 8 kr. v. 10,0 = 13 kr. (pulv.).

H. **Extractum Chinæ.** Vizes kivonata a cort. chinæ succirubr.-nak. Száraz, porítható. Csersavtartalma tetemes, alkaloidtartalma csekély. Tonicum. Adag porban, pilulában 0,5—2,0 többször napj. 1,0 = 11 kr.

H. **Tinctura Chinæ simplex.** Cort. chinæ succirubr.-ból készül. Tonicum, stomachicum. Adag 20—50 csepp pro dos. napj. többször. 10,0 = 6 kr.

H. **Tinctura Chinæ composita s. Tinctura roborans Whyti.** Cort. chinæ succirubr. mellett rad. gentianæ, flavedo cort. aurant. és cort. cassiæ cinnamomi is használtatik készítéséhez. Tonicum, stomachicum. Adag 20—50 csepp pro dos. napj. többször. 10,0 = 8 kr.

H. **Vinum Chinæ.** Malagaborral készül. Tonicum. Adag gyermekkanál-, tokaji pohárnyi 2—3 × napj. 10,0 = 11 kr.

236 Rp. Cort. Chinæ succirubr.

15,0.

Vini rubri 200,0.

f. l. a. decoctum

cui adde.

Elixir acid. Halleri 2,0.

Syrup. cort. Aurant.

20,0.

MDS. 2 ór. 1 evők.

Tonicum. Felnőttek.

90 kr.

237 Rp. Decoct. Chinæ Calisayæ e

4,0.

l. a. p. ad colat. 100,0.

Acid. sulf. dilut. gtt. 10.

Syrup. cort. Aurant. 15,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

5 éven túli gyermeknek mort. macul. Werlhof-nál, scorbut.-nál, v. reconvalescentia tartama alatt.

42 kr.

- 238 *Rp.* Cort. Chinæ succirubr.
Carbonis ligni depur.
aa 100,0.
M. f. pulv.
D_S. Hintőpor putrid sebekre.
1 frt 70 kr.
- 240 *Rp.* Extr. Chinæ 2,5.
Medullæ ossium bovis 25,0.
Olei Lavand. 1,0.
M. f. ungu.
D_S. Hajkenőcs.
68 kr.
- 242 *Rp.* Extr. Chinæ.
Extr. Centaurii aa 5,0.
Pulv. rad. Rhei chin.
qu. s.
Ut. f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Cassie Cin-
namomi.
D_S. 3 × napj. étkezés előtt
2—3 szemel. Stomachicum.
1 frt 20 kr.
- 239 *Rp.* Extr. Chinæ 0,2—0,4.
Aquæ dest. 100,0.
Syrup. simpl. 15,0.
M_DS. 2 ór. kk. v. gyk.
1—4 éves gyermeknek. To-
nicum. 31 kr.
- 241 *Rp.* Tinct. Chinæ comp.
Tinct. cort. Aurant.
aa 20,0.
Tinct. Nucis vomicæ 10,0.
M_DS. 3 × napj. 20—30
cseppet.
Amarum. Tonicum.
47 kr.
- 243 *Rp.* Tinct. Chinæ comp.
Tinct. Rhei vinos. aa 1,0.
Aquæ dest. 100,0.
Syrup. cort. Aurant. 15,0.
M_DS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—3 éves gyermeknek. Sto-
machicum.
29 kr.

Hivatalos chinin-készítmények.

II. Chininum ($C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot 3H_2O$). Fehér, selyemfényű, tű-
alakú jegecekből álló por. Keserű, lúgos kémhatású; vízben
alig, borszeszben elég jól oldódik. Gyógyezélokra sói használ-
tatnak. 1,0 = 30 kr.

H. Chininum bisulfaricum ($C_{20}H_{24}O_2N_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 7H_2O$).
Színtelen, hasábos kristályok, levegőn elmállanak; 11 sr. víz-
ben, 32 sr. borszeszben oldódik. Oldata savanyú kémhatású.
Antilypticum (antimalaricum), antipyreticum, (dos. totalis) toni-
cum, amarum, (dosis refracta). Adag bels. dosis totalis 0,5—1,0
pro dos. 2—3 × napj.; dos. refracta 0,05—0,1 pro dos. 3—4 × napj.
porban, pilulában, pastillában, oldatban. Subcután a hivatalos
chininsók közül ezen készítmény használtatik, mint vízben leg-
jobban oldódó. 1,0 = 20 kr.

H. Chininum hydrochlorionum ($C_{20}H_{24}O_2N_2 \cdot HCl \cdot 2H_2O$).
Fehér, selyemfényű, többnyire összegomolyodó jegeczkék. Ke-
serű ízű. 34 sr. vízben, 3 sr. borszeszben oldható. Oldata neu-
trális kémhatású. Hatás, használat mint a Chinin. bisulf. Subcután
ritkábban. 1,0 = 20 kr.

H. Chininum sulfuricum $[(C_{20}H_{24}O_2N_2)_2 H_2SO_4 \cdot 7H_2O]$. Igen finom, hajlékony, túalakú, gomolyokká összetapadó, selyemfényű, keserű ízű kristálykák; száraz levegőn elmállanak. 300 sr. hideg, 25 sr. forró vízben, 60 sr. hideg, 6 sr. forró borszeszben oldodik. Ha vízben oldani akarjuk 0,08-hoz 1 csepp acid. sulf. dilutum veendő. Hatást, használatot l. chinin. bisulfuricumnál. 1,0 = 10 kr.

H. Chininum tannicum insipidum Rozsnyai. 100 részben 30–32 sr. chinin. Sárgás színű, íztelen por, vízben alig, 40 sr. borszeszben oldódik. Hatás, használat, mint a chinin. bisulf. Adag $2\frac{1}{2}$ –3-szor annyi, mint a Chinin. bisulf.-ból. 1,0 = 13 kr.

244 *Rp.* Chinin. sulfur. 1,5.

Pulv. folior. Digitalis.

Opil pur. pulv. āā 0,3.

Succi Liquirit. qu. s.

ut f. pilul. No. 30.

℞. 3 × napj. 1–3 szemet.

(Pilul. Heimii phthisisnél.)

70 kr.

246 *Rp.* Chinin. bisulfur. 2,0.

Aquae dest.

Syrup. Mororum āā 50,0.

℞. Intermittens malari-

cánál felét egy óra alatt el-

fogyasztni 3–4 órával a

várt lázroham előtt.

78 kr.

248 *Rp.* Chinin. hydrochlor. 2,0.

Div. in dos. æqu. No. 10.

Det. in caps. amylac.

℞. 2–5 adagot pro die ren-

delet szerint.

Antipyreticum, antimalari-

cum, antineuralgicum.

89 kr.

250 *Rp.* Chinin. sulfur. 0,5.

Sacchar. alb. 5,0.

M. f. pulv. div. in dos.

æqu. No. 10.

℞. 3 ór. 1 port. Tonicum.

31 kr.

245 *Rp.* Chinin. sulfur. 0,4–0,6.

Aquae dest.

Syrup. Rubi Idæi āā 40,0.

Acid. sulfur. dil. gttas

qu. s. ad perfect. solut.

℞. 1 gyk.

2–6 éves gyermeknek vál-

tóláznál lázmentes időben

a szer felét ór. 1 gyk.

39 kr.

247 *Rp.* Chinin bisulfur. 1,0.

Aquae dest. 11,0.

M. filtra.

℞. Bőr alá fecskendésre.

1 fecskendő folyadék 0,07–

0,08 chinint tartalmaz.

41 kr.

249 *Rp.* Chinin. hydrochlor. 1,0.

Aquae dest. 100,0.

f. solut. ad misce

Vitell. ovi unius.

Tinct. Opil simpl. gtt. 10.

℞. 2 csőrének.

Antipyreticum. 56 kr.

251 *Rp.* Chinin sulfur.

Ferri sulfur. āā 1,5.

Pulv. et extr. Liquirit.

qu. s.

ut f. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Liquiritiae.

℞. 3 × napj. 1–2 szemet.

Anaemia, Chlorosis.

55 kr.

252 *Rp.* Chinin. tannici 3,0.
 Pastar. cacaotinae saccharat. qu. s.
 ut. f. trochisci No. 10.

Ds. Rendelet szerint. Chininchocolade. 1 trochiscus 0,1 chinint tartalmaz. Gyermekeknek váltólázás roham előtt 3 órával 1-3 darabot.
 83 kr.

253 *Rp.* Chinin. tannici.
 Natrii bicarbon. aa 0,5.
 Lactucarii german. 0,2.
 Sacchar. albi 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.

Ds. 4 port napj.
 4-6 éves gyermeknek.
 Phthisis.
 35 kr.

Nem hivatalos china-készítmények.

Chininum bimuriaticum carbamidatum. 70% chinint tartalmaz. Hosszú, fehér, prismaticus jegeczek = s. r. vízben oldatnak. Kötő készítmény bőr alá fecskendés céljaira. Hosszabb időn át nem tartható, bomlik. Antipyreticus adag 0,2-0,5 pro dos. 2-3 × napj.

254 *Rp.* Chinin. bimuriatici carbamid. 2,0.
 Aquæ dest. 8,0.
 M. filtra.

Ds. Bőr alá fecskendésre.
 1 fecskendőben 0,2 gm. van a készítményből.

Chininum ferro-citricum. Fénylő, kissé áttetsző, vörösbarna lemezek, keserű ízűek, 3 r. vízben oldódnak. 9% chinint és 30-32% vasoxydot tartalmaz. Haszn. chlorosisnál, anæmiánál, scrophulosisnál. Adag porban, pilulában v. oldatban 0,1-0,3 pro dos. 3-4-szer napj. Főleg a gyermekgyakorlatban haszn. 1,0 = 20 kr.

255 *Rp.* Chinini ferro-citrici 0,3-0,5.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.

Ds. 3-4 ór. 1 port.
 4-8 éves gyermeknek.
 32 kr.

Chininum salicylicum ($C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot C_7H_6O_3 \cdot H_2O$). Fehér, laza jegeczek, hideg vízben nehezen, borszeszben könnyebben oldódnak. Egyesíti a chinin és salicylsav hatásait. Antipyreticum. Adag 0,1-0,5 pro dos. porban 3-4 × napj. 1,0 = 60 kr.

Chinidinum sulfuricum sen Conchininum sulf. s. β.

Chininum sulf. Isomer a chininum sulf.-al. Finom, túalakú, színtelen, keserű ízű jegeczek. Vízben könnyebben oldódik, mint a kénsavas chinin. Hatás, használat, mint a chininsóknál. Hatása a chinin. sulf.-éhoz úgy viszonylik, mint 3:5 : 4. 1,0 = 20 kr.

Cinchoninum sulfuricum [(C₂₀H₂₄O₄N₂)₂H₂SO₄·2H₂O].

Nagyobb épszögű hasábokból álló kemény jegeczek, kevésbé keserűek, mint a chinin sulfur. 60 r. vízben oldódik, 7 r. tömény borszeszben. Hatása, használata, mint a chinin. sulfuricumé, adaga azonban félszer nagyobb legyen. 1,0 = 10 kr.

Chinolinum (C₉H₇N). Színtelen, olajszerű, erősen fénytörő, keserű mandolaolaj-szagú folyadék. Vízben nehezen, borszeszben könnyen oldódik. Antisepticum, s mint ilyen száj-, torokvíznek haszn. 1,0 : 500,0 (keves borszész segélyével feloldani); diphtheritisnél torokecsateelésre 5%-os víz-borszeszes oldat. Bels. ma már nem haszn. 0,1 = 2 kr.

Chinolinum tartaricum [3(C₉H₇N) · 4(C₄H₆O₆)]. Selyemfényű, színtelen, légálló, keserű mandolaolaj-szagú jegeczek; vízben elég jól oldódnak. Íze nem keserű. Bels antipyreticum, antimalaricum (?). Adag porban, oldatban 0,5—1,5 pro dos. 3—4×napj. 0,1 = 2 kr.

†H. **Chloralum hydratum** (C₂Cl₃H₃O₂). Színtelen, állászókristályok: szaga gyengén szúrós, íze kesernyész, csipős; vízben borszeszben oldódik. Sedativum kis adagban, hypnoticum nagy adagban. Substantiában nem szabad adni! Ellenjavalt a gyomor lobos vagy fekélyes bántalmainál, szívbajoknál. Lázás bántalmak esetén csak kis adagban. Sedativ adag nyákos oldatban 0,1—0,5 pro dos. 2—3 ór. Hypnoticus adag oldatban, pilulában, vagy klystirben, suppositoriumban, 1,5—2,5 egyszerre vagy két adagra osztva lefekvés előtt. Bőr alá fecskendezve tályogokat okozhat. Dos. maxim. sing. 3,0 ! dos. maxim. pro die 6,0 ! 10,0 = 18 kr.

256 Rp Chlorali hydrati 4,0.
Syrup. corl. Aurant. 60,0.

M. f. solutio.

℞S. Lefekvés előtt felét elfogyasztani.

Hypnoticum.

45 kr.

257 Rp. Chlorali hydrati 2,0.
Mucilag. Gummi arab. 50,0.
Aquae dest. aa

℞℥S. Csőrének. Egyszerre elfogyasztani.

61 kr.

258 *Rp.* Chlorali hydrati 5,0.
Morphini hydrochlor. 0,05.
Aqua Menthae pip. 120,0.
Syrup. cort. Aurant. 30,0.
MDS. 2 ór. 1 evőkan.
Sedativum elmebetegeknek.
61 kr.

259 *Rp.* Chlorali hydrati 0,2—0,5.
Aqua dest. 80,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
Csecsemőknek trismus és tetanus esetén. Ha a gyermek nyelni nem tudna, csőrében rendelő az összes adag fele, esetleg az oldat az orron át öntendő be. 29 k.

†H. **Chlorodine.** (Tartalmaz: extr. cannabist, aether aceticust, chloroformot, tinctura zingiberist és syrupus aurantiorumot.) Zöldessárga színű, csipős ízű, chlorof.-aether szagú folyadék. Bels. antispasmodicum, sedativum, azonkívül cardialgia, kolika ellen. Adag 15—20 csepp pro dos. napj. többször. Dos. maxim. sing. 1,5! dos. maxim. pro die 6,0! 10,0 = 16 kr.

†H. **Chloroformium e chloralo** (CHCl_3). Szintelen, átlátszó, nem kellemetlen szagú, édeses ízű folyadék. Vízben alig oldódik, borszeszzel, aetherrel és zsíradékkal elegyíthető. Forr 60—61° C.-nál. Küls. linimentum alakjában bőrre dörzsölve fájdalomcsillapító, elvonó neuralgiáknál, rheumatismusnál. Bels. belégzések alakjában strychnin mérgezésnél, letanusnál, eclampsianál; sebészeten nagyobb műtétek kivételénél, mint anaestheticum, narcoticum. Anesthesia és narcosis előidézésére 5,0—10,0 szükséges; iszákosoknál több (vigyázat!). Szívántalmaknál ellenjavalt. Narcosis tartamát meghosszabbíthatjuk s chloroformot megtakaríthatunk morph. hydrochl. előzetes bőr alá fecskendezésével (0,01—0,03). Per os *tiszta chlorof.*-ot ne adjunk!! 10,0 = 17 kr. 100,0 túl 10,0 = 14 kr.

260 *Rp.* Chloroformii
Ol. Hyosciami aa 20,0.
M. f. linim.
DS. Külsőleg, bőr bedörzsölésére.
Neuralgia, rheumatismus.
50 kr.

261 *Rp.* Chloroformii 10,0.
Cera alb. 5,0.
Adipis suilli 85,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.
Pruritus.
63 kr.

H. **Chorda carbolata**, l. Acid. carbol.

Chrysarobinum, l. Araroba.

Cinae flores. (Compositae.) Hatóanyaga santonin. Virágok már nem használtatnak, helyette santonin rendeltetik. 50,0 = 7 kr.

†H. **Santoninum** ($\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_3$). Santonsavanhydrid. Szintelen, hasábalakú, vagy pikkelyes kristályok. Vízben alig, borszeszben

is kevésbé oldódik. Haszn. ascaris lumbricoides ellen. Adag porban, pastillában gyermekeknek 0,02—0,04 pro dos. napj. 3—4-szer, felnőtteknek 0,05—0,1! pro dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. pro die 0,3! 0,1 = 1 kr.

262 *Rp.* Santonini 0,2—0 4.
Olei Ricini 50,0.
℞℞. 2 ór. 1 kk. székürülés
bekövetkeztéig.
2—4 éves gyermeknek.
34 kr.

263 *Rp.* Santonini 0,2—0,4.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
℞℞. Délelőtt 3—4 port; d. u.
1—2 kk. v. gyk. ol. ricini.
3—8 éves gyermeknek.
28 kr.

264 *Rp.* Santonini 0,25.
Pastæ cacaotinæ saccharat. qu. s.
ut f. pastilli No. 10.
℞℞. Santoninchocolade.
1 drb tart. 0,025 santonint.
47 kr.

Cinchoninum sulfuricum, l. chinakészítmények cz. a.

†H. **Cinnabaris factitia** (HgS). Igen finom por. élénk piros, szagtalan, íztelen. A decoct. Zittmanni készítéséhez haszn. 10,0 = 9 kr.

H. **Cinnamomi Cassiæ cortex**. (Laurineæ.) Hatóanyagai illó olaj, kevés csersav, gyanfa. Pora pilulahintő-por, íz és szagjavító; a kéregdarabok keserű vagy illatos theakeverékek, tincturák készítéséhez használtatnak. 100,0 = 32 kr., 10,0 = 6 kr. (pulv.).

H. **Aqua Cinnamomi simplex**. Szagjavító vehiculum. 100,0 = 18 kr.

H. **Aqua Cinnamomi spiritnosa**. Szagjavító vehiculum 100,0 = 22 kr.

H. **Syrupus Cinnamomi**. Íz- és szagjavító. 10,0 = 5 kr.

H. **Tinctura Cinnamomi**. Keserű vagy illatos tincturák alkatrésze. Stomachicum. Adag 25—30 csepp pro dos. napj. többször. Szokásos meliorrhagiák ellen is adagolni. 10,0 = 3 kr.

H. **Oleum Cinnamomi Cassiæ**. Illatos olaj. Szagjavító. Elæosaccharum készítéséhez haszn. 1,0 = 4 kr.

H. **Citri cortex fructus**. (Aurantiaçææ.) Hatóanyagai keserű anyag és illó olaj. Keserű vagy illatos theakeverékekhez, tincturához haszn. 10,0 = 7 kr.

H. **Citri flavedo corticis**. Hatóanyagok, használat, mint fentlebb. 10,0 = 7 kr.

H. Oleum citri. Illatos olaj. Elaeosaccharum készítéséhez haszn. 1,0 = 4 kr.

†**H. Cocainum hydrochloricum** ($C_{17}H_{21}NO_4 \cdot HCl$). Fehér, jegezes por, vagy szintelen kristályok. Ize kesernyés és a nyelvel mulékonyan érzésteleníti. Vízben, borszeszben, chloroformban könnyen oldódik. Vizes oldata semleges kémhatású. Helybeli anæstheticum, analgeticum. Szem érzéstelenítésére 5%-20%-os oldatból néhány csepp a kötőhártya-redőbe cseppenletik; szájfekélyek 5%-10%-os oldattal ecsetelendők; garathyperæsthesiánál, anginánál 2%-5%-os oldattal ecsetelések; gége-, orrtükrözés előtt a garat 10%-20%-os oldattal érzéstelenítendő; endolaryngealis vagy endonasalis műtéteknél gége, orrnyákhártyája 10%-20%-os oldattal ecsetellessék; gégefekélyek 10%-os oldattal kezelve, szűnnek a köhögési inger s a nyelési nehézségek; dobhártya 5%-10%-os oldat néhány cseppjével érzéstelenítendő; foghús a végzendő műtétek előtt 5%-os oldattal ecsetelendő; fogextractionál előbb a megfelelő foghúsrészletet kell érzésteleníteni, azután a foghúsba 10%-15%-os oldatból $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ Pravaz-fecskendőnyit fecskendezni; férfi, nő húgycsővét 2%-os oldat 2—3 centimeterje érzésteleníti; égési sebek, herpes Zoster, fissura ani, sebes csicsbimbók stb. 2%-5%-os oldattal ecseteltessenek. Belsőleg cardialgia, csillapíthatlan hányás (terhesek, tengeri betegség) esetén, idült morphinismus gyógykezelésekor az abstinentia alatt 0,02—0,05 l pro dos. napj. 3—4-szer porban, pilulában, cseppekben, bőr alá fecskendés alakjában. Dos. maxim. pro die 0,2 l. Heveny cocain-mérgezés esetén amyl-nitrit néhány cseppje légzendő be. 0,01 = 3 kr.

265 *Rp.* Cocaini hydrochlor. 0,5.
Ungu. emoll. 25,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs.
Tenesmusnál a végbélnyílásba babnyi bedörzsölendő.
2 frt.

267 *Rp.* Cocaini hydrochlor. 0,1—0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.

DS. Szükség esetén egy port.
Cardialgia, hyperæsthesis.
56 kr.

266 *Rp.* Cocaini hydrochl. 0,5.
Aquæ dest. 10,0.
Hydrarg. bichlor. corros. 0,001.
M. f. solutio filtra.

DS. Bőr alá fecskendésre 5%-os cocain oldat; az orvos kezéhez. Kisebb a bőrön végrehajtható műtéteknél anæsthetisálás céljából $\frac{1}{2}$ —1 fecskendőnyi használandó el. 1 frt 72 kr.

268 *Rp.* Cocaini hydrochlor. 0,5—1,0.
Aquæ dest. 50,0.
MDS. Belehelésre Siegle-féle permetezőből. Görcsös köhögésnél. 1 frt 71 kr.

269 *Rp.* Cocaini hydrochlor.
0,15—0 25.
Butyri Cacao qu. s.
ut f. supposit. No. 5.
D^s. Egy darabot elhasználni
szükség esetén. Tenesmus.
98 kr.

270 *Rp.* Cocaini hydrochlor 1,0.
Aque dest. 8,0.
Spiritus 2,0.
M^dS. Külsőleg. 10%-os co-
cain-oldat.
3 frt 22 kr.

†H. **Codeinum**, l. Opium.

†H. **Coffeinum** ($C_8H_{12}N_4O_3$). Tüalaku, fehér, selyemfényű,
kellemetlen kesernyész ízű kristályok. 80 sr. hideg, 2 sr. forró
vizben, 50 sr. borszeszben oldódik. Cardiacum (digitalis pó-
tszere, nem cumulativ hatású), diureticum; ezenkívül hemicrania,
neuralgiák ellen is szokásos szer. Hivatalos sói használatnak,
melyek vízben jól oldódnak. Dos. maxim. sing. 0,1 ! dos. maxim.
pro die 0,6 ! 0,1 = 3 kr.

†H. **Coffeinum citricum**. 66% coffeint tartalmaz; vízben
jobban oldódik, mint a coffein. Adag porban 0,05—0,1 ! pro
dos. 3—4-szer napj. Dos. maxim. pro die 0,6 ! 0,1 = 3 kr.

†**Coffeinum natrio-benzoicum**. 75% coffeint tartalmaz;
2 r. forró vízben oldódik, s ha a víz kihűlt is, oldatban ma-
rad. Adag porban, oldatban, bőr alá fecskendezve 0,1—0,2 pro
dos. napj. 3—4-szer. 0,1 = 3 kr.

†H. **Coffeinum natrio salicylicum**. 55%—56% coffeint
tartalmaz; 2 r. forró vízben oldódik. Adag mint a Coff. natr.
benzoic. 0,1 = 3 kr.

271 *Rp.* Coffeini citr.
Chinin. hydrochlor.
Sacchar. alb 33 0,6.
M. f. pulv. div. in dos. 4,0.
æqu. No. 10.
D^s. Hemicrania esetén 1—3
port. napjában. 56 kr.

272 *Rp.* Coffein natrio-benzoic.
Aque dest. 1,0.
Syrup. Rubi Idæi 130,0.
M^dS. 2—3 ór. 1 evök.
64 kr.

273 *Rp.* Coffein. natrio-benzoic.
Aque dest. 2,0.
M. filtra. 10,0.
D^s. Bőr alá fecskendésre.
1/2—1 fecskendővel egy-
szerre. 81 kr.

274 *Rp.* Coffein. natrio-salicyl.
Elæosacchar. citri 1,0.
M. f. pulv. div. in dos. 3,0.
æqu. No. 10.
D^s. 2—3 ór. 1 port.
62 kr.

H. **Cognac s. Spiritus vini gallici**. Sárgás, tiszta, kellemes
borszesz szagú és ízű folyadék. 46—50% borszeszt tartalmaz. Ex-
citans, analepticum. Adag kávé-, evőkanalanként. 10,0 = 11 kr.

†H. **Colchici semina.** (*Colchicum autumnale*. Colchicaceae.)
Hatóanyaga colchicinum. Készítményei haszn. 10,0 = 2 kr.

†H. **Colchicinum** ($C_{17}H_{19}NO_5$). Alkaloid. Sárgásfehér, néha jegeces por, levegőn megbarnul. Ize tartósan keserű. 2 r. vízben, borszeszben oldható. Kősvényes, csúszos bántalmak ellen haszn. Adag pilulában, oldatban 0,0005–0,003! pro dos. 2–3 × napj. Dos. maxim. pro die 0,01! Nagy vigyázat, hevesen ható mérég (!), inkább az alábbi készítmények használtassanak. 0,01 = 2 kr.

†H. **Tinctura Colchici seminum.** Adag 15–30 csepp 2–3 × napj. vízben, syrupban. Dos. maxim. sing. 2,0; dos. maxim. pro die 6,0! 10,0 = 6 kr.

†H. **Vinum Colchici.** Adag 5–15 csepp 2–3 × napj. Dos. maxim. sing. 1,0! Dos. maxim. pro die 3,0! 10,0 = 10 kr.

275 *Rp.* Colchicini 0,015.
Pulv. et extr. Liqur. āā
qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Obduc. Collodio.

28. 3 × napj. 1–2 szemel.
Egy pilulában 0,0005 col-
chicin.

276 *Rp.* Tinct. Colchici 10,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
28. 3 × napj. 10–15
cseppet. 21 kr.

277 *Rp.* Vini Colchici 10,0.
Tinct. Opii simpl. 2,0.
28. 2–3 ór. 5–10 cseppet.
Vinum colchici opiatum.
26 kr. (EISENMANN.)

H. **Collodium.** Kissé sűrű, félig állatszó, közömbös kémhatású folyadék. Protectivum. 10,0 = 4 kr.

H. **Col odium flexile.** (50 r. collodium + 1 r. ol. ricini.)
Protectivum, nem törékeny. 10,0 = 8 kr.

H. **Collyrium adstringens luteum.** Szemvíz. Adstringens. Főalkatrészei zinc. sulf. és ammon. chlorat. Tisztán v. egyenlő r. vízzel elegyítve kötőhártyaredőbe cseppenteni néhány cseppel catarrh. conjunct. esetén. 10,0 = 3 kr.

†H. **Colocynthis fructus.** (*Colocynthis cucumis*. Cucurbitaceae.) Háatóanyaga a colocynthin ($C_{56}H_{42}O_{23}$), glycosida természetű keserű anyag. Drasticum, hydrogogum (?). Adag porban, pilulában 0,05–0,3! pro dos. Dos. maxim. pro die 1,0! Inkább az extractum használtatik. 10,0 = 11 kr. v. 10,0 = 19 kr. (subt. pulv.).

†H. **Extractum Colocynthidum.** Száraz kivonat. Drasticum. Adag porban, pilulában 0,05–0,1! pro dos. Dos. maxim. pro die 0,4! 1,0 = 11 kr.

†H. **Tinctura Colocynthidum.** Drasticum. Adag 5–20 csepp pro dos. Dos. maxim. sing. 1,0! Dos. maxim. pro die 3,0! 10,0 = 8 kr.

278 *Rp.* Fruct. Colocynth. pulv. 1,0.

Pulv. rad. Rhei chin.

Sacchar. alb. aa 2,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

℞. 1—2 port szükség szerint. 31 kr.

279 *Rp.* Extr. Colocynth.

Sapon. medic. aa 1,0.

Spiritus qu. s.

ut f. pilul. No. 20.

Consp. pulv. rhiz. Iridis.

℞. 1—2 szemet egyszerre. 47 kr.

280 *Rp.* Olei Ricini 30,0.

Tinct. Colocynth. 1,0.

℞℞. Egyszerre 1 evők. 23 kr.

II. Colophonium depuratum flavum. Világossárga, felette törékeny, üvegszerűen állászó, kézhez ragadó, hidegen szagtalan, terpentin ízű gyanta. Hintőpor alakjában stypticum. 100,0 = 6 kr.

Condurango cortex. (Gonolobus Condurango. Asclepiadace.) Hatóanyagai keserű anyag, gyanta, csersav. Stomachicum. Gyomorrák ellen is ajánlották. Adag: decoctum v. maceratum 15,0—20,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 10 kr.

281 *Rp.* Cort. Condurango 15,0.

macera per hor. sex cum

Aqua dest. 150,0.

filtra et adde

Syrup. Cinnamomi 20,0.

℞. 2 ór. 1 evők.

58 kr.

282 *Rp.* Decoct. cort. Condu-

rango e 15,0.

l. a. p. ad colat. 150,0.

Tinct. Opii crocat. 1,0.

Syrup. cort. Aurant.

10,0.

℞℞. 2 ór. 1 evők.

53 kr.

Conii maculati herba. (Umbelliferae.) Hatóanyaga coniin. Készítményei haszn. de ritkán. 10,0 = 1 kr.

Coniinum ($C_8H_{17}N$). Kereskedésbeli részben élenyülve. Színtelen v. sárgás, olajos, rossz szagú, maró folyadék. 100 r. vízben oldódik, borszeszben könnyen. Ritkán haszn. Főleg helybelileg kenőcs alakjában (0,05—0,1 : 10,0) mint fájdalomcsillapító. Bels. tetanus és strychnin-mérgezés ellen szóba hozták. Nem ajánlható! 0,01 = 2 kr.

Coniinum hydrobromicum ($C_8H_{17}N \cdot HBr$). Színtelen, túalakú, prismaticus jegeczek; vízben könnyen oldódik. Francia orvosok ajánlottak 0,001—0,005-öt pro dos. tussis convuls. asthma, neuralgiák, hányás ellen. 0,01 = 3 kr.

Extractum Conii. Borszeszes kivonat. Azelőtt mint antispasmodicum, antineuralgicum használtatott. Küls. kenőcsben 1 : 5—10; bels. 0,03—0,1 napj. 3—4-szer pilulában. 1,0 = 4 kr.

Convallariæ majalis herba. (Smilacææ.) Hatóanyagai convallamarin és convallarin (glycosidák). Cardiacum, diureticum, mint a digitalis, csakhogy gyengébb. Nem cumulativ hatású. Az értékét illető ellentétes tapasztalatok a készítmények különböző gyűjtési helyére és frissességére vezethetők vissza. Adag infus. 5,0 : 150,0 2 ór. 1 evök. Ha diarrhœa jelentkeznék mellőzendő a szer. 10,0 = 8 kr.

Tinctura Convallariæ majalis. Adag 10 csepp 3—4×napj. 10,0 = 15 kr.

283 *Rp.* Infus. herb. Convallariæ
maj. e 5,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 15.
Syrup. Scillæ 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
39 kr.

284 *Rp.* Tinct. Convallariæ.
Aquæ Amygdalar. amar.
aa 5,0.
MDS. 2 ór. 15 cseppet.
25 kr.

H. Coriandri fructus. (Coriandrum sativum. Umbelliferae.) Hatóanyaga illó olaj. Stomachicum, carminativum. Keserű v. illatos theakeverékek gyakori alkatrésze. 100,0 = 8 kr.

Coto cortex. (Származás ismeretlen.) Hatóanyaga a cotoin (glycosida). Antidiarrhœicum. Adag porban 0,2—0,5 pro dos. 3—4×napj. Helyette jobban használhatók készítményei. 1,0 = 2 kr.

Tinctura Coto. Adaga 10—20 csepp 2—3 ór. borban, nyákos folyadékban. 1,0 = 3 kr.

Cotoinum ($C_{22}H_{18}O_6$). Sárga, jegeces por. vízben nehezen, borszeszben jól oldódik. Adag pilulában, borszeszes oldatban 0,01—0,05 pro dos. 3×napj. 0,01 = 2 kr.

285 *Rp.* Tinct. Coto 20,0.
DS. 10—15 cseppet
3—4×napj.
70 kr.

286 *Rp.* Cotoini 0,5.
Sacch. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
DS. 3 ór. 1 port.
1 frt 26 kr.

Creolin. Feketésharna, kellemetlen szagú, mézsűrűségű anyag. Különös fajta angol kőszén száraz lepárlási terménye. Antisepticum, antiparasiticum (ectoparasiták ellen). Carbolsav helyett ajánlották mint nem mérges (?) anyagot. Mergező hatását újabban kimutatta FILENE. Főlöszleges szer, semmi különös előnyvel nem bír, s különbözők lévén a kereskedésbeli készítmények megbízhatlan hatású. 10,0 = 5 kr.

H. Crocus gallicus. Stigmata. (Crocus salivus. Irideæ.) Hatóanyag illó olaj. Stomachicum, emmenagogum. Adag porban, pilulában 0,2—1,0 pro dos. napj. 3—4-szer. Obsoletnek tekinthető. 1,0 = 18 kr. v. 1,0 = 20 kr. (subl. pulv.).

Crotonis semina. (Tigilium offic. Euphorbiaceæ.) Drasticum. Használtatik a belőle készült :

†H. **Oleum Crotonis.** Sárga v. sárgásbarna, áttetsző, sűrű, sajátos kellemetlen szagú, kezdetben enyhe olajos, később tartósan égető ízű zsíros olaj. Hatóanyaga: crotonolsav s annak glyceridje. Drasticum. Adag: klystirnek 1—2 csepp emulsióban, per os. $\frac{1}{4}$ —1 csepp pro dos. ricinusolajban v. emulsióban v. cukorral eldörzsölve. Dos. maxim. sing. 0,05! Dos. maxim. pro die 0,1! Nagy vigyázat!! 1,0 = 3 kr.

287 *Rp.* Olei Crotonis gtt. 2.
Olei Ricini 30,0.
M. exact.
℞. Rendelet szerint 1 kk.
23 kr.

288 *Rp.* Olei Crotonis gtt. 1.
Elaeosacchar. citri 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 4.
Dent. in chart. cerat.
℞. 3 ór. 1 port mig székletét
jelentkezik. 23 kr.

II. **Cubobæ fructus.** (Cubeba offic. Piperacæ.) Hatóanyagok: illó olaj, cubebin és gyanta. Gonorrhœa, cystitis chron. ellen. Adag porban, pilulában 1,0—3,0 pro dos. 3—4×napj. 10,0 = 21 kr.

II. **Extractum Cubebæ æthereo-spirituosum.** Mézsurúségű. Haszn. mint a fruct. Cubeba. Adag pilulában, capsula gelatinosában 0,5—2,0 pro dos. 1,0 = 21 kr.

289 *Rp.* Pulv. Cubebæ recent.
tus.
Extr. Cubebæ æther-spi-
rit. āā 5,0.
M. f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Lycopod.
℞. 3×napj. 3 szemet.
58 kr.

290 *Rp.* Extr. Cubebæ æther-
spirit.
Bals. Copaivæ
Pulv. Gummi arab. āā 5,0.
f. l. a. emulsio cum
Aqua Menthæ pip. 150,0.
adde
Syrup. simpl. 20,0.
℞. 3 ór. 1 evök.
76 kr.

Cucurbitæ Peponis semina. (Cucurbitaceæ.) Galandféreg-hajtó szer. Adag a decorticált magvakból 50—100 gm. pro dos. reggel éhgyomorra; utána 1 órával ol. ricini adassék.

291 *Rp.* Seminum Cucurbitæ decort. 60,0.
Sacchar. alb. 40,0.
M. f. pasta.
℞. Rendelet szerint elfogyasztani.
Tania solium.

- H. Cuprum aluminatum s. Lapis divinus s. Lapis ophthalmicus.** Fehéreskék, camphorszagú, vízben majdnem egészen oldódó darabok. Enyhe causticum, adstringens. Küls. substantiában fekélyes nyákhártyák edzésére; szemvíznek és húgycsőbe befecskendezésre 0,2—0,5 : 100,0 (filtra). 10,0 = 14 kr.
- +H. Cuprum sulfuricum** ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$). Ferde hasábalakú, kékszinű jegeczek. Levegőn kissé elmállik; 3,5 sr. hideg, 1 sr. forró vízben oldódik. Küls. substantiában mint nyákhártyákat, fekélyeket, hámfosztott bőrfelületeket edző szer; higabb oldatokban (0,20%—0,50%) mint adstringens haszn. Bels. emeticum. Adag: bels. porban, oldatban, electuariumban 0,1—0,15! Dos. maxim. pro die 0,5! 10,0 = 3 kr.

292 <i>Rp.</i> Cupri sulfur.	0,1.	293 <i>Rp.</i> Cupri sulf.	50,0.
Aquæ Rosar.	30,0.	Alumin.	150,0.
Tinct. Opii simpl.	0,5.	M. f. pulv. det. in scat.	
<i>℞℞℞.</i> Szemcseppek.		§. 2 kávéskanálnyi 1 liter	
Adstringens.		langyos vízben feloldandó.	
25 kr.		Fluor albus esetén a hüvely	
		irrigatiójára.	
		85 kr.	
294 <i>Rp.</i> Cupri sulf.	1,0.	295 <i>Rp.</i> Cupri sulf.	0,4.
Aquæ dest.	60,0.	Aquæ dest.	60,0.
<i>℞℞℞.</i> 5—10 perczenként 1		Syrup. simpl.	20,0.
kk. míg hányás jelentkezik.		<i>℞℞℞.</i> ¼ ór. 1 kk. míg há-	
Emeticum felnőttek.		nyás jelentkezik.	
23 kr.		Emeticum 2—6 éves gyer-	
		meknek	28 kr.

Daturæ Stramonii semina et folia. (Solanaceæ.) Hatóanyaga daturin, mely valószínűleg keveréke az atropinnak s hyoscyaninnak. Belladonna-készítmények egészen fölöslegessé teszik. Obsolet. 10,0 = 3 kr.

Tinctura Stramonii, mint a tinct. belladonnæ. 10,0 = 6 kr.

H. Decoctum Zittmanni fortius. Egyszerre 8 üveg (1000 gmos) rendelendő. Antidyscraticum, antisymphiliticum. Adag reggel melegen ½—1 üveggel, napközben vagy este a gyengébb decoctumból (l. köv.) szintén ½—1 üveggel. A gyógy mód 2—4 hétig tart. 8 üveg = 11 frt 50 kr.

H. Decoctum Zittmanni mitius. Egyszerre 8 üveg (1000 gmos) rendelendő, használatát l. fentl. 8 üveg = 9 frt 30 kr.

H. Dextrinum ($C_6H_{10}O_5$)_n. Színtelen vagy kissé sárgás, átlátszó, nem jegeczes darabkák. Vízben könnyen oldódik, s ragadós, semleges kémhatású folyadék képződik. Gyógyszerészeti technikában fontos szer. Kemény kötés készítésére vétessek

100 r. dextrin, 60 r. borszesz, 50 r. víz. A képződő péppel a pólyadarabok bekenendők. 10,0 = 2 kr.

†H. **Digitalis folia.** (*Digitalis purpurea*. Scrophularineae.)
 Hatóanyagai 1. Digitoxin ($C_{31}H_{53}O_7$). 2. Digitalin. 3. Digitalin.
 4. Digitonin (glycosidák). Gyenge antipyreticum; néha
 vérzések ellen jól szolgál; főleg incompensált kétégyű, három-
 egyű billentyű elégtelenségénél haszn., ugyanezen esetekben
 kitűnő diureticum. Cumulativ hatású, ezért nagy vigyázat hosz-
 szabb adagolás alkalmával. Bels. adag infus. 0,5—1,5 : 150,0
 2 ór. 1 evők. (2 napra elegendő), porban 0,1—0,2 pro dos.
 4—5×napj. Dos. maxim. sing. 0,2! dos. maxim. pro die 1,0!
 10,0 = 2 kr.

†H. **Tinctura Digitalis.** Használat, mint a leveleknél. Adag
 bels. 5—15 csepp 3—4×napj. Dos. maxim. sing. 1,0 (20 csepp)!
 dos. maxim. pro die 5,0! 10,0 = 7 kr.

296 Rp. Infus. folior. Digital.

e 0,6.
 l. a. p. ad colat. 140,0.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 10.
 Syrup. Scillae 10,0.

℞℞℞. 2 ór. 1 evők.
 35 kr.

297 Rp. Infus. folior. Digital.

e 1,0.
 l. a. p. ad colat. 150,0.
 Kalii nitr. 5,0.
 Syrup. simpl. 10,0.

℞℞℞. 2 ór. 1 evők.
 43 kr.

298 Rp. Infus. folior. Digital.

e 0,6.
 l. a. p. ad colat. 130,0.
 Elixir. acid. Halleri 2,0.
 Syrup. Moror. 20,0.

℞℞℞. 2 ór. 1 evők.
 39 kr.

299 Rp. Pulv. folior. Digital.

Chinin. sulf. aa 0,5.
 Sacchar. alb. 4,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.

℞℞. 2—3 ór. 1 port.
 32 kr.

300 Rp. Tinct. Digitalis 5,0.
 Aquæ Amygdalar. amar. 10,0.

℞℞℞. 3×napj. 10—20 csep-
 pet.
 Palpitatio cordis nervosa.
 27 kr.

302 Rp. Tinct. Digitalis 5,0.
 Kalii acet. solut. 15,0.

℞℞℞. 2 ór. 10—15 cseppet.
 Diureticum.
 27 kr.

301 Rp. Infus. folior. Digital.

e 0,2—0,3.
 l. a. p. ad colat. 100,0.
 Kalii acet. solut. 2,0.
 Syrup. simpl. 15,0.

℞℞℞. 2 ór. 1 gyk.
 3—6 éves gyermeknek diu-
 reticum pleuritis exsuda-
 tiva esetén.
 35 kr.

303 *Rp.* Folior. Digit. pulv.
 Bulb. Scillæ sicc. pulv.
 aa 1,5.
 Roob Juniperi qu. s.
 ut f. pilul. No. 30.
 Consp. pulv. Liquirit
 ℞. 3—4×napj. 1 szemel.
 Diureticum. 39 kr.

304 *Rp.* Infus. folior. Digitalis
 e 0,3.
 l. a. p. ad colat. 100,0.
 Aquæ Amygdalar. amar.
 gtt. 15.
 Syrup. simpl. 15,0.
 ℞℞. 2 ór. 1 gyk.
 6 éven túli gyermeknek.
 36 kr.

†H. **Doveri pulvis** l. Opium.

Duboisinum sulfuricum. Sárgás, amorph, vízszívó anyag.
 A duboisin ($C_{17}H_{23}NO_3$) némelyek szerint azonos a hyosciaminnel. Mydriaticum; az atropin-nél állítólag gyorsabban hat.
 Adag szemcseppeknek 0,01—0,1 : 20,0. Az orvos kezéhez! Sub signo veneni! 0,01 = 15 kr.

H. **Elaeosacchara.** Olajczukrok, illatos czukrok. Dörzsölés által elegyítetik 2 gm. sacchar. alb. + 1 csepp ol. æther. Íz- és szagjavítók. Leggyakrabban haszn. elaeosacchar. menthæ piper., anisi-, citri-, fœniculi.

H. **Electuarium lenitivum** l. Senna.

Emplastra.

H. **Emplastrum adhæsivum.** Ragtapasz. Contentivum, protectivum. Bőrre közömbös hatása. 10,0 = 4 kr.

H. **Emplastrum adhaosivum linteo extensum.** Contentivum, protectivum. Bőrre közömbös hatása. 100 □ ctm. = 7 kr.

H. **Emplastrum adhæsivum extensum americanum elasticum.** Kautschuk sparadrap. Contentiv. protectiv. Bőrre közömbös. 100 □ ctm. = 12 kr.

H. **Emplastrum anglicanum.** Protectivum. 10 □ ctm. = 4 kr.

H. **Emplastrum Cantharidum**

H. **Emplastrum Cantharidum perpetuum** } l. Cantharides.

H. **Emplastrum Cerussæ.** Száritó tapasz. 10,0 = 5 kr.

H. **Emplastrum diachylon simplex.** Protectivum. Alapanyag más tapaszok készítéséhez. Száritó. 10,0 = 4 kr.

H. **Emplastrum diachylon compositum.** Gyengén izgató, genyedést előmozdító. 10,0 = 3 kr.

H. **Emplastrum Hydrargyri.** Izgató, oszlató. Főleg syphiliticus fekélyekre rendeltetik. 10,0 = 8 kr.

H. **Emplastrum Minii adustum.** Izgató, oszlató. 10,0 = 5 kr.

H. **Emplastrum saponatum.** Gyengén izgató. 10,0 = 5 kr.

H. **Emulsio amygdalina** }
 H. **Emulsio oleosa** } 1. Amygdala dulcis.

†H. **Ergotina**, 1. Secale cornutum.

H. **Esorinum salicylicum** 1. Physostigminum salicyl.

H. **Eucalypti folia**. (Eucalyptus globulus. Myrtaceae.) Hatóanyagai illatos olaj, kevés gyanta és csersav. Antisepticum, antipyreticum, antimalaricum (?), diaphoreticum. Küls. kötésekhez infus. 10,0 : 100,0. Bels. infus. 10,0 : 150,0 2 ór. 1 evőkan. 10,0 = 1 kr.

H. **Oleum Eucalypti australe amygdalinum**. Majdnem színtelen illó olaj, vízben alig, borszeszben könnyen oldódik; lavandulához hasonló szagú, hűsítő, kesernyős ízű. Küls. elvonó linimentumnak 1 : 5 (ol. sesami); desiniciens sebkötő folyadéknak 2 r. : 20 r. spiritus + 80 r. víz. Belégzésre 10—15 csepp forró vízre cseppentendő, párák belégzendők. (Bronchitis fetida, gangrena pulmon., bronchiectasia esetén.) Bels. malaricus láznál 5—15 csepp pro dos. caps. gelatinosában 4—5-ször napj. (Nem megbízható.) 1,0 = 3 kr.

H. **Tinctura Eucalypti**. Bels. 2—4 kk. napj. febris intermittens malarica esetén a lázmentes időben; gyermekeknél tussis convulsiva ellen ajánlották. (3,0 : 100,0 3 ór. 1 gyk. 10,0 = 4 kr.

305 R. Tinct. Eucalypti 3,0.

(Glycerini

Syrup. simpl.

Sacchar. alb.

Aquae dest.

aa 15,0.

100,0.

3/4 D.S. 3 ór. 1 gyk.

Nagyobb gyermeknek tussis convulsiva ellen. (WITTHAUER.)

41 kr.

†H. **Euphorbium**. (Euphorbia resinifera. Euphorbiaceae.) Megszáradt tejnedv; sokalakú, leginkább borsónagyságú, szennyes, halványsárga, homályos, csipős ízű darabok; vízben, borszeszben csak részben oldódik. Izgató tapaszok alkotórésze. Azelőtt bels. mint drasticum haszn. most már obsolet. 10,0 = 5 kr.

H. **Extracta omnia** 1. a megfelelő drogue-ok czímei alatt.
Extracta fluida. (Fluid extract.) Amerikai gyógyszeralak, mely divatba kezd jönni. 1 köbctm. fluid extract rendszeren a készítéséhez felhasznált drogue 1 gm-jának felel meg. Igen czélszerű gyógyszeralak.

Fel tauri inspissatum. Besűrített marhaepe. Sötét barnászöld, sűrű anyag. Aloe- vagy jalapával készült hashajtó pilulákhoz mint alapanyag, ha azok ictericus betegnek rendeltetnek. 1,0 = 2 kr.

Ferri præparata.

H. Ferrum pulveratum (Fe). Finom, sötétszürke, iztelen, nehéz por, kevésbé fémsfényű. Bels. adag: 0,05–0,2 pro dos. 3–4×napj. porban, pastillákban. 10,0 = 4 kr.

H. Ferrum reductum (Fe). Szürke, fénytelen, igen finom por, íz- és szagtalan. Bels. adag 0,05–0,2 pro dos. 3–4×napj. porban, pilulában, pastillában. 1,0 = 3 kr.

Ferrum carbonicum saccharatum (FeCO₃). 10% vasat tartalmaz. Zöldesszürke por, édeses fémízű; emésztést csak kevésbé zavarja. Bels. adag 0,2–0,5 pro dos. 3–4×napj. porban. 1,0 = 1 kr.

H. Ferrum lacticum (FeC₆H₁₀O₆ · 3H₂O). Zöldesfehér, apró lüalakú kristályokból álló kergek vagy por. 40 r. hideg, 12 r. forró vízben oldódik, borszeszben alig; emésztést nem zavarja; Bels. adag: 0,1–0,5 pro dos. 3–4×napj. porban. 1,0 = 2 kr.

H. Pilulæ ferratæ. Egy szem tartalmaz 0,1 gm. ferrum lacticumot. Adag 1–2–3 szemet 3–4×napj. 1 db = 2 kr.

H. Ferrum natrio-pyrophosphoricum [2(Na₂Fe₂(P₂O₇)₂ Na₄P₂O₇) · 7H₂O]. Fehér, jegezes por, íze enyhén sós, de nem összehúzó, hideg vízben lassan és nehézkesen, langyosban könnyebben oldható. 12% vasat tartalmaz. Bels. adag: 0,2–0,5 pro dos. 3–4×napj. porban. 1,0 = 2 kr.

H. Liqueur Ferri oxydati s. Oxochloridum Ferri solutum [8Fe₂(OH)₆ · Fe₂Cl₆]. Sötét barnavörös, átlátszó, szagtalan folyadék, gyengén összehúzó ízű, 3 1/2% vasat tartalmaz. Ferrum oxydatum dialysatum helyett vétetett fel a M. Gyk.-be. Adag bels. 10–20 csepp pro dosi 3–4×napj. 10,0 = 5 kr.

Ferrum oxydatum dialysatum solutum. Híg, sötétbarna, kissé összehúzó ízű folyadék; 5% vaséleget tartalmaz. Bels. adag: 5–15 csepp pro dos. 3–4×napj. 10,0 = 4 kr.

H. Extractum malatis Ferri s. Extractum Ferri pomati. Körülbelül 8% vasat tartalmaz almasavas só alakjában. Zöldesfekete színű, vízben jól oldható anyag. Bels. adag 0,2–0,5 pro dos. 3–4×napj. oldatban, pilulában. 10,0 = 11 kr.

H. Tinctura malatis Ferri s. Tinctura Ferri pomati. Bels. adag 15–30 csepp pro dos. 3–4×napj. 10,0 = 9 kr.

Tinctura Ferri acetici ætherea. Tiszta, barnászörös, eczet-æther szagú, savanyús, összehúzó ízű, vízben jól oldódó folyadék. A vas hatása mellett kevésbé excitans is. Bels. adag 15–30–50 csepp pro dos. 3–4×napj. czukros vízben, tokajiban. 10,0 = 8 kr.

Az eddig felsorolt vaskészítmények küls. nem használatnak; bels. chlorosis, oligæmia, rhachitis, scrophulosus eseteiben. Ellenjavallatok: hæmoptoe, phthisis, lázak, plethora, acut gyomorhurut. Berétel legezélszerűbben étkezés közben.

- H. Ferrum oxydatum sulfuricum solutum** [$Fe(SO_4)_3$]. Sárgásbarna, állátszó, kissé sűrűs folyadék, nagyon összehúzó ízzel; 10% vasat tartalmaz. Csupán az antidotum arsenici készítéséhez haszn. 10,0 = 5 kr.
- H. Ferrum sesquichloratum crystallisatum** (Fe_2Cl_6). Kristályos, barnássárga, légen szétfolyó tömeg; vízben, borszeszben, ætherben jól oldódik. Csak oldatban haszn. L. a köv. készítményt. 10,0 = 7 kr.
- H. Ferrum sesquichloratum solutum s. Oleum Martis.** (Ferrum sesquichlor. crystall. + Aqua dest. aa.) Sötét, sárgásbarna folyadék. Küls. töményen causticum, hígítva stypticum. Bels. erős hígításban stypticum gyomor-, bélvérzések, vesevérzések, hæmoptoë (?) eseteiben. Küls.: injectiókra, belégzésekre 1%-os oldat; vérző sebek, diphtheriticus fekélyek ecsetelésére 1:2 vízhez v. 1:1 vízhez. Bels. adag: 1,0–2,0:150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 5 kr.
- H. Spiritus Ferri sesquichlorati æthereus s. Tinct. nervino-tonica Bestuscheffii.** Arany-sárga színű, összehúzó vasízű folyadék. Csak bels. chloroticus, olygæmicus, kimerült belegeknek. Adag: 10–30 csepp 3–4×napj. czukron v. tokaji borban. 10,0 = 6 kr.
- H. Ferrum sulfuricum oxydatum.** Vaszgálicz. [$Fe_2(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$]. Kékeszöld színű jegeszes por, vízben jól oldódik. Küls. hintőpor alakjában stypticum; $\frac{1}{2}$ %–1%-os oldatokban adstringens. Bels. kali carbonicummal mint Blaud-féle labdacsochlorosis ellen. 10,0 = 4 kr.
- H. Syrupus Ferri jodati** (100 részben 12,2 r. vasjodür). Színtelen v. kissé sárgás, vasízű. Scrophulosus, amyloid elfajulások, syphilis- és malariacachexia eseteiben bels. 15–30 cseppet 3–4×napj. 10,0 = 14 kr.
- H. Pilulæ Ferri jodati s. Pil. Blankardi.** Haszn. mint a syrup. Ferri jodat. Adag: 3–9 szemet napj. 1 db = 2 kr.
- H. Globuli martiales.** 40 gm. súlyú golyók. Feketék, fénylők, 8 r. forró vízben csaknem egészen oldódnak. Kalium-ferro tartaricumot tartalmaznak. Vasas fürdők készítéséhez 1–4 db használandó. Főlölesleges! Vasas fürdők pharmacologicæ nem igazolhatók! 1 db. 25 kr.

Felnőttek számára.

- 306 *Rp.* Ferri pulv.
Pulv. rad. Rhei āā 1,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
2*S.* Napj. 3 port. 29 kr.
- 308 *Rp.* Ferri reducti 2,5.
Pastae cacaotinae sacch. 50,0.
M. f. l. a. pastilli No. 50.
2*S.* 3×napj. 1—2 szemet.
70 kr.
- 310 *Rp.* Ferri lactici.
Extr. Chinæ.
Pulv. rad. Rhei āā 2,0.
Extr. Gentianæ qu. s.
ut. f. pilulæ No. 30.
Consp. pulv. Cinnamomi
2*S.* 3×napj. 1—3 szemet.
71 kr.
- 312 *Rp.* Extr. malat. Ferri 5,0.
Vini Malagens. 150,0.
M. f. solut.
2*S.* 3×napj. 1 evök.
94 kr.
- 314 *Rp.* Ferri sesquichlorat.
crist. 3,0.
Collodii Ilexil. 27,0.
2*li*2*S.* Külsőleg.
Collodium stypticum.
53 kr.
- 316 *Rp.* Ferri sulfur. oxydul.
Kalii carbon. āā 15,0.
Tragacanthæ
Syrup. simpl. āā qu. s.
ut. f. l. a. pilul. No. 100.
Consp. pulv. Cinnamom.
2*S.* 3×napj. 3 szemet, majd
4—5 szemet.
Blaud-féle pilulák NIEMEYER
után. 32 kr.
- 307 *Rp.* Ferri reducti.
Chinin, hydrochlor. āā 1,0.
Ekeosacchar. Cinna-
momi 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
2*li*2*S.* Napj. 3 port.
55 kr.
- 309 *Rp.* Ferri carbon. sacchar.
2,0.
Extr. Nucis vom. 0,1.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
2*S.* Napj. 3 port.
29 kr.
- 311 *Rp.* Ferri natrio-pyro-
phosph. 2,0.
Chinin. sulfur. 1,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
2*S.* Napj. 3—4 port.
40 kr.
- 313 *Rp.* Tinct. malat. Ferri.
Tinct. Chinæ comp. āā 10,0.
Tinct. nucis vom. 3,0.
2*li*2*S.* 3×napj. 20—30
cseppel. 32 kr.
- 315 *Rp.* Ferri sesquichlorati sol.
2,0.
Aque dest. 150,0.
Syrup. simpl. 20,0.
2*li*2*S.* Ór. v. 2 ór. 1 evök.
28 kr.
- 317 *Rp.* Syrup. Ferri jodati 20,0.
Syrup. simpl. 80,0.
2*li*2*S.* 3×napj. 1 kk.
62 kr.

318 *Rp.* Pilul. Ferri jodati.
Dent. No. 30.
§. 3×napj. 2—3 szemet.
67 kr.

Gyermekek számára.

- 319 *Rp.* Ferri reducti 0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. Nr. 10.
D§. 4 port naponla.
Serdülőknek. Chlorosis.
28 kr.
- 320 *Rp.* Ferri carbon. sacchar. 1,0.
Chinin. sulf. 0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
D§. 3×napj. 1 port.
32 kr.
- 321 *Rp.* Ferri lactici 0,5—1,0.
Calcariae carbon. præcip. 1,0—2,0.
Sacchar. alb. 10,0.
M. f. pulv. det. in scat.
§. Naponla 3 késhegygyel.
1—3 évesnek. Rhachitis.
22 kr.
- 322 *Rp.* Ferri lactici 0,3—0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
D§. 3—4 port naponla.
4—8 évesnek scrophulosis
esetén, ha nagyobb fokú
olygæmia is van jelen.
27 kr.
- 323 *Rp.* Ferri oxyd. dialys. 2,0.
Aque dest. 100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
D§. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
3—4 éves gyermeknek.
24 kr.
- 324 *Rp.* Ferri oxyd. dialys. 1,0.
Aque dest. 80,0.
Aque Menthae pip.
Syrup. cort. Aurant.
aa 10,0.
- 325 *Rp.* Tinct. malatis Ferri.
Tinct. amar. aa 10,0.
Solut. arsen. Fowleri 2,0.
D§. Reggel-este evés után
5 cseppet emelkedőleg 15—
20 cseppig.
Cachexia malarica.
30 kr.
- D§. 2 ór. 1 gyk.
28 kr.
- 326 *Rp.* Ferri sesquichlor. solut.
gtt. 8—10.
Aque dest. 150,0.
D§. Külsőleg.
Diphtheritisnél a torok ki-
fecskenedésére.
23 kr.

327 *Rp.* Ferri sesquichlor. sol.
gtt. 10--12.

Tinct. Opii simpl.
gtt. 1--3.

Aquæ Cinnamom. simpl.

Aquæ dest. aa 40,0.

Syrup. simpl. 20,0.

Mod. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

1--4 éves gyermek. Enteritis follicul. Dysenteria chron.

37 kr.

329 *Rp.* Syrup. Ferri jodati 10,0.

Det. in vitro cœrul.

S. 4Xnapj. 3--4 cseppet.

2--4 éves gyermek. Scrophulosis.

27 kr.

328 *Rg.* Ferri sesquichlor. sol.
gtt. 10--15.

Aquæ dest. 100,0.

Syrup. simpl. 10,0--15,0.

Mod. 2 ór. 1 gyk.

3--8 éves gyermek. Nephritis scarlatinosa esetén.

330 *Rp.* Spirit. Ferri sesquichlor.
æther. gtt. 10.

Aque dest. 70,0.

Syrup. simpl. 10,0.

Mod. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

2--8 évesnek. Oligæmia.

22 kr.

331 *Rp.* Syrup. Ferri jodati 2,0.
Syrup. simpl. 40,0.

Mod. 2--3 kk. napj.

2--4 éves gyermek. Scrophulosis. 25 kr.

H. **Filicis Maris rhizoma.** (*Aspidium filix mas.* Polypodiaceæ.) Hatóanyagai filixsav és illó olaj. Anthelminticum tenniák ellen. 100,0 = 15 kr. Haszn. készítménye:

H. **Extractum Filicis Maris æthereum.** Felsűrű, zöldesbarna, vízben oldhatlan. Adag felnöttnék bels. caps. gelat. operculatában, pilulában, electuariumban 6,0--8,0 egy curához (éhgymorra); gyermeknek 2,0--4,0 electuariumban. 1,0 = 23 kr.

332 *Rp.* Extr. Filicis Maris æth.
6,0--8,0.

Pulv. Filic. Maris 2,0.

M. det. in caps. gelat.

operculat. No. 12--16.

D. 2 óra alatti bevenni.

Felnöttnék.

2 frt 29 kr.

333 *Rp.* Extr. Filic. Mar. æther.
4,0.

Melis rosati 10,0.

M. f. electuar.

D. 1 óra alatt 3-szorra bevenni.

4--8 éves gyermeknek.

H. **Filum sericeum antisepticum** l. Acid. carbol.

H. **Foeniculi fructus.** (*Foeniculum offic.* Umbelliferae.) Hatóanyaga illó olaj. Stomachicum, carminativum, galactogogum. Bels. adag porban 0,5--2,0 pro dos. napj. többször, infusumban 10,0--15,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. 100,0 = 14 kr.

H. **Aqua fœniculi** l. Aquæ aromathicæ.

II. Gallæ. Gubacs. Hatóanyaga csertav. Használtatik a tinct. gallarum készítésére. 100,0 = 24 kr. 10,0 = 6 kr. (pulv.).

H. Tinctura Gallarum. Adstringens. Csak küls. ecsetelésekre, tisztán v. tinct. jodi-val aa. 100 = 7 kr.

H. Gaze carbolatum album Listeri l. Acid. carbol.

II. Gaze hydrargyro bichlorato corrosivo imprægnatum l. Hydrargyri præparata.

II. Gaze jodoformio imprægnatum l. Jodoformium.

II. Gelatina animalis albissima. Állati enyv. 1 : 50 forró vízzel kihűléskor kocsonyát ad. 10,0 = 8 kr.

Gelsemii radix. (Gelsemium septemvirens. Loganiaceæ.) Hatóanyaga gelsemin (alcaloid). Erős méreg; gerinczvelőt, szívet bénítja. Antineuralgicum. 10,0 = 12 kr. Helyette készítménye használtatik a

Tinctura Gelsemii (1 : 15 spiritusra). Bels. adag 5—10 csepp 2—3×napj. (Vigyázat!) 1,0 = 2 kr.

331 *Rp.* Tinct. Gelsemii.

Tinct. Colchici aa 10,0.

℞ 3×napj. 10 cseppet.

Neuralgia. (GERHARDT.)

40 kr.

II. Gentianæ radix. (Gentiana lutea. Gentianeæ.) Hatóanyaga gentiopierin (keserű anyag). Amarum. Bels. adag porban, pilulában, decoctumban 0,1—0,5 pro dos. 3—4×napj. Egyik főszer keserű theakeverékekhez és tincturákhoz. 100,0 = 14 kr. 10,0 = 4 kr. (pulv.)

H. Extractum Gentianæ. Vizes kivonat. Amarum. Bels. pilulában, oldatban adag: 0,2—1,0 pro dos. 3—4×napj. Alapanyag hashajtó pilulákhoz. 10,0 = 18 kr.

335 *Rp.* Rad. Gentianæ
Rhiz. Calami aa 10,0.
Flaved. cort. Aurant. 5,0.
Conc. et cont. M. f. species.

℞ 1/4 részét egy csésze theára, mely egy nap alatt fogyasztandó el.

Amarum. 14 kr.

336 *Rp.* Pulv. rad. Gentianæ 1,0.
Natrii sulfur. 10,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.

℞ 3 port napjában.

Idült gyomorhurut, gyomoratonía.

30 kr.

H. Globuli martiales l. Ferrum.

H. Glycerinum [$C_3H_8(OH)_3$]. Színtelen, szagtalan, syrup-állományú átlátszó folyadék; íze édes, kémhatása semleges. Vízben, borszeszben minden viszony szerint, ellenben ætherben, chloroformban és zsíros olajokban nem oldható. Küls. puhító,

fedőszer. Bels. diabetes mellitusnál cukor helyett ételek édesítésére. Csőrében 1,5—2,0 kiűrtő hatású. Oldószer némely vízben oldhatlan anyag számára, mely v. a bőrre, v. a nyákhártyákra, v. a bőr alá viendő. Kenőcsökhöz, linimentumokhoz mint közömbös alapanyag. 10,0 = 3 kr.

H. Unguentum Glycerini. (Tragacantha 1 r. + spiritus 5 r. + glycerin 49 r.) Fedőszer. Kenőcsalapanyag. 10,0 = 8 kr.

H. Gossypium depuratum l. Lana Gossypii dep.

H. Granati Punicae cortex radiceis. (Myrtaceae.) Halóanyagai: pelletierin ($C_{16}H_{30}N_2O_2$ folyékony alcaloid) és isopelletierin ($C_{10}H_{30}N_2O_2$ folyékony alcaloid). Anthelminticum teniák ellen. Nem hashajtó. Adag: macerato-decoctum alakjában 30,0—60,0 : 600,0 vízre, 12 órai maceratio után felényire bepárlandó; egy óra alatt elfogyasztani éhgyomorra, utána ol. ricini. 10,0 = 5 kr. v. 10,0 = 9 kr. (pulv.).

H. Extractum Punicae Granati. Felsőrű vizes kivonat. Adag 8,0—10,0 egy curához, pilulában, caps. gelat.-ban. Utána ol. ricini. 1,0 = 8 kr.

Pelletierinum sulfuricum. } Adag oldatban, pilulában 0,3—
Pelletierinum tannicum. } 0,8 egy curához. Utána ol. ricini.

337 *Ip.* Cort. rad. Punicae Granati 60,0.
Aque fontis 600,0.
macera per 12 horas, dein coque usque ad remanent. 300,0.

colatura adde

Extr. Filicis Maris æth. 3,0.

Syrup. cort. Aurant. 30,0.

25. 3-szorra bevenni 1½ óra alatt reggel éhgyomorra.

Emelygés ellen citromos víz, rotula menthae pip. Felnőttek.

1 frt 53 kr.

340 *Ip.* Pelletierini tannici 0,5.
Aque dest. 80,0.
Syrup. simpl. 20,0.

2125. Reggel éhgyomorra bevenni 1 óra alatt.

3 frt 26 kr.

338 *Ip.* Cort. rad. Punicae Granati 15,0.
Aque fontis 200,0.
macera per 12 horas, dein coque usque ad remanent. 100,0.

colat. adde

Syrup. cort. Aurant. 20,0.

25. 3-szorra bevenni 1½ óra alatt reggel éhgyomorra.

4—8 éves gyermeknek.

53 kr.

339 *Ip.* Extr. Punicae Granati 8,0.
Tannini 1,0.
Pulv. rad. Althæe qu. s. ut f. l. a. pilul. No. 30.
Consp. pulv. rad. Althæe

25. 1½ óra alatt reggel éhgyomorra bevenni.

Felnőttek.

46 kr.

H. Gnajaum. Mogyorónyi, diónyi, zöldesszürke porral behintett, zöldesfeketés darabokban előjövő gyanta. Gyengén illatos,

ize kesernyés, csipős. Borszeszben, maró kalilugban oldódik. Régen mint antidyscraticum haszn. Ma obsolet. 10,0 = 9 kr.

II. Tinctura Guajaci resinæ. Kémszerek közt szerepel. 10,0 = 7 kr.

II. Guarana. A Paullinia sorbilis (Sapindaceæ) braziliai fának szárított és porrá tört magvaiból gyúrt készlet (pasta). Barnásfekete, belül vörhenyesen márványozott, kemény, törése majdnem egyenes, csekély fényű. Vízben részben oldható, sajátos szagú, fanyar-kesernyés ízű. Hatóanyagai coffein (5%), tannin és zsíros olaj. Hatása mint a coffeiné, e mellett adstringens is. Diarrhœa, dysenteria, hemicrania ellen bels. adag 0,5–2,0 pro dos. napj. 3–4-szer. 1,0 = 4 kr.

341 Rp. Guaranæ pulv.	5,0.	342 Rp. Guaranæ pulv.	0,5.
Sacchar. alb.	3,0.	Pulvis Doveri	0,1–0,3.
M. f. pulv. div. in dos.		Sacchar. alb.	3,0.
æqu. No. 10.		M. f. pulv. div. in dos.	
Det. in chart. cerat.		æqu. No. 10.	

§. Hemicrania esetén $\frac{1}{2}$ ór.

egy port a roham kezdetén.

Összesen 3–4 port.

52 kr.

D. in chart. cerat.

§. 2 ór. 1 port.

1–5 éves gyermeknek. Idült

bélhurut. 35 kr.

II. Gummi arabicum. Megszáradt növényi nedv. (Acacia-fajok. Mimosæ). Gömbölyded, fehér vagy sárgás, a felületen át nem metsző, íztelen, szagtalan darabok. Borszeszben nem oldódik, kétszeres mennyiségű vízzel ragadós, savanyú, nyúlós oldat képződik. Küls. hintőporban. oldatban bevonó. Bevonó klystirhez 1 : 3; száj- és torokvízhez 1 : 5–10. Bels. nem, ha csak nem mint vivőszer. Gyógyszerészeti technikában fontos szer, különösen emulsiók készítésénél. 10,0 = 10 kr., vagy 10,0 = 15 kr. (pulv.).

II. Mucilago Gummi arabici. (1 : 2 vízre.) Segítőszer pilulák, paszillák készítésénél; vivőszer. 10,0 = 7 kr.

II. Pulvis gummosus. (Amylum, rad. Liquirit. Pulv. Gummi arab. és Sacchar. alb. keveréke.) Vivőszer poralakú gyógyszerek számára sacchar. helyett. 10,0 = 8 kr.

II. Linctus gummosus. (Mucil. gum arab., Syrup. simpl. aa.) Keserű vagy csipős anyagok vivőszere.

II. Mixtura gummosa. (Mucii. gum. arab., Syrup. simpl. és Aqua dest. keveréke.) Vivőszer keserű v. csipős anyagok számára. 10,0 = 3 kr.

Gummi Kino l. Kino.

H. Guttapercha depurata. (Isonandra Gutta. Sapotaceæ.) Légen megszáradt, tisztított tejnedv. 1,0 = 5 kr. Előállítatik belőle-a

H. Lamina Guttapercha. Finom lemez. Vízáthatlan, zsír-
áthatlan fedőanyag. Sebészeti-, bőrgyógyászatban szerepel.

Gutti s. Gummigutti. Narancssárga, kagylós törésű, viasz-
fényű, szagtalan, édeses, majd égető ízű mézgyagya. Drasti-
cum. Bels. adag pilulában 0,01—0,05—0,2! 2—3×napj. Dos.
maxim. pro die 0,8! (M. Gyk. I. kiad.) Számos titkos szer,
p. o. a Morrison-féle pilulák is tartalmazzák (Nagy vigyázat!)
1,0 = 2 kr.

343 *Rp.* Gutti

Pulv. tub. Jalapae
Aloes āā 2,0.
Pulv. rad. Rheichin. 0,6.
Spirit. dil. qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Obducant. balsamo to-
luano.

§. 1—3 szemet egyszerre.

Drasticum.

70 kr.

344 *Rp.* Gutti

Folior. Digit. pulv.

Bulbi Scillae

Stibii sulf. aurant.

āā 1,0.

Extr. Graminis qu. s.

ut f. l. a. pilulae No. 50.

Consperg. Lycopodio.

2§. 2—3 ór. 1 szemet; emel-
hető az adag.

Pilulae hydrogogae Heimi.

41 kr.

Hamamelidis virginicae folia et radix. (Hamamelideae.)

Hatóanyaga csersav; a levelekben ezen kívül illó olaj. Ame-
rikában divatos adstringens, haemostaticum (minden fajta vér-
zések ellen). 10,0 = 5 kr. Használtatik készítménye az

Extractum Hamamelidis fluidum. Bels. adag 4,0—8,0
pro dos. 2—3 ór., vagy kávéskanalként cukros vízben, sy-
rupban. Főleg menorrhagiák, metrorrhagiák és haemorrhoida-
lis vérzések ellen. 1,0 = 3 kr.

345 *Rp.* Extr. Hamamelid. fluidi 40,0.

Aquae dest.

Syrup. cort. Aurant. āā 50,0.

2§. 2 ór. 1 gyk., evők.

1 frt 54 kr.

Helenin (C_6H_8O). Az Inula Helenium gyökeréből előállított
camphor. Szintelen, tüalakú, szagtalan, vízben oldhatlan, bor-
szeszben, aetherben, zsíros és illó olajokban jól oldható jege-
czek. Illó. Antiseptikus hatású (Korab). Francia részről belég-
zéseket ajánlottak phthisis, pertussis, bronchitis capillaris esetei-
ben. Bels. bronchitisek ellen 0,01—0,05 pro dos. 4—5×napj.
borszeszes oldatban, pilulában.

Hellebori viridis radix. (Ranunculaceae.) Hatóanyaga helle-
borein ($C_{26}H_{44}O_{15}$) és helleborin ($C_{36}H_{42}O_6$). (glycosidák.)
Drasticum. Szivre különben úgy hat, mint a digitalis. Népgyó-
gyászatban (Erdélyben) antihydropicum. Bels. adag porban,

pilulában, decoctumban 0,02–0,1 pro dos. 2–3 ór. (Vigyázat! Erős mérég! Mint drasticum nem!) 10,0 = 7 kr.

II. Hirudo medicinalis és H. officinalis. Pióca. (Annullata.) Csak egyszer használható. Használat után elpusztítandó. 1 db. = 12 kr.

Homatropinum l. Belladonna.

Hydrargyri preparata.

1. Hivatalosak.

II. Hydrargyrum purum s. Mercurius vivus (Hg). Ezüstfehér színű, élénk fémfényű, nehéz folyadék. Bels. ileusnál mint mechanicusan (súlyánál fogva) ható szer 100,0–200,0 mennyiségben. Különben csak kenőcs és tapasz előállítására haszn. 10,0 = 9 kr.

II. Emplastrum Hydrargyri l. Emplastra.

II. Unguentum Hydrargyri s. Unguentum cinereum. Antiphlogisticum, resolvens 2,0–3,0 1–2×napj. bedörzsölve. Phthiriasis esetén a bőr beteg területére 2,0–3,0 dörzsölendő be egyszer. Syphilisnél a bedörzsölési gyógymódhoz 1,0–2,0-os csomagok charta ceratában rendelendők. 10,0 = 10 kr.

III. Hydrargyrum bichloratum ammoniatum s. Mercur. præcipit. albus [$Hg(NH_2)Cl$]. Igen fehér por, vízben nem oldható, sem borszeszben. Causticum. Bels. nem. Küls. kenőcsökben főleg lágy fekélyre és bujakoros fekélyekre mint izgató, maró és specificus szer (1 : 10–20) 1,0 = 4 kr.

III. Hydrargyrum bichloratum corrosivum ($HgCl_2$). Apró, fényes, fehér jegecekből álló, szagtalan tömeg; maró és undorító fémmizű; szétdörzsölve fehér por; 16 sr. hideg, 3 sr. forró vízben, ugyanannyi borszeszben és 4 sr. ætherben oldódik. Causticum, antisepticum, antisiphiliticum. Küls. sebkezelésben mint antisepticum 1 : 1000–2000; condylomák edzésére 1 : 10; permete alakban belégzésre vagy torok-, szájvíznek 0,2–0,5 : 1000; hügcsőbe fecskendésre 0,05–0,1 : 100; bujakoros szájj-, torokfekélyek esetelésére 0,5–1,0 : 100. Bels. pilulában, porban, bőr alá fecskendés alakjában 0,005–0,01 pro dos. 1–2-szer. napj. Dos. maxim. sing. 0,03! Dos. maxim. pro die 0,1! Per os soha éhgyomorra. Por, pilula argillával készíthetők. Bőr alá fecskendésre szolgáló oldatban 1 r. $HgCl_2$ -hoz 10 r. $ClNa$ vételessék. Sublimatfürdőket l. Fürdők cz. a. 1,0 = 3 kr.

II. Gaze hydrargyro-bichlorato-corrosivo imprægnatum. Antiseptikus sebkötésekhez. 1 meteres-csomag = 40 kr. 5 meteres-csomag = 1 frt 65 kr.

II. Lana Gossypii Hydrargyro-bichlorato-corrosivo imprægnata. Antisepticus sebkötésekhez. 25,0 = 25 kr., 50,0 = 45 kr., 100,0 = 75 kr.

††**II. Hydrargyrum bijodatum rubrum** (HgI_2). Skarlátvörös por, vízben alig, hideg borszesz 130, — forró borszesz 20 súlyrészében oldható. Kissé erősebb causticum, mint a hydrarg. bichlor. ammon. Küls. kenőcsben 0,1–0,5 : 10. Bels. ritkán, még leginkább görvélyes egyének bujakórjánál. Bels. adag porban, pilulában 0,005–0,01–0,03 ! pro dos. Dos. maxim. pro die 0,1 ! 1,0 = 5 kr.

††**II. Hydrargyrum chloratum mite seu Kalomel** (Hg_2Cl_2). Finom, sárgásfehér, nehéz por, mely kristálytörmelékéből áll. Íz- és szagtalan. Vízben, borszeszben, aetherben oldhatlan. Küls. substantiában, mint a nyákhártyákat, fekélyeket enyhén edző hintőpor haszn. Bels. kis adagban antisyphiliticum (porban opiummal 0,02–0,05 pro dos. napj. 2–3-szor), nagy adagban laxans, diureticum 0,1–0,5 pro dos. napj. 2–3-szor (gyakran jalapával együtt). Cholera asiatica és nostras, valamint typhus abdom.-nál nagy adagban mint a beleket desinficiáló szert ajánlották. Dos. maxim. sing. 0,5 ! Dos. maxim. pro die 1,0 ! 1,0 = 3 kr.

††**II. Hydrargyrum cyanatum** [$Hg(NC)_2$]. Szintelen, áttetsző, hasábalakú jegeczek, maró, undorító fémizűek, szagtalanok, 13 r. hideg, 3 r. forró vízben, 15 r. hideg és 5 r. forró borszeszben oldódik. Bels. mint antisyphiliticum porban, bőr alá fecskendés alakjában a hydrarg. bichlor. corros. pótszeréül használtatik, fölötte azonban előnyei nincsenek. Adaga, mint a corrosivnek. Dos. maxim. sing. 0,03 ! Dos. maxim. pro die 0,1 ! 0,01 = 1 kr.

††**II. Hydrargyrum jodatum flavum** (Hg_2J_2). Zöldessárga, alakatlan por. Vízben, borszeszben oldhatlan. Küls. mint a hydrarg. bijod. rubr. Bels. szintén. Dos. maxim. sing. 0,05 ! Dos. maxim. pro die 0,2 ! 1,0 = 6 kr.

††**II. Hydrargyrum oxydatum flavum** (HgO). Sárga, alakatlan por, vízben nem oldható. Nyákhártyákra, fekélyekre edző hatású. Bels. nem. Küls. mint kenőcs lágy fekélyekre, syphiliticus fekélyekre 1 : 10–30, szemkenőcsnek 0,1 : 10–20. 1,0 = 5 kr.

†**II. Hydrargyrum sulfuratum rubrum.** I. Cinnabaris factitia.

- 346 *Rp.* Hydrarg. bichlor. ammon. 2,0.
Unguent. emoll. 30,0.
M. f. unguentum.
℞. Precipitat-kenőcs.
64 kr.
- 348 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,5.
Aqua destil. 500,0.
M. f. solutio
℞. 1 pro mille corrosivoidat.
42 kr.
- 350 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,2.
Glycerini 40,0.
℞. Syphiliticus torok-,
szájfekélyek esetelésére.
32 kr.
- 352 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,1.
Argillae alb. qu. s.
ut f. cum guttis nonnullis
Aqua dest. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Argillae
℞. 2-4 szemet naponta
38 kr.
- 353 *Rp.* Hydrarg. bijod. rubr. 0,05.
Kalii jodati 3,0.
Aqua destil. 150,0.
Glycerini 10,0.
M. f. solutio.
℞. Reggel, este egy evőkanállal. Lehet emelkedni
3-4 evőkanálíg naponta.
41 kr.
- 355 *Rp.* Calomelanos 10,0.
Det. in vitro cum epist.
vitreo clauso.
℞. Az orvos kezéhez. Calomel. Híntőpor.
47 kr.
- 347 *Rp.* Hydrarg. bichlor. ammon. Bismuth. subnit. aa 0,5.
Amyli
Glycerini aa 10,0.
M. f. unguent.
℞. Kenőcs szeplő s az epidermis más festenyzettsége ellen. (HEBRA.)
37 kr.
- 349 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 1,0.
Collodii flexil. 10,0—15,0.
℞. Corrosiv collodium edzésre.
30 kr.
- 351 *Rp.* Hydrarg. bichlor. corros. 0,1.
Natrii chlorati 1,0.
Aqua destil. 10,0.
M. f. solutio; filtra.
℞. 1%-os corrosivoidat.
Bőr alá fecskendésre. Sub sigillo. Az orvos kezéhez.
1/3—1 fecskendővel naponta.
23 kr.
- 354 *Rp.* Hydrarg. bijodati rubri 0,5.
Ungu. simpl. 20,0.
M. f. unguent.
℞. Kenőcs.
39 kr.
- 356 *Rp.* Calomelanos 0,5.
Opii pur. pulv. 0,05.
Sacch. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aequ. No. 10.
℞. 2-3-szor 1 port. Felnőtteknek.
Syphilis.
29 kr.

357 *Rp.* Calomelanos 0,05—0,1.
 Ferri lactici 0,2.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.

25. Reggel, este 1 port.

Csecsemőknek syphilis congenita esetén, ha nagyfokú vérszegénység is van jelen; ha nincs, úgy a ferum lact. elhagyandó.

29 kr.

359 *Rp.* Calomelanos 1,0.
 Tubera Jalapæ pulv.
 Sacchar. alb. aa 2,5.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 5.

25. Naponta 1—2 port.

Drasticum. 37 kr.

361 *Rp.* Hydrarg. jodat. flavi 0,05—0,1.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.

25. Reggel, este 1 port.

4—6 éves gyermeknek syphilis esetén. Ha diarrhœa is van jelen 0,2—0,3 pulv.

Doveri is tehető hozzá.

27 kr.

358 *Rp.* Calomelanos 0,05.
 Pulv. Doveri 0,05—0,08.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.

25. Reggel, este 1 port.

Csecsemőknek syphilis congen. esetén, ha bélhurut is van jelen. Ugyanez rendelendő cholera infantum ellen is, midőn a calomel összes adaga 0,08-ra emelhető, és 2 ór. adandó 1 por.

28 kr.

360 *Rp.* Calomelanos 2,0.
 Sacchar. alb. 5,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.

25. Naponta 3—4 port.

Diureticum.

31 kr.

362 *Rp.* Hydrarg. oxyd. flav. 0,15.
 Unguent. emoll. 5,0.
 M. f. unguent.

25. Külsőleg. Pagenstecher-féle szemkenőcs.

32 kr.

2. Nem hivatalosak.

Hydrargyrum bichloratum carbamidum solutum.

(1,0 hydrarg. bichlor. 100,0 forró, párolt vízben feloldatik, a lehűlt oldathoz 0,5 hugyany tétetik.) Hosszú időre nem rendelhető, mert megbomlik. Bőr alá fecskendésre igen alkalmas syphilis esetén. Napj. 1 fecskendővel. 1,0 = 1 kr.

Hydrargyrum formamidatum solutum. (LIEBREICH.) (1,0 frissen lecsapott higanyéleg oldata formamidben, az oldat felhigittatik vízzel 100 köbctmrig.) Bőr alá fecskendésre alkalmas syphilis esetén. Napj. 1 fecskendővel. 1,0 = 1 kr.

Hydrargyrum peptonatum. (BAMBERGER.) (1,0 húspepton 50 kctm. párolt vízben oldatik, az oldathoz 20 kctm. 5%-os sublimat oldat adatik; a megzavarodott folyadékhoz 20%-os konyhasó-

oldalból annyi adandó, hogy az feltisztuljon egészen; ezután a keverék vízzel 100 kctm.-ig felhigítandó.) Az oldat bőr alá fecskendésre igen alkalmas syphilis esetén. 1 kctm. megfelel 0,01 sublimatnak. Napj. egy fecskendővel. 1,0 = 5 kr.

Hydrargyrum tannicum oxydulatum. (LUSTGARTEN.)

Sötétzöld, színtelen, iztelen por, oldhatlan. Bels. porban syphilis ellen. Adag 0,1 pro dos. 3×napj. $\frac{1}{2}$ —1 órával étkezés után. 0,1 = 3 kr.

363 Rp. Hydrarg. tannici oxydul. 1,0.

Sachar. lact. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.

2S. 3×napj. 1 por.

30 kr.

II. Hydromel infantum l. Senna.

Hydrastis canadensis rhizoma. (Ranunculaceæ.) Hatóanyagai berberin, hydrastin (alcaloidok). Méhvérezések, tüdővérezések ellen köv. készítménye haszn. 10,0 = 14 kr.

Extractum Hydrastis fluidum. Adag 2 ór. 20—40 csepp syrupban. 1,0 = 4 kr.

364 Rp. Extr. Hydrastis fluidi.

Syrupi simpl.

3ā 30,0.

2/3 2S. 2—3 ór. 1 kk.

1 fcl 49 kr.

Hydrochinonum [$C_6H_4(HO)_2$]. Színtelen, 20 r. hideg vízben, borszeszben könnyen oldható, apró, prismaticus jegeczek. Mint antipyreticum kellemetlen mellékhatásai folytán nem válik be. Mint antisepticum itt-ott még használtatik 1—2%-os frissen készült vízdoldatok alakjában. 0,1 = 2 kr.

Hydrogenium hyperoxydatum (H_2O_2). Vízliszta folyadék, keserű, összehúzó ízű, könnyen bomlik. Kereskedésbeli készítmények 5—10%-os vízdoldatok. Helybeli izgató, desiniciens, élellyő (fekélyek ecsetelésére), cosmeticum (a barna haj arany-szőke szint nyer általa). Bels. nem. 10,0 = 6 kr.

†II. Hyosciami folia. (Hyoscyamus niger. Solanaceæ.) Hatóanyagai hyosciamin és hyoscin, melyek az atropinnal isomerek. Hatása, mint a folia belladonnæ-nak. Dos. maxim. sing. 0,2! Dos. maxim. pro die 1,0! Nem használtatik; helyette készítményei. 10,0 = 2 kr.

†II. Extractum Hyosciami foliorum. Dextrinnel készült borszeszes kivonat. Bels. porban, pilulában 0,01—0,05—0,15! pro dos. napj. 3—4-szer. Dos. maxim. pro die 0,8! 1,0 = 4 kr.

H. Oleum Hyosciami foliorum coctum. Küls. mint fájdalomcsillapító bedörzsölések alakjában. 10,0 = 3 kr.

Hyoscinum hydrochloricum.

Hyoscinum hydrojodicum.

Hatásuk mint az atropiné. Használatuk nem ajánlatos rendkívüli mérgező voltuk miatt. Adag különben subcután 0,0001—0,0005, per os 0,0005—0,001 pro dos.

Hyoscinum crystallatum ($C_{17}H_{23}NO_3$). Nem mindig tiszta készítmény, legjobb a Merck-féle. Selyemfényű jégcsek, vízben nehezen, savanyított vízben, borszeszben, ætherben könnyen oldódnak. A jó készítmény, mely hyoscint nem tartalmaz, hypnoticum, anodynum, antispasmodicum. Adag, mint hypnoticum subcután 0,001—0,005! (oldás glicerinnel). Per os pilulában mint anodynum 0,0005—0,001 pro dos. napj. 2—3-szor. Nagy vigyázat, különösen míg nem ismerjük a készítmény hatékonyságát és a beteg viselkedését a szer iránt. Jó lesz először a legalacsonyabb adaggal tenni kísérletet! 0,08 = 40 kr.

365 Rp. Extr. Hyosciami 0,5.
Pulv. rad. Ipecac. 0,2.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.

DS. 2—3 ór. 1 port. Bronchitisnél, görcsös köhögéskor.
29 kr.

368 Rp. Hyoscinum crystallatum.
Merck. 0,05.

Aquæ dest.

Glycerini aa 5,0.

DS. Hyoscinum bőr alá fecskendezésre. Sub sigillo.

Az orvos kezéhez. 1/3—1 fecskendővel egyszerre.

24 kr.

366 Rp. Extr. Hyosciami
Sulfur. aurat. Antimonii
aa 0,05—0,1.

Sacchar. alb. 3,0.

M. f. pulv. div. in dos.

æqu. No. X.

DS. 4 port naponta.
2—6 éves gyermekeknek bronchitis sicca esetén.

28 kr.

367 Rp. Olei Hyosciami cocti
Chloroformii aa 20,0.
M. f. linim.

DS. Külsőleg bedörzsölésre.
1 frt 14 kr.

Hypnonum l. Acetophenon.

11. **Ichthyocolla.** Halenyv. Gyógyszerészeti technicában bír fontossággal. 10,0 = 36 kr.

Ichthyolum ($C_{28}H_{36}S_3O_6H_2$). Fossil halak maradványait tartalmazó tyroli bituminosus ásvány száraz lepárlási terménye, melyet helyesebben sulfo-ichthyolsavnak kellene nevezni. Előállítják natrium, lithium, zink, higany és ammon sóit is. *Ichthyolum* név alatt rendszeren az *ammonium sulfo-ichthyolicum* értetik; mi is ezt értjük az alantiakban. Tiszta, vörösbarna, szirupszerű, kellemetlen szagú folyadék. Vízben, ætheres borszeszben tisztán oldódik. Élettani hatását nem ismerjük még

kielégítőleg. Használata küls. kenőcsök alakjában 1 : 10—20 idült *eccema*, *psoriasis*, *prurigo*, *acne rosacea*, *favus* ellen, azonkívül idült *rheumatismus* és *köszvény* eseteiben is. Bels. javalatai még elfogadhatólag meg nem állapítottak; adják pilulában. 0,1—0,3 pro dos. 1,0 pro die idült bőrbántalmak, izületi s izomrheuma, *hemicrania*, *cystitis* és *pyelitis chron.* eseteiben. 1,0 = 1 kr.

369 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
Vaselinæ 90,0.
M. f. unguent.
℞S. 10% ichthyolvaselin.
94 kr.

370 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
Unguent. diachyl. 200,0.
M. f. unguent.
℞S. Kenőcs.
Idült *eccema*. (Uxxa.)
1 frt 77 kr.

371 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
Aquæ dest. 20,0.
℞℞S. 2—3 × napj. 15—30
cseppel bels. (Uxxa.)
30 kr.

372 *Rp.* Ichthyoli 3,0.
Pulv. et extr. Liquirit.
āā qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
℞S. Többször napj. 1 szemet.
41 kr.

H. **Infusum laxativum** l. *Senna*.

H. **Infusum Rhei cum Natrio carbonico** l. *Rheum*.

†H. **Ipecacuanhæ radix.** (*Cephaelis Ipecacuanha*. Rubiaceæ.)
Hatóanyaga az emetin. Bels. porban 0,01—0,05 pro dos. 2—3-szor, v. infus. 0,2—0,5 : 150,0 2 ór. 1 evőkan., mint expectorans, anti-diarrhœicum, diaphoreticum; 0,3—1,0 pro dos. porban, infusumban, electuariumban 10 perezenként a hatás bekövetkeztéig, mint emeticum 1,0 = 3 kr. v. 1,0 = 4 kr. (pulv.).

†H. **Pulvis Doveri s. Pulvis Ipecacuanhæ cum Opio**
l. *Opium*.


†H. **Syrupus Ipecacuanhæ.** Adjuvans és izjavító köptető
folyadékokhoz. 10,0 = 5 kr.

†**Tinctura Ipecacuanhæ.** Expectorans adag 10—30 csepp
napj. 3—4-szer, v. mint adjuvans köptető folyadékokhoz
3,0—5,0 : 150,0. 10,0 = 13 kr.

373 *Rp.* Infus. rad. Ipecacuan-
hæ e 0,5.
l. a. p. ad colat. 140,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 10.
Natrii bicarbon. 3,0.
Syrupi Ipecac. 10,0.
℞℞S. 2 ór. 1 evőkanál.
Expectorans felnőttek.
45 kr.

374 *Rp.* Rad. Ipecac. pulv. 0,3.
Morphini hydrochlor. 0,05.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
℞S. 2—3-szor 1 port.
Diarrhœa. Catarrh. bronch.
Felnőttek. 29 kr.

- | | |
|---|--|
| 375 <i>Rp.</i> Pulv. rad. Ipecacuanhæ
Tartar. stibial.
Amyli
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 4.
25. 10 perczenként 1 port
a hányás bekövetkeztéig.
Emeticum felnőttek.
18 kr. | 376 <i>Rp.</i> Infus. rad. Ipecac. e 1,0.
l. a. p. ad colat. 60,0.
Oxymel. Scillæ 10,0.
M25. ¼ ór. 1 kk. v. gyk.
a hányás bekövetkeztéig.
Emeticum csecsemőknek (kk.)
s 1—4 éves gyermeknek
(gyk.).
35 kr. |
| 377 <i>Rp.</i> Infus. rad. Ipecac. e 0,1.
l. a. p. ad colat. 80,0.
Natrii bicarb. 0,4.
Syrupi simpl. 8,0.
M25. 2 ór. 1 kk.
Csecsemőknek expectorans.
Izgatott köhögés esetén 1
csepp tinct. opii teendő
hozzá.
40 kr. | 378 <i>Rp.</i> Infus. rad. Ipecac
e 0 15—0,2.
l. a. p. ad colat. 100,0.
Liquor. Ammoni anisati
gtl. 10—15.
Syrup. simpl. 10,0—15,0.
M25. 2 ór. 1 gyk.
2—5 éves gyermeknek ex-
pectorans.
36 kr. |
| Iridis florentinæ rhizoma. (Iridæe.) Hatóanyagai amyllum és illó olaj. Hintőpor, pilulaanyag, fogporok alkotórésze. Lapoczkákká faragva mint <i>Iris mundata</i> gyermeknek fogzáskor rágni adatik. 10,0 = 3 kr. | |
| Jaborandi folia. (Pilocarpus pennatifolius. Rutaceæ.) Hatóanyag pilocarpin (alcaloid). Hatalmas diaphoreticum, sialagogum. 10,0 = 6 kr. Helyette használtatik a hlv. :
†H. Pilocarpinum hydrochloricum. (C ₂₃ H ₃₄ N ₂ O ₄ , 2HCl). Színtelen, állatszó, tű- v. lemezalakú kristályok; íze alig keserű, kevésse összehúzó. Vízben, borszeszben könnyen oldódik. Hatása, mint a jaborandi leveleké. Adag subcután 0,01—0,02—0,03! pro dosi; per os 0,02 egész 0,03! pro dos. vízben v. borban oldva. Dos. maxim. pro die 0,06! Szívban-
talmak esetében vigyázat! Gyermekeknek subcután 0,005—0,01 korukhoz képest. 0,01 = 3 kr. | |
| 379 <i>Rp.</i> Pilocarpini hydrochlor.
Aquæ dest.
M. f. solut. filtra.
25. 2% Pilocarpin-oldat bőr
alá ferskendésre. Az orvos
kezéhez.
71 kr. | 380 <i>Rp.</i> Pilocarp. hydrochlor.
Pepsini german.
Acid. hydrochlor. dilut.
Aquæ dest.
M25. 1 ór. 1 kk.
Gyermeknek diphtheritis ese-
tén.
(GUTTMANN.)
32 kr. |



381 *Rp.* Pilocarpini hydrochlor. 0,025.

Cognac 5,0.

Aquar dest. 70,0.

Syrup. cort. Aurant. 25,0.

℞℞S. 2 ór. 1 kk. v. gyk.

Gyermeknek pertussis esetén. (ALBRECHT.)

†11. **Jalapæ tubera.** (Ipomea purga. Convolvulaceæ.) Hato-
anyaga jalapin seu convolvulin (gyanta). Kisebb adagban (0,2—0,5)
purgans, nagyobb adagban (0,5—2,0) drasticum; porban, pilu-
lában. Legtöbbször más catharticus szerekekkel, mint aloe, rheum.
calomel együtt (l. calomel). 10,0 = 7 kr.

†12. **Resina Jalapæ.** Sárgásbarna színű, fénylő lörésű, könnyen
szétmorzsolható. Vízben nem, borszeszben könnyen
oldható. Porban, pilulában 0,05—0,15 pro dos. purgans,
0,3—0,5 pro dos. drasticum. Leggyakrabban más catharticus
szerekekkel együtt. 1,0 = 11 kr.

H. **Pilulæ laxantes** l. Aloe.

382 *Rp.* Pulv. tuber. Jalapæ 2,0.

Kalii hydrotartr. 1,0.

M. f. pulv. div. in dos.

No. 2.

℞S. Egy port bevenni; ha

3 óra alatt nincs hatás, a

másik port is.

Drasticum.

8 kr.

383 *Rp.* Resin. Jalapæ.

Pulv. tuber. Jalapæ.

Extr. Aloes aquos.

Sapon. medic. aa 2,0.

Extr. Taraxaci qu. s.

ut f. l. a. pilule No. 40.

Consp. pulv. rad. Liquirit.

℞S. Reggel, este 1—2 szemet.

Obstip. habit.

60 kr.

Jequirity semina. (Abrus precatorius. Papilionaceæ.) A mag-
vak forrázata a benne levő bacillusok (SATTLER) folytán, ha a
kötőhártyára ecseteltetik genyes, sőt croupos conjunctivitist idéz
elő. Ezen tulajdonsága idült lobos kötőhártyabántalmak gyó-
gyítására használtatott fel némelyek által. SATTLER szerint az
infusum következőképen készítették: A forró vízben héjuktól
megfosztott magvakból 1,0 összezsúvatik, s 200,0 vízzel 24 órán
át macerállatván a kivonat leszűretik. A folyadékkal 4—6-szor
napjában ecseteltessek a kötőhártya.

†14. **Jodoformium crystallisatum** (CHJ_3). Czitromsárga
színű, z-firos tapintású, halszögű kris-ályelemzékéből áll, melyek
sáfranyra emlékeztető, de kellemetlen szagúak. Vízben nem,
50 sr. hideg és mintegy 10 sr. forró borszeszben oldódik, jól
oldódik zsíros és illó olajokban, valamint vaselinában is. Küls.
sebekre, fekélyekre hintőpor alakjában; kenőcshez 1:5—20.
Bels. subcután mint antisiphiliticum glycerinben feloldva 0,2—

0,3! pro dos. Per os 0,05—0,3! pro dos. pilulában, capsulában.
 Dos. maxim. pro die 1,5! Szagtalanítására legjobb a porhoz egy
 átmetszett faba tonca-t lenni v. cumarint; kenőcsökhöz mint
 szagtalanító perubalzsam, ol. mentha pip., ol. eucalypti, v. car-
 bolsav tehető. 1,0 = 7 kr. 10,0 túl 1,0 = 6 kr. 1,0 pulv. = 8 kr.

H. Gaze Jodoformio imprægnatum. Sebkezelésben hasz-
 náltatik. Van 10—20—30% jodoformol tartalmazó gaze. 5 me-
 ternyi csomag árai 2 frt 80 kr., 3 frt 30 kr., 3 frt 90 kr.

381 *Rp.* Jodoformii pulv. 20,0.
 Cumarini 0,5.
 M. f. pulvis del. in vitro.
 §. Jodoform.
 2 frt 62 kr.

386 *Rp.* Jodoformii pulv. 2,0.
 Balsami peruvian. 4,0.
 Unguent. emollientis 20,0.
 M. f. unguentum.
 2§. Kenőcs.
 67 kr.

388 *Rp.* Jodoformii pulv. 6,0.
 Glycerini qu. s. ut.
 mensura sit. 20,0
 2§. Bőr alá fecskendezésre.
 1 ketmben 0,8 jodoform.
 Syphilis. (THOMANN.)
 78 kr.

385 *Rp.* Jodoformi pulv. 2,0.
 Collodii flexil. 20,0.
 2§. Jodoformcollodium.
 51 kr.

387 *Rp.* Jodoformii pulv. 2,0.
 Vaseline 20,0.
 Ol. Menthae pip. gtt. 2.
 M. f. unguent.
 2§. Jodoformvaselin.
 47 kr.

389 *Rp.* Jodoformii pulv. 1,5.
 Extr. et pulv. Liquirit.
 qu. s.
 ut f. l. a. pilul. No. 30.
 Obduc. bals. toluano.
 Dent. in vitro bene
 clauso.
 §. 2×napj. 2—6 szemet emel-
 kedőleg.
 Syphilis. Diabetes mellitus.
 85 kr.

Jodolum s. Tetrajodpyrrol (C_4J_7NH). Világossárga, jege-
 czes, szagtalan, íztelen por, vízben nehezen, borszeszben, æther-
 ben, zsíros olajokban igen jól oldódik. Küls. sebészek által por-
 ban, kenőcsökben haszn. mint a jodoform pótszere; előnye
 szagtalansága és kevésbé mérgező hatása; a sarjadzást ép úgy
 előmozdítja, mint a jodoform. Bels. syphilisnél, scrophulosisnál
 kalium jodatum, natr. jodatum helyett. Adag 0,05—0,1 pro dos.
 0,2—0,5 pro die pilulában, capsulában. 1,0 = 24 kr.

390 *Rp.* Jodoli 0,5.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.
 Dent. in caps. amylac.
 §. Napj. 2—3-szor 1 capsulát.
 61 kr.

391 *Rp.* Jodoli 2,0.
 Ungv. emoll. 18,0.
 M. f. ungu.
 2§. 10%-os jodolkenőcs.
 90 kr.

kielégítőleg. Használata küls. kenőcsök alakjában 1 : 10—20 idült eccema, psoriasis, prurigo, acne rosacea, favus ellen, azonkívül idült rheumatismus és köszvény eseteiben is. Bels. javallatai még elfogadhatólag meg nem állapíttak; adják pilulában, 0,1—0,3 pro dos. 1,0 pro die idült bőrbántalmak, ízületi s izomrheuma, hemicrania, cystitis és pyelitis chron. eseteiben. 1,0 = 1 kr.

369 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
Vaselinæ 90,0.
M. f. unguent.
D_S. 10% ichthyolvaselin.
94 kr.

371 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
Aquæ dest. 20,0.
D_{id}D_S. 2—3 × napj. 15—30
cseppet bels. (UNNA.)
30 kr.

370 *Rp.* Ichthyoli 10,0.
Unguent. diachyl. 200,0.
M. f. unguent.
D_S. Kenőcs.
Idült eccema. (UNNA.)
1 frt 77 kr.

372 *Rp.* Ichthyoli 3,0.
Pulv. et extr. Liquirit.
āā qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
D_S. Többször napj. 1 szemet.
41 kr.

H. **Infusum laxativum** l. Senna.

H. **Infusum Rhei cum Natrio carbonico** l. Rheum.

†H. **Ipecacuanhæ radix.** (Cephaelis Ipecacuanha. Rubiaceæ.)
Hatóanyaga az emetin. Bels. porban 0,01—0,05 pro dos. 2—3-szor,
v. infus. 0,2—0,5 : 150,0 2 ór. 1 evőkan., mint expectorans, anti-
diarrhæicum, diaphoreticum; 0,3—1,0 pro dos. porban, infu-
sumban, electuariumban 10 perczenként a hatás bekövetkeztéig,
mint emeticum 1,0 = 3 kr. v. 1,0 = 4 kr. (pulv.).

†H. **Pulvis Doveri** s. **Pulvis Ipecacuanhæ cum Opio**
l. Opium.

†H. **Syrupus Ipecacuanhæ.** Adjuvans és izjavító köptető
folyadékokhoz. 10,0 = 5 kr.

†**Tinctura Ipecacuanhæ.** Expectorans adag 10—30 csepp
napj. 3—4-szer, v. mint adjuvans köptető folyadékokhoz
3,0—5,0 : 150,0. 10,0 = 13 kr.

373 *Rp.* Infus. rad. Ipecacuan-
hæ e 0,5.
l. a. p. ad colat. 140,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 10.
Natrii bicarbon. 3,0.
Syrupi Ipecac. 10,0.
D_{id}D_S. 2 ór. 1 evőkanál.
Expectorans felnőttek.
45 kr.

374 *Rp.* Rad. Ipecac. pulv. 0,3.
Morphini hydrochlor. 0,05.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
D_S. 2—3-szor 1 port.
Diarrhæa. Catarrh. bronch.
Felnőttek. 29 kr.

- 398 *Rp.* Infus. bacc. Juniperi e 15,0.
 l. a. p. ad colat. 150,0.
 Kalii acetici solut. 10,0.
 Tinct. Digitalis 3,0.
 Oxymel Scillae 15,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
 Erős diureticum.
 47 kr.
- 399 *Rp.* Rooh Juniperi 50,0.
 Kalii acet. soluti 15,0.
 M. f. electuarium.
Ds. 2 ór. 1 kk.
 Diureticum.
 70 kr.

Kairinum. Az oxychinolinäthylhydrür sósavas vegyülete szerepelt egy ideig ezen név alatt. FLENNÉ mint antipyreticumot ajánlotta. Már obsolet. 0,1 = 4 kr.

II. Kalium aceticum solutum ($C_2H_3KO_2$). Semleges kémhatású, színtelen, átlátszó folyadék; 3 srészben 1 srész ecetsavas kalium. Diureticum, diaphoreticum. Bels. adag 1,0–2,0 pro dos. 2–3 ór., legtöbbször más diureticus szerekekkel együtt. L. Digitalis, Juniperus. 10,0 = 6 kr.

- 400 *Rp.* Kalii acetici sol. 10,0.
 Syrupi Scillae 40,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 42 kr.
- 401 *Rp.* Kalii acet. sol. 10,0.
 Tinct. Digitalis 3,0.
 Oxymel. Scillae 40,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 36 kr.

- 402 *Rp.* Kalii acet. sol. 1,0–2,0.
 Aquae dest. 80,0–100,0.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 2–5 éves gyermeknek. Diureticum.
 22 kr.

II. Kalium bromatum (KBr). Köb alakú, színtelen és szagtalan, csípős-sós ízű kristályok; 2 sr. vízben, 200 sr. borszeszben oldódik. Antispasmodicum, sedativum, anodynum, hypnoticum. Bels. adag 0,5–1,0 pro dos. 2,0–5,0 pro die. Epilepsiánál kétszer ily nagy napi adagok is nyújthatnak. Adagolás porban (charta cerata), oldatban. 10,0 = 12 kr.

- 403 *Rp.* Kalii bromati
 Natrii bromati aa 5,0.
 Ammonii bromati 3,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Syrup. cort. Aurant. 50,0.
MDS. 2 ór. 1 evök.
 Epilepsia. 60 kr.
- 404 *Rp.* Kalii bromati 5,0.
 Div. in dos. æqu. No. 10.
 Det. in chart. cerat.
 S. Naponta 3–4 port cukros
 vízben feloldva.
 37 kr.

- 405 *Rp.* Kalii bromati 0,5—1,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Tinct. Moschi gtt. 10.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 kk. v. gyk.
 1—2 éves gyermeknek
 aszluna laryngeum, eclam-
 psia esetén. 48 kr.
- 406 *Rp.* Kalii bromati 2,0.
 Aquae dest. 100,0.
 Syrupi simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 5—10 éves gyermek. Epi-
 lepsia. 28 kr.

II. Kalium carbonicum cridum. Fehér, száraz, szemese-
 por; egyenlő mennyiségű vízben tökéletesen oldódik. 99% kalium
 carbonatot tartalmaz. Csak küls használatot. Teli fürdőhez
 100,0—200,0, kéz-, lábfürdőhez 30,0; a bőr mosogatására
 2—5%-os vizoldatok. 10,0 = 13 kr.

II. Kalium carbonicum purum (K_2CO_3). Fehér, a levegőn
 megnedvesedő por; egyenlő mennyiségű vízben lisztan oldódik,
 oldala lúgos. Légutak hurutjánál, croupnál belégzések permete
 alakjában 1 2%-os oldattal. Bels. köszvény, hörghurut, pyrosi-
 s eseteiben adag 0,2—0,5 pro dos. 3—4×napj. hig oldatban.
 Saturatiók készítésére gyakran haszn. A Bland-fele pilulák alkati-
 része (l. Ferrum sulfur.). 10,0 = 7 kr.

II. Kalium carbonicum solutum. (Kali carbon. pur.
 110,0 + Aqua dest. 200,0.) Színtelen, átlátszó, lúgos folyadék.
 Kali carb. pur. helyett haszn. 3 részben 1 r. K_2CO_3 . 10,0 = 4 kr.

H. Potio Riveri. (Kali carbonicum 6,0, acid. citricum
 5,4 gm.-jával víznek 170 gm.-jában van telítve.) Hányás ellen.
 100,0-ig = 30 kr. 100,0 túl 200,0-ig = 39 kr.

- 407 *Rp.* Kalii carbon. solut. 3,0.
 Aquae dest. 200,0.
MDS. Permete alakjában be-
 légzésre. 30 kr.
- 408 *Rp.* Decoct. rad. Althaeae
 e 10,0.
 l. a. p. ad colat. 150,0.
 Kalii carbon. soluti 6,0.
 Syrupi Senegae 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők.
 Expectorans. 45 kr.
- 409 *Rp.* Potionis Riveri 200,0.
D.S. 2-szerre elfogyasztani. 52 kr.

III. Kalium chloricum ($KClO_3$). Lemez v. táblaalakú, az
 egybajlású rendszerbe tartozó kristályokból áll. 16 sr. hideg és
 3 sr. forró vízben oldódik. Száj- és torokvíznek (stomatitisek
 és anginák különböző alakjainál) 2—5%-os oldatok; permete
 alakjában belégzésre 1%-os oldat haszn. Bels. diphtheritis,
 cystitis, pyelitis, gastritis catarrh.-nál adag oldatban (soha
 porban!) 2,0—4,0 pro die. Dos. maxim. sing. 0,5! pro die
 5,0! Gyermeknek l. táblázat. (Vigyázat!) 10,0 = 4 kr. v. 10,0 =
 5 kr. (pulv.).

Felnőttnek:

410 <i>Rp.</i> Kalii chlorici	6,0.	411 <i>Rp.</i> Kalii chlorici	4,0.
Aquæ dest.	300,0.	Aquæ dest.	130,0.
Syrup. Moror.	30,0.	Syrupi cort. Aurant.	20,0.
<i>Ölőds.</i> Száj-, torokvíz.		<i>Ölőds.</i> 2 ór. 1 evők.	
55 kr.		44 kr.	

Gyermekeknek:

412 <i>Rp.</i> Kalii chlorici	2,0.	413 <i>Rp.</i> Kalii chlorici	1,0—2,0.
Aquæ dest.	100,0.	Aquæ dest.	80,0—100,0.
Syrup. Moror.	10,0.	Syrupi simpl.	10,0.
<i>Ölőds.</i> Száj-, torokvíz.		<i>Ölőds.</i> 2 ór. 1 gyk.	
Lehet összekötni timsóval		2—6 évesnek diphtheritis	
is, melyből 2,0 teendő az		faucium esetén, színtügy	
oldathoz.		stomatitiseknél is.	
38 kr.		37 kr.	

414. Kalium hydroxydatum (KOH). Rudakba öntött készítmény. Fehéres színű, erősen lúgos kémhatású, felényi vízben oldható. Causticum. Leginkább haszn. mint pasta caustica vienn. (l. calcium oxydatum). A bőr mosogatására 1—2%-os oldat. Bels. nem. 10,0 = 9 kr.

H. Kalium hydrotartaricum s. Cremor Tartari s. Tartarus depuratus ($KC_4H_5O_6$). Fehér, kristályos, savanykás ízű por; 192 sr. hideg, 20 sr. forró vízben oldható. Gyenge antipyreticum, inkább hűsítő; diureticum; nagyobb adagban laxans. Bels. adag 0,5—2,0 pro dos. 3—4×napj. Mint laxans 4,0—6,0 pro dos. leginkább porban, electuariumban. 10,0 = 8 kr.

II. Electuarium Ionitivum l. Senna.

414 <i>Rp.</i> Kalii hydrotartar.	10,0.	415 <i>Rp.</i> Decoct. pulp. Tamarind.	
Sacchar. alb.	40,0.		e 10,0.
M. f. pulv. det. in scat.		l. a. p. ad colat.	100,0.
S. 3—4×napj. egy késhegy-		colat. ferv. adde	
nyit.		Kalii hydrotartar.	2,0.
Hűsítő, enyhe diureticum.		Syrup. simpl.	10,0.
38 kr.		<i>Ölőds.</i> 2 ór. 1 gyk.	
		4—8 éves gyermeknek icte-	
		rus catarrh.-nál.	
		47 kr.	

416 *Rp.* Pulv. rad. Rhei 1,0.
 Kalii hydrotartar. 4,0
 Sacchar. alb. 10,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 S. 4-szer napj. 1 késhegygyel.

Nagyobb gyermeknek icterus catarrh.-nál.
 26 kr.

†11. **Kalium hypermanganium** ($KMnO_4$). Hasábalakú, sötétbarna, fémfényű jegecekből áll. Ize gyengén összehúzó. 15 sr. vízben kékesvörösen oldódik. Élenyílő, desodorans, gyengén összehúzó, töményen a nyákhártyákat, hámfosztott helyeket edző. Nem antisepticus hatású! Bels. nem. Küls. desodoráló mosásokra (carcinoma uteri, ozoena, cystitis chron., fœtor ex ore, stomatitis ulcerosa) 0,5—1,0%-os oldatok haszn.; belégzésekre (bronchitis putrida, bronchiectasia, gangrena pulmonum) 0,1—0,5%-os oldatok rendeltetnek. 10,0 = 8 kr.

417 *Rp.* Kalii hypermangan. 0,5—2,0.
 Aquæ dest. 200,0.
 DñD. Suo nomine. Külsőleg. 29 kr.

418 *Rp.* Kalii hypermangan. 0,1—0 2.
 Aquæ dest. 100,0.
 DñD. Szájvíz.
 Gyermekeknek stomatitis ulcerosa esetén. A fekélyek edzése pokolkővel szükséges. 24 kr.

†12. **Kalium jodatum** (JK). Koczkaalakú, fehér kristályok. Ize csípős, sós, később kesernyés. $\frac{3}{4}$ sr. vízben és 12 sr. borszeszben oldódik. Küls. kenőcsben mint oszlató 1 : 10. Bels. syphilis, scrophulosis, asthma nervosum, rheumatism. chron., a központi idegrendszer idült lobos bántalmai, idült fémmérgezések esetén, s idült lobos izzadmányok elosztatására. Adag porban, pilulában, oldatban 0,1—0,5 pro dos. 1,5—3 0—4,0 pro die; oldatokhoz izjavítónak csak glycerin. 10,0 = 34 kr.

H. **Unguentum Kalii jodati** (JK 1,0 + Ungu. simpl. 8,0).
 Oszlató kenőcs. (Jódos kaliumjod-kenőcs l. Jodum.)

419 *Rp.* Kalii jodati 4,0.
 Sapon. medic. 6,0.
 Solve in
 Spirít. dilut. 50,0.
 adde
 Olei Citri 0,4.
 DñD. Külsőleg bedörzsölésre. 50 kr.

420 *Rp.* Ungu. Kalii jodati
 Linim. saponato-camphor. aa 10,0.
 M. f. unguentum.
 D. Kenőcs. Bedörzsölésre. 48 kr.

421 *Rp.* Kalii jodati 6,0.
Aque dest. 150,0.
Glycerini 10,0.

Mod. 3×napj. 1 evök.
56 kr.

424 *Rp.* Kalii jodati 10,0.
Pulv. et extr. Liquir. aa
qu. s.

ut f. pilul. No. 60.

Consp. pulv. Lycopod.

Mod. 3×napj. 3 szemet.

Syphilis. Idült fémmerge-
zések.

76 kr.

423 *Rp.* Kalii jodati pulv. 5,0.
Div. in dos. aequal. No. 10.

Mod. 0,5-os jodkali porok.

Asthma nervosum esetén,
roham jelentkezésekor 1
por vízben feloldva elfo-
gyasztandó. Szükség ese-
tén ismét egy por. 48 kr.

422 *Rp.* Kalii jodati 5,0.

Aque dest. 250,0.

Tinct. Opii simpl. 1,0.

Mod. Száj-, torokvíz.

Syphiliticus száj- és torok-
bántalmaknál.

66 kr.

425 *Rp.* Kalii jodati 0,5--1,0—

2,0.

Aque dest. 100,0

Glycerini 5,0.

Mod. 2 ór. 1 gyk.

4—8 éves gyermeknek scro-
phulosis torpida, menin-
gelis basilaris esetén.

31 kr.

**II. Kalium natrio-tartaricum s. Sal Seignetti, s. Tar-
tarnus natronatus** ($KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$). Hasábalakú, szin-
telen, átlátszó kristályokból áll. Egy súlyrész 1,4 sr. vízben
oldódik. Bels. kis adag (0,5—2,0) hűtő, enyhén diureticus hatású,
nagy adag (15,0—30,0) laxans. Porban, oldatban, electuariumban
10,0 = 4 kr., vagy 10,0 = 6 kr. (pulv.).

426 *Rp.* Kalii natrio-tartar. 10,0.

Aque laxativ. vienn.

40,0.

Syrup. mannali 10,0.

Mod. Két adagban egy óra
alatt elfogyasztani.

Laxans. 55 kr.

427 *Rp.* Kalii natrio-tartar. 10,0.

Aque dest. 100,0.

Syrapi mannali. 20,0.

Mod. 3 ór. 1 gyk.

3—6 éves gyerm. székszo-
rulás esetén.

50 kr.

H. Kalium nitricum (KNO_3) Hasábalakú, állátszó kristá-
lyok. 4 sr. hideg és 0,4 sr. forró vízben oldható. Enyhe anti-
pyreticum, diureticum; némelyek szerint antiphlogisticus hatása
is van; gyakran digitalissal együtt rendeltetik. Bels. adag
0,2—0,5—1,0 pro dos. 2—3 ór. leginkább oldatban. Ellenjavalt
gyomor-, bélbajok, vesebajok esetén. 10,0 = 4. kr.

128 <i>Rp.</i> Kalii nitr.	5,0.	429 <i>Rp.</i> Infus. fol. Digitalis e 0,5.	
Aquæ dest.	140,0.	l. a. p. ad colat.	150,0.
Syrup. simpl.	10,0.	Kalii nitr.	5,0.
<i>MDS.</i> 2 ór. 1 evök.		Syrup. Althææ	10,0.
32 kr.		<i>MDS.</i> 2 ór. 1 evök.	
		42 kr.	

130. <i>Rp.</i> Decoct. rad. Ononidis spin. e 15,0.	
l. a. p. ad. colat.	150,0.
Kalii nitr.	5,0.
Roob Juniperi	15,0.
<i>MDS.</i> 2 ór. 1 evök.	
Diureticum.	56 kr.

11. **Kalium stibio-tartaricum s. Tartarus emeticus** [$(K\text{Sb}C_4H_4O_7)_2 \cdot H_2O$]. Fehér, kezdetben édeses, később undorító fémizű, kristályos por. 15 sr. hideg, 2 sr. forró vízben oldható; borszeszben nem. Küls. kenőcsalakban 1 : 4—10 derivans, lobokozó. Bels. kis adagban 0,005—0,01 pro dos. napj. 3—4-szer expectorans, diaphoreticum, nagyobb adagban 0,03—0,05—0,15! pro dos. emelicum, porban, oldatban. Dos. maxim. pro die 1,0! Gyomor és bél lobos bántalmái, terhesség ellenjavallatok. Gyermekeknél nagy vigyázat! 1,0 = 2 kr.

11. **Unguentum Antenriethi.** (1 r. kalium stib. tartar. + 4 r. axung. porc.) Lobokozó, derivans. Borsónyi, babnyi mennyiség dörzsölendő a bőrre.

11. **Vinum stibio-tartaricum s. Vinum Huxhami.** (0,25 : 60,0 borra.) Expectorans 5—10 csepp pro dos. Mint emelicum nem. Dos. maxim. sing. 0,5! pro die 1,5! (1,0 = 20 csepp.) 10,0 = 8 kr.

131 <i>Rp.</i> Kalii stibiat. tartar. 0,05.	432 <i>Rp.</i> Kalii stibiat. tartar. 0,1.
Ammon. chlorat. 3,0.	Aquæ dest. 50,0.
Aquæ dest. 150,0.	M. f. solutio.
Syrup. Ipecac. 10,0.	<i>DS.</i> Felét egyszerre elfogyasztani; ha 10 p. múlva hányás nem jelentkezik, másik felét is. Emeticum.
<i>MDS.</i> 2 ór. 1 evök.	Felnőttek. 21 kr.
Expectorans.	
36 kr.	
133 <i>Rp.</i> Kalii stibiat. tart. 0,1.	434 <i>Rp.</i> Kalii stibiat. tartar. 0,04.
Pulv. rad. Ipecac. 1,0.	Aquæ dest.
M. f. pulv. div. in dos.	Oxymel Scillæ aa 20,0.
æqu. No. 2.	Pulv. rad. Ipecac. 0,4.
<i>DS.</i> Egyszerre 1 port; ha 10 p. múlva hányás nem áll be, a második port is bevenni.	<i>MDS.</i> Felrázva ¼ ór. 1 kk. a hányás beálltaig. Emeticum 1—3 éves gyermek számára.
Felnőttek. Emeticum.	30 kr
10 kr.	

†H. **Kalium sulfuratum pro balneo s. Hepar sulfuris.**

Barnássárga, májszínű, később zöldessárga színűvé váló, záptojás szagú, a levegőn megnedvesedő lömeg. 2 sr. vízben oldódik csekély maradék hátrahagyásával. Csak fürdőkhöz haszn. rheumatismus, köszvény, idült fémmérgezések esetén. Fakád! Teli fürdőre 50,0—100,0. Ha H_2S -gázt akarunk a fürdőben fejleszteni, 15,0—30,0 acid. sulf. crud.-ot öntünk a fürdőhöz. 10,0 = 2 kr.

H. **Kalium sulfuricum** (K_2SO_4). Tömör, hasábos kristályokból, vagy kristályos kérgéből áll. 10 sr. hideg, 4 sr. forró vízben oldható; borszeszben nem. Bels. idült gyomor-, bélhurutnál 0,5—1,0 pro dos. 2—3×napj. Nagyobb adagokban laxans, de mint ilyen ritkán használtatik, ha igen, jalapával, rheummal együtt. 10,0 = 2 kr., vagy 10,0 = 4 kr. (pulv. sub.).

435 *Rp.* Kalii sulfurici 5,0.

Pulv. rad. Rhei 2,0.

M f. pulv. div. in dos. aq. No. 10.

28. 3×napj. 1 port.

33 kr.

II. **Kalium tartaricum** ($K_2C_4H_4O_6$). Tiszta, fehér, kristályos por; egyenlő sr. hideg, felényi meleg vízben oldható. Bels. diureticum, hűsítő 1,0—2,0 pro dos. Laxans 5,0—10,0 pro dos. 10,0 = 10 kr.

436 *Rp.* Kalii tartar. 10,0.

Aque dest. 130,0.

Syrup. Scilla 20,0.

28. 28. 2 ór. 1 evők.

Enyhe diureticum.

44 kr.

H. **Kamala.** (*Rottlera tinctoria*. Euphorbiaceae.) Gyantás, téglaszínű, iztelen, szagtalan por. Hatóanyaga rottlerin (gyanta). Helyette használandó kizárólag a

H. **Kamala depuratum.** Anthelminticum teniák elhajtására. A teniát megöli. Hashajtólag is hat. 8,0—12,0 porban, electuariumban 1 ora alatt elfogyasztandó éhgyomorra. Előkészítő étrend szükséges; kellemetlen mellékhatása az émelygés. 1,0 = 3 kr.

437 *Rp.* Kamale depur. 12,0.

Div. in dos. aq. No. 4.

28. 1/4 ór. 1 port.

Felnőttnek.

48 kr.

438 *Rp.* Kamala depur. 10,0.

Mel. rosati 40,0.

M. exact. f. elect.

28. 1 ora alatt elfogyasztani.

Felnőttnek. 61 kr.

440 *Rp.* Kamakæ depur. 6,0.
 Extr. Filicis Maris æther.
 4,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 Pulv. gummos. āā qu. s.
 ut f. l. a. electuarium.
 2S. Reggel éhgyomorra be-
 venni 1 óra alatt. 4—8
 éves gyermeknek.
 1 frt 47 kr.

439 *Rp.* Kamakæ depur. 2,0—4,0.
 Aquæ Menthæ pip. 80,0.
 Syrup. simpl. 15,0.
 2S. Felrázva 3-szorra be-
 venni 1/2 órai időközökben.
 2—4 éves gyermeknek.
 44 kr.

Kephir. Erjedésben levő tehéntej. Az erjesztés az ú. n. kephir-
 magvak (gomba) által történik. Sűrű, fehér, savanykás, csipős
 folyadék. Alkatrészei, használata, mint a kumysnak (l. e. cz. a.).

Kino s. Gummi Kino. (Pterocarpus marsupium. Papilionaceæ.) Beszáritott növényi nedv. Feketésbarna, törékeny, granát-
 küliemű darabok; porítva pirosas. Íze összehúzó. Vízben cse-
 kély maradékkal oldódik. Hatóanyaga kinocersav. Adstringens.
 Főleg a gyermekgyakorlatban haszn. mint antidiarrhœicum. Bels.
 adag 0,3—0,5 pro dos. 3—4-szer napj. porban; gyermeknek
 0,05—0,1 pro dos. porban. Legtöbbször opium-készítményekkel
 összekötve. 1,0 = 2 kr.

441. **Kreosotum.** Guajakol és kreosolnak keveréke. Olajszerű,
 sárgás, átlátszó folyadék; erős füstszagú; égető ízű. Borszesz-
 szel, ætherrel átlátszó oldatokká elegyedik. Körülbelül 120 r.
 forró vízzel oldódik, kihüléskor az oldat zavarossa lesz. Küls.
 mint desiniciens használtatik, hasonlóan a carbolhoz, de igen
 ritkán. Fogászatban gyapótra felvéve, s a cariosus fogárbe he-
 lyezve fertőztelenít, fájdalmat csillapít. Fagydagاناتokra kenőcs
 vagy collodium alakjában (1 : 10.) Bels. gyomorban levő erje-
 dési folyamatoknál, hányásnál, diarrhœáknál, phthisisnél adag
 0,01—0,05 ! pro dos. pilulában, caps. gelatin.-ban, nyákos oldat-
 ban. Dos. maxim. pro die 0,2 ! 10,0 = 20 kr.

441 *Rp.* Kreosoti 1,0.
 Ungu. simpl. 10,0.
 M. f. unguent.
 2S. Kreosot-kenőcs.
 26 kr.

442 *Rp.* Kreosoti 1,0.
 Collodii flexil. 10,0.
 2S. Kreosot-collodium.
 24 kr.

443 *Rp.* Kreosoti 1,0.
 Pulv. et extr. Liquir.
 āā qu. s.
 ut f. pilul. No. 50.
 Obduc. foliis Argenti.
 2S. reggel, este 2 szemet.
 Egy szemben 0,02 kreosot.
 81 kr.

444 *Rp.* Kreosoti gtt. 2—3.
 Aquæ dest. 90,0.
 Tinct. Opii simpl.
 gtt. 2—3.
 Syrup. cort. Aurant. 10,0.
 2S. 2 ór. 1 kk.-gyk.
 2—4 éves gyermeknek cho-
 lera infantum esetén.
 25 kr.

45 <i>Rp.</i> Kreosoti	1,0—2,0.
Olei Jecoris Aselli	150,0.
<i>D/D.S.</i> Étkezés előtt 1 kk. napj. 2-szer.	
Phthisis pulm.	45 kr.

Kumys. Erjedésben levő kanczatej. Fehér, tejszerű folyadék, pezseg, íze savanykás, csipős, hűtő. Tartalmaz tejsavat, szabad szénsavat, borostyánkősavat, borszeszt, kevés glycerint. Könnyen emészthető. Mint tápanyag használtatik phthisis pulm. esetén, de más idült betegségek következtében elgyöngült egyéneknek is. Adag napjában $\frac{1}{2}$ —2 liter, emelkedőleg.

11. **Kusso flores.** (*Brayera anthelminthica*. Rosaceae.) Hatóanyaga kussein (gyanta). Anthelminthicum taniak ellen. Adag porban, electuariumban, rázandó keverékben 15,0—20,0, mely 1 óra alatt 2-szerre, éhgyomorra fogyasztandó el. Előkészítő étrend szükséges. Bevetel után $\frac{1}{2}$ órával ol. ricini nem fölösleges. Emelygés ellen citromvíz, rotula mentha. 10,0 = 9 kr. (pulv.).

12. **Kusseinum crystallatum.** Kénsarga, szagtalan, íztelen, rhombos, tűalakú jegéczek; hideg vagy meleg vízben alig, etherben jól, borszeszben csekély mérvben oldódnak. Haszn. mint a flores kusso. Adag: 1,0—2,0 porban éhgyomorra 1 óra alatt elfogyasztandó. Előkészítő étrend. Bevetel után $\frac{1}{2}$ órával ol. ricini. 0,01 = 4 kr.

46 <i>Rp.</i> Flor. Kusso pulv.	20,0.	47 <i>Rp.</i> Flor. Kusso pulv.	20,0.
Melis rosati	40,0.	Vini rubri	200,0.
M. f. electuarium.		<i>D/D.S.</i> 1 óra alatt éhgyomorra	
<i>D.S.</i> 1 óra alatt éhgyomorra		elfogyasztandó. Használat	
elfogyasztandó. Felnőttek.		előtt felrázandó.	
56 kr.		81 kr.	

48 <i>Rp.</i> Flor. Kusso	6,0.	49 <i>Rp.</i> Kusseini crystall.	2,0.
Mel. depur.	40,0.	Div. in dos. aequ. No. 4.	
M. f. electuar.		Del. in caps. amylic.	
<i>D.S.</i> Reggel éhgyomorra 1 óra		<i>S.</i> $\frac{1}{4}$ ór. 1 capsulát reggel	
alatt elfogyasztandó.		éhgyomorra.	
4—8 éves gyermeknek.		Felnőttek.	
42 kr.		8 frt 28 kr.	

13. **Lactucarium germanicum.** (*Lactuca virosa*. Compositae.) Beszáritott tejnedv. Hatóanyaga lactucin (keserű anyag). Opium pótszere. Sedativum, anodynum; főleg a köhögési inger csillapítására használtatik. Hatása bizonytalan. Bels. adag 0,1—0,3! pro dos. porban, pilulában, esetleg emulsióban. Dos. maxim. pro die 1,0! 1,0 = 10 kr.

450 *Rp.* Lactucarii germ. 1,0.
 Natrii bicarbon. $\overline{aa}$ 2,0.
 Sacchar. alb. $\overline{aa}$ 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 aqu. No. 10.
 2 $\overline{S}$. 2 ór. 1 port.
 37 kr.

451 *Rp.* Lactucarii germ. 1,0.
 Mucil. Gummi arab. 10,0.
 f. l. a. emulsio cum
 Aqua dest. 130,0.
 admisce
 Aquae Amygdalar amar. 5,0.
 Syrup. emuls. 10,0.
 2 $\overline{S}$. 2—3 ór. 1 evök.
 56 kr.

Laminaria. (Laminaria Cloustoni. Algæ.) A nyelczének 1—2 deciméternyi hosszú s körülbelöl $\frac{1}{2}$ —1 cmnyi átmérőjű darabjai. Vízben duzzad. Nőgyógyászatban a spongia pressa helyett a canalis cervicalis uteri tágítására haszn.

II. **Lamina Guttapercha** l. Guttapercha.

II. **Lana Gossypii depurata et a pinguedine liberata Brunsi.** Brunswatta. Sebészetben kötszerül használtatik. 25,0 = 15 kr., 50,0 = 25 kr., 100,0 = 45 kr.

II. **Lana Gossypii carbolata, hydrargyro bichlor corr. imprægnata, salicylata,** l. acid. carbol., hydrarg. bichlor. corr., acid. salicyl. ez. a.

Lanolinum. Gyapjából nyert s tisztított zsíradék. Cholesterin-zsír 20% vízzel. Fehéres, kenőcsszerű anyag, közönbös vegyhatású, nem avasodik. 80% vízet képes még felvenni, ha azzal összegyúratik. Egyetlen zsíradék, mely nyákhártyákra tapad. Használtatik, mint kenőcs-alapanyag; kitünő kenőcsöt ad, ha 10 részre 1—2 rész axungia porci vételek; 10,0 = 12 kr.

II. **Lichen islandicus.** (Cetraria islandica. Parmeliaceæ.) Hatóanyagai cetrarsav (keserű anyag) és keményítő. Amarum, stomachicum. Adag: decoct 10,0—15,0 : 250,0, étkezés előtt 2—3 evőkanálnyit egyszerre. 100,0 = 10 kr.

452 *Rp.* Decoct. Lichen. island. 2,0—4,0.
 l. a. p. ad. colat. 100,0.
 Natrii bicarb. 5,0.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 3—4.
 Syrup. simpl. 10,0.

2 $\overline{li}$ 2 $\overline{S}$. 2 ór. 1 gyk.

3—6 éves idült hörghurutban szenvedő sorvadtt gyermekeknek.

41 kr.

II. **Linctus gummosus** l. Gummi arabicum.

II. **Linimentum ammoniatum** l. Ammonium-készítmények.

II. **Linimentum saponato-camphoratum** l. Camphora.

II. **Linimentum Styracis** l. Styrax liquidus.

H. Lini semina. (*Linum usitatissimum*. Linea.) Hatóanyagai zsíros olaj, növényi nyák. Bevonó. Infusum, decoctum alakjában (1 : 10). 100,0 = 6 kr., v. 100,0 = 24 kr. (pulv.), 200,0 túl 100,0 = 20 kr.

Farina seminum Lini s. Placenta sem. Lini. Lenmagliszt. A zsíros olaj kipréselése utáni maradék. Meleg vízzel péppé alakítva kataplasmának használtatik. 100,0 = 8 kr. 200,0 túl 100,0 = 7 kr.

H. Oleum Lini venale. 100,0 = 12 kr. Tisztítva (mosás) haszn.

H. Oleum Lini lotum. Atlátszó, nyáktól mentes zsíros olaj.

Küls. fedő, puhító szer. Egési sebekre aqua calcissal aa. Kiürítő csőrének 2—3 evőkanállal. Bels. 1—3 evőkanállal laxans. 100,0 = 23 kr. 200,0-túl 100,0 = 20 kr.

Liparin. MERING szerint az ol. jecoris aselli kitünő pótszere. Nem más, mint igen finom ol. olivarum, melyhez 6^o-nyi olajsav kevertetett. Belegek szívesebben fogyasztják, mint a halmáj-olajat; igen könnyen emésztetik, talán mert könnyen képez fejet. Adaga mint az ol. jecoris-nek.

H. Liquiritiæ radix. Két fajta hív. a) *Glycyrrhiza glabra* (Papilionaceæ) hámozatlan gyökere, b) *G. glandulifera* hámozott gyökere. Rendeléskor különbséget nem teszünk. Porítva pilulaconstituens, pilulahintőpor, porvivőanyag, izjavító. 100,0 = 24 kr. v. 10,0 = 6 kr. (subt. pulv.). Készítményei:

H. Succus Liquiritiæ venalis. Fekete, hengerded rudacs kák. 10,0 = 7 kr. (pulv.).

H. Succus Liquiritiæ depuratus. Hig kivonatanyag. Izjavító syrupok helyett, pilulaconstituens. 10,0 = 10 kr.

H. Syrupus Liquiritiæ. Izjavító 10,0 = 2 kr.

H. Pulvis gummosus l. Gummi arabicum.

H. Liquor acidus Halleri l. acid. sulfur.

H. Liquor Ammonia l. Ammonii caustici liquor.

H. Liquor Ferri oxydati l. Ferri preparata.

H. Lithium carbonicum (Li_2CO_3). Fehér, kristályos por; 150 sr. vízben oldható, oldata lúgos kémhatású. Bels. köszvény, húgyhomok, húgykővek eseteiben, valamint diureticus célból is haszn. Adag 0,05—0,25 pro dos. 3—4×napj. porban. Urátokból álló húgykővek oldása céljából ajánlották, hogy 1,0—2,0 : 200,0—300,0 vízben oldva langyosan a hólyagba fecskendeztesék. (Műtétet természetesen nem pótolhatja.) 1,0 = 6 kr.

453 *Rp.* Lithii carbon. 1,0.

Sacchar. alb. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.

2*S.* 2—3 ór. 1 port.

32 kr.

Lithium citricum ($Li_3C_6H_5O_7$). 1,0 = 20 kr. | Bels. mint a lith.
Lithium jodatum (LiJ). 1,0 = 12 kr. | carbon. Kész-
Lithium salicylicum [$2(LiC_7H_5O_3) \cdot H_2O$] | vény, idült izm-
 1,0 = 20 kr. | leti rheumatis-
 mus, húgyhomok
 eseteiben.

11. **Lobelia herba.** (*Lobelia inflata*. *Lobeliaceae*.) Hatóanyaga lobelin (alcaloid). Antiaszthmaticum. Adag: infus. 1,0—3,0; 150,0 2 ór. 1 evők. Dos. maxim. sing. 0,5! Dos. maxim. pro die 4,0! 10,0 = 3 kr. Ritkán használtatik, még leginkább készítménye a

11. **Tinctura Lobeliae.** Adag 5—15 csepp pro dos. 2—3Xnapj. Vigyázat (!) 10,0 = 7 kr.

154 *Rp.* Tinct. Lobeliae
 Tinct. Ipecac. āā 5,0.
 Aquae Amygdal. amar. 10,0.
 Dosis. 15—20 cseppet 2—3Xnapj.
 35 kr.

11. **Lupuli glandulae.** (*Humulus lupulus* mirigyei. *Cannabineae*.) Nevezik lupulinak is. Hatóanyagai keserű anyag. illatos olaj, némelyek szerint egy bővítő alcaloid is. Kis adagban (0,1—0,2) amarum, nagyobb adagban (0,5—1,0 pro dos.) porban, pilulában, electuariumban, sedativum, antaphrodisiacum; különösen az utóbbi értelemben haszn. de gyakran eredmény nélkül. 1,0 = 1 kr.

155 *Rp.* Gland. Lupuli. 5,0.
 Div. in dos. aequ. No. 10.
 Dent. in caps. amylac.
 S. Este 1—2 capsulát bevenni.
 Antaphrodisiacum.
 61 kr.

11. **Lycopodium.** (*Lycopodium clavatum* csirszemeséi. *Lycopodiaceae*.) Hintőpor intertrigo, nedvező kútegek, herpes Zoster eseteiben. Pilulahintőpor. 100,0 = 54 kr.

11. **Magnesium carbonicum hydrooxydatum s. Magnesia carbonica.** [$(MgCO_3)_3 \cdot Mg(OH)_2, 3H_2O$]. Elporló, hófehér, laza tömeg, v. igen könnyű por, vízben jóformán oldhatatlan. Küls. fogporhoz v. mint pilulahintőpor. Bels. antacidum, nagy adagban enyhe laxans. Saturatiókhoz gyakran haszn. mint szénsavval adó alkatrész. Adag bels. késhegyenként, kávéskanálként. 10,0 = 4 kr.

456 *Rp.* Magnes. carbon. hydrooxyd. 20,0.
 Rad. Rhei chin. pulv. 5,0.
 Sacchar. alb. 10,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 §. Késhegyenként v. kk.-ként.
 Felnőttek, nagyobb gyer-
 meknek. Laxans.
 44 kr.

457 *Rp.* Magn. carb. hydrooxyd. 2,0.
 Rad. Rhei chin. pulv. 1,0.
 Eleosacch. Fœnic. 10,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
 §. 2—3 késhegynyi naponta.
 Csecsemőknek megrögzött
 székrekedés esetén.
 31 kr.

458 *Rp.* Magn. carb. hydrooxyd.
 Acid. citrici
 Eleosacch. Citri aa 5,0.
 M. f. pulv. div. in dos. aqu. No. 10.
 2§. Szükség szerint 1 pohár $\frac{1}{2}$ pohár
 cukros vízben feloldani, pezsgés köz-
 ben egyszerre elfogyasztani.
 Potio Riveri helyett.
 41 kr.

II. Magnesium hydrooxydatum s. Magnesia nsta in aqua [$Mg(OH)_2$]. Tejszerű folyadék. M. Gyk. I. kiadásában mint antidotum arsenici szerepelt. Antacidum. Savmérgezéseknél, főleg arsenessav-mérgezésnél mint antidotum chemicum. Adag evőkanalanként. Savmérgezéseknél 5—10 percenként 1 evőkan. 10,0 = 2 kr.

459 *Rp.* Magnes. hydrooxyd.
 lagenam unam (120,0)
 §. Rendelet szerint.
 Statim !!

37 kr.

II. Magnesium oxydatum s. Magnesia nsta (MgO). Hőfehér, könnyű, igen finom por, vízben nem oldható. Haszn. mint a magn. hydrooxyd. s a magn. carb. hydrooxyd. Adagolás mint az utóbbinál. 10,0 = 10 kr.

H. Magnesium sulfuricum ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$). Keserűsó. Színtelen, vagy fehér, a levegőn kissé elmalló hasábos jegeczekből áll. Íze keserű, sós. 0,8 sr. hideg, 0,15 sr. forró vízben oldható. Laxans. Adag 15,0—30,0 pro dos. porban vagy vízben (sodavízben) oldva. 100,0 = 10 kr.

H. Malvæ folia. (Malva silvestris. Malvaceæ) Hatóanyaga növényi
H. Malvæ flores. nyák. Decoct. 10,0—15,0 : 150,0 nyákos folyadék,
 száj-, torokvíznek, vagy csipős, keserű anyagok
 számára vívfolyadéknak. Folia 100,0 = 10 kr. Flo-
 res 100,0 = 28 kr.

460 <i>Rp.</i> Decoct. folior. Malvæ e 20,0.	
l. a. p. ad colat.	300,0.
Kalii chlorici	6,0.
Tinet. Opii simpl.	2,0.
<i>℞℥℥</i> Száj-, torokvíz.	
47 kr.	

II. **Manganum hyperoxydatum** (MnO_2). Barnakő. Hamvasfekete, kristályos törésű darabok. Chlorfejlesztésre használtatik. 10,0 = 2 kr.

II. **Manna**. (*Fraxinus ornus* kiizzadó nedve.) Hatóanyaga mannitum. Enyhe laxans. Adag: felnőttek substantiában 30,0–60,0, gyermeknek 5,0–10,0. 10,0 = 4 kr.

II. **Mannitum** ($C_6H_{14}O_6$). Hasáb- vagy tüalakú, tiszta fehér és fénylő kristályokból áll. 6,5 sr. hideg vízben és 80 sr. híg borszeszben oldható. Ízjavító cukor helyett. Laxans terhes nők, gyermekek számára; adag porban, oldatban felnőtteknek 20,0–40,0, gyermeknek 3,0–5,0. 10,0 = 9 kr.

II. **Syrupus mannatus** l. Senna.

461 <i>Rp.</i> Manniti	5,0.
Aquæ dest. ferv.	50,0.
<i>℞℥℥</i> ór. 1. gyk.	
Csecsemőknek székszorulás esetén.	
54 kr.	

II. **Mastiche**. *Pistacea lentiscus* (*Anacardiaceæ*) gyantás, beszáradt nedve. Aetherben oldva ideiglenes fogtömésre használtatik. 10,0 = 11 kr., vagy 10,0 = 15 kr. (pulv.).

462 <i>Rp.</i> Mastiche pulv.	10,0.
Aetheris	20,0.
<i>℞℥</i> Gyapotszálra felitva a kitisztított cariosus fogárba helyezendő.	
42 kr.	

Matico folia. (*Piper angustifolia*. *Piperaceæ*.) Hatóanyagai illó olaj, csersav, gyanta. Adstringens, elválasztást csökkenti. (Közel áll a piper cubeba hatásához.). Küls. infus. (5,0–10,0: 100,0–150,0), alakjában gonorrhœa ellen húgycsőbe fecskendeztetik. Bels. gonorrhœa, cystitis, diarrhœa, vérzések ellen 0,5–2,0 pro dos. 3–5×napj. porban, pilulában, vagy infus. 10,0: 150,0 2 ór. 1 evők. 10,0 = 8 kr.

II. **Mel crudum**. Syrupok helyett ízjavító. Electuariaumok alapanyaga. 100,0 = 14 kr.

II. **Mel depuratum**. Az előbbinél higabb. Haszn. mint a mel crud. 100,0 = 22 kr.

H. **Mel rosatum.** Íz- és szagjavító. 10,0 = 3 kr.

H. **Melissæ folia.** (*Melissa officinalis*. Labiatae.) Hatóanyagai: illatos olaj, kevés csersav, gyanta. Haszn. infusum alakjában (1 : 10) mint diaphoreticum, carminativum, stimulans. Illatos theakeverékek alkatrésze. 100,0 = 26 kr.

H. **Menthæ folia.** (*Mentha piperita*. Labiatae.) Hatóanyaga illó olaj. Infusum (1 : 10) alakjában diaphoreticum, carminativum, stimulans. Illatos theakeverékek alkatrésze 100,0 = 30 kr.

H. **Aqua Menthæ piperitæ** l. *Aquæ aromathicæ*.

463 *Rp.* Fol. Menthæ pip.

Fol. Melissæ

Rad. Valerianæ aa 25,0.

Fruct. Anisi

Fruct. Coriandri aa 10,0.

Conc. cont. M. f. species.

℞. 1 csésze theára 1—2 evők.

Diaphoreticus, antispasmodicus
theaelegy. 32 kr.

Mentholum [$C_{10}H_{19}(OH)$]. Az ol. menthæ pip. stearoptenje. Szintelen jegeczek, vízben nehezen, borszeszben, ætherben, glycerinben, zsíros olajokban könnyen oldódnak. Szaga, mint a menthaolajé. Helybelileg érzéstelenít; bels. véve a gerinczvelő reflextevékenységét csökkenti s érzéstelenít. Antisepticus hatása is telemes. Küls. hemicrania, neuralgiák ellen rudaeszkák (Migränstift), kenőcsök (1 : 10) alakjában használtatik. Bels. tuberculosissnál belegzések (melegítették, midőn elillan) alakjában haszn.; továbbá porban, pilulában (0,1—0,5—1,0 pro dos.) phthisis, cardialgia, hyperemesis, reflexneurosisok eseteiben. 0,1 = 3 kr.

64 *Rp.* Mentholi 1,0.

Ol. Sesami 0,5.

Lanolin 8,5.

M. f. ungu.

℞. Migrain-kenőcs.

(LANGGAARD.)

65 kr.

466 *Rp.* Mentholi 5,0.

Solve in

Ol. Sesami 45,0.

adde

Aquæ Calcis 50,0.

M. f. linim.

℞. Külsőleg. Egési sebekre.

(LANGGAARD.)

67 kr.

465 *Rp.* Mentholi 4,0.

Ol. Sesami 20,0.

M. f. linim.

℞. Gégébe, orrba cseppen-
tésre. (ROSENHEIM.)

1 frt 50 kr.

467 *Rp.* Mentholi 2,0.

Solve in

Glycer. 1,0.

adde

Gummi arab.

Sacchar. lact. aa qu. s.

ut f. l. a. pilul. No. 40.

Obduc. Gelatina.

℞. 2—3×napj. 1—2—3 sze-
met. Egy pilulában 0,05
menthol. 1 frt 30 kr.

Methylalum [$\text{CH}_2(\text{OCH}_3)_2$]. Szintelen, könnyen mozgó, igen illó, 42°C -nál forró folyadék; chloroform és eczetatherre emlékeztető szagú, csipős, aromaticus ízű; vízben, borszeszben, zsíros olajokban oldódik. Sedativum, hypnoticum. (Personali, Krafft-Ebing). Agyvérzés esetén bizonytalan hatású. Adaga subcután 0,1 pro dos., per os vagy klysmában 0,5–1,0 pro dos. 1,0 = 30 kr.

168 Rp. Methylali 1,0.
Aque dest. 9,0.
M. f. solut.

DS. Bőr alá fecskendésre.
Egy fecskendőnyi 0,1 methylalt tartalmaz.
50 kr.

469 Rp. Methylali 1,0.
Mucil. Gummi arab. 100,0.
Aque dest. aa 50,0.
MDS. Klysmá. 87 kr.

470 Rp. Methylali 1,5.
Syrup. simpl. 100,0.
MDS. $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$ -részét szükség esetén egyszerre elfogyasztani.
61 kr.

Methylenum bichloratum (CH_2Cl_2). Szintelen, tiszta, kellemes szagú folyadék. Forrpontja 40°C . Chloroform helyett a sebészletben mint altató, érzéstelenítő használtatik. Különös előnyei nincsenek. Gyakran találni tisztátalan készítményeket, ezért vigyázat! 1,0 = 15 kr.

II. **Miscella pro solutione Calcii oxysulfurati.** (Calc. oxyd. 30,0, + Aqua commun. 20,0, + Sulfur. subl. lotum 60,0, 10,0 = 5 kr.

II. **Solutio Calcii oxysulfuratis. Solutio Vlemineckx.**
1. haszn. calc. sulfurat ez. a. 10,0 = 2 kr.

II. **Mixtura gummosa** l. Gummi arabicum.

Mollinum. Túlszírosított szappan, mely a bőrgyógyászatban részint tisztán haszn. más szappanok helyett, részint puha kenőcsszerű lévén, kenőcs alapanyagul szolgál. Rendelnek p. o. carbol-mollint, mollin-creolint, mollinum hydrargyri cinereum-ot stb. A mollin gyorsan bomlik; hámfosztott helyekre maró hatást gyakorol, s így sebekkel nem szabad érintkezésbe jönnie. Főösleges készítmény. 10,0 = 15 kr.

††H. **Morphinum**

††H. **Morphinum hydrochloricum** } l. Opium.

H. **Moschus.** A Moschus moschiferus præputium-mirigyének váladéka. Excitans, antispasmodicum. Adag porban 0,1–0,3–0,5 pro dos. napj. 3–4-szer, gyakran camphorral összekötve. 0,1 = 48 kr.

Tinctura Moschi. 10–30 csepp 2–3 ór. 1,0 = 25 kr.
1 csepp = 2 kr.

- 471 *Rp.* Moschi 3,0.
 Camphor. trit. 0,3.
 Sacchar. lact. 4,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.
 2 $\frac{1}{2}$ S. 2—3 ór. 1 port.
 Excitans.
 14 frt 69 kr.
- 472 *Rp.* Tinct. Moschi
 Tinct. Valerian. spir.
 āā 15,0.
 2 $\frac{1}{2}$ S. 2—3 $\times$ napj. 20—30
 cseppet.
 Antihystericum, antispas-
 modicum.
 3 frt 98 kr.
- 473 *Rp.* Moschi 0,1.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.
 2 $\frac{1}{2}$ S. 3 ór. 1 port.
 Csecsemőnek asthma laryngeum v.
 eclampsia esetén.
 74 kr.

H. **Mucilago Gummi arabici** l. Gummi arabicum.

Naphthalinum purissimum ($C_{10}H_8$). Színtelen, fénylő, kátrányszagú lemezekké. Illó. Vízben nem. hideg borszeszben nehezen, forróban könnyebben, ætherben, zsíros olajokban könnyen oldódik. Antisepticus, desiniciens hatású. ROSSBACH ajánlotta idült vékony- és vastagbélhurutok, cholera infantum, typhus abdomin, tuberculosusok hasmenése ellen. Hólyagbajoknál észszerűtlen, sőt ártalmas is lehet. Bőrgyógyászatban phthiriasis, scabies ellen kenőcsalakban (1 : 2). Bels. adag porban 0,1—0,5 pro dos. 3—6 $\times$ napj. felnőttek; gyermeknek 0,05—0,1 pro dos. 3—4 $\times$ napj. Nem tévesztendő össze a naphthollal (!!) 10,0 = 3 kr.

- 474 *Rp.* Naphthalini puriss.
 Sacchar. alb. āā 5,0.
 Ol. Bergamotta 0,03.
 M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 20.
 Del. in chartis ceratis.
 S. 5—10—15—20 port napjában (ostyában)
 bevenni. (ROSSBACH.)
 Acut v. idült bélhurut esetén felnőttek.
 55 kr.

H. **Naphtholum** ($C_{10}H_8O$). Színtelen, selyemfényű kristálylemezekből áll, v. fehér kristályos por. Gyenge, phenolra emlékeztető szaga, erős, égető íze van. 1000 sr. hideg, 75 sr. forró vízben oldódik, borszeszben, ætherben, chloroformban, zsíros olajokban könnyen. Bőrgyógyászatban küls. kátránykészítmények helyett idült eccema, psoriasis, pityriasis versicolor, scabies, favus, herpes tonsurans, prurigo ellen. Hosszas v. kiterjedt bőrfelületen alkalmazása haemoglobinuriát hozhat létre, ezért vigyázat (!). Kenőcshez 1 : 10—30, borszeszes oldathoz 2—10 : 100, 1,0 = 9 kr.

475 *Rp.* Naphtholi pulv. 0,5.
Amyli 50,0.
M. f. pulv. det. in scat.
℞. Hintópor.
Hyperidrosis.
31 kr.

477 *Rp.* Naphtholi 5,0.
Axung. porci 10,0.
Lanolini 80,0.
M. f. ungu. ~
℞. Kenőcs.
1 frt 63 kr.

476 *Rp.* Naphtholi 1,0.
Ol. Sesami 100,0.
M. f. linim.
℞. Ecsételésre.
63 kr.

478 *Rp.* Naphtholi 15,0.
Axung. porci 100,0.
Sapon. kalini 50,0.
Cretæ alb. 10,0.
M. f. ungu.
℞. 1—2-szer bedörzsölni.
Scabies.
1 frt 93 kr.

H. Natrium aceticum crystallisatum ($NaC_2H_3O_2 \cdot 3H_2O$). Színtelen, állászó jegecekből áll; íze kesernyés és sós, 14 sr. hideg vízben, 30 sr. hideg és 2 sr. forró borszeszben oldható. Gyenge diureticum. Bels. adag 1,0—3,0 pro dos. napj. 3—4-szer oldatban. Gyakran mint más diureticus szerek adjuvansa kali acetic. solut. helyett. 10,0 = 5 kr.

H. Natrium benzoicum ($C_7H_5NaO_2$). Fehér, alaktalan por: 1,5 sr. vízben oldódik. Ma ritkán rendeltetik, még leginkább polyarthrit. rheum. ellen (jobb a natr. salicyl.). Mint antipyreticum már alig szerepel. Adag bels. porban 10,0—20,0 pro die. 1,0 = 6 kr.

H. Natrium bicarbonicum l. Natrium hydrocarbonicum.

H. Natrium boracicum s. Borax venetus $Na_4B_4O_7 \cdot 10H_2O$. Hasábalakú, színtelen, kemény kristályok, levegőn elmállnak. 17 sr. hideg, 4,2 sr. forró vízben oldódik, glicerinben könnyen, borszeszben nem. Gyenge desiniciens, gyenge diureticum; húgysavas sókat oldja. Alkalmazása kiterjedtebb, mint indokolható volna. Küls. minden alakú stomatitisnél, angina catarrh.-nál, száj-, torokvizek (1—2% oldatok), és ecsetelések (1 : 5—10) alakjában; acné disseminata, pityriasis versicolor, pruritus vulvæ eseteiben kenőcsök alakjában (1 : 5—10). Bels. mint diureticum és köszvény ellenes szer 0,5—2,0 pro dos. porban, oldatban napj. 3—4-szer. 10,0 = 4 kr. (subl. pulv.).

479 *Rp.* Natrii boracici 1,0—2,0.
Aquæ dest. 100,0.
℞. Csecsemőknek soor
esetén szájmosóvíz.
35 kr.

480 *Rp.* Natrii boracici 3 0.
Glycerini 15,0.
M. f. solut.
℞. Stomatitis aphthosa ese-
tén ecsetelésre.
35 kr.

H. Natrium bromatum ($NaBr$). Fehér, kristályos por, 1,2 sr. hideg vízben oldható. Hatása, használata, adagolása, mint a

kalium bromatúé, külömbség, hogy a szívre még nagy adagban sem hat károsan. 10,0 = 14 kr.

- 481 *Rp.* Natrii bromati 10,0.
 Ammon. bromati $\bar{a}\bar{a}$ 5,0.
 Aquæ dest. 150,0.
 Syrup. cort. Aurant. 20,0.
MDS. 3 ór. 1 evőkan.
 51 kr.
- 482 *Rp.* Natrii bromati 10,0.
 Div. in dos. æqu. No. 10.
 Det. in chart. cerat.
S. Naponta 3–5 port.
 45 kr.

H. Natrium carbonicum crystallisatum ($\text{Na}_2\text{CO}_3, 10_2\text{H}_2\text{O}$).

Szintelen, az egyhajlású rendszerbe tartozó, a levegőn elmálló jegecekből áll. 1,8 sr. hideg és 0,3 sr. forró vízben oldódik; oldata erősen lúgos hatású, maró ízű; borszeszhen nem oldódik. Bels. nem haszn., még leginkább saturatiókhoz kali carbon. helyett. Helyette a natron. hydrocarb. 100,0 = 16 kr. 10,0 = 5 kr. (dilaps.).

H. Natrium hydrocarbonicum s. bicarbonicum (NaHCO_3).

Fehér, nem átlátszó, a levegőn el nem málló jegecesz kergek. 13,8 sr. vízben oldható, íze gyengén lúgos. Küls. száj-, torokvizeknek 2–5%-os oldatok, belégzésre $\frac{1}{2}$ –1%-os oldatok. Bels. adag porban, oldatban 0,3–1,0 pro dos. 3–5×napj. 100,0 = 16 kr. 200,0 túl 100,0 = 14 kr.

- 483 *Rp.* Natr. hydrocarb. 3,0.
 Pulv. rad. Rhei 2,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.
DS. 2–3 ór. 1 port.
 Gyomorhurut. Icerus catarrh. 32 kr.
- 484 *Rp.* Natrii hydrocarb. 20,0.
 Elæosacchar. Fœnic. 5,0.
 M. f. pulv. det. in scat.
S. 3×napj. 1 késhegynyit.
 Pyrosis, gyomorhurut, diabetes, köszvény, húgyhomok. 29 kr.
- 485 *Rp.* Natrii hydrocarb. 0,5.
 Aquæ dest. 100,0.
 Aquæ Amygdal. amar. gtt. 10.
 Syrup. simpl. 10,0.
MDS. 2 ór. 1 gyk.
 3–4 éves gyerm. hörg-hurut ellen. 31 kr.
- 486 *Rp.* Natrii hydrocarb. 0,4.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 1.
 Aquæ dest. 80,0.
 Syrup. simpl. 8,0.
MDS. 2 ór. 1 kk.
 Csecsemőnek heveny hörg-hurut esetén. 33 kr.

- 487 *Rp.* Natrii hydrocarb. 0,4.
 Aquæ Fœniculi
 Aquæ dest. $\bar{a}\bar{a}$ 40,0.
 Syrup. simpl. 8,0.

MDS. 2 ór. 1 kk.

Csecsemőnek dyspepsia acida esetén. Kolika esetén 1–2 csepp tinct. nucis vom. is teendő hozzá.

32 kr.

H. Natrium hydrooxydatum solutum s. Natrium causticum solutum. Színtelen, átlátszó folyadék; 100 srészben 32 sr. natr. hydrooxyd. Erősen lúgos hatású. Bels. nem. Küls. bőrgyógyászatban 1/2—1%-os oldatok mosogatásokra, ecsetelésre. 10,0 = 4 kr.

H. Natrium jodatum (NaJ). Fehér, jegeces por, levegőn hosszabb idő múlva megnedvesedik és vöröses színű lesz. 0,6 sr. vízben, és 3 sr. borszeszben oldható. Hatása, használata, adaga, mint a kalium jodatumé. Előnye az utóbbi felett, hogy a szívre nem hat károsan. 10,0 = 48 kr.

H. Natrium nitricum (NaNO₃). A rhomboedricus rendszerbe tartozó, csaknem kockaalakú, színtelen jegeczeket alkot. 1,0 sr. vízben és 50 sr. borszeszben oldható. Használata tévesen olyan, mint a kalium nitricumé; szívre, diuresisre, hőre alig hat. Adag bels. oldatban 0,5—2,0 pro dos. 3—4×napj. 10,0 = 3 kr.

Natrium nitrosum (NaNO₂). Fehér, jegeces, gyengén lúgos kémhatású, vízben könnyen, borszeszben nem oldódó, hűtő, sós ízű por. Úgy hat és úgy használtatik, mint az amyle nitrosa. Adag bels. oldatban 0,5—2,0; 150,0 3—4×napj. 1 evők., vagy szükség szerint (angina pectoris vagy asthma rohamok alkalmával) 1—2 evőkanállal. Vigyázat. (!)

H. Natrium phosphoricum (Na₂HPO₄ · 12H₂O). Színtelen, áttetsző, hasábos jegeczekből áll; száraz levegőn igen könnyen elmállik. Íze enyhén sós, kémhatása lúgos. 5,8 sr. hideg vízben, 2 sr. forróban oldódik. Enyhe laxans 20,0—30,0-os adagban; adják rhachitis, osteomalacia, köszvény, lithiasis eseteiben is 0,5—2,0—3,0-os adagban, de kevés haszonnal. 10,0 = 4 kr.

488 Rp. Natrii phosphor. 30,0.
Aque dest. 160,0.
Syrup. mannati 20,0.
℞℞. Reggel 2—3-szorra el-
fogyasztani. Enyhe laxans.
53 kr.

489 Rp. Natrii phosphor. 10,0.
Acid. benzoici 1,0.
Aque dest. 100,0.
Syrup. simpl. 30,0.
℞℞. 2 ór. 1 evők.
Köszvény, húgyhomok ese-
teiben. 53 kr.

490 Rp. Natrii phosphor. 1,0—2,0.
Aque dest. 100,0.
Syrup. simpl. 10,0.
℞℞. 2 ór. 1 gyk.

Gyermekeknek lithiasis esetében, ha a vizelet savi vegyhatású. Fájdalmas vizelésnél 2—4 csepp linct. opii simpl. tehető hozzá.
24 kr.

H. Natrium salicylicum ($2\text{NaC}_7\text{H}_5\text{O}_3$, H_2O). Sós és édeses ízű, fehér, jegeczes pikkelyekből álló por. Egyenlő sr. vízben, 6 sr. borszeszben oldható. Antipyreticum, antirheumaticum. Adag porban, oldatban 0,5—1,0 pro dos. 3,0—10,0 pro die. Antipyreticus czélból az egyes adagok óránként, polyarthrititis rheum. eseteiben $\frac{1}{2}$ óránként adandók. Hemicrania eseteiben roham kezdetén 1,0—1,5 pro dos. Vastagbélhurut, dysenteria chron. eseteiben bélmosások 1—2 $\frac{1}{2}$ -os oldattal. 1,0 = 4 kr.

491 *Rp.* Natrii salicyl. 1,0—2,0.
Aque dest. 80,0.
Syrup. simpl. 10,0.
MiDS. ór. 1 gyk.

2—4 éves gyermeknek heveny lázas fertőző betegségek esetén antipyreticum.

30 kr.

492 *Rp.* Natrii salicyl. 10,0.
Aque dest. 170,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
Syr. cort. Aurant. 20,0.

MiDS. 2—3 óra alatt felét elfogyasztani evőkanalanként. Polyarthrititis rheum. acuta esetén.

77 kr.

493 *Rp.* Natrii salicyl. 10,0.
Div. in dos. æqu. No. 10.
DS. 1 gmos natr. salicyl. porok.
65 kr.

H. Natrium silicicum liquidum. Vízüveg. Színtelen, vagy kissé sárgás színű, lúgos hatású folyadék. Sebészetben contentiv kötések készítéséhez használtatik. 100,0 = 8 kr.

H. Natrium sulfuricum crystallatum. Glanbersó. ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.) Színtelen, hasábalakt., csikos jegeczekből áll. Légen könnyen elmállik; íze kesernyés sós, 3 sr. hideg és 0,4 sr. forró vízben oldható. Bels. 15,0—30,0, pro dos. laxans. 1,0—2,0 pro dos. 3—4 $\times$ napj. idült gyomor-, bélhurut, gyomorbéltonia, icterus catarrhalis, ulcus ventriculi eseteiben. 100,0 = 14 kr., vagy 10,0 = 4 kr. (dilaps.).

H. Sal thermarum Carolinarum. Karlsbadi só. Főalkatrésze natr. sulf. Haszn. és adaga mint az utóbbinak. 10,0 = 12 kr., vagy 10,0 = 25 kr. (dilaps.).

494 *Rp.* Natrii sulf. dilapsi 40,0.
Kalii sulf. 2,0.
Natrii chlor. 18,0.
Natrii hydrocarb. 36,0.
M. f. pulv. det. in scat.

S. Mesterséges karlsbadi só. 6,0 feloldva 1000,0 vízben mesterséges karlsbadi vizet ad. 47 kr.

495 *Rp.* Natrii sulf. dilapsi 10,0.
Pulv. rad. Gentianæ 1,0.
M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.

DS. 3-szor napj. 1 port. Idült gyomor-, bélhurut, gyomor- és béltonia eseteiben. 30 kr.

Natrium tartaricum ($\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6, \text{H}_2\text{O}$). Szintelen, vízben könnyen oldható jegeczek. Laxans, mint a kalium tartaricum. Bels. adag 10,0—30,0 vízben oldva. 10,0 = 9 kr.

Nitroglycerinum [$\text{C}_3\text{H}_5(\text{ONO}_2)_3$]. Szintelen, olajszerű, hidegen szagtalan, édeses-aromathicus ízű, könnyen robbanó folyadék. Hatása, használata mint az amyle nitrosáé és a natr. nitrosomé. *Teljesen főlösleges, e mellett veszélyes* (l. czélszerűtlen, veszélyes gyógyszerkeverékek cz. a.) készítmény. Ne rendeltessék! Adaga különben 1% borszeszes oldathól 3 cseptől pro dos. emelkedőleg 10 cseppig pro dos.

H. Nux moschata. Szerecsendió. (*Myristica fragrans*. Myristiceae.) Hatóanyaga illatos olaj. Carminativum, szagjavító. Öbsolet. 10,0 = 10 kr., vagy 10,0 = 13 kr. (pulv.).

H. Nux vomica. (*Strychnos nux vomica* magvai.) Hatóanyagai strychnin, brucin. 10,0 = 3 kr., vagy 10,0 = 6 kr. (subt. pulv.). Készítményei haszn.:

††**II. Strychninum nitricum** ($\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_2, \text{HNO}_3$). Finom, fehér, selyemfényű kristályokból áll, 90 sr. hideg és 3 sr. forró vízben, 70 sr. hideg és 5 sr. forró borszeszben, 26 sr. glycerinben oldható. Oldala igen keserű. Körzeti és központi motor. hűdések (különösen zárizomhűdések) esetén bőr alá fecskendés alakjában adag 0,001—0,01! Dos. maxim. pro die 0,02! 0,01 = 1 kr.

†**H. Extractum Nucis vomicae.** Borszeszes kivonat. Kis adagban bels. mint amarum, tonicum, nagyobb adagokban hűdések esetén. Adag pilulában, porban 0,01—0,04! Dos. maxim. pro die 0,2! 1,0 = 9 kr.

†**H. Tinctura Nucis vomicae.** Haszn. mint az extr. nuc. Adag bels. 2—5—10! csepp pro dos. 2—3×napj. Dos. maxim. sing. 0,5! (10 csepp)! Dos. maxim. pro die 1,5! (30 csepp.)! 10,0 = 7 kr.

496 *Rp.* Strychnini nitr. 0,05.
Aque dest. 10,0.
M. f. solut. filtra.

℞ Bőr alá fecskendésre.
Sub sigillo. Sub signo veneni. Az orvos kezéhez.
Egy fecskendőben 0,005
Strychn. nitr. 26 kr.

498 *Rp.* Extr. Nucis vom. 0,2.
Ferri lactici 2,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.

℞ 2—3×napj. 1 port.
Hűdések, impotentia.
30 kr.

497 *Rp.* Extr. Nuc. vom. 0,1.
Natrii hydrocarb. 2,0.
Pulv. rad. Rhei 1,0.
Sacch. albi 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.

℞ 3 ór. 1 port.
Gyomorhurut.
31 kr.

499 *Rp.* Extr. Nucis vom. 0,03—0,05.
Aque dest. 100,0.
Syrup. simpl. 15,0.

℞ 2 ór. 1 kk. v. gyk.
1—5 éves gyermeknek lapsus anni esetén. 30 kr.

500 *Rp.* Tinct. Nucis vom. aa 3,0.
 Tinct. Opii crocat. 10,0.
 Tinct. Chinæ comp. 10,0.
MDS. 3—4-szer napj. 15—20 cseppel.
 Diarrhoea. 35 kr.

Olea aetherea.

H. **Oleum Anisi.** 1,0 = 5 kr.
 H. **Oleum Aurantiorum corticum.** 1,0 = 6 kr. Szagjavítók. Elaeosaccharum készítéséhez használtatnak.
 H. **Oleum Caryophyllorum.** 1,0 = 4 kr.
 H. **Oleum Cinnamomi Cassiæ.** 1,0 = 4 kr.
 H. **Oleum Citri.** 1,0 = 4 kr.
 H. **Oleum Eucalypti amygdalinum** l. Eucalypti folia.
 H. **Oleum Foeniculi.** Szagjavító. Elaeosaccharum készítéséhez haszn. 1,0 = 3 kr.
 H. **Oleum Juniperi.** Küls. bőrizgató. Bels. diureticum. Adag bels. 2—4 csepp czukorra cseppentve v. cognacban v. más szeszes oldatban. 1,0 = 2 kr.

501 *Rp.* Olei Juniperi 3,0. 502 *Rp.* Olei Juniperi 2,0.
 Ungu. simpl. 30,0. Tinct. Digitalis 5,0.
 M. f. ungu. Spirit. Aetheris 13,0.
MDS. Bőrizgató kenőcs. 40 kr. *MDS.* 3 ór. 20—30 cseppel.
 Diureticum. 26 kr.

H. **Oleum Lavandulæ.** 1,0 = 4 kr.
 H. **Oleum Macidis.** 1,0 = 5 kr.
 H. **Oleum Majoranæ.** 1,0 = 13 kr.
 H. **Oleum Menthæ crispæ.** 1,0 = 11 kr.
 H. **Oleum Menthæ piperitæ.** 1,0 = 16 kr. Szagjavítók. Elaeosaccharum készítéséhez haszn.
 H. **Oleum Pini silvestri pro inhalatione.** Az Ol. terebinthina helyett 10—25 csepp forró vízre cseppentve belégzendő idült légcső-, hörghurut esetén, ha sok a váladék. 10,0 = 13 kr.
 H. **Oleum Rosæ.** Szagjavító. Elaeosacchar. és mel. rosatum készítéséhez haszn. 1 csepp = 2 kr.
 H. **Oleum Rosmarini.** Szagjavító. 1,0 = 2 kr.
Oleum Santali ligni. Santalum album fa illatos olaja. Hurutellenes szer. Különösen bronchitisek s acut gonorrhœa eseteiben 10—20 csepp gelatin capsulában 3—4×napj. jó sikerrel adható. 10 = 12 kr.
 †H. **Oleum Sinapis æthereum** l. Sinapis semina. 1 csepp = 1 kr.
 H. **Oleum Succini rectificatum.** Bels. vitæ Hoffmanni készítéséhez haszn. 1,0 = 3 kr.

H. Oleum Terebinthinæ rectificatum. Színtelen, híg, közönbös kémhatású, fenyűszagú, csípős, égető ízű illó olaj. Küls. tisztán v. kenőcsben (1 : 3) a bőrre dörzsölve bőrvörösítő, tisztán beecsetelve hæmostaticum. Belégezve (15—30 cseppet forró vízre cseppentve) légcső-, hörgőhurutnál az elválasztást csökkenti. Bels. hurutellenes, hæmostaticum, anodynum, excitans, diureticum. Adag 5—10—15 csepp pro dos. 2—3 ór. capsula gelatinosában, electuariumban v. egyszerűen czukorra cseppentve. Heveny phosphormérgezésnél *nem rectificált u. n. franczia terpentin adandó*, mint vegyi ellenmérég 15—20—30 cseppnyi adagokban. 100,0 = 20 kr.

503 *Űp.* Olei Terebinth. 20,0.
Olei camphor. 40,0.
M. f. linim.
28. Külsőleg.
Bőrvörösítő.
49 kr.

504 *Űp.* Olei Terebinth. gtt. 10.
Det. in caps. gelat.
Dent. tal. dos. No. 20.
8. 3—4×napj. 1 capsulát.
1 frt 10 kr.

505 *Űp.* Olei Terebinth.
Olei Amygdalar. dulc.
aa 5,0.
Mucil. Gummi arab.
Syrup. simpl. aa 20,0.
Aquæ dest. 200,0.
M. f. l. a. emulsio.
28. 1/2 ór. 1 evők.
Hæmoptoë. (BAMBERGER.)
58 kr.

506 *Űp.* Olei Terebinth. 5,0.
Cera alb. 15,0.
Sacchar. alb qu. s.
ut f. l. a. pilul. No. 100,0.
Consp. pulv. Cinnam.
28. 3—4×napj. 5—10 szemet.
Cystitis chron. Gonorrhœa
chron. eseteiben.
60 kr.

H. Oleum Valerianæ. Zöldessárga v. barna, kissé sűrű, savanyú kémhatású, átható szagú illó olaj. 100 sr. vízben oldódik, borszeszben minden arányban, Antispasmodicum, antihystericum. Bels. adag 1—3 csepp pilulában, capsula gelatinosában. 1,0 = 12 kr.

H. Oleum Amygdalarum dulcinum l. Amygdalæ dulces.

H. Oleum Cacao s. Butyrum Cacao. Végbélcsapok alapanyagául szolgál. 10,0 = 6 kr.

H. Oleum Cadinum. Sötétbarna, sűrű, kátrányhoz hasonló, füstös szagú olaj. Bőrgyógyászatban a pix liquida helyett mint bőrizgató és antiparasiticum használtatik psoriasis, prurigo, idült eczemák, herpes tonsurans, favus, scabies ellen. Bels. nem. 100,0 = 15 kr.

507 *Rp.* Ol. Cadini
Ol. Sesami $\bar{a}\bar{a}$ 50,0,
MDS. Külsőleg.
36 kr.

509 *Rp.* Empl. Diachylon simpl.
Ungu. emoll. $\bar{a}\bar{a}$ 25,0.
Olei Cadini 5,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs.
Gyermekek prurigo esetén.
60 kr.

511 *Rp.* Sulfur. subl. loti
Olei Cadini $\bar{a}\bar{a}$ 50,0.
Sapon. kalini
Axung. porci $\bar{a}\bar{a}$ 100,0.
Pulv. Cretæ alb. 10,0.
M. f. ungu.
DS. Módosított Wilkinson-
kenőcs. 94 kr.

508 *Rp.* Olei Cadini 2,0.
Sapon. kalini
Ungu. emoll. $\bar{a}\bar{a}$ 50,0.
M. f. ungu.

DS. Kenőcs. Sörteecsettel
vékonyan beecsetelendő a
beteg bőrfelületre.
Gyermekeknek herp. tons.,
favus esetén.
78 kr.

510 *Rp.* Olei Cadini.
Sapon. kalini $\bar{a}\bar{a}$ 20,0.
Spiritus 40,0.
MDS. 2×napj. szőreccsettel
beecsetelni.
Idült eccema. (HEBRA.)
31 kr.

II. **Oleum camphoratum** l. Camphora.

III. **Oleum Crotonis** l. Crotonis semina.

H. **Oleum Hyosциami foliorum coctum** l. Hyosциami folia.

H. **Oleum Jecoris Aselli flavum.** Csukamájolaj. Minden
zsíros olaj közt legkönnyebben emészthető. Tápanyag rhachitu-
sus, scrophuloticus (erebicus alak) gyermekeknek, phthisiku-
soknak. Ellenjavallt láznál és gyomor-bélhajok eseteiben. Adag
gyermekeknek napj. 2×1 kk., felnőtteknek 2×1 gyk. v. 1 evők.
mindig étkezés közben, soha éhgyomorra. 100,0 = 17 kr. 200,0 túl
100,0 = 14 kr.

H. **Oleum Lauri.** Friss babérmagvakból sajtolt zöld, lágy ke-
nőcshez hasonló szemeses, babérszagú olaj. Kenőcsökhöz, kül.
hajkenőcsökhöz mint alapanyag haszn. 10,0 = 2 kr.

II. **Oleum Lini lotum et venale** l. Lini semina.

H. **Oleum Ricini.** A ricinus communis magvaiból sajtolt, át-
látszó, kissé sűrű, majdnem színtelen v. sárgás, sajátos szagú
és ízű zsíros olaj. Laxans. Adag 20,0 – 30,0 pro dos. (1–2 evők.)
Kellemetlen ízét javítjuk, ha az olajra néhány csepp rumot
v. citromnedvet öntünk. Rendelhető tisztán, v. emulsióban v.
capsulában (az utóbbiak különböző adagokban készletben is
szoktak tartatni nagyobb forgalmú gyógytárakban). 100,0 = 25 kr.

512 *Rp.* Olei Ricini 30,0.
 Pulv. Gummi arab. qu. s.
 Aquæ dest. 180,0.
 Syrup. emuls. 20,0.
 M. f. l. a emulsio.

℞S. 1 óra alatt 3-szorra be-
 venni.

72 kr.

513 *Rp.* Olei Ricini
 Syrupi mannati aa 10,0.
 ℞S. 2 ór. (felrázva) 1 kk.
 v. gyk. a hatás bekövet-
 keztéig.

Csecsemőnek v. 1—3 éves
 gyermeknek.

20 kr.

II. **Oleum Sesami.** Az oleum olivarium helyett hiv. zsíros olaj.
 100,0 = 26 kr.

II. **Ononidis spinosæ radix.** (Papilionaceæ) Hatóanyagát pon-
 tosan nem ismerjük. Diureticum. Adag decoct. 15,0—20,0; 150,0
 2 ór. 1 evők. Gyakran más diureticus szerekekkel összekötve.
 100,0 = 10 kr.

514 *Rp.* Decoct. rad. Ononid. spin. e 15,0.
 l. a. p. ad colat. 130,0.
 Kalii acet. sol. 10,0.
 Oxymel. Scilke 20,0.
 ℞S. 2 ór. 1 evők.
 Diureticum. 47 kr.

III. **Opium.** Papaver somniferum gyümölcsének lejuedve. Főbb
 hatóanyagai: morphinum (10%), codeinum (0,3—0,5%), the-
 bainum (0,2—1,0%). Anodynum, anæstheticum, hypnoticum,
 antispasmodicum, antidiarrhoicum. Colica saturnina eseteiben
 nagy adag a fájdalmakkal együtt a székszorulást is megszünteti,
 diabetes mellitusnál nagy adagok erősen csökkenlik a cukor
 kiürülést. Adag bels. porban, pilulában igen különböző; fáj-
 dalmak, köhögési inger, hasmenés csillapítására 0,01—0,02
 pro dos. 3—5Xnapj.: hypnoticus, antispasmodicus célból v.
 colica saturn. és diabetes mellitusnál 0,03—0,10 pro dos.
 3—5Xnapj Dos. maxim. sing 0,15! pro die 0,5! Gyermekeknél
 nagy vigyázat l. táblázat (!). 1,0 = 8 kr.

IV. **Extractum Opii.** Dextrinnel beszárított vizes kivonat.
 Hatás, használat, mint az opiumnál. Még egyszer oly haté-
 kony, mint az opium. Adag bels. porban, pilulában *felényi*
 mint az opiumból. Dos. maxim. sing. 0,05! pro die 0,3!
 Gyermekeknek nem! 1,0 = 22 kr.

V. **Tinctura Opii sim-
 plex.** 10,0 = 12 kr.

VI. **Tinct. Opii crocata.**
 10,0 = 40 kr.

Egyenlő mennyiségű opiumot tar-
 talmaznak. Hatás, használat, mint
 az opiumnál. Bels. kis adag 2—5
 csepp pro dos. 3—5Xnapj., nagy
 adag 6—10! csepp pro dos. 3—5
 Xnapj. Dos. maxim. sing. 0,5!
 (10 csepp)! pro die 2,0! (40 csepp)!.

†H. **Pulvis Doveri.** (Opium 5 r. + pulv. rad. Ipecac. 5 r. + Sacchar. 40 r.) Expectorans, köhögést csillapító, anti-diarrhœicum. Adag porban, pilulában 0,1—0,3 pro dos. ór. v. 2 ór. Dos. maxim. sing. 1,0! pro die 4,0! 1,0 = 2 kr.

††H. **Morphinum** ($C_{17}H_{19}NO_3$, H_2O). Hasáb- v. túalakú, szintelen, fénylő kristályokból áll. Ize keserű, kémhatása lúgos. 1000 r. hideg vízben, 500 r. forró vízben oldódik. Rossz oldékonysága miatt nem haszn., helyette haszn. sósavas sója. 0,1 = 6 kr.

††H. **Morphinum hydrochloricum** ($C_{17}H_{19}NO_3$, HCl , $3H_2O$). Vékony, túalakú, gyakran kéve módjára egyesült selyemfényű jegecekből, v. koczkaalakú, kristályos tömegekből áll. Ize igen keserű, kémhatása semleges. 20 sr. hideg, majdnem egyenlő sr. forró vízben és 50 sr. borszeszben oldható. Hatása mint az opiumé. Küls. fájdalomcsillapító kenőcsnek, linimentumnak 0,1—0,3 : 10,0. Bels. porban, pilulában, suppositoriumban, oldatban. bőr alá fecskendés alakjában kis adag 0,005—0,01 pro dos. 3—5×napj., nagy adag 0,02—0,03! pro dos. 3—4×napj. Dos. maxim. pro die 0,12! Gyermekeknek nem! 0,1 = 4 kr.

†H. **Codeinum** ($C_{18}H_{21}NO_3$, H_2O). Fehér, v. sárgásfehér, gyakran jól kifejlődött rhombos hasábalakú jegecekből áll; 80 sr. hideg és 17 sr. forró vízben oldódik. Hatása, használata mint a morphin. hydrochlor., csakhogy kevésbé megbízható. Bels. adag porban, pilulában 0,01—0,03—0,05! pro dos. 3—5×napj. Dos. maxim. pro die 0,2! 0,01 = 2 kr.

515 Rp. Opii pulv. 0,1.
Sacchar. alb. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqu. No. 10.
DŰ. Napj. 3—4 × 1 port.
28 kr.

516 Rp. Opii pur. 0,6.
Pulv. et extr. Liquir. āā
qu. s.
ut f. l. a. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Lycopod.
DŰ. Diabetes mellitus esetén
napj. 3 × 1 pilulát, majd
emelkedőleg egészen 3 × 3
szemig napj. Egy pilulában
0,02 opium.
38 kr.

517 Rp. Extr. Opii 0,05.
Alumin. pulv. 2,0.
Elaeosacch. Menthæ 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqu. No. 10.
DŰ. 2 ór. 1 port.
Diarrhœa.
29 kr.

518 Rp. Extr. Opii 0,05.
Butyri Cacao qu. s.
ut f. l. a. supposit. No. 5.
DŰ. Naponta 2 × 1 csap al-
kalmazandó.
Végbél- és hólyagtenesmus,
prostatitis, acut gonor-
rhœa eseteiben.
55 kr.

- 519 *Rp.* Extr. Opii 0,05.
Sulfur. aurat. Antimon. 0,5.
Natrii hydrocarb. 3,0.
Sacchar. alb. 2,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
℞. 2 ór. 1 port. Köhögés-
csillapító, köptető.
29 kr.
- 521 *Rp.* Tinct. Opii simpl.
Chloroformii aa 5,0.
℞. Fogcseppek.
28 kr.
- 522 *Rp.* Mixtur. gummosæ 100,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 3.
℞. 2 ór. 1 gyk.
3—5 éves gyermek. izgatott
köhögés ellen.
36 kr.
- 523 *Rp.* Pulv. Doveri 1,0—2,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
℞. 2 ór. 1 port.
Felnöttnék.
28 kr.
- 524 *Rp.* Tinct. Opii croc. 1,0.
Tinct. Castorei 2,0.
Tinct. Valerian. spir. 5,0.
℞. 1/2—1 ór. 10—15 csep-
pet szükség esetén.
Hystericus görcsök esetén.
36 kr.
- 525 *Rp.* Morphini hydrochl. 0,4.
Ungu. emoll. 20,0.
M. f. ungu.
℞. Morphinkenőcs. Fájdal-
omcsillapító.
60 kr.
- 526 *Rp.* Pulv. Doveri 0,1—0,3.
Sacchar. albi 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
℞. 2 ór. 1 port.
1—5 éves gyermeknek.
27 kr.
- 527 *Rp.* Morphini hydrochl. 0,5.
Gummi arab. pulv. 10,0.
M. exact. f. pulv. det. in
scal.
℞. Gégébe befúvásra por.
53 kr.
- 528 *Rp.* Tinct. Opii crocatae. 5,0.
Tinct. Ipecac. 3,0.
Tinct. Valerian. æth. 10,0.
Olei Menthæ pip. gtt. 10.
℞. 2—3 ór. 15—20 csep-
pet. Colica, diarrhœa ese-
leiben. Hasonló összeállí-
tású cseppek, mint cholera-
cseppek is ismereteseek.
57 kr.
- 529 *Rp.* Decoct. rad. Althææ
e 15,0.
l. a. p. ad colat. 100,0.
Tinct. Opii simpl. gtt. 5—10.
℞. Langyosan klysmá-
nak. Tenesmus.
32 kr.
- 530 *Rp.* Morphini hydrochl. 0,06.
Butyri Cacao qu. s.
Ut f. suppos. No. 4.
℞. 0,015 gmos morphinsup-
pos.
47 kr.

530 *Ap.* Morphini hydrochlor.

0,2.

Aquæ dest. 10,0.

M. f. sol. filtra.

MD. 2%-os morphinoldat, bőr
alá fecskendésre $\frac{1}{2}$ —1 fecs-
kendővel egyszerre.
29 kr.

532 *Ap.* Morphini hydrochlor.

0,05.

Sacchar. alb. 5,0.

M. f. pulv. div. in dos.

æqu. No. 10.

D. 2 ór. 1 port.

29 kr.

534 *Ap.* Morphini hydrochlor.

0,15.

Pulv. rad. Althææ

Mucil. Gummi arab.

aa qu. s.

Ut f. pilul No. 30.

Consp. pulv. Lycopod.

MD. 0,005 gmos morphin-
pilulák.

2—4—6 szem este bevéve

hypnoticum.

43 kr.

531 *Ap.* Morphini hydrochlor.

0,05.

Aquæ Amygdalar. amar.

15,0.

MD. 2 3 ór. 10—15 csep-
pet. 33 kr.

533 *Ap.* Emuls. oleosæ. 100,.

Aquæ Amygdalar. amar.

5,0.

Morphin. hydrochlor.

0,05.

MD. ór. v. 2 ór. 1 kk. las-
san lenyelni. Fájdalmas
nyelésnél, anginák, epiglott-
tis fekélyek eseteiben.

43 kr.

535 *Ap.* Codeini 0,1—0,2.

Pulv. rad. Ipecac. 0,3.

Sacchar. alb. 4,0.

M. f. pulv. div. in dos.

æqu. No. 10.

MD. 2—3 ór. 1 port.

Köhlögés-csillapító, köptető,
anti-diarrhoeicum.

47 kr.

I. H. Oxymel Scillæ l. Scilla.

H. Oxymel simplex. Izjavító, mint a syrupok. 10,0 = 3 kr.

Pannæ s. Uncomocomo rhizoma. (*Aspidium athaman-
ticum*. Filices.) Anthelminticum. Főleg teniák ellen. Adag
8,0—10,0 porban éhgyomorra. Előkészítő étrend czélszerű.

Papainum. *Carica papaya* nedvéből előállított, fehéres porból
álló erjanyag, mely fehérsnyét és fehérsnyeféléket ép úgy emészt
savanyú, mint alcalicus közegben. Feloldja 5%-os oldatban a
croup-hártyát. Küls. 5—10%-os oldat ecsetelésre croup, diph-
theritis eseteiben, esetleg belégzésre is. Bels. pepsin helyett
0,1—0,5 pro dos. porban, borban.

536 *Ap.* Papaini 2,0.

Aquæ dest.

Glycerini aa 9,0.

MD. 10%-os papainoldat.

Ecsetelésre.

†II. **Papaveris somniferi capsulæ s. capita.** (Papaveraceæ.) Kevés opiumalcaloïdokat tartalmaz. Syrupus diacodii készítésére használtatik. 100,0 = 9 kr.

II. **Paraffinum.** Fehér, merev, kristályos, viasznemű, zsíros tapintatú, petroleumszagú, íztelen, 74–80° C.-nál olvadó tömeg; vízben nem, 35 r. víztelen és forró borszeszben oldódik, ætherben, benzolban, zsíros és illó olajokban jól. Gyógyszerészeti technicában fontos szer. Néha kenőcsökhöz vételik mint alapanyag. 10,0 = 3 kr.

†II. **Paraldehydum** ($C_6H_{12}O_3$). Színtelen, sajátos fűszeres és egyszersmind fojtó szagú folyadék. 10 sr. vízben oldódik; ætherrel, borszeszszel elegyíthető. Sedativum, hypnoticum chloralhydrat helyett. Szívre hatása alig van. Strychnin és más görcsokozó mérgek hathatós pharmacologicus ellenmérge. Bels. sedativ adag 1,5–2,0 pro dos. hypnoticus adag 3,0! pro dos. Ha alvás nem állana be, $\frac{1}{2}$ –1 óra múlva ismét ennyit. Dos. maxim. pro die 6,0! 1,0 = 4 kr.

537 *Rp.* Paraldehydi 6.0.
 Aquæ dest. 100,0.
 Syrup. cort. Aurant. 20,0.
 Olei Menthæ pip. gtl. 2.
 MDS. Este felét bevenni, ha 30
 percz alatt álm nem jelentke-
 zik, másik fele is elfogyasz-
 landó. 53 kr.

II. **Pasta Guarana** l. Guarana.

Pelletierinum l. Granati Punica cort.

II. **Pepsinum germanicum solubile.** Kevéssé tapadós, finom, sárgásfehér por, sós, savanyú ízű, nem vízszívó; vízben oldódik. Hatása (a peptonképzés) csak savanyú közegben jelentkezik. Bels. dyspepsia bizonyos alakjainál. Adag porban, pilulában, pastillakban 0,1–0,5–1,0 pro dos. étkezés közben vagy után. Egyidejűleg acid. hydrochlor. dilut. vagy acid. tartar. is rendelendő. 1,0 = 7 kr.

II. **Vinum Pepsini.** (Tartalmaz 40 gm. folyadékban 1,0 pepsint és 0,1 híg sósavat.) Adag-étkezés után $\frac{1}{2}$ –1 tokaji pohárral. 10,0 = 15 kr.

I.	538	II.
<i>Rp.</i> Pepsini germ. 3,0.		<i>Rp.</i> Acid. hydrochlor. dil. 10,0.
Sacchar. alb. 2,0.		
M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.		Det. in vitro cum epi- stom. vitreo clauso.
Ds. Étkezés után 1 port.		S. Étkezés után $\frac{1}{2}$ pohár víz- ben 5–6 cseppet.
Utána acid. hydrochlor. di- lut. I. II. 38 kr.		19 kr.

Ia.	539	Ila.
<i>Rp.</i> Pepsini germ. 0,5.		<i>Rp.</i> Acid. hydrochlor. dil. gtt. 5—8.
Sacchar. alb. 2,0.		Aquæ dest. 80,0.
M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.		Syrup. simpl. 8,0.
℞S. Étkezés után 1 port.		℞S. Étkezés után 1 kk.
Utána acid. hydrochlor. l. Ila.		v. gyk.
Csecsemőknek. 28 kr.		Csecsemőknek. 22 kr.

540 *Rp.* Pepsini germ. 10,0.
 Acid. hydrochlor. dilut. 1,5.
 Pulv. Gummi arab.
 Sacchar. alb. āā qu. s.
 ut f. cum aqua dest. gtt. non-
 null. pastilli No. 30.
 ℞S. étkezés után 1 dbot.
 1 frt 21 kr.

H. Petrolum reotificatum. Színtelen, híg, közömbös kém-
 halású, átlható szagú, kesernyész, csipős ízű folyadék. Haszn.
 mint az æther petrolei. l. e. cz. a. 100,0 = 32 kr.

Phenacetinum l. Acetphenetidin.

Phosphorus. Fehér vagy sárgás, állatsző rudacskáiban fordul
 elő. Főleg csontbántalmak esetében, nevezetesen rhachitisnél
 rendelik olajoldatban, emulsióban, pilulában. Bels. adag felnőt-
 teknek 0,0005—0,001 pro dos. és 0,002—0,003 pro die, gyerme-
 keknek 0,0002—0,0005 pro dos. és pro die. 1,0 = 2 kr.

541 <i>Rp.</i> Phosphori 0,02.	542 <i>Rp.</i> Phosphori 0,01.
Mucil. Gummi arab.	Olei Amygdalar. dulc.
Pulv. Tragacanthæ	30,0.
āā qu. s.	Pulv. Gummi arab.
ut f. l. a. pilul. No. 30.	Sacchar. alb. āā 15,0.
Consp. pulv. Lycopod.	Aquæ dest. 40,0.
℞S. 2—3-szor napj. 1 szemet.	f. l. a. emulsio.
Felnőttnek.	℞S. Napj. 1 kk.
31 kr.	Gyermekeknek rhachitis esetén. 86 kr.

543 *Rp.* Phosphori 0,01.
 Olei Jecor. Aselli 100,0.
 f. solutio.
 ℞S. Napj. 1 kk.
 Gyermekeknek rhachitis esetén.
 48 kr.

†† **H. Physostigminum salicylicum** ($C_{15}H_{21}N_3O_2, C_7H_6O_3$).

A Calabarbab egyik hatóanyagának sója. Színtelen vagy kissé sárgás jegecekből áll. 150 sr. vízben és 12 sr. borszeszben oldható. A szemészetben használtatik mint myoticum becsepentések alakjában; oldat 0,02—0,05 : 10,0. Bels. ajánlották 0,0005—0,001 ! adagban tetanus, epilepsia, atropin és strychnin mérgezés ellen, de nem vált be. Dos. maxim. pro die 0,003 ! 0,01 = 8 kr.

Picrotoxinum ($C_{30}H_{34}O_{13}$). Anamirta cocculus (Menispermaceae) magvainak hatóanyaga. Színtelen, fénylő, szagtalan, igen keserű mérges anyag; 400 sr. hideg vízben oldódik, meleg vízben, valamint borszeszben könnyen. Strychnin készítmények helyett haszn. Angliában, Amerikában körzeli hűdéseknel, sphincterhűdéseknel, éjjeli ágybavizelésnél; ajánlatos heveny morphinmérgezésnél is (az atropinnál jobb). Adag bels. oldatban, pilulában v. bőr ala fecskendve 0,0005—0,001 pro dos. 2—3 × napj. 0,1 = 20 kr.

544 *Rp.* Picrotoxini 0,01.

Aquae dest. 20,0.

M. f. solut.

℞. 15—20 cseppet egyszerre.

Subcután 1 fecskendőben 0,0005 Picrotoxin.

22 kr.

†† **Pilocarpinum hydrochloricum** l. Jaborandi fol.

H. **Pilulae ferratae**

H. **Pilulae Ferri-jodati** } † Ferri praeparata.

H. **Pilulae laxantes** l. Aloe.

Piscidia erythrinae cortex. (Leguminosae.) Hatóanyaga a piscidin ($C_{29}H_{24}O_8$). Amerikában mint anodynum, sedativum, hypnoticum szerepel opium helyett. Fájdalma, köhögés, dysmenorrhoea, álmatlanság eseteiben. Adag a kéreg porából bels. 0,5—1,0 pro dos. 3—5 × napj. 1,0 = 2 kr. Czélszerű készítménye az

H. **Extractum Piscidiae fluidum.** Adag 0,3—0,5—2,0 pro dos. 3—5 × napj. 0,1 = 4 kr.

545 *Rp.* Extr. Piscidiae fluidi

10,0.

Syrup. cort. Aurant.

20,0.

℞℞. 1—3 × napj. 1 kk.

4 frt 25 kr.

546 *Rp.* Extr. Piscid. fluidi 10,0.

Aquae Menthae pip. 20,0.

Syrup. simpl. 30,0.

℞℞. 3—4 × napj. 1 evők.

Dysmenorrhoea.

4 frt 47 kr.

H. **Pix liquida.** Erdei bükkfából száraz átpárlás útján állítatik elő; ilyékony, nyúlós, víznél nehezebb, olajos, fekete-

barna, félig átlátszó, füstös kreosótszagú, undorító, keserű ízű. Küls. bőrgyógyászatban idült bőrbántalmaknál (eccema, psoriasis, prurigo, pityriasis, herpes tonsurans, favus, scabies). Tisztán v. inkább kenőcsök, linimentumok alakjában szőrccsettel beecsetelve. Bels. ritkán, helyette a kreosot czélszerűbb. 50,0 = 3 kr.

547 *Rf.* Picis liqu. 60,0.
Cretæ albæ 20,0.
Sapon. kalini
Spir. aa 120,0.
M. f. linim.
D^s. Ecsetelésre. (HEBRA.)
Scabies.
67 kr.

548 *Rf.* Picis liqu. 5,0—10,0.
Vaselinæ 15,0.
M. f. ungu.
D^s. Külsőleg.
549 *Rf.* Picis liqu. 20,0.
Aetheris 10,0.
D^{li}D^s. Külsőleg ecsetelésre.
19 kr.

[H. **Plumbum aceticum basicum solutum.** Ólomeczet. ($Pb_3C_8H_{14}O_{10}$). Szintelen, átlátszó, édes, később fanyar ízű folyadék; kémhatása lúgos. Causticum. Bels. nem. Küls. készítményei. 10,0 = 3 kr.

H. **Aqua plumbica.** (Plumb. acet. bas. sol. 1 r., Aquæ dest. 50 r.) Külsőleg borogatások alakjában hűtő, összehúzó, gyuladást, elválasztást csökkentő. 100,0 = 10 kr.

H. **Aqua vegeto-mineralis Goulardi s. Aqua Goulardi.** (Plumb. acet. bas. sol. 2 r., Spir. dil. 5 r., Aquæ font. 100 r.) Külsőleg haszn. mint az aqua plumbica. 100,0 = 6 kr.

[H. **Plumbum aceticum depuratum s. Saccharum Saturni** [$Pb(C_2H_3O_2)_2, 3H_2O$]. Szintelen, átlátszó jégcsekből áll; légen elmállik. Íze eleinte édes, később összehúzó, fémes; kémhatása gyengén savas. 1,75 sr. vízben, 8 sr. borszeszben oldódik. Küls. adstringens; szemcseppeknek 0,05 : 10,0, szemvíznek 0,05—0,1 : 100,0, húgycsőbe fecskendésre 0,1—0,3 : 100,0, hólyagmosásra 0,05—0,1 : 100,0. Bels. mint adstringens, stypticum hamatemesítés, melena, hæmoptæ, vesevérzések eseteiben; czélszerű phthisikusok izzadása, valamint azok csillapíthatatlan hasmenése ellen is. Adag porban, pilulában 0,01—0,03—0,1! pro dos. 3—4×napj. Dos. maxim. pro die 0,5! 10,0 = 4 kr.

H. **Unguenti Plumbi acetici.** Összehúzó, gyuladást csökkentő. 10,0 = 5 kr.

550 *Rf.* Plumb. acet. depur. 0,05.
Aquæ dest. 10,0.
D^{li}D^s. Szemcseppek.
Conjunct. catarrh.
21 kr.

551 *Rf.* Plumb. acet. depur. 0,2.
Aquæ Rosar. 100,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
D^{li}D^s. Húgycsőbe fecskendésre.
Gonorrhœa. 35 kr.

II. Potio Magnesiae citricae effervescens s. Limonada solvens. Enyhe laxans nők, gyermekek számára. Felnőttek egész üveggel, gyermeknek kor szerint $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ üveggel. Egy üveg = 60 kr.

II. Pulvis aërophorus Seidlitziensis. (Kék papirban kalium natrio tartaricum. 10,0 + natr. hydrocarb. 3,0, fehér papirban acid. tartar. 3,0.) Enyhe laxans. Dos. 1 = 8 kr. Dos. 12 = 90 kr.

II. Potio Riveri l. Kalium carbonicum.

H. Pulpa Prunorum. Izjavító. Electuariumok alapanyaga. Indifferens. 10,0 = 4 kr.

H. Pulpa Tamarindorum l. Tamarindus.

H. Pulvis aërophorus. Pezsgő por. (Kék papirban natr. hydrocarb. 2,0, fehér papirban acid. tartar. 1,5.) Hűtő, hányást csillapító. Dos. 1 = 3 kr. Dos. 12 = 35 kr.

†H. Pulvis Doveri l. Opium.

H. Pulvis gummosus l. Gummi arabicum.

H. Punica Granatum l. Granati punicae corl. rad.

Pyridinum (C_5H_5N). Átlati anyagok száraz átpárlási terménye. Tiszta, színtelen, illó, kellemetlen szagú folyadék, égető ízű. Vízzel, borszeszszel, aetherrel, zsírokkal keverhető. Antiasthmaticum. (Főleg asthma nervosum.) A légzési központ ingerlékenységét s a reflexingerlékenységet lefokozza. Alkalmazás: 4,0—5,0 pyridin tányérra öntendő s párái belégzendőek 3Xnapj. 15—30 perczen át. Szívbántalmaknál, elgyengült belegeknél ne alkalmazzuk. 1,0 = 10 kr.

†H. Pyrogallolum l. Acidum pyrogallicum.

Quassiae lignum. (Quassia amara. Simarubaceae.) Hatóanyaga quassin (keserű anyag). Amarum. Haszn. mint a rad. gentianae. Adag bels. decoct. v. maceratum 5,0—10,0; 150,0, melyből tokaji poharanként. Keserű theakeverékek alkatrészé.

Extractum Quassiae. Vizes kivonat. Adag porban, pilulában, oldatban 0,1—0,5 pro dos. 2—3Xnapj. 50,0 = 6 kr.

Quebracho cortex (Aspidosperma quebracho. Apocynaceae.) Quebracho blanco. Főhatóanyagai aspidospermin ($C_{12}H_{30}N_2O_2$) és quebrachin ($C_{21}H_{26}N_2O_2$) alcaloidok, melyek a légzőközpont ingerlékenységét csökkentik; ezenkívül csersav. Antidyspnoeicum. 10,0 = 4 kr. Haszn. készítménye az

Extractum Quebracho. (Penzoldt.) 10 gm. quebrachokéreg 100 gm. töm. borszeszszel 8 napig pállíttatik, a szűredék vízfürdön szárazra bepároltatik s 20 gm. vízben oldatik, leszűretik. Adag ezen kivonatból 1—2 kk. 2—4Xnapj.

H. Quercus cortex. (Quercus robur. Cupuliferae.) Hatóanyagai csersav és keseranyag (quercin). Adstringens. Adag bels. decoct. 1 : 10. Ritkán; helyette inkább tannint rendelünk. 100,0 = 8 kr. vagy 10,0 = 4 kr. (subt. pulv.).

Quillajae cortex. (Quillaja saponaria. Rosaceae.) A senegagyökér pótszere. Hatóanyagai mint a senegának u. i. quillaja-

sav és sapotoxin, melyekből azonban 5-ször több van benne, mint a senegában. Expectorans. Vigyázat (!), mert helybelileg erősen izgat; ellenjavallják alkalmazását gyomor-, bélbántalmak, garatfekélyek, valamint erős köhögési inger. Adag bels. decoct. 3,0—4,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. felnőtteknek, 1,0 : 100,0 nagyobb gyermeknek. Csecsemőnek s 1—3 évesnek nem. 10,0 = 2 kr.

556 *Rp.* Decoct. cort. Quillajæ e 3,0—4,0.

l. a. p. ad colat. 150,0.

Natrii hydrocarb. 3,0.

Syrup. cort. Aurant. 10,0.

℞℞℞. 2 ór. 1 evők.

41 kr.

II. **Ratanhæ radix.** (*Krameria triandra*. Polygalæ.) Hatóanyaga cseszav. Adstringens. Küls. helyette tannin haszn. Bels. adag decoct. 7,0—10,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. mint antidiarrhoeicum, gyakran opiumkészítményekkel összekötve. 100,0 = 38 kr. vagy 10,0 = 9 kr. (subt. pulv.).

II. **Extractum Ratanhæ depuratum.** Beszárított vizes kivonat. Adstringens. Küls. száj-, torokvíznek 2—5%-os oldatok, kenőcsnek 1 : 5. Bels. porban, oldatban 0,4—1,0 pro dos. 3—5×napj. 1,0 = 3 kr.

II. **Tinctura Ratanhæ.** Küls. mint adstringens ecsetelésekre; bels. 15—30 csepp pro dos. 10,0 = 5 kr.

557 *Rp.* Decoct. rad. Ratanhæ e 10,0.

l. a. p. ad colat. 150,0.

Tinct. Opii simpl. 0,5.

Syrup. Cinnamomi 10,0.

℞℞℞. 2 ór. 1 evők.

Diarrhœa.

41 kr.

559 *Rp.* Extr. Ratanhæ dep. 4,0.

Extr. Opii 0,05.

Elaeosacch. Menthæ 2,0.

M. f. pulv. div. in dos.

æqu. No. 10.

℞℞. 2 ór. 1 port.

Diarrhœa.

40 kr.

558 *Rp.* Infus. fol. Salviæ e 15,0.

l. a. p. ad colat. 300,0.

Extr. Ratanhæ dep. 6,0.

Spirit. aromath. 20,0.

℞℞℞. Száj-, torokvíz.

Adstringens. 67 kr.

560 *Rp.* Extr. Ratanhæ dep.

0,2—0,4.

Tinct. Opii simpl. gtt. 1.

Aquæ dest. 80,0.

Syrup cort. Aurant. 8,0.

℞℞℞. 1 kk.

Csecsemőnek bélhurut esetén.

30 kr.

561 *Rp.* Tinct. Ratanhæ

Tinct. Myrrhæ aa 20,0.

℞℞℞. Foghús ecsetelésére.

28 kr.

562 *Rf.* Tinct. Ratarhæ gtt. 10.

Tinct. Opii simpl.

gtt. 1—2.

Aquæ dest. 80,0.

Syrup. simpl. 8,0.

℞ 2 ór. 1 kk.

Csecsemőnek bélhurut esetén. 25 kr.

11. **Resina Jalapæ** l. *Jalapæ tubera*.

11. **Resina Pini burgundica**. Tisztított fenyőgyanta. Tapaszok készítéséhez szükséges a gyógyszerészeti technikában. 100,0 = 5 kr.

11. **Resorcinum** ($C_6H_6O_2$). Majdnem színtelen, vagy kissé sárgás, hasáb- vagy lemezalakú jégcecekből áll. Sajátságos gyenge szagú, s kellemetlen, karczó, édes ízű. Vízen, borszeszben, ætherben könnyen oldódik. Eleinte mint antipyreticum szerepelt, ma ezen használatát obsolet. Mint antisepticum jól használható az acid. carbol. pótszerül, mert az utóbbinál kevésbé mérges. Sebkezelésben 0,5—5%-os oldatai haszn. Pora lágy fekélyek edzésére jól haszn. Hólyagmosásra 3—6%-os oldatok. Bels. sarcina ventriculi vagy a gyomorban levő erjedési folyamatok ellen 0,5—1,0 pro dos. 3—4×napj. oldatban vagy caps. amyliceában. Dos. maxim. sing. 3,0! pro die 10,0! Resorcin-köl-szerek jól használhatók. 1,0 = 5 kr.

563 *Rf.* Resorcini

10,0.

Aquæ dest. 300,0.

M. f. solutio.

℞ Hólyagmosásra. Langyosan használandó.

80 kr.

564 *Rf.* Resorcini 5,0—10,0.

Div. in dos. æqu. No. 10.

Det. in caps. amylic.

℞ 3×napj. 1 capsulat.

76 kr.

11. **Rhei radix**. (Rheumfajok gyökere. Polygonæe.) Főalkatrészei chrysophan ($C_{32}H_{18}O_{16}$), chrysophansav ($C_{15}H_{10}O_4$), phaeoretin ($C_{16}H_{16}O_7$), emodin ($C_{15}H_{10}O_3$), rheumesersav ($C_{26}H_{26}O_{14}$ stb. Kis adagban (0,1—0,5 pro dos. napj. 3—5-ször) adstringens, tonicum, stomachicum, nagy adagban (1,0—2,0 pro dos.) laxans. Adagolás porban. 10,0 = 23 kr. (sciss.), 10,0 = 30 kr. (subl. pulv.).

11. **Extractum Rhei**. Beszáritott vízes kivonat. Haszn. mint a radix. Kis adag 0,1—0,2 pro dos. 3—5×napj., nagy adag 0,5—1,0 pro dos. porban, pilulában, oldatban. Gyakori alkatrésze hashajtó piluláknak aloeval, jalapával együtt. 1,0 = 9 kr.

11. **Tinctura Rhei Darelli s. vinosa**. Főleg mint tonicum, stomachicum. Adag 3×napj. 1 kk. 10,0 = 11 kr.

H. Infusum Rhei cum Natrio carbonico. Laxans. Adag. 1—2 evök. a székürülés beálltaig. 10,0 = 4 kr.

II. Syrupus Rhei Gyermekeknek kk., — gyk. hashajtó, különben mint izjavító haszn. hashajtó folyadékokhoz. 10,0 = 4 kr.

565 *Rp.* Pulv. Rhei
Extr. Rhei aa 5,0.
Mucil. Gummi arab. qu. s.
ul f. pil. No. 50.
Consp. pulv. Lycopod.
2*S.* Reggel, este 1—2—3 szemet.
Obstip. habit.
98 kr.

566 *Rp.* Pulv. Rhei 1,0.
Extr. Nucis vom. 0,1.
Natrii sulfur. 5,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
2*S.* 3—4×napj. 1 port.
Idült gyomor- v. bélhurul.
31 kr.

567 *Rp.* Pulv. Rhei 1,0.
Kalii hydrotart. 4,0.
Sacchar. alb. 10,0.
M. f. pulv. det. in scat.
2*S.* 4×napj. 1 késhegygyel.
Nagyobb gyermeknek icterus catarrhal. esetén.
27 kr.

568 *Rp.* Pulv. Rhei 0,5.
Natrii hydrocarb. 1,0.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
2*S.* 2 ór. 1 port.
3—8 éves gyermeknek icterus catarrh. esetén.
29 kr.

569 *Rp.* Extr. Rhei
Extr. Gentianæ
Extr. Ferri pomati aa 2,0.
M. f. pilul. No. 50.
Consp. pulv. Cinnamomi
2*S.* napj. 3×3—5 szemet.
Tonicum. 70 kr.

570 *Rp.* Tinct. Rhei Darelli 10,0.
Syrup. Rhei 30,0.
2*S.* 2 ór. 1 kk., — 1 gyk. míg hashajtás bekövetkezik.
1—2 éves gyermeknek hashajtó. 37 kr.

571 *Rp.* Infus. Rhei cum Natr. carb. 100,0.
Olei Menthæ pip. gtt. 2.
Syrup. Rhei 20,0.
2*S.* 2 ór. 2 evök. míg hashajtás beáll.
Enyhe laxans. 67 kr.

II. Ricini semina. (Ricinus communis. Euphorbiaceæ.) Haszn. az ol. ricini előállítására.

II. Roob Juniperi l. Juniperi fructus.

II. Roob Sambuci l. Sambuci fructus.

II. Rosæ petala. (Rosa centifolia. Rosaceæ.) Haszn. az aqua rosar., ol. rosarum és mel. rosatum előállításához. 10,0 = 5 kr.

II. Rosmarini folia. (Rosmarinus offic. Labiatæ.) Haszn. az ol. rosmarini előállítására. 10,0 = 1 kr.

II. Sabadillæ semina. (Schœnocaulon offic. Melanthaceæ.) Hatóanyaga veratrin. Bels. nem. Küls. phthiriasis ellen kenőcsalakban. 10,0 = 4 kr. (pulv.). Hiv. kenőcs az

H. Unguentum Sabadillæ s. Ungu. contra pediculos.

(50 : 200) 10,0 = 7 kr.

†H. **Sabinæ summitates.** (Sabina offic. Coniferae.) Hatóanyaga az oleum sabinæ. Küls. kenőcsalakban (1 : 1—5) izgató, bőrvörösítő. Bels. infus. 4,0 : 150,0 diureticum. Ritkán haszn. Dos. maxim. sing. 1,0! pro die 2,0! 10,0 = 2 kr. vagy 10,0 = 5 kr. (pulv.).

Saccharinum ($C_7H_5SO_3N$). Fehér, alaktalan, kevésbé keserű-mandula szagú, rendkívül édes por, hideg vízben nehezen, forróban könnyen oldódik, borszeszben, ætherben szintén. Nem látszer. Izjavító, mennyiben 280-szor oly édes, mint a sacchar. alb. A szervezetet változatlanul hagyja el. Diabetikusok étkeinek, italainak édesítésére alkalmas, ép úgy chinakészítmények ízének javítására is. 1,0 = 20 kr.

572 Rp. Saccharini 3,0.

Natr. carb. 2,0.

Manniti 60,0.

M. f. l. a. pastilli No. 100.

28. Egy pastilla egy csésze kávé, thea stb. édesítésére elegendő. Diabetes mellitus.

2 frt 20 kr.

H. **Saccharum album.** Izjavító, vivőanyag. 10,0 = 3 kr.

H. **Saccharum lactis.** Tejzúker. Haszn. mint a sacchar. alb. Különösen vízzívó porokhoz észszerű, mint vivőanyag. 10,0 = 5 kr.

H. **Sal thermarum Carolinarum** l. Natrium sulfuricum.

H. **Salep tubera.** (Különböző Orchis-fajok gumója.) Hatóanyagai növényi nyák, keményítő. Decoctum 0,5—1,0 : 100,0 bevonó, jó vehiculum csipős, keserű, savanyú anyagok számára. 10,0 = 9 kr. v. 10,0 = 11 kr. (subl. pulv.).

573 Rp. Decoct. tub. Salep e 1,0.

l. a. p. ad colat. 140,0.

Tinct. Opii simpl. 1,0.

Syrup. Ipecac. 10,0.

2828. 2 ór. 1 evők.

Diarrhœa.

38 kr.

574 Rp. Decoct. tub. Salep e 0,4.

l. a. p. ad colat. 80,0.

Aluminis 0,4.

Tinct. Valerian. gtt. 10.

Syrup. simpl. 8,0.

2828. ór. 1 kk.

Csecsemőnek heveny gyomor-, bélhurut esetén, ha collapsus jelentkezne.

34 kr.

Salolum ($C_{13}H_{10}O_3$). Salicylsavas phenylkether. Fehér, jegezes, vízben majdnem oldhatlan, csaknem íztelen, aromathicus szagú por. Borszeszben, ætherben, zsíros olajokban könnyen oldható. Gyomorból nem szívódik fel, a bélben salicylsavvá és

phenollá esik szét. Desinficiens hintőpor v. olajos oldat v. kenőcs alakjában v. borszeszes oldatban. Főleg mint a salicyl-savas natrium pótszere használtatik polyarthrititis rheumatica, rheumatismus musculorum acuta, neuralgiák eseteiben, azonkívül mint antipyreticum, nemkülönbén bélhurutoknál, midőn a bélben nagyfokú rohadási folyamatok állanak fenn. Kellemtelen mellékhatásai vannak, de csekélyebb mérvben, mint a natr. salicyl.-nak. Adag bels. porban 1,5—2,0 pro dos. 3—5×napj. felnőtteknek, 0,3—0,5 pro dos. 3—5×napj. gyermekeknek. 1,0 = 8 kr.

575 Rp. Saloli	5,0.	576 Rp. Saloli	3,0—4,0.
Amyli	50,0.	Ol. Sesami	40,0.
M. f. pulv. det. in scat.		M. f. linim.	
§. Hintőpor.	(SAHLI.)	25. Külsőleg.	(SAHLI.)
Fekélyekre, decubitusra.		Eccema. Pruritus.	
67 kr.		38 kr.	

577 Rp. Saloli	10,0.	578 Rp. Saloli	5,0.
Olei Menthae pip. gtl. 2.		Amyli	0,5.
M. f. pulv. div. in dos.		M. f. pulv. div. in dos.	
æqu. No. 10.		æqu. No. 10.	
Det. in chart. cerat.		Comprimantur.	
§. 1—2 ór. 1 port.	(SAHLI.)	25. 1—2 ór. 1—4 darabot.	
1 frt 12 kr.		1 frt.	(SAHLI.)

II. **Salviae folia.** (Salvia offic. Labiatae.) Hatóanyagai illó olaj és csersav. Gyenge adstringens. Leginkább száj- és torokvíznek infus. 1 : 10. 100,0 = 23 kr. v. 10,0 = 5 kr. (pulv.).

II. **Sambuci cymæ s. flores.** (Sambucus nigra. Caprifoliaceae.) Hatóanyaga illatos olaj. Diaphoreticum. Infus. 1 : 10. 100,0 = 14 kr.

II. **Sambuci fructus.** Belőle készül a

II. **Roob Sambuci.** Izjavító, electuariaumok alapanyaga. 10,0 = 5 kr.

Santali ligni oleum l. Oleum santali ligni.

II. **Santonium** l. Cinae flores.

Sapones officinales.

II. **Sapo albissimus droguistarum.** A sapo szegediniensis helyett. 100,0 = 15 kr. v. 10,0 = 4 kr. (pulv.).

II. **Sapo kalinus albus.** Kenőcsszerű, fehér v. kissé sárgás színű, szagtalan; meleg vízben és szeszben lúgos hatással oldódik. Bőrgyógyászatban mint bőrizgató, pörköket oldó, antiparasiticus hatású szer haszn. külsőleg bedőrszölések, mosások alakjában seborrhoea, psoriasis, eccema chron., pityriasis versicol.,

herpes tonsurans, favus, scabies eseteiben tisztán v. kenőcsökben. (L. ol. cadini és pix liquid.) Bels. nem: 10,0 = 7 kr.

H. Sapo kalinus venalis s. viridis. Szegénygyakorlatban. 100,0 = 12 kr.

H. Sapo medicinalis s. amygdalinus. Natronszappan, mely édes mandula olajjal készül. Küls. haszn. a bőr tisztán tartására. Bels. hashajtó pilulákhoz. 10,0 = 8 kr. v. 10,0 = 13 kr. (pulv.).

H. Sapo Picis. Natronszappan, mely pix liquida-t tartalmaz. Bőrgyógyászatban haszn. a bőr tisztogatására ott, hol a kátrány különben is javalva van. 10,0 = 8 kr.

H. Sapo sulfuratus. Natronszappan, mely kénalkalit tartalmaz. Bőrgyógyászatban haszn. a bőr tisztogatására ott, hol a kénalkali különben is javalva van. 10,0 = 10 kr.

H. Sapo venetus. Natronszappan, mely faolajjal készül. 100,0 = 15 kr. v. 10,0 = 4 kr. (pulv.).

H. Sarsaparillæ radix. (Különböző forróövi amerikai smilax-fajok gyökerei.) Hatóanyagai smilacin v. parillin és kevés ményítő. Csekély értékű diureticum, diaphoreticum. Régen nagyhirű antidyscraticum volt. Adag bels. decoct. 10,0—30,0 : 250,0 egy nap alatt elfogyasztani. 100,0 = 66 kr. 200,0 túl 100,0 = 60 kr.

II. Decoctum Zittmanni fortius et mitius l. D betű a.

579 *Ap.* Rad. Sarsaparillæ
Ligni Guajaci
Ligni Sassafras aa 25,0.
Aquæ font. 500,0.
Maceraper 24 horas, dein
coque usque ad reman.
250,0.

℞. Délelőtt 3-szorra elfogyasztani.

Decoct. Zittmanni helyett.
65 kr.

580 *Ap.* Rad. Sarsaparillæ 50,0.
Aquæ fontis 500,0.
Maceraper 24 horas, dein
coque usque ad reman.
300,0.

adde

Aquæ laxat. viennens.

Syrupi mammali aa 40,0.

℞. Egy nap alatt elfogyasztani.

Decoct. Zittmanni helyett.
1 frt 4 kr.

†**H. Scillæ bulbns.** (Scilla maritima. Asphodelea.) Hatóanyagai scillitoxin, scillipicrin, scillin; a két előbbi oly hatású mint a digitoxin; scillin a szívre nem hat, hanem hánytató hatású. Diureticum, némely egyéneknek (gyermekek) emeticum. Főleg készítményei haszn. 10,0 = 1 kr. v. 1,0 = 1 kr. (pulv.).

†**H. Scilla siccata.** (Összemetélt szárított tengeri hagymalevelek.) Bels. adag porban, pilulában, infusumban 0,02—0,2! pro dos. 3—5×napj. Dos. maxim. pro die 1,0! 1,0 = 1 kr. (pulv.).

†**H. Extractum Scillæ.** Dextrinnel beszárított borszeszes

kivonat. Bels. adag porban, pilulában 0,02—0,2! pro dos. 3—4×napj. Dos. maxim. pro die 0,8! 1,0 = 2 kr.

11. **Acetum Scillæ.** Adjuvans diureticus szerekhez. Bels. adag 20—30 csepp pro dos. 10,0 = 1 kr.

12. **Oxymel Scillæ.** Adjuvans diureticus v. hánytató szerekhez. Kis gyermekek 1—2 kk.-tól már hánynak. 10,0 = 4 kr.

581 *Rp.* Scillæ sicc. 3,0.
Folior. Digitalis 6,0.
Baccar. Junip. 30,0.
Kalii acet. sol. 20,0.
Spir. diluti 50,0.
Vini albi gener. 400,0.
Macer. per 12 dies el
colat. express. filtra.
28. Vinum diureticum. Ór.
v. 2 ór. 1 evök.
2 frt 14 kr.

584 *Rp.* Aceli Scillæ 50,0.
Kalii carbon. dep. qu. s.
ut f. l. a. saturatio
admisce
Spir. Aether. nitrosi 5,0.
Roob. Juniperi 50,0.
28. 2 ór. 1 kk.
79 kr.

582 *Rp.* Extr. Scillæ 1,0.
Roob. Juniperi 50,0.
M. f. electuarium.
28. 3×napj. 1 kk.
68 kr.

583 *Rp.* Extr. Scillæ 0,5.
Chinin. sulf. 1,0.
Ekeosacch. Junip. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
æqu. No. 10.
28. 2 ór. 1 port.
43 kr.

585 *Rp.* Oxymel Scillæ.
Kalii acet. sol. aa 50,0.
Aquæ dest. 100,0.
28. 2 ór. 1 evök.
71 kr.

13. **Sebum ovile.** Juhfaggyú. Kenőcsökhöz alapanyag. 100,0 = 15 kr.

14. **Secale cornutum.** (Claviceps purpurea. Pyrenomyces.)
Hatóanyagait az egyes szerzők más-más névvel s különböző
vegyképlettel jelölik. Egyik hatóanyaga az acidum sclerotinicum
(DRAGENBORFF), mely úgy látszik azonos a Kobert-féle ergotin-
savval; egy másik a sphacelinsav (Kobert), mely úgy látszik
főalkatrésze az ergotin név alatti készítményeknek; egy harmadik
a cornutin (Kobert), alkaloid. Bels. mint hæmostaticum,
méhösszehúzódasokat előmozdító szer haszn. Tapasztalatilag
némely idegbántalomnál is jól hat, különösen azoknál, melyek
edénymozgató zavarokon alapulnak. Dos. maxim. sing. 1,0!
pro die 3,0! Főleg készítményei haszn. 10,0 = 6 kr. v. 1,0 = 1 kr.
(pulv.).

15. **Extractum Secalis cornuti spissum pro solutione,**
s. Ergotina. Bels. adag 0,1—0,3 pro dos. szükség szerint
ór. v. 2 ór. oldatban per os v. subcután. 1,0 = 8 kr.

16. **Extractum Secalis cornuti siccum pro pulvere.**
Bels. adag porban, pilulában 0,1—0,25! pro dos. ór. v. 2 ór.
Dos. maxim. pro die 1,0! 1,0 = 6 kr.

586 *Rp.* Extr. Secalis cornuti
 spiss. 1,0.
 Aquæ dest.
 Glycerini aa 5,0,
 M. fillra.

2S. 10%-osergotin-oldat. Bőr
 alá fecskendésre. Egy fecskendőben 0,1 ergotin. 31 kr.

588 *Rp.* Extr. Secalis corn. sicci
 1,0.
 Pulv. folior. Digitalis 1,5.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.
 2S. 2 ór. 1 port.
 34 kr.

587 *Rp.* Extr. Secalis corn. spiss
 1,0.
 Aquæ Cinnamomi 100,0.
 Syrup. cort. Aurant.
 10,0.

2S. 2 ór. v. 2 ór. 1 kk. —
 evök. 52 kr.

589 *Rp.* Extr. Secalis corn. sicci
 0,5.
 Sacchar. alb. 3,0.
 M. f. pulv. div. in dos.
 æqu. No. 10.
 2S. 2 ór. 1 port.
 5 éven túli gyermeknek.
 Hæmaturia, hæmoptoë
 esetén. 29 kr.

II. Senegæ radix. (Polygala Senega Polygalæ.) Hatóanyagai, mint a quillajakéregnek. Expectorans. Bels. adag decoct. 10,0—15,0 : 150,0 2 ór. 1 evök. 10,0 = 7 kr.

590 *Rp.* Decoct. rad. Senegæ
 e 10,0.
 l. a. p. ad colat. 140,0.
 Natrii hydrocarb. 3,0.
 Tinct. Opii simpl. gtl. 10.
 Syrup. Senegæ 10,0.
 2S. 2 ór. 1 evök.
 Expectorans.
 50 kr.

591 *Rp.* Decoct. rad. Senegæ
 e 4,0.
 l. a. p. ad colat. 100,0.
 Liqueur. Ammon. anis.
 gtl. 10—15.
 Syrup. simpl. 10,0.
 2S. 2 ór. 1 gyk.
 Gyermeknek köptető.
 37 kr.

II. Sennæ folia. (Cassia acutifolia et angustifolia. Caesalpineæ.) Hatóanyaga a catharlinsav. Kis adagban laxans, nagy adagban drasticum. Bels. infus. 5,0—15,0 : 150,0 ór. 1 evök., míg széürülés jelentkezik (enyhén hat), v. felét, esetleg az egészét egyszerre elfogyasztani (drasticusan hat). 100,0 = 52 kr. v. 10,0 = 9 kr. (pulv.).

II. Species laxantes St. Germain. Hashajtó theaelegy. Házilag infusum (thea) készítendő. 1—2 kk., esetleg 1 evöknyi veendő 1 csésze vízre. A forrázat édesítendő s 1—2-szerre elfogyasztandó. 10,0 = 10 kr.

II. Infusum laxativum s. Aqua laxat. viennensis, s. Infus. Sennæ comp. Hashajtó. Felnőttnek 2 evökannálal, gyermeknek 1—2 kk. 10,0 = 4 kr.

II. Syrupus mannatus s. Syrupus Sennæ cum Manna
 l. Syrupi omnes.

II. Electnarium lenitivum. Laxans gyermekeknek, nőknek. Adag gyerm. kávéskanalanként, felnőttnek evőkanalanként. 10,0 = 7 kr.

II. Hydromel infantum. (Infus. laxat. 3 r. + Syrup. mannat. 1 r.) Hashajtó gyermekeknek. Adag ór. 1 kk. 10,0 = 5 kr.

592 *Rp.* Infus. fol. Sennæ e 10,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Natrii sulfur. 15,0.
Syrup. mannat. 10,0.
Olei Menthae pip. gtt. 2.
℞℥S. 2 óra alatt elfogyasz-
tani. Erősebb laxans.
49 kr.

594 *Rp.* Elect. lenitivi 20,0.
Syrup. Rubi Idæi 10,0.
℞℥S. 1–2 kk. ór. míg a ha-
tás beáll.
3–6 éves gyermeknek has-
hajtó. 36 kr.

597 *Rp.* Hydromel. infant. 40,0.
℥S. 2 ór. 1 gyk. míg a hatás
beáll.
2–3 éves gyerm. hashajtó.
30 kr.

593 *Rp.* Aquæ laxat. vienn. 40,0.
Aquæ Amygdal. amar. 1,0.
Syrup. mannat. 10,0.
℞℥S. 1 óra alatt elfogyasz-
tani. Gyengébb laxans.
37 kr.

595 *Rp.* Aquæ laxat. vienn. 60,0.
Syrup. Rubi Idæi 20,0.
℞℥S. ór. 1 gyk. míg a hatás
beáll.
6–10 év. gyerm. hashajtó.
45 kr.

596 *Rp.* Syrup. mannat. 20,0.
Salis Seignetti 10,0.
Aquæ dest. 100,0.
℞℥S. ór. 1 gyk. míg a hatás
beáll.
3–5 éves gyerm. hashajtó.
38 kr.

II. Serum lactis commune. Tejsavó. Igen csekély értékű lápszer. Főlösleges.

II. Sinapis semina. (Sinapis nigra. Cruciferae.) Ha összezúzva és vízzel elegyítve langyos helyen áll, ol. sinapis æther. képződik benne. Készítményei használatnak.

II. Farina seminum Sinapis. (Hevenyében összetört magvak.) Mustárliszt. Langyos vízzel péppé alakítva cataplasmák alakjában bőrvörösítő. Bels. 0,5–1,0 pro dos. porban stomachicum, 5,0–10,0 pro dos. emeticum. 100,0 = 19 kr., 200,0-tól 100,0 = 16 kr.

II. Charta sinapisata. Mustárliszt-pép helyett. Meleg vízbe mártva s nedvesen a bőrre kötve bőrvörösítő. 1 db = 9 kr.

II. Oleum Sinapis æthereum. Szintelen vagy sárgás, közömbös kémhatású, átható, csipős szagú és égető ízű illó olaj. 150 r. vízben, 10 r. hig borszeszben, tömény borszeszben minden arányban oldható. Erős izgató, lobokozó. Önállóan nem használatik, csak borszeszes oldatban. 1 csepp = 1 kr.

II. Spiritus Sinapis (1 : 50). Küls. bedörzsölések alakjában, vagy itatópapírra cseppentve s a papír a bőrre helyezve, bőrizgató és vöröslő. 10,0 = 6 kr.

++**H. Solutio arsenicalis Fowleri** l. acidum arsenicosum.

H. Solutio Calcii oxysulfurati l. miscella calcii oxysulfur.

Sparteinum sulfurium ($C_{15}H_{26}N_2 \cdot H_2SO_4 + 8H_2O$).

A spartium scoparium hatóanyagának kénsavas sója. Szintelen, áttetsző, rhomboedricus jegeczek, vagy szintelen por; vízben jól oldódik. Hasonlóan hat, mint a digitalis, csak hogy nem oly megbízható; csekély narcoticus hatása is van. Haszn. a digitalis pótszeréül. Bels. adag pilulában, cseppekben 0,01–0,05 pro dos. 3–5Xnapj. 0,01 = 4 kr.

598 *Sp.* Sparteini sulfur. 0,2.

Aquæ Amygdal. amar.

10,0.

2–3 ór. 15–20 csepp.
pet. 1 frt 8 kr.

599 *Sp.* Sparteini sulfur. 0,5.

Pulv. et extr. Liquir.

aa qu. s.

ut f. pilul. No. 30.

Consp. pulv. Liquirit.

2–3 ór. 1–2 pilulát.

2 frt 41 kr.

H. Species Althææ l. Althææ rad.

H. Species amaricantes. Keserű theaelegy. Stomachicum.

Infus. vagy maceratum készítendő vízzel vagy borral hűzlag.

Adag: 1 csészére 1 evőkanállal. 100,0 = 40 kr.

H. Species laxantes St. Germain l. Sennæ folia.

II. Spiritus s. Spiritus vini. Tömény borszesz. Aethylal-

cohol (C_2H_6O). 90–91 térfogat — % aethylalcoholt tartalmaz.

100,0 = 12 kr. 200,0-tól 100,0 = 10 kr.

II. Spiritus dilutus. Hígított szesz. 70 térfogat — % aethyl-

alcoholt tartalmaz. 100,0 = 10 kr. 200,0-tól 100,0 = 8 kr.

H. Spiritus Aetheris. (Aether dep. 100 r. + Spiritus 300 r.)

Hoffmann-cseppek. Szaglószer ájulásnál stb. Bels. excitans aether

helyett 10–20–40 csepp pro dos. cukorra cseppentve, vagy

cukros vízben. 100,0 = 25 kr.

Spiritus Aetheris chlorati. Keveréke alcoholnak, aethylchlor-

ürnek, chloratnak és acetylchlorürnek. Haszn. mint a spir. æthe-

ris, ezenkívül mint gyenge diureticum. 10,0 = 6 kr.

Spiritus Aetheris nitrosi. Tartalmaz aethylalcohol mellett

aethylnitritet, aldehydet és eczetaethert. Bels. excitans, diure-

ticum, diaphoreticum. Adaga bels. 10–20–30 csepp pro dos.

szükség szerint. 10,0 = 7 kr.

H. Spiritus aromathicus. Küls. bedörzsölések alakjában

mint bőrizgató. 100,0 = 31 kr.

H. Spiritus camphoratus l. Camphora.

H. Spiritus Ferri sesquichlorati ætherous l. Ferri præ-

parata.

H. Spiritus salis ammoniaci anisatus. l. Ammonii anisati liquor.

II. Spiritus saponatus. (Sapo venetus borszeszes oldala.) Küls. bőrre dörzsölve izgató. Bőrgyógyászatban seborrhoea, idült eczema és psoriasisnál mosogatások alakjában haszn. 100,0 = 24 kr., 200,0-től 100,0 = 20 kr.

II. Spiritus saponis kalini. (Sapo kalinus borszeszes oldata.) Haszn. mint a spir. saponatus, de annál erősebb hatású. 100,0 = 48 kr. 200,0-től 100,0 = 40 kr.

II. Spiritus Sinapis l. Sinapis semina.

II. Spongia pressa. Ha vizet szív fel, megduzzad. Használatik a méh-nyakesatorna, sipolymenetek stb. tágitására. 10,0 = 81 kr.

III. Stibium sulfuratum aurantiacum s. Sulfur aurantum Antimonii (Sb_2S_5). Igen finom, narancsvörös színű, szagtalan és íztelen por. Vízben nem oldódik. Expectorans. Bels. adag porban, pilulában 0,03–0,05–0,1 pro dos. 3–5× napj. felnőttek. 1,0 = 1 kr.

600 <i>℞p.</i> Stibii sulfur. aurant. 0,5.	601 <i>℞p.</i> Stibii sulfur. aurant.
Acidi benzoici 1,5.	Extr. Hyosciami
Sacchar. albi 3,0.	aa 0,05–0,1.
M. f. pulv. div. in dos. 10	Sacchar. alb. 3,0.
aq. No. 10.	M. f. pulv. div. in dos.
28. 2–3 ór. 1 port.	aq. No. 10.
41 kr.	28. 3 ór. 1 port.

2–6 éves gyermeknek idült hörghurut esetén. 29 kr.

602 <i>℞p.</i> Stibii sulfur. aurant.	0,5.
Pulv. Doveri	1,0.
Sacchar. alb.	3,0.
M. f. pulv. div. in dos. aequ. No. 10.	
28. 2 ór. 1 port.	29 kr.

III. Stibium sulfuratum nigrum (Sb_2S_3). Súlyos, szürkés-fekete, fémsfényű, jegeczes darabok. A stib. sulf. rubr. készítéséhez használtatik. 100,0 = 15 kr., v. 10,0 = 3 kr. (subt. pulv.).

III. Stibium sulfuratum rubrum s. Kermes minerale ($Sb_2S_3 + Sb_2O_3$). Finom, könnyű, vörösbarna színű, szagtalan és íz nélküli por. Expectorans. nagyobb adagban emeticum. Ritkán használtatik. Bels. adag 0,01–0,05 pro dos. porban 3–5× napj. 1,0 = 14 kr.

Strophanti hispidi semina. (Apocynae.) Hatóanyaga strophantin (glycosida). Digitalis pótszere. Szívre úgy hat, mint a digitalis, csak hogy gyorsabban s tartósabban; edényszetre nincs hatással. (FRASER.) Állítólag nem cumulatív hatású. Mint diu-

reticum nemcsak szívbántalmaknál, hanem némelyek szerint vesebántalmaknál is beválik. Gyomor-belekre nincs kellemetlen hatással. Magvakból tincturák készülnek és ezek használatnak; a hatóanyag rendelve nem czélszerű, mert a különböző forrásból származó készítmények különböző tisztaságúak és erejűek.

Tinctura sem. Strophanti (1 : 20). Adag bels. 4—5—10 csepp pro dos. 2—4×napj. Igen keserű léven, ízjavítóról gondoskodni kell. Subcután nem alkalmazható, mert erős fájdalmat okoz. 1,0 = 6 kr.

603 *Ap.* Tinct. Strophanti hisp. 1,0.
Aqua dest. 80,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.
℞℥℥. 3 ór. 1 evök.
30 kr.

604 *Ap.* Tinct. Strophanti hisp. 5,0.
Aqua Amygdalar. amar. 15,0.
℞℥℥. 3×napj. 10—20 csepp.
56 kr.

605 *Ap.* Infus. folior. Digit. e 1,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Strophanti hisp. 3,0.
Kalii acet. sol. 10,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.
℞℥℥. 3 ór. 1 evök.
Erős diureticum, cardiacum.
63 kr.

††H. **Strychninum nitricum** l. Nux vomica.

H. **Styrax liquidus**. Liquidambar orientale (Balsamifera) balzsama. Mézszerű. kevésbé nyúlós, szürkés, v. szürkésbarna anyag; sajátos erős illatos szagú és fűszeres, csipős, alig keserű ízű. Küls. haszn. a bőrgyógyászatban állati paraziták (phthiriasis és scabies) ellen úgy, mint a bals. peruvianum. Scabiesnél előkészítő eljárás (zöldszappan, fürdő) szükséges. 10,0 = 10 kr. Czélszerű a

H. **Linimentum Styracis** (Syrax 3 r. + Ol. sesami 1 r.), melyből egyszeri bedörzsölésre 30,0—50,0 szükséges. 10,0 = 12 kr.

H. **Succus Liquiritiae depuratus** }
H. **Succus Liquiritiae venalis** } l. Liquiritiae radix.

Sulfonal [(CH₃)₂C · (C₂H₅SO₂)₂]. Színtelen, szagtalan, íztelen, jegezes lapocskák v. táblácskák. Oldódik 120 r. hideg és 18—20 r. forró vízben, borszeszben könnyen. Sedativum, hypnoticum s mint ilyen a chloralhydrat pótszere. Anodyn hatása nincs, szívre, edényekre (?) nem hat, s így szívbántalmak esetén is használható. Kellemetlen mellékhatások eddig nem irattak le. Adag bels. porban 1,0—2,0—3,0 pro dos. 1—2× este lefekvés előtt. 1,0 = 50 kr.

- 606 *℞p.* Sulfonali 10,0.
f. pulv. Div. in dos. No. 10.
℞S. Este lefekvés előtt 1—2 port.
5 frt 25 kr.

II. Sulfur præcipitatum s. Lac sulfuris. Alaktalan, sárgásfehér por. Küls. bőrgyógyászatban növényi és állati parasiták ellen kenőcs úgy rendelve, hogy a kenőcsben kénalkali képződjék (szappannal, szénsavas kalium v. natriummal). Diphtheritisnél, croupnál pora befúvatik a torokba, gégébe. Bels. laxans. Adag porban, pilulában, electuariumban 0,5—1,0—3,0 pro dos. 10,0 = 7 kr.

- 607 *℞p.* Sulfur. præcip. 5,0.
Kalii carb. 10,0.
Glycerini M. f. pulv. div. in dos.
Spiritus æqu. No. 10.
Aetheris aa 5,0. ℞S. 1—2 port. napj.
M. f. linim. Laxans. Obstip. habit.
39 kr.
℞S. Comedók, aene disseminata ellen. Este a beteg helyek beecsetelendők. lemosás csak reggel. (HEBRA.) 37 kr.
- 608 *℞p.* Sulfur. præcip. 10,0.
Magnes. ustæ 30,0.
M. f. electuar.
℞S. Napj. 1—3 kk.
Laxans. 35 kr.
- 609 *℞p.* Sulfur. præcip. 10,0.
Melis rosati 30,0.
M. f. electuar.
℞S. Napj. 1—3 kk.
Laxans. 35 kr.

II. Sulfur sublimatum. Belőle állítatik elő a

H. Sulfur sublimatum lotum s. Sulfur. depur. s. Flores Sulfuris. Világossárga, finom por. Haszn. küls. és bels. mint a sulf. præcip. Adag bels. mint laxans 3,0—5,0—8,0 pro dos. 10,0 = 3 kr.

H. Unguentum sulfuratum s. Unguentum ad scabiem. Tartalmaz pix liquidát, sapo kalinus venalist és creta albat. Haszn. főleg scabiesnél, de használható herpes tonsurans, favus, pityriasis versicolor ellen is. 10,0 = 5 kr.

- 610 *℞p.* Sulfur. subl. loti 20,0.
Kalii carbon. depur. 10,0.
Axung. porci 80,0.
M. f. unguent.
℞S. Zöld szappannal bedörzsölés és fürdő után a beteg helyek 1/2 órán át dörzsölendők a kenőccsel. Ezután fürdőben lemosandó a kenőcs.
Scabies. 55 kr.
- 611 *℞p.* Sulfur. sublim. loti
Picis liquidæ aa 15,0.
Cretæ alb. 10,0.
Sapon. kalin. venal. 30,0.
Spirit. dilut. 60,0.
℞S. Bedörzsölésre scabies esetén; 3-szorra elhasználni 12 órai időközben. Utána fürdő.
Hebra-féle rühtinctura módosítva. 46 kr.

Syrupi officinales.

- H. **Syrupus Althææ.** Illatos izjavító. 10,0 = 3 kr.
H. **Syrupus amygdalinus.** Fejelet képez. Izjavító fejetekhez. 10,0 = 5 kr.
H. **Syrupus corticorum Aurantiorum.** Illatos izjavító, különösen jó kellemetlen szagú folyadékokhoz. 10,0 = 3 kr.
H. **Syrupus capillorum Veneris.** Igen kellemes illatú izjavító. 10,0 = 4 kr.
H. **Syrupus Cinnamomi.** Illatos izjavító. 10,0 = 5 kr.
H. **Syrupus Citri.** Savanykás limonade-ízű. 10,0 = 6 kr.
†H. **Syrupus diacodii.** Kevés morphint tartalmaz. Izjavító opiatokat tartalmazó folyadékokhoz l. Opiúm. 10,0 = 3 kr.
H. **Syrupus Ferri-jodati** l. Ferri preparata.
†H. **Syrupus Ipecacuanhæ.** Izjavító köptetőkhez. 10,0 = 5 kr.
H. **Syrupus Liquiritiæ.** Izjavító köptetőkhez, különösen ammon. chlorat. oldatához. 10,0 = 2 kr.
H. **Syrupus mannatus.** Izjavító hashajtó folyadékokhoz. Gyermekeknek kk. v. gyk. hashajtó. 10,0 = 4 kr.
H. **Syrupus Mororum.** Szép piros színű iz- és színjavító. Különösen a savakat tartalmazó folyadékokhoz szokásos. 10,0 = 3 kr.
H. **Syrupus Rhei.** Izjavító hashajtó folyadékokhoz. 10,0 = 4 kr.
H. **Syrupus Rubi Idæi.** Piros színű iz- és színjavító; különösen savakat tartalmazó folyadékokhoz szokásos. 10,0 = 3 kr.
H. **Syrupus Senegæ.** Izjavító köptetőkhez. 10,0 = 5 kr.
H. **Syrupus simplex.** Közönbös izjavító. Különösen a szegény gyakorlatban rendelendő. 10,0 = 3 kr.

H. **Tamarindorum pulpa.** (Tamarindus indicus. Casalpinea.) Barnás-fekete, kissé szívós lágy tömeg. Kellemes savanyu, kevésbé összehúzó ízű. Gyenge hashajtó nagyobb adagban (10,0—30,0) v. decoctum alakjában (30,0:300 0). Különben mint electuarium alapanyag haszn. 100,0 = 13 kr.

612 *Rp.* Decoct. pulp. Tamarindor e 10,0.

l. a. p. ad colat. 100,0.

Colat. fervid. adde

Kalii hydrotartar. 2,0.

Syrup. simpl. 10,0.

MDS. 2 ór. 1 gyk.

4—8 éves gyermek. hashajtó icterus catarrh. esetén. 42 kr.

H. **Tanninum** l. acid. tannicum.

H. **Taraxaci radix et folia.** (Leontodon taraxacum. Composite.) Hatóanyaga taraxacin (keserű anyag). Amarum. 100,0 = 11 kr. Használtatik az

II. Extractum Taraxaci. Folyékony vizes kivonat. Főleg mint pilulaconstituens haszn. hashajtó pilulákhoz. 10,0 = 12 kr.

H. Tela sericea protegens l. acid. carbolieum.

H. Terebinthina communis. Pinus silvestris és más pinus és picea-fajok balzsama. Halványsárga v. sárgásfehér, zavaros, át nem látszó, nyúlós, mézsűrűségű, kevésbé szemecses, ragadós, fenyűszagú, keserű ízű balzsam. Borszeszben, ætherben, illó és zsíros olajokban oldódik. Küls. főleg a népgyógyászatban mint derivans haszn., különben tapasztok készítéséhez a gyógyszerészeti technikában. 100,0 = 7 kr.

II. Terebinthina veneta. Pinus larix balzsama. Az előbbinél több ol. terebinthinæ-t tartalmaz és ezért drágább. 10,0 = 3 kr.

Terpinum hydratum ($C_{10}H_{16} \cdot 2H_2O + H_2O$). Szintelen, rhombicus, fénylő, kissé szagos, aromaticus ízű jegeczek. Hideg vízben alig, forróban 150 r.-ben oldódik, borszeszben jól oldódik. Az ol. terebinthinæ pótszere. Kis adagban expectorans, a váladékot elfolyósítja. Nagy adagban edényösszehúzó, miéért is a légutak váladékát csökkenti. Hemostaticum, ezért hæmoptoesetén indicált. Diureticum. Jól hat cystitis és gonorrhœa esetében is. Adag bels. pilulában, v. vizes, borszeszes oldatban mint expectorans, diureticum 0,1—0,2 pro dos.; mint hæmostaticum és váladék csökkentő 0,2—0,5 pro dos. 2—3×napj. 0,1 = 2 kr.

613 *Rp.* Terpinini hydrati 2,0.
Spiritus
Aque dest.
Syrup. cort. Aurant.
aa 50,0.
℞℞ 3 ór. 1 evők.
Expectorans.
87 kr.

614 *Rp.* Terpini hydrati 3,0.
Sacchar. alb.
Mucil. Gummi arab. aa
qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Lycopod.
℞ 3×napj. 1—2 szemet.
99 kr.

Terpinol [$(C_{10}H_{16})_2H_2O$]. Terpinhydrathból állítatik elő. Szintelen, könnyen mozgó, erősen fénytörő, jácint szagú folyadék, mely vízben oldhatlan, borszeszben, ætherben jól oldható. Expectorans. Adag bels. capsulában v. pilulában 0,1—0,15 pro dos. 2—3 ór. 1,0 = 12 kr.

615 *Rp.* Terpinoli 1,0.
Ol. Sesami 3,0.
M. f. solutio
Det. in caps. gelatin. No. 10.
℞ 0,1 gmos terpinolcapsulák. 2—3 ór. 1 darabot.
Expectorans. 92 kr.

Thallinum sulfuricum $[(C_{10}H_{13}NO)_2H_2SO_4]$. Fehér, jegeszes por, kellemes szagú, keserű, sós, aromaticus ízű. 5 r. hideg vízben oldódik, borszeszben nehezen. Küls. mint antisepticum, antizymoticum gonorrhœa ellen befecskendések alakjában 1—2%-os oldatok. Bels. antipyreticum különösen typhus abdomin. eseteiben. Gyakran sokáig tartó izzadás jelentkezik használatára. Szívre erősen deprimáló hatású, ezért szívgyengeség esetében ellenjavallt. Adag bels. oldatban, porban 0,25—0,5 pro dos. ór. v. 2 ór. szükség szerint. 0,1 = 3 kr.

Thallinum tartaricum $(C_{10}H_{13}NO : C_4H_6O_6)$. Sárgásfehér, kellemes szagú, keserű, aromaticus ízű por. Vízben, borszeszben nehezen oldódik. Hatása, haszn. bels. mint a thall. sulf. Küls. rossz oldékonysága miatt nem haszn. Gyengébb hatású mint a thall. sulf. ezért némileg nagyobb adagok rendelendők. 0,1 = 3 kr.

616 Rp. Thallini sulfur.	4,0.	617 Rp. Thallini sulfur.	2,0.
Aquæ dest.	200,0.	Sacchar. alb.	3,0.
MDS. Húgycsőbe fecskendésre.		M. f. pulv. div. in dos. æqu. No. 10.	
Gonorrhœa.		Del. in caps. amylac.	
1 frt 48 kr.		S. 0,2 gmos thallin-capsulák.	
		1 frt 12 kr.	

H. Thymolum $(C_{10}H_{14}O)$. Táblaalakú, szintelen, kakukfű-olaj szagú, fűszeres, csipős ízű jegeszek. Vízben alig, borszeszben, ætherben, zsíros olajokban, glycerinben könnyen oldható. Antisepticum. Sebkezelésben 1 : 1000 oldatban haszn. Bronchitis putrida, bronchiectasia, gangræna pulm., phthisis eseteiben belégzésre 0,5—1,0 : 1000. Bels. ritkán. Kereskedésben thymolos kötszerek forgalomban vannak. 1,0 = 9 kr.

618 Rp. Thymoli	1,0.	619 Rp. Thymoli	0,2.
Glycerini	20,0.	Spiritus qu. s. ad solut.	
Spiritus	10,0.	Aquæ dest. ferv. 200,0.	
Aquæ dest.	1000,0.	MDS. Belégzésre. (LEYDEN.)	
M. f. solutio.		40 kr.	
D.S. 1 ⁰⁰⁰ thymololdat.			
Külsőleg. (RANKE.)			
81 kr.			

H. Tiliæ flores. (Tilia grandifolia et parvifolia. Tiliaceæ.) Hatóanyaga illó olaj. Diaphoreticum. Házilag készíthető belőle infusum. Egy csésze theára 1—2 evőkanál veendő; melegen fogyasztandó el. 100,0 = 16 kr.

H. Tinctura amara. Amarum. Stomachicum. Adag bels. 20—30 csepp. 10,0 = 4 kr.

H. Tincturæ omnes l. a megfelelő drogok címei alatt.

- H. Tragacantha.** Különböző astragalus fajok mézgája. Gyógyszerészeti technikában fontos szer. Haszn. mint a gummi arabicum. 10,0 = 14 kr.
- H. Trifolii fibrini folia.** (Menyanthes trifoliata. Gentianace.) Hatóanyaga menyanthin (keserű anyag). Amarum. Keserű tea-keverékek alkotórésze. 100,0 = 12 kr.
- Extractum Trifolii fibrini.** Haszn. mint az extr. taraxaci. 10,0 = 14 kr.
- H. Tubuli præparati carbolati** l. acid. carbolicum.

Unguenta.

- H. Unguentum aromaticum.** Illatos kenőcs-alapanyag. Tiszán a bőrre dörzsölve gyengén izgató, elvonó. 10,0 = 6 kr.
- H. Unguentum Antenriethi** l. Kalium stibio-tartaricum.
- H. Unguentum Cerussæ** l. Plumbum carbonicum.
- H. Unguentum diachylon Dr. Hebra** l. Plumbum oxydatum.
- H. Unguentum emolliens s. Crème céleste.** Közönbös kenőcs-alapanyag. A gazdag gyakorl. haszn. 10,0 = 10 kr.
- H. Unguentum Glycerini.** (Tragacantha 1 r. + Spiritus 5 r. + Glycerini 49 r.) Bevonó, védő kenőcs. Közönbös kenőcs-alapanyag. Kül. nyáron használandó, midőn zsíros kenőcsök könnyen avasodnak. 10,0 = 8 kr.
- H. Unguentum Hydrargyri** l. Hydrargyrum.
- H. Unguentum jodatum** l. Jodum.
- H. Unguentum Kalii jodati** l. Kalium jodatum.
- H. Unguentum Plumbi acetici** l. Plumbum aceticum.
- H. Unguentum Plumbi tannici s. Ungu. contra decubitus.** (Acid. tannicum 1 r. + Plumb. acet. bas. 2 r. + Vaseline 17 r.) Decubitusokra mint összehúzó kenőcs. 10,0 = 12 kr.
- H. Unguentum rosatum.** Illatos kenőcs-alapanyag. A gazdag gyakorlatban. 10,0 = 8 kr.
- H. Unguentum Sabadillæ** l. Sabadilla semina.
- H. Unguentum simplex.** Közönbös kenőcs-alapanyag. 10,0 = 5 kr.
- H. Unguentum sulfuratum** l. Sulfur. sublim. lot.
- H. Unguentum Zinci oxydati** l. Zincum oxyd.

Urethanum ($C_3H_7NO_2$). Színtelen, oszlopos, hűtő ízű jegczek; vízben, borszeszben, ætherben jól oldódik. Sedativum, hypnoticum. Chloralhydrat pótszere. Kevésbé biztos hatása, mint a paraldehyd. Szívre nem hat. Nem anodyn hatású, ezért oly álmatlanságnál, mely fájdalmak, köhögés miatt áll fenn, nem használható. Adag bels. oldatban 2,0–4,0 pro dos. felnőtteknek, 0,1–0,3 gyermeknek. 1,0 = 20 kr.

- 620 *Rp.* Urethani 6,0. 621 *Rp.* Urethani 0,5.
 Aquæ dest. Aquæ Menthae pip.
 Syrupi capill. Veneris Syrup. corl. Aurant.
 aa 30,0. aa 25,0.
MDS. este lefekvéskor 2 *MDS.* 1—2 kk. egyszerre.
 evők., ha álmom nem jelent- 1 kk.-ban körülbelöl 0,1 gm.
 keznék, még egy kanállal. urethan.
 1 frt 54 kr. Gyermekeknek. 43 kr.

Uvae ursi folia. (*Arbutus uva ursi*, Ericaceae.) Hatóanyagai arbutin és csersav. Adstringens. Mintán az arbutin a szervezetben hydrochinonra és cukorra hasad, s a hydrochinon részint tisztán, részint kénsavval párosulva ürül ki a vizelettel, *pyelitis*, *cystitis* bizonyos eseteiben a medveszőlő-levél mint antizymolicum jól használható; ehhez járul még a csersav jelenlétéhez kötött adstringens hatás is. Adag bels. decoct. 10,0—15,0 : 150,0 ór. 1 evők. 50,0 = 5 kr.

Arbutinum ($C_{12}H_{16}O_7 + H_2O$). Selyemfényű, túalakú jég-
 czek, hideg vízben nehezen, forróban könnyebben oldhatók.
 Haszn. mint a fol. uva ursi. Adag bels. porban, pilulában
 0,5—1,0 pro dos. 3—5×napj. 1,0 = 90 kr.

- 622 *Rp.* Decoct. folior. Uvae ursi 5,0.
 e 15,0. Div. in dos. aqna. No. 10.
 1. a p. ad colat. 150,0. *MDS.* 3 ór. 1 port.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 10. 3 frt 75 kr.
 Syrup. capill. Veneris 10,0.
MDS. 2 ór. 1 evők. 38 kr.

H. Valerianæ radix. (*Valeriana officin.* Valerianaeae.) Ható-
 anyaga illó olaj és valerianasav. Excitans, antispasmodicum (hys-
 teria, epilepsia stb.) Adag: klysmának infus. 8,0—10,0 : 100,0.
 Bels. infus. 10,0—15,0 : 150,0 2 ór. 1 evők. más excitans vagy
 antispasmodicus szerekekkel összekötve. 100,0 = 18 kr.

H. Tinctura Valerianæ ætherea. (Rad. valer. 10 : spir.
 æther. 50 r.) Adag bels. 15—30 csepp pro dos. 3—5×napj.
 10,0 = 11 kr.

H. Tinctura Valerianæ spirituosa. Adag bels. 15—40
 csepp pro dos. 3—5×napj. 10,0 = 6 kr.

- 624 *Rp.* Infus rad. Valerianæ e 10,0.
 1. a p. ad colat. 100,0.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 5.
MDS. Csórének.
 Antispasmodicum.
 32 kr.
- 626 *Rp.* Tinct. Valerian. æth.
 Tinct. Castorei aa 15,0.
MDS. Ór. v. 2 ór. 20—30
 cseppet.
 Excitans.
 1 frt 36 kr.

625 *Rp.* Infus. rad. Valerian.
e 15,0.
l. a. p. ad colat. 150,0.
Tinct. Castorei 1,5.
Syrup. cort. Aurant. 10,0.
- *MDS.* 2 ór. 1 evök.
Antispasmodicum (hyste-
ria). 48 kr.

627 *Rp.* Rad. Valerianæ
Fol. Aurantior.
Fol. Menthæ pip.
Fol. Trifolii fibr. aa 20,0.
Conc. cont. m. f. species.
DS. 1 evök. 3 csésze vízre.
Heim-féle thea hysteriások-
nak. 24 kr.

H. **Vaselina.** Sárgás, áttetsző, kissé fluorescáló, lágy, szagta-
lan, közönbös kémhatású, kenőcsösszeállású anyag. Vízben,
glycerinben nem oldódik, borszeszben kevésbé, ætherben, chlo-
roformban könnyen; zsíros és illó olajokkal összeolvasztva azok-
kal minden arányban elegyíthető. Közönbös kenőcs-alapanyag.
10,0 = 7 kr.

†H. **Veratrinum.** A tiszta veratrinnek vegyképlete: $C_{37}H_{53}NO_{11}$, azonban forgalomban csak tisztátlan készítmények van-
nak, ilyen az is, melyet a M. Gyk. II. kiad. megjelöl. Fehér,
laza, igen csipős ízű por, szaga nincs, de erősen lússzögtető.
Vízben alig oldható, 4 sr. borszeszben, 2 sr. chloroformban lúgos
kémhatású folyadékká oldódik. Küls. kenőcsök (0,1—0,3:10,0)
alakjában mint erős izgató, derivans haszn. Bels. ma már rit-
kán, ezelőtt mint antipyreticum, cardiacum volt divatban.
Adag bels. 0,001—0,005! pro dos. pilulában, porban 2—3×napj.
Dos. maxim. pro die 0,02! Nagy vigyázat! Szívméreg!
0,1 = 4 kr.

628 *Rp.* Veratrinii 0,2.
Chloroformii 1,0.
f. solut. adde
Ungu. simp. 20,0.
M. f. ungu.
DS. Kenőcs. 44 kr.

629 *Rp.* Veratrinii 0,1.
Chloroformii 10,0.
MDS. Külsőleg bedörzsö-
lésre.
40 kr.

630 *Rp.* Veratrinii 0,06.
Pulv. et extr. Liquir. aa qu. s.
ut f. pilul. No. 30.
Consp. pulv. Liquirit.
DS. 0,002-gmos veratin-pilulák.
3 ór. 1 szemet.
31 kr.

H. **Vinum Chinæ** l. Chinæ succirubr. cort.

†H. **Vinum Colchici** l. Colchici semina.

H. **Vinum malagense.** A hív. gyógyborok előállítására haszn.
100,0 = 14 kr.

H. **Vinum Pepsini** l. Pepsinum german.

†H. **Vinum stibiato tartaricum** l. Kalium stibio-tar-
taricum.

Xylolum (C_8H_{10}). Szintelen, tiszta, erősen fénytörő, kátrány-szagú és ízű folyadék, mely kőszénkátrányból állítatik elő fractionált lepárlás útján. Zülzer ajánlotta variolánál 10—20 cseppnyi adagban (nyákos vagy illatos mixturában vagy capsulában); szerinte és Örvös tr. szerint a himlőhólyagok tartalmát gyorsan megolvasztja, s a hegeképződés ritka, a leszáradás szövdmények nélkül történik. $1,0 = 3$ kr.

631 *Rp.* Xyloli pur. gtt. 10.
 Del. in caps. gelat.
 opercul.
 Dent. tales dos. No. 10.
 5. Napj. 3×1 capsulát.
 78 kr.

632 *Rp.* Xyloli puri 3,0.
 Aquæ Menthae pip.
 Aquæ dest. aa 50,0.
 Syrup. Cinnamomi
 Mucil. Gummi arab.
 aa 10,0.

MDS. 2 ór. 1 evök.
 Gyermekeknek. (Löwisch.)
 44 kr.

H. Zedoariæ rhizoma. (*Curcuma Zedoaria*, Scitamineæ.) Hatóanyagai illatos olaj, gyanta, keményítő. Stomachicum, carminativum. Adag bels. porban, pilulában 0,5—1,0 pro dos. $2-3 \times$ napj. 100,0 = 16 kr.

†**H. Zincum aceticum** [$Zn(C_2H_3O_2)_2 \cdot 3H_2O$]. Finom, szintelen, lemezalakú jegecekéből áll; 3 sr. hideg, $\frac{1}{2}$ sr. forró vízben és 30 sr. borszeszben oldható. Küls. substantiában hámfosztott helyeket, nyákhártyákat edző, higabb oldatokban adstringens. Bels. nervinum, mint a zinkkészítmények általában. Szemviznek, húgycsőbe fecskendésre 0,1—0,2 : 100,0. Bels. 0,05,—0,1 ! pro dos. $3-5 \times$ napj. Dos. maxim. pro die 0,5 ! mint emeticum ne rendeltesék. 10,0 = 24 kr.

633 *Rp.* Zinci acet. 0,4.
 Aquæ dest. 200,0.
 Tinct. Opii simpl. gtt. 10.
 DS. Húgycsőbe fecskendésre.
 Gonorrhœa.
 30 kr.

634 *Rp.* Zinci acet.
 Extr. Belladonnae aa 1,0.
 Pulv. rad. Valerianæ
 qu. s.
 ut f. l. a. pilul. No 50.
 Consp. pulv. Liquir.
 DS $2-3 \times$ napj. 2 szemet.
 Lehet emelkedni is az
 adaggal.
 Epilepsia. 47 kr.

†**H. Zincum chloratum** ($ZnCl_2$). Fehér, v. kissé szürkésfehér por; vízben és borszeszben igen könnyen oldódik. Légen meg nedvesedik és szétfolyik. Substantiában causticum. Oldatokban desiniciens, antisepticum. Bels. nem haszn. Causticus czélokra szolgálnak a bacillusok (kalí nitr.-al összeolvastva és formába öntve), azután a pasta Canquoini és a pasta Landolfii. Sebkezelés-

ben mint desiniciens 1,0:100,0—500,0, szemvíznek 0,02:100,0, húgyesőbe fecskendésre 0,05:100,0. 10,0 = 10 kr.

635 *Rp.* Zinci chlorati
Farinæ secalis aa 10,0.
M. f. c. Aqua dest. qu. s.
pasta.
D^S. Késhátvastagon felkenni.
Külsőleg.
Pasta Canquoini. I. sz.
58 kr.

637 *Rp.* Zinci chlorati
Stibii chlorati
Acid. hydrochlor. conc.
aa 10,0.
Lycopodii qu. s.
ut f. pasta.
D^S. Külsőleg. Pasta caustica
Landoltii Hebra módosítása
szerint. 84 kr.

636 *Rp.* Zinci chlorati 5,0.
Farinæ secalis 10,0.
Glycerini 1,0.
M. f. pasta.
D^S. Késhátvastagon felkenni.
Külsőleg. Pasta Canquoini
II. sz.
MENIÉRE módosítása szerint.
33 kr.

638 *Rp.* Zinci chlorati 1,0.
Aquæ dest. 1000,0.
D^S. Külsőleg.
Sebmosó folyadék.
63 kr.

†H. **Zincum oxydatum s. Flores Zinci** (ZnO). Finom, fehér, alaktalan por; vízben nem oldható. Küls. mint hintő por bőrön szárító, izgalmat csökkentő, nyákharlyákon enyhén edző, izgató. Kenőcsben szárító. Bels. nervinum, antispasmodicum, főleg epilepsia, chorea, hysteria, eclampsia eseteiben. Adag bels. porban, pilulában 0,05—0,1—0,3 pro dos. napj. 3—5 $\times$. 10,0 = 8 kr.

H. **Unguentum Zinci oxydati** (1:9). Szárító, fedő kenőcs.

639 *Rp.* Zinci oxydati 2,0.
Lycopodii 30,0.
M. exact. f. pulv.
det. in scat.
S. Hintőpor.
Intertrigo, pruritus pu-
dendi.
36 kr.

641 *Rp.* Zinci oxyd. 0,2.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.
D^S. 4 $\times$ napj. 1 port.
Csecsemőknek eclampsia
esetén. 27 kr.

640 *Rp.* Zinci oxydat. 1,0.
Sacchar. alb. 4,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.
D^S. 3—4 $\times$ napj. 1 port.
Epilepsia, chorea.
18 kr.

642 *Rp.* Zinci oxyd.
Ase fetid.
Pulv. Valerianæ aa 2,5.
Mucil. Gummi arab. qu. s.
ut f. l. a. pilul. No. 50.
Obduc. foliis argent.
D^S. 2—3 $\times$ napj. 2—5 szemet.
Hysteria. 32 kr.

†H. **Zincum sulfuricum** ($ZnSO_4, 7H_2O$). Szintelen, hasábos v. tüalakú jeccezekből áll. Hideg és meleg vízben egyaránt könny-

nyen oldódik. Vizes oldata csipős, undorító fémízű és savanyú kémhatású. Substantiában edző, de ezen hatását fel nem használjuk. Híg oldatokban desiniciens (de gyengébben, mint a chlorzink); jó adstringens és mint ilyen haszn. szemvíznek 0,03—0,1 : 10,0, húgycsőbe fecskendésre 0,3—0,5—1,0 : 100,0, száj-, torokvíznek, sebek, hüvely mosásra 0,5—1,0 : 100,0. Bels. emeticum, adag 0,3—1,0! pro dos. Dos. maxim. pro die 5,0! 10,0 = 5 kr.

613 *Rp.* Zinci sulf. 0,3.
Aque dest. 30,0.
Tinct. Opii croc. gtt. 10.
℞℥℥ Szemcseppek.
Conjunct. catarrh.
24 kr.

615 *Rp.* Zinci sulf. 0,5.
Plumb. acet. bas. sol. 1,0.
Aque dest. 200,0.
℞℥℥ Húgycsőbe fecskendésre gonorrhœa esetén.
Használat előtt felrázni.
31 kr.

617 *Rp.* Zinci sulf. 0,5.
Aque dest. 100,0.
Tinct. Opii simpl. 1,0.
℞℥℥ Belégzésre.
Laryngitis catarrhalis.
28 kr.

614 *Rp.* Zinci sulf. 0,5.
Aque dest. 200,0.
Acid. carbol. liquid. 1,0.
℞℥℥ Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhœa. 31 kr.

616 *Rp.* Zinci sulf. Aluminis $\overline{aa}$ 0,3.
Aque dest. 200,0.
Tinct. Opii croc. 1,0.
℞℥℥ Húgycsőbe fecskendésre. Gonorrhœa. 35 kr.

618 *Rp.* Zinci sulf. 0,5—1,0.
Aque dest. 100,0.
Syrup. cort. Aurant. 25,0.
℞℥℥ 10—15 percenként 1 evők. míg hányás nem jelentkezik.
Emeticum.
32 kr.

†H. **Zincum valerianicum** [$Zn(C_5H_9O_2)_2, 2HO_2$]. Zsírfehérű, lemezes kristályokból álló, valerianasav szagú tömeg. 90 sr. vízben, 40 sr. borszeszben oldható. Nervinum, antispasmodicum mint a zink. oxyd. Adag bels. 0,05,—0,1! pro dos. porban, pilulában. Dos. maxim. pro die 0,5! 1,0 = 5 kr.

619 *Rp.* Zinci valerian. 0,5.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.
℞℥ 3—4×napj. 1 port.
Epilepsia, hysteria.
28 kr.

620 *Rp.* Zinci valerian. 0,2.
Sacchar. alb. 3,0.
M. f. pulv. div. in dos.
aqua. No. 10.
℞℥ 4×napj. 1 port.
5 éven túli gyermeknek chorea minor esetén. 27 kr.

H. **Zingiberis rhizoma**. (Zingib. offic. Scitamineæ.) Hatóanyagai illó olaj, gyanta. Stomachicum, carminativum. Keserű és illatos theák alkatrésze. 100,0 = 29 kr.

H. **Tinctura Zingiberis**. Adag. bels. 10—30 csepp. Keserű v. illatos tincturák alkatrésze. 10,0 = 6 kr.

XII. Gyógyhelyek és gyógyvizek átnézete.*

Az alábbiak a nálunk gyakrabban használt bel- és külföldi gyógyvizekre és betegeink által leginkább látogatott bel- és külföldi gyógyhelyekre vonatkoznak.

A gyógyhelyek és gyógyvizek egyszerű felsorolása helyett helyesnek tartottam nemű állapigazító jellemzést is adni. A mennyire javulatokat vagy ellenjavulatokat bővebb indokolás nélkül adni lehet, igyekeztem azokat is összeállítani. Nagy súlyt fektettem a hazai gyógyhelyekre és ásványvizekre. Fontos nemzetgazdasági szempontok parancsolják, hogy ha csak a beteg igazi érdekeivel megegyeztetlenül, hazai gyógyhelyt ajánljunk és hazai gyógyvizet rendeljünk, feltéve mindig, hogy a gyógyhelyen a beteg a kellő ellátást méltányos árak mellett megtalálhassa, s feltéve, hogy az ásványvíz kezelése a kívánalmaknak megfelel.

1. Klimatikus gyógyhelyek.

1. *Subalpin gyógyhelyek nyári tartózkodásra.*

Hazaiak: *Lucivna* (800 meter magasságban), *Marillavölgy* (790 m.), *Leibitz* (732 m.), *Tusnád* (650 m.), *Gánóc* (635 m.), *Feketehegy* (632 m.), *Előpatak* (624 m.), *Borszék* (582 m.), *Lubló* (556 m.), *Jegenye* (550 m.), *Stubnya* (518 m.), *Baldóc* (486 m.), *Ránk* (392 m.), *Szklénó* (382 m.), *Szliács* (360 m.), *Tarcsa* (347 m.), *Bártfa* (319 m.), *Vihnye* (310 m.).

Külföldiek. Nálunk ismertebbek és magyarok által látogatottabbak Steyermarkban, Karinthiában, Salzkammergutban és Tyrolban: *Reichenau* (480 m.), *Gmunden* (417 m.), *Kammer, Unterach, Mondsee* (470 m.), *Ischl* (484 m.), *Aussee* (650 m.), *Tobelbad* (330 m.), *Pörschach* és *Velden*, mindkettő a Wörthi tó mellett (439 m.), *Tarvis* (734 m.), *Zell am See* (752 m.), *Achensee* (930 m.).

Németországban: *Görbersdorf* Porosz-Sziléziában (540 m.), *Reiboldsdgrun* az Érczhegységben (688 m.), *Thale, Harzburg, Suderode, Hubertusbad, Alexisbad* a Harzban, *Falkenstein* a Taunusban, *Triberg* (618 m.) és *Bad-nweiler* a Schwarzwaldban, *Berchtesgaden* (580 m.), *Tegernsee* (732 m.), *Kreuth* (512 m.) Felső-Bajorországban.

Svájc számos helyei közül ismertebbek nálunk: *Luzern, Interlaken, Waeggis, Vitznau, Beutenberg* stb. stb.

* Az adatokat BOLEMAN, REIMER, DOJARDIN-BEAUMETZ, HIRSCHFELD és PICHLER munkái alapján közlöm.

2. *Alpin gyógyhelyek nyári tartózkodásra. 1000 méteren túl a tenger színe felett.*

Hazaiak: Csorbai tó Liptóban (1350 m.), Ó-, Új- és Alsó-Tátrafüred Szepesben (átlag 1000 m.).

Külföldiek. Tyrolban: *Niederdorf* (1158 m.), *Toblach* (1250 m.), *Cortina* (1219 m.), *Innichen* (1332 m.). — Svájcban: *Davos* — két helység *D.-Dörfli* és *D.-Platz* — (1652 m.), *Pontresina* (1828 m.), *Szt.-Moritz-Dorf* (1856 m.), *Rigi* (1460 m.), *Bormio* (1396 m.), *Arosa* (1850 m.).

3. *Alpin és subalpin gyógyhelyek téli tartózkodásra.*

A felsorolandó alpin és subalpin helyek jellege télen aránylag enyhe és állandó középhőmérsék, tiszta levegő, szélmentesség, az alpin helyeken csekély légnyomás.

a) Alpin helyek.

Hazai: *Új-Tátrafüred*. Erős insolatio, — 2.4° C. átlag. középhőm.

Külföldiek. Svájcban: *Davos* (1652 m., középhő — 5.8° C.), *Samaden* (1740 m.), *Szt.-Moritz* (1856 m.).

b) Subalpin helyek.

Hazai: *Marillavölgy* (790 m.).

Külföldiek: *Görbersdorf*, *Falkenstein*, *Reiboldsgrün*, *Wiesbaden*.

4. *Délen fekvő igen enyhe égaltű helyek téli tartózkodásra.*

Hőm. télen 2° és 4° C. között ingadozik, szélsend, kevés csapadék.

Hazai: nincs.

Külföldiek: *Abbazia*, Fiume mellett a tengerparton. *Bozen*, Meran mellett, 270 m. 2° C. téli átlag. hőm. Meran, 319 m. 1.8° C. téli átlag. hőm., derült ég, kevés csapadék, szélsend. *Arco*, a tyrolí alpesek déli lejtőjén, 73 m. 3.7° C. téli átlag. hőm., kissé nedvesebb, mint Meran. *Montreux* és *Vevey* a Genfi tó partján. Még enyhébb égaltűak télen a Riviera di Ponente számos helye (Genuától nyugatra), mint *Pegli*, *San-Remo*, *Ospe-*

daletti, Bordighera, Mentone, Monte-Carlo, Monaco, Nizza, Cannes, továbbá a Riviera di Levante számos helysége (Genuától keletre), mint *Nervi, Spezzia, Pisa*. Sziciliában látogatott helyek *Catania, Palermo*.

5. Tél nélküli helyek.

Cairo, Alexandria, 13° C. átl. téli hőm. *Algier*, 15·3° C. átl. téli hőm. Nagy napi ingadozások. *Madeira*, portugál sziget (fővárosa *Funchal*), 16·9° C. átl. hőm. télen, egyenletesen nedves, reggel 8 órától este 6-ig szabadban lehet tartózkodni. *Coriu*.

II. Hidegvíz-gyógyintézetek.

Javalatok csak nagyon általánosságban állíthatók fel. *Hypochondria, hysteria* némely alakja, *tabes dorsalis*, idült gyomor- és bélhurut, idült csúszos bántalmak, a köszvény némely alakja, *syphilis*, test edzése meghűlések ellen.

Hazaiak: *Budapest városmajori és svábhegyi Vaskorits-féle. Budapest városligeti Fischhof-Fischer-féle. Marillavölgy* (Krassó-Szörénymegyében, Oravicza mellett). Ó-, Új- és Alsó-Tátrafüred (Szepes megyében, Poprádtól 1½ órányira). *Feketehegy v. Schwarzenberg* (Szepes megyében Igló mellett). *Lucsivna* (Liptó- és Szepes megye határán).

Ausztriában nevesebbek: Giesshübel-Puchstein, Karlsbad mellett. *Gräfenberg*, Sziléziában. *Helenenthal*, Bécs melletti Badenben. *Kaltenleutgeben*, Bécs mellett. *Kreuzen*, a Duna mellett, Greinhez közel. *Priessnitzthal*, Mödling mellett, Bécestől nem messze. *Szt-Radegund*, Stájerországban, Gráztól 2 órányira.

Németországban: Boppard (Marienberg és Mühlbad), a Rajna mellett. *Elgersburg*, Gotha mellett. *Godesberg*, Bonn mellett. *Herrenalb*, Würtenberghen, Gernsbach mellett. *Ilmenau*, Thüringiában. *Königstein*, a Taunusban. *Lauterberg*, a Harzban. *Liebenstein* Thüringiában. *Dietenmühle* és *Nerothal*, Wiesbaden mellett. *Wilhelmshöhe*, Cassel mellett.

Svájczban: Albisbrunn, Zürich mellett. *Rigi Kaltbad*, *Schönbrunn* és *Schöneck*, a Vierwaldstüdti tó mellett. *Buchenthal*, St.-Gallenben.

III. Tengeri fürdők.

Gyógyhatányok: a tengervíz hőmérséke, *NaCl* tartalma, a hullámcsapás, az állandó légmozgás, a lég nedvessége és *NaCl*, valamint ozontartalma, s a leghőmérsék egyenletessége. A víz

hőmérséke 16—27° C. között ingadozik hely és évszakok szerint; legmelegebb a Közép-tenger (22—27° C.), utána jő az Atlanti oceán (20—23° C.), leghűvösebb az Északi tenger. A NaCl tartalom igen változó; a Földközi tengerben 0.3—2.6‰ között ingadozik, az Atlantián 2.5—3.3‰ között, az Északiban 3.0—3.9‰ között, a Keleti tengerben pedig 0.6—2.0‰ között. Évad a nyár és főleg az őszelő. *Javulatok*: Bőr edzése, hajlam hyperidrosisra, meghűlésre, csúszos bántalmakra; utógyógymód meleg fürdőzés után; hemicrania, idült neuralgiák, neurasthenia bizonyos alakjai, scrophulosis torpida, olygaemia, reconvalescencia, szellemi túlerőltetés. *Ellenjavulatok*: Gyomorbántalmak, minden fajta vérzés, szívbántalmak, edénybajok, agyizgalom, nagyfokú gyengeség, aggkor, zsenge gyermekkor.

Hazai: csupán Fiume.

Külföldiek. Ausztriában: Abazia. Fiume mellett. Trieszt, Porto-Ré. A monarchián kívüliek közül nálunk ismertebbek: Velence (Lido), Castellamare, Monaco, Nizza, Cannes (Földközi tenger), Biarritz, Arcachon (Atlanti tenger), Boulogne, Étretat, Trouville, Dieppe (La Manche-csatorna), Wight szigete, Brighton, Ramsgate (Anglia), Ostende, Blankenberghe, Scheveningen, Norderney, Sylt, Helgoland (Északi tenger), Heringssdorf, Misdroy, Colberg, Zoppot, Cranz (Keleti tenger).

IV. Gyógyvizek.

1. Egyszerű érvényes ásrányvizek.

Leginkább ivógyógymód; néhol fürdő. *Javulatok*: gyomor-, béllhurut, gyomorfekély, alhasi pozsga, epekövek, idült icterus, zsírmáj, húgykövek, vesekövek, húgyhomok, idült pyelitis és cystitis, köszvény, diabetes mellit., légutak idült hurutja. — Főhatóanyag: ketted szénsavas natrium; némely vízben, különösen a hidegebben sok szabad szénsav.

a) Melegek.

Hazai: Lipik. Fürdőhely Pozsega megyében, Pakráczlól 12 órányira. 1.9‰ natr. bicarbonicum, kevés konyhasó és jodnatrium. Hőm. 64° C. Mint jódos víz is szerepel.

Külföldiek: Vichy. Fürdőhely Franciaországban. 4—5‰ natr. bicarb. Legerősebb forrás a Celestins, kissé gyengébb a Grande Grille. Hőm. midőn legmelegebb 45° C. — Neunahr. Fürdőhely Németországban (Rheinpreussen), kevés natr. bicarb. 40° C. hőm.

b) Hidegek.

Hazaiak: Szolyvai víz (Bereg.), $8\frac{4}{100}$ natr. bicarb., igen sok szabad CO_2 . Mérkőzik minden e nemű külföldi vízzel. — *Luhí Margit-forrás* (Bereg.), $4\frac{0}{100}$ natr. bicarb., középmenyiségű szabad CO_2 . — *Luhí Erzsébet-forrás*, $2\frac{8}{100}$ natr. bicarb., középmenyiségű szabad CO_2 . Mindezen vizek elszállítva használtatnak.

Külföldiek: *Bilini József-forrás* (Csehország), $4\frac{7}{100}$ natr. bicarb. — *Bilini Karolina-forrás*, $3\frac{03}{100}$ natr. bicarb. és kevés natr. sulf. — *Fachingen* (Németország), $3\frac{5}{100}$ natr. bicarb. — *Preblau* (Karinthia), $2\frac{8}{100}$ natr. bicarb. — *Obersalzbrunn* (Szi-lézia) $1\frac{7}{100}$ natr. bicarb., kevés natr. sulfur. — *Giesshübel-Puchstein* (Csehország), $1\frac{1}{100}$ natr. bicarb., sok szabad CO_2 . E helyek vizei részint elszállítva, részint helyben használtatnak.

Függelék.

Egyszerű savanyú vizek.

Nagyrészt diatetikus célra, vagy mint luxus-vizek használtnak, de rendelhetjük mint enyhe gyomor- és bélizgatókat, eselleg mint gyenge diureticumokat is. — Mindannyia bő szabad CO_2 -tartalmú, míg szilárd alkotó részekben igen szegény.

A számos hazai forrás közül általános forgalomban vannak a: *Borszéki borvíz*, *Salvator* (Szinye-Lipóczi), *Mohai Ágnes és Stefánia*, *Balaton-Füredi*, *Német-Keresztúri Rudolf* és a *Szántói* savanyú vizek. Különben minden vidéknek megvan a maga savanyú vize.

Külföldiekre hazánkban nem szorulunk.

2. Égtrényes-konyhasós ásványvizek.

Főleg ivógyógymód. *Javulatok:* Légutak és emésztőszervek idült hurutjai, vesekő, húgyhomok, pyelitis és cystitis catarrh. chron., scrophulosis torpida, régi izzadmányok. *Ellenjavulatok:* Lázas állapotok. Főhatóanyagok: Szénsavas natrium és konyhasó, szabad szénsav.

a) Melegek.

Hazai nincs, ha csak a Lipiki vizet ide nem számítjuk, melyben csekély mennyiségű $NaCl$ csakugyan van (felényi mint az Émsi vízben).

Külföldi: *Ems.* Fürdőhely Coblenctől nem messze. Több forrás. Átlag 2‰ natr. bicarb., 1‰ *NaCl*, közepmennyiségű szabad *CO*₂. Források hőfoka 27·9° C.—50·4° C.

b) Hidegek.

Hazaiak: *Czigelkai Lajos-forrás* (Sárosm.), 16·7‰ natr. bicarb., 5‰ natr. chlorat., sok szabad *CO*₂. Víz elszállítva használtatik. *Bikszád.* Fürdő Szathmár megyében. Több forrás. Átlag 6‰ natr. bicarb., 2·5‰ natr. chlorat. Kevés szabad *CO*₂. Kitünő víz. — *Bártfa.* Fürdő Sáros megyében. Orvosforrás vizében 4·8‰ natr. bicarb. 1·1‰ natr. chlorat. (Kevés szénsavas vas-oxidul 0·04‰). Többi forrás erősebben vasas.

Külföldiek: *Sczaenicza.* Fürdő Galicziában. 3 forrás; leg-erősebb a Magdalena-forrás melyben 8·4‰ natr. bicarb., 4—6‰ natr. chlorat., közepmennyiségű szabad *CO*₂. — *Luhatschoritz.* Fürdő Morvaországban. Legerősebb a Johannisbrunnen 8·3‰ natr. bicarb., 3·6‰ natr. chlorat., kevés *NaJ* és *NaBr*, közepmennyiségű szabad *CO*₂. — *Selters* (Németországban). Víz elszállítva. 1·2‰ natr. bicarb., 2·3‰ natr. chlorat. — *Gleichenberg.* Fürdő Stájerországban. Legerősebb a Conslantin-forrás, 3·5‰ natr. bicarb., 1·8‰ natr. chlorat.; gyengébb az Emma-forrás. Sok szabad *CO*₂ mindkettőben.

3. Glaubersós ásványvizek.

Ivógymód. *Javulatok:* Idült gyomor- és bélhurut, gyomor- és bélsékélyek, aranyér, idült májbántalmak, epekő, köszvény, diabetes mellitus, plethora abdominalis, zsírkór. *Ellenjavulatok:* carcinoma, tuberculosís.

a) Melegek.

Hazai nincs.

Külföldi: *Carlsbad.* Fürdő Csehországban. 18 hévforrás. Legmelegebb a Sprudel. Átlag 2·3‰ natr. sulfur., 1‰ natr. chlorat. Elszállítva a Sprudel, Schlossbrunn, Mühlbrunn víze használtatik leginkább.

b) Hidegek.

Hazai megfelelő még nem ajánlható.

Külföldiek: *Marienbad.* Fürdőhely Csehországban. A Ferdinandsbrunnen és Kreuzbrunnen vizében átlag 5‰ natr. sulf., 2‰ natr. chlor., 1·8‰ natr. bicarb., igen sok szabad *CO*₂. —

Franzensbad. Fürdő Csehországban. A Salzquelleben 2·8‰ natr. sulf., 1·1‰ natr. chlor., 0·9‰ natr. bicarb. foglaltatik. A többi forrás vasas. — *Rohitsch.* Fürdő Stájerországban. 1·9‰ natr. sulf., 1‰ natr. bicarb., kevés natr. chlor., sok szabad CO_2 . — *Tarasp-Schuls.* Fürdő Svájcban (1300 m. m.) Legerősebb a Lucius-quelle; 2·1‰ natr. sulf., 3·6‰ natr. chlor., 0·8‰ natr. bicarb., e mellett tartalmaz még 2·4‰ kétszer szénsavas meszet és 2‰ kétszer szénsavas ammoni. Vannak vasas forrásai is. — *Elster.* Fürdő Szászországban. A Salzquelleben van 5·2‰ natr. sulf., 1·6‰ natr. bicarb., 0·8‰ natr. chlor. Vannak vasas forrásai is.

4. Keserű vizek.

Ivógyógymód. *Javaltatok*: egyszerű és szokványos székrekedés, aranyér, plethora abd., májvérbőség, elhízás.

Hazaiak mindenek fölött állanak. A *budai Hunyadi János, Ferencz József, Rákóczy, Hunyadi László, Árpád, Victoria*, stb. vizekben átlag körülbelül 20‰ natr. sulfur. és ugyanannyi magn. sulf. — *Igmándi víz.* (Komáromm.) 14‰ magn. sulf., 7·4‰ natr. sulf. Kevés szabad CO_2 . — *Iszlandi víz* (Torontálm.). 15‰ natr. sulf. Magn. sulfur. nincs benne.

Erzsébet sósfürdő Budán a Gellérthegy alatt. Fürdőgyógymód a női ivarszervek idült lobos bántalmái eseteiben. Ivásra szolgál az Erzsébet-forrás, melyben 14‰ natr. sulf., 9‰ magn. sulfur.

Külföldiek: *Saidschitz-i, Püllna-i, Fridrichshall-i, Mergentheim-i, Montmirail-i* keserű vizek. Mindezek szükségtelenek nálunk. Gyengébbek és drágábbak, mint a budaiaiak.

5. Egyszerű konyhasós vizek.

Konyhasótartalom nem haladja túl a 15‰-ot. Részint ivó-, részint fürdőgyógymód. Némelyik forrásnak sok szabad CO_2 tartalma támogatja a hatást. Fürdők mint erős bőrízgatók szerepelnek. — *Javaltatok ivógyógymódra*: idült gyomor- és bélhurut, gyomor- és béltonia, obstipatio habitualis, plethora abdominalis, aranyér, scrophulosis torpida, köszvény, idült fennálló izzadmányok.

Ellenjavaltatok: carcinoma, tuberculosis.

Javaltatok fürdőkre: Idült fennálló izzadmányok, köszvény, scrophulosis torpida, idült rheumatismus, idült neuralgiák, körzeti idegrendszer idült bántalmái. *Ellenjavaltatok*: borbántalmak, eccemára hajlamos bőr, szív- és edénybántalmak, vértolulások az agy felé.

a) Melegek.

Hazai: *Mehádiai Hercules-forrás.* (Mehádián vannak kenes források is.) Fürdő és ivógyógymód. 1.9‰₁₀₀ natr. chlor. Hőmérsék 56° C. Vetekedik a legfőbb külföldi fürdőhelylyel.

Külföldiek: *Baden-Baden.* Fürdőhely a badeni nagyhercegségben a Schwarzwald tövében. (210 m.) 2‰₁₀₀ natr. chlor. Hőmérsék 40—69° C. között. Ivásra a Hauptquelle szolgál. *Wiesbaden.* Fürdőhely Németországban a Taunusban. (117 m.) Ivásra a Kochbrunnen vize használtatik, 6.8‰₁₀₀ natr. chlor. tartalommal és 69° C. hőmérsékkel.

b) Hidegek.

Hazai: *Csizi víz* (Gömör-m.), nem fürdőhely; víz elszállítva használtatik, 15.5‰₁₀₀ natr. chlor., 0.04‰₁₀₀ jód-kálium, 0.08‰₁₀₀ brom-kálium tartalommal. Mint jódos víz is szerepel. Hatását konyhasó tartalmának köszöni.

Külföldiek: *Kissingen.* Fürdő Bajorországban. Az ivásra használt Rákóczy- és Pandur forrásokban átlag 5.5‰₁₀₀ natr. chlor. és igen sok szabad CO₂. Fürdőkhoz a többi 10‰₁₀₀ natr. chlor.-ol tartalmazó CO₂— dús források használtatnak. — *Homburg.* Fürdő majnai Frankfurt mellett a Taunusban. (190 m.) Ivásra a gyengébb Louisenbrunnen (3‰₁₀₀ natr. chlor.) és az erős Elisabethbrunnen (10‰₁₀₀ natr. chlor.) használtatnak. Fürdőnek más források. — *Dürkheim.* Fürdő Bajorországban. Ivásra a Bleichbrunnen vize használtatik, melyben 8.8‰₁₀₀ natr. chlor., 0.0019‰₁₀₀ natr. jód, 0.019‰₁₀₀ natr. bróm., foglaltatik. Fürdők más forrásokkal készíttetnek. Mint jódos víz is szerepel. — *Kreuznach.* Fürdő Németországban. Ivásra az Elisabethquelle használtatik, melyben 9.5‰₁₀₀ natr. chlor., 0.0003‰₁₀₀ magnes. jód, 0.039‰₁₀₀ magnes. bróm. van. A többi források fürdésre használtatnak. Mint jódos víz is szerepel. — *Neuhans.* Bajorországi fürdő. Források 9—18‰₁₀₀ natr. chlor.-al, sok szabad CO₂-al. — *Hall.* Fürdő Felső-Austriában. Ivásra a Tassiloquelle vize használtatik, 14‰₁₀₀ natr. chlor., 0.05‰₁₀₀ magnes. jód, 0.04‰₁₀₀ magnes. bróm., kevés szabad CO₂. A többi források fürdésre szolgálnak. Mint jódos víz is ismeretes.

6. Erős konyhasós vizek.

15‰₁₀₀-tól 300‰₁₀₀-ig terjedő natr. chlor. tartalommal. Ivógyógymódra nem használtatnak, csupán fürdőkre. Az igen tömény vizek megfelelően hígíttatnak. Hatást, használatot l. az egyszerű konyhasós vizeknél.

a) Melegek.

Hazai nincs megfelelő.

Külföldiek: *Nauheim*. Fürdő Németországban (Hessen-Darmstadt). Sok forrás közül fürdőkhöz a Friedrich-Wilhelms-Sprudel (29‰ NaCl , 37° C. meleg) és a Grosser Sprudel (21‰ NaCl és 27° C. meleg) használtanak. Gyengébb források ivógyógymódra szolgálnak. Minden forrásban sok szabad CO_2 . — *Oeynhausen-Rehme*. Fürdő Németországban (Westphália). Fürdőhöz használt források 29‰—35‰ NaCl -t tartalmaznak s 26°—33° C. melegek, bő szabad CO_2 tartalommal. Higított vízzel ivógyógymód.

b) Hidegek.

Hazánkban sok alkalmas forrás van, különösen Erdélyben, de jól berendezett fürdő egy sincs. — Igen szerény igényeknek felelhetnek csak meg: *Polhora* (Árvam.), *Szoráta* (Maros-Tordam.), *Görgény-Sóakna* (Maros-Tordam.), *Vizakna* (Alsó-Fehérm.), *Felső-Bajom* (Kis-Küküllőm.) és *Maros-Ujvár* (Alsó-Fehérm.), mely utóbbi megérdemelné, hogy mint fürdőre nagyobb gond fordítassék.

Külföldiek igen nagy számmal vannak; nálunk ismertebbek: *Aussee*. Fürdő Stájerországban (650 m.). Vize 244‰ NaCl tartalmú; fürdőhöz használatkor hígítatlik. — *Ischl*. Fürdő Salzkammergutban (484 m.). Fürdőkhöz használt vizei 236‰—255‰ NaCl tartalmúak; fürdő-használatra megfelelőleg hígítatnak. Ivógyógymód gyengébb, 5—17‰ NaCl -ot tartalmazó vizekkel. — *Reichenhall*. Fürdő Bajorországban (457 m.). 19 sósforrása van. Az Edelquelleben 228‰ NaCl . — *Harzburg*. Fürdő Németországban, a Harzban (238 m.). Vize 66‰ NaCl -t tartalmaz.

7. Jódos és brómos vizek.

Azon ásványvizek, melyek e cím alatt szerepelnek, oly csekély jód és bróm tartalmúak, hogy ezt gyógyhatás szempontjából számításba venni önámítás. E vizek többnyire konyhasós vizek, néha (mint p. o. a Czigelkai Lajos-forrás) égvényes konyhasós vizek, s mint ilyenek hatnak jótékonyan ivógyógymód vagy fürdők alakjában: torpid scrophulosis, némely idült bőrbántalom, inveterált syphilis, idült izzadmányok eseteiben.

Mint jódos vizek vannak forgalomban a sok közül a következők:

Hazaiak: (melyek kereskedelmi czikkel is képeznek, mert p. o. a Zajzoni víz, mely pedig állítólag a legerősebb jódos víz,

nincs forgalomban) a *Cziz-i*, *Czigetkai Lajos-forrás* és a *Lipiki viz*.

Külföldiek: a *Kreuznachi*, *Halli* (Felső-Ausztria), *Dürkheimi* stb.

S. Földes vagy meszes ásványvizek.

Jellegüket tetemesebb kétszer szénsavas mész, kétszer szén-savas magnesium és gipsz jelenléte adja meg, míg más sók elenyésző csekély mennyiségben vannak jelen. — E vizek egy része meleg, más része hideg, de többnyire sok szabad CO_2 -at tartalmaznak. — A melegek fürdőkül használtatnak u. a. javulatok alapján, mint a tiszta hévvizek, miután lényegileg u. a. batással is bírnak. A hidegekkel ivógyógymód: Bright-kór, cystitis és pyelitis catarrhalis chronica, lithiasis, húgyfővény, köszvény, rhachitis, légutak idült hurutja eseteiben.

a) Melegek.

Hazaiak: *Szklénó*. Fürdő Bars megyében (382 m.). Hőm. $37-53.5^{\circ} C$. Kénsavas mész 1.6% — 2.7% . Egyéb szilárd részek csekély mennyiségben. Fürdő- és ivógyógymód. *Budapest*. *Sárosfürdő*. Hőm. $50^{\circ} C$. Iszapfürdő is berendezve. *Ráczfürdő*. Hőm. $43.5^{\circ} C$. Gőzfürdők is. *Rudasfürdő*. Hőm. $45^{\circ} C$. Gőzfürdők is.

Külföldiek: *Leuk (Loèche)*. Fürdő Svájcban. (Cant. Wallis. 1415 m. mag.) Hőm. $34-51^{\circ} C$. Kénsavas mész 1.3% . Zord alpesi klíma. Fürdő és ivógyógymód. *Bagnères de Bigorre*. Fürdő Franciaországban (Dép. Hautes Pyrenées, 579 m.). Hőm. $18-51^{\circ} C$. Sok forrás; meszes hévvizek mellett kénes és vasas források is.

b) Hidegek.

Hazaiak: *Gánóc*. Fürdő Szepes megyében (630 m.), Poprádtól nem messze. Kétszer szénsavas mész 2% , tetemes szabad CO_2 . Vize melegítve fürdőnek is használtatik. — *Baldóc*. Fürdő Szepes megyében, a szepesi vár mellett. Deák-forrásban 2.1% kétszer szénsavas mész, 0.8% natrium sulfur.; igen sok szabad CO_2 ; a fürdőforrásban 3.7% kétszer szénsavas mész, 1.4% natr. sulf.; ez utóbbi forrás, mint glaubersós víz is szerepelhetne.

Külföldiek: *Wildungen*. Fürdő Németországban a Waldeck hercegségben (300 m.). Legerősebb a Helenenquelle, melyben 1.3% kétszer szénsavas mész, 1.4% kétszer szénsavas magnesium, 0.9 natr. bicarbonic., 1% konyhasó és sok szabad CO_2 . —

Lippspringe. Fürdő Németországban. Az Arminiusquelle-ben 0.6% kétszer szénsavas mész, 0.8% gipsz, u. a. natr. sulf., sok szabad CO_2 és légenyáz. — Enyhe klímája folytán különösen tuberculoticusok gyógyhelye. — *Inselbad.* Fürdő Németországban Lippspringe-től nem messze. Földes-konyhasós források sok légenyázzal. Tuberculoticusok gyógyhelye, mint Lippspringe. — *Weissenburg.* Fürdő Svájcban (896 m.).

Franciaországban látogatottak: *Cransac* (Dép. Aveyron.), *Contrexe ville* és *Vittel* (Dép. Vosges.), *Saint-Armand* (Dép. Nord).

9. Vasas ásványvizek.

A vas mint kétszer szénsavas vasoxydul van jelen legalább 0.03% mennyiségben. Többnyire hideg vizek, meleg csak néhány van. *Tiszta vasas savanyú vizeknek* nevezzük azokat, melyekben a kétszer szénsavas vasoxydul és telemes szabad CO_2 mellett kevés más számbavehető alkatrész van; ezek mellett ismerünk és használunk *földes-vasas savanyú vizeket, égvényes-vasas savanyú vizeket, égvényes-konyhasós-vasas savanyú vizeket, s végül, glaubersós-vasas savanyú vizeket.* A melegek főleg fürdőgyógyomódra szolgálnak, midőn a fürdő hőmérséke s a jelenlevő szabad CO_2 a gyógyhatány; a kétszer szénsavas vasoxydul a bőrön át föl nem szívódik. Javulatok nagyrészt, mint az egyszerű hévvezeknél. Hideg vasas vizekkel főleg ivógyógyomód, néhol melegítve fürdőgyógyomód is. — Ivógyógyomódra a javulatok sokfélék lehetnek a víz vegytartalmához képest. Általánosabb javulatok: chlorosis, olygamia, általános gyengeség, idült neurosisok vérszegény alapon. Ellenjavulat: lázas bántalmak, tuberculosus, gyomorbántalmak.

a) Melegek.

Hazaiak: *Vihnye.* Fürdő Bars megyében (310 m.). Víz-hőmérsék 35—38.3° C. Főleg fürdőgyógyomód, de a források ivógyógyomódra is használtatnak. — Régi forrásban 0.63% kétszer szénsavas vasoxydul, kis mennyiségű szabad CO_2 . Az új artézi forrásban kevesebb a vas. — *Szliács.* Fürdő Zólyom megyében (360 m.). Hideg, langyos, meleg források. — Az ivásra szolgáló hideg források közül a Jozsef-forrás a legfontosabb, mely tiszta vasas savanyú víz, s mely 0.4% kétszer szénsavas vasoxydukt. igen sok szabad CO_2 -al tartalmaz. — Vannak langyos, ivásra is használt földes-vasas szénsavdús források is (Lenkey-, Dorottya-forrás). — Fürdől 25—30° C. hőjű források szolgálnak, bő szabad CO_2 tartalommal. Legmelegebb az I. sz. tükörfürdő, mely földes-vasas víz.

Külföldiek főleg Franciaországban találhatók; ilyenek: *Rennes, Bagnères de Bigorres, Borbolan.*

b) Hidegek.

Hazainak: *Buziás.* Fürdő Temes megyében. Forrásai vasasavanyú vizek. Ivógyógymód. Fürdők mesterségesen és czélszerűen melegített ásványvízzel. József-forrásban 0.16% kétszer szénsavas vasoxgydul, tetemes szabad CO_2 . Kissé gyengébb a Mihály-forrás. — *Koritnyicza.* Fürdő Liptó megyében (847 m.). Főleg ivógyógymód. A forrásokban kétszer szénsavas vasoxgydul $0.084-0.097\%$, e mellett tetemes gipsz, kétszer szénsavas mész, kénsavas magnesium és középennyiségű szabad CO_2 . — *Borszék.* Fürdő Csik megyében (882 m.). A Kossuth-kút vize 0.09% kétszer szénsavas vasoxgydul tartalmaz. Ivógyógymód. — *Új-Lubló.* Fürdő Szepes megyében (556 m.). A forrásokban kétszer szénsavas vasoxgydul $0.04-0.05\%$. E mellett tetemes kétszer szénsavas magnesium és mész; igen sok szabad CO_2 . Ivógyógymód. Fürdők is melegített ásványvízzel. — *Parád.* Fürdő Heves megyében. A *Clarisse*-forrás liszta vasas savanyú víz. Kétszer szénsavas vasoxgydul 0.05% , dús szabad CO_2 tartalom. — *Előpataka.* Fürdő Háromszék megyében (624 m.). Ivógyógymód. Források égvényes-vasas savanyú vizek. Ha az elemzések nem tévesek, a források tartalmazzak: kétszer szénsavas vasoxgydul $0.079-0.468\%$ -ig, kétszer szénsavas natriumot $1.2\%-2.0\%$ -ig, kétszer szénsavas magnesiumot és meszel szintén tetemes mennyiségben, ép úgy szabad CO_2 -at is. — *Tusnád.* Fürdő Csik megyében (635 m.). Ivóforrásokban $0.1-0.13\%$ kétszer szénsavas vasoxgydul; ezek közül a Rezső-forrásban 2% $NaCl$. A fő-kút vize, mely szintén ivásra szolgál, égvényes-sós-vasas savanyú víz, 0.04% kétszer szénsavas vasoxgydul és 1.2% kétszer szénsavas natrium tartalommal. Melegített vízzel fürdőgyógymód. *Bártfa.* Fürdő Sáros megyében (318 m.). Ivógyógymód, s mesterségesen melegített ásványvízzel fürdőgyógymód. Források többsége égvényes-sós-vasas savanyú víz, a lobogó forrás pedig égvényes-vasas-savanyú víz, 0.08% kétszer szénsavas vasoxgydullal, 1.6% natr. bicarb.-al, sok szabad CO_2 -al. Az Orvos-forrás erős égvényes-sós-savanyú víz 4.8% natr. bicarb.-al, 1.1% $NaCl$ -al, kevés vassal.

Külföldiekre hazánk rá nem szorul ugyan, mégis legyenek megemlítve itt a következő ismertebbek: *Spaa.* Fürdő Belgiumban. Tiszta vasas savanyú víz források $0.05-0.2\%$ kétszer szénsavas vasoxgydul tartalommal. — *Pyrawarth.* Alsó-Ausztriában, Bécsről nem messze. Tiszta vasas víz, szabad CO_2 benne kevés, 0.1% kétszer szénsavas vasoxgydul tartalommal. — *Schwalbach.* Fürdő Németországban, Nassauban. Ivógyógymódra szolgál a Stahlquelle, 0.08% kétszer szénsavas vas tartalommal, sok szabad CO_2 -al. Tiszta vasas savanyú víz. — *Pyrmont.* Fürdő Németországban, Waldeck hercegségben. A Stahlquelle vize,

mely a kereskedésben forgalomban van, 0.077% kétszer szénsavas vasoxydult tartalmaz és sok szabad CO_2 -at. Gyengébb sokkal a Helenenquelle. Konyhasós ivóforrások is vannak, dús szabad CO_2 tartalommal. Sós fürdők. — *Elster*. Fürdő Szászországban. Sok forrás, melyek — kivéve a Salzquelle-t, mely égvényes-glaubersós savanyú víz kevés vassal — mind glaubersós-vasas savanyú vizek, 0.056 — 0.085% kétszer szénsavas vasoxydul tartalommal, 2.0 — 5.0% natr. sulfur.-al és sok szabad CO_2 -al. — *Franzensbad*. Fürdő Csehországban. Számos glaubersós-vasas savanyú víz. A Stahlquelle 0.07% kettő szénsavas vasoxydult tartalmaz. A Salzquelle égvényes-glaubersós savanyú víz.

Függelék a vasas vizekhez.

Vasgáliczos vizek.

Kénsavas vasoxydult és oxydult, kénsavas aluminiumot, némelyike arsenitrioxydut, vagy arsenessavas natriumot is tartalmaz. Töményebbek fürdől, gyengébbek vízzel vagy borral erősen hígítva, ivásra is használatnak, nagyrészt ugyanoly javalatok alapján, mint a tiszta vasas savanyú vizek.

Hazni: *Parád*. Fürdő Heves megyében. A vasas-timsós és Honavölgyi timsós vizek tartoznak ide. Utóbbi előbbinél háromszorta gyengébb. Előbbiben 3.5% kénsavas vasoxyd, 3.0% kénsavas aluminium, 0.001% arsenitrioxyd. Ivó- és fürdőgyógymód.

Külföldiek: *Roncegno*. Fürdő déli Tyrolban (535 m.). Kénsavas vasoxydul 4.2% , kénsavas aluminium 1.2% , arsen-sav 0.067% . Mint arsenes víz nagyhirű, nemcsak vérszegénység, hanem idült bőrbajok, idült idegbántalmak eseteiben is. Ivó és fürdőgyógymód. — *Levico*. Fürdő déli Tyrolban (520 m.). Az erős vízben, mely fürdőkhoz vétetik, 4.9% kénsavas vasoxydul, 0.88% kénsavas aluminium, 0.0015% arsen-savas natrium van; ivóvízben 0.48% kénsavas vasoxydul, 0.0016% arsen-savas natrium foglaltatik. Javalatok, mint a Roncegno-i víznél.

10. Kénés vizek.

Nagy részük hévvíz. A kén mint H_2S , COS , azután mint natrium-, kalium-, calcium- és magnesium-kénmáj foglaltatik e vizekben; az utóbbi vegyületekből folyton fejlődik H_2S . Tartalmazhatnak e vizek még tetemesebb szabad CO_2 -at, midőn kénes-savanyú vizeknek nevezetnek, — konyhasót, s ekkor konyhasós-kénés vizek, — mészsókat, midőn meszes-kénés víz a ne-

vük, — végre ketted, szénsavas natriumot, ez utóbbiak az égvényes-kénés vizek. A meleg vizek főleg fürdő alakjában, néha ivógyógymód céljaira is használtatnak; a hidegek főleg ivógyógymódra szolgálnak; de mesterségesen melegítve fürdők alakjában is alkalmazásba vételnek.

Javalatok a fürdökre: idült rheumaticus bántalmak, idült neuralgiák, idült fémmérgezések, körzeti hűdések, caries, necrosis, köszvény, idültten fennálló lobos izzadmányok, pityriasis versicolor, prurigo.

Javalatok ivógyógymódra: plethora abdominalis, légútak idült huruljai, idült fémmérgezések, idült bőrbántalmak.

a) Melegek.

Hazaink: *Harkány.* Fürdő Baranya megyében. Fürdőgyógymód. Egyszerű kénés hévíz. Hőmérséke $62-2^{\circ}\text{C}$. — *Budapest* a következő fürdők meszes-kénés hévízű forrásokkal bírnak, melyek főleg fürdésre, de néha ivógyógymódra is használtatnak: *Császár-fürdő.* Különböző hőfokú források. Gyógyforrás hőmérséke 59°C . Iszapfürdő is. *Lukács-fürdő.* Különböző hőfokú források. Buzogó 60°C . Iszapfürdő is. *Margitsziget.* Hőmérséke 43°C . *Városligeti artézi fürdő:* Hőmérséke 73°C . — *Pöstyén vagy Pistván.* Fürdő Nyitra megyében. Meszes-kénés hévíz. Hőmérséke $60-64^{\circ}\text{C}$. Iszapfürdők is vannak berendezve. — *Várasd-Toplitz.* Fürdő Várad megyében. Meszes-kénés hévíz. Hőmérséke 57°C . — *Trencsén-Teplitz.* Fürdő Trencsén megyében. Meszes-kénés hévíz. Hőmérséke $38-40^{\circ}\text{C}$. — *Mehidiai Hercules-fürdő.* Krassó-Szörénymegyében. A Sz. páry-, Erzsébet- és Lajos-források konyhasós-kénés hévizek, $45-48^{\circ}\text{C}$ hőmérsékkel; NaCl-tartalmuk $1.5\text{‰}-3.7\text{‰}$ között. A Herkules-forrás egyszerű konyhasós-hévíz. (l. e. cz. a.).

Külföldiekre nem vagyunk utalva. Megemlítendők. *Baden Bécs mellett,* számos földes-konyhasós-kénés hévforrással, melyek hőmérséke $24-26^{\circ}\text{C}$. — *Achen.* Nagy város Németországban (80,000 lakossal). Forrásokban kénvegyületek mellett tetemes mennyiségű konyhasó, natr. bicarb, és kevés natr. sulfur. Hőmérsékük $47-55^{\circ}\text{C}$. Ivó-, fürdő- és belehelési gyógy mód. — *Schinznach.* Fürdő Svájcban. (Aargau.) Meszes-kénés hévíz, sok calcium-sulphiddel. Hőmérséke $25-34^{\circ}\text{C}$. Ivó- és fürdőgyógy mód. — Francziaországi nevezetesebb fürdőhelyek: *Aix les Bains, Luchon, Barèges, Caunterets, Eau Bonnes, Eau Chaudes.*

b) Hidegek.

Hazaink: *Parád.* Fürdő Heves megyében. A *Csevicze* égvényes kénés savanyú víz sok szabad CO_2 -al. Ivógyógymód. —

Leihicz. Fürdő Szepes megyében (754 m.). Egyszerű kénes víz kevés szabad CO_2 -al. Mesterségesen melegített vízzel fürdő-gyógymód. — *Szobráncz.* Fürdő Ungmegyében. Konyhasós-kénes savanyú víz; a főforrásban 6‰ NaCl és közép mennyiségű CO_2 . Ivó- és gyógymód.

Külföldiek: *Weilbach.* Fürdő Németországban. Egyszerű kénes víz. — *Nenndorf.* Fürdő Németországban (Hessen). Meszes-kénes víz. — *Enghien.* Fürdő Franciaországban (Seine et Oise dép.). Meszes-kénes víz.

12. Egyszerű hérvizek.

Fürdő-gyógymód. Források hőmérséke $22-80^\circ\text{C}$ között. A $40-45^\circ\text{C}$ -nál melegebbek fürdőzés céljaira lehűtetlenek. Hőmérsék szerint hűvösek ($22-28^\circ\text{C}$.), langyosak ($28-35^\circ\text{C}$.), meleg ($35-40^\circ\text{C}$.), forrók ($40-45^\circ\text{C}$.). Jellemező rendkívüli szegénységük gázlartalomban és szilárd részekben. A hűvös fürdők az anyagcserét enyhén fokozzák; a javulatok ezen hatáshól indulnak ki. A langyos hérvizek javalatai igen sokfélék, legtöbb javulatot az idült idegbántalmak szolgáltatják: neurasthenia, hypochondria, hysteria oly esetei, melyek izgalmi tünetekkel járnak, tabes dorsalis, neuralgiák, körzeti hűdések, idült fennálló lobos izzadmányok, különösen medencezébéliek, hosszúra nyúló reconvalescentia, korai elaggás, általános gyengeség. — Meleg és forró hérvizeket illető javulatok: idült izom- és ízületi rheumatismus, köszvény s azok következményei, csontcaries és necrosis, idült lobos izzadmányok, súlyosabb neuralgiák (ischias), idült fémmérgezések.

Hazaiak: *Hévíz.* Fürdő Zala megyében, közel Keszthelyhez. Hőm. 33°C . Iszapfürdők is. — *Krapina-Teplitz.* Fürdő Horvátországban Varasd megyében. Hőmérséke $41-43^\circ\text{C}$. Erdei klíma. — *Daruvár.* Fürdő Szlavóniában Pozsegamegyében. Hőmérséke $42-46^\circ\text{C}$. Iszap- és lápfürdők is. — *Sztubnya.* Fürdő Turócsmegyében (518 m.) Hőmérséke $40-46.5^\circ\text{C}$. Subalpin klíma.

Külföldiek: *Tobelbad.* Fürdő Stájerországban Grácztól nem messze. Hőmérséke $25-29^\circ\text{C}$. Erdei klíma. — *Neuhaus.* Fürdő Stájerországban Cilli mellett. Hőmérséke $34-35^\circ\text{C}$. Enyhe klíma. — *Pfäfers* és *Ragaz.* Fürdők Svájcban. Pfäfers (683 m.) zord klímájú; víz hőmérséke 37°C ., mely innen facsöveken Ragazba (521 m.) vezetetik, hol 34°C . Ragaz klímája subalpin. — *Römerbad.* Fürdő Stájerországban (237 m.). Víz hőmérséke $36-38^\circ\text{C}$. Enyhe klíma, dúz növényzet. — *Tüffer.* Fürdő Stájerországban. Hőmérséke a víznek $35-39^\circ\text{C}$. Erdei klíma. — *Wildbad-Gastein.* Salzburg tartományban (1047 m.). Hőmérséke a víznek 50°C . Alpin klíma. Víz elvezetetik Hofgasteinba, hol szintén vannak fürdők. — *Teplitz-Schönau.* Fürdő Csehországban.

Víz hőmérséke 28—48° C. — *Plombières*. Fürdő Franciaországban a Vosges-hegységben (44 m.). Hőmérséke a víznek 20—70° C. — *Luxeuil*. Fürdő Franciaországban a Vosges-hegységben. Víz hőmérséke 30—56° C.

13. Lápfürdők.

Hazánkban Alsó-Tátrafüreden, Daruvárott és Jegenyén.

Külföldön: Franzensbadban, Elsterben, Pyrmontban, Spaaban, Kissingenben, Marienbadban, Karlsbadban, Teplitz-Schönauban.

Javalatok: Idült neuralgiák, körzeti hűdések, idült lobos izzadmányok, különösen a női ivarszervek idült lobos bántalmái, az impotentia némely alakja, idült ízületi és izomszűz, köszvény.



GYÓGYSZEREK TÁRGYMUTATÓJA.

(L = lapszám; Rp = vényszám.)

- Absinthii herba. L. 30. Rp. 1.
 Acetanilid. L. 31. Rp. 3, 4.
 Acetophenon. L. 31. Rp. 5, 6, 7.
 Acetphenetidín. L. 31.
 Acetum aromathicum. L. 32.
 Rp. 8, 9.
 — pyrolign. rectific. L. 32.
 — scilke. L. 153. Rp. 584.
 — vini. L. 31. Rp. 8.
 Acidum arsenicosum. L. 32.
 Rp. 10, 11, 12, 13.
 — benzoic. L. 33.
 Rp. 17, 18, 19, 20, 21, 22.
 — boric. L. 34.
 Rp. 23, 24, 25, 26, 27, 62.
 — carbol. L. 35.
 Rp. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 644.
 — — crud. L. 36.
 — — liquid. L. 36.
 — chloronitros. L. 36.
 — chrom. L. 37. Rp. 41.
 — chrysophan. L. 37.
 — citric. L. 37.
 — fluor. L. 37.
 — hydrochlor. dil. L. 39.
 Rp. 44, 45, 46.
 — hyperosm. L. 38. Rp. 47.
 — lact. L. 39. Rp. 48, 49, 50.
 — nitric. conc. pur. L. 37.
 — dil. pur. L. 37.
 Rp. 42, 43.
 — — fumans L. 37.
 — phenyl. l. Acid. carbol.
 — phosphor. L. 39. Rp. 51, 52, 53.
 — pyrogall. L. 39. Rp. 54, 55.
 — salicyl. cryst. L. 40.
 Rp. 56—62.
 — sclerotin. L. 41. Rp. 63.
 — sozol. l. Aseptolum.
 — sulfur. conc. L. 41.
 — — dil. L. 41. Rp. 64—67.
 — sulfuros. L. 42.
 — tannic. L. 42. Rp. 68—76.
 — tartar. L. 43.
 Aconitinum germanic. L. 43.
 Rp. 77, 78.
 — nitric. L. 43.
 Aconitum napellus. L. 43.
 Adonidinum. L. 44. Rp. 80.
 Adonis vernalis. L. 44. Rp. 79.
 Aether acetic. L. 44. Rp. 216.
 — depurat. L. 44. Rp. 81, 82.
 — petrolei. L. 45.
 — sulfur. l. Aether. dep.
 Aethoxy-coffeinum. L. 45.
 Rp. 83, 84.
 Aethylidenum bichlorat.
 l. Aethyliden. chlorat.
 — chloratum. L. 45.
 Aethylenum chlorat. L. 45.
 Aethylum bromat. L. 45.
 Agaricinum. L. 45. Rp. 85, 86.
 Agaricus chirurgor. L. 46.
 Aloe. L. 46. Rp. 87, 88, 343.
 Althæa rad. L. 47.
 Rp. 8, 93, 105, 115, 408.
 — fol. L. 47.
 Alumen. L. 47. Rp. 94—103, 293.
 — ustum. L. 48.
 Aluminium hydroxydat. L. 49.
 Ammoniacum. L. 49.
 Ammonium acetic. solut. L. 49.
 Rp. 104.
 — anisatum (liquor) L. 49.
 Rp. 105, 106, 150.

- bromatum. L. 50.
Rp. 107, 108, 403.
- carbonicum. L. 50.
Rp. 100—112.
- caustic. (liquor). L. 49.
- chloratum. L. 51.
Rp. 113—116, 431.
- — ferratum. L. 51.
Rp. 117, 118.
- succin. (liquor). L. 51. Rp. 119.
- sulfo-ichthyolicum l. Ichthyolum.
- Amygdalæ amaræ. L. 52.
- dulces. L. 52.
- Amylnitrit. l. Amyle nitrosa.
- Amyle nitrosa. L. 53. Rp. 124.
- Amylenum hydratum. L. 52.
Rp. 122, 123.
- Amylium nitrosum l. Amyle nitrosa.
- Amylum tritici. L. 53.
- Angelicæ rad. L. 53.
- Anthraxarobinum. L. 53.
Rp. 126, 127.
- Anisum stellatum. L. 53.
- vulgare. L. 53.
- Antidotum arsenici. L. 53.
Rp. 125.
- Antifebrinum. L. 31. Rp. 3, 4.
- Antipyrinum. L. 54. Rp. 128, 129.
- Apomorphinum hydrochlor.
L. 54. Rp. 130—132.
- Aqua amygdalarum amar. L. 52.
Rp. 120, 121, 300.
- Aquæ aromaticæ. L. 53.
- aurant. flor. L. 55.
- calcis. L. 55. Rp. 29, 135—139.
- calcis saccharata. L. 56.
- carbolata. L. 36.
- chlori. L. 55.
- cinnamomi. simpl. L. 55. és 81.
- cinnamomi. spirit. L. 55. és 81.
- fœniculi. L. 55. Rp. 33, 34.
- laurocerasi. L. 56.
- laxativa viennensis l. Infus. laxat.
- menthæ piper. L. 55.
- plumbica. L. 56.
- regia l. acid. chloro-uitros.
- rosarum. L. 55.
- vegeto-mineralis Goulardi.
L. 56.
- Araroba. L. 56.
- Arbutinum. L. 56. és 164. Rp. 623.
- Argentum nitr. cryst. L. 56.
Rp. 142—149.
- — fus. L. 57.
- — cum kalio nitrico. L. 57.
- Argilla alba. L. 57.
- Arnica montanæ flor. L. 58.
Rp. 150, 152.
- — fol. L. 59.
- — rhizom. L. 58. Rp. 151.
- Arsenicum album l. Acid. arsenicosum.
- Asa foetida. L. 58.
Rp. 151, 155, 156, 642.
- Aseptolum. L. 59.
- Aspidosperminum. L. 59.
- Atropinum sulfur. L. 61.
Rp. 172—176.
- Auro-natrio-chloratum. L. 59.
Rp. 157.
- Balsamum copaiv. L. 59.
Rp. 158—161.
- peruvian. L. 60. Rp. 162—165.
- styracis l. Styrax liquid.
- vitæ Hoffmanni. L. 60.
- Belladonnæ rad. L. 60.
- Benzoe resina. L. 62.
- Benzolum. L. 62. Rp. 179, 180.
- Berberinum hydrochlor. L. 69.
- phosphor. L. 69.
- Bismuthum subnitr. L. 63.
Rp. 181—186, 347.
- subsalicyl. L. 63. Rp. 187.
- tannic. L. 64. Rp. 188, 189.
- Blatta orientalis. L. 64. Rp. 190.
- Bolus alba l. Argilla alba.
- Borax venetus l. Natrium borac.
- Bromæthyl. l. Aethylum bromat.
- Bromkalium l. Kalium bromat.

- Bromalum hydratum. L. 64.
 Rp. 191.
 Bulbus scillæ l. Scilla.
 Bulhylechloralum hydratum.
 L. 65. Rp. 192, 193.
 Butyrum cacao l. Oleum cacao.

 Calamus acorus. L. 65.
 Rp. 194, 195, 335.
 Calcaria caustica l. Calcium
 oxydat.
 — chlorata. L. 66.
 Calcium carbon. nativ. L. 66.
 — — præcipit. L. 66.
 Rp. 196—199.
 — chlorat. fus. L. 66. Rp. 200.
 — hypochlorosum, l. Calcaria
 chlorata.
 — oxydatum. L. 67.
 — oxysulfurat. solut. l. Solutio
 Vlemingcks.
 — phosphoric. L. 67.
 Rp. 202—204.
 — sulfurat. L. 68.
 — sulfuric. ust. L. 68.
 Calomel l. Hydrargyr. chlorat.
 mite.
 Calumbæ rad. L. 68. Rp. 206, 207.
 Camphora. L. 69.
 Rp. 20, 21, 100, 109, 111, 151,
 211—216, 230, 471.
 — monobromata. L. 70.
 Rp. 217, 218.
 Cannabinum tannicum. L. 71.
 Rp. 222.
 Cannabis indicæ summitates.
 L. 70.
 Cantharides. L. 71.
 Capilli Veneris frondes. L. 72.
 Caragaheen. L. 72.
 Carbo animalis. L. 72.
 — ligni depur. L. 72. Rp. 238.
 — ossium. L. 72.
 Cardamomi fruct. L. 72. Rp. 195.
 Caryophylli flor. L. 72.
 Cascaræ sagradæ cortex. L. 72.
 Cascarillæ cortex. L. 72.
 Castoreum. L. 73. Rp. 229, 230.
 Catechu pallidum. L. 73. Rp. 233.
 Centaurii herba. L. 74.
 Cera alba. L. 74. Rp. 234.
 — flava. L. 74.
 Ceratum cetacei. L. 74.
 Cerium oxalicum. L. 74. Rp. 235.
 Cerussa l. Plumb. carbon.
 Cetaceum. L. 74.
 Chamomilla vulgar. L. 75.
 Rp. 156.
 Charta sinapisata l. Sinapis
 nigra.
 Chinæ calysayæ cort. convolut.
 L. 75. Rp. 237.
 — — — planus. L. 75.
 — regiæ cort. l. Chin. calysayæ.
 cort. plan.
 — succirubræ cort. L. 75.
 Rp. 67, 236, 238.
 Chininum. L. 76.
 — bimuriaticum carbamidat.
 L. 78. Rp. 254.
 — bisulfur. L. 76. Rp. 246, 247.
 — ferro-citricum. L. 78. Rp. 255.
 — hydrochloric. L. 76.
 Rp. 248, 249, 271, 307.
 — salicyl. L. 78.
 — sulfur. L. 77.
 Rp. 244, 245, 250, 251, 299, 311.
 — tannic. insipid. Rozsnyai.
 L. 77. Rp. 252, 253.
 Chinolinum. L. 79.
 — tartaric. L. 79.
 Chinidinum sulfur. L. 79.
 Chloralum hydrat. L. 79.
 Rp. 256—259.
 Chloroformium e chloralo. L. 80.
 Rp. 210, 260, 261, 367.
 Chlorodine. L. 80.
 Chorda carbolata. L. 36.
 Chrysarobinum. L. 56.
 Rp. 140, 141.
 Cinæ. flor. L. 80.
 Cinchoninum sulfur. L. 79.
 Cinnabaris factitia. L. 81.
 Cinnamomi cassiæ cortex. L. 81.

- Citri cortex. L. 81.
 — flavedo. L. 81.
 Cocainum hydrochlor. L. 82.
 Rp. 84, 265—270.
 Codeinum. L. 138. Rp. 535.
 Coffeinum. L. 83.
 — citricum. L. 83. Rp. 271.
 — natrio-benzoicum. L. 83.
 Rp. 272, 273.
 — natrio-salicylicum. L. 83.
 Rp. 274.
 Cognac. L. 83.
 Colchici semina. L. 84.
 Colchicinum. L. 84. Rp. 275.
 Collodium. L. 84. Rp. 32, 349.
 — flexile. L. 84. Rp. 59, 314.
 Collutorium. L. 8.
 Collyrium adstringens luteum.
 L. 84.
 Colocynthis. L. 84. Rp. 278.
 Colophonium dep. flav. L. 85.
 Conchininum sulfur. l. Chinidi-
 num sulfur.
 Condurango cortex. L. 85.
 Rp. 281, 282.
 Conii maculati herba. L. 85.
 Coniinum. L. 85.
 Coniinum hydrobromic. L. 85.
 Convallariæ majalis herba. L. 86.
 Rp. 283.
 Coriandri fruct. L. 86.
 Coto cortex. L. 86.
 Cotoinum. L. 86. Rp. 286.
 Cremor tartari l. Kalium hydro-
 tartar.
 Creolin. L. 86.
 Creta alba l. Calcium carbon.
 nativ.
 Crocus gallic. L. 86.
 Crotonis semina. L. 87.
 Cubebæ fruct. L. 87. Rp. 289.
 Cucurbitæ semina. L. 87. Rp. 291.
 Cuprum aluminatum. L. 88.
 — sulfuric. L. 88.
 Rp. 97, 292—295.
 Datura stramonium. L. 88.
 Decoctum. L. 9.
 — Zittmanni fortius. L. 88.
 — — mitius. L. 88.
 Dextrinum. L. 88.
 Diethylacetal. L. 30.
 Digestum. L. 9.
 Digitalis fol. L. 89.
 Rp. 244, 296—304, 344, 429, 605.
 Dimethylacetal. L. 30.
 Dimethylæthylcarbinol l. Amy-
 lenum hydrat.
 Dimethyloxychinicin. l. Anti-
 pyrin.
 Duboisinum sulfuric. L. 90.
 Elæosacchara. L. 90.
 Electuaria. L. 7.
 Electuarium lenitiv. L. 155.
 Elixirium acidi Halleri l. Liquor
 acid. Halleri.
 Emplastra omnia. L. 7. és 90.
 Emplastrum cantharid.
 L. 71. és 90. Rp. 224.
 Emulsiones. L. 9.
 Emulsio amygdalina. L. 52.
 Rp. 121.
 — oleosa. L. 52.
 Ergotinum l. Extract. secalis
 cornuti spissum.
 Eserinum salicyl. l. Physostig-
 min. salicyl.
 Eucalypti folia. L. 91.
 Euphorbium. L. 91.
 Extracta fluida. L. 91.
 Extractum aconiti. L. 43.
 — aloes. L. 46. Rp. 76, 89, 90, 91.
 — belladonnæ. L. 61.
 Rp. 166—170, 634.
 — calumbæ. L. 68. Rp. 208, 209.
 — cannabis indicæ. L. 71.
 Rp. 219, 220.
 — cascaræ sagradæ fluid. L. 72.
 Rp. 225, 226.
 — cascarillæ. L. 73. Rp. 228.
 — centaurii. L. 74. Rp. 242.
 — chinæ. L. 75.
 Rp. 88, 239, 240, 242, 310.

- colocynthidum. L. 84.
Rp. 90, 279.
- conii. L. 85.
- cubebærum æthereo-spiri-
tuos. L. 87. Rp. 290.
- ferri pomati l. Extr. malat.
ferri.
- filicis marisæthereum. L. 96.
Rp. 332, 333, 440.
- gentianæ. L. 97. Rp. 310.
- hamamelidis fluidum. L. 100.
Rp. 345.
- hydrastis fluidum. L. 105.
Rp. 364.
- hyosiami folior. L. 105.
Rp. 78, 121, 219, 365, 366.
- malalis ferri. L. 92. Rp. 312.
- nucis vomicæ. L. 133.
Rp. 75, 168, 184, 186, 309, 497,
498.
- opii. L. 137. Rp. 517—519.
- piscidiæ fluidum. L. 143.
Rp. 545, 546.
- punicæ granati. L. 98.
Rp. 339.
- quassia. L. 146.
- quebracho. L. 146.
- ratanhæ dep. L. 147.
Rp. 558, 559, 560.
- rhei. L. 148.
Rp. 87, 89, 90, 565, 569.
- scillæ. L. 152. Rp. 582, 583.
- secalis cornuti spiss. pro so-
lut. L. 153. Rp. 586, 587.
- — — sicc. pro pulv. L. 153.
Rp. 588, 589.
- trifolii febrini. L. 163.
- Farina seminum lini. L. 122.
- — sinapis. L. 155.
- Fel. tauri inspissatum. L. 91.
Rp. 91.
- Ferrum carbonic. sacchar. L. 92.
Rp. 309.
- lact. L. 92.
Rp. 89, 199, 204, 310, 321, 322,
357.
- natrio-pyrophosphor. L. 92.
Rp. 311.
- oxydatum dialys. solut. L. 92.
Rp. 323, 324.
- sulfur. solut. L. 93.
- pulveratum. L. 92. Rp. 306.
- reductum. L. 92.
Rp. 203, 307, 308, 319.
- sesquichlor. cryst. L. 93.
Rp. 314.
- — — solut. L. 93.
Rp. 315, 326—328.
- sulfur. oxydul. L. 93.
Rp. 251, 316.
- Filicis maris rhizoma. L. 96.
- Filum sericeum antisept. L. 36.
- Flores salis ammoniaci martia-
les l. Ammon. chlorat. ferrat.
- benzoës. l. Acid. benzoic.
- sulfuris l. Sulfur sublimat. lot.
- zinci l. Zincum oxydatum.
- Fœniculi fructus. L. 96.
- Fürdök, mesterségesek. L. 13.
- Gallæ. L. 97.
- Gargarisma. L. 8.
- Gaze carbolat. album. Listeri.
L. 36.
- hydrarg bichlor. corr. im-
prægn. L. 101.
- jodoformio imprægn. L. 110.
- salicyl. L. 241.
- Gelatina animalis albiss. L. 97.
- Gelsemii radix. L. 97.
- Gentianæ rad. L. 97.
Rp. 195, 335, 336.
- Globuli martiales. L. 93.
- Glycerin. L. 97. Rp. 305.
- Goa pulvis l. Araroba.
- Granati cortex radices. L. 98.
Rp. 337, 338.
- Guajacum. L. 98.
- Guarana. L. 98. Rp. 341, 342.
- Gummi arab. L. 99.
- kino l. Kino.
- gutti. L. 100.
Rp. 90, 343, 344.

- Guttæ. L. 8, 10, 11.
 Guttapercha dep. L. 99.
 Gutti l. Gummi gutti.
 Gypsum ustum l. Calc. sulf. ust.
- Hamamelis virginica. L. 100.
 Helenin. L. 100.
 Helleborus viridis. L. 100.
 Hepar sulfuris. l. Kalium sulfurat.
 pro balneo.
- Hirudo. L. 101.
 Homatropin. hydrobrom. L. 61.
 — sulf. L. 61.
 Hydrargyrum. L. 101.
 — bichlor. ammon. L. 101.
 Rp. 346, 347.
 — — carbamid. solut. L. 104.
 — — corros. L. 101.
 Rp. 266, 348—352.
 — bijodal. rubr. L. 102.
 Rp. 353, 354.
 — chlorat. mite. L. 102.
 Rp. 355, 360.
 — cyanat. L. 102.
 — formamid. solut. L. 104.
 — jodal. flav. L. 102. Rp. 362.
 — oxydat. flav. L. 102. Rp. 362.
 — peptonat. L. 104.
 — sulfurat. rub. L. 102.
 — tannic. oxydul. L. 105. Rp. 363.
 Hydrastis canadensis rhiz.
 L. 105.
 Hydrochinonum. L. 105.
 Hydrogenium hyperoxyd.
 L. 105.
 Hydromel infant. L. 155. Rp. 597.
 Hyosiami folia. L. 105.
 Hyoscinum hydrochlor. L. 106.
 — hydrojod. L. 106.
 Hyosciaminum cryst. L. 106.
 Rp. 368.
 Hypnonum. L. 31. Rp. 5, 6, 7.
- Ichthyocola. L. 106.
 Ichthyolum. L. 106.
 Rp. 369—372.
 Infusum. L. 9.
- laxat. L. 154. Rp. 593, 595.
 — rhei cum natrio carbon.
 L. 149. Rp. 571.
 — sennae compos. l. Inf. laxat.
 Injectiones subcutaneæ. L. 8.
 Ipecacuanhæ rad. L. 107.
 Rp. 18, 112, 220, 365, 373—378,
 433, 434.
 Iris florentina. L. 108.
- Jaborandi folia. L. 108.
 Jalapæ tubera. L. 109.
 Rp. 343, 359, 382.
 Jequirity semina. L. 109.
 Jodoformium cryst. L. 109.
 Rp. 384—389.
 Jodolum. L. 110. Rp. 390, 391.
 Jodum. L. 111. Rp. 392—395.
 Juniperi baccæ. L. 111. Rp. 398.
- Kairinum. L. 112.
 Kalium acet. sol. L. 112.
 Rp. 301, 302, 398—402, 581, 585.
 — bromat. L. 112.
 Rp. 108, 171, 403—406.
 — carbon. crud. L. 113.
 — — par. L. 113. Rp. 316.
 — — solut. L. 113. Rp. 407, 408.
 — chloric. L. 113.
 Rp. 99, 410—413, 460.
 — hydrooxyd. L. 114.
 — hydrotartaric. L. 114.
 Rp. 414—416.
 — hypermangan. L. 115.
 Rp. 417, 418.
 — jodal. L. 115.
 Rp. 353, 419, 421—425.
 — natrio-tartaric. L. 116.
 Rp. 126, 127.
 — nitric. L. 116.
 Rp. 297, 428—430.
 — stibio-tartaric. L. 117.
 Rp. 431—434.
 — sulfurat. pro balneo. L. 118.
 — sulfur. L. 118. Rp. 435.
 — tartar. L. 118. Rp. 436.
 Kamala. L. 118.

- depun. L. 118. Rp. 437—440.
- Kephir. L. 119.
- Kermes minerale l. Stibium sulfurat. rubr.
- Kino. L. 119.
- Klysmā. L. 9.
- Leube-Rosenthal-fële hús-pancreas. L. 10.
- Kreosolum. L. 119. Rp. 442—445.
- Kumys. L. 120.
- Kusseinum cryst. L. 120. Rp. 449.
- Kusso flores. L. 120.
- Rp. 446—448.
- Lac. sulfur. l. Sulfur. præcip.
- Lactucarium german. L. 120.
- Rp. 253, 450, 451.
- Laminaria. L. 121.
- Lamina guttapercha. L. 100.
- Lana gossypii dep. Brunsī. L. 121.
- — carbol. L. 36.
- Lana gossyp. hydrarg. bichlor. corr. impregn. L. 102.
- — salicyl. L. 41.
- Lanolinum. L. 121.
- Lapis divinus l. Cupr. aluminat.
- ophthalmic. l. Cupr. aluminat.
- Lichen islandic. L. 121. Rp. 452.
- Ligroin l. Aether petrolei.
- Limonada solvens. l. Potio magnes. citr. efferv.
- Linclus gummos. L. 99.
- Linimenta. L. 8.
- Linimentum ammoniat. L. 52.
- saponato-camphor. L. 69.
- styracis. L. 158.
- volatile l. Liniment. ammoniat.
- Lini semina. L. 122.
- Liparin. L. 122.
- Liquiritiæ rad. L. 122.
- Liquor acidus Halleri. L. 42.
- ammon. acet. l. Ammon. acet. solut.
- anodyn. Hoffmanni l. Spir. æther.
- ferri oxyd. L. 92.
- holland. l. Aethylenum chlorat.
- kali arsenic. l. Solut. arsen. Fowleri.
- natrii caust. Rp. 136.
- Lithium carbon. L. 122. Rp. 453.
- citricum. L. 123.
- jodatum. L. 123.
- salicyl. L. 123.
- Lobeliæ herba. L. 123.
- Lupulæ glandulæ. L. 123. Rp. 455.
- Lycopodium. L. 123.
- Lythargyrum l. Plumb. oxyd.
- Lytta vesicatoria. l. Canthar.
- Maceratum. L. 9.
- Magister. bismulhi l. Bismuth. subnit.
- Magnesia carbon. l. Magnes. carb. hydrooxyd.
- Magnesium carbonic. hydrooxydat. L. 123. Rp. 196, 456—458.
- hydrooxydat. L. 124.
- oxydat. L. 124.
- sulfur. L. 124.
- Magnesia usta in aqua l. Magnes. hydrooxyd.
- usta l. Magnes. oxydat.
- Malva fol. et flor. L. 124. Rp. 460.
- Manganum hyperoxyd. L. 125.
- Manna. L. 125.
- Mannitum. L. 125. Rp. 461.
- Mastiche. L. 125. Rp. 462.
- Matico fol. L. 125.
- Mel crud. L. 125.
- dep. L. 125.
- rosat. L. 126.
- Meliæ fol. L. 126. Rp. 463.
- Menthæ pip. fol. L. 126. Rp. 463.
- Mentholum. L. 126. Rp. 464—467.
- Mercurius vivus l. Hydrarg.
- præcip. alb. l. Hydrarg. bichlor. ammon.
- Methylalum. L. 127.
- Rp. 468—470.
- Methylenum bichlor. L. 127.
- Minium l. Plumb. hyperoxyd. rubr.

Miscella pro solut. calc. oxysulfur. L. 127.

Mixturæ. L. 8.

— agitandæ. L. 8.

— mediæ. L. 8.

Mixtura gummos. L. 99.

— oleoso-balsam. l. Bals. vitæ Hoffmanni.

Mollinum. L. 127.

Morphinum. L. 138.

— hydrochlor. L. 138.

Rp. 12, 86, 102, 120, 123, 132, 176, 182, 187, 188, 258, 527—534.

Moschus. L. 127.

Rp. 22, 211, 471, 473.

Mucilago Gummi arab. L. 99.

Naphtalinum puriss. L. 128.

Rp. 474.

Naphtholum. L. 128.

Rp. 475—478.

Natrium acet. cryst. L. 129.

— benzoic. L. 129.

— bicarb. l. Natr. hydrocarb.

— borac. L. 129. Rp. 479, 480.

— bromat. L. 129.

Rp. 107, 403, 481, 482.

— Carbon. cryst. L. 130.

— caust. solut. l. Natr. hydroxyd. solut.

— hydrocarb. seu bicarb. L. 130.

Rp. 133, 171, 253, 483—487.

— hydroxyd. solut. L. 131.

— jodat. L. 131.

— nitr. L. 131.

— nitros. L. 131.

— phosphor. L. 131.

Rp. 488—490.

— salicyl. L. 132. Rp. 491—493.

— silicic. liqu. L. 132.

— sulfur. cryst. L. 132.

Rp. 336, 494, 495.

— tartar. L. 133.

Nitroglycerin. L. 133.

Nux moschata. L. 133.

— vomica. L. 133.

Olea ætherea. L. 134.

Oleum amygdalar. dulcium.

L. 52.

— cacao. L. 135.

— cadini. L. 135. Rp. 507—511.

— camphorat. L. 69. Rp. 210.

— crotonis. L. 87. Rp. 287, 288.

— eucalypti amygdalinum. L. 91 és 134.

— hyosciami folior. coct. L. 105. Rp. 260, 367.

— jecoris aselli flav. L. 136.

— juniperi. L. 134. Rp. 501, 502.

— lauri. L. 136.

— lini lot. L. 132. Rp. 135.

— venale. L. 122.

— martis l. Ferrum sesquichlor. solut.

— ricini. L. 136. Rp. 512, 513.

— santali ligni. L. 134.

— sesami. L. 137. Rp. 615.

— sinapis. æther. L. 134.

— succini rectific. L. 134.

— terebinthinæ rectificat.

L. 135. Rp. 30, 81, 503—506.

Ononidis spinos. rad. L. 137.

Rp. 430, 514.

Opium. L. 137. Rp. 75, 515, 516.

Oxychloridum ferri solut. l. Liqu. ferri oxyd.

Oxymel scillæ. L. 153. Rp. 585.

— simplex. L. 140.

Panna. L. 140.

Papaynum. L. 110. Rp. 536.

Papaveris somniferi capita.

L. 141.

Paraffinum. L. 141.

Paraldehydum. L. 141. Rp. 537.

Pasta caust. vienn. Rp. 201.

— canquoini. L. 167.

Rp. 635, 636.

— guarana l. Guarana.

— Landolfii. L. 167. Rp. 637.

Pastilli. L. 7.

Pelletierinum tan- } Rp. 340.

nicum. } L. 98.

— sulfur.

- Pepsinum german. solut. L. 141.
 Rp. 538—540.
 Petroleum rectific. L. 142.
 Phenacetinum l. Acetphenetidin.
 Phosphorus. L. 142.
 Rp. 541—543.
 Pysosligminum salicyl. L. 143.
 Picrotoxinum. L. 148. Rp. 544.
 Pilocarpinum hydrochlor. L. 108.
 Rp. 379—381.
 Pilulae. L. 6.
 — Blancardi. l. Pilulae ferri jodati.
 — Blandi. Rp. 316.
 — ferratae. L. 92.
 — ferri jodati. L. 93. Rp. 318.
 — Heimi. Rp. 244.
 — — hydrogogae. Rp. 344.
 — laxantes. L. 46.
 Piscidae erythrinae cort. L. 143.
 Pix liquida. L. 143. Rp. 547—549.
 Placenta semin. lini. l. Farina sem. lini.
 Plumb. acetic. bas. sol. L. 144.
 Rp. 95, 645.
 — — depurat. L. 144.
 Rp. 550—553.
 — carbon. L. 145.
 — hyperoxyd. rubr. L. 145.
 — oxydat. L. 145.
 Po de Bahia l. Araroba.
 Podophyllum. L. 145.
 Rp. 554, 555.
 Polio magnes. citr. efferv. L. 146.
 — — Riveri. L. 113. Rp. 409.
 Pulpa prunorum. L. 146.
 — tamarindor. L. 160.
 Rp. 415.
 Pulveres. L. 6.
 Pulvis aërophor. L. 146.
 — — Seydlitziensis. L. 146.
 — Doveri. L. 138.
 Rp. 71, 73, 101, 183, 185, 186, 189, 208, 233, 342, 358, 525, 526.
 — goa l. Araroba.
 — gummos. L. 99.
 — ipecacuanhae cum opio l. Pulvis Doveri.
 Punice granati cort. l. Granati punice cort.
 Pyridinum. L. 146.
 Pyrogallolum l. Acid. pyrogall.
 Quassiae lignum. L. 146.
 Quebracho cort. L. 146.
 Quercus cort. L. 146.
 Quillajae cort. L. 146. Rp. 556.
 Ratanhae rad. L. 147. Rp. 557.
 Resina jalapae. L. 109. Rp. 383.
 — pini burgundica. L. 148.
 Resorcinum. L. 148. Rp. 563, 564.
 Rhei rad. L. 148.
 Rp. 195, 306, 310, 343, 365—368.
 Ricini semina. L. 149.
 Roob juniperi. L. 111. Rp. 399.
 — sambuci. L. 151.
 Rosmarini folia. L. 149.
 Sabadillae semina. L. 149.
 Sabineae summitates. L. 150.
 Saccharinum. L. 150. Rp. 572.
 Saccharum. alb. L. 150.
 — lact. L. 150.
 — saturni l. Plumb. acet. depur.
 Sal ammoniacum depur. l. Ammon. chlorat.
 — Seignetti l. Kalium natriotartar.
 — thermar. Carolinar. L. 132.
 Salep tubera. L. 150.
 Rp. 52, 103, 573, 574.
 Salmiak l. Ammon. chlorat.
 Salolum. L. 150. Rp. 575—578.
 Salviae fol. L. 151. Rp. 9.
 Sambuci cymae seu flor. L. 151.
 Rp. 104.
 — fruct. L. 151.
 Santali ligni oleum. L. 151.
 Santoninum. L. 80. Rp. 262—264.
 Saponess officinales. L. 151.
 Sarsaparillae rad. L. 152.
 Rp. 579, 580.

- Saturaciones. L. 9.
 Scillæ bulbosus. L. 152.
 Rp. 303, 344.
 — siccata. L. 152. Rp. 581.
 Sebum ovile. L. 153.
 Secale cornutum. L. 153.
 Senegæ rad. L. 154. Rp. 590, 591.
 Sennæ fol. L. 154. Rp. 592.
 Serum lactis commune. L. 155.
 Sinapis semina. L. 155.
 Solutio arsenic. Fowleri. L. 32.
 Rp. 14—16, 325.
 — calc. oxysulfur. l. Solut. Vlemingckx.
 — Vlemingckx. L. 68.
 — Lugoli. Rp. 392—394.
 Sparteinum sulfur. L. 156.
 Rp. 598, 599.
 Species. L. 6.
 — althææ. L. 47.
 — amaricantes. L. 156.
 — laxant. St. Germain. L. 154.
 Sperma ceti l. Celaceum.
 Spiritus seu Spiritus vini. L. 156.
 — ætheris. L. 54.
 — — chlorati. L. 156.
 — — nitrosi. L. 156.
 — aromat. L. 156.
 — dilut. L. 156.
 — camphor. L. 69.
 — ferri sesquichlor. æther. L. 93.
 Rp. 330.
 — Mindereri l. Ammon. acet. solut.
 — salis ammon. anis. l. Ammon. anis. liquor.
 — saponal. L. 157.
 — saponis kalini. L. 157.
 — sinapis. L. 156.
 — vini gallici.
 Spongia pressa. L. 157.
 Stibium sulfurat. aurant. L. 157.
 Rp. 344, 600—602.
 — — nigrum. L. 157.
 — — rubrum. L. 157.
 Strophanti hispidi semina.
 L. 157.
 Strychinum nitr. L. 133. Rp. 496.
 Styrax liquidus. L. 158.
 Succus liquirit. dep. } L. 122.
 — — venal. }
 Sulfonal. L. 158. Rp. 606.
 Sulfur. aurat. antimonii l. Stib. sulfur. aurant.
 — depurat. l. Sulfur. subl. lot.
 — præcip. L. 159.
 Rp. 25, 607—609.
 — subl. lotum. L. 159.
 Rp. 25, 607—609.
 Suppositoria. L. 7.
 Syrupi officinales. L. 160.
 Syrupus diacodii. L. 160.
 — ferri jodati. L. 93 és 160.
 Rp. 317, 329, 331.
 — mannatus. L. 154 és 160.
 Rp. 596.
 — sennæ cum manna l. Syrup. mannatus.
 Tablettæ compressæ. L. 7.
 Talcum venet. L. 160. Rp. 60.
 Tamarindor. pulpa. L. 160.
 Rp. 612.
 Tanninum l. Acid. tannic.
 Taraxacum. L. 160.
 Tartarus depur l. Kalium hydro-tartaric.
 — emeticus l. Kalium stibio-tartar.
 — natronatus l. Kalium natrio-tartar.
 Tela sericea protegens. L. 36.
 Terebinthina communis. L. 161.
 — veneta. L. 161.
 Terpinum hydratum. L. 161.
 Rp. 613, 614.
 Terpinol. L. 165. Rp. 615.
 Tetrajodpyrol l. Jodol.
 Thallinum sulfur. L. 162.
 Rp. 616, 617.
 — tartar. L. 162.
 Thymolum. L. 162. Rp. 618, 619.
 Tilix flor. L. 162.

- Tinctura absinthii comp. L. 30.
 Rp. 2.
 — aconiti. L. 43.
 — aloës. L. 46. Rp. 92.
 — arnicæ. L. 58. Rp. 153.
 — amara. L. 162. Rp. 14, 325.
 — belladonnæ. L. 61.
 Rp. 171, 173.
 — benzoës. L. 62. Rp. 177, 178.
 — cannabis indicæ. L. 71.
 Rp. 221.
 — cantharidum. L. 71. Rp. 223.
 — cascariillæ. L. 73. Rp. 227.
 — castorei. L. 73.
 Rp. 231, 232, 521.
 — chinæ simpl. L. 75.
 — — comp. L. 75.
 Rp. 92, 241, 243, 313.
 — cinnamomi. L. 81.
 — colchici semin. L. 84.
 Rp. 276, 334.
 — colocynthidum. L. 84.
 Rp. 280.
 — convallariæ majalis. L. 86.
 Rp. 284.
 — coco. L. 86. Rp. 245.
 — digitalis. L. 99.
 Rp. 300, 302, 398, 401, 502.
 — eucalypti. L. 91. Rp. 305.
 — ferri pomati l. Tinct. malat.
 ferri.
 — ferri acetici ætherica. L. 92.
 — gallar. L. 97.
 — gelsemii. L. 97. Rp. 334.
 — guajaci. L. 99.
 — ipecacuanhæ. L. 107.
 Rp. 221, 454, 520.
 — jodi. L. 111. Rp. 396, 397.
 — lobeliæ. L. 123. Rp. 454.
 — malatis ferri. L. 92.
 Rp. 15, 313, 325.
 — moschi. L. 127. Rp. 472.
 — nervino tonica Bestuscheffi
 l. Spir. ferri sesquichlor. æther.
 — nucis vomic. L. 133.
 Rp. 242, 313, 500.
 — opii simpl. L. 137.
 Rp. 276, 277, 521—523, 647.
 — opii crocata. L. 137.
 Rp. 521, 524, 640, 646.
 — ratanhæ. L. 147. Rp. 561, 562.
 — rhei Darelli seu vinosa. L. 148.
 Rp. 2, 194, 243, 570.
 — — aquosa. Rp. 134.
 — roborans Whyti l. Tinct.
 chinæ comp.
 — seminum strophanti. L. 158.
 Rp. 613—605.
 — stramonii. L. 88.
 — valerianæ ætherica. L. 174.
 Rp. 82, 153, 520.
 — — spirituosâ. L. 174.
 Rp. 231, 472, 524.
 — zingiberis. L. 168.
 Tragacantha. L. 163.
 Trifolii febrini fol. L. 163.
 Trochisci. L. 7.
 Tubuli præparati carbolati.
 L. 36.
 Uncomocomo rhiz. l. Panna.
 Unguenta. L. 7 és 163.
 Urethanum. L. 163.
 Rp. 620, 621.
 Uvæ ursi fol. L. 164. Rp. 622.
 Valerianæ rad. L. 164.
 Rp. 155, 170, 624—627, 634, 642.
 Vaselina. L. 165.
 Veratrinum. L. 165.
 Rp. 628—630.
 Vinum chinæ. L. 75.
 — colchici. L. 84. Rp. 277.
 — Huxhami l. Vinum stibiato-
 tartar.
 — pepsini. L. 141.
 — stibiato-tartar. L. 117.
 Rp. 105.
 Xylolum. L. 166. Rp. 631, 632.
 Zedoariæ rhiz. L. 166.

Zincum aceticum. L. 166.

Rp. 633, 634.

— chloratum. L. 166.

Rp. 635—638.

— oxydatum. L. 167.

Rp. 57, 170, 639—642.

— sulfuricum. L. 167.

Rp. 9, 643—648.

— valerianicum. L. 168.

Rp. 649, 650.

Zingiberis rhiz. L. 168.



BETEGSÉGEK TÁRGYMUTATÓJA.

(A számok a vényekre vonatkoznak.)

- Abscessus pulm. 35.
 Acne disseminata 607.
 Alopecia 223.
 Amyloidea degener. 317, 318.
 Anæmia l. Olygæmia.
 Angina catarrh. 93, 98, 99, 410.
 412, 413, 558.
 Antipyreticum 3, 4, 128, 129,
 247, 248, 249, 254, 491, 493, 577,
 578, 617.
 Antispasmodicum 154, 155, 231,
 463, 472, 621, 623, 627.
 Arsenessaval mérgezés 125, 459.
 Arthritis uratica 275—277, 453,
 484, 489.
 Ascaris lumbricoides. 262—264.
 Asthma nervosum 13, 423, 454.
 Blandi pilul. 316.
 Brighti morb. 42, 76.
 Bronchoblennorrhœa 158—161,
 164, 165.
 Bronchiectasia 619.
 Bronchitis feclida 34, 619.
 Cachexia malar. infant. 325.
 Conquoini pasta 635, 636.
 Carcinoma ventr. 281, 282.
 Cardiacum 79, 80, 283, 284, 296,
 299, 304, 429, 598, 599, 603—605,
 Cardialgia 184, 267, 467.
 Catarrh. bronchialis 118—121,
 219—221, 365, 374, 407, 485, 504.
 Catarrh. bronchialis infant. 366,
 486.
 Catarrh. intest. 435, 474, 495,
 566.
 Catarrh. intest. infant. acut.
 103, 185, 560, 562, 574.
 Catarrh. intest. chron. infant.
 186, 189, 207, 342.
 Catarrh. ventr. acut. 483, 484,
 497.
 Catarrh. ventr. chron. 336, 435,
 495, 566.
 Chlorosis 11, 15, 89, 117, 251,
 255, 306, 313, 316, 319, 320, 323,
 324.
 Cholera infant. 444.
 Cholelithiasis 81, 484, 494.
 Chorea minor 14, 16, 170, 640,
 650.
 Colica saturnina 176, 530, 534.
 Colloodium stipticum 314.
 Combustio 24, 135, 466.
 Comedones 607.
 Conjunctiv. catarrh. 68, 94, 143,
 550, 643.
 Coryza catarrh. 37.
 Croup 48, 136, 407, 536.
 Cystitis catarrh. 26, 53, 61, 144,
 158—161, 289, 290, 411, 506, 563,
 622, 623.
 Decubitus 575.
 Defluvium capillor. 162, 163,
 240.
 Delirium tremens 107, 108, 217,
 218.
 Diabetes mellitus 14, 40, 50, 175,
 389, 484, 516, 572.
 Diaphoreticum 104, 379, 463.
 Diarrhœa dispeptica infant. 227.
 Diarrhœa 72, 73, 75, 101, 183,

- 188, 206, 208, 233, 234, 285, 286,
 374, 474, 500, 517, 520, 525, 535,
 552, 557, 559, 573.
 Diphtheritis 29—31, 48, 138,
 326, 380, 412, 413, 536.
 Diureticum 190, 272, 274, 283,
 284, 301, 302, 303, 360, 398, 402,
 414, 430, 436, 502, 514, 581, 585,
 605.
 Diureticum vinum 581.
 Drasticum 90, 278—280, 287,
 288.
 Dysenteria 145, 327.
 Dysmenorrhœa 531, 532, 546.
 Dyspepsia acidâ infant. 133, 134,
 139, 487.
 Dyspepsia gastrica 45, 46, 538,
 540.
 Dyspepsia infant. 539.
 Eccema 56—58, 135, 370, 476,
 477, 510, 549, 576.
 Eccema margin, 126, 127, 140,
 141.
 Eclampsia infant. 405, 473, 641.
 Emelicum 130, 131, 294, 295,
 375, 376, 432, 433, 434, 648.
 Enteritis follic. infant. 149, 327.
 Enuresis nocturna infant. 168.
 Epilepsia 107, 108, 124, 170, 175,
 217, 218, 403, 404, 406, 481, 482,
 634, 640, 649.
 Erosiones port. vagin. uteri 69.
 Excitans 17, 37, 111, 150, 152,
 153, 211—215, 229, 230, 232, 471,
 626.
 Excoratio 135.
 Expectorans 18—20, 22, 105,
 116, 113—116, 132, 150, 373, 377,
 378, 408, 431, 519, 535, 556, 590,
 591, 600—602, 613—615.
 Favus 369, 476, 477, 508, 511,
 548, 549.
 Gangræna pulm. 34, 35, 619.
 Gonorrhœa 71, 95, 96, 97, 167,
 181, 289, 290, 455, 506, 551, 616,
 633, 644, 645, 646.
 Hæmatemesis 315, 552.
 Hæmaturia 101, 587, 589.
 Hæmierania 83, 84, 271, 272,
 274, 364, 341.
 Hæmoptœ 101, 315, 505, 552,
 586, 588, 587, 589.
 Heimi pilul. 244.
 Heimi pilul. hydrogog. 344.
 Herpes tonsurans 25, 126, 127,
 140, 141, 476, 477, 508, 511, 548,
 549.
 Hydrocele 394.
 Hyperemesis 235, 267, 394, 409,
 458, 467.
 Hyperidrosis 60, 85, 86, 175, 475.
 Hypnoticum 5, 67, 122, 123, 193,
 222, 256, 257, 468—470, 534, 537,
 600, 620, 621.
 Hysteria 154, 155, 231, 472, 642,
 649.
 Hystero-epilepsia 107, 108, 217,
 218.
 Ichthyosis 11, 56.
 Icterus catarrh. 483, 567.
 Icterus catarrh. infant. 415, 416,
 568, 612.
 Impotentia 498.
 Insomnia l. Hypnotica.
 Intertrigo 639.
 Landolfii pasta 637.
 Laryngitis catarrh. 142, 647.
 Laxans 87, 91, 225, 226, 426,
 488, 512, 555, 571, 592, 593, 609.
 Laxans pro infant. 427, 513, 570,
 594—597.
 Lithiasis infant. 490.
 Lupus 10, 54.
 Lymphoma maligna 11, 14.
 Malaria 11, 14, 245, 246, 248,
 247, 252, 254.
 Mania 258.
 Menorrhagia 52, 345, 364.
 Metrorrhagia 52, 63, 345, 364,
 586—588.

- Mydriaticum 172.
 Nephritis scarlatinosa 74, 328.
 Neuralgia 14, 47, 77, 78, 192,
 248, 260, 273, 334, 367, 419, 420,
 464, 527, 530, 532, 577.
 Obstip. habit. 383, 554, 565, 608.
 Obstip. habit. infant. 457, 461.
 Oedema pulm. 21, 553.
 Olygæmia 251, 255, 306—313,
 316, 330.
 Pagenstecher kenôcs 362.
 Palpit. cordis. nerv. 300, 428,
 429, 598, 599.
 Pasta Canquoini 635, 636.
 Pasta caust. vienn. 201.
 Pasta Landolfi 637.
 Perniones 43, 442.
 Pertussis 171, 173, 305, 381.
 Phagedenica ulcera 55.
 Phthisis pulm. 443, 445, 451, 467.
 Phthisis pulm. infant. 253.
 Pilul. Heimi 316.
 Pilul. Heimi 244.
 Pilul. hydrogog. Heimi 344.
 Pityriasis versicolor 126, 127,
 140, 141, 476, 477, 511.
 Pneumonia catarrh. 106, 112.
 Polyarthrit. rheumat. acuta 36,
 492, 577, 578.
 Proctitis catarrh. 70.
 Prolapsus ani 499.
 Prostatitis 167, 518, 529.
 Prurigo 39, 215.
 Prurigo infant. 509.
 Pruritus 576.
 Pruritus vulvæ et ani 100, 261,
 639.
 Psoriasis 11, 39, 54, 126, 127,
 140, 141, 205, 369, 476, 477.
 Pulvis dentifritius 196.
 Pyelitis catarrh 158—161, 411,
 622, 623.
 Pyrosis 198, 459, 484.
 Rhachitis 199, 202, 204, 321,
 542, 543.
 Rheumatism. muscul. 260, 275—
 277, 367, 392, 419, 420, 501, 503.
 Salivatio 175.
 Sarcina ventr. 38, 443, 564.
 Scabies 179, 205, 478, 511, 547,
 610, 611.
 Scrophulosis 14, 317, 318, 322,
 329, 331, 425.
 Seborrhœa 178.
 Soor 479.
 Spasmus glottidis infant. 156.
 Spasmus urethræ 167.
 Stenocardia 124.
 Stomatitis aphthosa 99, 137,
 460, 480.
 Stomatitis catarrh. 93, 99, 410,
 412, 413, 460, 538.
 Stomatitis ulcerosa 418.
 Syphilis 352, 353, 351, 356, 361,
 363, 388, 389, 390, 421, 424, 579, 580.
 Syphilis congen. 357, 358.
 Syphilitica ulcera 350, 355, 349,
 354, 422.
 Taenia 291, 332, 333, 337—340,
 437—440.
 Tenesmus 167, 265, 267, 518, 523.
 Tetanus et trismus neonat. 259.
 Tic douloureux 192, 464.
 Tonsillitis follicul. 99, 460.
 Trichiniasis 180.
 Trismus et tetanus neonat. 259.
 Tuberculosis intest. (diarrhœa)
 102, 187.
 Tubercul. laryngis 49, 528.
 Tussis convuls. l. Pertussis.
 Ulcus molle 346, 354, 384, 391.
 Ulcus ventriculi 184.
 Uremia 17, 379.
 Variola 631, 632.
 Vesicans 224.
 Vinum diureticum 581.
 Werlhoffi morb. macul. 67, 237.

TARTALOM.

	Lap
Előszó	3
Vényszerkesztéstani jegyzetek	5
Jegyzetek némely mérlékről	10
Jegyzetek a cseppekről	10
Czélszerűtlen és veszélyes gyógyszerkeverékek	11
Fürdők. Mesterséges fürdők	13
Bőr alá fecskendésre használt szerek oldatai	14
Belégzésre használt szerek oldatai	16
Gyermekgyógyászati gyakorlatban fontosabb szerek adagai	17
Legnagyobb adagok táblázata	24
Chémiai készítmények oldékonysága (táblázat)	26
Vénygyűjtemény	30
Gyógyhelyek és gyógyvizek átnézete	169
Gyógyszerek tárgymutatója	184
Betegségek tárgymutatója	197

JEGYZETEK.



R_x Cerae flav.
Lanolin anhydrous.
aa. 40.0

Ol. olivar 20.0
(mixture of ol. olivar. benzoic)
Mise f. pasta usque ad
refrigerat. agitant.

R_x Cist. salicif. subdill. pulv.
Querc. tria

Ol. oliv. 9 to 17.0
Cer. flavae
Lanolin

aa. q to 40.0
Mf. pasta.

S. Ectema per ureas et holagras
at arginias

R Thyrog. praecip. albi 10.0
 Sapon. natrii. 40.0
 Linalin. anisat. 50.0
 Mf.

Dr. Psoriasis capitis ellen.

Dr. Valentini Diabetes Mellitus ellen
 agalya prostat pro die 4 cepps
 saponis emulsiue 10 ceppis

Marotti muscular Chorea minor
 ellen hiteg v. receptum agaly

Dr. Sakli antifebril angina
tonsillaris ellen 0.5 grm. eggerre.
 Szimulati a fejfájás nyelési és rágási
 mozgásokkal. Ha a fájdalom ismét
 beáll a szer ismétlandó.

Agalyuod scarlatina és diftheritis el.

Gyermekes Brachypneumonia

Ita a baj lehang is erő hangattai
mics 0.01 - 0.02 apomorph. muria

pro die, két ellen pedig Antipyrin

Ita nag, foka disporacé is erő
hangattai van :

Pp. Annon. carbon 1.0

Spir. rectificati 10.0

Cig. clea 100.0

Syr. albu. 20.0

Mt. trassint és vány rakt.

Ita szörös körepe van az. vics
lepusó, sa szoda levegő is van
gökörel legyen kelteve.

Ita a lés g szint sa lekvétel
vender Pp. Infus. ras. ipl. a. 0.30

Lig. anon. ami 1.0

ad col. 100.

Po'fajás

R. Chloroform pur.

Aeth. aet.


Spir. Aromat

ao. g. so. delem

O. menth. jap

G. lo. tris.

M. Berberis lo



R. Vanillin

O. I.

Vanillin

Vaschin

ao. 15.0

M. Ner. Nervos

brveixes ellen Wase artapinfa, lag
a belesz vereites labait olyan forro
vizebe lepp nifent van elhis.

Gyomortagulatban & Xennverö
betegereser.

A gyomorban végyemenö erjesel ellen:

Rp. Bismuth. salicyl.

Magnes. sulfurici

Acet. butyrici

air quito. dorem

Mpp. oliv. ni dor. aeg. 5^o XXX:

Ira a tagulatasi erjesel mag. form:

Rp. Bismuth. subnitrici

& Haphtali

Carbon. pulv.

air quito. dorem

Siv. ni dor. XXX.

A belesz delben is etkeve van be
eremporosbol.

Ezen vivit empre haszaydol. adan-
dos. mint haszaydol. asvazveris.

Ha has meres volna jelen ezen
betegnek. Dujardin a következő
potivat rendeli:

Rp. Binnett. salicyl.
d. Naphthali
Inesae praepar.
Natri. phosphorici
an. 10.0

Ugyan az in dor 40.

S. Delken is ebbe egy port
ezen has meresekhez meg
többszörösen az antiseptikum
alvamoskal való beindítás.

Scarbath.

Rp. Sal. hystrang. biclor. 25.0
Natri. fosali 1.0
Syrup. 15.0
Aq. Chlor 200.0

At. Ketorantent egy evőkanal

2 os. hystrang. biclor = 10 grm vir +
1 endgon $HgCl_2$ + 1 endgon ammon
chlorid.



CSÁSZÁRFÜRDŐ.

Budapest legrégebb, leghírnevesebb és legnagyobb hévviz-fürdője. Teljes kényelemmel berendezett gőzfürdővel, férfiak és nők számára elkülönített és télen át is használható iszapfürdőkkel, porcellán-, fehér és vörös márvány-kád-, kő- és török-fürdőkkel, gyönyörű női- és a fővárosban a leglagasabb férfi-uszodával, hat speciális női fürdővel.

Minden fürdőben (az uszodákban is) — a zuhanyok kivételével — úgy meleg, mint a hidegvíz **kizárólagosan természetes hőfoku ásványviz**, a melyet tíz különböző (27—64,75° C.) hőfoku kénes forrás szolgáltat.

Forró (54—64,75° hőfoku) ásványviz bősége a legnagyobb Budapest összes fürdői között, 24 óránként ugyanis 370,503 köbláb forró és azonfölül mintegy 534,145 köbláb langyos (26,2° C. hőfoku) forrásvízzel rendelkezik.

A császárfürdői hévviz- és iszapfürdők kitűnő sikerrel használtatnak: köszvény, az ízületek, izmok, csontbánta és ideghüvely idült csúza, zsábák (ischias), hűdések, a csontbántalmakat és ízületi bajokat követő elváltozások, izzadmányok, merevség, hörfekélyek, máj, lép, méh, hüvely, petefészek és húgyhólyag bántalmak és vizeelési nehézségek ellen.

Az uszodák: mint erősítők, általános gyöngeség, vérszegénység és sápkór ellen.

Az ivó-gyógyforrás vize: idült gyomorhurut, alhasi pangás, a bél és a légzőszervek hurutja ellen.

Fürdő-orvos dr. Brunner Kálmán, kivüle más két rendelőorvos. Massage-gyógymód.

A Dunára és a Margitszigetre néző sík- és hegyi sétánnyal, 200 kényelmes lakoszobával (napi 50 krtól 3 frtig) jó vendéglővel, az épületben posta, táviráda, nyilvános telefon, helyben hajó, lóvasúti és bérkocsi állomással. A fővárossal minden irányban 2—3 perczenként, valamint minden színházzal lóvasúti összeköttetés.

Főevad május 15-től szeptember 15-ig, ezen idő alatt naponként kétszer katonazene. Zenedíj, valamint gyógydíj (Cur-taxa) nem fizettetik.

GYÓGYINTÉZET INCZERSDORF

Bécs mellett.

Bresslauer és Fries
orvostudorok tulajdona.

Ezen intézet a Laxenburgi úton át Bécsből $\frac{1}{2}$ óra alatt érhető el. Ezelőtt Lobkovitz herceg tulajdona volt. Teljes salusiasság. Minden kényelem 25 jobbmódu beteg számára.

Kezelés alá kerülnek többnyire ideglántalmak, mint: **Hysteria, Hypochondria, Neurasthenia, Neuralgia, Álmatlanság, Morphinismus, Alkoholismus, Chloralismus, Vértódulás és könnyebb fokú lehangoltság.**

Ilynemű bántalmakban szenvedők mint testi (somaticus) betegek vétetnek fel és gyógykezeltetnek.

Nehezebb esetek teljesen elkülönített házakban, saját külön kerttel, ápoltatnak.

Nagy park, fürdők. A gyógyulás-, szórakoztatás- és foglalkozásnak minden megfelelő eszköze.

Hozzá tartozók a betegek közvetlen közelében nyerhetnek szállást és eltartást.

Dr. BATIZFALVY

egyetemi m. tanár

újjonnan épített és a mai tudomány színvonalán álló

VIZGYÓGY-INTÉZETE

Budapesten, városligeti fasor és Arena-ut sarkán. Szakavatott gyógykezelés, jó ellátás, gondos ápolás és jutányos árak mellett vesz fel bennlakó és bejáró betegeket. A rendszeres vizgyógyimódon kívül svéd gyógytornáztat, villamozás, massage. Nagy terjedelmű árnyas sélányok, olcsó, gyors közlekedés ez intézet előnyeit képezik. Az intézet orvos-sebészi és testgyógyászati osztálya 31 év óta szakadatlanul működik.  Kimerítő program bérmentve.

Eredeti borjunyirk

friss és kitűnő minőségben kapható
a magyar kir. belügyministerium által
engedélyezett

védhimlő termelő intézetemből.

Dr. Pápai Vilmos

koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, tb. megyei főorvos
Budapest, VI., Teréz-körut 27. sz.

Alapítottott
1819. évben.

12 elsőrendű
érdemjel.

☛ *Egészen új!!* ☛

A legjobb

Dolgozó mikroszkop

orvosok és orvosnövendékek számára.

(Elsőrendű tekintélyek utasításai szerint szerkesztve) homogenus (olaj) immersióval, mozgó segítségével igazítható Abbe-féle világítókészülékkel, három tárgylencse és két szemcsővel, (20—800-szor nagyít, polírozott mahagoni szekrényében)

teljesen 180 márka = o. é. 108 frtért
ajánl

F. W. SCHIECK

optikai intézete

Berlin, Halle'sche - Strasse 14.

Árjegyzékek ingyen és portómentesen.



KESERÜVIZ

PÜLLNAER

(Böhmen)

Krone der Bitterwässer.

A keserűvizek legkitünőbbike.

DARUVÁRI ÁSVÁNYFÜRDŐ

a rómaiak „*Thermae Jasovenses*” néven ismerték.

Cs. kir. déli vasut állomás, 989 méter hegység alján. Europa legmelegebb 50° Celsius vashőforrása. — Női betegségek, sápadtság, vérszegénység, köszvény, idegbetegség, ischias és gyengeség ellen. Ivó- és fürdő-gyógymód.

A fürdő rendelő orvosa dr. Buder Ferencz, magánorvosok dr. Brink Ede, dr. Hirschenstein J. és dr. Réthy Gusztáv. — Felvilágosítással az álgyeti Tüköry-féle Daruvár, Szirács és Uljaneki uradalom fürdő intézősége szolgál.

Vegyelemzés dr. Wagner Dániel tanár szerint.

	Antal-forrás	János-forrás	Iszapfürdő-forrás
	g r a n		
Kénsavas kali	0.028	0.024	0.088
„ natron	0.435	0.462	0.411
„ magnesium	0.092	0.062	0.107
Chlormagnesium	0.027	0.027	0.036
Szénsavas magnesia	0.220	0.198	0.238
„ mészföld	1.966	1.605	2.112
„ vasoxydul	0.096	0.057	0.095
„ manganoxydul	0.041	0.031	0.041
Kénételes mézga	0.081	0.100	0.081
„ kavics	0.361	0.315	0.409
Szilárd anyagok összege	3.359	2.988	3.558
Szabad szénsav	1.94	1.32	1.58
Lithionnak csak nyomai.			

Rosenthal M. tanár Sanatoriuma idegbetegek számára

(bárminemű elmezavar kizárásával)

Hackingban (közel Ober-St.-Veithez Bécs mellett)

Wasagasse 2.

Egész éven át nyitva van.

Tudósítást ad Rosenthal M. tanár Bécsben,

I., Krugerstrasse 12 (2—4 óra közt).

KEFYR

nem valami titkos, sem különleges gyógyszer, hanem kiváló ital *betegek* számára, amely igen gazdag tápanyaggal bír és a mellett könnyebben emészthető a közönséges tejnél, mértékes alkohol és szénsav tartalmánál fogva pedig igen hűsítő és felette ízletes ital. — Gyomor-, ideg- és tüdőbetegeknek úgy mint vérszegénységben szenvedőknek, valamint mindenkinek, kinek elégtelen emésztés következtében orsóbulásra -züksége van a **Kefyr** a legjobb tápszer, mely számos esetben sok kiváló és tekintélyes orvos által rendeltetik. A **Kefyr**, gyógyhatása mellett, felette kellemes élvezet *egészséges ember* számára is. — A **Kefyr** nem egyéb mint legtisztább és legjobb minőségű, a Kefyrszem segítségével forrt és ezáltal igen ízlelőssé, táplálékossá és könnyen emészthetővé lett tehéntej. A **Kefyr**-szem a Kaukaszuból származik és ez idő szerint egyetlen ismert élesztő, melynek a tehéntejre erjedő hatása van. — A **Kefyr** mint *kész ital* 3 nappal tovább nem conserválható és ennél fogva távolabb eső helyekre nem küldhető. A **Kefyr** azonban minden háztartásban könnyű szerezni és olcsón készíthető.

Kefyr-szemek, minők a **Kefyr**-ital készítésére szükségesek, valódi és hatékony minőségben megrendelhetők alant irt czégtől 2.40, 3.60 és 6 frtért, mely mennyiségek elegendő $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 liter **Kefyr**-ital készítésére.

Erste Kaukasische Kefyr-Anstalt

Breslau, Zwingerstrasse 22.

Könnnyen megérthető, betegek, orvosok és gyógyintézetek részéről jó eredménnyel alkalmazott készítmény utasítás minden küldeményhez mellékeltek. — Prospectus ingyen.

Univ. med. Dr. Zoltán A.

a m. kir. belügyminiszter által enged.

nyilv. borjuhimlő nyirk intézete

Kétegyházán (Békésmegye).

Szállít egész éven át jótállás mellett mindig friss s hatékony eredeti borjuhimlő nyirket a következő árakon:

1 phiola 2—3 egyénre	---	---	---	à — frt (60 kr.
2 vagy több ily phiola	---	---	---	" — " 50 "
1 phiola 10—15 egyénre	---	---	---	" 2 " 25 "
1 " 50 "	---	---	---	" 5 " 50 "
1 " 100 "	---	---	---	" 10 " 50 "
1 " 1000 "	---	---	---	" 95 " — "
Csomagolás és szállítás	---	---	---	15 "

Oltási kellékek saját árban.

Nagyobb megrendeléseknél árkedvezmények.

Természetes

BILINI SAVANYÚVIZ

az égvényes savanyúvizek

legkiválóbb képviselője

(33,6339 szén-sav szikénnyel 10,000 súlyrészben) hatásában kitűnik mint savkötő, a vér aljaságát fokozó szer, használata tehát különösen zahaégetés, gyomor-görcs, idült gyomorhurutnál, továbbá az ugynevezett húgysavany, dara, homok, vesekövek, köszvény, idült csúsz, hólyag- és tüdőhurutos bántalmainál, epekőképződésnél, májkövesedés és scrophulosisnál becses és czélszerű.

A bilini savanyúviz nem különben kitűnő étrendi szer, bor vagy citromsavval és cukorporral vegyítve, szén-savdús tartalmánál fogva magasra fölhabzó ital és e miatt különösen a meleg nyári hónapoknak való ajánlható.

Sauerbrunn Bilini gyógyintézet
Csehországban.

Vasuti állomás «Bilin—Sauerbrunn»
a Prága—Duxi és Pilsen—Priesen—Komotau
vasutnak.

Savanyúviz, Édesviz és Gőzfürdők,
Hidegviz-gyógyintézet.

A bilini savanyúvizből nyert **Pastilles de Bilin** (bilini emésztési cukorkák) elismert kitűnő szer emésztési zavarok ellen.

BRUNNEN-DIRECTION BILIN

(Csehország).

LIPPERT GYULA

országos központi tanszerraktárában

Budapest, IV., Múzeum-körút 39. sz.

Kaphatók mindennemű látszerészeti műszerek, mint: szemüvegek, orrszorítók, színházi és tábori látesővek, nagyító és olvasó üvegek, görösővek, orvosi bevezetési készülékek, pontosan kipróbált és bizonyítvánnyal ellátott orvosi maximal hőmérők, ablak-, szoba- és fürdőhőmérők, belehelési készülékek, önfejlesztő szodaviz-készülékek, orvosi eszközök, irrigátorok, allövők, fecskendezők stb.

Készít és javít villanyos házi sürgönyöket a legjutányosabb árakon.

Dr. Molnár Nándor és Társa

jól felszerelt vegyvizsgálati laboratóriumában

Budapest, Kerepesi-út 43. sz.

elfogadtatnak vegyvizsgálat végett mindennemű tárgyak:

Ásványok, ásványvizek, fémek, festékek, gyógyanyagok, droguak, élelmi szerek, tej, bor, sör, likörök, stb. a szokásos árak mellett.

Ezuttal van szerencsénk az orvos urak figyelmébe ajánlani urinavizsgálatainkat is.

Landschaftl. St. Johannsspitals-Apotheke SALZBURGBAN.

**Különleges üzlet orvosi házi gyógytárak valódi
gyógyszerárúkkal való felszerelésére.**

Nagy gyógyszerészeti laboratórium, alapított 1696-ban, a legjobb és leg-
újabb technikai berendezéssel.

Összes jelenlegi és előbbi officinális gyógyfűvek, præparatumok szigo-
rán a gyógyszerkönyvek (pharmacopœák) után készítve, valamint minden
esetleg újabb alkalmazásba jutandó a lehető legolcsóbb napiárakon és csak
legjobb minőségben. Gazdag raktár a házi gyógytárakhoz szükségelt min-
dennemű kellékekből, valamint antiseptikus kötanyagokból. Postadíj a leg-
távolabb eső helyekre is 5 kilóig csak 30 kr. Kimerítő árjegyzéket kívá-
natra azonnal küldök. Szíves megrendelések pontosan teljesíttetnek.

J. R. v. Angermayer.

Első antiseptikus kötés az orvos kezeibe.

Bárhon könnyen elhelyezhető és könnyen kezelhető csomagban; kellő
mennyiségben és szétszithatóságban oly módon van felszerelve a szüksé-
ges anyagokkal és vegyszerekkel, hogy a polgári életben előforduló közön-
yes sebesüléseknél azonnal egy teljes, egészen correct antiseptikus kötés
alkalmazható. Törvényesen védve. 1 frt 50 kr. beküldése ellen küldetik.

CALDERONI ÉS TÁRSA BUDAPESTEN,

a vácz-utczában, — mű- és tanszer-raktár a kis hid-utczában.

Ajánlanak :

Maximum-hőmérőket, kemény üvegből, hivatalos vizsgálati bizonyít-
vánnyal a csász. •Normal-Aichungs-Kommission•-tól Charlottenburg-
ban, 3 frt 50 kr; — *maximum-hőmérőket* 2—2.50 frt; *fürdőhőmé-
rőket*, gyakorlatilag felszerelve: 80 kr, 1 frt, 1 frt 50 kr, 2 frt.

Hőmérő, az ablakhoz csavarható, 1 frt 50 kr, 2 frt.

Hőmérő, kórszoba és ispotályok számára, 50, 60, 80 kr, 1 frt.

Fínom szobahőmérő 1 frt 50 kr, 2 frt.

Ércz (Aneroid) légsulymérő 6, 8, 10, 20 frtig.

Ozonometer,

Bevezetési (Inductions) készülékek, orvosok számára felszerelve.

Górcsövek, nagyítóüvegek, bonoztani készüléktokok, respirátorok, növénytan
eszköztokok, szem- és orrzuhanycok, kék vagy szürke védőüvegek, szemüveg-
próbaszokronyek, húgymérők stb.

*Fényképészeti készülékek műkedvelők, touristák stb. számára, ki-
tűnő minőségű szemüvegek és orrsíptetők, finom üvegekkel vagy
hegyjegeczekkel.*

Arjegyzékek bérmentve küldetnek. — Levélbeli megrende-
lések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Schleinz Károly és társai

magyarországi kizárólagos főraktárukban Budapesten,
belső Stáció-utca 47.

kapható: a cs. és kir. legmagasabb elismeréssel és
évek hosszú sora óta a legelső díjakkal kitüntetett

GLEICHENBERGI

JÁNOS FORRÁS

ÉS WORITSCHAI

GIZELLA FORRÁS

a legjobb, legtisztább és legolcsóbb szénsavdús
savanyuvizek, melyek borral, vagy gyümölcs-szörp-
pel vegyítve kitűnő üdítő italt nyújtanak. Buda-
pesti megrendelések, öt palaezktól kezdve bérmente-
sen házhoz szállíttatnak.

Syr. ferri. albuminati (Brautlecht)

Widerhofer u. t. és több budapesti elő-
kelő, klinicus által kitűnő sikerrel alkal-
mazva, mindenütt, hol a vas javalva van.
Felette kellemes íze, s az a körülmény,
hogy az étvágyat emeli nagy elterjedést
biztosítanak e szernek.

Kapható valódi minőségben az egyedüli raktárban

NAGY GYULA

volt csász. és kir. udvari gyógyszerésznél

Budapest, Damjanich-utca 2.

Schottola Ernő

Budapesten, Andrásy-ut 2. sz.
Fonciére-palotában.

Gyári raktár mindennemű sebészeti cikkekben, ugymint: nemzetközi köt-szerek, sérvkötők, irrigator, öncsórésző és anyaméh-fecskendők, haskötők, havi-zacsok, fűzők, egyenes-tartók, anya-méh-tükrök, méhkoszorúk ruganyos ha-risnyák, bougies, katheter, szopó üvegek, uszócsövek, fürdőkádak és főkötők, sus-pensor, uri és női különlegességek, vala-mint mindezen szakmába vágó cikkek, lehető legolcsóbb árak mellett.

AZ E. O. ALTALÁNOS BALESET ELLEN BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG.

Teljesen befizetett alaptőke: Egy millió forint o. é.

A társaság elfogad: **Egyénenként való biztosításokat** balesetek ellen és pedig minden testi baleset ellen, mely a biztosítottat hivatásában vagy azon-kivül, otthon vagy utközben érheti.

Példák:

1. Városi orvos vagy gyógyszerész baleset biztosításért fizet:

p. o.	10.000	frtnak halálesetre való biztosításáért	à 0-90 ^o /∞ =	frt 9.—	évenk.
	10.000	" munkaképtelenség eseteire való biztosításért	 à 1-10 ^o /∞ =	" 11.—	"
napi	10	" biztosításáért ideiglenes kere-setképtelenség esetében...	 à frt 2.25 =	" 22.50	"
		mindhirom esetre	frt 42.50	évenk.	
		kötvény- és bélyegilleték ...	" 1.66	"	
		összesen tehát...	frt 44.16	"	

Öt évre szóló biztosításnál a társaság a netto díjból 10%-nyi engedményt nyújt, úgy hogy a fenti évi díjösszeg 39 frt 85 krra mérsékeltetik.

Megjegyzés. Egyénenként való biztosítás megkötésnél az eljárás rendki-rül egyszerű. A biztosítás iránt való ajánlat az úrlapon melyet a társaság ügy-nökei ingyen szolgáltatnak ki, az azon levő kevés kérdésre adandó válasz meg-adása által kiállítatik, s annak alapján a társaság a megfelelő kötvényt kiál-lítja. Egyénenként való biztosítást baleset ellen tehát mindenki minden nehézség nélkül köthet, mert a biztosítandó egyén testi vizsgálatnak nem vetetik alá, s a fizetendő díjak, mint az a fentebbi példákban látszik, rendkívül esekélyek.

Minden közelebbi felvilágosítással, valamint ajánlati úrlapokkal a társaság vezérügynöksége, **Budapest, Dorottya-utca 10.**, vagy annak összes kép-riselősegei (a triesti es. k. szab. Assicurazioni Generali ügynökségeinél) készség-gel szolgálnak.

„MARGIT“

GYÓGYFORRÁS,

MAGYAR SELTERS.

Vegyelmezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétel, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szén-savtartalma kiváló hatásnak bizonyult különösen **tüdőbántalmaknál**, a hol a szabadszénsav csekélyebb jelenléte megóvjá a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhatásu alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközözi. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabadszénsavtartalomban erősebb ásványvizek, mint a **seltersi-gleichenbergi, tüdőbajokban**, különösen **tüdővérzéseknél** már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.

A **tüdőbetegek** klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb **Görbersdorfbán**, a Margit-víz otthonossá vált. Orvosi tekintélyek Budapesten: **Dr. Korányi, Dr. Gebhardt, Dr. Navratil, Dr. Poór, Dr. Kétly, Dr. Barbás**; Bécsben: **Dr. Bamberger, Dr. Dnschek** stb. a legjobb eredménnyel alkalmazzák a légző-, emésztő- és húgyszervek általános hurutos bántalmainál.

Mint ivóvíz

präservatív-gyógyszernek bizonyult legközelebb Triest-Fiumében KOLERA megbetegedés ellen a

„MARGIT“ borral használva a legegészségesebb ital!

Kizárólagos főraktár:

ÉDESKUTY L.

m. kir. és szerb kir. udvari ásványvíz-szállítónál Budapest.

Ugyszintén kapható minden gyógyszertárban, fűszerkereskedésben és vendéglőkben.

Legjobb asztali és üdítőital.

A MOHAI

ÁGNES

FORRÁS

Hazánk egyik legszénsavdusabb

SAVANYUVIZE,

vegyelemezve dr. Lengyel Béla egyet. tanár ur által.

Ajánlva a bel- és külföldi számos orvosi tekintélyei által főleg a légzési, emésztési és húgycső-szervek hurutos bántalmainál, hatásosan gyógyítja a Rhachitis-, görvél-, vese- és köszvénybajokat, ép úgy használható a tagok csúzos bajainál, gyermekeknél meggátolja a túlságos gyomor-savany képződést s fokozza az idegrendszer tevékenységét. Gazdag szénsav tartalma folytán ezen üdítő savanyuviz a legkellemesebb izzel bír s borral használva igen nagy keletnek örvend.

Friss töltésben mindenkor kapható:

ÉDESKUTY L.

m. kir. és szerb kir. udv. ásványvizszállítónál
Budapesten.

Ugyszintén minden gyógyszertárban, fűszer-
kereskedésben és vendéglőben.

Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.

Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál.

Évi elszállítás 2.000,000 palackk.

A Gschwindt-féle Gyár-Részvénytársaság fürdő-intézet igazgatósága.

Budapesten, az üllői úton, a kaszárnnyával szemközt.

Bátorkodik minden kényelemmel berendezett **fürdő-intézetét** a nagyérdemű közönségnek figyelmébe ajánlani. Közönséges **tisztasági** fürdőkön kívül kaphatók még az intézetben és gyógyczélokra fényes eredménnyel használtatnak: **ásványos és vegetabilieus fürdők**, melyek közül leginkább kiemelendők: a **maláta-, moslék-, vas- és vasas lápfürdők** (Eisenmoorbäder). Ezeken kívül orvosi rendelés mellett kaphatók: **tülevelei fenyőfürdők, halli jod-, konyhasó-, kreutznachi lugsó-, korpa- és fekete szappanfürdők.**

Izületi, csusz, izom- és idegbajok, hűdések és fájdalmas hegek, hólyagbajok és különféle anyaméh- és női ivarszervek minden néven nevezendő zavarai ellen a **villamos fürdők** kiválóan ajánlatosak.

Minthogy a társaság érdekében áll, hogy ezen a fővárosban általános elismerésben részesülő intézet jó hírnevét fokozza és terjeszsze, és hogy a t. cz. közönség igényeinek is eleget tegyen, elhatározta a társaság, hogy már legközelebb a fürdő-intézetben a **massage-gyógymódot** is alkalmaztatni fogja.

Midőn ezt van szerencsénk a t. közönségnek és különösen a t. **orvos uraknak** tudomására hozni, fürdő-intézetünk minél számosabb látogatásáért illetőleg szives ajánlásáért esedezve, maradunk szives tisztelettel

A Gschwindt-féle Gyár-Részvénytársaság
fürdő-intézet igazgatósága.

Ezzel van szerencsém a t. orvos urak b. figyelmét felhívni az általam forgalomba hozott egyes különleges czikkekre, nevezetesen:

Saját termésű vörös borra,

mely Pécsen a nagy éremmel lett kitüntetve, s melyről a m. kir. állami vegyakisérleti állomás részéről következő vélemény adatott ki:

A beküldött és „Kőbánya Aranyhegy Herminalaki bor. Bieber Antal saját termése” szövegű vignettával ellátott vörös bor száz köbcentiméterjében találtatott:

10.150 gramm	alcohol
0.682 „	összesség
0.097 „	csersav
2.305 „	kivonat
0.997 „	glycerin
0.170 „	hamu
0.048 „	phosphorsav,

czukor nyomokban volt kimutatható. — Idegen festő-anyag nem találtatott. — Budapesten, 1889. április 4-én.

A m. kir. állami vegyakisérleti állomás vezetője:

Dr. Liebermann s. k.

Azt hiszem, hogy a t. orvos urak ezen vélemény alapján leginkább fogják méltányolni tudni e bornak valódi értékét s adandó alkalmakkor, hol kívánatosnak mutatkozik, ajánlatba hozni.

Szíves figyelmét hívom fel továbbá a nálam árusított, tiszta kezelésű magyar és franczia „**Cognac**“-ra, mivel ezek az első rendű és leghirnevesebb gyárakból valók és közvetlen hozatalt képezik. Ezen „**Cognac**“-ok, különösen gyógyszer gyanánt igen ajánlatosnak bizonyultak.

Nem kevésbé ajánlatos a nálam kapható és palaczkokban forgalomba hozott kitünő „**Kőbányai sör**“, mely az arany és ezüst éremmel lett kitüntetve. Ezen sör már azért is megérdemli a figyelemre való méltatást, mivel nemcsak finom zamattal bír, hanem mindazon kiváló tulajdonságokat tartalmazza, mint a „**Pilseni sör**“, s így mint belföldi gyártmány, a külföldivel szemben, bizonyos méltatást és támogatást érdemel.

Végre még figyelmeztetni kívánom a **Budapesten (Kerepesi-ut 6. sz. a.)** levő téa-üzletemre, hol a közvetlen behozatalu „**chinai**“ és „**indiai**“ legfinomabb téakból mindig nagy raktár tartatik s hol a t. orvos urak látogatása szívesen fogadtatik.

S hogy a t. orvos uraknak módot nyujtsak a felsorolt czikkek kitünő minőségeiről meggyőződhetni, intézkedni fogok az iránt, hogy azokból kívánatra díjmentesen próbaképen juttassak.

Budapest.

Kiváló tisztelettel

BIEBER ANTAL

Kerepesi-ut, Bazár-épület.

A TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG

— ASSICURAZIONI GENERALI. —

E társaság, mely a károk előzékeny megállapítása és pontos kifizetése által általános bizalmat keltett maga iránt, az 1887. évi deczember hó 31-ről kelt mérleg szerint, alaptőkében és készpénzbeli tartalékban

36.120,176 frt 53 krral rendelkezik.

A fentemlített évben érvényben levő élet-

osztályi tőke-biztosításainak összege 105.482,651 • 38 krt teszen.

A tűzbiztosítási osztályban későbbi években esedékes díjakról szóló díjkötelez-

vényei 22.766,106 • 95 krra rugnak.

Fennállása óta, 676,679 károsítása után 207.379,802 • 20 krt fizetett ki.

E számok bizonyítják, hogy az „Assicurazioni Generali” még a legelővigyázatosabb gazdának is teljes megnyugtatót nyújthat és hogy a nagy bizalom, melynek a társaság örvend, teljesen igazolt is.

Biztosítások elfogadtatnak:

A) Tűzkárok ellen lak és gazdasági épületekre, butorok- és áruaktárakra, továbbá egyéb ingóságokra.

B) A tiszta haszon és bérjövedelemnek laképületeknél tűzkár folytán való elmaradása ellen.

C) Tükör- vagy szolináveg eltorzításából származó károk ellen.

D) Jégkárok ellen, a kártérítés teljes és azonnal való utalványozása ellen.

E) Szállítási károk ellen, melyeket a szállított javak hajókon, vasutakon vagy kocsikon szenvednek, tengeren szállított áruk is elfogadtatván biztosításra.

F) *Tőkére vagy életjáradékra, halál vagy túlélés esetén*, úgy, hogy a biztosított összeg azonnal, vagy úgy, hogy bizonyos megszabott határidőben fizetetik ki.

Különösen ajánlhatók az életbiztosítások, nyereségben való részesüléssel. Az eddig felosztásra került nyereség-osztalék 1852-től 1888-ig évenként átlag 28 frt 85 krt tett ki minden 100 frt befizetett díj után.

Az e képen biztosított személy a reá eső nyereséget:

1. készpénzben felveheti; vagy
2. a biztosított tőke szaporítására; vagy
3. az évi díj leszállítására fordíthatja.

A mérsékelt díjakon és nagy osztalékokon felül, az ezen osztályban az új feltételek mellett biztosítottaknak, következő kedvezmények garantírozottak:

megtámadhatlanok a kötvények öt évi fennállásuk után *öngyilkosság, párbaj* stb. esetében,

nem veszíthetik el teljesen érvényöket kölcsönmentes kötvények három évi fennállás után,

a biztosítottak egészségi állapotától függetlenül ismét érvénybe léptethetők három hónapon belül oly kötvények, melyek a díjfizetésnek elmulasztása folytán érvényöket veszítették,

népfolkelés esetén díjpótlék nélkül érvényben marad a biztosítás egy évi fennállása után 15,000 frtot meg nem haladó összeg erejéig.

Egyszerű biztosítás halálesetre.

Évi díj minden 1000 frt után, ha a biztosított életkora

25 év	30 év	35 év	40 év	45 év
19 frt 30 kr.,	21 frt 80 kr.,	24 frt 90 kr.,	28 frt 90 kr.,	34 frt 30 kr.

Iroda: Budapest, az intézet saját házában Dorottya-utca 10.

SINGER ÉS WOLFNER KÖNYVTÁR.

KÖNYVKERESKEDÉSE

Budapest (Andrássy-út 10.)

ajánlja a hazai összes, és a külföldi művelt nemzetek irodalma újabb s legújabb megjelenéseivel ellátott

KÖNYVKERESKEDÉSÉT.

Raktárunkon állandóan készletben vannak az összes magyar, valamint a külföldi különösen a német orvostudományi művek; részletes jegyzékeket kívánnakra bárkinek szívesen küldünk.

Magyar, franczia, angol, német heti-, havi-, negyedévi

ORVOSI FOLYÓIRATOK

állatunk is megrendelhetők, az eredeti előfizetési árakon. (Külföldi folyóiratoknál a folyton változó napi árfolyam tekintetbe vételével.)

Állandó szükségletnél készek vagyunk a részletfizetési kedvezményt alkalmazni, mely esetben feltételeinket a rendelés nagyságához mértén állapítjuk meg.

ANTIKVARIAT

A TRIESTI kiadványok magyar és német orvosi műveknek, melyek kezdő orvosoknak csaknem nélkülözhetetlenek.

Kaphatók:

E tár-
által
ke-

SINGER ÉS WOLFNER

könyvkereskedésében

Budapest, Andrássy-út 10. sz. alatt.

I. Magyar művek:

Purjesz Zsigm.	A belgyógyászat tankönyve.	Ára
	II. kiadás	...frt 12.—
Mann J.	Szülészeti műtéttan	2.—
Schächter M.	A sebek gyógyulása és a sebkezelés	2.—
Dollinger Gyula.	A masszázs	1.—
Balogh Kálm.	Orvosi műszótár	3.—
Schmid Hugó.	Sebészeti műtéttan. I. rész	2.40
	A II. és III. rész még ez évben fog megjelenni.	

II. Német művek:

Albert	Lehrbuch der Chirurgie und Operations-Lehre 4 Bände	fl. 24.—
Eichhorst	Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. 4 Bände	24.—
Kaposi	Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten	10.80
Fritsch	Die Krankheiten d. Frauen	5.40
Henoch	Kinderkrankheiten	10.20
Schmidt-Rimpler	Augenheilkunde und Oph- thalmoskopie	8.40
Kirchner	Ohrenheilkunde	2.76
Schröder	Geburtshilfe. Kötve	10.80
Schröder	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	6.—

Legújabb és legjobb eredeti és fordított regények gyűjteménye.

EGYETEMES REGÉNYTÁR.

Egy-egy kötet ára diszes piros vászonkötésben 50 kr. — Havonként.
1—2 kötet jelenik meg. — Kapható minden könyvkereskedésben.

Előfizetési ára postán való bérmentes küldéssel:

20 kötetre... 10 frt | 10 kötetre... 5 frt | 6 kötetre...

Eddig megjelent:

Negyedik évfolyam.

- I., II. Osiky Gergely. Az elvált asszony.
III., IV. „Ö”. Irta Rider Haggard.
V., VI. Almanach 1889-re. Tartalma 14 elbeszélés.

- VII., VIII. Zola Emile: Alom.
IX., X., XI. Werner. Szt. Mihály.
XII. Abonyi. A pénzés molnár románcza.
XIII., XIV. Ohnet Gy. Rameau orvos.
XV. Kazár. A szivárvány.

Harmadik évfolyam.

- I., II. Beniczkyné. Ő az.
III., IV. Delpit E. A hitetlen.
V., VI. Mikszáth. Almanach.
VII., VIII. Oberbuliez. Holdenis Meta.
IX. Kazár Emil. Lég és föld.
X. Groller. A tábornok ur fia.
XI., XII. Ohnet. Akarat.

- XIII., XIV. Szathmáry. A legszebb hercegnő.
XV. Ouida. A freskók.
XVI. Uchard. Blaisot kisasszony.
XVII. Bródy S. Emberek.
XVIII. Dosztojevszky. Fehér éjszakák.

Második évfolyam.

- I., II. Ohnet. A Croix-Mort grófnő.
III., IV. Conway. Mő halott.
V. Margitay D. Megölt lelkek.
VI. Feuillet Oktáv. Az özvegy.
VII., VIII. Abonyi L. Magduska öröksége.
IX. Lindan Pál. Jung Helén.

- X., XI. Ohnet György. Sarah grófnő.
XII. Szathmáry K. Balassa Bálint.
XIII., XIV. Delpit A. A marquísé.
XV. Turgenev Iván. Első szerelem.
XVI. Mikszáth K. A fészek regényei.
XVII., XVIII. Carmen Sylva. Tábori posta.

Első évfolyam.

- I., II. Ohnet György. A banya.
III. Mikszáth Kálmán. A lohinai fű.
IV., V. Conway. Beatrice házassága.
VI. Tolnay L. A jubilausok.
VII., VIII. Boisgobey. A kék fátyol.
IX. Feuillet Oktáv. A halott.
X., XI. Ohnet György. Lise Fleuron.

- XII. Petelei István. A fülemile.
XIII., XIV. Collins Wilkie. Nem!
XV. Eckstein Ernő. Violanta.
XVI. Beniczkyné B. L. Saját kezébe.
XVII. Gonzales. Egy csontváz elbeszélése.
XVIII. Aidó H. Az nri körökben.

Kiadja SINGER és WOLFNER könyvkereskedése

Budapest, Andrásy-ut 10.

