
EXPLORAREA FUNCȚIEI RESPIRATORII A PLĂMÂNULUI ÎN FAZA CLINICĂ ASIMPTOMATICĂ A ASTMULUI BRONȘIC LA COPIL

Csilla Todea, Zsuzsa Béres

Clinica de Pediatrie nr. 1
U.M.F. Târgu-Mureș

La copilul astmatic în perioada asimptomatică examenul funcțional pulmonar este necesar pentru evidențierea obstrucției bronșice neobservabile clinic, dar care necesită tratament bronhodilatator și/sau antiinflamator până la normalizarea stării funcționale.

Pe un lot de 30 bolnavi cu astm bronșic alergic am efectuat examene ale funcției respiratorii cu spirometru portabil MICROSPIRO HI-198, dotat și cu un sistem de tipărire a rezultatelor pe hârtie: CV, VEMS, indicele Tiffenau, PEF, FEF 25-50-75%. Bolnavii cu limita de vârstă între 6-16 ani, cu forme clinice moderate de astm alergic la praf de casă cu intricare infecțioasă, au beneficiat de un tratament complex pe o perioadă de 3 luni. Valorile spirometrice la bolnavii clinic aparent asimptomatic arătau un grad variabil de bronhoobstrucție, indicând necesitatea continuării tratamentului adecvat bronhodilatator și antiinflamator.
