

ASPECTE CLINICO-RADIOLOGICE ÎN UNELE VÂRSĂTURI ALE SUGARULUI

Lucia-Sanda Fetea, C. Rusnac, Maria Florișteanu, Marcela Sigmirean,
L. Neagoș, B. Voicu, Anca Sglimbea, C. Bancos

Clinica de Pediatrie nr.3
U.M.F. Târgo-Mureș

După cum se știe, în cursul primului an de viață, vărsăturile constituie un simptom sau sindrom frecvent întâlnit, atât în numeroase stări patologice, cât și în afara oricărui semn de boală. Datorită acestei frecvențe crescute, ele par la prima vedere manifestări banale, lipsite de o semnificație deosebită. În realitate există la sugar, începând cu perioada de nou-născut și spre deosebire de copilul mai mare, o serie de îmbolnăviri digestive sau extradigestive în care vărsăturile domină într-atât tabloul clinic, încât devin prin ele însele capabile să-i altereze profund starea de nutriție și de sănătate, punându-i în pericol chiar viața. În asemenea cazuri, numai diagnosticul precoce al afecțiunii sau circumstanțelor cauzatoare de vărsături și luarea imediată a unor măsuri energice poate împiedica evoluția lor malignă.

Din numărul mare al cazurilor de copii 0-1 an prezentând la internare vărsături ca simptom ce domină tabloul clinic, autorii au selecționat numai acele cazuri care s-au pretat la un diagnostic etiologic prin efectuarea unei radiografii esofago-gastrice după introducerea pe sondă a unei soluții de Odiston 75%. Astfel, autorii prezintă cazuri de atrezie de esofag, cazuri de stenoză hipertrofică de pilor sau numai spasm piloric, cazuri de plicatură gastrică și de reflux gastroesofagian, tot atâtea cauze de vărsături la vârsta de sugar mai mic sau mai mare. Aceasta, pentru a sublinia importanța examenului radiologic pentru precizarea diagnosticului etiologic al unei vărsături la această vârstă.