

RAHITISMUL ÎN ACTUALITATE

D. Buțu, I. Muntean

Clinica de Pediatrie nr. 1

U.M.F. Târgu-Mureș

Lucrarea este un studiu retrospectiv, statistico-matematic, care cuprinde 176 copii rahitici internați în Clinica de Pediatrie nr. 1 din Tg.-Mureș în anii 1992-1993-1994, studiu prin care s-a urmărit în principal ponderea pe care o dețin diverși factori etiologici în producerea rahitismului carențial la sugar și copilul mic.

Concomitent s-au urmărit principalele forme clinice de manifestare și unele aspecte ale tratamentului profilactic și curativ.

Din concluziile lucrării se desprinde faptul că manifestările osoase craniene sunt prezente în procentajul cel mai mare (66,47%) din totalul cazurilor. Anemia rahiticului a fost prezentă în proporție de aproximativ 70%.

În 88,67% din cazuri se găsesc implicați în etiologie între 2 și 6 factori favorizanți, ceea ce înseamnă că numai profilaxia cu vitamina D nu este suficientă.

Nici profilaxia cu vitamina D nu se efectuează corect. Astfel, 17,61% din pacienți nu au efectuat profilaxia cu vitamina D, iar în 22,37% din cazuri aceasta a fost incomplet efectuată. Una din metodele profilactice ar fi îmbogățirea sistematică a laptelui praf cu vitamina D. Acest mod de profilaxie utilizat în numeroase țări europene, în SUA și Canada, și-a dovedit eficacitatea, rahitismul carențial devenind foarte rar în aceste țări.

Lucrarea cuprinde și referințe clinice privitoare la rahitismul adolescentului, rahitismul hipomagneziem, precum și unele aspecte terapeutice.

Prin incidența crescută, prin multitudinea de factori favorizanți implicați în etiologie, prin profilaxia cu vitamina D incomplet efectuată și existența unor forme cu hipomagneziem, rahitismul carențial vitamino-D-sensibil este o problemă de larg interes.