

ROLUL MALFORMAȚIILOR COLECISTULUI ÎN PATOGENEZA LITIAZEI BILIARE

Imola Török, Ana Bratu, Simona Băjagă, Ligia Bancu, C.Dudea

Clinica Medicală nr.1

U.M.F. Târgu-Mureș

Malformațiile vezicii biliare prezintă variate aspecte anatomice. Ecografia abdominală poate să aprecieze modificările de formă ale colecistului. Ca urmare a modificării anatomiei colecistului, contractilitatea și evacuarea conținutului biliar se schimbă, determinând stază biliară. Se știe că staza biliară favorizează cristalizarea și nucleerea colesterolului, urmat de formarea și creșterea calculilor de colesterol.

Scopul studiului nostru constă în stabilirea frecvenței cu care apare litiaza biliară la bolnavii cu colecist malformat.

În acest scop, pe un număr de 10000 bolnavi examinați ecografic în timp de trei ani (II 1991-XII 1994) am reținut cazurile cu malformații ale vezicii biliare, cu și fără calculi.

Astfel, din cei 10000 bolnavi examinați, am găsit malformații ale vezicii biliare la 1504 pacienți, reprezentând 15%. Cei 1504 bolnavi cu malformații ale colecistului au avut și litiază biliară într-un număr de 305 cazuri reprezentând 20,3% din totalul bolnavilor cu modificări anatomice ale colecistului.

În concluzie, malformațiile vezicii biliare:

- sunt prezente în proporție de 15% într-o populație generală examinată ecografic;
- sunt însoțite de calculi biliari în 20,3% din cazuri, ceea ce reprezintă o cifră statistic semnificativă ($p < 0,01$);
- pot fi considerate ca un factor favorizant important în patogeniza litiazei biliare, probabil în condițiile existente și a altor factori favorizanți.