

SECVENȚE CLINICO-TERAPEUTICE PRIVIND ATTITUDINEA NOASTRĂ ÎN CAZUL APARIȚIEI REACȚIEI DE RESPINGERE A PROTEZELOR SINTETICE ABDOMINALE

D.Deac, Liana Deac, N.Turdeanu***

Spitalul Clinic de Intreprinderi Cluj

*I.S.P.C.M.- Laborator Epidemiologie, Cluj-Napoca

**Clinica de Chirurgie V, U.M.F. Cluj-Napoca

În ultimii 30 de ani utilizarea protezelor sintetice în chirurgia defectelor parietale abdominale a luat o mare amploare, aceasta datorându-se și dezvoltării industriei chimice, care furnizează materialul sintetic.

Cu toate perfecționările aduse în timp, atât în ceea ce privește materialul sintetic cât și tehnica utilizată, problema reacției de respingere a organismului față de materialul utilizat rămâne încă nerezolvată. Cu toate acestea, menținerea protezei este necesară.

Datorită acestor considerente, având o oarecare experiență în acest domeniu, am inițiat un studiu clinic și terapeutic menit să ducă în final la păstrarea protezei.

Am luat în studiu 12 cazuri cu reacție de respingere (3 de sex masculin și 9 de sex feminin cu vârsta varînd între 35-72 ani).

Se analizează în continuare manifestările locale și generale ale reacției de respingere și se fac referiri la procedeele operatorii și de terapie locală și generală aplicate, toate în scopul menținerii protezei.

Se descriu și 3 cazuri în care a fost necesară suprimarea protezei.

În concluzie, deși cazuistica este redusă, susținem faptul că proteza trebuie și poate fi păstrată, adoptând conduita noastră.
