

ATTITUDINEA CHIRURGICALĂ ȘI REZULTATELE TARDIVE ÎN PROLAPSUL GENTAL OPERAT

C. Enciulescu, H. Mândărianu, Jolanda Kusztos

Clinica de Obstetrică și Ginecologie nr. 1
U.M.F. Târgu-Mureș

În perioada 1984-1993 în Clinica de Ginecologie nr. 1 s-au făcut 5532 operații ginecologice, din care 865 pentru prolaps genital, reprezentând 15,64%.

Pentru studierea și compararea rezultatelor a fost nevoie de o standardizare a multulelor denumiri, atât în cazul diagnosticului cât și în cazul operațiilor.

Operațiile au fost grupate în 8 categorii, cele mai frecvente fiind cele de tip colporafie anterioară + colpoperineorafie reprezentând 64,85%.

Evaluarea rezultatelor s-a făcut cu ajutorul unui chestionar trimis tuturor celor 862 bolnave luate în calcul. Am primit 453 răspunsuri din care au putut fi utilizate 427 (49,59%).

Din cele 427 răspunsuri 373 paciente s-au simțit mai bine după operație, adică 87,35%. Rezultatele tardive arată însă că numai 273 dintre paciente nu mai au problemele pentru care s-au operat, adică 63,93%. Restul de 36,07% prezintă I.U.E. recidivantă la un interval în medie de 21 de luni.
