

# MENINGOENCEFALITA CĂRBUNOASĂ (PROBLEME CLINICO-EVOLUTIVE ȘI TERAPEUTICE)

*S.Rugină\*, A.Toader\*\**

\*Clinica de Boli Infecțioase, Facultatea de Medicină

\*\*Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Militar, Constanța

Se prezintă un caz de meningoencefalită primitivă cu lichid hemoragic de etiologie cărbunoasă la un tânăr de 36 ani. Raritatea acestor cazuri precum și numărul redus de comunicări și publicații cu această temă, impun cu necesitate reamintirea ori de câte ori este cazul a posibilității unei astfel de evoluții a antraxului, mai ales în condițiile creșterii morbidității prin

această zoonoză, așa cum s-a întâmplat în anul 1994. Tânărul, pădurar de profesie, sacrificase și eviscerase cu 4 zile înaintea internării o vacă dovedită ulterior a fi fost bolnavă de antrax, fiind internat în secția de boli infecțioase pentru comă, febră, sindrom de iritație meningeasă. Evoluția cazului a fost severă, în pofida măsurilor terapeutice energice impuse (seroterapie anticărbunoasă, penicilinoterapie, corticoterapie, antiedematoase etc.) decesul survenind la 6 ore de la internare. Diagnosticul clinico-epidemiologic, a fost confirmat rapid bacteriologic prin evidențierea bacililor cărbunoși atât în examenul direct al LCR, cât și prin culturile pe medii uzuale. Se subliniază încă o dată insuficiența nivelului educativ-sanitar al populației precum și a măsurilor sanitar-veterinare, singurele în măsură de a controla evoluția acestei zoonoze.