

OBSERVAȚIILE NOASTRE ASUPRA INFECȚIEI CU VIRUS C

Doina Stănescu*, Emilia Nicoară*, M. Dragomirescu*, T. Moisil**, Maria Cerbu*, Narcisa Nicolescu*, Stanca Jianu***, Natalia Roșiu***

*Clinica de Boli Infecțioase, Universitatea de Medicină și Farmacie

**Spitalul Clinic „V. Babeș”

***Centrul de Sănătate Publică, Timișoara

Studiile de epidemiologie din întreaga lume arată o prevalență a hepatitei cu virus C variind între 0,1-1,5%. Folosind teste de diagnostic de ultimă generație am putut dovedi că frecvența acesteia este mai mare. Deși deseori asimptomatică, 50% din cazuri dezvoltă hepatită cronică cu posibilitatea de evoluție spre ciroză hepatică și carcinom hepatocelular.

Determinând anticorpii anti-HCV la pacienții cu hepatită non-A non-B internați sau dispensarizați în Clinica de Boli Infecțioase Timișoara în ultimii 5 ani, am putut identifica hepatita virală C în unele din aceste cazuri. 60% dintre acestea au fost spitalizați cu diagnosticul de hepatită acută virală, iar 40% dispensarizați ca hepatite cronice non-A non-B.

Vârsta bolnavilor cu anticorpi anti HCV pozitiv a variat între 3-60 ani, 22% fiind copii între 3-14 ani. În studiul nostru, calea de transmitere principală (posttransfuzională) a putut fi identificată doar la o mică parte din cazuri (sub 20%).