

MANIFESTĂRI CLINICE ALE HEPATITELOR VIRALE. (CONSIDERAȚII ASUPRA 1274 CAZURI)

V. Luca, Doina Mihalache, Cătălina Luca, Irina Iacob, Florica Dănilă,
Lucia Grigore, Elena Logigan, Anca Iriciuc

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași

Au fost analizate 1274 cazuri de hepatită virală, spitalizate în Clinica de Boli Infecțioase Iași în perioada 1993-1994. Profilul etiologic a fost predominant de hepatita tip A - 602 cazuri (47,2%), urmată de hepatita B cu 433 cazuri (34,77%), hepatita C cu 122 cazuri (9,51%), în 3 cazuri (8,16%) etiologia a fost mixtă B+C iar în 0,02% etiologia a fost neprecizată. Etiologia posttransfuzională a fost întâlnită la 170 cazuri (13,34%). Repartiția pe ani calendaristici arată o ușoară predominanță a cazurilor în 1994 - 696 (54,6%), repartiția pe sexe arată o proporție relativ egală M/F = 633/641 (49,69%/50,31%) și se remarcă predominanța cazurilor provenite din mediul urban: 1062 (83,2%). Dintre grupele de vârstă, a predominat cea a adultului tânăr cu 506 cazuri (39,7%) urmată de cea a copilului cu 215 cazuri (16,8%). Din punct de vedere clinic a predominat forma medie de boală - 612 cazuri (40,18%), iar forma prelungită a fost întâlnită în 273 cazuri (21,42%). Icterul a fost prezent în 734 cazuri (57,6%), precedat sau nu de simptome generale și cu o durată medie de 10-14 zile, cu valori cuprinse între mai puțin de 6,0 mg% - 98 cazuri (13,57%), 5,0-10,0 mg% - 375 cazuri (57,62%) și peste 10,0 mg% - 213 cazuri (28,8%). Valorile transaminazelor au fost crescute cu valori ce au variat între sub 50 UI/l - 71 cazuri (5,57%), între 50-100 UI/l - 375 cazuri (29,43%) și peste 100 UI/l în 828 cazuri (65%). S-au înregistrat 5 decese (0,39%) din care 2 adulți și 3 copii.