

MANIFESTATION CLINIQUE DE HEPATITES VIRALES. (CONSIDERATIONS SUR 1274 CAS)

V. Luca, Doina Mihalache, Cătălina Luca, Irina Iacob, Florica Dănilă,
Lucia Grigore, Elena Logigan, Anca Iriciuc

Clinique des Maladies Infectieuses,
Université de Médecine et Pharmacie, Iasi

Nous avons fait une étude sur 1274 cas des hépatites virales hospitalisées dans notre service entre 1993-1994. La mortalité était faible 0,39%. L'agent étiologique prédominant était le virus de l'hépatite A (602 cas - 47,2%), suivi par VHB (433 cas - 34,77%), VHC (122 cas - 9,51%), VHB+C (3 cas - 8,16%). Dans 0,02% l'agent étiologique reste inconnue. L'étiologie posttransfusionnelle a été rencontrée dans 170 cas (13,3%). Les fluctuations annuelles des cas relevant une discrète prédominance en 1994 (694 cas - 54,6%), les hommes et les femmes sont également affectés (49,69%/50,31%) la grande majorité des cas a une provenance urbaine. La répartition des cas sur tranches d'âge indique que la maladie était prédominante à l'adulte jeune (506 cas - 39,7%) suivi par l'enfant (215 cas - 16,8%). La forme clinique la plus fréquemment rencontrée était la forme moyenne et la forme prolongée (273 cas - 21,42%). L'ictère était présent dans 734 cas (57,64%) précédait ou mondes symptômes générales avec une durée moyenne de 10-14 jours et avec des valeurs de la bilirubinémie variable (<60 mg% - 98 cas - 50-100 mg% - 375 cas, +100 mg% - 213 cas). Les transaminases ont été élevées mais avec des valeurs variables (<50 UI - 71 cas, 50-100 UI - 375 cas - +100 UI - 828 cas). Nous avons enregistré 5 décès (0,39%): 2 adultes et 3 enfants, deux décès en 1993 à la sexe masculin.