

LE RÔLE DE LA DÉTERMINATION DES MARQUERS SÉROLOGIQUE DE L'HÉPATITE VIRALE AIGÜE POUR PRÉCISER LE DIAGNOSTIQUE ET LE PROGNOSTIQUE DE LA MALADIE

*Valentina Florea, Georgeta Burugiu, Claudia Rugină, Mariana Codarcea,
Eugenia Muja*

Clinique des Maladies Infectieuses,
Hôpital Municipal, Constanța

Tenant compte de la large répan­due des les cinq virus hépatiques spécifiques (A, B, C, D, E) on a fait un étude sur le diagnostique, l'évolution et le prognostique des maladies données par ces virus, parce que dans notre pays, les hépatites représentent des problèmes de santé publique. On a trouve des différences essentielles vis à vis des étude et les statistique antérieures de notre pays, ainsi que des différences mais aussi des données pareilles, entre les études et les statistiques des pays de l'ouest de l'Europe. Ces études ont été possibles grâce aux marqueurs sérologiques des hépatites aiguës B et C par la méthode immuno-enzymatique de l'appareil de la ligne Pasteur - 2^{ème} génération qu'on a eu à disposition avant commencer l'étude. Nos statistiques contiennent un tas des malades avec hépatite virale aiguë dans notre hôpital dans l'intervalle 01.01.1993-01.01.1994. Du point de vue clinique on a trouve beaucoup de formes ressemblantes, correspondants aux typiques, classiques sémiologiques, biochimiques et comme évolution, mais ayant un pourcentage agrandi vers la chronicité. Du total de 845 d'hépatites virales aiguës, 406 sont type B, donc 48% (un pourcentage très

élevé vis à vis des statistiques antérieures). Du total de 406 hépatites virales aiguës de type B, 58 ont été enfants donc un pourcentage de 14% (les français 10%). Du point de vue épidémiologique la voie de transmission est aussi horizontale par le sang ainsi que par les contacts directs et répétés en collectivités familiales ou autres (écoles, jardins d'enfants etc.). La transmission verticale est plus rare. 20% des cas d'hépatites aiguës B dans les quelles dans la période de suite on trouve précocement les anticorps HBs et HBe ont une évolution favorable et un pronostic bon et un très bon potentiel de guérison. La présence plus de 6 mois des antigènes HBs et HBe témoigne une capacité infectieuse élevée et une grande tendance pour la chronicité de la maladie. Une évolution vers la chronicité avec la persistance des marqueurs spécifiques ont eu aussi les hépatites dans les quelles on a diagnostiqué dès le début la double infection B et C, donc un nombre élevé d'affection avec invalidité.