

CONSIDERAȚII ANATOMOPATOLOGICE ÎN CAZURILE LETALE DE HEPATITĂ VIRALĂ ACUTĂ

L. Păun, Maria Teodorescu

Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale,
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

Lucrarea se bazează pe studiile clinice și histologice hepatice la necropsiile efectuate în Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș", pe o perioadă de 8 ani, cuprinzând copii și adulți și totalizând 135 decedați. Majoritatea deceselor sunt la copii - 81 din 135 - în special de vârstă mică 5 luni - 3 ani, iar adulți 54, majoritatea între 20-34 ani. Făcând o statistică a deceselor de hepatită virală acută pe această perioadă 1987-1994 am constatat că din 1987-1991 sunt 107 decese, iar din 1991-1994, 28 decese. Corelarea datelor clinice cu cele de laborator și cu prezența sau absența antigenului HBs, arată că din 135 decese 79 prezintă AgHBs, 36 nu prezentau, iar 20 incert. Examenenele histologice au pus în evidență că necroza acută hepatică din cadrul hepatitelor virale s-a produs pe un ficat tarat cum ar fi leziuni de distrofie grasă, stază biliară intracanaliculară sau intracelulară, distrofie granulară, distrofie clară hepatică, proliferare de celule Kupfferiană, hepatită cronică, infiltrate celulo-inflamatorii și altele.