

ASPECTE CLINICO-HISTOLOGICE ÎNTÂLNITE ÎN HEPATITA VIRALĂ FULMINANTĂ (POSTER)

D.Hurezeanu, F.Bogdan, Mioara Cotulbea, Livia Dragomir, Carmen Canciovici

Clinica de Boli Infecțioase, Laboratorul de morfopatologie,
Facultatea de Medicină, Craiova

Hepatita virală fulminantă ridică probleme deosebite pentru medicul practician și pentru cercetător prin numeroasele necunoscute pe care le implică. În prezenta lucrare efectuată pe un lot de bolnavi decedați în Clinica de Boli Infecțioase cu diagnosticul de mai sus, în intervalul 1985-1995, am urmărit corelațiile dintre forma clinică de debut, tipul de infecție (virus hepatitic de tip A sau B), terenul pe care a evoluat boala și aspectul morfologic și histopatologic al ficatului. Rezultatele noastre demonstrează inexistența unor semne patognomonice pentru tendința evolutivă cu prognostic grav. Majoritatea deceselor au prezentat o hepatită virală la care nu s-a izolat AgHBs, aspect discordant oarecum cu datele din literatură. Studiul histologic a relevat modificări ale parenhimului hepatic, evidente în zona periferică a lobului hepatic și în zona centro-lobulară, foarte rar în regiunea imediat subcapsulară. Stroma hepatică, studiată prin metode adecvate, a obiectivat fibrilostroma alterată, prin modificări de calibru cu nodozități și ramificații mai puține și frecvente fragmentări ale fibrelor. Nu am constatat o corelare directă și caracteristică între manifestările clinice și tabloul histopatologic, dar în toate cazurile cu insuficiență hepatică modificările la nivelul parenhimului și ale stromei sunt foarte intense.