

ASPECTE CLINICE ALE HEPATITEI VIRALE POSTTRANSFUZIONALE (CONSIDERAȚII ASUPRA 223 CAZURI)

*V. Luca, Doina Mihalache, Cătălina Luca, Irina Jacob, Florica Dănilă, Lucia
Grigore, Elena Logigan, Anca Iriciuc*

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași

Lucrarea prezintă unele aspecte ale prognosticului imediat al hepatitei posttransfuzionale (HPT), aspecte desprinse din analiza retrospectivă a 223 cazuri, internate în clinica noastră în perioada 1.01.1991-31.12.1994. Raportate la totalul internărilor de hepatită virală, aceste cazuri reprezintă 5,7%. Incidența anuală a HPT a variat între 42 și 70 cazuri. Incidența după grupe de vârstă: vârste extreme 7 luni - 80 ani, afecțiunea a predominat la adult (30-50 ani: 45% din cazuri). Incidența pe grupe de vârstă și sex s-a corelat cu afecțiunile ce au impus transfuzia: neoplazii (20% din cazuri), hemoragie digestivă superioară din ulcerul gastric sau duodenal (20%), afecțiuni ginecologice și obstetricale (27%). Perioada de incubație a variat între 18 și 120 zile, fiind în medie de 55 zile. 14% din cazuri au evoluat anicteric. Formele clinice, după intensitatea icterului au fost: medii (55,6%), ușoare (19,2%) și severe (10,3%). Recăderile au fost întâlnite la 12% din cazuri. La 75,7% din cazuri valorile TGP au fost mici (sub 400 U.L/l). Au decedat 5 bolnavi, dintre care numai 2 prin insuficiență hepatică acută (indice de letalitate 0,8%).