

## **LES HEPATITES VIRALES POST-TRANSFUSSIONELLES. ASPECTS CLINIQUES.(CONSIDERATIONS SUR 223 CAS)**

*V.Luca, Doina Mihalache, Cătălina Luca, Irina Iacob, Florica Dănilă, Lucia Grigore, Elena Logigan, Anca Iriciuc*

Clinique des Maladies Infectieuses,  
Université de Médecine et Pharmacie, Iași

Nous avons fait une étude retrospective sur 223 cas des hepatitis virales post-transfusionnelles dans notre service entre 1.01.1991 et 31.12.1994 pour presenter quelques aspects concernant leur pronostic immediate. Nos cas (223) represent seulement 5,7% des toutes les cas des hepatitis virales hospitalises dans la meme periode. Le nombre des hepatitis virales post-transfusionnelles etait entre 42 et 72 cas (per an). La repartitions

chez cas sur touche d'age indique que la maladies a predominee a l'adult (30-50 ans - 45% cas) extremes (71 - 80 ans) ce que est en correlation avec des maladies qui imposent les transfusions: neoplasies - 20% cas, hemorragie digestives superieure (ulcer gastrique ou duodenale) 20%, affections gynecologique et obstreticales (27%). La periode d'incubation etait variable 18-120 jours (en moyenne 55 jours). Les formes de manifestations cliniques correspondentes a l'intensite de l'ictere etaient: severe (10,3%), formes moyennes 55,6% et 14% formes anicteriques. Les rechutes etait en proportion de 12%, et un letalite de 0,8%.