

# FORME SEVERE DE HEPATITĂ VIRALĂ ACUTĂ LA COPIL, ÎN PERIOADA 1985-1994

*Paula Surugiu, Adriana Georgescu, Maria Marinescu, I. Diaconescu*

Clinica de Boli Infecțioase-Pediatrie,  
Facultatea de Medicină, Craiova

Pe o perioadă de 10 ani au fost studiate 27 cazuri de hepatită virală acută, forme severe, la copil. Am considerat ca forme severe decese,

sindromul neuro-psihic, coma, insuficiența hepatică acută (procent protrombină mai mic de 40%). Dintre acestea, 17 cazuri (62,9%) au fost cu AgHBs prezent, 1 caz (3,4%) cu hepatită virală acută tip C, iar nedeterminați 9 cazuri (33,3%), (anticorpul anti-virus hepatic C s-au lucrat de la sfârșitul anului 1994). Formele grave au fost mai frecvente la fete, 17 cazuri (62,9%). Au predominat în mediul urban 16 cazuri (59,2%). Ancheta epidemiologică a fost relevantă pentru 21 cazuri (92,5%), tratamente parenterale 13 (48%), tratamente stomatologice 1 caz (3,7%), intervenții chirurgicale 2 cazuri (7,4%), caz similar în familie/colectivitate 6 cazuri (22,2%). Forma gravă de hepatită virală acută a fost întâlnită la copiii cu handicap biologic anterior internării și boli asociate pe perioada internării (infecții urinare, tuberculoză, tuse convulsivă, varicelă, anemie, distrofie, rahitism, cord congenital, sechele poliomielită). Sindromul comatos a fost înregistrat la 10 cazuri (37%) din care 7 cazuri (22,2%) au decedat. Dintre decedați 5 cazuri (71,4%) au fost cu AgHBs prezent. Din cei 7 decedați, 6 au fost sugari (85,7%) și 1 caz de 13 ani - sechele poliomielită și malformație congenitală de cord, copil de colectivitate (14,2%). S-au cronicizat 5 cazuri (18,5%). Formele severe se corelează cu vârsta și terenul biologic deficitar.