

EFICACITATEA TERAPEUTICĂ A INTERFERONILOR LA BOLNAVI CU HEPATITĂ VIRALĂ B

T. Holban, S. Ceșic

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie,
Chișinău (Republica Moldova)

S-a efectuat un studiu asupra a 91 bolnavi cu hepatită virală acută de tip B (AgHBs+), confirmată prin metode clinice, biochimice și serologice. Aprecierea eficacității terapeutice a preparatelor Reaferon (RF- α_2 -interferon (IF) recombinat) și Leucinferon (LF-produs complex al α_2 -interferonului natural și al citokinelor produse de leucocite în urma inducției cu virusuri) s-a efectuat prin metoda dublu-orb. Din I lot au făcut parte 30 bolnavi, care au primit LF (cură de 10 zile; în total - $1,3 \times 10^5$ Un IF), în lotul II au fost 30 bolnavi, care au primit RF (cură de 10 zile, în total - $1,3 \times 10^7$ Un IF), iar lotul III l-au alcătuit 31 bolnavi, cărora li s-a administrat Placebo. Aplicarea tratamentului cu LF a dus la micșorarea duratei de manifestare a sindromului de intoxicație, sindromului disepptic, duratei perioadei icterice și a sindromului citolitic, apreciat după nivelul ALAT. În acest lot de bolnavi nu s-au înregistrat forme trenante ale maladiei. În urma tratamentului cu RF nu s-a înregistrat vreo acțiune asupra evoluției sindroamelor clinice, dar s-a depistat o descreștere mai rapidă a nivelului ALAT și bilirubinei în timpul administrării preparatului. LF a avut o acțiune normalizatoare asupra conținutului de limfocite CD3-, CD4- și CD8- în sângele periferic. Tratamentul cu LF și RF duce la o creștere a activității funcționale a celulelor natural killer. Aplicarea LF ducea la o stimulare a producției de IF - α de către limfocitele sângelui periferic. Durata medie a AgHBs - emiei în I lot a fost de $23,6 \pm 3,1$ zile, în lotul II - $31 \pm 3,9$ zile și în lotul III - $33,5 \pm 3,0$ zile. Rezultatele investigațiilor noastre ne permit de a recomanda folosirea Leucinferonului în tratamentul complex al hepatitei virale B acute.