

EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE DES INTERFERONS AUX MALADES D'HÉPATITE VIRULENTE DE TYPE B

T. Holban, S. Cegic

Université de Médecine et Pharmacie,
Kichinev (Republique Moldavie)

Nous sommes livrés à l'étude de 91 malades avec une hépatite virulente aiguë de type B (AgHB+), confirmée par des méthodes cliniques, biochimiques et serologiques. L'appréciation de l'efficacité thérapeutique des médicaments Reaferon (α_2 -interferon récombinat) et Leucinferon (produit complexe de α_2 -interferon naturel et de cytokines, produites des leucocytes à la suite de l'induction par les virus) a été effectuée par la méthode double aveugle. Dans le I groupe des malades ($n=30$) on a administré Leucinferon pendant 10 jours (en somme $1,3 \times 10^5$ Un IF). Dans le II groupe ($n=30$) on a administré Reaferon (un cours de 10 jours, en toute $1,3 \times 10^7$ Un IF). Le III groupe des malades ($n=30$) ont reçu Placebo. L'application du traitement avec Leucinferon a mené à une diminution de la durée de manifestation de l'intoxication, du syndrome dyspeptique, de l'ictère et du syndrome cytolytique, appréciée conformément au niveau de l'ALAT. On n'a pas enregistré des formes tenantes de la maladie dans ce groupe. Après l'application du traitement avec Reaferon on n'a enregistré aucune action sur l'évolution des syndromes cliniques, mais on a observé une diminution plus rapide du niveau de l'ALAT et du bilirubine pendant l'administration du médicament. Le Leucinferon a eu une action de normalisation sur le contenu des lymphocytes CD3-, CD4- et CD8- dans le sang périphérique. Le traitement avec Leucinferon et Reaferon menait à une augmentation de l'activité fonctionnelle des cellules natural killer. L'application de Leucinferon menait à une stimulation de la production de IF- α par les lymphocytes du sang périphérique. La durée moyenne de l'AgHBs -émie dans le I groupe a été de $23,6 \pm 3,1$ jours, dans le II groupe - $31,6 \pm 3,9$ jours et dans le III groupe - $33,5 \pm 3,0$ jours. Les résultats de nos investigations nous permettent de recommander l'utilisation de Leucinferon dans le traitement complexe du hépatite virulente aiguë type B.