

QUELQUES ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET CLINIQUE DE LA TOUX CONVULSIVE PAR RAPPORT A L'INTRODUCTION DE LA VACCINATION A TETRACOQ DANS LE DISTRICT DE DOLJ

Mihaela Sava, Daniela Capac, Teonifia Gavrila

I.P.S.M.P. Dolj

Dans le district de Dolj les enfants nés dans la période 1 juillet 1992 - 1 juillet 1994 ont bénéficié de la vaccination polio-combinée avec le produit français Tetracoq. L'âge du commencement de la première vaccination a baissé d'un mois de sorte que la vaccination du nouveau-né commence à l'âge de deux mois comme dans le cas de DTP. L'on a étudié des cas de toux convulsive hospitalisés dans la Clinique de Maladies Infectieuses de Craiova.

L'on a étudié la casuistique soumise a la vaccination TQ, c'est a dire les enfants nés dans la période 1 juillet 1992 - 1 juillet 1994, pour une période de 2 ans et 9 mois en comparaison avec la casuistique soumise a la vaccination DTP, c'est a dire les enfants nés dans la période 1 juillet 1990 - 1 juillet 1992, pour une période de 2 ans et 9 mois de vie. L'on a étudié les fiches d'observation (nombre de jours d'hospitalisation, les complications, la médication etc.), et les données des vaccinations offertes par les registres uniques d'immunisations des dispensaires territoriaux. Le vaccin TQ a montré sa supériorité face au vaccin trivalent roumain par la diminution de la casuistique de toux convulsive. L'âge du début de la maladie pour les non vaccinés descend audessous de 2 mois par rapport a 3-4 mois. L'assurance des conditions de conservation des produits biologiques a laquelle s'ajoute une surveillance stricte de la vaccination peuvent etre les facteurs qui ont concouru a la croissance de l'efficience de la vaccination avec la componentte pertusis.