

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ȘI CLINICO-TERAPEUTICE ÎN BOALA DIAREICĂ ACUTĂ LA SUGAR ȘI COPIL

Madelena Drăgan, Rozina Iagăru, Monica Luminos, Ruxandra Măntescu,
Elena Gheorghe

Clinica de Boli Infecțioase-Pediatrie,
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

Studiul a fost efectuat pe 2100 de cazuri de boală diareică acută la sugar și copil, internate în spitalul nostru în anul 1994. Grupa de vârstă cea mai afectată a fost cea a sugarilor, 1 lună-12 luni, cu 1089 cazuri, urmată de grupele de vârstă: 1-3 ani (546 cazuri), 3-5 ani (246 cazuri), 5-12 ani (155 cazuri) și în final nou-născuții cu 64 de cazuri. Distribuția sezonieră a relevat un număr crescut de cazuri de îmbolnăvire vara și toamna. Din punct de vedere socio-economic 1116 cazuri au provenit din mediul urban și 984 din zonele rurale; un număr redus de cazuri s-a înregistrat la copii din orfeline. Aspectul clinic dominant a fost de gastroenterocolită acută. 191 de cazuri au prezentat șoc hipovolemic și 16 coagulare diseminată intravasculară. Etiologia bacteriană a fost stabilită în 55% din cazuri, după cum urmează: Shigella (552 cazuri), Salmonella (20 cazuri), E.Coli (13 cazuri). Un număr de 300 cazuri au fost considerate de etiologie virală, în context clinico-epidemiologic (coproculturi negative și evidență sezonieră a unor infecții virale). De asemenea am înregistrat 200 de cazuri cu diaree secundară unor infecții respiratorii acute, otite supurate și mastoidite. 650 de cazuri de diaree care au survenit la sugari și copii mici au fost determinate

de greșeli în tehnica alimentației. În sfârșit, în 300 de cazuri nu am putut stabili agentul etiologic, eșec datorat probabil terapiei ambulatorii instituite anterior internării. Antibiograma a evidențiat rezistența crescută a germenilor izolați la majoritatea antibioticelor testate. Se menține, totuși, un procent crescut de tulpini bacteriene sensibile la acid nalidixic (85% din tulpinile testate). Tratatamentul a fost administrat pe o perioadă de 5-6 zile în formele medii și 12-14 zile în formele severe cu infecție sistemică. Evoluția bolii diareice acute a fost favorabilă în 99,5% din cazuri, 2809 de pacienți externându-se vindecați.