

HERPES ZOSTER LA COPIL: CONSIDERAȚII CLINICO-EPIDEMIOLOGICE ASUPRA 32 CAZURI (8 CU HIV)

St.Dimitriu*, V.Luca*, C.Scurtu*, Irina Mitroi**, Carmen Corcaci*,
Mihaela Cătălina Luca*

*Clinica de Boli Infecțioase, Universitatea de Medicină și Farmacie

**Inspectoratul de Poliție Sanitară și Medicină Preventivă, Iași

În deceniul 1985-1994 au crescut important internările în clinică cu herpes zoster (H-Z) la copil: 32 cazuri față de 128 adulți cât și cele cu varicelă: 391 cazuri (86,1%). Numai în 1984 s-au internat cu H-Z 30% din copii și 25% din adulți. Vârsta medie 8,4ani (extreme: 1,4-16 ani) și respectiv 56 ani (extreme: 17-88 ani). Varicela în antecedente era notată la 22,4% din copii și la 8,2% din adulți; 54% copii și 51% adulți erau de sex feminin. Internările pentru H-Z au predominat în sezonul cald, invers ca în varicelă. Dermatoamele afectate au fost: intercostale (41,9% la copii, 54,4% la adulți), lombo-sacrate (25% și respectiv 16,4%), craniene (16%, respectiv 19,2%), cervicale (16%, respectiv 7%). Un copil cu H-Z mandibular avea și zoster oral. La copii, H-Z era însoțit de: febră (38-40°C în 37,5% cazuri), neuralgie în faza acută (39%) și de alte boli (40,6%, la adulți 21%). 8 copii (25%) erau HIV pozitivi (5 cu boală SIDA): la aceștia erupția a fost mai prelungită în 3 cazuri asociată de la debut cu sindrom Reye (un caz cu comă de 5 zile) și recidivantă în 3 cazuri (unul cu trei episoade). Toți copiii s-au

vindecat sub tratament simptomatic. O fetiță de 5 ani cu boală SIDA a
decedat la 8 luni după recidiva de zoster.