

LE ZONA CHEZ L'ENFANT: CONSIDÉRATIONS CLINICO-EPIDÉMIOLOGIQUES SUR 32 CAS (8 VIH SÉROPOSITIFS)

St.Dimitriu*, V.Luca*, C.Scurtu*, Irina Mitroi**, Carmen Corcaci*,
Mihaela Cătălina Luca*

*Clinique des Maladies Infectieuses, Université de Médecine et Pharmacie

**Centre de Medicine Preventive, Iași

Entre 1985-1994 ont été hospitalisés en notre service pour le zona 32 enfants et 178 adultes, ainsi que 391 cas avec varicelle (86,1% enfants). Seulement en 1994 ont été hospitalisés pour le zona 30% des enfants et 25% des adultes. L'âge moyen: 8,4 ans (extrêmes: 1,4-16 ans) et respectivement 56 ans (extrêmes 17-87 ans). La varicelle en antécédents était notée chez 22,5% des enfants et chez 8,2% des adultes; 54% parmi les enfants et 51% des adultes étaient de sexe féminin. Les hospitalisations pour le zona ont été dominées dans les mois chaudes et inverse dans la varicelle. Les métamères affectées étaient: intercostales (41,9% chez l'enfant, 91,4% chez l'adulte) des membres (25% et respectivement 16%) du visage (16% et respectivement 19%) et cervicales (16% et 7%). Un enfant avait de zona oral. Chez les enfants, le zona était accompagnée de fièvre (38-40°C, envers 21% chez les adultes). Huit des enfants (25%) étaient VIH séropositifs (5 avec SIDA); chez ces enfants l'éruption a été prolongée (3 cas), associée de le début du zona avec syndrome Reye (1 cas, avec coma de 5 jours) ou avec récides (3 cas, un avec 3 épisodes). Tous ces enfants étaient guéris sous le traitement symptomatique. Un enfant avec SIDA, âgé de 5 ans, a décédé 8 mois après la récide du zona.