

QUELQUES CONSIDÉRATIONS CLINIQUES ET ÉPIDÉMIOLOGIQUES CONCERNANT UN ÉPISODE D'EXHANTHEME ROUGEOLIFORME SURGI DANS UNE COLECTIVITÉ D'ENFANTS

Mihaela Petrescu*, Ileana Brâncuș*, Dorina Udrescu**

*I.P.S.M.P., Dolj; **I.I.S.P.S.S.C., București

L'étude présente des observations cliniques et épidémiologiques concernant un foyer de maladie fébrile à exanthème rougeoliforme sué dans un village. Le foyer concerne deux collectivités - scolaire et préscolaire - et est découvert à l'occasion du triage épidémiologique au début du III^e trimestre. Le diagnostic clinique est de rougeole exigeant la prophylaxie par vaccination anti-rougeole des contacts de collectivités. Les cas comprennent 26% des élèves et 35% des enfants à l'âge préscolaire, tous ayant des antécédents, vaccinaux anti-rougeoliques. Ultérieurement les examens virologiques des exsudats du nez et du pharynx ont relevé la présence des virus Coxsackie types A6A10, et A1A5, USR, ECHO et parainfluenza type 3. En conclusion, les auteurs apprécient que l'incidence de la rougeole dans la

population vaccinée peut être faussement élevée par l'impossibilité d'un diagnostic de laboratoire correct et rapide. Du point de vue pratique ceci engendre un consommé exagéré de matériel biologique administré dans les foyers considérés être de rougeole.