

ASPECTE CLINICE ȘI PARACLINICE ALE PACIENȚILOR CU MENINGITE VIRALE INTERNATE ÎN SECȚIA DE BOLI INFECȚIOASE, SPITALUL MUNICIPAL HUȘI

T.Mititelu, C.Străchineanu, M.Bolea, M.Gârlău

Secția de Boli Infecțioase,
Spitalul Municipal Huși

În ultimii 6 ani, în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Huși, au fost internați un număr de 75 bolnavi cu diagnosticul de meningită virală. Din aceștia, 44 au provenit din mediul rural, iar 31 din mediul urban. Repartizarea bolnavilor pe grupe de vârstă a evidențiat; a) 0-1 an: 3; b) 1-3 ani: 4; c) 3-5 ani: 4; d) 6-15 ani: 17; e) peste 15 ani: 47. Simptomele clinice au fost reprezentate de cefalee, fotofobie, grețuri, vărsături și redoarea cefei. La 10% din bolnavi s-au remarcat bombarea fontonelei și semnul Trousseau. Lichidul cefalorahidian a fost clar și hipertensiv. Citologia a evidențiat 30-1000 celule/mm³, din care 80% au fost limfocite. Reacția Pandy a fost cuprinsă între "+" și "++++". Albumina a variat între 0,35 g‰ și 3 g‰. Evident, nu s-a remarcat nici o floră microbiană. Evoluția bolnavilor a fost favorabilă, cu perioade de internare cuprinse între 7-8 zile și 17 zile.