

L'IMPORTANCE CLINIQUE DE DETERMINER LA PROTEINOGRAMME DE LCR DANS LES AFFECTIONS INFLAMATOIRES DU SNC ET DE LA MENINGE

Domnica *Țetcu**, Al.*Șchiopu***, Paula *Bakos**, Iringo *Kezdi Zaharia****

*La Discipline de Maladies Infectieuses

**La Discipline de Physiopathologie, Université de Médecine et Pharmacie

***L'Hôpital Clinique Municipal, Clinique des Maladies Infectieuses, Târgu-Mureș

Dans ce travail on a étudié les spectres de distribution spécifiques des protéines du LCR par rapport de la distribution des protéines plasmatiques chez les malades avec le syndrome méningien clinique comparatif avec un échantion témoin, représenté par des sujets sains, et utilisant la méthode de dr. Al.Șchiopu, nommé électrophorèse en système d'électrofocalisation géométrique, méthode breveté par OSIM en 1995. On a étudié 88 sujets des deux sexes, des âges différents, entre 5 et 58 ans, 54 étant l'échantion témoin, 34 l'échantion des malades avec le syndrome méningien clinique. En l'échantion des malades avec le syndrome méningien a été divisé en trois groupes: la groupe des malades avec méningites virale (12 cas), la

groupe des malades avec meningo-encephalite (10 cas) et la groupe des malades avec réaction meningéale (12 cas). Dans toutes les trois groupes ont avait obtenu des modifications importantes des fractions proteiques du LCR, comparatives avec l'echantion témoin.