

CARACTERISTICA MALARIEI DE IMPORT ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Elena Mihnevici, C.Andriuță, Irina Sâmboteanu, Natalia Pobedinski

Catedra de Boli Infecțioase, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie,
Chișinău (Republica Moldova)

Au fost examinați 216 bolnavi cu malarie de import. La 112 (51,9%) bolnavi a fost diagnosticată malarie terță, la 88 (40,7%) - malarie tropică, la 13 (6%) - malarie ovală, la 3 (1,4%) - malarie cuartă. Dintre 216 bolnavi au suferit de malarie 112 locuitori locali și 104 - cetățeni străini. Până în 1987 a predominat importul malariei terțe, iar din 1987 mai frecvent s-a importat în republica noastră malarie tropică. Malaria cuartă în ultimii 10 ani n-a fost înregistrată. În Africa s-au infectat toți cei cu malarie tropică, ovală și cuartă, de asemenea și 6 - cu malarie terță. Însă majoritatea bolnavilor de malarie terță s-au molipsit în Asia de Sud-Est. Apogeul importului malariei coincide cu lunile august-septembrie. Cu diagnostice greșite au fost îndreptați pentru spitalizare 36 (16,7%) bolnavi, dintre care cu infecție respiratorie acută - 19, cu tifos exantematic - 5, cu pneumonie - 4 și 8 bolnavi - cu alte patologii. La toți locuitorii Republicii Moldova malarie

evolua în formă clinică tipică, iar la străini în 14,4% a fost depistată o formă frustă. În formă ușoară malaria a decurs la 45,5% băștinași și la 50% - străini, în formă semigravă - corespunzător - la 50% și 35,6% și în formă severă - numai la 4,5% bolnavi din republica noastră. La toți 216 bolnavi diagnosticul de malaria a fost confirmat cu metoda parazitologică. În sângele periferic s-a depistat o anemie (15,7%), leucopenie (21,3%), limfocitoză (45,5%), monocitoză (38,6%) și aneozinofilie (30,6%). La toți bolnavii tratamentul a fost eficient.