

UNELE PROBLEME ALE TOXOPLASMOZEI UMANE

B.Fazakas, I.Oprea, Enikő Barabas-Hajdu, Anda Dana Fejer, Timea Kerekes, Z.Fülöp, R.Wynohradnyk, Angela Fülöp

Disciplina de Parazitologie, Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Târgu-Mureș

Între anii 1981-1994, prin metoda imunofluorescenței indirecte, cu lame teste, s-au examinat 1215 seruri provenite de la persoanele trimise cu suspiciunea toxoplasmozei. În 66 de cazuri s-au găsit valori pozitive, cu titruri între 1:40 și 1:1280. Concomitent au fost urmăriți și tratați 378 de bolnavi internați cu diagnosticul toxoplasmozei. Dintre cei 378 de bolnavi 60 au fost copii, iar restul adulți. Sexul feminin a fost reprezentat în 87% a cazurilor. În 96% s-a găsit toxoplasmoza dobândită, având următoarele forme clinice: forma ganglionară în 43,75%, forme ale SNC: 10,39%,

formele oculare la 10% și formele ginecologice la 31,25%. Restul de 3,12% a cazurilor au avut o toxoplasmoză congenitală. Bolnavii internați au fost tratați timp de 21 de zile cu Tindurină, Biseptol, Sulfametină și Vitamina B6.